



全國中藥成藥 處方集

中國中醫研究院中藥研究所等編



前 言

祖国医学，是一个伟大的宝库。它是我国劳动人民几千年来与疾病作斗争的经验总结。在中药成药制剂方面也同样有着悠久的历史 and 极为丰富的内容。

成药，由于使用方便，易于掌握，因而千百年来一直为广大人民群众所欢迎。正因为这样，中药成药对于维护我国人民健康不仅在过去即在现在和将来仍将起有重大的作用，这是一方面。另一方面，由于我国地域广阔，南北地理、气候条件不同，各地均有独特的丰富经验，这些经验都是十分宝贵的，因而及时地总结和整理这些经验，取长补短，互相交流，对于提高当前中药成药的生产水平，也是十分重要的。

为此，本书蒐集了全国二十五个大中城市的成药配本，经初步整理后汇编成书，用以反映我国中药成药生产的基本情况，并可供制备中药成药、临床应用、教学和研究等各方面的参考。但是，本书所收录的成药处方还是不够全面的，资料整理方面也存有很多的缺点，希望读者多提宝贵意见，以便今后修订补充。

中医研究院中药研究所
沈阳药学院药学系

凡 例

一、本书是根据北京、天津、上海、沈阳、广州、重庆、武汉、济南、吉林、撫順、大同、西安、福州、兰州、南京、南昌、青島、呼和浩特、哈尔滨、承德、长春、南宁、沙市、禹县、昆明等二十五个大中城市的成药配本，經初步整理汇编而成。

二、本书分总論、各論两部分。总論部分是根據有关資料結合实际生产編写的。其內容包括概說，一般炮炙方法和丸、散、膏、丹、酒、胶等重点剂型的基本理論，分类原則和一般操作方法。各論部分以如实反映各地原始配本資料为主。仅在方剂組合上作了一些初步的整理。

三、各論分类法則以继承传统习惯、結合实用为主，在可能条件下酌加調整，使更符合中医理論体系。共分六大門，即內科門、外科門、婦科門、儿科門、五官科門、杂症門。每門之中分为若干类，如內科門內分补益、风痰、时感、暑湿、燥火、痰嗽、气滯积聚、胃腸、血症、腫脹淋浊等十类，余門原則上仿此。每类之下再按剂型排列，分为丸、散、膏、丹、錠、酒、露、胶、茶、其他等等。同一剂型內的各种成方則按功能主治相近的类归一起，以便于参考。

四、方名同和药味主治相同的方剂，排列一处，以便于集中反映同一品种不同地区的經驗和特点；如药物組成、分两、功能、主治、用法、用量完全相同者則合併之，但仍保留地区名称。

五、每方之下，列有品名、来源、功能与主治、处方、制法、剂量和用法、禁忌、备考等項，以便于查考。

六、个别地区成方中有的資料項目不全，有缺功能主治者，有缺制法者，均不作增补，但尽量与同类方剂排列在一起，以資互相参考。此外，也有少数独門药，因項目不全而又缺乏参考材料，一时难以理解者，則予删除。

七、为了供各地对成方出处的进一步了解，在各該方剂后列有“附参考古方”一項，可資参考。但一时尚未查清出处者，暫付缺如，留待以后补充。

八、本书因系資料汇编，其中有許多宝贵的經驗和理論，这是可以肯定的，但也有部分不够妥善的地方。茲为反映各地配本的实际情况，以供有关方面参考研究，故除个别錯字及非学术性簡字（如三稜写成三△）酌予校正外，其余有关术语、别名、剂量等，均不予更动，以保持原来面貌为原則，暫不强求統一，但为讀者便于理解起見，在篇末附有药名、行名对照表，以供参考。

目 录

总 論	1
概 說	1
中藥炮炙法簡述	1
中藥成藥制备方法簡述	4
各 論	12

內 科

补 益 类	
鹿茸大补丸	12
鹿茸丸	12
全鹿丸	12
百补全鹿丸 大补全鹿丸	
鹿茸丸	14
人参鹿茸丸	14
参桂鹿茸丸	15
鱼鳔种子丸	16
参茸广嗣鱼鳔丸 鱼鳔丸	
保真广嗣丸	16
延龄广嗣丸	17
衍庆丸	17
真武丸	17
茴香丸	17
强精丸(强精补肾丸)	17
無比山藥丸	17
桂附地黄丸	17
桂附八味丸 八味地黄丸 崔	
氏八味丸 八味丸 八味肾	
气丸	
右归丸	19
景岳右归丸	
脾肾双补丸	20
双补丸	
附子七味丸	21
十全大补丸	21
十味补丸 十全大补汤 大补	
丸	
补中益气丸	23
益气丸	
黄芪建中丸	25
薯蓣丸	25
金匱薯蓣丸	
人参养荣丸	26
养荣丸 参桂养荣丸 人参养	
荣汤	
参茸丸(滋补参茸丸)	28
参茸百补丸	28
参茸衛生丸	28
八珍丸	30
局方八珍丸	
並补兩天丸(兩天丸)	30
龟鹿固本丸	30
龙虎丸	30
补血退黄丸	31
黄腫丸	31
滋补丸	31
益气健中丸	31
黑归脾丸	31
保身丸	31
归脾丸	31
人参归脾丸 养血归脾丸 白	
归脾丸 济生归脾丸 归脾	
养心丸 归脾湯	
补益丸(子午丸)	33
妙香丸	33
柏子养心丸	34
柏子养心丹	
硃砂安神丸	35
东垣硃砂安神丸 黄连安神丸	
安神丸 琥珀安神丸 琥珀	
安神丸	
人参琥珀丸	37
琥珀多寐丸	37
宁神丸	37
宁神定志丸	37
宁志丸	37
定心丸	37
安神定志丸	37
参茸固本丸	37
参茸补肾丸	
参茸补肾丸	38
人参固本丸	38
固本丸	
老奴丸	38
健陽老奴丸 金精老奴丸 如	
童老奴丸	
打老兒丸	39
补血荣筋丸	39
虎膠丸	39
葆真丸	39
龙骨續断丸	40
起痿丸	40
金剛丸	40
补肾金剛丸	
大补陰丸	41
丹溪大补陰丸 大补丸	
大补元煎丸	41
百补丸(長春百补丸)	41
滋陰百补丸	41
滋陰补肾丸	42
金匱肾气丸	42
肾气丸 薛氏金匱肾气丸	
左归丸	43
景岳左归丸	
归肾丸	44
小安肾丸	44
古菴心腎丸	45
海狗健腎丸	45
海參丸	45
大菟絲子丸	45
河車大造丸	45
补天大造丸 大造丸	
五子衍宗丸	46
五子丸 五子补肾丸	
壬子丸	47
五腰丸	47
保元丸	47
坎离既济丸	47
既济丸 坎离丸 滋陰坎离丸	
神仙既济丸	
神仙巨胜子丸	48
巨胜丸	
柏子仁丸	48
桑麻丸	48

扶桑丸	
三腎丸	49
壯陽三腎丸	至寶三腎丸 古
方三腎丸	海馬三腎丸 人
參鹿茸丸	
三一腎氣丸	50
六味地黃丸	50
六味丸	
七味地黃丸	52
歸芍地黃丸	53
歸芍六味丸	
知柏地黃丸	53
知柏八味丸	
麥味地黃丸	55
八仙長壽丸	五麥八味丸 麥
味丸	
柴芍六味丸	56
參麥六味丸	56
滋陰八味丸	56
都氣丸(七味都氣丸)	56
癩肝丸	57
三才丸	57
滋陰降火丸	57
滋補大力丸	57
二至丸	58
青娥丸	58
神效青娥丸	
立安丸	59
補腎丸	59
增精補腎丸	59
安神固精丸	59
加味腎氣丸	59
金鎖固精丸	60
固精丸	
金鎖玉關丸	60
鎖陽固精丸	61
鎖陽固精丹	鎖陽丸 固精丸
萃仙丸	62
萃仙丹	
斑龍丸	62
青囊斑龍丸	斑龍二至丸 斑
龍二至百補丸	斑龍百補丸
聚精丸	62
茯菟丸	63
局方茯菟丸	茯菟丹
威喜丸	63
補虛威喜丸	
滋腎丸	63
通關滋腎丸	通關丸
濟生腎氣丸	64
金匱腎氣丸	
豬肚丸	64
松石豬肚丸	
縮泉丸	65
玉屏風散	65

龍虎散	65
肘后癩肝散	65
六合散	65
豬腰六合散	
十珍散	65
妙香散	65
良方妙香散	
再造腎	65
益壽比天膏	66
參芪膏	66
黃芪膏	66
綿上黃芪膏	
代參膏	66
兩儀膏	66
當歸補血膏	67
十全大補膏	67
十味補膏	
鹿茸膏	67
毓麟固本膏	67
固本膏	67
金櫻子膏	68
金櫻膏	金櫻子煎膏
桑椹膏	68
桑椹子膏	文武膏
正元丹	68
老年延壽丹	69
長壽丹	69
回陽救急丹	69
補益丹	69
天眞丹	69
枕中丹(孔聖枕中丹)	69
枕中丸	孔聖枕中丸 孔子大
聖知枕中丸	
清腦慧智丹	70
靜神丹	70
天王補心丹	70
補心丹	寧神丹 補心丸
琥珀養心丹	73
琥珀丹	
九轉黃精丹	73
黃精丹	
七寶美髯丹	73
七寶美髯丸	美髯丹
既濟固真丹	74
金鎖正元丹	74
草還丹	75
補天丹	75
神效補天丹	
七寶益壽丹	75
補髓丹	75
延壽丹	76
八味丹	76
壯陽丹	76
胡尚書壯陽丹	
濟陰丹	76

滋補強壯丹	76
官方草靈丹	76
乾坤丹(乾坤種子丹)	76
還少丹	77
楊氏還少丹	還少丸 參茸固
本還少丹	真人還少丹
水陸二仙丹	78
水陸二味丸	
三才封髓丹	78
三才封髓丸	原方封髓丹
周公百歲酒	79
參茸藥酒	79
阿膠	80
驢皮膠	黑驢皮阿膠
龜版膠	80
鼈甲膠	80
鹿角膠	81
白膠	杜煎鹿角膠
黃明膠	81
龜鹿二仙膠	81
龜鹿膠	龜鹿參杞膏 龜鹿二
仙丸	龜鹿二膠
鹿鞭膠(鹿腎膠)	82
黃狗鞭膠(黃狗腎膠)	82
龜齡集	82
參茸三腎粉	82
法制黑豆	82

風 痰 类

指迷茯苓丸	83
茯苓丸	
青州白丸子	83
青州白朮丸	
健步虎潛丸	84
虎潛丸	
武當救世丸	86
消風丸	86
疏風定痛丸	86
天麻丸	86
易老天麻丸	祛風天麻丸
半夏天麻丸	87
天麻琥珀丸	88
虎骨木瓜丸	88
加味四斤丸	
搜風順氣丸	89
搜風丸	大黃丸
豨薟丸	90
九制豨薟丸	古方豨薟丸
舒筋豨薟丸	91
舒筋丸	
舒筋活絡丸	91
舒筋丸	91
風痛丸	92
當歸拈痛丸	92
木耳丸	92

如意大力丸·····	92	育赤散·····	111	醒迷至宝丹·····	127
豹骨木瓜丸·····	92	金不换膏·····	111	解語丹·····	127
追風丸·····	92	金不换神化膏 神仙金不换膏		金箔鎮心丹·····	127
牽正丸·····	93	金絲万应膏		癲狂丹·····	127
史国公药酒丸·····	93	救急膏·····	112	癰症鎮心丹·····	127
搜風丸·····	93	救苦膏·····	112	精制万应錠·····	127
独活寄生丸·····	93	舒筋活絡膏·····	112	养血愈風酒·····	128
独活寄生丹		追風膏·····	113	愈風酒	
神仙药酒丸·····	94	驅風膏·····	113	八仙酒(八仙庆寿酒)·····	128
苏合香丸·····	94	追風活血膏·····	113	史国公药酒·····	128
苏合丸 追風苏合丸 神香苏合丸		海馬追風膏·····	113	五加皮药酒·····	128
感应丸(苏合感应丸)·····	96	紅花活血膏·····	114	加皮露	
再造丸·····	96	桂附膏·····	114	虎骨酒·····	129
人參再造丸 人參回生再造丸		桑枝膏·····	114	虎骨膏 定痛散 虎骨追風酒	
回天丸 回生再造丸 回天再造丸		虎骨膏·····	114	虎骨药酒 虎脛骨酒 白虎骨酒	
牛黃清心丸·····	101	熊油虎骨膏 虎骨熊油膏		虎骨木瓜酒·····	131
万氏牛黃清心丸 万氏牛黃丸		狗皮膏·····	115	參茸虎骨酒·····	132
清心牛黃丸 局方牛黃清心丸 高麗清心丸 清心丸		麝香狗皮膏		祛風木瓜酒(重料木瓜酒)·····	132
小珠砂丸·····	105	風寒麻木膏·····	116	白花蛇药酒·····	133
清神定志丸(定志丸)·····	105	老鸛草膏·····	116	追風露(追風露药酒)·····	133
抱胆丸·····	106	豨薟膏·····	116	虎骨膠·····	133
惊悸丸·····	106	竹瀝膏·····	116	如意油·····	133
白金丸·····	106	回阳膏·····	116	坎离砂·····	133
癰癤白金丸 白玉化痰丸 硃郁丸		牽正膏·····	116	雷火針·····	134
癰疔鎮心丸·····	106	黑錫丹·····	116	热熨針 雷火神針	
龙虎丸·····	106	黑錫丸 局方黑錫丹 回生黑錫丹		双了拐(神仙双了拐)·····	134
癲狂丸 癲狂龙虎丸		大活絡丹·····	118	时 感 类	
医癰無双丸·····	107	活絡丹 大活絡丸 聖濟活絡丹 聖濟大活絡丹 神效活絡丹		羚翹解毒丸·····	134
医癰丸		小活絡丹·····	122	銀翹解毒丸·····	135
五癰再生丸·····	107	獨疳活絡丹 活絡丹 追風活絡丹		銀翹解热丸	
羊癰瘋丸·····	107	追風活絡丹·····	123	感冒苏風丸·····	135
解毒鬚蛇丸·····	108	舒筋活絡丹·····	123	和解丸·····	135
螃蟹丸·····	108	通絡益氣丹·····	123	川芎茶調丸·····	135
猴棗散·····	108	舒筋丹·····	123	九味羌活丸·····	136
精制猴棗散		愈風丹·····	123	清眩丸·····	136
神效散·····	108	灵应愈風丹·····	124	古方清眩丸	
稀涎散·····	108	追風透骨丹·····	124	清巖丸·····	136
追風散·····	108	追風丹		神仙冲和丸·····	136
金料散·····	108	透骨搜風丹·····	124	均气丸·····	136
木耳散·····	108	換骨丹·····	125	防風通聖丸·····	136
侯氏黑散·····	108	神仙換骨丹		防風解热丸 通聖丸	
牽正散·····	109	筋骨八仙丹·····	125	双解丸·····	138
六石風引散·····	109	透骨鎮風丹·····	125	双解香苏丸·····	138
惊風散·····	109	活血壯筋丹·····	125	双解通聖丸·····	138
奇風散·····	109	妙濟丹·····	125	消食苏風丸·····	138
通关散·····	109	大金丹·····	126	五积丸·····	139
开关散·····	110	伏虎丹·····	126	如意丸(如意丹)·····	139
三蛇胆陈皮散·····	110	神效回春丹·····	126	时疫清瘟丸·····	139
天麻散·····	110	梁会大津丹·····	126	清瘟丸	
琥珀散·····	110	十香返魂丹·····	126	清瘟解毒丸·····	140
鎮惊定癇散·····	110	十香返生丹 十香丹		清瘟解毒丹	
癲狂馬宝散·····	111	珠珀鎮神丹·····	127	犀羚解毒丸·····	140
				連翹解毒丸·····	140
				清涼解毒丸·····	141

消炎解毒丸	141
普济丸(普济消毒丸)	141
普济通宣丸	141
普济通眩丸	141
犀角化毒丸	141
达原丸(至聖达原丸)	141
代天宣化丸	141
代抵挡丸	142
托毒丸	142
太平丸	142
兌金丸	142
安宫牛黄丸	142
安宫牛黄散 新定牛黄清心丸	
牛黄安宫丸 安宫丸	
牛黄清心丸	144
疳疾丸	144
疳疾半貝丸	144
疳疾五品丸	144
龜甲煎丸	145
人參龜甲煎丸 金匱龜甲煎丸	
龜甲丸	146
五積散	146
复甦散	146
百解散	146
消風百解發汗散	146
芎苏香葛散	147
芎芷藿苏散	147
六味通解散	147
苏解散	147
苏解丸	
川芎茶調散	147
菊花茶調散 芎菊茶調散 茶	
調散	
头風散	148
立止头痛散	148
防風通聖散	148
紫花散	148
衛生散	148
桑菊散	148
銀翹散	149
銀翹解毒散	
桑菊銀翹散	149
荆防敗毒散	149
人參敗毒散	149
敗毒散	
四逆散	150
解表散	150
清解散	150
暹邏清解散	150
麝香透毒散	150
升降散	150
安宫牛黄散	151
牛黄安宫散	
抵肝散	151
截瘧散	151

神效截瘧散	
羚翹解毒膏	151
銀翹解毒膏	151
清瘟解毒膏	151
太阳膏	152
头痛太阳膏	152
头痛膏	152
万应头風膏	152
止痛膏	152
瘧疾膏	152
普济回春丹	152
普济灵砂丹	152
精制灵砂丹	152
大灵砂丹	153
选料大灵砂丹	153
神效冲和丹	153
五瘟丹	153
驅疫丹	153
犀角化毒丹	153
犀角透表丹	153
犀角解瘟丹	153
时疫普济丹	154
神应普济丹	
神效普济丹	154
清宫丹	154
犀角清宫丹	
牛黄清宫丹	154
清瘟丹	155
清瘟至宝丹 清瘟解毒丹 清	
瘟解毒丸	
牛黄清瘟丹	155
牛黄解瘟丹	155
牛黄衛生丹	155
玉雪丹	156
救苦玉雪丹	
至宝丹	156
局方至宝丹 局方至宝散 牛	
黄至宝丹 六味至宝丹 人	
參牛黄至宝丹	
紫雪丹	158
紫雪 紫雪散 局方紫雪丹	
紫雪玄霜丹	
神犀丹	161
神犀丸 叶天士神犀丹	
真犀丹	
瘧灵丹	162
七宝丹	162
神应七宝丹 截瘧七宝丹	
涼寒头痛酒	162
万应神麝	163
存安麝	163
采芸麝	163
建麝	163
福建麝	
建神麝	163
范志麝	
自制建神麝	164
万应神麝糕	164

午时茶	164
天中茶	
神麝茶	165
万寿香面	165
專治瘧疾方	165
暑 湿 类	
二妙丸	165
二妙散 三妙丸 清湿二妙丸	
三妙丸	166
清湿三妙丸	
四妙丸	166
藿香正气丸	166
大粒藿香丸 正气丸 藿香丸	
藿香正气散	
香薷丸	169
蒼藷丸	169
清暑益氣丸	169
菩提救苦丸	169
菩提丸	169
菩提万应丸	170
普济消毒丸	170
六合定中丸	170
定中丸 六合丸	
六和丸	171
古方手拈丸	171
甘露消毒丸	171
普济解疫丸	
冰霜梅苏丸	172
梅苏丸	
純阳正气丸	172
祛暑丸	173
金衣祛暑丸 加料祛暑丸	
扁鵲玉壺丸	174
五苓丸	174
五苓散	
胃苓丸	174
四順丸	174
急救丸	174
霍乱急救丸	
时症丸	175
时疫丸(阿伽陀药)	175
四症丸	175
四正丸	175
万应时症丸	175
备急丸	175
痧药丸(痧气丸)	175
痧药 蟾酥丸 痧气蟾酥丸	
蟾酥痧药丸 塘棲痧药丸	
冰麝痧药丸 犀黄痧气丸	
救急痧气丸 痧丸 苏痧药	
痧气丹 灵应痧药 痧气灵	
丹	
二妙散	178
丹溪二妙散	
胃苓散	178
一苓散	178

目	录
四苓散	178
四苓丸	
五苓散	178
藿香正气散	179
藿香散	
六一散	180
益元散 藿苏散 碧玉散	
清元散 温元散 玉泉散	
天水散 天水六一散	
天水散	180
益元散(辰砂益元散)	180
辰砂六一散	
藿苏散	181
碧玉散	182
温六散	182
定中散	182
甘露散	182
加味玉露散	182
不换金正气散	182
避瘟散	182
红避瘟散 避疫散 避瘟丹	
救急避瘟散	
白避瘟散	183
雷公散	183
威应丹 救急雷公散	
雷击散	184
雷公救疫丹 救急散 果济散	
麝香救疫散	184
救急散	184
普济散	184
神效济生散	184
诸葛行军散(武侯行军散)	185
行军散 人馬平安散	
行军散	185
白痧散	185
人馬平安散	185
人馬平安行军散	
人馬云安散	186
万应平安散	186
白平安散	186
白云平安散 平安散	
甘露消毒丹	186
普济解毒丹 长春丹	
七液丹	187
寸金丹	187
救急丹	188
急救丹	188
救苦丹	188
观音救苦丹 除瘟救苦丹	
黄金丹	188
分水丹	189
灵宝如意丹	189
如意丹 灵宝丹 灵宝如意丸	
八宝红灵丹	191
红灵丹	

避瘟丹	192
犀角避瘟丹	
臥龙丹	193
痧气(臥龙丹)	
武红灵丹	194
痧气飞龙夺命丹	194
避穢回苏丹	195
周氏回生丹	195
周氏应效丹	195
时令救急丹	195
观音救急丹	196
威应救急丹	
急救回生丹	196
霍乱救急丹	196
济生立效丹	196
胜利丹	196
和平丹	196
长春丹	196
臭灵丹	197
仁丹	197
济仁丹	
無極丹	197
济世丹	197
健民丹	197
防疫丹	197
万应錠	198
解热鎮靜錠 金鼠矢 神效万	
应錠	
回阳救急酒	200
金银花露	200
忍冬花露	
鲜藿香露	200
六和茶	200
安全片	200
救急水	200
救急痧药水	201

燥 火 类

三黄丸	201
清热二黄丸	
黄连上清丸	201
上清丸 黄连上清膏	
上清丸	203
芎菊上清丸	203
牛黄上清丸	204
犀角上清丸	204
滋陰甘露丸	204
生津丸	205
梔子金花丸	205
黄连解毒丸 金花丸 梔子金	
花膏 大金花丸	
清火丸	205
凉膈丸	206
凉膈丹	
清火凉膈丸	206

高丽清心丸(高丽丸)	206
清胃丸	206
牛黄清胃丸	206
清胃黄连丸	206
清胃黄连膏 清胃丸	
清宁丸	207
青麟丸 延寿丹 十五制清宁	
丸 二十四制清宁丸 秘制	
清宁丸 九制清宁丸 加料	
清宁丸	
九制大黄丸(清宁丸)	210
牛黄解毒丸	210
加味犀角丸	211
瀉青丸	211
龙胆瀉肝丸	212
当归龙薈丸	213
当归薈薈丸	
琥珀茯苓丸	215
凉膈散	215
清火凉膈散	
清胃散	215
金釵石斛膏	215
清火贵金膏	216
犀羚丹	216

痰 嗽 类

金水六君丸	216
养陰清肺丸	216
养陰清肺膏	
百合固金丸	217
固金丸	
壯士固金丸	217
玉露养肺丸	217
补虛止咳丸	217
洋参保肺丸	217
蛤蚧养肺丸	218
蛤蚧定喘丸	218
养肺止咳丸	218
潤肺鉄笛丸	218
参苏理肺丸	218
参苏丸 理肺丸	
通宣理肺丸	219
杏苏二陈丸	220
苏子降气丸	220
保肺丸	220
疎風宁嗽丸	220
荷葉止咳丸	220
止咳青葉丸	
清肺化痰丸	220
清肺止咳丸	221
立效丸	221
百花丸	221
百花定喘丸 加味百花丸 止	
嗽百花丸	
清肺抑火丸	221

清肺抑火膏 清肺抑火化痰丸	
清咽抑火丸 抑火丸	
定喘丸	222
定喘固金丸 定喘止咳丸	
定金丸	223
保金丸	223
清金止嗽化痰丸	223
鷄鳴丸	223
鷄鳴保肺丸 鷄鳴定喘丸	
郝氏養肺丸	224
解肌安嗽丸	224
寧嗽丸	224
太平丸(寧嗽太平丸)	224
五更太平丸 太平養肺丸	
寧嗽化痰丸	225
二母寧嗽丸	225
二母安嗽丸 二母丸	
止嗽化痰丸	226
止嗽定喘丸	227
蘆嗽丸	227
止咳丸	227
立止咳嗽丸	227
止咳定喘丸	227
止咳化痰丸	227
陰化止咳丸	227
半貝丸	228
惜紅丸	228
射干麻黃丸	228
二陳丸	228
除痰二陳丸 古方二陳丸	
橘紅丸	229
橘紅化痰丸	
清氣化痰丸	229
清火化痰丸	230
順氣消食化痰丸	230
消食化痰丸	
化痰丸	230
竹瀝達痰丸	230
化痰丸 竹瀝化痰丸 達痰丸	
竹瀝化痰丸	231
礞石滾痰丸	231
沉香滾痰丸 滾痰丸 隱居滾痰丸 礞石丸	
滌痰丸	233
小陷胸丸	233
己椒蘆黃丸	233
皂莢丸	233
霜雪定喘丸	233
哮喘丸	233
冷哮丸	233
清肺散	234
牛黃清肺散	
大清肺散	234
清金散	234
必效散	234

黛蛤散	234
桑麻散	234
咳嗽散	234
止嗽散	234
琥珀清金散	235
瀉白散	235
肺癰再補散	235
定喘散	235
沉香散	235
萊菔散	235
通宣理肺膏	235
百花膏	235
潤肺百花膏 神效百花膏	
清金止嗽膏	235
清肺抑火膏	236
養陰清肺膏	236
清肺膏	
潤肺膏	236
二冬膏	236
天麥二冬膏 貝母二冬膏	
琺瑯膏	237
羅仙瓊玉膏	
玉竹膏	238
玄霜膏	238
玄霜紫雪膏	238
梨膏	238
雪梨膏 止咳雪梨膏 法制梨膏	
枇杷膏	239
枇杷叶膏	239
枇杷膏	
西瓜膏	240
紫菀桂靈丹	240
清痰止嗽丹	240
養肺止嗽丹	241
清華潤肺丹	241
止嗽金丹	241
化痰金丹	241
清燥救肺丹	241
止嗽保金丹	241
哮喘金丹	241
健體固本藥酒	241
福壽藥酒	
寒涼咳嗽酒	242
法制肺露	242
枇杷叶露	242
地骨皮露	242
百葉仙膠	242
半夏蠟	242
法制半夏蠟	
竹瀝蠟	242
沉香蠟	242
霞天蠟	243
叭達杏仁粉	243

肺寧藥片	243
竹瀝水	243
法制陳皮	243
清肺寧	243

氣滯積聚類

木香順氣丸	243
順氣丸 木香丸	
檳榔順氣丸	245
檳榔丸 木香檳榔丸	
開胸順氣丸	245
消食順氣丸	246
流氣丸	246
流氣導滯丸	246
理氣丸	246
理氣舒肝丸	
寬胸利膈丸	246
利膈丸	
開胸利氣丸	247
黃連利氣丸	247
五味檳榔丸	247
英明普救丸	248
英神普救丸	248
普救丸	
太乙無名丸	248
黑虎丸	248
平安丸	248
丁香爛飯丸	249
丁沉透膈丸	249
丁香核桃丸	249
沉香化氣丸	249
沉香順氣丸	
沉香化滯丸	250
沉香降氣丸 化滯丸	
沉香順氣丸	251
沉香消積丸	251
沉香消化丸	251
沉香爛積丸	251
沉香至寶丸	251
開郁老薑丸	251
老薑丸	
豆蔻舒肝丸	252
紫薤丸	252
薤沉消導丸(薤沉百消丸)	252
開郁順氣丸	252
紫朴開郁丸	252
朴沉化郁丸	252
木香檳榔丸	253
枳實導滯丸	254
木香分氣丸	254
中滿分消丸	255
鷄胞化滯丸	255
化食三消丸	255
消痞化積丸	255

百順丸	256	化痞丸 龟鳖化痞丸		舒郁丹	278
百消丸	256	消积保中丸	268	沉香舒郁丹	278
补瀉丸	256	阿魏丸	268	沉香化气丹	278
瀉积丸	256	消痞阿魏丸 阿魏化痞丸		沉香四宝丹	279
爛积丸	256	神应百消丸	269	肝胃至宝丹	279
六聚爛积丸 六积丸 神效爛		沉香百消丸	269	解郁四宝丹	279
积丸		杀虫丸	269	华山碑記丹	279
誠修消滯丸	257	杀虫化积丸 追虫利积丸		碑記丹	
五香丸	257	化虫丸	269	消寒止痛丹	279
五香百消丸		五花丸	270	白虎丹	279
万应山楂丸	258	橘核丸	270	涼水金丹	279
山楂內消丸	258	济生橘核丸 橘核疝气丸 神		遇仙丹	280
內消丸		效橘核丸		預先丹 鷄鳴遇仙丹	
山楂丸	258	茴香橘核丸	271	五癭丹	280
大山楂丸		疝气丸 橘核丸 茴香疝气丸		麝香化积丹	280
四消丸	259	一二三层茴香丸	272	消积丹	280
檳榔四消丸 調中四消丸		良方三层茴香丸	272	消食化积丹	280
左金丸	260	胡蘆巴丸	272	疝气灵丹	281
二味左金丸 柴連左金丸 左		理疝丸 理疝胡蘆巴丸		蕩疝丹	281
金丹 回令丸		疝气丸	273	紅茅葯酒	281
加味左金丸	261	木香金鈴丸	273	沉香順气酒	281
越鞠丸	261	回春丸	273	佛手酒	281
丹溪越鞠丸 芎朮丸		三和散	273	佛手露 佛手露酒	
越鞠保和丸	262	木香調气散	273	狀元紅酒	281
良附丸	263	五香散	274	狀元紅	
止痛良附丸		嘉禾散(谷神散)	274	玫瑰花露(玫瑰露)	281
涼金丸(涼水金丹)	263	清咽散	274	木瓜軸	282
六郁丸	263	胡椒散(胡椒灵脂散)	274	七香餅	282
十香止痛丸	263	消脹寬膨散	274	五香粉	282
台草八香丸 十香丸		益欢散	274	消食飯灰(五香飯灰)	282
舒肝丸	264	枳榔消痞散	274	制金柑	282
王府舒肝丸 加料舒肝丸		六分散	274	一塊气	282
舒肝解郁丸	265	定痛五香散	274	一塊气丸	
平肝順气丸	265	磨积散	274	神仙一塊气	282
舒肝調气丸	265	化积散	274	一把抓	283
舒肝和胃丸	265	化痞散	274	舒气通	283
快胃舒肝丸	265	杀虫散	275	舒肝灵	283
腸胃舒郁丸	265	化虫散	275	治寸白虫方	283
琥珀利气丸	266	化痞散	275	胃腸病类	
利气丸		蠱症散	275	平胃丸	283
硃衣寬中丸	266	牡丹五筹散	275	原方平胃丸 治湿平胃丸	
四制棟实丸	266	疝气散	275	健脾平胃丸	284
消滯止痛丸	266	沉茄止痛散	275	香砂平胃丸	284
經驗止痛丸	266	阿魏化痞膏	275	四君子丸	284
九气拈痛丸	266	化痞膏		补陽四君子丸 四君子湯	
九气心痛丸		消痞膏	276	六君子丸	285
定痛丸	267	消痞狗皮膏	276	益气六君子丸 六君子湯	
除痛丸	267	化癖膏	277	香砂六君子丸(香砂六君子丸)	285
肚痛丸	267	麝香化痞膏	277	归芍六君子丸	286
丁香破气丸(破气丸、丁香破气		二龙膏	277	柴芍六君子丸	286
化积丸)	267	異授二龙膏		和中理脾丸	286
黃連磨积丸	267	水蓬膏	277	快脾溫胃丸	286
金鈎鈎积丸	268	八宝瑞生丹	278	扶脾丸	287
化积丸	268	瑞生丹		紫薤助脾丸	287
		平肝舒絡丹	278	养脾进食丸	287

清胃保安丸287
 黃連清胃丸287
 快胃丸287
 健胃丸287
 枳朮丸287
 二味枳朮丸
 香砂枳朮丸288
 加味枳朮丸
 橘半枳朮丸289
 香砂養胃丸289
 養胃丸
 香砂助胃丸290
 枳實消痞丸290
 失笑丸
 烏頭赤石脂丸290
 赤石脂丸
 四神丸290
 止瀉四神丸 神效四神丸 故
 紙四神丸
 太倉丸292
 二姜丸292
 止痛二姜丸
 加味二陳丸292
 舒泰丸292
 沉香交泰丸292
 三物備急丸293
 金匱備急丸 備急丸
 百補增力丸293
 增力丸 百補增力丹
 葛花解酲丸294
 溫白丸294
 硃砂萬億丸294
 硃砂萬應丸 萬應丸 神仙萬
 億丸
 黑虎丸295
 陸氏潤字丸295
 沉香紫薏丸295
 虎肚丸295
 神效虎肚丸
 消脹止痛丸295
 心胃止痛丸295
 烏龍丸296
 舒肝烏龍丸
 寬中丸296
 調胃健中丸296
 資生丸296
 健脾資生丸 資生健脾丸
 白朮丸297
 大健脾丸297
 小健脾丸297
 人參健脾丸297
 健脾丸 加料健脾丸
 調中健脾丸298
 理氣健脾丸299
 開胃健脾丸299

參苓白朮丸299
 參苓白朮散
 吳茱萸丸300
 久瀉丸300
 泄瀉丸300
 瓜蒌瞿麥丸300
 瀉痢固腸丸300
 固腸丸
 止瀉胃苓丸301
 香砂胃苓丸301
 肉豆蔻丸301
 理中丸301
 仲景理中丸 人參理中丸
 附子理中丸302
 理中丸
 肉桂理中丸303
 桂附理中丸(附桂理中丸)303
 參桂理中丸304
 丁薤理中丸
 參茸理中丸304
 丁薤理中丸304
 香砂理中丸304
 鷄內丸304
 茵陳五苓丸304
 茵陳五苓丸
 伐木丸304
 三丰伐木丸304
 大溫中丸305
 小溫中丸305
 絳朮丸305
 黃病絳朮丸
 保和丸306
 丹溪保和丸 消食保和丸 加
 味保和丸
 山楂化滯丸307
 蜜制山楂丸307
 芍藥丸307
 戊己丸307
 痢疾丸307
 治痢丸(治痢神效丸)307
 止痢丸308
 止血痢疾丸308
 紅痢疾丸308
 紅白痢疾丸308
 香連丸308
 局方香連丸 直指香連丸 二
 味香連丸 大香連丸
 加味香連丸309
 香連丸 香連散
 香連化滯丸310
 上痢香連丸 香連丸
 暖臍丸310
 駐車丸310
 烏梅丸311

烏梅安胃丸 仲景烏梅丸 仲
 景安胃丸 杀虫烏梅丸 烏
 梅安就丸
 麻仁滋脾丸(脾約麻仁丸)312
 麻仁丸 脾約丸 加味麻仁丸
 麻子仁丸
 潤便丸313
 潤腸丸313
 五仁潤腸丸314
 五仁丸
 活血潤腸丸314
 衛生潤腸丸314
 更衣丸314
 半硫丸315
 局方半硫丸 通幽半硫丸
 參苓白朮散316
 白朮散
 平胃散317
 東垣平胃散
 參苓平胃散317
 香砂平胃散317
 千金白朮散317
 神心散317
 安中散317
 活胃散317
 舒肝健胃散317
 肝胃氣痛散317
 健胃止嘔散318
 玉露散318
 甘露散
 養臟散(真人養臟散)318
 止瀉溫中散318
 肉豆蔻散318
 萬金散318
 香連散318
 痢疾香連散318
 治痢散318
 痢疾散319
 痢症散
 痢疾導滯散319
 瀉痢導滯散319
 清腸解痢散319
 止痢散319
 八厘散319
 阿膠散319
 黨參膏319
 暖臍膏319
 十香暖臍膏 封臍暖肚膏 暖
 臍丸
 便血紅痢膏321
 健胃丹321
 化食丹321
 順逆丹321
 胃病丹321

健脾增力丹	321
緩中丹	322
神妙奇效丹	322
瀉痢丹	322
紫砂丹	322
胃痛丹	322
來復丹	322
太乙來復丹 止一丹	
香砂正胃丹	323
痢疾奇妙丹	323
止痢急救丹	323
久痢丹	323
屠蘇酒	323
屠蘇飲	
白玉露(白玉霜藥酒)	323
甘露茶	323
六神齋	324
陳齋 神齋 半夏齋	
消食万应齋	324
沉香白消齋	324
健脾膏	324
健脾粉	325
胃潰瘍粉	325
蜜煎導	325
糊藥	325
血 症 类	
十灰丸	325
血症十灰丸	
荷叶丸	325
加料荷叶丸 叶灵神丹	
四生丸	326

瘡 瘍 类

連翹敗毒丸	337
蜡矾丸	337
清血解毒丸	338
清血珠黃丸	338
犀角紫草丸	338
琥珀蜡矾丸	338
蜡矾丸	
蟾酥丸	339
外科蟾酥丸	
蟾酥解毒丸	340
醒消丸	341
犀黃丸	342
牛黃醒消丸 西黃醒消丸 解	
毒犀黃丸 外科西黃丸 犀	
黃丹 虔制犀黃丸	
阳和丸	343
瘡科保安丸	343
瘡科蝦蟆丸	343
大麻風丸	343

归芍理中丸	326
奉賢丸	326
止血丸	326
神效止血丸	326
腸紅丸	326
止紅腸癖丸	327
斷紅腸癖丸	327
濟生止梅丸	327
十灰散	327
止血十灰散	
花蕊石散	328
止血散	328
地榆散	328
四紅丹	328
止血四紅丹	
八宝治紅丹	328
止血丹	329
止血化痰丹	329
止血秘紅丹	329
蚕豆花露	329
鮮生地露	329
八宝止血藥墨	329
腫脹淋濁类	
舟車丸	329
舟車神佑丸 河間舟車丸 神	
佑丸 淨勝丸 三花神佑丸	
十棗丸	330
仲景十棗丸 十棗湯	
禹余糧丸	330
續隨子丸	331
通關滋腎丸	331

外 科

小金丸	344
千里追風丸	344
海龍丸	344
羊芳丸	344
蹲龍丸	
經驗瘰癧丸	344
瘰癧疏肝丸	344
消癰丸	344
瘰癧內消丸	
海藻丸(內消瘰癧丸)	345
內消瘰癧丸	345
瘰癧丸	
消癰五海丸	346
消癰七海丸 五海丸 五海瘰	
癧丸 瘰癧五海丸	
消癰順氣丸	347
二分丸	347
藏連丸	347
榆槐藏連丸 腸連丸 治痔臟	
連丸	
槐角丸	348

革蘼分清丸	331
革蘼分清散	
琥珀丸	331
琥珀分清丸	331
琥珀通淋丸(琥珀五淋丸)	331
妙香琥珀丸	332
鳳凰丸	332
琥珀鳳凰丸 秘制鳳凰丸	
分清五淋丸	332
分清止淋丸 金砂五淋丸 淋	
症丸	
五淋白濁丸	333
八正丸	333
五色淋濁丸	333
治濁固本丸	333
归參丸	333
參归丸	
八正散	333
鎮坎散	334
蟾香散(益坎散)	334
五淋白濁散	334
止淋散	334
白淋散	334
金砂散	334
海金砂散 神效金砂散	
琥珀參苓散	334
回春散	334
控涎丹	335
子龍丸 控涎丸 三因控涎丹	
妙應丸	

腸風槐角丸 地榆槐角丸 槐
角地榆丸 地榆丸

痔瘡丸	349
愈痔丸	350
除痔丸	350
神效化痔丸	350
諸痔脫管丸	350
痔漏丸	350
王氏痔漏丸	350
痔漏無双丸	351
王氏下黃丸	351
清血搜毒丸	351
花柳搜毒丸	351
五虎搜毒丸	351
花柳敗毒丸	351
花柳解毒丸	351
聖靈解毒丸	351
如意金黃散	352
金黃散 金黃如意散 如意金	
黃丸	

三黄散	353	藤黄膏	364	神效瘰癧膏	376
瘡毒化毒散	353	宮粉膏	364	千錘膏	376
柏叶散	353	独角蓮膏	364	瘰癧千錘膏	376
芙蓉散	353	独角蓮膏藥 独角膏		鷓鴣膏	376
韓氏驅毒散	354	麝香膏(麝香蜈蚣膏)	365	穎曲氏回春膏	376
冲和散(冲和膏)	354	礞砂膏	365	紅毛紫金膏	376
千金內消散	354	外科礞砂膏		麝香回春膏	376
欽箍散	354	咬火膏	365	熊胆軟膏	377
护心散	355	綠云膏	366	紅膏藥	377
提膿八將散	355	綠膏藥 千錘綠云膏		黑膏藥	377
紅提毒散	355	鯽魚膏	366	梅花点舌丹	377
提毒散 加味提毒散		白魚兒膏 鯽魚白油膏		梅花丸子	
白提毒散	355	玉紅膏	366	飞龙夺命丹	379
提毒散	355	生肌玉紅膏		夺命丹	
拔毒散	355	紅王膏	367	衛生宝丹	380
五行散	355	白玉膏	367	衛生丹 神效衛生宝丹 衛生	
太平散	355	云母膏	368	宝	
珍珠散	356	五毒膏	368	保安万灵丹	381
珍珠丹 生肌珍珠散		血云膏	368	風湿止痛丹 保安丸 散毒万	
月白珍珠散	357	珠砂膏	368	灵丹 万灵丹	
八宝珍珠散	357	夾紙膏	368	治毒紫霞丹	382
珍珠八宝散	357	隔紙膏		諸瘡解毒丹	382
八宝生肌散	357	廔瘡膏	369	再造至宝丹	382
生肌散	357	膝下膏	369	消腫化毒丹	383
珍珠散 八宝生肌散		清湿紫金膏	369	黑虎丹	383
拔毒生肌散	358	胭脂膏	369	壺公丹	383
化腐生肌散	358	烏龙膏	369	九一丹	383
生肌定痛散		白鯽魚膏	369	提毒散	
四虎散	358	紫草膏	370	白降丹	383
回阳散	359	玉紅膏		夺命丹	
薏苡敗醬散	359	瓜蒌膏	370	紅升丹	384
薏苡附子敗醬散		呂祖治發背灵宝膏		一粒金丹	386
消核散	359	琥珀膏	370	提膿丹(三仙丹)	386
橘香散(原名乳癰橘香散)	359	拔毒膏	370	三仙丹	386
清痔散	359	大敗毒膏	371	生肌八宝丹	386
枯痔散	359	連翹敗毒膏		八宝丹	
消痔千金散	359	沈氏拔毒膏	371	生肌玉紅丹	386
桃花散	359	拔毒膏		青龙丹	386
鵝黃散	360	麝香拔毒膏	371	龙虎化毒丹	387
下疳散	360	拔毒生肌膏	371	立馬回疔丹	387
銀粉散	360	生肌膏	371	回疔丹 回疔散	
下疳散		清涼膏	371	小金丹	387
黃連膏	361	凍瘡膏	371	小粒金丹	
三妙膏	361	阳和解凝膏	371	消核丹	389
連翹敗毒膏	362	陽和膏		消癰丹	389
万应膏	362	回阳玉龙膏	374	消痔丹	389
紅毛拔毒膏 拔毒生肌膏 陽		夏枯草膏	374	九龍丹	389
和解凝膏		陀僧膏	375	花柳九龍丹	390
太乙膏	363	結乳膏	375	新加五宝丹	390
加味太乙膏		化堅膏	375	十仙丹	390
太乙万应膏	364	化核膏	375	避火丹	390
千槌膏	364	消核膏	375	蟾酥錠	390
秘傳千槌膏		万应消核膏	376	外科蟾酥錠 蟾酥条 蟾酥餅	
观音救苦膏	364				

坎宮錠	391
离宮錠	392
化瘍錠子	392
五色灵药 (提毒散、八宝提毒散)	392
外用紅灵药	392
清毒药	392
疔药	392
坐板瘡药	392
薄荷油	393
健民薄荷油	393
黑药油	393
专治瘰癧药面	393
冻瘡药水	393
治大背瘡驗方	393
臃瘡神效方	393
专治痔漏方	393
一粒珠	393
一笔消	393
一笔勾	394
局方 笔勾	
堆毒群芳白	394
吃疔虎	394

皮肤病类

苦参丸	394
苦参扫疥丸	394
合掌丸	394
合手香 合掌散	
胡麻散	395
蛤粉散	395
青蛤散	395
冰蛤散	395
五倍子散	395
文蛤散	
甘石散	395
一扫光散	396
黄金散	396
龟版散	396
二味拔毒散	396
妙散	396
四圣散	396
九圣散	396
黄水散	397
必效散	397
桃花散	397
四白灭癩散	397

經帶類

四物丸	416
四物益母丸	416
女科八珍丸	416

汗斑散	397
汗斑粉 密陀僧散	
玉容散	397
玉容粉 洗面玉容散	
除湿膏	397
白龙膏(驗方千錘膏)	398
輕黃膏	398
外科黃連膏	398
摩風膏	398
干疥刺痒搽抹膏	398
灭疥膏(硫黃膏)	398
疥瘡膏	398
疥藥膏	
万灵油	399
大楓子油	399
冰霜玃子粉	399
脚气粉	399
脚气散 脚气藥粉 脚气藥	
黃水瘡藥	399
黃水瘡散	
濕氣藥	399
擦疥藥	399
疥瘡藥	399
癬瘡藥	400
神效癩頭藥	400
禿瘡藥	400
禿瘡油藥	400
癬冷水	400
癬藥水	400
擦癬藥水	400
疥藥方	400
癬瘡方	400
霸王泥	400
一扫光	400
一扫光瘡藥 諸瘡 一扫光	
疥藥 一扫光	401

外伤类

二黃寶蜡丸	402
跌打丸	403
跌打損傷丸	軍中跌打丸
乳香定痛丸	404
大力丸(英雄大力丸)	404
正骨紫金丸(正骨紫金丹)	404
黑砂丸	404
礞峒丸	404
神效礞峒丸	

妇 产 科

当归内补丸	416
当归养血丸	416
内补养荣丸	417
千金吉祥丸	417

九分散	406
七厘散	406
伤科七厘散 神效七厘散 台	
麝七厘散	
八厘散	408
打伤八味散	408
玉真散	409
破伤风玉真散	
胜金散	410
石灰大黄散(桃花散)	410
神授散	410
定痛散	410
舒筋活血定痛散	410
铁扇散	410
黎嗣膏	410
万应宝珍膏	411
宝珍膏 内伤膏药 万应内伤膏	
万应太乙膏 万应红毛膏 万	
应灵膏 加料万应灵膏	
红鸡膏	411
内伤膏	411
活血膏	411
红伤黑药	
跌打损伤膏	412
活络膏	412
鸡血藤膏	412
燙火药膏	412
燙火軟膏	
五虎丹	412
全身丹	412
回生第一丹	412
第一效丹	
跌打丹(内府跌打回生	
第一仙丹)	413
补益活络丹	413
紫砂丹	413
接骨丹	413
跌打损伤酒	413
跌打酒	
劳伤药酒	414
风损膏药	414
刀伤药	414
吊筋药	414
燙火药	414
火燙药	
罐油	415
边臣十八位	415

調經種子丸 417
調經丸
種玉丸 417
種育丸

毓麟珠丸	417
調經毓麟珠	
調經毓麟丸	418
濟坤育麟丸	418
鹿胎丸	418
神效鹿胎丸 百補鹿胎丸 秘	
制全鹿丸	
鹿胎冷香丸	419
齡龜丸	419
百補濟陰丸	419
白鳳丸	419
烏雞白鳳丸 參茸白鳳丸 女	
科烏雞白鳳丸 婦科白鳳丸	
烏雞丸	422
烏雞種子丸 烏雞調經丸	
溫經丸	422
十二溫經丸	
安坤贊育丸	423
濟坤丸	424
坤順丸(參茸濟陰坤順丸)	424
培坤丸	424
月事丸	424
烏賊骨丸	424
女科烏賊丸 四烏賊 蘆茹二	
妙丸	
寧坤丸	425
婦寶寧坤丸	
益母丸	425
大顆益母丸 四制益母丸	
四制益母丸	426
八珍益母丸	426
人參益母丸 益母丸	
宋氏益母丸	428
調經丸	428
養血調經丸 調經益母丸 婦	
科調經丸 調經養血丸 調	
經育子丸 人調經丸	
黑神丸	430
烏金散	
和血通經丸	431
紅花當歸丸	431
通經丸	431
通經甘露丸	431
婦科黑豆丸(保育回生丸)	432
固經丸	432
痛經丸(經期腹痛丸)	432
艾附煖宮丸	432
暖宮丸	
大黃廕虫丸	434
血府逐瘀丸	435
血府丸	
逍遙丸	436
逍遙散	
加味逍遙丸	436
丹梔逍遙丸	

香附丸	437
四制香附丸	437
制香附丸	
四物香附丸	438
久制香附丸(九制香附丸)	439
七制香附丸	439
香附丸	
十珍香附丸	440
十味香附丸	440
舒肝保坤丸	440
崩露丸	440
砂鍋丸	441
千金止帶丸	441
止帶丸	
白帶丸	442
婦科白帶丸 婦女白帶藥 婦	
女白帶丸	
固下丸	442
治帶固下丸	
椿皮丸	442
逍遙散	442
調經和血散	443
崩漏止血散	443
千金止帶散	443
琥珀散	443
白帶散	443
鹿胎膏	443
鹿胎膠	
養血當歸膏(養血當歸精)	443
養血調經膏	443
婦女調經膏	
附桂紫金膏	444
女經膏	444
調經回春膏	444
益母草膏	444
四物益母膏 坤膏 坤草膏	
八寶坤順丹	446
金衣八寶坤順丹 坤順丹 人	
參坤順丹	
寧坤丹	447
寧坤至寶丹	
寧坤至寶丹	447
救坤丹	447
參茸濟坤丹	447
百寶濟坤丹	447
育麟保坤丹	448
保坤丹	448
培坤丹	448
定坤丹	448
救苦金丹	449
益坤救苦金丹 益心救苦金丹	
婦女救苦金丹	
女金丹	449
女金丸 勝金丹 調經女金丹	

趙氏金丹 人參女金丹 高	
氏女金丹 加料女金丹	
婦科金丹	451
婦科婦寶丹	451
滋陰至寶丹	452
勝金丹	452
婦寶勝金丹 神效勝金丹 參	
茸勝金丹 琥珀勝金丹 女	
勝金丹	
慈航丹	453
九轉慈航丹	
震靈丹	454
溯源丹	454
經帶金丹	454
調經丹	455
血還丹	455
二益丹	455
益母還魂丹	455
五寶丹	455
自行丹	455
玉液金丹	455
婦科補益丸 人參玉液金丹	
得生丹	456
婦科得生丹	
五癰至寶丹	457
化癰回生丹	457
化癰回春丹	
寧坤錠	457
婦女止痛酒	457
參茸補血露	458
藥砂糖	458
妊 娠 類	
養血安胎丸	458
養血固胎丸	458
健母固胎丸	458
先天補胎丸	458
安胎丸	458
保胎丸	459
保產安胎丸	459
保產無憂丸	459
保產無憂散 保胎無憂丸	
保孕安胎丸	459
千金保孕丸	459
保孕丸	
所以載丸	460
泰山盤石丸	460
孕婦金花丸	460
催生兎腦丸	460
兎腦丸 速產兎腦丸 催生丹	
催生丸	
保胎無憂散	461
保產無憂散 便產神方	
佛手開骨散	461
開骨散	
通產散	461

保胎膏	461
千金保胎膏	
清热凉血膏	462
熟地膏	462
保孕丹	462
千金保孕丹	462
胎产金丹	462
保胎金丹 产金丹 神功产金 丹 家传胎产金丹	

产 后 类

产后丸(人参回生丹)	464
救产丸	464
琥珀茯苓丸	464
产后救生丸	464
妇科散瘀丸	464

伤寒温疫类

羌活丸	472
小兒羌活丸	
小兒四症丸	472
紫草丸	472
通淋紫草丸	
小兒导赤散	473
小兒清涼散	473
牛黄十全散	473
清疹散	473
透毒散	473
育嬰金丹	473
金液仙丹 育嬰丹	
小兒痧疹金丹	474
香苏正胃丹	474
香苏正胃丸 加料正胃丹	

惊 風 类

小兒調中丸	474
保嬰育生丸	474
疎風保童丸	475
保兒安丸	475
如意丸	475
太極升降丸	475
太極丸	475
小兒太極丸 除瘟丸 加料太 極丸	
七珍丸	476
小兒惊風丸	476
惊風丸	
救惊丸	476
吳氏救惊丸	
鎮惊丸	476
牛黃鎮惊丸	476
牛黃鎮惊錠 牛黃丸 鎮惊丸 琥珀鎮惊丸	
琥珀鎮惊丸	478

烏金丸	464
妇科烏金丸 产后烏金丸 神 效烏金丸	
催乳丸	466
失笑散	466
經驗失笑散	
黑神散	466
妇科花蕊石散	466
清經散(清魂散)	467
猪肝散	467
下乳湧泉散	467
通乳湧泉散 湧泉散 下乳湧 泉膏	
生化膏	467
回生丹	468
妇科回生丹 人参回生至宝丹	

兒 科

安神鎮惊丸	478
百益鎮惊丸	
保嬰鎮惊丸	479
保安鎮惊丸	479
抱龙丸	479
小抱龙丸	
牛黃抱龙丸	479
牛黃琥珀抱龙丸 抱龙丸 金 黃抱龙丸 牛黃抱龙散 惊 風抱龙丸	
琥珀抱龙丸	481
抱龙丸	
珠黃琥珀抱龙丸	482
金衣抱龙丸	482
急慢惊風丸	482
慢惊丸	482
醒脾丸	482
小兒四六風丸	483
小兒回春散	483
小兒白效散	483
嬰惊散	
珍珠定風散	483
保嬰散	483
保赤万应散(保赤散)	483
万应保赤散	
千金散	484
牛黃千金散 牛黃鎮安散	
回生救急散	485
珠珀散	485
全蠍散	485
桃花散	485
平惊消积散	486
惊風七厘散	486
脐風散(小兒脐風散)	486
牛黃八宝散	486
至宝散	486

产后理血丹	469
神效产灵丹	469
还元丹	470
观音普济丹	470
观音救苦普济丹	
产后药	470

其 他 类

滋陰百补丸	470
妇科五淋丸	470
疳症丸	470
疳症丸	470
破血紫金丹	470
妇女香身丹	470
化癥錠	471
下癥錠	471

小兒惊風散	483
牛黃惊風散	
救惊散	487
牛黃救惊散	
鎮惊散	487
珠珀鎮惊散	487
保嬰鎮惊散	488
鎮惊膏	488
保赤丹	488
保嬰夺命丹	488
保幼培元丹	488
小兒金丹	488
保幼再生丹	488
保幼化風丹	488
散風丹	489
小兒回春丹	489
五粒回春丹 小兒回春丸 万 病回春丹 小兒万病回春丹 回春丹 五粒万病回春丹	
导赤丹	491
清热保幼丹	492
沉瀝丹	492
七珍丹	492
小兒七珍丹	
寿嬰丹	493
牛黃八宝丹	493
八宝丹	
至聖保元丹	494
保元丹	
至聖保嬰丹	495
牛黃紫金丹	495
紫金丹	
珠黃宝生丹	495
救惊丹	495
珠珀保嬰丹	496
保嬰丹	

小兒百壽丹	496
百壽丹	
乾元丹	496
化風丹	496
已風丹	497
法製金液丹	497
小兒咽喉靈丹	497
謝氏育嬰丹	497
秘製混元丹	497
金衣全寶錠	497
定搐化風錠	497
小兒定搐化風錠	
小兒定風珠	498
小兒肥皂餅	498
小兒急驚粉	498
鎮驚新葯	498
兒女福	498

痰 嗽 类

小兒止咳丸(華蓋止咳丸)	498
小兒久嗽丸	498
止咳太和丸	499
小兒寧嗽丸	499
解肌寧嗽丸	499
清金埋嗽丸	499
瀉白丸	499
白玉丸	499
小兒化痰丸	500
驚風咳丸	500
鸛鷀涎丸	500
小兒鎮咳散	500
小兒清肺散	500
清肺散	
牛黃清肺散	500
清金散	501
牛黃清金散	501
猴棗鸛涎散	501
寧嗽膏	501
止咳清官丹	501
九寶丹	501
小兒止咳金丹	501
兒科嗽靈丹	501
妙靈丹	502
百日咳新葯	502

胃 腸 病 类

小兒健脾丸	502
健脾肥兒丸	502
消補丸	502
燒針丸	503
福幼理中丸	503
啓脾丸	503

小兒啓脾散 人參啓脾丸 加 料啓脾丸	504
大一丸	504
五味異功散	504
異功散	
嬰兒健脾散	504
消疳扶脾散	504
育嬰散	504
健胃散	504
小兒千金散	504
小兒消熱散	505
小兒化滯散	505
一金散	505
丁香散	505
溫脾固腸散	505
止瀉分心散	505
止瀉散	505
小兒疳疾散	505
白朮散	505
保赤丹	505
混元丹	506
保元丹	506
育嬰壯脾丹	506
小兒化食丹	506
小兒至寶丹	506
育嬰至寶丹 嬰兒至寶丹	
理脾止瀉丹	506
白朮助胃丹	507
香粘丹	507
小兒香粘丹	
至寶錠	507
小兒至寶錠	
一捻金	507
小兒一捻金 人參一捻金	
一捻金散 八仙牛即散	
一字金	508
八珍糕	508
肥兒糕	509

疳 積 类

小兒化積丸	509
小兒紫霜丸	509
肥兒丸	509
疳積丸 五疳肥兒丸 消疳肥 兒丸 健脾肥兒丸 鷄肫肥 兒丸 消痞肥兒丸 加味肥 兒丸	
消積皂矾丸	511
真色五花丸	511
七疳丸	511
五疳消積丸 消痞五疳丸 小	

五 官 科

眼 目 类	
明目蒺藜丸	521

蒺藜丸 蒺藜明目丸	
明目上清丸	522

兒五疳丸 五疳消食丸	
百效丸	511
蘆薈丸	511
加味蘆薈丸	
珍珠丸	512
金蟾丸	512
保童丸	512
五色兌金丹	512
五色兌金丹	
使君子丸	512
蛔虫丸	
食積萬應散	512
娃娃安寧散	513
清虫散	513
化積散	513
五消散	513
五疳散	513
消疳散	513
吳氏消疳散	513
吳婆散	
清疳散	514
鷄肝散	514
疳積散	514
疳積散 小兒疳積散	
清疳化虫散	515
寸白虫散	515
消疳蘆薈散	515
妙效丹	515
消積萬靈丹	515
育兒丹	515
一厘丹	515
白玉餅	515
白餅	
肥兒片	516
鉄門栓	516
健兒素	516

其 他 类

犀角解毒丸	516
犀角化毒丸	516
犀角化毒丸	
化毒丸	
犀角解毒散	517
小兒牛黃散	517
養金化毒散	517
絳雪丹	518
五福化毒丹	518
五福化毒丸	
小兒化毒丹	519
犀角化毒丹	519
小兒化毒錠	519

清心明目上清丸 明目上清膏	
菊花明目丸(菊花通聖丸)	522

羚羊明目丸	522
清火明目丸	523
疏肝明目丸	523
单料羚羊明目丸	523
加料羚羊明目丸	523
小儿明目丸	523
消风养血丸	523
开明丸	523
开光复明丸	523
再造还明丸	523
黄连羊肝丸	523
明目羊肝丸	524
羊肝丸	
明目雁肝丸	525
明目地黄丸	525
杞菊地黄丸	526
杞菊丸	
保瞳丸	528
石斛夜光丸	528
夜光丸	
磁朱丸	530
磁砂丸 明目磁朱丸	
决明子丸	531
益气聪明丸	531
拨云退翳丸	531
退翳丸 拨云丸 拨云退翳丹	
还睛丸	533
明目还睛丸	533
还睛丸	
三花五子丸	533
八子丸	533
退翳还睛丸	533
保目全睛丸	534
洗眼碧玉丸	534
明目没竭散	534
清凉散	534
碧云散	534
光明散	534
八宝光明散	534
风火眼痛散	534
没药散	534
夜明散	535
明目蟬花散	535
明目清肝散	535
羊肝明目散	535
保光清凉散	535
明目散	535
烂弦散	535
退云散	535
拨云退翳散	535
拨云散	
拨云散	536
八宝拨云散	

撥云散	536
八宝撥云散(八宝磁砂眼药粉)	536
珍珠撥云散	536
八宝撥云散	536
八宝退云散	536
八宝退云散 八宝推云散	
眼科八宝散	537
養空青眼散	537
明目退云散	537
还睛退云散	537
复明散	537
日月光明散	537
开障去翳散	537
退翳回光散	538
黄连膏	538
明目黄连膏	538
龙胆其連膏(光明眼药)	538
清凉明目膏	538
明明化眼药膏	539
洗眼紫金膏	539
三光眼药膏	539
熊胆烂眼膏	539
明目熊胆膏	539
蕤仁春雪膏	539
退翳回光膏	539
化针丹	539
若霞丹	539
磨障灵光丹	539
磨障丹 灵光丹眼药	
洗眼灵光丹	540
琥珀还睛丹	540
宝光退障丹	540
八宝明目锭	540
紫金锭	540
八宝眼药	540
八宝明目散	
光月眼药	541
光明水眼药	541
克明亮眼药	541
撥云眼药	541
光明燥眼药	541
干眼药	541
瓜子眼药	542
養空青眼药(光明点眼药粉)	542
鵝毛管眼药 水眼药	
杏核眼药	543
眼藥藥	543
宋氏点眼药	543
清凉眼药面	543
光明油	543
洗眼蛋清	543
玉壺冰	543

耳 鼻 类

五寶丸	543
耳聾丸	543
耳聾左磁丸	544
耳鳴丸 紫磁地黄丸	
養胆丸 清肝保脑丸	544
片速散	544
耳疳散	544
聾耳散	544
紅棉散	544
吹耳散 耳痛散 吹耳紅棉散	
通耳紅棉散	
磁砂散	545
吹耳散	545
割耳散	545
耳底散	545
耳底白龙散	
黄连膏	545
耳底油	546
滴耳油 治耳油	
口 内 咽 喉 类	
六神丸	546
外科六神丸	
冰梅丸	547
冰梅上清丸	547
冰梅上清丸	547
祛毒牛黄丸	547
雄黄解毒丸	548
雄黄丸	
清咽利膈丸	548
清咽太乙丸	548
清音丸	549
铁笛丸	549
喉痛铁笛丸	
噙化丸	550
牛黄噙化丸	550
冰硼散	550
青黛冰硼散	551
冰片散	552
锡类散	552
綠袍散	552
烏龙散	553
珠黄散	553
珠黄消疳散	554
八宝珍珠散	554
异功散	554
喉症异功散 貼喉異功散 冰	
麝異功散 喉科異功散	
舒喉散	555
纏喉散	555
清蛾散	555
西瓜散	555

龙脑吸虫散	555
雄黄解毒散	555
琥珀救喉散	555
万应散	555
吹喉散	555
八宝散	555
七宝散	556
青黛散	556
神效散	556
喉症散	556
艾叶散	556
香口散	556
中白散	556
青黛散	
牙疳散	557

人中白散 中白散	
千泉散	557
白荷胃散	557
樟冰散	558
牙痛失笑散	558
牙痛散	
止牙痛散	558
牙痛散	
擦牙散	558
青果膏	558
橄欖膏	
碧雪丹	558
泰信丹	559
金匱丹 赤霜散 加味信泰丹	
信泰丹	

杂 証

利牛丸	562
鵝卵石	562
升降敗毒丸	562
紫金散	562
一氣散	
乾坤一氣散	562

百效膏	562
附片紫金膏	563
甲角散	563
千水金	563
紫金錠(千柳)	564
太乙紫金錠 太乙千柳丹 柳	

目 录	
九龙活命丹	559
咽喉丹	559
小灵丹	559
牙痛一粒丹	559
乌龙錠	559
玉鎖匙	560
玉鎖匙 金不换	
金鎖匙	560
西瓜霜	560
牙疼药	561
牙痛药 止牙疼药	
牙疼药水	561
牙痛一粒笑	561
耳鳴丸	561

仙解毒万病丹 万病解毒丹	
太乙紫金片	
鹽水錠	567
八宝金药墨	567
局方百药煎	567

索 引	568
-----	-----

總 論

概 說

方劑學，是整个中医学的重要组成部分之一，它是在使用單味藥治病的基础上發展起來的。中医方劑學的基本內容，就是中医“辨證論治”的医疗原則在藥物組合使用方面的具体运用。藥物通过配伍組合后，可以發揮它的綜合作用，並能調和藥物的偏勝，更好地發揮其应有的功能。关于这一方面，早在我国現存第一部医書“黃帝內經”中就提出了明确的藥物配伍原則——君

臣佐使。可見我国方劑學的起源和發展，已有很悠久的历史。

关于方劑學的專書，根据历史文獻的記載，最早的有“伊尹湯液經方”，其后，汉代名臣張仲景的“傷寒雜病論”（即現行傷寒論、金匱要略二書的內容）对于方劑的組合与应用更有进一步的闡明和發揮。迨及唐宋以后，各家方書更为丰富，特别是北宋时編写的“和劑局方”，是作为当时全国中藥成藥制劑規範而凡

行的，这对以后中藥成藥的进一步发展具有重大的推动作用。由于医学是不断發展的，历代以来，各地民間單方、医家秘方，經推广試用后，其中确屬有效的，遂被逐漸納入成藥的范畴，因而迄至現在，有关中藥成藥方面的理論和經驗更为丰富，及时进行整理、总结，加以推广使用，对于人民保健事業确有重大的貢獻，是当前开展中医藥工作中的項不容忽視的工作。

中藥炮炙法簡述

中藥炮炙法是中藥半制品加工的操作技术和理論。藥物通过炮炙处理后，可以更方便的和更安全有效的用于湯劑和丸散膏丹等成藥的制备和应用。

炮炙法在我国起源是很早的，經過历代藥學家不断的实践和發展，至現代已經逐步形成一門專門的学科。因炮炙法与成藥生产有不可分割的关系，所以本書对炮炙法的基本內容和操作加以簡單扼要的介紹，以便供成藥生产者的参考。

炮炙法的加工方法極為复杂，南北地区也各有不同的經驗，本篇所介紹的仅是其中一般性的部分，仅供一般参考之用。如某些地区对某种炮炙法有傳統經驗者，可按傳統方法处理，不必拘泥于本篇所介紹的方法。

炮炙的操作方法，通常可分为5类，即：

1. 治法：本法系选取藥物的藥用部分，除去非藥用的異物或雜質，其切制的方法可分：

(1) 挑：挑揀去非藥用部分，如人参去芦，麻黃去根，山萸去核等。

(2) 篩：篩除藥物中夾雜的泥沙、石屑或其他夾雜物。

(3) 簸：利用藥物和雜質的比重不同，經過簸動使與雜質分離。

(4) 刮：刮去藥物外附着的栓皮或去皮，如刮朴、肉桂刮去栓皮。

(5) 刷：刷除藥物外絨毛或雜質，如枇杷葉去毛等。

(6) 碾：除去藥物附生的非藥用部分，如香附去須根，白薇去刺等。

(7) 劈：將大塊藥物劈（包括砍、砸等）成小塊，便于使用，如油松節等。

(8) 切：將藥物切碎或切片（包括橫切、縱切、斜切等）。切后的藥物称为咀片或飲片。

2. 水制：本法系利用水與其他輔料，以除去附著于藥物的不潔物，使藥物軟化便于切制，或減低藥物的毒性，或制取藥物細粉的一些方法。可分：

(1) 洗：用清水將藥物表面附着的泥土或不潔物洗去，洗時應注意掌握時間，勿使藥物在水中浸泡過久，減失藥效。

(2) 泡：將藥物放在清水中浸泡，使其柔潤便于切片，或除去藥物的毒質。泡時應注意將藥物按大小粗細分類处理，並根据季节、气温等不同情况适当掌握，以免影響質量。

(3) 浸：浸的時間一般較泡為短。凡藥物用水稍浸后，其柔潤程度能达到加工切制內，可采用本法。

(4) 漬(伏)：將藥物洗淨后，置于适当的容器內，蓋嚴，使水分徐徐滲入藥物組織內部，使藥物內外濕度均勻，便于切制。操作時注意溫度和時間，以免發酵或霉敗。

(5) 噴：系用少量的水、藥液等，使藥物均勻濕潤的方法。适用于有些藥物不宜水浸但又不能切切的，或炒制時噴以鹽水、酒、醋或其他藥汁者。

(6) 飛：系濕法制取藥物極細粉末的方法，「將不溶于水或難溶于水的藥物與水（或藥液）共研細，加入大量的水，攪拌，較粗的粉粒即下沉，細粉混懸于水中，傾出，粗粒再研再飛，傾出的混懸液靜置沉淀后，分出水分，干燥后，即成極細的粉末。

3. 火制：本法系藥物經加熱

处理的加工方法,按照加热的温度、时间和性质可分为:

(1) 炒:系將藥物在鍋內加热,不断地翻炒的方法,通常分为單炒和共炒兩类。

(甲) 單炒:單炒时不加輔料。根据炒的时间 and 程度,分为炒黃、炒焦和炒炭三种。炒黃系將藥物炒至表面微黃色或能嗅到藥物固有的气味为度,如炒白芍、炒麦芽等;炒焦系將藥物炒至表面焦黃色为度,如焦山楂、焦白朮等;炒炭系將藥物炒至表面黑色内部焦黃色(即炒存性)为度,如地榆炭、側柏炭等。

(乙) 共炒:即藥物加輔料同炒,常用者有下列数种:

酒炒:通常用黃酒,用量根据各該藥物項下的規定,酒炒的方法通常有二:(1)先將黃酒与藥物拌勻,稍悶或不悶,倒入鍋內加热,炒至藥物表面微黃即得;(2)將藥物在鍋內先炒至微黃色,再噴洒黃酒,微炒即得。

醋炒:通常用米醋,用量根据各該藥物項下的規定,炒法与酒炒同。

盐炒:取規定量的食盐加水溶解后,拌炒或噴炒,食盐加水的量应适当掌握,以藥物能搅拌均匀湿润为度。

米泔水炒:用米泔水与藥物拌勻,稍悶后,置鍋內加热炒至藥物表面微黃为度。

麸炒:先將鍋加热,洒入規定量的麸皮,至冒烟时,加入藥物,炒至藥物表面微黃,取出,篩去麸皮即得。

土炒:通常用伏龙肝(灶心土)置鍋內炒至輕松,加入藥物,共炒至藥物表面均呈土色,取出,篩去过剩的土即得。

米炒:將米倒入鍋內,加热,使米貼附鍋底上,俟冒烟时,倒入藥物,輕輕翻炒至藥物变色,取出,篩揀去米粒即得。

(2) 燙:將藥物与輔料共加热炒燙,但温度比炒高,通常有二种。

砂燙:先將砂土置鍋中炒热,倒入藥物,炒至藥物表面鼓起为度,取出,篩去砂土即得。

蛤粉燙:操作方法与砂燙同。

滑石粉燙:操作方法与砂燙同。

(3) 煨:系將藥物用火煨燒,通常分二种:

直接煨:將藥物直接在爐火上煨紅,塊粒細小的藥物,可置砂罐內煨燒,至煨紅为度,如龙骨。

間煨:將藥物置煨鍋內,上面复盖一个口稍大小的鍋,接合处用黄泥封严,加热煨透为止,如生地黄炭、灯心炭、血余炭等。

(4) 煨:系將藥物用湿润麵粉或吸油的紙包裹,在鍋內炒(如煨肉果);或在烘房中加热(如煨木香),以除去部分油分。

(5) 烘(或烤):系將藥物使之干燥的一种方法,通常置近火处烤或在烘房中干燥,如紫河車等。

(6) 燎:系將藥物在火焰上短时加热的方法,使藥物表面迅速受热焦化而内部不受影响,如鹿茸燎毛等。

(7) 炮:系將藥物用湿润的麵粉或湿润的紙包裹,埋在热炭灰中也全包裹物黄焦爆裂为度,本法已不常用。

(8) 炙:系將藥物与煉好的蜂蜜和少量水或油脂等拌勻后,在鍋內热炒,使輔料炙入藥物組織內,如炙甘草、炙枇杷叶等。

4. 水火制:本法系一种综合性的加工方法,通常分为:

(1) 蒸:系將藥物置适宜的容器內,放在水鍋上加热,即用水蒸汽蒸藥物的方法。有些藥物在蒸时須加一定量的輔料,如黃酒、醋等,蒸时須將拌好輔料的藥物裝入罐內,封严,隔水加蒸,至液汁吸尽后取出。

(2) 煮:系將藥物与水或輔料(如醋、姜、甘草、黑豆、白矾等)共煮的加工方法,通常有二法:一种为与輔料同煮至完全吸尽,如商陆、狼毒等与醋同煮至醋吸尽;另一种为与輔料煮至一定程度后撈出,剩余的湯去掉,如川烏、草烏与甘草、黑豆湯煮至內無白心为度。

(3) 淬:系將藥物加热煨后,迅速投入冷水、黃酒或醋中,使之酥碎的方法,如赭石、阳起石等。

(4) 燻:系將藥物投入沸水中,翻动片刻,撈起,以便除去藥物表面附着的外皮,如杏仁、桃仁等。

5. 其他:不屬於以上四种类型的加工方法,比較常用的有下列数种:

(1) 法制:系一种特殊的加工

方法,意义是如法炮制。一般加有其他藥料,按照各該藥物項下的規定操作,如法半夏等。

(2) 制霜:系將藥物中所含的油分榨去,取用剩余的粉末,如巴豆霜、千金子霜等。

(3) 藥拌:加入其他藥料拌制,如珠珀、驚風散等。

(4) 提淨:系將藥物中杂质除去,提取結晶的方法,如芒硝、硝砂等。

【附】藥物的粉碎处理

在中藥成藥制造中,無論何種劑型和处方,其組成藥物都必須通过粉碎的处理。粉碎的程度随着制剂加工和应用要求不同,有的要求粉末極細,如某些外用的散剂和丹剂,特别是眼科用的散剂;有的要求一般的細粉,如丸剂的制备;有的則要求粗末,甚至是藥物的碎塊,如熬膏藥时所用的原料。

由此看来,中藥的粉碎处理是比较复杂的,它包括碎塊、粗末、細末以至極細粉末。

同时,中藥来源广阔,数量庞大,仅就本草綱目一书所收載者就有 1892 种之多,目前成藥中最常应用的藥物也在 500 种以上。这些藥物包括了动物藥、矿物藥、植物藥和部分人工加工制品在內。藥物与藥物之間的物理性狀有很大的差异,有柔軟的动物組織,如烏雞、兔腦、全鹿之类;有干燥的动物臟器,如海狗腎、獾肝之类;有坚硬的矿石,如花蕊石、紫石英之类;有易潮湿的無機鹽类,如大青鹽、草酸之类;有纖維性的植物根,如甘草、黃耆之类;有含大量油脂的植物种子,如杏仁、桃仁之类;有受热易融軟的树脂,如乳香、血竭之类;有含多量糖分易潮湿的藥物,如熟地、大冬之类等等。要將这些不同性狀的藥物統一达到粉碎的目的,是一个复杂的操作过程,中藥从業人員在这方面累积了丰富的經驗。总结这些經驗,找出它的規律性,使之逐步提高到現代理論水平,这对現代藥学的进一步发展是有很大的贡献的。

关于中藥粉碎的工作,有三个环节,即:(1)藥物的分研和配研,主要是利用藥物本身的物理性狀,分別單研和混合配研,使易成粉和难成粉的藥物互相协同調济以达到粉

碎的目的。这个方法主要是应用于中小型生产，但适当地考虑配研的原则，对大型生产在提高数量质量方面也有帮助。(2) 某些药物在粉碎前应进行特殊的处理：如某些属于动物脏器或特别坚韧的药物，不经过特殊处理是难以达到粉碎的目的。这些特殊处理的方法，因属于炮炙的范围，在这里不再赘述，可参阅炮炙法中的有关各条。(3) 粉碎机械的选择：关于粉碎工具的发明和改进，在我国已有千余年的历史了。现代的粉碎机械就是在前人的经验基础上发展而成的；但由于本书的编写目的在于介绍原有中药成药生产经验，故对选用机械及有关机械性能问题，暂不讨论。

兹就第一项有关药物分研和配研的问题，作如下申述。

中药的品种繁多，性状各异，有的药物不论单研或合研均易成粉；有的药物因系坚韧的纤维、胶质或角质，如果单独处理则不易成粉，必须适当配合其他药料共研方能成为粉末。当然，这种配合是有法度的，即有一定的数量比例的。

配研的原理是利用药物彼此不同的物理性状以起互相协同调剂的作用。调剂得越合理，成粉率越高，工时也越少。要想协同调剂得合理和适度，就必须对中药的性状有充分的了解，只有掌握了药物的特性才能在事前对处方中组成药物定出正确的配研设计，以获得良好的粉碎效果。

中药成药种类甚多，处方药物组合各各不同，在配研法上很难加以明确固定，而是随着处方的具体组合情况灵活运用。虽然如此，但还是有其一定规律性的。今结合一般常用药的特性及个别处方，加以阐述，作为读者在掌握配研法时的参考。

1. 珍贵药物（即细料）的处理 珍贵药物一般是指细料而言，细料在处方中通常占的比例较小，但它药效作用是重要的。为了保证剂量的准确，细料在处方中往往是分别加以处理的，这种处理又分为两种类型：

(1) 分研：药物本身容易研为细末的，可预先研为细末贮存，临用时按处方分两种准加入，属于此

类型的有犀角、羚羊角、三七、琥珀、珊瑚、珍珠、铜绿、轻粉、煅白石、硃砂、乳黄等等，这些药物中有的是较易成粉的如琥珀、铜绿、雄黄、硫黄^①、硃砂等等；有的则需特别处理，如犀角、羚羊角要用专门的粉碎机来粉碎。这种粉碎机有些像磨刀用的电动砂轮，如没有这种设备，先将犀角等镑成薄片，然后于乳钵中研至细粉亦可。有时药物事先需加炮炙，如煅白石、珍珠豆腐制等。研珍珠时为取得细粉和减低折耗率在研时加水同研；有些药物为取得极细粉，可用水飞法，如铜绿、煅白石、硃砂、雄黄等；雄黄、硃砂还应该用磁石去尽铁质。

(2) 兑研：有的细料药物单研不易成粉，如牛黄、麝香、冰片、轻粉等，可根据处方的内容，取出一部分药物细末共同研磨，如雄黄、煅白石或类似之物质均可，研至无声为度，可免去过筛，以免损失。当然，如没有适当配研的药物亦可单研。研牛黄、冰片时，可预先将乳钵微微润湿，研时用力不可过重，亦可得到适当的粉末。应该指出水片与薄荷水或樟脑之类同研时会逐渐融成液状物，但对药物疗效并无变化，液化后可按全色法混入处方中应用。

此外，也有个别细料本身就是液体物质，如苏合香油，所以不需经过粉碎直接加入；有的药物，如熊胆之类本身虽非液体，但亦可用开水少许，烊化后加入。

2. 含胶质粘性药物的处理：含胶质丰富及粘性强的粘性药物，单独粉碎是比较困难的，通常用配研的方法加以处理。

这类药物中比较典型的如熟地、龙眼肉等粘性最大，最不易粉碎；其次是玉竹、黄精、天门冬、麦门冬等，亦不易粉碎；再次是女贞子、山茱萸、五味子、乌梅、大枣等亦带有粘性，在粉碎时亦可加以注意。

熟地、龙眼单独是不易成粉的，操作时可先将熟地分切为大小适当的小块，再将处方中其他药物碎为粗末，与熟地或龙眼混匀，用石碾压研成块状，晒干或低温干燥（60℃以下）后再研，不易成粉者再干燥，再研，反复操作即可得到细粉。这种操作在华北一带称为“串”，是一种优良的操作方法，如六味地黄丸多用

“串”的方法处理。

在处方中如果有熟地又同时有山茱萸之类的药物存在，可将山茱萸合并熟地处理。如果没有熟地、龙眼之类，操作方法可以较为简化，干燥的时候也可以酌于缩短，以能成粉为度。除非医师特别许可，不应将这类药物于锅中炒或煨（即炒炒、蛤粉炒或滑石炒），以免减低药效。

3. 含脂肪或脂肪油丰富的药物的处理：某些含脂肪油丰富的药物，特别是种子类，如苦杏仁、桃仁、柏子仁、芝麻、榧子、酸枣仁、火麻仁、紫苏子、郁李仁、人面子、莱菔子、胡桃仁等，在粉碎时往往乳化成糊状物，影响其他药物过筛，所以应分出另行处理（在处方中所占的比例很小，不影响过筛者，可以混合处理），操作时先将其余药物研细、过筛，然后再将含脂肪的药物研成糊状（越细越好），再将药物粉末分次加入糊状物内，混合搅拌均匀即得。

除杏仁、桃仁等外，其余某些药物，如丁香、母丁香、豆蔻、砂仁、草蔻、胡麻子、益智仁、补骨脂、蔓荊、牛蒡子、橘核、牵牛子、葶苈子、苍朮等也都含有一定的油分，但不及杏仁等之多，仅操作时加以注意即可，不必另行单独处理。某些含有丰富脂肪油又同时有硬壳的药物，如木鳖子、鸦胆子、蕤仁等，可按处方的规定去壳或不去壳，按在处方中所占比例量的大小决定分研或合研。

4. 一般纤维性药物的处理：中药品种虽多而以植物药占绝大多数，植物药中又以含纤维质多的药物占多数，所以掌握各种含纤维多的药物的性能，对处理粉碎时的设计完全是必要的。

有的药物除含有纤维质外，同时含有丰富的淀粉或其他易成粉的物质，这类药物是比较容易粉碎的，如天花粉、白芷、白芍、石菖蒲、北沙参、黄药子、草河车、骨碎补、高良薑、葛根、泽泻等是。

有的药物含有纤维，粉质不多，但性脆亦易成粉，如甘松、白朮、紫草、细辛、草薢、独活、木香、川芎、升

① 雄黄、硫黄、火硝、轻粉等药物绝对不能同研，不然会发生燃烧，甚至爆炸，造成人身事故，必须特别加以注意。

麻、甘草、黃連、苦參、胡黃連、羌活、防風、前胡、地榆等是。

有的藥物含有纖維，本身又屬丁枝葉之類亦易成粉，如青蒿、香薷、浮萍、益母草、馬鞭草、荊芥、敗醬草、淫羊藿、紫蘇、透骨草、鹿含草、蒲公英、劉寄奴、澤蘭、大青葉、石楠葉、佩蘭、淡竹葉、荷葉、側柏葉、薄荷、月季花、白梅花、金銀花、厚朴花等是。

有的藥物含有纖維，但有吸潮性，質地微軟，在粉碎前需酌予晒干或低溫干燥，如桑葉、紫苑、黃耆、龍胆草、百部根、桔梗、鎖陽等是；有的質地較軟，須充分干燥才能成粉，如牛膝、黨參、當歸、玄參、知母、於朮、射干、枸杞子等是。

有的藥物含有纖維，但質地堅韌，其中部分不易成粉或粉碎後形成絨毛狀者，可採用重羅過篩（最好分取單研，以免影響其他藥物的過篩時間），篩余的纖維狀物質可煎成濃汁加入成藥中以保證質量。如干姜、白前、蔓本、白薇、續斷、常山、貫眾、艾蒿、茵陳蒿、白茅根等是。

個別特殊的纖維性藥物，成粉困

難，而且體積較大，可以煎成濃汁加入成藥內應用，不能隨意用代用品取代，以保證質量和療效。此類藥物有大腹皮、蓮房、絲瓜絡、錦灯笼等。

5. 其他植物藥物的處理：在種子類藥物中亦有不含或少含油脂物質者，這類藥物勿需特殊處理，如蛇床子、荔枝、皂角、扁豆、石蓮子、浮小麥、人蔞、小蔞、川椒、棟子、木蝴蝶、青果、藏青果、王不留行、冬葵子、白果、胡椒、赤小豆等是。

個別種子類藥物或質堅，或表面光滑，或形體過小，混研時不易接觸機械磨擦面，所以亦需單獨處理，如沙苑蒺藜、青箱子、白花菜子、地膚子、枳椇子、韭菜子等是。

部分花類藥物，質軟而韌，粉碎亦較困難，亦應另行處理，或選擇適當的機械粉碎之，如芫花、紅花、扁豆花、夏枯草（花）、荊芥穗、密蒙花、旋復花、款冬花、槐花、雞冠花等是。

6. 昆蟲類藥物的處理：昆蟲類藥物在粉碎前大都經過炮炙法的處理，或去頭足翅，或去毛，或微炒等等。在粉碎時一般沒有什麼特

殊的困難，可採用配研的方法，也可以採用分研的方法，這類藥物有水蛭、紅娘子、虻蟲、斑蝥、蛤蚧、蜈蚣、麝蟲、全蠍、殭蠶、蟬蛻等等。

必須指出，在研磨紅娘子、斑蝥等藥物時，必須對面部、眼睛及呼吸道加強保護措施，不然一但粘上藥末就會引赤發泡，或造成更嚴重的事故。

單獨處理蟾酥時也應特別小心，以免吸入，亦有先用牛乳浸潤（每蟾酥一斤加牛乳12~14兩）涼干後再研粉的，這樣做較易成粉和減少藥塵飛揚。

7. 礦物類藥物的粉碎處理：礦物類藥物的粉碎一般說較植物或動物藥較為容易，個別質地較堅硬的可以單獨處理（有時規定要煨或淬），如代赭石、石膏、自然銅、花蕊石、禹余糧、紫石英、陽起石、磁石等；質地不太堅硬的可以混合處理，如赤石脂、青礞石、浮海石、胆礞、明礞、伏龍肝等；有的藥物通常均單獨處理，如雄黃、硫黃、礞砂、硃砂、爐甘石等，可以單獨處理也可以混合處理。

中藥成藥制備方法簡述

中藥成藥是中藥藥劑學的一個重要組成部分，几千年来，我国人民在这方面积累了丰富的加工經驗和理論知識。這些經驗和理論，一部分記載在有關的中醫藥典籍里，一部分蘊藏在全國中藥老工人的實際經驗中，這一項寶貴的文化遺產急待我們很好的去繼承和整理，特別是老工人的活經驗，更急待搶救。

本書是介紹各地成方配本為主的，但為了幫助讀者理解和實際應用，特對一般中藥制備方法作一簡單扼要的介紹；由於祖國歷史悠久、地大物博，有關中藥成藥的制備方法，是極為眾多的，本書所收是不夠全面的，希望通過本書的拋磚引玉，各地將當地的經驗加以整理，互相交流，逐步提高，逐步統一，使祖國藥劑學在最短時期形成一個具有現代水平的完整的科學體系。

一、丸 劑

（一）丸劑的基本概念：中藥丸劑的涵義有兩個主要方面：一是含有“型”的概念在內；一是含有臨床應用的意義在內。蘇沈內翰良方曾說：“欲甚緩者用丸。”李東垣用藥法象指出：“圓者，緩也。”繆希雍炮炙大法中也提到：“丸者緩也，作成圓粒也，不能速去病舒緩而治之也。”由此可見，簡明的中藥丸劑的定義是“一種形圓的，在臨床緩緩奏效的固形劑”。

中藥丸劑通常由主藥和輔助原料所成，有固定的劑型，並具有很多優點。

成型後的丸劑，可呈潤濕狀態（如蜜丸），亦可呈干燥狀態（如水丸）。因有這兩種型式，所以在丸劑中可加入多種不同性質的原料（如膠類、礞石類、油脂類、醃類等）而不

致使制丸發生困難，特別是丸劑煉合劑的種類很多，可以根據不同的情況選擇不同的煉合劑，以滿足不同原料制備丸劑的要求，這是其他任何劑型，包括現代片劑在內的制劑所不及的。

由於丸劑是固形物質，所以矯正組成藥物的不良味道和有臭氣，便于病人服食。並在劑量上易于做到基本上準確，在取用時，以丸計算，也遠較散劑或其他液體制劑來得方便。此外，丸劑在包裝、貯藏和運輸等方面，也都比較便利。

當然，丸劑還是有它一定缺點的。首先丸劑的處方是固定的，沒有湯劑來得靈活；對兒童患者服用時有困難。同時，目前的中藥丸劑，還存在着體積過大的缺點，有待進一步研究改進。

（二）丸劑的分類：丸劑的分類方法甚多，現暫按制法不同而分類，

以便了加工單作參考。

1. 摺丸：即用摺合法製備的丸劑，又分：

(1) 手摺丸劑：單純用手摺製備的丸劑，如犀黃丸。

(2) 約摺丸劑：利用約摺機摺製的丸劑。

(3) 丸板丸劑：利用切丸板摺製的丸劑。

(4) 機摺丸劑：利用制丸機製備的丸劑。

2. 泛丸：即用泛丸法製備的丸劑。

(1) 水泛丸：用水泛製的丸劑。

(2) 酒泛丸：用酒泛製的丸劑。

(3) 蜜泛丸：用蜜泛製的丸劑（杭州胡慶余堂和重慶桐君閣均用蜜泛丸）。

(4) 藥汁泛丸：用含有藥效成分的藥汁泛製的丸劑（如蘇靈煎湯泛丸）。

(5) 糖衣丸劑：不用糖衣機泛製的丸劑。

一般丸劑除用以上方法分類外，還有按煉合劑不同而分類者，常用的分類有：水丸、酒丸、蜜丸、糊丸、蜡丸、醋丸、煎丸、藥汁丸、樹脂丸等等，其中以前五種最為常用。

(一) 丸劑的制法：丸劑系根據處方，將藥物粉碎為末，加賦形劑或不加賦形劑，用摺丸法或泛丸法作成的圓形劑。由於臨床应用的特殊要求，故丸劑的干濕度、體積大小和崩解時間，均各有不同。

丸劑由於成型後的性質及制法上的不同，分如下四類：

1. 蜜丸：蜜丸系用蜂蜜為粘合劑製備的丸劑，成型後為柔軟的半圓體，服用方便，並可減少藥物對胃部的刺激，為最常見的中藥丸劑類型之一。

蜜丸的制法可分為：

(1) 煉蜜：蜜的選擇及蜜的煉製程度是製備丸劑的關鍵問題。蜜的質量以色白如膏者良；煉蜜的程度按藥物的要求不同分為嫩蜜、煉蜜、老蜜三種。煉蜜的目的是在於通過煉製除去蜜內夾附的雜質及破壞其中所含的酶，並適當調整蜜的粘合力，使符合了製備丸劑的要求。

嫩蜜：適合了丸劑原料中含有大量油脂、醣類、動物組織等時用之。如烏雞白鳳丸、生黃抱龍丸等是。煉製時在蜜中加入少許水，加熱溶解，濾過，凝於手摺鍋中濃縮，待沸騰時析出的渾濁狀泡沫，用匙除去。沸騰後8~10分鐘即得。

煉蜜：煉蜜適合了一般丸劑使用，應用最廣。即將濾過的蜜，置手摺鍋內加熱濃縮，待沸騰時析出的渾濁狀泡沫，用匙除去，繼續加熱，煉至發生淺紅色有光澤的泡沫，用手捻之有粘性（指與指之間有粘稠感，不白絲）為度。

老蜜：適合了製作含有大量礦物或纖維素特別多的藥物的丸劑應用，具有較大的粘合力。煉製方法與煉蜜相同，惟煉製時間較長，至鍋中蜜呈紅、棕色稠液，凝止呈紅色，用手捻之成絲，指與指之間起白絲為度。

(2) 摺合：摺合即製備丸塊的操作，即將藥物粉末置乳鉢內，傾入一定量之蜜（蜜的用量約為藥物重量的60~200%，視原料的性質而異，含醣和油質多的藥物，用蜜較少；反之則用蜜較多），乘熱用力攪拌摺合，至具有彈性較硬的丸塊，即得。

(3) 搓條：將丸塊用手或制丸板搓成長條狀，以便進一步切割為丸劑。丸條的粗細按丸劑的大小而定，製備大丸則丸條較粗，製備小丸則丸條較細，視具體情況而定。

(4) 成型：制丸時將丸條分割為等量的小粒，用手或制丸板搓成圓粒即得。

在搓條和成型時，為避免丸塊粘附手或工具，可酌量在手或工具上擦潤滑劑少許。潤滑劑系用麻油、一、黃蜡二兩，加熱融合成。

2. 糊丸：糊丸系用糊精為粘合劑製備的丸劑，成型後經過干燥，成為堅硬的固體，其崩解速度慢於水泛丸和蜜丸。

按處方規定的不同，糊丸所用之糊精分為多種，有糯米糊：用糯米製成粉糊；麵糊：用小麦粉製成的糊；蒸餅糊：先將麵粉發酵蒸熟，然後加水攪拌成糊；粥糊：用米或粟米煮成糊；神麵糊：用六神麵製成之糊。也有在糊中另加酒、醋或藥汁者，稱酒糊、醋糊或藥汁糊。

糊丸的制法，有如下幾個步驟：

(1) 打糊：將制糊的原料置鍋中，加水適量，攪拌均勻，置火上用文火徐徐加熱，不絕攪拌，至原料完全糊化為度。

(2) 摺合：法同蜜丸。

(3) 搓條：法同蜜丸。

(4) 成型：法同蜜丸。

(5) 干燥：將制成之丸劑置於低溫（50℃以下）徐徐干燥，以丸劑的表面發裂，至接近干燥後，溫度可稍升高（60~70℃左右）。如處方內的藥物含揮發油較多，則應長期保持低溫，至丸劑充分干燥為度。

3. 水丸：水丸亦稱“水泛丸”，即以水作粘合劑，用人工或機械，用“泛丸法”製成，其崩解時間較蜜丸和糊丸均為迅速。又水丸由於不加賦形劑，故以同樣的數量比較，水丸的藥物效價大於蜜丸和糊丸。

水丸的制法分為：

(1) 起模：丸模是泛丸法成型的基础，丸劑的質量與丸模的優劣有密切的關係。起模時，將“藥匾”（手工泛丸的主要工具）置長凳上，左邊置藥物粉末（七、八分），右邊置一盆，內貯沸水，用棕刷蘸水少許，刷在藥匾的一邊，取藥粉少許撒於有水處，用手將匾旋擺，至藥物全部均勻地粘附於水潤處為度；另取一干燥棕刷，徐徐將藥粉刷下。藥物由於水的粘附，形成細小的顆粒，加入少量藥粉攪拌，使顆粒較為加大，然後再於匾的一邊蘸水，將顆粒旋於水潤處，使之潤濕，用刷刷下，加藥粉旋轉，如此反復操作，至丸模略大於黍米時為度。以後停止加水加藥物，用力旋攪，使丸模圓潤光滑，置70℃以下低溫中干燥之。

遇有不易起模者，可將藥物粉碎時，將處方中較易起模之藥物（如小麥等）先取一部分作為起模原料。

據一般情況，丸模的製備量約為成型丸劑的1%左右，則製丸1000克，需製備丸模10克。

(2) 泛丸：將干燥的丸模置篩內，取其大小均勻者置藥匾內，用刷蘸水少許，刷在匾的一邊，將丸模於水潤處旋擺，使之均勻地吸收水分，靜置3~5分鐘，再進行同樣的操作，至丸模充分潤濕為度，加入藥粉

少許，旋擺之，藥粉即被丸模及附粘着，再刷水，再旋擺，加粉，再旋擺，如此反復操作，丸型即逐漸增大，隨着丸型增大的同時，刷水量和加藥粉量亦隨之增加，至丸型略大于梧桐子，即停止加藥粉，用力旋擺，使之光滑，通過篩選，除去其中过大过小者，于70℃以下低溫中干燥之即得。

4. 蜡丸：蜡丸系用蜂蜡为粘合剂制备的丸剂，处方中的藥物多为毒性物質，在普通水溶液中不能完全崩解，但在腸中能徐徐發揮丸剂的疗效。用于蜡丸的蜂蜡应为純蜂蜡，夾有固体石蜡者不适于药用。

蜡丸的制法可分为：

(1) 熔蜡：將蜂蜡加热熔融，沉淀雜質，濾过，再加热熔融。

(2) 將藥物粉末迅速与蜂蜡捏合成丸塊，操作应迅速，以免冷凝影响操作。

(3) 搓条：法同蜜丸。

(4) 成型：法同蜜丸。

(四) 丸剂的貯藏：如何貯藏丸剂应按丸剂的类别和具体品种来决定。

貯藏蜜丸，必需密閉，並置于陰涼干燥处。貯藏時間最好不超过一年。

糊丸最易虫蛀，貯于干燥处，密閉，每月或每兩月检查一次。

水丸的貯藏法基本上与糊丸同，特別是有芳香性藥物的丸剂，密閉应更加严密，同时不可受热，貯藏時間也最好不超过一年。

蜡丸，因本身已有优良的包裝，不易變質霉敗，只要貯于陰涼处即可。

二、散 剂

(一) 散剂的基本概念：散剂是一种或数种藥物的干燥粉末，按处方剂量規定的均匀混合的一种制剂，服用方便，奏效較快。

散剂是历史較久的剂型之一。就中医理論說，散剂的定义包括两个方面：

第一，从剂型方面看，呈分散的細小顆粒，故称为散剂。繆希雍炮炙人法指出：“散者散也（散音傘），研成粉末是也。”龔云林寿世保元也曾說：“散剂，研成細末也。”这种說法与現代藥剂学散剂定义相符。

第二，从临床应用和治方方面看，是以發散風寒实邪为主，如孙思邈千金要方指出：“四肢病久，風冷發动，次当用散；散能逐邪，風气濕痹表里移走，后無常处者，散当半之”。后世学者概括了這項經驗，減称“散者散也（散音傘），解散其結塞”（見明李士材本草通串总論）；也有認為散剂主要是去腸胃的积聚，不上四肢風邪，如九世保元說：“散去急病用之，不循經絡，只去胃中及臟腑之積，故曰：散者散也。”但总的說來，这些理論都側重在散剂的临床应用方面，其共通点是“去急病，散积聚”。由于中藥散剂，有广床应用的含义在內，所以不只是指粉末狀的制剂而言，在服法和用法上也較現代散剂的範圍广。

(二) 散剂的分类：散剂由于制法和应用的不同，約可分为三种：

1. 內服散剂：內服散剂以內服为主（亦有内外兼用者，如七厘散、玉真散之类），通常为藥物的干燥粉末，供吞服或溫开水調服，如藿香正氣散，川芎茶調散等是。

2. 外用散剂（包括眼用散剂）：外用散剂，多供外用，亦为藥物的干燥粉末，其中眼用散剂更要求細淨，用于拈之無顆粒感者为良。外用散剂如珠黃散、三黃散之类，眼用散剂如撥云散、八寶眼藥等是。

3. 煮散：煮散是中藥特有的剂型之一，粉末較一般散剂为粗，不直接吞服而采用酒浸或煎湯的方式服用，服时有連渣吞服者，有去滓服湯者，随医师的处方而定。

必需指出，煮散与湯剂是有所不同的，湯剂多半随証施治，临时处方，而煮散则为固定处方，大量制造，临时取用，所以煮散仍屬于成藥范畴，如銀翹散之类是。

(三) 散剂的制法：內服散剂的制法，有下列几种：

1. 分研：將处方內藥物，分別粉碎为末，然后合併攪拌均匀，过篩即得。

2. 合研：將处方內藥物秤准，混合研磨成粉，过篩即得。

3. 套色：套色法亦称倍数法。凡藥物中含有少量毒性物質或少数珍貴藥物，必需絕對混合均匀者用套色法。套色法，即將需套色之藥物，另行研細，置乳钵內，加入等量

体积之另一份粉末，研磨使匀，再加入倍量之粉研匀，如此多次增加、倍量，至完全混入研匀为度，过篩一次即得。

外用散剂的制法：外用散剂为干燥的藥物粉末，专供外用。其制法同內服散剂。

煮散的制法：煮散系藥物的粗制粉末（二号篩），不直接吞服，用水或酒煎服，有去滓服者，有連滓服者，視处方具体規定而異。其制法，將藥物粉碎为粗末，过篩，遵医嘱煎服。

(四) 散剂的貯藏：如前所述，散剂是一种粉末狀的固体制剂，一般不另加任何賦形藥（毒藥除外），藥剂較为單純，体积也較小，但藥物粉碎后与空气的接触面和接触机会增大，在保存方面問題較多，易受潮的散剂，極易互相粘附成塊；含树脂类藥物多的散剂，受热也易融結成塊；有揮發性藥物的散剂，芳香成分容易飞散損失；不安定的藥物成分容易氧化變質，所以散剂的生产应加强計划性，以銷定产，一方面可以避免积压，造成浪費；一方面也可以提高藥物的質量。在貯藏方面，以密閉不洩气为原則，用瓶裝、盒裝、袋裝均可。並应貯放在暗冷干燥的地方为宜，有特殊气味的散剂应單獨貯放，以免沾染其他藥物。

三、膏 剂

(一) 膏剂的基本概念：膏剂，在古时主要是一种外用制剂，內經平真要大論曾說：“摩之、浴之、薄之、劫之、开之、發之，适事为故。”其中所指的摩之、薄之都是后代膏剂的濫觴。在南北朝时还称“膏”为“薄”；至唐代还有“摩膏”的称呼。随着时代的發展，膏剂的用途，逐漸扩大，不但治外病用膏，即治內病也可用膏（以膏剂治疗內病的典型著作为理瀉駢文）。明清时代將唐代的“煎”改称为“膏滋”或“膏”，如“枇杷膏”、“貝母冬膏”等也納入膏剂的范畴。这样，膏剂的品种更加丰富了。

膏剂是一种半固体的制剂，由藥物和基質两个部份組成（亦有不需基質者）。繆希雍炮炙人法說：“膏者熬成稠膏也。”龔云林寿世保元說：“膏者膠也。”都反映了半固

体制剂的含意。

(一) 膏剂的分类: 膏剂由于制法及应用的的不同, 約可分为四种类型:

1. 膏滋: 膏滋是藥物水或醇溶出液的濃縮物, 在唐代称为“煎”, 类似西藥的流浸膏, 如养阴煎、肺膏、桑椹膏等。現代習慣称为“膏”或“膏滋”, 結合中医“丸散膏丹”分类的傳統, 故暫列入“膏”剂討論。

2. 油膏: 油膏在古代称为“貼”, 即以动物脂肪(猪脂或牛脂等)或植物油加松香或蜡制成基質, 再加上藥物而成, 如松香貼: “右一味, 細切, 曝令極燥, 先煎脂蜡, 下松香烱尽, 內諸药上下, 候色足, 絞以綿布, 水中以新竹片上火炙之, 施紙上貼之”。此剂剂量現代应用甚广, 如紫草膏、五宝膏均屬于此類。

3. 鉛膏: 鉛膏即通称之膏药, 由植物油加黃丹(其他鉛化合物如官粉、密陀僧均可)加热制成基質, 再加上藥物而成, 主要为乙酸鉛, 在制造时由于鉛丹的应用比例及加热时的溫度和時間不同, 可以得到色澤和硬度不同的基質, 色澤由白色、黃色以至黑色, 通常应用以黑色者为多。最早的鉛膏載于肘后方, 称为“成膏”, 其制法是“清麻油十二兩, 菜油亦得, 黃丹七兩, 二物鉄鍋上火煎, 粗湿柳批篋攪不停, 至色黑, 加武火, 仍以扇扇之攪不停, 煙漸絕尽, 看漸稠膏成, 其須淨处”(見葛洪, 肘后各急方, 卷八)。由此可以看出南北朝時代的鉛膏就是今天所称的基質, 后世逐漸發展, 在基質上加入主要藥物, 疗效更为提高。这种剂型, 亦为現时常用品之一。

4. 敷药: 敷药是藥物粉末加水(或其他粘合剂), 使成軟膏狀, 用于外部調敷的一种制剂, 古代称为“薄”, 如升麻薄: “右一味, 篩, 和以猪脂, 調塗, 在傅之癰上, 燥易之”(見龔庆云, 丸散子鬼遺方, 卷四)。这种剂型也有它一定的特点, 中医外科常用之。

(二) 膏剂的制法: 膏剂制法, 大致分如下四种:

1. 膏滋: 將藥物碎为粗末, 用水或酒(准处方規定)加热煮出, 約煮2~3次, 至藥物中可溶性物質全部溶出为度, 上火上徐徐蒸發濃縮, 不加或加入一定量的蔗糖或蜂蜜

(准处方規定), 濃縮至占軟膏狀为度。

2. 油膏: 油膏的制法可分为如下两种:

(1) 冷法: 將藥物碎为細末(6~7号篩)置乳鉢內, 加入适量的基質, 研磨攪拌, 至均匀呈軟膏狀为度。

(2) 热法: 將藥物碎为細末(6~7号篩), 另將基質加热熔化, 乘热加入藥物, 不絕攪拌, 至冷凝呈軟膏狀为度。

3. 鉛膏: 鉛膏的制法可分为两种:

(1) 炸药法: 將藥物洗淨, 切碎, 干燥, 浸入用制鉛膏的植物油中5~10L(夏季浸时較短, 冬季較長), 將油連药共置火上加热煎炸, 至药炸枯为度, 濾出, 殘渣棄去, 將油再置火上热之, 至青烟起, 徐徐加入干燥的黃丹或鉛粉(加入量按处方規定, 一般油1斤, 用丹4~10兩), 不絕攪拌, 熬至滴水成珠为度, 取出放冷, 加入冷水浸泡, 溶去其中刺激性物質, 然后再用火熬融, 分攤于狗皮、紙或布上即得, 面积之大小, 随适用而定。

(2) 渗药法: 藥物研为細末, 另用純油加丹熬膏(熬法与炸药法同), 待成后分攤时, 將藥物加入于狗皮、布或紙上, 攪勻攤之。

(3) 混合法: 按处方規定, 將处方中藥物一部分按炸药法操作, 一部分按渗药法操作, 將兩法合併应用。

4. 敷药: 按其性質可屬于膏剂之范畴。即將藥物粉碎为末, 用水或酒調敷于患处。

(三) 膏剂的貯藏: 膏剂由于制法和来源不同, 在貯藏方面也各不相同, 通常膏滋較难存貯, 因膏滋是藥物的煎出物, 並含有一定的水分, 容易發酵和霉敗, 除在加工时应严格掌握操作規程和注意清潔外, 对貯藏膏滋的瓷罈或玻璃瓶均应用沸水煮过或用酒精消毒, 貯器內应少留空間, 加蓋之需严密, 然后貯于陰暗干燥处。本品貯藏時間最好不超过一年。

油膏系由油脂煎成, 一般裝瓶后加蓋閉固即得, 無特殊原因不易霉敗, 但須貯于陰涼处以免受熱熔解。鉛膏也宜貯于陰涼干燥处, 一

般的說, 也不易變質。

敷药一般为粉末狀藥物, 应用时临时加入粘合剂調用, 其貯藏法与散剂同。含揮發性成份的敷药, 宜临时配制, 貯藏時間最好不超过一年(有特殊密閉設備者不在此例)。

四、丹 剂

(一) 丹剂的基本概念: 丹剂在中藥剂型中是一种綜合性的制剂, 在古代称用化学方法制备的藥剂为丹, 如聖濟經說: “至于成丹, 則火力烹煎, 有一阳在中之义, 金石之类多取焉。”又, 丹字的原意是色紅, 如抱朴子說: “赤之以为丹, 丹性赤也。”所以某些色紅的金石药亦为丹(如硃砂亦称丹砂)。聖濟經也說: “今以火煉色赤者为丹, 非煉者为丸。”

在唐以前, 中藥藥剂以丸散膏丹等为主, 丹剂甚少。至宋元以后, 丹剂逐漸發展增多。合于古法制者有八仙丹、紅昇丹、小灵丹等; 有以丸为丹者, 如大活絡丹、小活絡丹、神犀丹、至宝丹等; 有以散为丹者, 如九一丹、黑虎丹、飞龙夺命丹等; 有以錠为丹者, 如辟瘟丹、玉樞丹等; 有以液体狀制剂为丹者如化鉄丹等等。所以張石頑在仿寒緒論里說: “丸药, 有名丹者, 先君子曰: 盖以方士多煅煉服餌, 凡諸石煅煉之物, 泛然称之为丹, 后卓約如控涎丹, 竟無知其所以焉。”

这个現在, 丹的正确定义尚待进一步的整理和研究, 部分学者將丹剂分散归納于各有关剂型中, 如丸丹丸剂, 散剂散剂等, 为商讨分类方便, 权可作此分类, 为严肃的对待祖国医学文化遗产, 則应深入研究, 在学术上作出正确的結論, 当分者分之, 当併則併之, 但不宜过分輕率的加以处理。

(二) 丹剂的分类: 丹剂是因素一种綜合性的制剂, 內容繁多, 定义未定, 所以在分类上也有一定的困难, 如按物理性狀分类, 如丸散等, 則与其他剂混淆和重复; 如按制法分类, 則包括不易全面。为应用計, 可暫按临床用途分类, 即:

1. 內服丹剂: 只供內服, 不供外用之丹剂, 如八宝紅灵丹、天丁补心丹之类是。

2. 外用丹剂,專供外用,不供內服之丹剂,如紅升丹、白降丹之类。

3. 內服外用丹剂:此类丹剂,既可供內服,亦可供外用,如小灵丹之类。

这种分类方法仅供应用参考,其正确分类方法应对丹剂进行系统的学术研究以后再定。

(二) 丹剂的制法:丹剂是一种綜合性制剂,其中大部分用化学方法制成,但亦有用物理混合法制成者。其剂型可为丸剂、錠剂或散剂,視处方的規定为准。

丹剂的制法由于操作的不同,可区分为四种,即:

1. 昇华法:將藥物按处方規定分量秤准,置鉄鍋或阳城罐(煉丹專用之坩堝),上复的瓷碗或鉄盖,用六一泥(由六分黃泥一分食鹽合成)封固,用文武火加热昇煉,至反应生成之物質全部昇华至上部碗底(蓋底)为度,停火,俟冷,取出,研为細末即得,如紅昇丹等是。

2. 降华法:將藥物研碎,調勻,粘附于鉄盖的上部,扣蓋阳城罐上,六一泥封固,四週热之,使反应物降华至罐底,停火,俟冷,取出,研細即得,如白降丹是。

3. 熔煅法:熔煅法系將处方規定藥物于密閉或不密閉的容器中,加热熔煅,使成为新生的物質——丹,如黑錫丹是。

4. 混合法:按处方規定,其中一部分藥物用煉丹的方法,或全部不用煉丹的方法而采用制丸散等方法,如女金丹、天王补心丹等是。

(四) 丹剂的貯藏:丹剂种类甚多,其貯藏方式也各不相同,用化学方法制备的丹剂,应密閉存貯,勿令吸潮。个别的丹剂如輕粉、白粉霜之类应藏于暗处,因与日光接触容易变成黃色,其余丹剂可根据其物理性質,分別按上述貯藏丸散的方法貯藏。

五、酒 剂

(一) 酒剂的基本概念:酒剂具有体积小、有效成份含量高、奏效快、容易保存等优点。酒剂在我国由来很早,也可以說是有文献可考的最早的一种制剂,在殷周时代甲骨文里就有酒和藥酒的記載。

关于应用酒剂的理論,在內經中早就明确指出:“經絡不通,病生于不仁,治之以按摩醪藥。”(血气形志篇)林亿註解說:“醪藥者所以养正祛邪,調中理气,故方之為用,宜以此焉。醪藥謂酒藥也。”不仁,就是神經麻痺的意义,可見远在紀元前,我国古代医药学家就开始用藥酒来治疗風湿性病患了。

宋以前的藥酒以發酵法釀造的为主,酒精含量較低;宋以后發明了燒酒,开始用蒸餾法制取,酒精含量大大提高,藥酒的制法也發展以浸取法为主,但仍保留釀造法,当时用浸渍法制备的称为“浸酒”;用釀造法制备的称为“醪酒”,如聖濟總錄卷八載有白朮醪酒:“右四味粗搗篩,以水一石同煮,取一石五斗去滓澄清,取汁釀黍米二石,用麴如常醪法,酒熟,压去糟滓,取酒于瓷器中收,密封”;卷十九載有茵陈浸酒:“右九味,咀咀,以生絹袋貯,以酒一斗浸二兩,宿。”繆希雍炮炙大法更对浸酒作了进一步的闡述,並且还重点的討論了藥酒的服用方法:“漬酒者,以酒浸藥也。有宜酒浸以助其力,如当归、地黄、黃柏、知母,陰寒之氣味,假酒力而行气血也;有用藥細剉如法,煮酒密封,早晚頻飲,以行經絡或补或攻以取速效是也。”

后世学者又有:“补虛損症,宜少飲緩取效;攻風湿症,宜多飲速取效”(見寿世保元)的說法。

(二) 酒剂的分类:酒剂,虽然应用面广、品种多,但內容比較單純,所以沒有严格的分类方法。为研究、生产和临床应用計,可暫按以下两种方法分类:

1. 按酒精含量高低和矯味藥(主要是白糖或冰糖)有無而分类:酒精含量高,不含或含糖少的称为“酒”,一般治疗風湿病或跌打損伤的藥酒多屬于此类;酒精含量低,同时含有多量糖的称为“醪”,一般滋补性藥酒或妇科用藥酒多屬于此类。前者与西藥酊剂类似,后者与西藥醑剂类似。酒醑的分类法則,是傳統的分类,文献早有記載,但实际应用上往往沒有严格区分,此点是应当加以強調,逐步在中藥制剂中予以实际应用。

2. 按临床应用范疇分类:如滋补藥酒、調經藥酒、跌打損伤藥

酒、風湿藥酒、祛寒藥酒等等。这种分类方法,在临床应用和商业經售方面甚为方便,但从藥剂学的角度出发,就难以从分类法則上闡明剂型特点,所以在制剂方面亦甚少用。

(三) 酒剂的制法:酒剂的制法,約可区分为:

1. 溶解法:能溶于酒的藥物如冰片、樟腦、松香、苏合香油等,可以直接溶于酒中,制为藥酒;不能直接溶于酒中之藥物,如阿膠、虎骨膠之类,可先用水少許,加热使用,然后傾入酒中搅拌均匀,制为藥酒。

2. 浸泡法:將藥物粉碎为粗末(1~2号篩),置瓷罇中加白酒浸泡,浸泡时密閉以免洩气,每日攪拌一次,七日后每週攪拌一次,浸泡時間至少在15日以上,越久越好。应用时,吸取上部澄清液体濾过即得。

3. 文火悬胎法:將藥物粉碎为粗末(1~2号篩),置紗布袋中,取一瓷罇,內置白酒,將藥袋悬于酒中,其位置相当于酒液的1/3处,密閉之,瓷罇外用溫火徐徐加热,使酒的溫度保持40~50°C左右,如此經過3~7晝夜,去溫,俟冷后,取出藥袋压榨之,榨出液与渗出液濾过即得。

4. 煎出去:先將藥物軋碎,加白酒适量,浸泡5~10天左右(夏季5天,冬季10天)后,再將酒与藥渣共同倒入鋼鍋內,放文火上微微加热約一小时,取出待凉后过滤即得。

5. 發酵法:將藥物粉碎为粗末,另取定量之糯米(与藥物之比例以处方規定为准),炊熟,乘热与藥物粉末混合,加入放溫的沸水适量,搅拌均匀,俟溫度降至38°C~40°C左右时,混入酒糟,置小口徑瓷罇內密閉之,貯于溫处(37°C左右),經一月后开封,榨取渗出液,濾过即得。

(四) 酒剂的貯藏:酒精本身是有灭菌作用的,所以藥酒本身就具有一定的防腐力,較其他剂型易于貯藏。不过,酒精的防腐力随着酒精濃度高低的变化,防腐能力的强弱也随之而增減,一般情况,酒精濃度越高防腐能力越强(以75%濃度防腐力最强);反之,則逐步減弱,低濃度的藥酒,酒精含量在20%以下的时候防腐力很弱,不但藥物有發酵和霉敗的可能,即酒精本身也

可能被氧化而变成醋酸^①，所以醃剂必需密封勿令洩气；药酒亦应封固于阴凉处以免酒精揮散，減低药物的質量。

六、錠 剂

(一) 錠剂的基本概念：錠剂系药物粉末加适当的粘合剂，用捏合法、模制法或机压法所制成的圆形药剂。

錠剂由于应用要求的不同，通常有紡錘形、長方形、圓柱形、方形等多种剂形，供内服者剂形較小，供外用者剂形較大。

(二) 錠剂的制法和貯藏：錠剂的制法約可分为二种，即：

1. 捏合法：取药物粉末，用糯米糊或按处方规定的糊按丸操作法制成丸塊，搓条，分成顆粒，按规定的錠形制成，干燥即得。

2. 模制法：先将药物粉末加糊制丸塊，用人工或机械挤压使成为大塊的藥片，如藥片表面有皺裂，可噴溫开水少許，复压使表面光滑，切成适当大小的塊狀（其大小及形狀視錠模而定），置錠模中，加模盖压榨，取出，剪齐边缘，干燥即得。

3. 机压法：將药物粉碎为極細的粉末(6~7号篩)，加入适量的糯米糊，作成顆粒，干燥之，用压錠机按规定的剂形及重量压成药錠即得。

錠剂的貯藏比較簡單，密封后，貯于干燥冷处即得。

七、膠 剂

(一) 膠剂的基本概念：膠剂是我国最早的制剂之一，有时也作为單味藥物在复方中应用。主要用作补养剂、止血剂、驅風剂以及妇科調經药。

膠剂系动物特殊蛋白質經溶解、濃縮而成的不定型膠狀物質，在常溫时是半透明的固形，加热則溶化，能溶于水形成膠体溶液，不溶于醇及他种有机溶剂。有动物蛋白質特有的气味。經充分干燥后，在密封器內可久貯不坏。

載于神农本草經的膠剂有兩種，即(1)白膠(即鹿角膠)；(2)阿膠(即傅致膠)兩種。梁·陶宏景名医別錄謂白膠“生云中，煮鹿角作之”；阿膠“生东平郡，煮牛皮作之，出

东阿”。由此可見膠剂在我国应用至少有2000年以上的历史。

从膠剂的具体操作看，基本上符合現在所謂“新格林制剂”的要求。將原生药通过提取和濃縮的步骤，棄去糟粕，提取精华。

(二) 膠剂的分类：中药常用的膠剂，种类很多，除神农本草經所載的外，历代本草均有發展，按其原料来源不同，約可分为以下数类：

1. 皮膠类：由动物的皮所煉成，常見的有阿膠和黃明膠。阿膠見載于神农本草經。名医別錄謂“者午反作之”，可見古代的阿膠即牛皮膠。不唐时隋藏器本草拾遺已記載用驢皮煎膠，如說：“凡膠均能行風、止洩、补虛，驢皮膠主風为最。”氏氏的說法获得后世多数学者的支持，此后牛皮阿膠即漸由驢皮阿膠所取代。至明时李时珍本草綱目已將二者分称，称驢皮膠为“阿膠”，称牛皮膠为“黃明膠”。

2. 角膠类：角膠类在中药中仅有鹿角膠一种。古代煉角膠时不去油，后世則將角完全除去，純以膠質煉成，称“鹿角膠”，濾出的骨渣，称“鹿角霜”，亦供药用。

3. 骨膠类：骨膠系以动物的骨骼煉成而成。通常有虎骨膠、豹骨膠和魚骨膠等。此等膠类未收載于古本草中，是后世药学家在古人經驗發展而来的。

4. 甲膠类：是以水产动物的甲煉成而成，如龟版膠、鱉甲膠等是。由于發明和应用較晚，直到清代的本草書才开始記載；但現時应用甚为广泛。

5. 肉膠类：是以动物的肌肉煉成而成，应用时代亦較晚，常見的有霞天膠，由牛肉提煉而成。

6. 其他膠类，如龟鹿二仙膠，系鹿角膠与龟版膠混合而成等是。

(三) 膠剂的制法：膠剂的种类虽多，但制法大体相似，有許多共同之点；但各种膠也有它的特点，故某些膠还需个别处理。兹分述于下：

1. 原料的选择：煉膠时对原料的选择是非常重要的，原料的优劣，对产品的質量和生产率，有着直接关系；但限于篇幅，仅能介紹几种重要原料的选择要求，提供参考。

阿膠：用以制备阿膠的驢皮，以

張大、伤少、皮厚、毛黑为上；有杂色毛、張小、皮薄者次之。病驢或生过皮膚病的驢皮不能入药。取皮以冬季为佳，俗称“冬板”，春秋产者次之，夏季产者称“伏板”最次。

鹿角膠：用以制备鹿角膠的鹿角通常有兩種，即花鹿角与麝鹿角。均以人工锯下，以骨中含有血質对光照之呈紅色者为佳，称“获角”；春季自脫之角次之，称“脫角”；檢自野外，經受風霜侵蝕之脫角，質白有裂紋者最次，称“霜脫角”，不能入药。

虎骨膠：用以制备虎骨膠的虎骨，以产东北者为最佳。熬膠可采全架骨，無筋肉油脂，重10斤以上不枯白之新貨为良。陈久枯白之原料，产膠量小，不宜作熬膠用。

龟版膠：用以熬制龟版膠的龟版以产于洞庭湖一带者为佳，因多由汉口轉运，故称“汉版”。对日光照之，微透明呈粉紅色者良，又称“血片”。形小色不呈粉紅色者次之。鱉甲膠的鑑識法同龟版膠。

2. 原料的处理：因直接購得的原料，附有多量不潔物和不入药用的組織，故必經過一番处理。茲將处理法分述如下：

驢皮：將成張之驢皮，于大池中用清水浸泡，每日換水2次，3日后取出，置于木架上，刮去毛，不可伤及皮，以免減少产量。去毛后，洗淨晾干，再用鋼刀切成四寸見方小塊，再放入池中浸泡，每日換水1~2次，5~7日后，即可供熬膠之用。

鹿角：鹿角先放于池中浸泡，每日換水1次，3~5日后取出。用刀刮去附着在角上的杂皮茸毛，洗淨，打碎或鋸成2~3寸的小节，再放入水中泡之，每日攪拌1次，換水2次，至鹿角內外都清潔，毫無血質，至泡角之水澄清为度。

虎骨：將全架之虎骨放于池中浸泡，3天換水1次，直至附着于骨上的筋肉完全腐爛，骨架已散开时，取出，用刀刮洗潔淨，打碎或鋸成短节。用热的皂莢水刷洗去油質，然后用清水漂之，每日換水1次，漂泡約1月，至內外清潔为度。

① 在古代的药酒，酒精含量均較低，容易發敗，未酸敗的称清酒、美酒或無灰酒。已酸敗的药酒，加石灰（氢氧化鈣）中和醋酸，使生成醋酸鈣沉淀，濾过后用，即有灰酒。

龟版：在夏秋之交，將龟版貯放缸內，注以清水，日晒夜露，使附着于龟版上的皮肉腐爛，至着手即裂为碎塊为度。取出，反复用水冲洗，至清潔后再用清水漂之，每日換水2~3次，漂3~5天即成。开始貯于缸內时，最好置于郊外無人烟处，因为皮肉腐爛时，有臭气放出，影响衛生；如無合适地点泡版，用稀氫氧化鉀或氫氧化鈉溶液泡亦可，每日換液一次，經2~5日也可將皮肉蝕去，但上述溶液濃度不可过大（一般可用0.5%的溶液）以免減少膠的產量。

鱉甲：鱉甲處理法与龟版同。

牛肉：用以煉熬震天膠之牛肉，可选淨瘦肉，去淨脂肪韌皮，切为厚塊，于清水中漂之，每日換水2~3次，換水时将牛肉盛布袋內压之。經3~5日后，以牛肉呈白色無血水滲出为度。

3. 膠汁的抽提：將原料与水一同煮沸，使“膠朮”溶出。熬膠宜用軟水，以免影響成品質量和透明度。

熬膠时用水量不宜过多，也不宜过少，以淹沒原料为度。鍋应有多孔假底一层，以免原料与鍋底接触，發生焦化現象。火力亦不过大，以微微沸騰为度。熬膠过程中，如水分因蒸發而減少时，可于鍋沿徐徐注加清水补充。

熬至膠朮含量約达5%时，即可將膠汁放出。加热時間以原料不同而各異，大抵在8~36小时之間。

膠汁放出后，可再注入清水，进行第二次煮熬。此时火力亦不可驟然加大，必須徐徐加热，至接近沸騰时始可酌加火力，保持微沸状态。經适当時間后，又可放出第二次膠液，其操作与第一次相同。如此反复煮提至膠朮完全抽尽为止。熬膠次数，各种原料均不相同，一般約在4~8次左右，視具体情况决定，以抽尽为度。

4. 澄清和過濾：膠汁为一混濁液体，悬浮的雜質，如凝固蛋白、毛髮、不溶無機物及其他異性有机物等，于蒸發濃縮前，必須經過澄清处理。

澄清膠汁通常均采用沉降法或沉降与過濾两种方法合用。由于膠汁的粘度很大，因此自然靜置沉降

法的效果是不佳的，一般均在膠汁溶液中加入少許明矾（每100斤原料加明矾40~60兩），並先以少許水溶解后加入，強力攪拌后，靜置24小时以上，俟沉清后将上部澄清溶液傾出或用虹吸管吸出，用双层絲棉過濾。濾液即可进行濃縮。

5. 膠汁的濃縮：濃縮膠汁的火力不宜太猛和过分集中。为了达到这样的目的，古籍記載特別強調用“桑柴火”熬膠。但用桑柴火成本显然会增高，而且某些地区也無法取得大量桑柴，所以一般均用普通柴火熬制，亦可用煤炭。

加热时火力最好側重一边，使鍋中膠汁在一边沸騰，能加速对流作用，避免焦化和促進蒸發速度。

較好的方法，是利用蒸气加热濃縮。具有蛇形加热管的蒸發器或一层底蒸發鍋均可使用。用蒸气加热的优点在于加热迅速、調節容易、不發生焦化現象等。現在北京永盛合膠厂即用此項方法进行生产。

濃縮时析出的灰色泡沫，必須不断地用勺取出，另貯一器中，直至析出之气泡呈棕紅色透明时为度。取出之泡沫內尚含有部分膠質，不可扔去，可併入煮膠鍋中处理。

膠汁濃縮至相当程度后（似糖漿狀），取出靜置24小时，使濃縮过程中析出的沉淀能够沉降于底。然后小心傾出上部澄清液，进行煉膠。下面的沉淀与取出的泡沫一起併入煮膠鍋中处理。

傾出之膠汁澄清液，再入鍋中加热濃縮。如以直接火加热，要小心控制火力，徐徐加热，不絕攪拌，因此时膠汁已濃，对流不易，最易焦化。至开始沸騰时，火力始可稍稍加大，但亦以保持微沸为度。随着膠汁的漸漸濃稠，火力亦应漸漸减小，同时加入白糖与黄酒（紹興酒）少許（每100斤原料加糖1~2斤，酒1~2斤），借以減少成品之臭气，並能增加膠之透明度和預防膠在貯藏时發生松碎現象。

加入糖、酒后的1小时左右，火力更要减小，強力攪拌，促進蒸發和預防焦化。至鍋中有大气泡起似饅头狀，俗称“發鍋”；提起攪棒，膠汁黏附在棒上呈片狀，俗称“掛旗”；或用匙揚起，無水蒸气逸出为度。

“發鍋”、“掛旗”現象的判定工

作，必須仔細准确，不然水分未尽，致使成品在干燥时發生四边高中間陷下的“塌頂”現象。

膠汁煉成后，再加入麻油少許（每100斤原料加食用植物油半斤），攪拌均匀。加油的主要目的在于便于切膠，因此加油后必須徹底攪拌均匀，以免成品中出現小油泡造成次品。

以上所述者系一般情况，个别特殊的膠在煉膠时尙需特別处理，茲补充說明如下。

阿膠一般分成兩種，即“清水膠”和“福字膠”。清水膠是純粹驢皮煉成，福字膠則另有藥物加入，所加之藥物大都为黃耆、当归、熟地、人參、鹿茸之类的滋補藥。但各家处方亦有不同，有加3~5味者，亦有加至数十味者，这些藥物的煎剂多在煉膠时加入。

鹿角膠的表面，往往有一层黄色的不透明物質，此系鹿角膠的泡沫所制成的。其法即在煉好膠后，另取一小部分膠，用力攪打成沫，傾入凝膠盤內，用酒噴平，冷凝后即現出一层黄色物質，增加美观。

龟版膠、鱉甲膠等水生动物之膠最不易掌握，凝固困难，所以濃縮时要特别注意，不能含有过多的水分；也有在收膠时加入5~10%阿膠的。加入阿膠后，凝膠比較容易，但質量却没有純龟版膠好，所以能掌握不加阿膠还是不加的好。

虎骨膠在收膠时也有加入部分阿膠的，例如北京同仁堂的虎骨膠在每30斤虎骨膠中加有阿膠15斤。

龟鹿二仙膠系龟版膠、鹿角膠各等量並熬而成。

6. 凝膠和切膠：凝膠亦有称“潮膠”的，系將熬好的膠放冷凝固使成塊狀的操作。

凝膠盆，是長方形、內襯白鉄皮的木盆。鹿角膠和龟版膠之凝膠盆为銅制之淺長方盤。凝膠前要將凝膠盆洗滌清潔，抹加少許麻油。注入熱膠后，靜置之。盆要放平，置于8°~12°C之溫度中約12~24小时，即可完全凝固。

切膠，也称“开刀”，是將凝固的膠切成小塊的操作。一般都由熟練的技术工人操作。切膠刀兩端均有把柄，切时将膠塊取出，先切成条，然后切成片。操作时刀口平下，一

气切成，不能中間停滯，以致現出多次刀口痕跡，影响成品美观。

各种膠的大小規格亦不一致，通常阿膠有二兩一塊和一兩一塊的兩種。鹿角膠、龟版膠之塊更小，每斤約在30~60塊之間，視各地区的習慣而定。

7. 干燥和包裝，將切好的膠，平置竹帘上，置于陰处，並須微微通風，每48小時將膠翻向一次，称“翻膠”，以免成品發生弯曲現象。干燥10日后，將膠平放木箱中，貯放整齊，密閉悶之，称“伏膠”。約2~3日后取出，此时膠內部所含之水分即

滲出膠面，用布拭干后，再于竹帘上晒之，达10日后再悶，如此一晒一悶，約有40天左右，膠即完全干燥。

初步在竹帘上干燥后的膠，也可不用“伏”的方法，將膠用皮紙包好，每30塊（指阿膠，如系鹿角膠，則每包塊數可酌予增加）一包，置于石灰干燥箱內干燥之亦可。干燥箱內分若干层，貯放上，一层膠，一层石灰，石灰須不時更換。干燥一週后取出，將黏連处用刀小心切開，用布拭之，重新包好，再貯于干燥箱內。这种操作約可縮短干燥時間7~10天左右。但切忌急躁，使用其

他不适宜的干燥方法使其速干。因为速干时膠之外部虽然干了，可是膠內仍然有水分，在貯藏时会逐漸析出，易霉敗，不可不注意。

將已經徹底干燥的膠，用热的微湿毛巾擦之，膠的表面即現出光澤，称为“上光”。上光后即可印上商標，用麻包紙、金箔紙均可。裝盒后整个膠的制备就算完成了。

(四) 膠类的产率、質量 and 貯藏：膠类的产率由于原料品質、輔助原料及加工方法的不同而各異，特别是輔助原料与产率的关系最大。見下表：

各种膠类的产率及輔助原料分量表

品 名	原 料 量 (市斤)	原膠收得量		輔 助 原 料 (市斤)				产 品 量 (市斤)	附 註
		量 (市斤)	产率	豆 油	水 糖	黄 酒	阿 膠		
阿 膠	600	240—260	40—43	15—17.5	30	10		280—300	浸液加少量明矾以澄清
鹿 角 膠	100	26—30	26—30	1.5	5	5	5	38—42	殘渣为鹿角花
龟 版 膠	100	3	3	1	5	3	15	26—27	原料为龟腹部之版
鳖 甲 膠	100	3	3	1.5	5	3	15	26—27	原料为鳖背部之甲
龟 鹿 膠	100	13—15	13—15	1.5	5	5	5	25—28	原料为龟版与鹿角各等分
虎 骨 膠	30	10—20	33—40			5	15	28—30	主要用途为供配制虎骨酒用

本表引自“中藥成藥配本經驗介紹”一書，資料来源是北京同仁堂，因各地情况不尽相同，仅供讀者参考。

膠的質量鑑別，在技术上比較困难，尚無一定的方法。現介紹一些老經驗如下：

一般情况，优质的膠，必須具备以下条件。

(1) 平整、色澤均匀，用光照呈半透明体，無显著油泡及他种夹杂物。

(2) 干燥不实，按之不弯曲，断面光滑似玻璃。

(3) 無異常臭味。

(4) 能溶于热水，水溶液接近澄明，不呈显著混濁現象。

如遇不透明、断面不光滑、有惡臭之品，为劣品或伪货，只能供工業用，不可作药用。

一切膠类均貯于冷暗干燥地方，如遇气候潮湿的季节或潮湿地区，則应將膠类貯于密閉器內，器中同时貯放干燥生石灰，以免受潮变质或發霉。

各 論

內 科

補 益 類

鹿茸大補丸

大 同

【功能与主治】先天不足，精腎不固，頭眩耳鳴。

【处方】仙茅四兩 山萸二兩 首烏(制)半斤 草薢 麥冬 天冬 云苓 五味子 小茴 巴戟 鎖陽 牛山藥 故紙(炒) 復盆子(炒) 杜仲 牛膝 柏子仁(去油) 遠志 茯苓各二兩 川椒一兩 菟絲子 巨勝子各二兩 鹿茸(炙)四兩 青鹽二兩 麗參六兩 當歸 生地各二兩 熟地 玉竹(制)各四兩 枸杞二兩

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】早晚每服一錢，開水送下。

鹿 腎 丸

蘭 州

【功能与主治】強健身體，充陽益火，滋陰固腎。主身體衰弱，氣血兩虛，面黃肌瘦，夢遺滑精，陽萎等症。

【处方】魚膠四兩 懷牛膝二兩 虎骨二錢 鹿腎六兩 金櫻子一兩 核桃仁 枸杞各四兩 杜仲 蓮鬚各二兩 元桂五錢 黨參五兩 五味子一兩 故紙 麥冬 續斷各二兩 生地四兩 山藥 萸肉各二兩 丹皮一兩 苓塊 建膝各一兩 巴戟人 芡實 黃芪各二兩 盆子四兩 生龍骨二兩 鹿茸一兩 首烏五兩 旱蓮草三兩 車前子 正榮子各一兩

【制法】共為細末，蜜小丸。(或大丸亦可)

【劑量及用法】每服二錢，淡鹽

水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

全 鹿 丸

一、北 京

【功能与主治】固精益氣，滋補強壯。主身體衰弱，頭眩耳鳴，遺精盜汗，腰膝無力，婦女崩漏帶下。

【处方】鹿膠八兩 青毛鹿茸四兩 鹿鞭二兩 鮮鹿肉三百二十兩(帶骨) 鹿尾一條約二兩 熟地十六兩 黃耆十六兩 人參十六兩(去蘆) 當歸十六兩 生地十六兩 懷牛膝十六兩 天冬十六兩 芡實十六兩 枸杞子十六兩 麥冬十六兩 肉蓯蓉十六兩 補骨脂十六兩 巴戟人十六兩 鎖陽十六兩 杜仲十六兩 秋石十六兩 茯苓十六兩 續斷十六兩 菟絲子十六兩 山藥十六兩 五味子十六兩 胡蘆巴十六兩 甘草十六兩 復盆子十六兩 於朮六兩 川芎十六兩 橘皮十六兩 椿實子十六兩 川椒八兩 小茴香八兩 沉香八兩 大青鹽八兩 共一十七味 計八百一十七兩

【制法】以生地 芡實 枸杞子 補骨脂 山藥 續斷，均於朮沉香九味軋粗末，舖晒槽，余者下罐，加黃酒四百八十兩，蒸一晝夜，同舖槽之群藥拌勻，晒干共為細粉，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服三錢，日服三次，溫開水送下。

二、天 津

【功能与主治】滋補益氣，填精補髓。主身體衰弱，頭眩耳鳴，夜夢遺精，腰膝疼痛，四肢痿軟，白汗盜汗，神志不安，婦女氣血虧損，崩漏帶下。

【处方】人參(去蘆)五斤 故紙(鹽炒)一斤 鹿角膠一斤四兩 當

歸二斤 川牛膝一斤四兩 黃柏二斤 鎖陽一斤八兩 杜仲炭(鹽炒)一斤 小茴香(鹽炒)十二兩 菟絲子一斤 香附(醋制)二斤 鹿茸(去毛)二斤八兩 生黃芪四斤 青鹽一兩 杜元肉十五斤 冬虫草五錢 秋石一斤 椿實子十兩 鹿角(洗淨)六斤 茯苓(去反)五斤 蘆巴子一斤 天冬 麥冬 甘草 懷牛膝 琥珀 制沒藥各一斤 枸杞子二斤 黨參(去蘆)十兩 益母草膏一斤 花椒四兩 復盆子十兩 老鸛草膏十兩 鮮鹿肉二十斤 鹿尾一斤十四兩 巴戟肉(甘草水制)一斤 鮮牛乳一斤 淨龜腎一斤四兩 遠志肉(甘草水制)八兩 紫河車二兩 茯苓(酒蒸)一斤(以上用黃酒七十一斤八兩裝罐內，或裝不銹的桶內，將罐口封固，隔水蒸至酒盡為度) 川芎一斤 陳皮九斤 白朮(麸炒)一斤十兩 沉香二斤 廣木香一斤 生地一斤十兩 續斷一斤 砂仁八斤 生薑仁六兩五錢 炒棗仁六兩五錢 黃芩一斤 桑枝十兩 木瓜一斤 牛山藥一斤 五味子(酒蒸)十兩 熟地二斤 紅花十兩

【制法】以上軋成粗末，再和所蒸的藥料共和一起拌勻，晒干碾粉，煉蜜為丸三錢重，蠟皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、上 海

【功能与主治】神經衰弱，面色萎黃，腰膝無力，形寒畏冷。

【处方】活鹿一只(下列藥品每料用毛鹿十斤，依此類推) 黨參一斤 懷山藥(炒)一斤 於朮(炒)一斤 黃芪(炙)一斤 茯苓一斤 杜仲(炒)一斤 甘草(炙)一斤 續斷一

斤 当归 一斤 巴戟肉 一斤 川芎 一斤 淡苣蓉 一斤 生地 一斤 鎖陽 一斤 熟地(酒炒) 一斤 芡實 一斤 天冬 一斤 胡蘆巴(酒炒) 一斤 麥冬 一斤 補骨脂(炒) 一斤 五味子 一斤 復盆子(酒炒) 一斤 陳皮 一斤 菟絲子 一斤 枸杞子 一斤 楮實子(酒炒) 一斤 花椒八兩 小茴香(炒)八兩 青鹽八兩 沉香八兩 懷牛膝(酒炒) 一斤

【制法】將活鹿縛死，去毛破肚洗淨，同肚雜用黃酒煮爛，再將其骨炙酥，與諸藥打和曬干，研細粉，煉蜜為丸如綠豆大。

【劑量及用法】每服一錢五分至三錢，淡鹽湯送服。

【備考】原方內有咸秋石，已失其真。

四、南 京

【功能與主治】強壯劑。主精神衰憊，頭眩耳鳴，癯瘠腹痛，陽萎足軟，婦女血分，崩漏帶下。

【處方】活鹿一只約重一百斤，斤 熟地黃 生地黃 蘇合丸 川芎 廣陳皮 楮實子 巴戟肉 懷山藥 胡蘆巴 炙黃芪 懷牛膝 甘枸杞 鎖陽 五味子 炙甘草 四黨參 人門冬 淡苣蓉 杜仲 白茯苓 復盆子 西胡身 麥門冬 補骨脂 菟絲子 川續斷 其白朮 秋石以上二十八味每重十斤 花椒五斤 丁香五斤 沉香五斤 西青鹽五斤

【制法】將活鹿縛死，去毛破肚，將肚雜洗淨，可入鍋內，用好陳酒煮爛，取肉切片焙干，與肚雜仍入原湯內至煮極爛，再將骨節炙酥碾末，和入藥內研為細末，加煉白蜜為小丸，每錢約做五十粒。

【劑量及用法】每服一至四錢，一日一次，開水吞服。

五、武 漢(百補全鹿丸)

【功能與主治】精神衰憊，頭眩耳鳴，癯瘠腹痛，腰膝無力，婦女血分，崩漏帶下。

【處方】活美鹿一只(大約一百斤)，將鹿縛死，去毛破肚洗淨，肚內臟腑亦洗淨，腸內糞便要去淨，臟腑放入鹿肚內，加好陳酒煮爛，再將肚內臟腑取出，鹿肉切薄片，焙干，

磨細末，又將取出臟腑放原湯內熬成濃汁，和入藥末內，其骨亦要炙酥研末，混合藥末內攪勻制丸。沉香八兩 芡實 廣陳皮 巴戟肉 天門冬 杜仲 補骨脂 炙甘草 川牛膝 川杜仲 復盆子 黨參 楮實子 茯苓各一斤 小茴香八兩 五味子 炙黃芪各一斤 青鹽八兩 杭寸冬 秋石各一斤 花椒八兩 胡蘆巴 熟地黃 續斷 生地 枸杞子 人參 菟絲子 當歸 魚於朮 山藥 鎖陽各一斤

【制法】小丸。取藥進行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜50—54%，急成小丸，每錢不得少于二十五粒。

大丸。如法得淨粉后，加煉蜜120—130%，和成大丸，每丸重為二錢。

【劑量及用法】每服一錢，日服二次，溫開水送下。

六、福 州

【功能與主治】此藥能補諸虛百損，主勞傷過度，功效不能盡述，人制一料服之，可以延壽一紀。

【處方】中鹿一只(縛死退毛，將肚洗淨，同鹿肉加酒煮熟，將肉橫切焙干為末，去皮同肚雜仍入原湯煮膏，和藥末肉末加煉蜜和搗為丸，大骨須酥炙為末同入之。)

人參 白朮(炒) 茯苓 炙甘草 當歸 杜仲 生地 熟地 黃芪(蜜炒) 天門冬 麥門冬 枸杞 杜仲(鹽水炒) 牛膝(酒拌蒸) 山藥(炒) 芡實(炒) 菟絲子(制) 五味子 鎖陽(酒拌蒸) 淡苣蓉 故紙(酒炒) 巴戟肉 胡蘆巴(酒拌蒸) 川續斷 復盆子(酒拌蒸) 楮實(酒拌蒸) 秋石 陳皮以上各一斤 胡椒(去目炒) 小茴香(炒) 沉香 青鹽各半斤

【制法】先精制諸藥為末，和勻一處，候鹿膠成，就和搗為丸桐子大，焙干，用生黃絹作小袋五十條，每袋約盛一斤，懸置透風處，用一袋又取一袋，陰濕入須用火焙一、二次為妙。

【劑量及用法】每服八、九丸，空心吞服，姜湯鹽湯、白湯任下，冬月溫酒下。

七、杭 州(大補全鹿丸)

【功能與主治】補腎生精，益氣養血。主勞傷過度，諸虛百損，精神萎頓，面容憔悴，背脊痠痛，腰膝無力，男子精損陽痿，高年體虛畏冷，婦人宮寒不孕。久服和顏悅色，強精健腦。

【處方】活美鹿一只(宰殺將肚雜洗淨，同鹿肉加酒煮熟，將肉橫切，焙干為末，取皮去毛，同肚雜仍入原湯煮膏，和藥末肉末，其骨用酥炙為末，同入藥內)

路黨參 炒於朮 白茯苓 炙甘草 當歸 川芎 大生地 大熟地 炙黃芪 天門冬 麥門冬 枸杞子 杜仲(酒炒) 懷牛膝 懷山藥 芡實 菟絲子 五味子 鎖陽 淡苣蓉 補骨脂(酒炒) 巴戟肉 胡蘆巴 川續斷 復盆子 楮實子 秋石 陳皮各一斤 胡椒 小茴香 貢沉香 青鹽各八兩

【制法】依法精制諸藥為末，候鹿膠成就，和鹿油加煉蜜共搗為丸。每鹿膏一斤加上藥一料。

【劑量及用法】每服二至四錢，空腹用陳酒或淡鹽湯送下，冬月溫酒送下。

八、南 昌

【功能與主治】補腎填精，益氣力，利關節健步。精神衰憊，頭眩耳聾，男子精寒陽痿，婦人虛羸癯瘠，陰寒腹痛，崩漏經阻，赤白帶下等。

【處方】北枸杞 芡實 天門冬 川牛膝 生地 當歸 石桂參 炙黃芪 熟地 楮實 新會皮 菟絲子 淮山藥 菟絲子 杜仲 鎖陽 巴戟肉 補骨脂 肉苁蓉 麥冬 白朮 魚於朮 復盆子 炙甘草 胡蘆巴 續斷 茯苓 秋石各一斤 青鹽 沉香 小茴 胡椒各八兩

有角者人雄鹿(重量約六十斤如超量比例加藥)一只

【制法】將活鹿縛死，破肚洗淨，將肚雜亦洗淨，納入鹿肚內，加好陳酒煮爛，取肉橫切薄片，焙干磨細末，其肚雜連皮仍入原湯熬成膏，同時將上列各藥研成細末，連鹿肉研磨之細末一併收入，再將其骨酥炙研末，連同諸藥面攪勻，和煉

蜜打丸如梧桐子大，焙干。

【剂量及用法】每服三錢，每日二次，用酒或淡鹽开水送下。

【禁忌】風寒感冒忌服；忌生冷食物。

九、沙 市

【功能与主治】此丸能补腎填精，益气和血。治虛損勞傷，精神衰憊，脊背痠軟，腰膝無力等症。虛羸老人最宜。

【处方】中鹿一只（如無全鹿則以干鹿肉五斤鹿筋八兩鹿角膠六兩代之）

潞党参一斤 白朮一斤 茯苓一斤 炙甘草一斤 当归一斤 川芎一斤 生地一斤 熟地一斤 黃耆一斤 大冬一斤 麦冬一斤 枸杞一斤 杜仲一斤 牛膝一斤 淮藥一斤 芡实一斤 菟絲子一斤 五味子一斤 鎖阳一斤 肉苁蓉一斤 破故紙一斤 巴戟肉一斤 胡蘆巴一斤 續斷一斤 复盆子一斤 楮實子一斤 秋石一斤 广陈皮一斤 川花柳八兩 小茴香八兩 沉香八兩 青鹽八兩

【制法】先宰鹿去毛，破肚洗淨，加酒煮爛，取肉切薄片，焙干研細末，取皮同肚內諸臟器，入原湯內熬膏，其骨須酥炙研末，再將各藥研細末，取藥末、肉末、骨末入鹿膏內，另加煉蜜和搗為丸，如梧桐子大，烘干，用生絹作小袋五拾條，每袋約裝一斤，懸透風處，用完一袋再取一袋，陰濕天須用火烘。

【剂量及用法】每服三錢，空腹姜湯或淡鹽开水下，冬月溫酒下，每日服一次。

【禁忌】体实而發炎者忌服。

附参考古方

【来源】景岳全書。

【功能与主治】补諸虛百損，五勞七傷。

【处方】中鹿（縛杀之，退去毛，將肚杂洗淨，同鹿肉加酒煮熟，將肉橫切焙干為末，去皮，同肚杂仍入原湯熬膏，和藥末肉末，加煉蜜和搗為丸，其骨酥炙為末同入之）一只 人參 白朮（炒） 茯苓 炙甘草 当归 生地黃 川芎 熟地黃 黃耆（蜜炙） 大門冬 麦門冬 枸杞 杜仲（鹽水炒） 牛膝（酒拌蒸） 山

藥（炒） 芡实（炒） 菟絲子（制） 五味子 鎖阳（酒拌蒸） 肉苁蓉 破故紙 酒炒 巴戟肉 胡蘆巴（酒拌蒸） 川斷續 复盆子（酒拌蒸） 楮實子（酒拌蒸） 秋石 陈皮以上各一斤 川椒（去目炒） 小茴香（炒） 沉香 青鹽各半斤。

【制法】上先須精制諸藥為末，和勻一處，候鹿膠成就和搗為丸，桐子大，焙干。

【剂量及用法】每服八九十丸，空心卧姜湯鹽湯、白湯任下，冬月溫酒亦可。

【备考】用生黃絹作小袋五十條，每袋約盛一斤，懸置透風處，用尽一袋又取一袋，陰濕天須用火烘一二次為妙。

鹿 茸 丸 昆 明

【功能与主治】病后体虛，心臟衰弱，怔忡惊悸，遺精帶下。

【处方】洋参二兩 鹿茸二兩 熟地二兩 大云二兩五錢 当归二兩 口芪二兩 棗仁八錢 淮藥一兩 於朮二兩 枸杞二兩 巴戟二兩 菟絲一兩五錢 桑皮八錢 天雄二兩 杜仲二兩 茯苓一兩 远志八錢 淮膝五錢 五味一兩 補血錢 車前四錢 大棗一兩 川姜六錢 澤瀉四錢 磁砂二兩 甘草一兩

【制法】研末，煉蜜為丸，外裝蜡壳封固。

【剂量及用法】每服一丸，幼童減半，用開水早晚各服一次。

【禁忌】感冒及一切熱症忌服；忌酸冷食物。

附参考古方

【来源】1. 济生方。

【功能与主治】治腎虛少氣，腹脹腹痛，小腹急痛，手足逆冷，飲食減少，面色黧黑，百節痛疼，日漸無力。

【处方】川牛膝（去蘆酒浸） 鹿茸（去毛酒炙） 五味子各二兩 石斛（去根） 菟絲子（淘淨酒浸） 棘刺 杜仲（去皮剉炒） 川巴戟（去心） 山藥（剉炒） 阳起石（煨） 附子（炮，去皮臍）各一兩 沉香（別研）半兩 川楝子（取肉炒） 磁石（煨） 官桂（不見火） 澤瀉各一兩

【制法】上為細末，酒糊為丸，如桐子大。

【剂量及用法】每服七十九，空心鹽酒鹽湯任下。

2. 女科証治准繩。

【功能及主治】治冲任虛損，又為風寒所乘，尺脈微小甚者，可灸关元穴。

【处方】鹿茸（炙） 赤石脂 禹余糧各一兩 續斷二兩 柏叶 附子（炮） 熟地黃 当归（酒浸） 艾叶各七錢半

【制法】上為末，酒糊丸，梧子大。

【剂量及用法】每服五十九，空心溫酒下。

3. 沈氏尊生書。

【功能与主治】下消。

【处方】麦冬二兩 鹿茸 熟地黃 芡 五味子 雞肫皮（麩炒） 酒浸肉苁蓉 破故紙 酒牛膝 山萸人參各七錢半 地骨皮 茯苓 元參各五錢

【制法】蜜丸。

【剂量及用法】空心米飲下。

人參鹿茸丸

一、北京、承德

【功能与主治】补血生精，兴奋神經。神經衰弱，目暗耳聾，遺精盜汗，腰腿痠軟。

【处方】人參二兩五錢（去蘆） 鹿茸二兩 杜仲 补骨脂 巴戟大 菟絲子 怀牛膝 茯苓 黃芪 五味子 龙眼肉 香附 黃柏各四兩 冬虫草一兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重二錢，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，溫開水送下，溫黃酒亦可。

【禁忌】忌食生冷；孕婦忌服。

二、天 津

【功能与主治】滋陰補腎，强壯筋骨。主氣血兩虧，四肢疲倦，面色蒼白，貧血遺精，心臟衰弱，消化不良，血虛頭眩，自汗盜汗，腰痠腿痛，体弱氣弱。

【处方】人參（去蘆） 鹿筋 甘草 鹿茸（去毛） 海馬 当归 故紙（鹽炒） 天冬 楮實子 茯苓（去皮） 生黃芪 枸杞子 小茴香（鹽炒） 怀牛膝 复盆子 杜仲炭

【鹽炒】麥冬 菟絲子 菟蓉(酒蒸) 巴戟肉(甘草水制) 蘆把子 秋石各一兩六錢 冬虫草一錢 青鹽八錢 制虎骨一兩 以上用黃酒二斤五兩,裝入罐內(不生鏽的桶亦可),將罐口封固,隔水蒸至酒盡為度,再入下藥:五味子(酒蒸) 熟地 川芎各一兩六錢 生山藥 生地 續斷 白朮(麩炒) 廣陳皮各一兩六錢 沉香八錢 軋成粗末,和所蒸的藥料攪勻晒干。

【制法】共為細粉,煉蜜為丸三錢重,蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸,白開水送下。

三、蘭 州

【功能與主治】補血生精,促進消化,強壯筋骨,興奮神經。主氣血兩虧,四肢疲倦,面色蒼白,貧血遺精,心臟衰弱,消化不良,血虛頭眩,自汗虛汗,腰痠腿痛,一切身體虧弱等症。

【處方】人參 鹿茸 鹿筋 甘草 五味子 海馬 白朮 熟地 故紙 當歸 川芎 茯苓 山藥 天冬 楮實子 黃芪 杞子 生地 茴香 杜仲 牛膝 寸冬 菟絲 巴戟 菟蓉 蘆巴 秋石 川斷 復盆 廣皮 各一兩六錢 海南沉香八錢 冬虫草一錢 青鹽八錢 虎骨一兩

【制法】共為細面,蜜丸重三錢,蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸,白開水送下。

四、濟 南

【功能與主治】神經衰弱,目暗耳聾,遺精盜汗,腰腿痠軟等症。

【處方】同北京。

【制法】共為細粉,煉蜜為丸三錢重,蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸,開水送下,溫黃酒亦可。

【禁忌】生冷食物。

五、沈 陽

【功能與主治】補腎強精,促進生殖機能。主諸虛百損,五勞七傷,氣血虛弱,腰腿痠痛,肢倦體瘦。

【處方】紅人參二兩 鹿茸一兩 益沉一兩 枸杞 熟地 茯苓 山

藥 山萸肉各五兩 肉桂一兩 杜仲 肉蓯蓉 菟絲子 鹿腎各二兩 虎腿骨二兩 巴戟二兩 懷牛膝二兩 小茴香一兩 楮實子 遠志肉各一兩 母丁香一兩 附子一兩五錢 故紙 核桃肉各二兩

【制法】共碾極細面,煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸,淡鹽水送下,白水亦可。

六、沈 陽

【功能與主治】益氣補血,填髓固精。主諸虛百損,五勞七傷,先天不足,後天虛損,陽萎不舉,遺精白濁,腰腿痠痛,肢倦體瘦,精神疲憊,腹痛泄瀉,以及婦人經血不調,子宮虛冷,不能受孕,久患小產,統能治之。

【處方】人參 鹿茸各二兩 熟地六兩 茯苓五兩 益沉一兩 枸杞 山藥 山萸肉各五兩 紫油桂一兩 杜仲二兩 菟蓉一兩 菟絲餅二兩 虎骨膠二兩 巴戟一兩 懷牛膝二兩 小茴香一兩 鹿角膠二兩 楮實一兩 遠志二兩(去心) 母丁香一兩 黑附子一兩半 破故紙二兩 核桃肉二兩

【制法】除將二膠酒化外,余藥共碾細面,蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸,淡鹽湯送下。

【禁忌】五辛。

參桂鹿茸丸

一、上 海

【功能與主治】虛損乏力,腰膝痠軟。

【處方】別直參五兩 黃芪(炙) 黨參各十兩 毛鹿茸 甘草(炙) 續斷各五兩 冬朮(炒)十兩 茯苓八兩 肉桂五兩 陳皮八兩 白芍藥(炒) 當歸各十兩 熟地十二兩 遠志(炒) 枸杞子 淡菟蓉各十兩

【制法】共研細粉,煉蜜為丸,如綠豆大。

【劑量及用法】每服三錢,淡鹽湯送服。

二、南 京

【功能與主治】補氣血,健脾胃,

強壯體力。

【處方】高麗參四兩 上肉桂八兩 鹿茸四兩 焦白朮 西黨參 甘枸杞 廣陳皮 粉甘草 炙黃芪各八兩 白茯苓六兩四錢 杭白芍八兩 大熟地六兩四錢 西當歸八兩 遠志肉四兩

【制法】共研細末,加煉白蜜為丸,每錢約做五十粒。

【劑量及用法】每服二至三錢,一日一次,開水吞服。

【禁忌】孕婦忌服。

三、武 漢

【功能與主治】身體瘦弱,胃納不強,腰背痠痛,手足酸麻,自汗頭昏,及一般虛寒病症。

【處方】紅參四兩 黨參 陳皮各八兩 熟地六兩四錢 炙黃芪 白芍 當歸各八兩 遠志四兩 茯苓六兩四錢 肉桂 白朮各八兩 鹿茸四兩 枸杞 炙甘草各八兩

【制法】小丸 一上約干燥,混合碾細,照淨粉量加煉蜜60—62%,迭成小丸,每錢不得少于二十五粒。

大丸——加煉蜜125—130%,和成大丸,每丸重三錢。

【劑量及用法】每服二錢,空腹淡鹽湯或溫水送下。

四、沙 市

【功能與主治】治體質虛寒,氣血不足,精神衰憊,腰背痠痛,足膝無力,精冷陽痿,及婦女虛寒、腹痛、崩漏、帶下等症。

【處方】嫩鹿茸一兩 高麗參 肉蓯蓉 巴戟肉各二兩 於朮(炒) 棗仁各一兩 端溪茯苓 龜膠各二兩 遠志二兩 魚膠四兩 懷牛膝一兩五錢 茯苓二兩 枸杞 淮山藥各二兩 菟絲子 云故紙各二兩 熟地六兩 杜仲二兩 附塊一兩 北五味一兩五錢 中安桂一兩 山萸肉三兩 核桃米 當歸 蓮鬚各二兩

【制法】共研細末,煉蜜為丸。

【劑量及用法】每次服三錢,空腹淡鹽湯或溫開水下,每日服一次。

【禁忌】水份不足而發炎者忌服。

五、重 慶

【功能與主治】補氣補血,益精

填髓，兴奋神經，促进体力。

【处方】高丽参四兩二錢 枸杞十兩 远志七兩 鹿茸四兩二錢 白芍 熟地各十兩 蒙桂十二兩 广橘皮 当归各十兩 云茯苓八兩 炙甘草 龟白朮 炙黄芪 党参各十兩

【制法】除鹿茸、高丽参另乳外，余药共研細末，煉蜜为丸，玻璃瓶裝四兩。

【剂量及用法】每次三錢，临睡时淡鹽湯送下，白开水亦可。

六、西 安

【功能与主治】治老少虛寒，及妇人血虛，腰脊痠痛等症。

【处方】高丽参四錢 油桂 鹿茸各五錢 熟地四兩 云苓二兩 山藥二兩 山萸二兩 澤瀉 丹皮各一兩 路參二兩 於朮 炙芪 菟絲子 牛膝各一兩 杜仲 枸杞巴戟各二兩 炙草一兩

【制法】共为細末，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服二錢，淡鹽湯送下。

七、禹 县

【功能与主治】气血不足，諸气百損，脾胃虛弱，神困体倦，腰膝痠軟，筋骨不舒，元阳衰敗，痰喘咳嗽。

【处方】高丽参八兩 杜仲炭 枸杞子各四兩 破故紙二兩 建澤瀉二兩 川牛膝四兩 巴戟天二兩 山藥四兩 丹皮二兩 远志六兩 萸肉四兩 茯苓三兩 熟地四兩 川續斷三兩 菟蓉四兩 鎖陽二兩 茯神 棗仁 木瓜各四兩 陈皮六兩 肉桂四兩 鹿茸二兩 菖参 綿芪 附子各四兩

【制法】共为細面，煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服一錢，白开水送下，每日早晚二次。

【禁忌】孕妇忌服，火熱症忌用。

【备考】有效期間一年。

八、呼和浩特

【处方】人參 肉桂各五錢 九地一兩 山萸 山藥 丹皮 澤瀉 茯苓各五錢 当归八錢 黃芪二兩 於朮一兩 党参 兩 杞子八錢 大芸二兩 五味子五錢 川牛膝八

錢 杭芍五錢 杜仲八錢 菟絲子二兩 故紙八錢 巴戟一兩 附子八錢 炙草五錢 条芩八錢 青鹽四錢 茴香 龙骨各六錢 牡蠣 虎骨各五錢 鹿腎二兩(另) 鹿茸五錢(另) 海馬一對五錢(另)

【制法】每药面二十兩，加鹿茸三錢、海馬二錢、硫黃二錢、人參三錢，蜜为小丸。

魚鰾种子丸

一、福 州

【功能与主治】治身体虛弱，酒色过度，人眩、耳鳴、目花，腰膝痠疼，四肢無力，自汗盜汗，下元虛損，夢遺精滑，阳痿；或男子精寒，腎虛，元阳衰敗；或女人血寒氣弱，子宮久冷，赤白帶下，經水不調，久不受孕。有子者服之亦可，卻病保元。

【处方】魚鰾一斤(牡蠣粉炒) 当归(酒洗) 淫羊藿(羊油酥) 蓮蕊 菟蓉(酒洗) 杜仲(鹽水炒) 菟絲(酒浸) 沙苑子各八兩(用青鹽、人乳、老酒、童便各拌二兩，微炒) 云苓(人乳拌) 枸杞各四兩 牛膝(酒洗) 故紙各六兩(青鹽水炒) 肉桂二兩 附子一兩

【制法】共研細末，和蜜为丸。

二、昆 明

【功能与主治】男子体弱，生殖力減，女子帶下，月經不調。

【处方】当归 蓮蕊 魚鰾 杜仲 大芸各八兩 茯苓 淮朮各六兩 菟絲 巴戟各八兩 肉桂四兩 枸杞八兩 天雄四兩 骨脂六兩 淫羊藿八兩 关蒺藜六兩

【制法】研末，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服一丸(水丸每服一錢半)，早晚各服一次，开水送下。

【禁忌】感冒忌服。

三、蘭 州

【功能与主治】强壯身体，充阳补火，斂精固腎，主身体虛弱，阳萎滑精。

【处方】当归 杜仲 蓮蕊 巴戟 大芸 潼蒺藜 淫羊藿 菟絲子 云苓 怀牛膝 故紙 桂元各四兩 魚鰾八兩 肉桂 附子 炙草各二兩

【制法】共为細末，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服三錢，淡鹽湯送下。

【禁忌】孕妇忌服。

四、沈 陽

(参茸广嗣魚鰾丸)

【功能与主治】滋补强壯，促进生殖机能旺盛。主身体虛弱，未老先衰，四肢無力，精神倦怠，飲食減少，面黃肌瘦，失眠盜汗，怔忡不安，恍惚健忘，腰痠腿軟，生殖机能減退。

【处方】淨魚鰾一斤(分四份，用牡蠣、蛤粉、麦麸各面炒成珠) 鹿角膠 鹿角霜 生沙苑菟藜各四兩 人參 麦冬 天冬 当归 澤瀉 山藥 芡实 菖蒲 蓮蕊 赤石脂 五味子 复盆子 白茯苓 車前 白朮 广木香 柏仁 炒棗仁 各一兩 山藥 石斛 巴戟 川牛膝 川椒 生地黃 熟地黃 地骨皮 杜仲 远志 菟蓉 菟絲子 枸杞各二兩

【制法】除二地搗膏外，余則共碾極細面，加煉蜜为丸，二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，空心白开水送下。

五、撫順(魚鰾丸)

【处方】魚鰾 当归 牛膝 蓮蕊 杜仲 故紙各二兩 川断 杞子 沙苑子各四兩

【制法】共为細面，蜜丸三錢大。

六、呼和浩特(魚鰾丸)

【处方】魚鰾八兩 山藥 当归 菟絲子各二兩 生地二兩 虎骨二兩 川断 白朮 沙苑子 椿实各二兩 枸杞四兩 首烏六兩 牛膝 故紙 茴香各二兩 甜瓜子三兩

【制法】共为細面，蜜小丸。

保真广嗣丸

杭 州

【功能与主治】补益气血，滋培肝腎。治男子諸虛羸瘦，精神衰弱，腰膝痠痛，阳萎乏嗣，妇人下元虛冷，久不孕育等症。

【处方】路党参二兩 車前子一

兩五錢 怀牛膝(酒浸) 天門冬各二兩 石菖蒲 炒遠志各一兩 當歸(酒洗) 兩 五味子一兩 山萸肉 怀山藥各二兩 复盆子一兩五錢 杜仲(姜汁炒) 巴戟肉各二兩 赤石脂(另研)一兩 地骨皮一兩五錢 广木香 大生地 枸杞子各二兩 川椒(微炒)一兩 澤瀉一兩五錢 菟絲子(酒炒) 淡菴蓉各四兩 大熟地 柏子仁 白茯苓各二兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服三至四錢，空腹時淡鹽湯送下；冬月溫酒或開水送下。

延齡廣嗣丸

杭 州

【功能與主治】培元固本，補腎生精，健陽種子，延齡廣嗣，治男子下元虛損，陽痿精冷，久無子嗣，腰背痠痛，一切先天稟受不足，少年驚傷過度之症。

【處方】鹿角膠二兩 巴戟肉二兩 大熟地六兩 海馬一兩 淡菴蓉 杜仲各二兩 路黨參四兩 五味子一兩 怀山藥 白茯苓各一兩 大茴香 金櫻子各一兩 胡蘆巴四兩 淫羊藿二兩 真沉香一兩 枸杞子 蛇床子各二兩 白檀香 肉桂各一兩 菟絲子四兩 川楝子二兩 山萸肉二兩 制附子 制乳香各一兩 怀牛膝(鹽水炒)二兩 補骨脂二兩 制沒藥一兩

【制法】共研細末，將膠烱化，酌加煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服三錢，淡鹽湯送下。

衍慶丸

沈 陽

【功能與主治】補益身體，強精種子。主身體衰弱，精氣不足，腎虛寒冷，偏墮疝氣。

【處方】當歸 肉菴蓉 山藥 枸杞 熟地 复盆子各四兩 阿膠 核桃肉 補骨脂各一斤 菟絲子八兩 吳茱萸二兩 杜仲二兩 人參 黃芪各五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，七分重。

【劑量及用法】每服一至二丸，

空心淡鹽湯送下。

真武丸

福 州

【功能與主治】此方補腎之陽，壯火利水。

【處方】茯苓 芍藥各二兩 白朮二兩 附子(炮)一枚 牛膝二兩

【制法】共研細末，水泛為丸。

茴香丸

沈 陽

【功能與主治】補腎煖寒。主寒濕腰痛，遺精白濁，下部虛寒，男子陽痿，腰膝無力，少腹疼痛。

【處方】熟地一兩六錢 山萸 山藥 肉桂 干姜各八錢 丹皮 吳萸 茯苓 澤瀉各六錢 小茴香一斤六兩 酒芍一兩六錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，淡鹽湯送下。

【禁忌】生冷硬物。

附參考古方

【來源】沈氏尊生書。雜病源流犀燭

【功能與主治】小腹癰。

【處方】胡蘆巴八錢 茴香六錢 巴戟 川烏各二錢 川楝肉四錢 吳萸五錢

【制法】酒糊。

【劑量及用法】每服十五丸，小兒五丸，鹽酒下。

強精丸(強精補腎丸)

吉 林

【功能與主治】添精補髓，扶陽助腎安神。治夢遺滑精，陽痿腎虛，氣逆氣滯。

【處方】山參 楮實子 复盆子各一錢零七分 菟絲餅 淫羊藿 巴戟各一兩七錢四分 丁香 川附 龜板各八錢七分 萸肉一兩七錢四分 怀膝 虎骨膠 虎鞭各一兩三錢四分 龍骨一兩七分 真桂一兩七分 當歸 山藥各一兩三錢四分 川斷一兩七錢四分 杜仲一兩七分 塊苓一兩七分 枸杞一兩七錢四分 芡實六錢七分 石斛一兩

陽起石六錢七分 金櫻子二錢 蓮鬚六錢七分 寸云一兩三錢四分 盤沉六錢七分 韭菜子一兩七分 石蓮子四錢 紅蠟六錢七分 鹿茸一兩七分 熟地二兩六錢七分 蛇床子 鹽腎各一兩三錢四分

【制法】將以上藥品共為細面，用水泛為小丸，如黃豆大，外用硃砂為衣。

【劑量及用法】每服二十粒，用鹽水送下為佳，日服二次為度。

無比山藥丸

一、青 島

【處方】熟地 茯苓 山萸 赤石脂 巴戟 澤瀉 杜仲 菟絲子 山藥 五味子 菴蓉 牛膝各二兩

【制法】共軋面，蜜小丸。

二、呼和浩特

【處方】九地 山藥 菟絲餅 大云各四兩 附子 牛膝 杭萸 茯苓 五味子 柏子仁 巴戟 姜炭 澤瀉 白朮 杜仲各二兩

【制法】共為細面，蜜小丸。

附參考古方

【來源】儒門事親。

【處方】干山藥二兩 肉菴蓉四兩(剉酒浸焙) 五味子六兩(揀淨) 菟絲子二兩(酒浸) 杜仲二兩(去粗皮炒) 牛膝一兩(酒浸) 澤瀉一兩 熟地黃一兩(干) 山茱萸一兩 茯苓一兩(去皮) 巴戟二兩(去心) 赤石脂一兩

【制法】上為細末，煉蜜和丸桐子大。

【劑量及用法】每服三十丸，食前溫酒下，米飲亦可。

桂附地黃丸

一、北京、青島、承德

【功能與主治】滋補散寒。主體弱腸寒，小便短數，大便唐瀉，臍腹隱痛。

【處方】熟地八兩 山藥 山茱萸各四兩 茯苓 丹皮 澤瀉各三兩 肉桂 川附片各一兩

【制法】共為細粉，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服三錢，日服

二次，温开水送下。

【禁忌】忌食生冷。

二、天津

【功能与主治】滋补散寒。主体弱虚寒，小便频数，入便唐瀉，脐腹隐痛。

【处方】熟地八兩 生山藥 山萸肉(酒制)各四兩 丹皮 茯苓(去皮) 澤瀉各二兩 制附子 肉桂(去粗皮)各一兩

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

三、上海

【功能与主治】体虚畏寒，食少便溏。

【处方】附子(泡去皮制) 肉桂各一兩 熟地八兩 怀山藥(炒) 山萸肉(酒炒)各四兩 茯苓 牡丹皮(酒炒) 澤瀉(鹽酒炒)各三兩

【制法】共研細粉，煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢，温开水送服。

四、南京(桂附八味丸)

【功能与主治】主肾虚头眩，耳鳴气喘，便唐，神倦食減，少腹拘急，夜間多尿，小便閉澀。

【处方】同北京。

【制法】上药先将熟地黄煮爛，和余药在石臼内共杵碎，晒干，研为細末，加煉蜜为丸，每錢約做二十粒。

【剂量及用法】每服三錢，一日二次，早晚开水吞服。(如用温酒服，須遵医嘱)

五、武汉(八味地黄丸)

【功能与主治】虚寒气喘，少腹冷痛，小便短，大便溏，嘔吐自汗，喘急耳鳴，及飲食少进等症。

【处方】熟地黄八兩 山萸肉(酒炒) 山藥各四兩(炒) 丹皮(酒炒) 澤瀉(鹽、酒炒)，白茯苓各三兩 肉桂 附子各一兩(泡去皮制)

【制法】小丸 取上药进行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜50—52%，迭成小丸，每錢不得少于二十

五粒。

大丸 一如法得淨粉后，加煉蜜110—120%，和成大丸，每丸重为二錢。

【剂量及用法】每服二錢，温开水送下。

六、广州(桂附八味丸)

【功能与主治】神經衰弱，心力不足，头暈目眩。

【处方】地黄六兩 山萸 澤瀉 丹皮各二兩 淮山藥 茯苓各四兩 附子二兩 肉桂一兩

【制法】將上列各药洗淨，切碎隔水蒸透，晒干，研成細末，拌蜜糖成小丸。

【剂量及用法】开水送服。

七、福州(八味地黄丸)

【功能与主治】治命門火衰，不能生土，以致脾胃虚寒、飲食少思、大便不实或下元冷憊、脐腹疼痛等症。

【处方】熟地八兩(蒸搗) 山萸 山藥(炒)各四兩 丹皮 澤瀉 白茯苓各二兩 肉桂 制附子各一兩

【制法】共为細末，地黄膏加煉蜜为丸。

八、杭州(桂附八味丸)

【功能与主治】治脾肾虚寒，食少便唐，脚气上冲，少腹不仁，喘急自汗，畏寒腹痛，夜多漩溺，以及虛癆等症。

【处方】大熟地(砂仁酒拌，九蒸九晒)八兩 白茯苓三兩 制附子一兩 山萸肉(酒潤)四兩 粉丹皮三兩 肉桂一兩 怀山藥四兩 澤瀉二兩

【制法】共为細末，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服三錢，空腹时淡鹽湯送下。

九、沙市(八味地黄丸)

【功能与主治】治肾虚火衰，体弱畏寒，夜多漩溺，食慾不振，消化不良等症。

【处方】淮山藥四兩 怀熟地(砂仁酒拌，制透为度)八兩 山萸肉四兩(酒潤，去子) 澤瀉 粉丹皮 茯苓各三兩 附塊 中安桂各一兩

【制法】諸药研細末，蜜丸。

【剂量及用法】成人量每次服三錢，日服二次，空腹或食前，用淡鹽湯或白开水下。

【禁忌】充血體質忌服，孕妇亦忌。

十、重庆

【功能与主治】治阳虛命門火衰，脾胃虚寒，大便不实，夜多漩溺，下元虚憊，脐腹疼痛，喘急腹脹等症。

【处方】同北京。

【制法】共研細面，煉蜜为丸，紙盒包裝。

【剂量及用法】每服三錢。

十一、昆明(桂附八味丸)

【功能与主治】遺精盜汗，腰痠足軟。

【处方】熟地八兩 淮山藥 桑皮各四兩 茯苓 粉丹 澤瀉(鹽炒)各三兩 肉桂 附片各一兩

【制法】研末，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服一丸，幼童減半，水壘每服一錢半，用开水早晚各服一次。

【禁忌】感冒忌服。

十二、西安(桂附八味丸)

【功能与主治】督促腎臟机能之恢复，糖尿病慢性腎臟炎，子宮下垂症，脚气及机能衰退(命門火衰)轉變諸症。

【处方】熟地黄(砂仁酒拌，九蒸九晒)八兩 山萸肉(酒潤) 怀山藥各四兩 澤瀉 茯苓(乳拌) 粉丹皮各三兩 制附子 上肉桂各一兩

【制法】蜜制为丸。

【剂量及用法】每服二錢，开水送下，食前服。

【禁忌】孕妇服用，須遵医嘱；有实火者禁忌。

十三、蘭州

【功能与主治】补血散寒，滋陰强壯。主肝胃虚寒，大便瀉瀉，脐腹疼痛，小便頻数。

【处方】六味面一斤半 附子 肉桂各三兩

【制法】共研細粉，蜜小丸。

【剂量及用法】每服三錢，白开水送下。

十四、大同(八味地黄丸)

【功能与主治】腎氣虛寒，腎水不足。

【处方】熟地八兩 山萸 山藥各四兩 茯苓 澤瀉 丹皮各三兩 肉桂 附子各二兩。

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每次三錢，早晚二次，開水送下。

十五、禹縣(八味地黄丸)

【功能与主治】命門火衰，上氣喘急，脾虛便溏，飲食少思，下元虛損，臍腹疼痛。

【处方】同北京。

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

【備考】有效期間一年。

十六、沈陽(八味地黄丸)

【功能与主治】滋陰補腎，健脾溫中。寸身軀衰弱，精神不振，脾胃虛寒，飲食減少，大便溏瀉，腎臟虛損，臍腹疼痛，夜尿頻頻。

【处方】同北京。

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，淡鹽湯送下。

【禁忌】忌、蒜。

十七、撫順(八味地黄丸、崔氏八味丸)

【功能与主治】溫補滋養。主生殖器官衰弱，小便頻澀或夜多遺溺或腳氣入腹，少腹不仁，上氣喘急，耳聾虛鳴，自汗健忘，夢遺滑精，體疲眩暈，大便溏瀉，食少等症。

【处方】同北京。

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服二錢，淡鹽湯送下，一日二次早晚服。

【禁忌】內熱盛者勿服，孕婦忌服。

十八、吉林(八味丸、八味地黄丸)

【功能与主治】添命門之火，補精液不足。主體病眩暈，腎虛耳鳴，瘡瘍久潰不斂，濃清漸轉瘡癤，腹痛

臍冷，脚氣上攻，大便或澀或瀉，小便或澀或頻，脾不化食，形消骨立；並主陽痿不舉，遺精早洩，脾弱食少，健忘頭暈，脚氣上攻，少腹不仁，婦人轉胞，男子夢遺等症。

【处方】熟地八兩(九蒸，搗膏) 黃肉四兩 茯苓三兩 山藥四兩 丹皮 澤瀉各三兩 附子(熟) 肉桂各二兩

【制法】共研細面，煉蜜為丸，如梧桐子大，蜡紙包，貯于清涼處。

【劑量及用法】大人每服二錢，早晚空心服之，引用元酒溫送；如脚氣上攻，或小便不通，鹽水送下；兩耳虛鳴，用枇杷葉少許，溫酒送下。

十九、哈爾濱

(八味地黄丸、八味丸、崔氏八味丸)

【功能与主治】補腎益陽，托里生肌。命門火衰，小便頻澀，或夜多遺溺，或腳氣入腹，少腹不仁，上氣喘急，嘔吐自汗，耳聾虛鳴，以及一切腎虛健忘，夢遺滑精，體疲眩暈等症；並主脾陽不運大便溏泄，食少難化，腹痛臍冷，潰瘍不斂，以及婦人轉胞，消渴，形消骨立。

【处方】熟地黃八兩(九蒸，搗膏) 山藥 山萸肉各四兩 白塊苓 牡丹皮 建澤瀉各三兩 真油桂 熟附片各二兩

【制法】碾為細面，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，溫黃酒送下；脚氣及小便不通，鹽湯送下；兩耳虛鳴，全蠍末少許溫酒送下。均空腹服，服後以美膳壓之。

【禁忌】內熱盛者及孕婦忌服。

二十、呼和浩特

【处方】照六味地黄丸方，加肉桂二兩 附子一兩五錢

【制法】軋細面，蜜小丸。

附參考古方

【來源】備急千金要方。(八味腎氣丸)

【功能与主治】治虛勞不足，大渴欲飲水，腰痛，小腹拘急，小便不利方。

【处方】干地黄八兩 山萸萸 薯蕷各四兩 澤瀉 牡丹皮 茯苓各三兩 桂心 附子各二兩

【制法】上末之，蜜丸，如梧子。

【劑量及用法】酒下十五丸，日三，加至廿五丸。

右 归 丸

一、上 海

【功能与主治】體虛畏寒，食少便溏。

【处方】當歸(酒炒)一錢五分 懷山藥(炒)二兩 附子(炮去皮制)一兩 菟絲子(制)二兩 肉桂(一兩) 杜仲(鹽水炒)二兩 熟地四兩 山茱萸肉二兩 鹿角膠一錢五分 枸杞子(鹽水炒)二兩

【制法】除鹿角膠外，共研細粉，以鹿角膠烊化和煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服一錢五分至三錢，食前淡鹽湯送服。遵醫師指示服用。

二、廣 州

【功能与主治】不思飲食，精神疲倦。

【处方】熟地三兩 杞子一兩五錢 附子一兩五錢 杜仲一兩五錢 肉桂五錢 黃肉一兩 淮山藥二兩 炙草八錢

【制法】研為細末，煉蜜埋成小丸。

【劑量及用法】滾水送服，每日三次，每次一錢。

三、福 州

【功能与主治】治元陽不足，或先天稟弱，或勞傷過度，以致命門火衰不能生土，而為脾胃虛寒，飲食少進，或嘔惡膨脹，或翻胃噎膈，或怯寒畏冷，或臍腹多痛，或大便不實，瀉痢頻作，或小便自遺，虛淋寒疝，或寒侵穀谷而肢節痺痛，或寒在下焦而水邪浮腫，總之真陽不足者，此方主之。

【处方】大懷熟地八兩 山藥(炒)四兩 山茱萸(微炒)三兩 枸杞(微炒)四兩 鹿角膠(炒珠)四兩 菟絲子(制)四兩 杜仲(姜湯炒)四兩 當歸二兩(便溏勿用) 肉桂二兩漸可加至四兩 制附子自二兩漸可加至五、六兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸彈子大，作小粒亦可。

【剂量及用法】每嚼服二三丸，以白滾湯送下其效尤速。

四、杭州(景岳右归丸)

【功能与主治】治元阳虚憊，劳伤过度，脾肾虚寒，食少便溏，怯寒畏風，臍腹疼痛，虛淋寒疝，肢节痠痛，阳虛無子，一切衰弱症候。常服补肾壯阳，精神自強。

【处方】大熟地四兩 枸杞子二兩 全当归兩半 山萸肉二兩 菟絲子二兩 杜仲(姜汁炒)二兩 怀山药二兩 肉桂一兩 鹿角膠兩半 制附子一兩

【制法】共为細末，將膠溶化，酌加煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服三錢，淡鹽湯嚼送，或开水送下。

五、南昌

【功能与主治】命門火衰，脾胃虛寒，嘔噦膨脹，翻胃噎膈，臍腹多痛，虛淋寒疝，便溏泄瀉，肢节痠痛。

【处方】干淮山四兩 山茱萸四兩 制附子二兩 肉桂二兩 熟地八兩 归身三兩 鹿膠(炒珠)三兩 菟絲餅四兩 北枸杞(鹽水炒)四兩 杜仲(鹽水炒)四兩

【制法】前药研極細的末煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢，每日早晚各一次，开水吞服。

【禁忌】腎虛有火，骨蒸潮熱均忌服。

【备考】非經醫師处方不得使用。

六、沙市

【功能与主治】治脾腎虛寒，腹痛便溏，虛淋寒疝，肢节痠痛，週身浮腫等症。

【处方】熟地黄八兩 中安桂二兩 附塊二兩 山萸肉四兩 淮山药(炒)四兩 杜仲(鹽水炒)四兩 菟絲子四兩 鹿角膠(炒珠)二兩 枸杞子四兩 全当归三兩

【制法】諸药研細末，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每次服二錢，空腹淡鹽升水下，每日服二次。

【禁忌】胃腸發炎及腎臟發炎者忌服。

七、青島

【处方】杜仲二兩 枸杞二兩 附子二兩 肉桂二兩 熟地八兩 山药四兩 山萸四兩 茯苓三兩 澤瀉三兩 丹皮三兩

【制法】共軋面，蜜丸如桐子大。

八、沈陽

【功能与主治】补肾气，健脾胃，培元氣，益精神。主稟賦衰弱，或因房勞過度，以致腎氣大傷，脾胃虛寒，飲食減少，嘔吐腹脹，畏冷腹痛，泄瀉遺精，肢节痠痛，寒在下焦，停水浮腫者。

【处方】熟地八兩 山药 枸杞 菟絲子 杜仲 山萸肉 当归各四兩 肉桂 鹿膠 附子各二兩

【制法】共軋極細面，再將熟地蒸爛杵膏，加蜜为丸二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，空心白水送下。

【禁忌】生冷葱蒜，尤須節慾。

九、撫順

【处方】熟地八兩 山药 山萸 鹿膠 全归 杞子 絲餅 杜仲各四兩 肉桂一兩 附子一兩

【制法】共为細面，蜜丸三錢大。

十、呼和浩特

【处方】熟地 山药 杞萸各四兩 絲子 杜仲各三兩 枸杞六兩 当归 鹿角膠 附子 肉桂各二兩

【制法】共为細面，蜜小丸。

附参考古方

【来源】張氏景岳全書。

【功能与主治】治元阳不足，或先天稟弱，或勞傷過度，以致命門火衰不能生土，而为脾胃虛寒，飲食少進，或嘔噦膨脹，或反胃噎膈，或怯寒畏冷，或臍腹多痛，或大便不實，瀉痢頻作，或小水自遺，虛淋寒疝，或寒侵穀谷而肢节痠痛，或寒在下焦而水邪浮腫，总之真阳不足者必神疲氣怯，或心跳不寧，或四肢不收，或畏見邪祟，或陽痿無子等証，俱速宜益火之原，以培右腎之元阳而神氣自強矣，此方主之。

【处方】大怀熟地八兩 山药

补益类

(炒)四兩 山茱萸(微炒)三兩 枸杞(微炒)四兩 鹿角膠(炒珠)四兩 菟絲子(制)四兩 杜仲(薑湯炒)四兩 当归二兩(便溏勿用) 肉桂二兩(漸可加至四兩) 制附子二兩(漸可加至五、六兩)

【制法】先將熟地蒸爛杵膏，加煉蜜丸桐子大，或丸彈子大。

【剂量及用法】每嚼服二、三丸，以白滾湯送下，其效尤速。

脾腎双补丸

一、上海(双补丸)

【功能与主治】脾胃虛弱，腹痛泄瀉，飲食嘔噦。

【处方】党参三兩 五味子(蜜蒸)二兩四錢 蓮子(炒)一兩六錢 菟絲子二兩四錢 补骨脂(鹽水浸二日)一兩六錢 肉果(煨)一兩 砂仁六錢 巴戟肉(薑汁制)一兩二錢 山茱萸肉三兩 橘紅六錢 怀山药(炒)一兩六錢 車前子(炒)一兩二錢

【制法】共研細粉，煉蜜为丸如梧桐子大。

【剂量及用法】每服三錢，溫开水送服。

二、杭州

【功能与主治】健脾溫腎。治脾腎虛寒，腹痛泄瀉，酒食傷脾，飲食嘔噦等症。

【处方】潞党参一兩六錢 山萸肉一兩六錢 怀山药一兩六錢 补骨脂(鹽水炒)一兩六錢 蓮子肉一兩六錢 巴戟肉一兩二錢 車前子一兩二錢 煨肉蔻(去油)一兩 菟絲子二兩四錢 五味子二兩四錢 广陈皮六錢 春砂仁六錢

【制法】共研細末，酒調麵糊为丸。

【剂量及用法】每服二錢，开水送下。

三、蘭州

【功能与主治】强壯身体，健胃斂精。主脾腎双虛，面黃肌瘦，夢遺滑精。

【处方】酒地三兩 山萸肉一兩 怀山药一兩 元桂一兩 大云一兩半 附子一兩 菟絲子一兩 怀牛膝一兩 归身八錢 故紙八錢 大

內 科

枸杞一兩 杜仲一兩 巴戟一兩
鎖陽一兩 蓬鬚八錢

【制法】以上共為細末，蜜為小丸。

又方：扁豆一兩 紫葳五錢 黨參一兩 白朮一兩 炙芪一錢 茯苓一兩 枳殼八錢 薏米一兩 廣皮一兩 益智一兩 木通五錢 香附八錢 砂仁八錢 桑椹一兩五

【制法】以上共為細面，用水疊打為小丸。

【劑量及用法】每服一錢，鹽開水送下或開水亦可。

【禁忌】孕婦忌服。

四、大同

【功能與主治】脾弱不消，腎陽虧損。

【處方】黨參二兩 熟地四兩 山萸二兩 澤瀉二兩 茯苓四兩 丹皮二兩 山藥二兩 炙芪二兩 炙草一兩 當歸一兩 川芎一兩 炒白芍一兩 蓮肉二兩 牛膝二兩 土炒白朮二兩 肉桂一兩 枸杞二兩 芡實二兩 扁豆一兩五錢 薏米二兩 麥冬一兩 五味子一兩 陳皮二兩

【制法】共為細面，蜜為二錢丸。

【劑量及用法】每服三錢，開水送下。

五、呼和浩特

【處方】黨參二兩 黃芪四兩 川芎一兩 當歸四兩 白朮二兩 茯苓二兩 炙草二兩 首烏六錢 肉桂二兩 砂仁二兩 巴戟六錢 山藥六錢 故紙五錢 蛇床二兩 人參五錢 絲子六錢 益子五錢 杜仲二兩 牛膝六錢 遠志五錢 桑葉二兩 龍骨六錢 鹿膠六錢 華藤六錢 鎖陽六錢 茴香五錢 味子三錢 九地二兩 青鹽五錢 沉香一錢 鹿茸二錢 干姜二兩

【制法】每斤面兌：鹿茸一錢 沉香一錢五分 蜜小小丸。

附子七味丸

福州

【功能與主治】治陽虛畏冷、自汗便溏、虛火上炎、形體瘦弱。

【處方】熟地黃八兩(蒸搗) 山萸 山藥(炒)各四兩 丹皮 澤瀉 白茯苓各二兩 附子一兩

十全大補丸

一、北京

【功能與主治】滋補氣血。主男婦體弱，久病虛損，時發潮熱，精神倦怠，腰膝無力。

【處方】人參(去蘆) 熟地 黃耆 白朮 當歸 白芍 肉桂 川芎 茯苓 甘草各等分

【制法】共為細粉，煉蜜為丸重錢。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。

二、天津

【功能與主治】強壯身體，振奮精神，促進消化。主身體衰弱，心跳氣短，精神疲倦，食慾不振，病後體弱。

【處方】當歸一兩 生黃芪一兩五錢 熟地一兩五錢 甘草八錢 川芎一兩 茯苓(去皮) 白朮(熟炒) 牛白芍 肉桂(去粗皮)各一兩 黨參(去蘆)一兩五錢 共十味十一兩錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

三、上海(十味補丸)

【功能與主治】氣血兩虧，食慾不振，病後虛弱，腰膝無力。

【處方】黨參二兩 冬朮(炒)二兩 茯苓二兩 甘草(炙)一兩 當歸(酒洗)二兩 黃芪(炙)一兩 肉桂一兩 白芍藥(炒)一兩 熟地三兩 山藥一兩

【制法】共研細粉，煉蜜為丸如綠豆大。

【劑量及用法】每服三錢，溫開水送服。

四、南京

【功能與主治】主男婦體弱，久病虛損，潮熱倦怠，腰膝無力。

【處方】人熟地一兩五錢 炒白朮一兩 潞黨參一兩五錢 白茯苓八錢 炙黃芪一兩五錢 炙甘草八

錢 炒白朮一兩 撫川芎八錢 肉桂心一兩 西當歸一兩

【制法】前藥共研細末，煉蜜為丸，每錢約二十粒。

【劑量及用法】每服一錢，一日二次，開水吞服。

五、武漢(十全大補湯)

【功能與主治】虛損勞熱，腳膝無力，面黃肌瘦，胃弱不適，並為一般滋養劑。

【處方】黨參 白朮 茯苓各二錢 炙甘草一錢 熟地黃 當歸各二錢 川芎一錢半 芍藥 炙黃芪各二錢 肉桂一錢

【制法】小丸——取上藥進行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜50—52%，迭成小丸，每錢不得少於二十五粒。

大丸——如法得淨粉后，加煉蜜120—130%和成大丸，每丸重為三錢。

【劑量及用法】每服三至五錢，日服二次，姜，棗煎湯送服，或淡鹽湯送服。

六、廣州

【功能與主治】氣損氣弱。

【處方】黨參二錢 熟地一錢 炒白朮二錢 當歸一錢 白芍一錢 川芎八分 切云苓二錢 炙甘草一錢 炙北芪二錢 肉桂五分

【制法】將各藥混合杵碎，蒸透晒干，磨為細末，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】清茶送服，每次服三或四錢。

七、福州

【功能與主治】治氣血俱虛，惡寒發熱，自汗盜汗，肢體困倦，眩暈驚悸，晡熱作渴，遺精白濁，二便見血，小溲短少，便泄閉結，喘咳等症。

【處方】人參二兩 白朮一兩 茯苓二兩 炙草一兩 川芎一兩 當歸二兩 白芍二兩 熟地三兩 炙芪一兩 肉桂一兩

【制法】共碾細末，煉蜜為丸。

八、杭州

【功能與主治】治男婦諸虛不足，氣血兩虧，食慾減退。病後虛弱，頭眩耳鳴，畏風自汗，經絡拘急，面黃便泄。並治婦人本原不足，經遲色淡等症。

【处方】潞党参二兩 全当归三兩 炙黄芪二兩 炒冬朮二兩 酒白芍二兩 肉桂一兩 川芎一兩 白茯苓二兩 炙甘草一兩 大熟地三兩

【制法】共研細末，煉蜜为丸或水泛丸。

【剂量及用法】每服三至四錢，开水送下。

九、南 昌

【功能与主治】心肺俱損，气血兩亏，及癰疽潰后膿少而清，潰久不斂等症。

【处方】党参 漂白朮 茯苓各二兩 炙甘草一兩 熟地 全当归各三兩 白芍二兩 川芎一兩五錢 炙黃耆一兩 肉桂一兩

【制法】共研細末，煉蜜为丸如梧桐子大。

【剂量及用法】每服三錢，早晚各服一次，开水吞服。

【禁忌】热症及陰虛火旺者忌服。

十、沙 市

【功能与主治】治气虛貧血，肌肉消瘦，足膝無力及潰瘍寒熱作痛，膿清而少，或流注瘰癧便毒，久不化膿或膿成不潰，潰而不斂等症。

【处方】党参 白朮(土炒) 茯苓各二兩 甘草(炙)一兩 当归 熟地各二兩 白芍二兩 川芎一兩 黃耆(炙)二兩 中安桂五錢

【制法】諸藥研細末，蜜丸。

【剂量及用法】每服三錢，日服二次，溫開水下。

【禁忌】水份不足及充血體質，並咳嗽失血者忌服。

十一、重 庆

【功能与主治】專治五癆七傷，諸虛不足，頭痛昏暈，耳鳴目眩，口舌生瘡，牙齒不固，心煩作渴，喘咳呃逆，胸腹悶痛等症。

【处方】同南京。

【制法】共为細面，煉蜜为丸，紙盒包裝。

【剂量及用法】三至五錢。

十二、昆 明

【功能与主治】大暈耳鳴，目眩

身倦，肌肉消瘦，营养不良。

【处方】党参一兩五錢 白朮一兩 炙草五錢 茯苓一兩五錢 川芎五錢 当归一兩五錢 熟地一兩五錢 杭芍一兩 肉桂五錢 炙口芪一兩五錢

【制法】研末，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服一丸(水丸每服三錢半)，幼童減半，用汁水早晚各服一次。

【禁忌】感冒風寒与暑濕燥熱等病忌服。

十三、西 安

【功能与主治】主治男婦諸虛不足，五勞七傷，气血兩亏，食慾減退，病后虛弱潮熱，面黃肌瘦，骨脊拘急疼痛，脚膝無力等症。

【处方】大熟地三兩 白茯苓二兩 全当归三兩 炒白芍二兩 肉桂一兩 炙甘草一兩 炙冬朮二兩 大川芎一兩五錢 人參二兩 炙黃芪二兩

【制法】蜜制为丸。

【剂量及用法】每次服三錢，一日二次，開水送服。

【禁忌】熱病忌服

十四、蘭 州

【功能与主治】强壯身体，振奮精神，促進消化主身体衰弱，氣虛咳嗽，心跳气短，精神疲倦，食慾不振，病后体弱。

【处方】党参一兩五錢 当归一兩 黃芪一兩五錢 甘草八錢 川芎二兩 云苓一兩 白朮一兩 白芍一兩 肉桂一兩 熟地一兩五錢

【制法】以上共研細末，蜜为丸。

【剂量及用法】每服三錢，白開水送下。

【禁忌】中滿腹脹忌。

十五、大 同

【功能与主治】氣血虛損，脾胃衰弱，健精神，病后失調，新陳代謝。

【处方】党参一兩 川芎四兩 当归一斤 生黃芪半斤 白朮一斤 茯苓半斤 白芍半斤 熟地半斤 肉桂一兩 甘草二兩

【制法】共为細面，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服三錢。

十六、禹 县

【功能与主治】氣血兩虛，頭目眩暈，虛弱喘嗽，耳鳴目眩，瘦弱不食，足膝無力。

【处方】潞党参一兩五錢 熟地黃一兩五錢 黃耆一兩五錢 白朮一兩 当归一兩 白芍藥一兩 肉桂五錢 川芎一兩 白茯苓一兩 甘草八錢

【制法】共为細面，煉蜜为丸，重二錢。

【剂量及用法】每服三錢，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌用，熱症忌用，小兒不用。

【備考】有效期間一年。

十七、濟 南

【功能与主治】男婦体弱，久病虛損，時發潮熱，精神倦怠等症。

【处方】党参一兩 熟地一兩 黃耆一兩 白朮一兩 当归一兩 白芍一兩 肉桂一兩 川芎一兩 茯苓一兩 甘草一兩 生薑三錢 大棗(去核)十枚。

【制法】共为細粉，煉蜜为小丸梧桐子大。

【剂量及用法】每服三錢，日服二次，溫開水送下。

十八、青島(1)

【处方】人參二十兩，川芎五斤 当归(酒洗)二十斤 茯苓十斤 黃芪二十斤(蜜炙) 白芍十斤(酒炒) 熟地十斤 白朮二十斤(炒) 甘草二斤半

【制法】共研面，水燉成丸。

十九、青島(2)

【处方】人參 肉桂 黃芪 熟地各六兩 茯苓五兩 当归 白朮 白芍各四兩 川芎 炙草各二兩

【制法】共軋細面，水泛小丸。

二十、沈 陽

【功能与主治】氣血雙補。主治諸虛百損，五勞七傷，不思飲食，久病虛弱，時發潮熱，瘡瘍內陷，面色萎黃，腿膝無力，一切虛弱症盡可治之。

【处方】人參 炒白朮 茯苓各二兩 炙甘草一兩 熟地三兩 白芍二兩 当归三兩 川芎一兩 制

黃芪二兩 肉桂一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空心白開水送下。

【禁忌】忌冷硬物。

二十一、撫順

【功能與主治】補養強壯。主氣血衰弱，心跳頭暈，健忘怔忡，自汗盜汗，積勞內傷，咳嗽氣弱，羸瘦不食，腰膝無力，以及瘡瘍內陷，毒氣潛伏，膿清如水，青紫塌陷，久不收口等症。

【處方】白人參四兩 熟地六兩 白朮四兩 川芎四兩 茯苓四兩 白芍四兩 桂枝二兩 當歸四兩 制甘草 黃芪各四兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，每日早晚二次，開白水送下。

【禁忌】忌食生冷物。

二十二、吉林(大補丸)

【功能與主治】強身補血，益壽延年，補虛培元，托里固本。主脾虛胃弱，倦怠自汗，精神減少，眼目昏花，健忘怔忡，勞傷內傷，咳嗽呃逆，羸瘦不食，胸悶不舒，足膝無力，瘡瘍內陷，經年不愈，膿清如水，青紫塌陷，久不收口；或痘不灌漿，痘已起脹，仍見痘內如水澄清。

【處方】歸身 炙芪 熟地 茯苓 酒芍 貢朮(炒) 川芎 人參各四兩 炙草二兩 貢桂一兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸，二錢一分重。蜡紙包。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，開白水送下。七歲至五歲每服半丸，四歲至一歲一丸分四至五次服。

二十三、哈爾濱

【功能與主治】同吉林。

【處方】制黃芪 當歸身 大熟地 塊茯苓 炒白芍 炒白朮各四兩 撫川芎二兩 揀人參四兩 制甘草二兩 貢油桂一兩

【制法】共碾為細面，煉蜜為二錢一分重丸。

【劑量及用法】每服一丸，日二、三次，開白水送下。

【禁忌】忌食生冷物品。

二十四、承德

【功能與主治】體虛神倦，日漸消瘦，頭昏目眩，食少便溏，足膝無力，及瘡瘍膿清，潰而不斂等症。

【處方】同西安。

【制法】共為細粉，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服三錢，日服二次，開水送下。

【禁忌】熱症忌服。

二十五、呼和浩特

【處方】肉桂 炙草 川芎 人參各一斤二兩 杭芍 黃芪 九地各一斤六兩 當歸 白朮各二斤四兩 茯苓一斤十一兩

【制法】共為細面，蜜小丸。

附參考方

【來源】太平惠民和劑局方。(十全大補湯)

【功能與主治】治男子婦人諸虛不足，五勞七傷，不進飲食，久病虛損，時發潮熱，氣攻骨脊，拘急疼痛，夜夢遺精，面色萎黃，腳膝無力，一切病後氣不如舊，憂愁思慮，傷動氣血，喘嗽中滿，脾腎氣弱，五心煩悶，此藥性溫不熱，平補有效，養氣育神，醒脾止渴，順正辟邪，溫煖胸胃。

【處方】白茯苓(焙) 白朮(焙) 人參(去蘆) 熟干地黄(酒蒸) 白芍藥 粉草(炙) 黃耆(去蘆) 肉桂(去粗皮，不見火) 川當歸(去蘆洗) 川芎各等分

【制法】上為粗散。

【劑量及用法】每服二大錢，水一盞，生薑三片，棗子二箇，同煎七分，不拘時溫服。

補中益氣丸

一、北京、承德

【功能與主治】補氣健胃。氣虛血虧，精神倦怠，氣短自汗。

【處方】黃耆一兩 人參三錢(去蘆) 甘草五錢 當歸三錢 橘皮三錢 升麻三錢 柴胡三錢 白朮三錢

【制法】共為細粉，生薑二分五厘，紅棗五分，煎湯泛小丸。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水送下。

二、天津

【功能與主治】補氣健脾。主身體衰弱，氣虛血虧，精神倦怠，氣短自汗。

【處方】生黃芪八兩 白朮(麩炒)三兩 升麻一兩五錢 柴胡一兩五錢 黨參(去蘆) 陳皮 甘草 當歸各五兩

【制法】共為細粉，涼開水泛小丸，三錢重裝袋，或煉蜜為丸三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】水丸每次服一袋；蜜丸每次服一丸，白開水送下。

三、上海

【功能與主治】勞傷脫力，氣虛心煩，畏風惡寒。

【處方】黨參 黃芪(炙)各一兩 白朮(炒)九錢 當歸身(酒洗) 升麻 柴胡各六錢 甘草(炙)三兩 陳皮六錢

【制法】共研細粉，用生薑六兩，紅棗九兩，煎湯泛丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服三錢，溫開水送服。

四、南京

【功能與主治】主體虛勞倦，氣短自汗。

【處方】炙黃芪一兩 廣陳皮二錢 西當歸一錢 炒白朮三錢 柴胡三錢 炙甘草五錢 潞黨參三兩 升麻二錢

【制法】共研細末，用鮮生薑四錢，大棗十枚煎濃湯，和煉白蜜為丸，每錢約做二十粒。

【劑量及用法】每服三錢，一日二次，早晚開水吞服。

五、武漢

【功能與主治】體虛勞倦，氣短自汗，頭疼心煩，不思飲食。

【處方】黨參三分 黃芪一錢(炙) 白朮二分 甘草五分(炙) 當歸二分 陳皮三分 升麻三分 柴胡一分

【制法】小丸——上藥干燥，混合碾細，照淨粉量用生薑三分、大棗五分煎水兌入煉蜜60~62%，迭成小丸，每錢不得少於二十五粒。

大丸——如法得淨粉后，用生薑三分，大棗五分煎水兌入蜜125~

130%，和成人丸，每丸重三錢。

【剂量及用法】每服一錢，日服三次，溫開水送下。

六、廣州

【功能与主治】頭腦疼痛，不思飲食。

【处方】炙芪三兩 當歸二兩 炙黨二兩 炙升麻六錢 炙草二兩 枳皮一兩 炙柴胡六錢 白朮一兩

【制法】研為細末，煉蜜為小丸。

【剂量及用法】淡鹽水送下，每日早晚服三錢。

七、福州

【功能与主治】治勞倦傷脾，中氣不足，清陽不升，外感不解，體倦食少，寒熱瘧痢，氣虛不能攝血等症。

【处方】人參 黃芪(炒) 白朮(炒) 炙草各一兩五錢 陳皮五錢 升麻 柴胡各三錢 當歸一兩

【制法】共研細末，蜜煉為丸。

【剂量及用法】以姜棗湯送服。

八、杭州

【功能与主治】益氣固表，升清降濁。治內傷勞倦，肺脾氣虛，頭痛懶言，陽虛自汗，惡風厭食，心煩口渴，瘧勞寒熱，久瀉久痢等症。

【处方】潞黨參二兩 炙甘草一兩五錢 升麻五錢 炙黃芪二兩 全當歸一兩 柴胡五錢 炒冬朮一兩五錢 陳皮一兩 生薑一兩 大棗三十枚

【制法】共研細末，用姜棗煎湯泛丸。

【剂量及用法】每服三錢，開水送下。

【禁忌】腎陰下虛，濕熱內伏者忌服。

九、南昌

【功能与主治】氣虛氣喘，內傷勞倦，惡寒自汗，脾胃虛弱，中氣不足等症。

【处方】黃芪(蜜炙或酒炒)一兩 黨參三錢 當歸身(酒制土炒或酒拌)三錢 陳皮二錢 炙甘草五錢 焦白朮三錢 北柴胡二錢 升麻一錢

【制法】共研細末，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二至三錢，溫開水送下，日服一次。

【禁忌】風寒外感忌服。

十、沙市

【功能与主治】治氣虛下陷，中氣不足，內傷體倦，寒熱頭痛，懶言食少，崩帶等症。

【处方】黃耆(炙)三兩 黨參二兩 土炒白朮一兩 甘草(炙)二兩 廣陳皮一兩 當歸一兩 升麻六錢 北柴胡六錢

【制法】諸藥研細末，蜜丸。

【剂量及用法】每服三錢，日服二次，溫開水下。

【禁忌】充血體質忌服。

十一、重慶

【功能与主治】治虛氣少氣，高氣氣喘，內傷勞倦，凡屬脾胃虛弱，元氣中氣不足等症。

【处方】炙黃芪一兩 黨參二錢 炙草五錢 當歸三錢 橘皮二錢 升麻二錢 柴胡三錢 土炒白朮三錢 大棗肉(去核)三錢 生薑三錢

【制法】除生薑搗汁和丸，余藥共研細末，煉蜜並生薑汁和丸。

【剂量及用法】二至三錢。

【禁忌】凡腎中水竭，命門火衰，陰虛下，陽虛上，表不固，汗不斂，水火亢，吐血衄血，四肢厥逆，陽虛將脫，均不能服。

十二、昆明

【功能与主治】胃酸不足，身弱感冒，久瘧不愈，體虛發熱，脫肛下血等症。

【处方】黨參三兩 黃芪十兩 白朮一兩 當歸五兩 陳皮二兩 升麻二兩 柴胡二兩 炙甘草二兩

【制法】研末，煉蜜為丸。

【剂量及用法】每服一丸，幼童減半，水吞每服三錢半，用開水早晚各服一次。

【禁忌】濕熱者忌服。

十三、蘭州

【功能与主治】強壯健胃。主身體衰弱，消化不良，人量惡心，精神不振，胸滿作嘔，心跳氣短。

【处方】黃芪八兩 白朮三兩 升麻一兩五錢 柴胡一兩五錢 黨

補益類

參五兩 陳皮五兩 甘草五兩 歸身十兩

【制法】以上共研細粉，蜜小丸。

【剂量及用法】每服三錢，白開水送下。

十四、大同

【功能与主治】中氣不足，脾虛下瀉。

【处方】黨參五兩 白朮四兩 炙草一兩五錢 炙芪四兩 廣皮一兩五錢 當歸三兩 柴胡(炙)五錢 升麻五錢

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

【剂量及用法】早晚每服三錢，開水送下。

十五、禹縣

【功能与主治】氣虛氣弱，內傷勞倦，中氣不足，元氣下陷，惡寒體倦。

【处方】黃耆 潞黨參 甘草各一兩 當歸身 陳皮 升麻 柴胡各二錢 白朮三錢

【制法】共為細面，煉蜜為丸，每丸重三錢。

【剂量及用法】每服三錢，姜一片棗一枚煎湯送下。

【禁忌】實症忌用。

【備考】有效期間一年。

十六、濟南

【功能与主治】體虛勞倦，氣短自汗。

【处方】黃芪一錢(蜜炙) 人參一分 甘草五分(炙) 當歸身(酒炙) 橘皮 升麻 柴胡 白朮(土炒)各二分

【制法】共為細粉，水泛小丸，綠豆大。

【剂量及用法】每服三錢，日服二次，溫開水送下。

十七、青島

【处方】黃芪十斤 人參二斤半 白朮 陳皮各十五斤 升麻 甘草 柴胡各五斤 當歸十斤

【制法】共研細面，蜜丸。

十八、沈陽

【功能与主治】補中養氣。主心臟衰弱，氣不上達，心煩怔忡，肢體倦怠，自汗口渴，氣短咳喘等症。

【处方】制黃芪 人參 白朮各一兩五錢 制甘草 一兩 當歸一兩 柴胡 陳皮 升麻各五錢

【制法】共碾極細面，生薑大棗煎湯，合煉蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空心白開水送下。

【禁忌】生冷。

十九、撫順(1)

【功能與主治】補養強壯。主胃腸虛弱，消化不良，食慾不振，四肢倦怠，虛瀉滑脫。元氣不足，氣息微弱，自汗身熱，面色羸瘦，肢倦神疲，遺精，生殖器衰弱，無夢自遺，腰腿痠痛，頭暈耳鳴，久瘡不愈，轉為陰性，潰瘍無膿，紫黃塌陷，久不收口。

【处方】白人參 一兩五錢 黃芪 一兩 白朮 一兩五錢 當歸 一兩五錢 柴胡 三錢 升麻 三錢 炙甘草 一兩 陳皮 一兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，開白水送下。

【禁忌】忌食生冷食物。

二十、撫順(2)

【处方】黨參 一兩半 元芪 一兩 白朮 全歸各 一兩半 柴胡 升麻各 三錢 炙草 陳皮各一兩。

【制法】共為細面，蜜丸三錢大。

二十一、吉林(益氣丸)

【功能與主治】補氣行血，安神定魄。治氣血神傷，喘急息短等症。

【处方】炙芪 三兩 三錢四分 白朮 二兩六錢七分 陳皮 一兩六錢七分 黨參 二兩六錢七分 茯苓 一兩六錢七分 炙草 一兩三錢四分 柴胡 四錢 升麻 四錢

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，溫開水送下。

二十二、哈爾濱

【功能與主治】補中益氣，托裡培元。主脾胃虛弱，元氣不足，遺精，瘡瘍內陷，疳不腐爛，虛人感冒。

【处方】蜜黃芪 五兩 炒白朮 揀人參 當歸身各四兩 廣陳皮 二兩半 制甘草 一兩二錢 軟柴胡 制升麻各六錢

【制法】共碾為細面，煉蜜為二

錢一分重丸。

【禁忌】忌生冷食物。

二十三、呼和浩特

【处方】人參 四斤十一兩 黃芪 四斤十一兩 炙草 一斤九兩 陳皮 二斤三兩 歸身 白朮各三斤二兩 升麻 柴胡各十五兩

【制法】共為細面，水泛小丸。

附參考古方

【來源】脾胃論(補中益氣湯)。

【处方】黃芪(病甚勞役熱甚者)一錢 甘草(炙)以上各五分 人參(去蘆，有嗽去之)二分 當歸二分(酒焙干，或日干) 橘皮(不去白)二分或三分 升麻二分或三分 柴胡二分或三分 白朮三分

【制法】上件藥咬咀。

【劑量及用法】都作一服，水二盞煎至一盞，量氣弱氣盛臨病斟酌水盞大小，去粗食遠稍熱服，如傷之重者不過二服而愈，若病日久者以權立加減法治之，並隨症引用。

黃芪建中丸

南 昌

【功能與主治】虛勞諸不足，腹中急痛。

【处方】黃芪 一兩半 桂枝 生薑各三兩 白芍六兩 炙甘草一兩 大棗十二枚 飴糖一斤

【制法】共研細末，入飴糖煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，每日服二次，開水送下。

【禁忌】嘔家忌服。

薯蕷丸

一、福州 (金匱薯蕷丸)

【功能與主治】治虛勞諸不足，風氣百病。

【处方】薯蕷 十分 人參七分 麥冬六分 白朮六分 茯苓五分 甘草 十分 當歸十分 芍藥六分 芎藭六分 生地十分 阿膠七分 干姜三分 人參百枚為膏 桔梗五分 杏仁六分 桂枝十分 防風六分 神麴十分 柴胡五分 白朮二分 黃豆卷十分

【制法】共研細末，冬蜜為丸，如彈子大。

【劑量及用法】酒服一丸，一百丸為一劑。

二、西 安

【功能與主治】治肝脾機能衰弱，及因此而引起之消化不良，體溫不足，潮熱盜汗，貧血心悸等虛勞諸不足。

【处方】山藥(即薯蕷) 一兩 人參 阿膠各七錢 白朮 芍藥 川芎 麥冬 杏仁 防風各六錢 茯苓 桔梗 柴胡各五錢 甘草(炙) 二兩 當歸 干地黄 桂枝 神麴 豆卷各一兩 干姜一錢 白朮 二錢 大棗一百枚(去皮核)

【制法】將上藥(除大棗外)研細末，另將大棗煮融去皮、核，與藥搗和酌加煉蜜為丸，如彈子大，每丸二錢半，一百粒為一劑。

【劑量及用法】每次一丸，熟湯送下，一日二次，視身體情況而定。

三、大 同

【功能與主治】婦女休弱，血枯或失血過多，造成貧血，營養不良。

【处方】薯蕷 三兩 人參 三錢 阿膠 七錢 川芎 麥冬 白芍 防風 白朮 杏仁各六錢 桔梗 茯苓 柴胡各五錢 甘草 二兩 膠 棗 八兩 桂枝 一兩 生地 神麴 黃豆卷各二兩 白朮 二錢 干姜 三錢

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每次服二丸，日服二錢。

四、沈 陽

【功能與主治】補虛扶弱，促進消化機能。主大便秘瀉，咳嗽悸眩，腎虛精冷，心跳氣短，神疲體倦，自汗盜汗，腰痠腿軟，完谷不化。

【处方】山藥四兩九錢 干姜五錢二分 人參 一兩七錢五分 白朮 一兩零五分 桔梗 八錢七分五厘 茯苓 八錢七分 杏仁 八錢七分五厘 甘草 三兩五錢 桂枝 一兩二錢 當歸 一兩五錢 防風 芍藥各 一兩另五分 神麴 一兩七錢五分 白朮 五錢二分 柴胡 川芎各八錢七分 麥冬 一兩另五分 阿膠 干地黄 黃豆卷各一兩二錢 大棗百枚

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空腹時黃酒送下。

【禁忌】忌食腥冷；孕婦忌服。

五、吉林

【功能與主治】補虛、益氣、養血。治各種風氣，虛癆，陽虛外寒，陰虛內熱，脾虛便溏，肺虛咳嗽，心虛悸眩，腎虛滑精，以及一切虛損，氣短心跳，神疲體倦，自汗盜汗，納少形消等症。

【處方】薯蕷(山藥)四兩九錢 白芍藥 大十冬 全當歸(去苗) 貢白朮各一兩五分 柴胡(去苗) 桔梗 川芎 塊苓 杏仁(去皮尖，麩炒，另研)各八錢五分五厘 防風(去苗)一兩五分 神麴一兩七錢五分 吉林人參(去蘆)七錢五分 桂枝一兩一錢二分二厘 大黃豆卷(碎炒)一兩二錢二分五厘 貢阿膠(挫碎，蛤粉炒)一兩二錢二分五厘 白蘆五錢二分五厘 干姜五錢二分五厘 干熟地一兩二錢二分五厘 炙甘草一兩五錢 大棗一百枚(蒸熟，去皮核搗成膏)

【制法】共碾為細面，將人參肉煉蜜和丸，每丸重二錢。

【劑量及用法】早晚各服一丸，空腹時溫酒送下。一百丸為一劑。

【禁忌】忌食生冷；孕婦忌服。

六、哈爾濱

【功能與主治】同吉林。

【處方】薯蕷四兩九錢(即山藥) 白芍藥 大十冬 全當歸(去苗) 軟防風(去苗) 貢白朮各一兩零五分 軟柴胡(去苗) 苦桔梗 撫川芎 白塊苓 苦杏仁(去皮尖，麩炒，另研)各八錢七分五厘 六神麴 吉林人參(去蘆)各一兩七錢五分 嫩桂枝 大豆黃卷(碎炒) 貢阿膠(挫碎，蛤粉炒)各一兩二錢二分五厘 白蘆五錢二分五厘 干姜五錢二分五厘 干熟地一兩二錢二分五厘 炙甘草一兩五錢 大棗一百枚(蒸熟，去皮核搗成膏)

【制法】同吉林。劑量及用法，禁忌皆同。

附參考古方

【來源】金匱要略方論。

【功能與主治】虛勞諸不足，風氣百疾。

【處方】薯蕷二十分 當歸 桂枝 地黃 麴 豆黃卷各一分 甘草廿八分 芍藥 麥門冬 芍藥 白朮 杏仁各六分 人參七分 柴胡 桔梗 茯苓各五分 阿膠七分 干姜三分 白朮二分 防風六分 大棗百枚為膏

【制法】上二十一味木乙，煉蜜和丸，如彈子大。

【劑量及用法】空腹，酒服一丸，一百丸為劑。

人參養榮丸

一、北京、承德

【功能與主治】強心健胃。主神經衰弱，驚悸健忘，發熱盜汗，飲食減少。

【處方】人參(去蘆) 肉桂 五味子各二十兩 白芍 黃耆 白朮 茯苓 當歸各八十兩 熟地一百六十兩 橘皮 甘草 遠志各五十六兩

【制法】共為細粉，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

二、上海(養榮丸)

【功能與主治】氣虛血虧，心悸神疲，食少便溏。

【處方】黨參 白朮(炒)各一兩五錢 甘草(炙) 肉桂 陳皮 五味子(炒)各五錢 白芍藥(炒)一兩五錢 熟地三兩 黃芪(炙)二兩 當歸(酒洗)二兩 遠志(炒)五錢 茯苓一兩

【制法】藥共研細粉，將生姜八兩打泥，和紅棗八兩煮爛去皮核和入藥粉打和，加煉蜜為丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，溫開水送服。

三、南京(1)

【功能與主治】主氣血衰少之驚悸自汗，食減體倦，肌瘦色枯，毛髮脫落，及病後體虛等。

【處方】人參一兩(去蘆) 白芍一兩五錢 炒白朮 炙甘草 炙黃芪 肉桂各一兩 大熟地七錢 五味子七錢 西當歸一兩 炙遠志五

錢 廣陳皮一兩 白茯苓七錢

【制法】共研細末，以大棗一兩五錢 鮮生姜一兩，煎濃汁加煉蜜為丸，每錢約二十粒。

【劑量及用法】每服三錢，一日兩次，開水吞服。

四、南京(2)(養榮丸)

【功能與主治】脾肺氣虛，營血不足，驚悸健忘，盜汗發熱，食少無味，身倦肌瘦，色枯氣短，毛髮脫落，小便不禁或遺尿，發汗過多，身振脈緩，筋肉跳動。

【處方】同上，人參易黨參。

【制法】研為細末，生薑一兩，紅棗一兩五錢，煎汁和煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，開水送下，每日早晚各服一次。

五、武漢

【功能與主治】積勞虛損，四肢軟弱，骨肉酸痛，行動喘息，小腹拘急，腰背強痛，咽干唇燥，飲食無味等症。

【處方】黃芪一兩 杭白芍二兩 炙甘草 白朮(煨) 當歸 肉桂心各一兩 五味子七錢半 黨參一兩 茯苓七錢半 陳皮一兩 熟地七錢半 遠志五錢

【制法】小丸——上藥干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜50—52%，迭成小丸，每錢不得少于二十五粒。大丸——加煉蜜130—140%，和成大丸，每丸重為三錢。

【劑量及用法】每服三至五錢，日服二次。

六、廣州

【功能與主治】躁煩失眠。

【處方】人參三兩 茯苓三兩 肉桂五錢 當歸二兩 炙草一兩 炙芪二兩 白芍二兩 陳皮一兩 遠志一兩 熟地四兩 白朮二兩 五味子五錢

【制法】研為細末，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】淡姜湯送下，每次四錢。

七、福州

【功能與主治】治脾肺俱虛，惡寒發熱，肢體瘦倦，食少作瀉，口干心悸自汗等症。

【处方】人参 黄芪 当归 白朮 炙甘草 桂心 陈皮各一兩 熟地 五味 茯苓各七錢 白芍一兩五錢 远志五錢

【制法】共研細末，蜜煉為丸。

【劑量及用法】加姜棗湯送下。

八、杭州(參桂養榮丸)

【功能與主治】主治脾肺兩虛，營養缺乏不足，心悸健忘，肌瘦肢倦，寢汗發熱，病後元虛血虧，食少便唐等症。

【处方】潞黨參二兩 大熟地二兩 远志肉一兩 炒冬朮二兩 生白芍三兩 陈皮二兩 白茯苓二兩 全當歸二兩 五味子一兩 炙甘草二兩 炙黃芪二兩 肉桂一兩

【制法】共研細末，用大棗三十枚，生薑一兩煎湯泛丸。

【劑量及用法】每服三至四錢，開水送下。

九、沙市

【功能與主治】治氣虛血虧，心悸健忘，食少無味，身倦肌瘦，身振脈弱，筋惕肉瞤等症。

【处方】黨參二兩 土炒白朮二兩 茯苓二兩 甘草一兩 當歸三兩 熟地三兩 白芍二兩 黃耆二兩(炙) 中安桂(去皮)五錢 远志一兩 廣陳皮一兩 北五味五錢

【制法】諸藥研細末，蜜丸。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水下。

【禁忌】體實而充血者忌服。

十、昆明

【功能與主治】血液不足，虛熱惡寒，體倦神疲，心悸盜汗。

【处方】黨參四兩 白朮四兩 炙口芪四兩 炙甘草二兩 陈皮二兩 肉桂一兩 當歸四兩 熟地四兩 五味二兩 茯苓四兩 炙远志二兩 杭芍六兩 生薑二兩 大棗二兩

【制法】研末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服一丸，(水丸每服二錢半)，幼童減半，用開水早晚各服一丸。

【禁忌】感冒及溫暑燥熱各病均忌服。

十一、西安

【功能與主治】主治健忘虛熱，

體倦肢瘦，食少無味，脈搏無力及貧血症候。

【处方】人参 白朮各一兩 茯苓七錢 炙甘草 當歸(酒拌)各一兩 熟地七錢 白芍 炙黃芪 桂心 陈皮各一兩 远志五錢 五味子七錢 生薑一兩 大棗一兩五錢

【制法】將棗煎濃汁為丸。

【劑量及用法】每次一至二錢，開水送下。

【禁忌】急性發熱病及脈搏有力者忌服。

十二、蘭州

【功能與主治】補氣養血斂精。主氣血兩虛，面黃肌瘦，精神恍惚，夢遺滑精。

【处方】黨參 白朮 炙黃芪 炙甘草 廣皮 桂心 當歸各二兩 熟地 五味 云苓各一兩五錢 远志 杭芍各一兩

【制法】共研細面，蜜小丸。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

十三、大同

【功能與主治】健脾平胃。主血虛氣虛。

【处方】黨參 當歸各八兩 廣皮二兩 桂朮二兩五 白朮 熟地各四兩 茯苓二兩 炙甘草 远志各一兩八錢 五味子一兩 制芪六兩

【制法】煉蜜為丸。

【劑量及用法】早晚各服二、三錢。

十四、濟南

【功能與主治】肢體疲倦，食少無味，心悸健忘，筋肉跳動。

【处方】同西安。

【制法】將大棗煎汁，泛為丸綠豆大。

【劑量及用法】每服一至三錢，白開水送下。

十五、青島(1)

【处方】人參一斤零四 白芍五斤 桂心二十兩 麥冬五斤 五味子二十兩 熟地十斤 黃芪五斤 陈皮三斤半 白朮五斤 甘草三斤半 茯苓五斤 远志三斤半 當歸五斤

【制法】共為細面，蜜丸。

十六、青島(2)

【处方】人參 黃芪 白朮 當歸 白芍 甘草 陈皮各四兩 远志二兩 熟地八兩 五味子二兩 桂心二兩 茯苓四兩

【制法】共研面，蜜小丸。

十七、沈陽

【功能與主治】補虛生血。主治脾肺俱虛，營養不良，肢體瘦弱，食少作瀉，怔忡不眠，呼吸氣短，腰腿痠軟，氣虛等症。

【处方】白芍三兩 當歸一兩 桂心一兩 炙甘草一兩 陈皮一兩 人參一兩 炒白朮一兩 黃芪一兩 熟地七錢五分 五味子七錢五分 茯苓七錢五分 远志五錢(去心)

【制法】共碾成極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，姜棗水送下。

【禁忌】生冷硬物。

十八、撫順(1)

【处方】人參二兩 熟地二兩 陈皮一兩 远志一兩 白朮二兩 五味五錢 元芪二兩 白芍一兩半 炙甘草一兩 桂心五錢 當歸二兩 白芍二兩

【制法】為細面，蜜丸三錢大。

十九、撫順(2)

【功能與主治】補血強心滋養。主貧血衰弱，營養不良，心悸健忘，寢汗發熱，身倦肌瘦，顏面萎黃，食少無味，或虛脫症。

【处方】白人參二兩 熟地二兩 陈皮一兩 远志一兩 白朮二兩 五味子五錢 黃芪二兩 云苓兩半 制草二兩 桂朮五錢 當歸二兩 白芍二兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服二錢，每日早晚二次，白開水送下。

【禁忌】陰虛火盛者忌服。

二十、吉林、哈爾濱 (養榮丸)

【功能與主治】溫補氣血。主氣血虛弱，營養不足，心悸健忘，寢汗發熱，身倦肌瘦，色枯氣短，或發汗過多，身振脈緩，筋瞤肉惕。

【处方】人参二兩 白朮 炙芪 炙草 陈皮 桂心 酒归 牛蒡各一兩 熟地 五味(炒) 茯苓各七錢 远志五錢 白芍一兩五錢 大棗一兩五錢。

【制法】共为細面，煉蜜为小丸如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢，早午晚一次，白水送下。

【禁忌】陰虛火盛者忌服。

二十一、呼和浩特

【处方】人参 黄芪一斤 当归一斤半 白朮一斤 炙草 肉桂 陈皮各半斤 九地斤半 五味四兩 茯苓 白芍 远志各一斤

【制法】蜜小丸。

附参考古方

【来源】太平惠民和剂局方。(人参养荣汤)

【功能与主治】治积劳虛損，四肢沉滯，骨节酸痛，呼吸少气，行动喘促，小腹拘急，腰背强痛，心虛惊悸，咽干唇燥，飲食無味，陰陽衰弱，悲憂慘戚，多臥少起，久者积年，急者百日，漸至瘦削，五藏气竭，难可振复；又治肺与大肠俱虛，咳嗽下利，喘乏少气，嘔吐痰涎。

【处方】白芍药二兩 当归 桂心(去粗皮) 甘草(炙) 陈橘皮 人参 白朮(煨) 黄耆各一兩 熟地黄(制) 五味子 茯苓各七錢半 远志(炒去心)半兩

【制法】上剉散。

【剂量及用法】每服四錢，水一盞半，牛蒡二片，棗子一枚，煎七分，去滓溫服。便精遺泄，加龙骨一兩，咳嗽加阿膠。

参茸丸(滋补参茸丸)

吉林、哈尔滨

【功能与主治】补气养血，壯阳添精。主气血衰弱，体弱神倦，气短無力，腰膝痠痛，怔忡健忘，自汗暈眩，失眠惊悸，消化不良，溏泄清白，以及腎虛阳痿，遺精滑精等症。

【处方】熟地一兩 龟板 山药 归身各八錢 益智 茯神 元肉 茅朮 牛膝 故紙 枸杞 辰砂各五錢 远志 焦梔 草稍 酒栢 栢仁 棗仁 酒母 山参 鹿茸各三錢 琥珀 貢桂 鑒砂各二錢

【制法】共研为細面，煉蜜为小丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢，早晚空腹服，白水送下。

【禁忌】阳事易举及火盛者忌服；忌食生冷。

参茸百补丸

沈陽

【功能与主治】滋补强壯。主性慾減退，元氣衰弱，憂思過度，傷損精神，盜汗滑精，女子虛勞。

【处方】紅人參 熟地各二兩 五味六錢 山藥一兩 硃寸冬二兩 川斷六錢 芡實八錢 杜仲 远志 金櫻子 柏仁霜各六錢 鹿茸三錢 山萸肉 龟板各一兩 丹皮 澤瀉 云茯苓各六錢 棗仁一兩 白芍 牡蠣 复盆子各六錢

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸，二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，早晚空心用淡鹽水送下。

参茸衛生丸

一、北京、承德

【功能与主治】滋補衰弱，兴奋神經。主身体衰弱，精神不足，食慾不振，夢遺滑精，腰膝痠軟。

【处方】人參 鹿茸 巴戟天 党参 山藥 桑寄生 白芍 蓮子 鎖陽各八十兩 蒼朮 乳香 黑附子各二十兩 川牛膝一百一十二兩 熟地 酸棗仁 甘草 香附 杜仲各一百六十兩 何首烏 麦冬 紅朮 枸杞子 龙骨 肉桂各四十八兩 远志四十兩 复盆子 补骨脂各六十四兩 茯苓 於朮各二百四十兩 沒药十六兩 龙眼肉三百二十兩 琥珀 黃耆各九十六兩 砂仁一百五十二兩 山茱萸 当归各一百二十八兩 紅棗一百七十六兩 肉苁蓉一百六十兩 續斷 沉香各四十八兩 橘皮一百二十兩 生地一百二十兩 木香八十兩 白朮一百六十兩

【制法】續斷，沉香，橘皮，生地，木香，白朮，六味軋粗末，舖晒槽，余者下罐加黃酒四千兩蒸三日夜，与舖槽之羣藥木拌勻，晒干，共为細粉，每十六兩細粉兌。

硃砂三錢六分，煉蜜为丸，重三錢，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。

二、天津

【功能与主治】滋补元氣，兴奋精神。主身体衰弱，气血兩亏，酒色過度，精神不足，筋骨無力，思慮過度，心臟衰弱，腰膝痠疼，夢遺滑精，自汗盜汗，头昏眼花；妇女氣虛血寒，赤白帶下，崩漏不止，腰疼腹疼。

【处方】人參(去蘆)五斤 琥珀六斤 桂元肉二十斤 香附(醋制)十斤 紅棗十一斤 破故紙(鹽炒)四斤 生牡蠣二斤 鹿茸(去毛)五斤 枸杞子三斤 生鹿角十五斤 制乳香二斤 制沒药一斤 秋石二斤 生黄芪六斤 当归八斤 菴蓉(酒蒸)十斤 麦冬三斤 甘草十斤 怀牛膝七斤 鎖陽 蓮子(去心)各五斤 杜仲炭(鹽炒)十斤 生白芍五斤 桑寄生一斤 党参(去蘆)十斤 生龙骨三斤 茯苓(去皮)十五斤 豬鬃子二十条 豬脊髓三十条 河車 鹿尾各一斤十四兩 鮮牛乳四十斤 豬腰子二十对 白酒五十斤 狗脊(沙子燙，去毛)二斤(上藥用黃酒一百斤裝入罐內，或裝入不生鏽的桶，將罐口封固，隔水蒸煮至酒尽为度)炒棗仁十斤 木瓜 黃芩各五斤 牛膝十五斤 山萸肉(酒制)八斤 肉豆蔻(滑石煨)三斤 生地二斤 白朮(麸炒)十斤 制半夏五斤 陈皮二十斤 熟地十斤 紅花四斤 沉香三斤 川芎五斤 續斷三斤 砂仁九斤八兩 炒蒼朮 制首烏各二斤 广木香五斤 远志肉(甘草水制)二斤八兩

【制法】上藥軋成粗末，再和所蒸藥料拌勻晒干，共为細粉，煉蜜为丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

三、上海

【功能与主治】精力亏乏。

【处方】人參一兩 毛鹿茸二兩 沉香 肉桂 茯苓 怀山藥 制首烏 淡菴蓉 鹿角膠各一兩 甘草(炙) 远志(炒)各五錢 杜仲(炒)

巴戟肉 枸杞子各一兩 鹿鞭四兩
黃狗鞭一兩五錢 附子(泡去皮制)五錢

【制法】除鹿角膠外，余藥共研細粉，以鹿角膠烱化加煉蜜為丸，每粒潮重二錢，蜡壳固封。

【劑量及用法】每服一丸，溫開水化服。

四、福州

【功能與主治】治男女各病，諸虛百損。常服身體強健，益壽延年。

【處方】人參 鹿茸各一兩半 茯苓一兩 天生朮一兩半 棗仁一兩 柳桂四錢 枸杞一兩半 杭芍七錢半 炙芪一兩半 化州皮四錢 當歸七錢半 首烏一兩 菟絲一兩半 淮山一兩 炙草四錢 正阿膠一兩

【制法】共研細末，和蜜為丸，每粒重四錢，赤金為衣，外用棉紙包，蜡封固。

五、重慶

【功能與主治】固本扶陽，填精益髓，強智寧神，補氣補血。治元陽虧損，真陽不固，氣血衰憊，諸虛百損。

【處方】人參二兩五錢 川牛膝 杜仲 黨參 枸杞 白芍 棗仁 龍眼肉 蓮子 牡蠣 山藥 肉蓯蓉各六兩 補骨脂 琥珀 鹿角 何首烏 茯苓各二兩 紫河車一具 熟地 山萸各八兩 鹿茸二兩五錢 鹿尾二條 黃芪六兩 牛乳一斤 桑寄生八兩

【制法】除人參、鹿茸另研，牛乳另下，余藥共為細末，煉蜜合牛乳和丸，每重四錢，蜡壳封固，另有小丸。

【劑量及用法】一丸，或二至四錢。

六、昆明

【功能與主治】身體衰弱，精血不足，脾胃不健，神疲體倦。

【處方】洋參二兩 鹿茸一兩 白朮六兩 口芪八兩 天雄 肉桂 香附各二兩 當歸四兩 熟地十兩 茯苓二兩 五味一兩 大芸六兩 遠志 陳皮各二兩 棗仁三兩 杭芍 砂仁各一兩 元肉六兩 人參四兩 枸杞 淮藥各六兩 巴戟四

兩 甘草三兩

【制法】研末，煉蜜為丸，外裝蜡壳。

【劑量及用法】每服一丸，小兒減半，嬰兒量四分之一丸，早晚用開水服。

【禁忌】感冒風寒及一切熱症忌服。

七、蘭州

【功能與主治】滋補身體。主身體衰弱，氣血兩虧，精神不足，筋骨無力，思慮過度，心臟衰弱，消化不良，婦女月經不調，四肢浮腫，腹中痞積。

【處方】牛牡蠣一斤 乳香二斤 沒藥一斤 白芍五斤 元肉二十斤 人參 鹿茸各五斤 牛膝七斤 破故紙四斤 大芸十斤 熟地十二斤 杜仲炭十斤 山萸八斤 枸杞子三斤 茯苓十五斤 大棗十一斤 蓮子五斤 何首烏一斤 鎮陽五斤 炙甘草十斤 桑寄生一斤 秋石二斤 香附一斤 琥珀六斤 龍骨三斤 鹿角霜一斤半 黃芪六斤 紫河車二十具 豬腰子二十個 豬脊髓二十條 鹿尾十個 紅米酒五十斤 牛乳四十斤。

【制法】將前藥共入罐內，蒸透烘乾，再軋細末，蜜丸三錢重，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

八、大同

【功能與主治】男婦氣血衰弱，病後失調，自汗盜汗，一般虛弱症及失眠症。

【處方】人參 鹿茸 棗仁 熟地 於朮各四兩 肉桂八兩 木香一兩 當歸四兩 茯苓 黃芪 山萸 山藥各六兩 遠志 炙草各二兩。

【制法】每一料用桂元肉四十兩，枸杞子十兩熬膏，加煉蜜為丸，每丸四錢重，蜡皮封固。

【劑量及用法】每丸分二次服。

九、濟南

【功能與主治】諸虛百損，真陽不足，氣血衰弱，腰酸腎冷，下部寒涼。

【處方】人參二兩五錢 懷牛膝

杜仲炭 黨參 杞子 白芍 棗仁(炒) 桂元肉 蓮子 牡蠣(煅) 山藥各六兩 故紙 琥珀 鹿角 首烏 云苓各二兩 紫河車一具 熟地 山萸各八兩 鹿茸二兩五錢 鹿尾二條 黃芪六兩 寄生八兩 牛乳一斤 菟蓉六兩

【制法】除人參、鹿茸另研，牛乳另下外，余藥共為細粉，煉蜜為丸，每丸四錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白水送下。

【禁忌】生冷。

十、青島(1)

【處方】人參 鹿茸 川芎各五斤 牛膝七斤 黨參一斤 杜仲 熟地各十斤 杞子三斤 棗仁十斤(炒) 白芍五斤 紅花四斤 元肉二十斤 木瓜 建連 口朮各五斤 肉果三斤 乳香二斤 山萸八斤 沒藥一斤 木香五斤 麥冬三斤 半夏五斤 沉香三斤 陳皮二十斤 桑朮五斤 甘草十斤 龍骨三斤 茅朮二斤 於朮十五斤 生地二斤 菟蓉十斤 首烏二斤 鎮陽五斤 白朮十斤 琥珀六斤 茯苓十五斤 川斷三斤 故紙四斤 香附十斤 寄生一把 秋石二斤 鹿角十五斤 大棗十一斤一兩 河車二十具 黃芪六斤 白酒五十斤 牛乳四十斤 當歸八斤 豬脊髓十條

【制法】共為細末，蜜為丸。

十一、青島(2)

【處方】人參 鹿茸 川芎各四兩 牛膝 黨參各二兩 杜仲八兩 熟地八兩 枸杞子 棗仁各六兩 白芍 紅花各二兩 元肉四兩 木瓜二兩 山萸四兩 麥冬二兩 菟蓉四兩 茯苓六兩 當歸四兩 炙草二兩 遠志四兩 牡蠣 丹皮各二兩 黃芪六兩 硃砂五錢 干姜二兩 豬腰子十個 豬脊髓二十條。

【制法】共軋細面，蜜丸。

十二、青島(3)

【處方】枸杞六兩 菟蓉四兩 熟地八兩 黃芪六兩 干姜 於朮各一兩 茯苓 棗仁各六兩 當歸四兩 甘草二兩 遠志四兩 牡蠣

一兩 山萸四兩 丹皮一兩 杜仲八兩 猪脊髓一兩 猪腰三付 硃砂二錢 鹿茸 人參各四兩

【制法】共研細面，加鹿茸、人參、硃砂，煉蜜為丸，重四錢。

十三、沈陽

【功能与主治】补心腎，壯氣血。主男婦諸虛百損，五勞七傷，四肢困倦。

【处方】人參 杜仲 山萸 茯苓 鹿茸 元肉 鎖陽 杞子 熟地 首烏 杜蠟 於朮 牛膝 鹿尾各一兩 黃芪二兩 琥珀六錢 從蓉一兩一錢 蓮子二兩二錢 沉香四錢 乳八兩 猪腰半個 乳香四錢 白酒 黃酒各一斤

【制法】以上各藥及酒，共入罈內封固，用火煮七天七夜，取出晒干，再碾極細面，煉蜜為丸，三錢重，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】生冷油膩。

十四、呼和浩特

【处方】人參五錢 牛膝八錢 當歸五錢 白朮八錢 枸杞 大芸 五味子 牛膝 杭芍 杜仲各五錢 菟絲子八錢 炙草四錢 附子五錢 肉桂三錢 鹿茸 元肉各五錢

【制法】共為細面，蜜大丸，重四錢，蜡皮封固。

八 珍 丸

一、廣州

【功能与主治】補氣補血。主氣血兩虧。

【处方】黨參十一斤四兩 川芎 白芍(酒炒) 白朮 當歸各九斤六兩 炙草二斤十二兩 熟地十二斤 茯苓七兩半

【制法】共研細粉，每料用蜜糖八十斤煉為小丸。

【剂量及用法】白開水送服，每次服一錢。

二、福州(局方八珍丸)

【功能与主治】治氣血兩虛，調和陰陽，腰膝痠軟，脾胃損傷，精神

衰弱等症。

【处方】人參 白朮 茯苓各二兩 炙甘草一兩 熟地 當歸各三兩 川芎一兩 芍藥二兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

三、南昌

【功能与主治】氣血兩虧，神疲肢倦，面色萎黃，食少內熱，婦女月經或前或后，及外症潰膿，久而不斂。

【处方】正黨參二兩 白朮(土炒)二兩 云苓二兩 炙甘草一兩 酒當歸二兩 熟地黃二兩 白芍二兩 川芎一兩五錢

【制法】共研細末，姜棗煎湯，蜜為丸如梧桐子大。

【剂量及用法】每服一錢，用溫開水或米湯送下。

【禁忌】風寒外感忌服。

四、昆明

【功能与主治】病后失調，兼治月經不和。

【处方】黨參一兩五錢 白朮一兩 茯苓一兩一錢 炙甘草五錢 川芎五錢 當歸一兩五錢 熟地一兩五錢 杭芍(酒炒)一兩

【制法】研末，煉蜜為丸。

【剂量及用法】每服一丸(水丸每服二錢半)，幼童減半，用開水早晚各服一次。

【禁忌】感冒溫暑燥熱忌服。

五、蘭州

【功能与主治】補氣血，和脾胃。主氣血不足，身體衰弱，食慾不振。

【处方】黨參一兩 白朮一兩 云苓一兩 當歸一兩 熟地一兩 川芎七錢 杭芍七錢 炙草七錢 六袖七錢

【制法】共為細末，蜜為小丸。

【剂量及用法】每服一錢，開水送下。

六、大同

【功能与主治】氣血兩虛，精神短少。

【处方】黨參六錢 白朮 茯苓各二錢 炙草二錢 當歸四錢 川芎 白芍各二錢 熟地四錢

【制法】蜜丸二錢重。

【剂量及用法】早晚服一丸。

七、青島

【处方】熟地 川芎 當歸 白芍各四兩 人參三兩 白朮四兩 茯苓 甘草各一兩

【制法】共軋面，蜜丸重二錢。

八、呼和浩特

【处方】人參二兩 茯苓 白朮 當歸 杭芍各四兩 九地八兩 川芎二兩 甘草一兩五錢

【制法】共為細面，蜜大丸，重二錢五分。

並補兩天丸 (兩天丸)

哈 爾 濱

【功能与主治】溫補脾腎。治脾腎虛弱，納少清泄，夢遺滑精，陽痿不舉，腰腿痠痛，氣短心跳，四肢清冷，神倦面蒼。

【处方】橘紅二兩 牛膝二兩 白朮四兩 砂仁二兩 黃肉二兩半 龍骨一兩半 蓮肉二兩 鹿膠四兩 木瓜二兩半 人參一兩 枸杞 白茯苓各二兩半 藿香二兩 杜仲二兩半 山藥二兩 川附一兩

【制法】共碾為細面，煉蜜為小丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢，每日服三次，白開水送下。

【禁忌】忌食生冷；戒房事。

龟鹿固本丸

沙 市

【功能与主治】補養精血，固精益腎。

【处方】熟地二兩 蓮米四兩 丹皮一兩五錢 棗皮二兩 淮藥一兩 川牛膝 當歸各一兩 遠志一兩 枸杞二兩 澤瀉一兩 白芍二兩 甘草 鹿膠各一兩 龜膠二兩

【制法】共研細末，用金銀石斛四兩煎水，煉蜜為丸。

【剂量及用法】每次服二錢，淡鹽開水下，日服二次。

【禁忌】如濕熱體質而精血不虛者忌服。

龙 虎 丸

天 津

【功能与主治】扶虛養氣，補血

化痰。主身体衰弱，劳伤失血，痰中帶血，气虚咳嗽，心跳气短，自汗盗汗，不思饮食，精神疲倦，久病失調。

【处方】制龙骨八兩 煅龙骨 生地各四兩 元肉八兩 川芎 故紙(鹽炒) 砂仁 广木香 菟絲子各四兩 川牛膝二兩 疾藜(鹽炒) 黄芩各四兩 甘草 浙貝母 神曲(麸炒)各二兩 貫仲四兩 木通 生石膏 桔梗各二兩 炒棗仁 山楂 陈皮 杜仲炭(鹽炒) 防風各四兩 共二十五味，計五斤十四兩。

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，鮮藕煎汁送下；白开水亦可。

【禁忌】忌食辛辣、油膩；禁房事。

补血退黄丸

南 京

【功能与主治】主貧血黃腫，四肢痠軟，心悸头眩，气短气脹，食慾失常等症。

【处方】針砂四兩(用醋煨透三次) 茵陈一兩(煮汁) 皂矾二兩(煨透燒至紅色) 澤瀉一兩 大麦芽二兩 茯苓一兩 蒼朮一兩 广皮一兩 厚朴一兩 熟地一兩 大棗八兩(去皮核) 肉桂四錢

【制法】共研極細末，將大棗煮爛，去皮核打成泥，兑入茵陈汁，酌加煉蜜为丸，每錢約二十粒。

【剂量及用法】每服二錢，一日二次，食前用开水吞服。

黃 腫 丸

福 州

【功能与主治】治男妇气血兩虛，骨蒸夜热，手足酸楚，头目暈眩，大便溏瀉，形容枯瘦，黃腫等症。

【处方】西党参 熟地 当归各一兩 川芎 怀牛膝 陈皮各五錢 紅花一錢 澤瀉四錢 茯苓一兩 甘草五錢 皂矾二錢 針砂二兩 車前八錢 烏棗 面粉各四兩 白朮八錢 白芍二錢 黑豆一兩 糯米八兩

【制法】共研細末，烏棗、糯米粉

为小丸。

滋 补 丸

禹 县

【功能与主治】壯阳种子。治气血双亏，身体虛弱，腰膝痠軟，咳久痰喘，妇女血虛。

【处方】熟地十斤 生地 川芎 巴戟天 續斷各二斤 清鹽一斤 胡蘆巴 楮實子 当归 白茯苓 枸杞子 党参 防皮 怀牛膝 鎖陽 肉苁蓉 复盆子 麦冬 天冬 辽五味 杜仲炭 黄氏 甘草 破故紙 小茴香 芡实 山藥 土白朮 菟絲子各二斤 川椒一斤

【制法】共为細面，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下。

【禁忌】火热实证者忌用；小兒不用。

【备考】有效期間一年。

益气健中丸

呼 和 浩 特

【处方】黃芪 党参各二斤 於朮 茯苓 訶子各四兩 米芩八兩 升麻 甘草 肉桂各二兩

【制法】共为細面，蜜大丸。

黑归脾丸

一、上 海

【功能与主治】食少倦倦，血虛發熱，惊悸少寐。

【处方】熟地 黃芪(炒) 茯苓 党参 白朮(炒)各四兩 当归身(酒炒)二兩 酸棗仁(炒)四兩 远志(炒)二兩 甘草(炙) 广木香各一兩

【制法】共研細粉，用紅棗六兩(去皮核)、桂圆肉四兩煮爛打和，用生薑四兩煎湯打糊为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服三錢，溫开水送服。

二、杭 州

【功能与主治】治思慮過度，气血兩亏，体力衰弱，神倦不寐，惊悸盗汗，怔忡健忘，傷風便血，久瘧久

痢等症。

【处方】路党参 炙黃芪各二兩 炙甘草五錢 炒冬朮二兩 一个当归一兩 大熟地 白茯苓各二兩 远志肉一兩 桂圆肉 炒棗仁各二兩 广木香五錢 大棗(去核)二兩

【制法】共研細末，將枳实、人參煮熟打爛，加生薑湯和煉蜜为丸，或棗煎湯泛丸。

【剂量及用法】每服四錢，開水送下。

保 身 丸

武 汉

【功能与主治】精神疲倦，腰痠肢軟，虛煩盜汗，心悸不寧。

【处方】党参二兩 杜鵑 炙黃芪二兩 巴戟天四兩 当归三兩 龙骨二兩 甘草一兩 杜仲 补骨脂各二兩 續斷二兩 菟絲子四兩 川芎 益智仁各二兩 枸杞子四兩 酸棗仁二兩 淮牛膝 杭白芍各二兩 远志四兩 白朮二兩 广防皮一兩 云茯苓二兩

【制法】小丸——取1药进行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜50~52%，迭成小丸，每錢不得少于二十五粒。大丸——加煉蜜115~125%，和成大丸，每丸重二錢。

【剂量及用法】每服二錢，白开水送下。

归 脾 丸

一、北京、承德

(人参归脾丸)

【功能与主治】滋養安神健胃。主神經衰弱，健忘失眠，食少嗜臥，惊悸怔忡。

【处方】人參(去蘆) 木香 甘草 酸棗仁 白朮 当归 茯苓 黃耆各一百六十兩 远志 龙眼肉各四十兩

【制法】共为細粉，煉蜜为小丸。

【剂量及用法】每服三錢，溫开水送下。

二、天津、蘭州

(人参归脾丸)

【功能与主治】滋養健胃。主精神衰弱，心悸不眠，气血亏損，四

肢無力。

【处方】党参二兩 当归 黄芪
九肉各一兩四錢 远志五錢 茯神
棗仁各一兩四錢 甘草一兩八錢
广木香四錢 白朮一兩四錢

【制法】共研細末，蜜为丸。

【剂量及用法】每次服三錢，日服兩次，白开水送下。

三、南京(养血归脾丸)

【功能与主治】滋养补益。上操
劳过度，疲倦健忘，食慾不振，怔忡
少寐，崩漏便血等症。

【处方】西党参二兩 西当归一
兩 炙黄芪二兩 远志肉一兩 白
茯苓二兩 广木香五錢 炒白朮二
兩 炒甘草五錢 酸棗仁二兩

【制法】共研細末，用大棗二兩
与龙眼肉二兩鲜生薑一兩同煮，去
薑不用，將棗去皮核和龙眼肉煮爛
杵泥，酌加煉白蜜为丸，每錢約做二
十粒。

【剂量及用法】每服二錢，一日
二次，早晚开水吞服。

四、武汉

【功能与主治】食少体倦，大便
下血，惊悸失眠，怔忡健忘及妇科崩
漏。

【处方】党参五錢 白朮一兩
(土炒) 酸棗仁一兩(炒熟) 桂元
肉一兩 黄耆一兩(蜜炙) 木香五
分 炙甘草二錢半 茯苓一兩 紅
棗肉二錢 当归一兩 远志五錢

【制法】小丸——先取紅棗煮爛
去核，同桂元肉搗泥拌茯苓，再同群
药烘干，混合碾細，照淨粉量加煉蜜
45~48%，迭成小丸，每錢不得少于
二十五粒。大丸——加煉蜜100~
105%和成丸，每丸重为二錢。

【剂量及用法】每服一至二錢。

五、广州

【功能与主治】神經衰弱，消化
不良，失眠健忘。

【处方】黄芪一兩半 白朮七分
木香四分 当归 远志 党参各一
錢 茯苓二錢 元肉 棗仁各一錢
甘草二分

【制法】洗净切碎，隔水蒸透，晒
干研为細末，拌蜜糖成小丸。

六、福州(1)

【功能与主治】治思虑伤脾，不

能攝血，致血妄行，或健忘怔忡，惊
悸盜汗，嗜臥少食，或大便不調，心
脾疼痛，瘡癤郁結，或因病用藥失
宜，尅伐伤脾以至变症者，最宜用
之。

【处方】人参 黄芪 白朮 茯
苓 棗仁各二兩 远志 当归各一
兩 木香 炙甘草各五錢 龙眼肉二
兩

【制法】共研細末，蜜煉为丸。

七、福州(2)

(白归脾丸)

【功能与主治】治思虑过度，劳
伤心脾，怔忡健忘，惊悸盜汗，發熱
体倦，食少不眠，或脾虛不能攝血及
妇人經帶崩漏等症。

【处方】人参 白朮(土炒) 茯
苓 棗仁 龙眼肉各二錢 炙黄芪
一錢五分 当归(酒洗) 远志各一
錢 木香 炙甘草各八分

【制法】共研細末，水泛为丸。

八、杭州(济生归脾丸)

【功能与主治】治思虑过度，劳
伤心脾，怔忡健忘，惊悸盜汗，發熱
体倦，食少不眠，胸腹虛痛等症。此
丸調气舒脾，和暢血脉，可以常服。

【处方】路党参二兩 炙黄芪二
兩 广木香五錢 炒冬朮二兩 全
当归一兩 桂圓肉二兩 白茯苓二
兩 炒棗仁二兩 大棗(去核)二兩
炙甘草五錢 远志肉一兩

【制法】共研細末，以桂圓大棗
煮熟打爛，加生姜湯和煉蜜为丸，或
姜棗煎湯泛丸。

【剂量及用法】每服二至四錢，
开水送下。

九、南昌

【功能与主治】心脾氣虛，怔忡
健忘，惊悸盜汗，少气懶言，嗜臥少
食，大便下清稀血水，及妇人經帶崩
漏，或病后精神不振。

【处方】炙黄芪一兩五錢 龙眼
肉二兩 炒棗仁二兩 茯神二兩
炒白朮二兩 党参二兩 紅棗肉二
兩 生姜一兩 炙甘草五錢 广木
香五錢 远志肉一兩 当归身(酒
洗)一兩

【制法】共研細末，先用龙眼肉、
棗肉煮爛搗泥，加煉蜜为丸，如梧桐
子大。

【剂量及用法】每服三錢，日服
兩次，白开水送下。

【禁忌】血虛肝熱，煩躁不眠，咽
干喉痛，能食善消，大便秘結，糞如
羊屎者忌服。

十、沙市

【功能与主治】治思虑过度，怔
忡健忘，惊悸不寐，貧血体倦，腸風
下血及妇人血虛發熱崩漏等症。

【处方】蜜炙黄耆二兩 土炒白
朮二兩 茯神二兩 党参二兩 远
志一兩 广木香五錢 棗仁二兩
甘草五錢 当归二兩 桂圓肉二兩

【制法】諸药研細末，蜜丸。

【剂量及用法】每服二錢，日服
二錢，溫开水下。

【禁忌】体实充血而發炎者忌
服。

十一、重庆

【功能与主治】治憂思伤脾，血
虛發熱，食少体倦，或脾虛不能攝
血，以致妄行吐下，或健忘怔忡，惊
悸不寐，或心脾作痛，自汗盜汗，或
肢體腫痛，大便不調，經期不准，妊
娠結郁伤脾等症。

【处方】当归一兩 党参二兩
茯苓二兩 炙黄芪二兩 土炒白朮
二兩 龙眼肉二兩 酸棗仁二兩
广木香五錢 炙甘草五錢 远志五
錢 大棗(去核)五錢

【制法】共研細末，煉蜜和姜汁
和丸。

【剂量及用法】三錢。

十二、昆明

(归脾养心丸)

【功能与主治】治血下血，健忘
惊悸，睡眠不足，自汗盜汗，食少等
症。

【处方】党参十五兩 白朮二十
兩 茯苓十五兩 棗仁二十兩 元
肉二十兩 炙口芪十五兩 当归十
兩 炙远志五兩 广木香三兩 炙
甘草五兩

【制法】研末，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服一丸(水丸
二錢半，幼童減半，用开水早晚各服
一次。

【禁忌】感冒及溫暑燥熱各症忌
服。

十三、西安

【功能与主治】主思虑过度，劳伤心脾，怔忡健忘，惊悸盗汗，发热体倦，食少不眠，或脾虚不能摄血，致血妄行及妇人经带等症。

【处方】人参 白朮(土炒) 茯苓 棗仁 龙眼肉各二兩 炙黄芪一兩五錢 当归酒洗 远志各一兩 木香 炙甘草各五錢

【制法】共为細末，用姜棗及龙眼肉煮爛，共打为丸。

【剂量及用法】每服三錢，开白水送下。

【禁忌】热性病禁用。

十四、济南

【功能与主治】食少体倦，健忘怔忡，惊悸，少寐，大便下血及妇科崩漏。

【处方】党参 酸棗仁 黄耆各四兩 广木香 炙草各二兩 茯神 远志 龙眼肉 白朮 当归各八兩

【制法】共为細末，煉蜜为小丸，梧桐子大。

【剂量及用法】每服三錢，生薑大棗湯送下，白开水亦可。

【禁忌】生冷食物。

十五、青岛(1)

【处方】人参 当归 白朮 棗仁 茯神 远志 黄芩 木香 甘草

【制法】共为細面，蜜小丸。

十六、青岛(2)

【处方】人参五斤 棗仁 黄芪各十斤 木香五斤 白朮 香附 茯苓 陈皮 当归各十斤 远志二斤半 甘草五斤

【制法】共为細面，蜜丸。

十七、沈阳

(人参归脾丸)

【功能与主治】引血归經，强心健腦。主治思虑过度，血液妄行，怔忡健忘，腸風下血，經血崩漏，惊悸盗汗，嗜眠食減，飯后倦怠，心胃虛痛，病后身弱，过劳疲憊。

【处方】炒白朮 制黄芪 茯神 人参 当归 炒棗仁各二兩 远志五錢(去心) 木香 炙甘草各一兩 龙眼肉二兩 陈皮一兩

【制法】共碾成細面，蜜丸二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，空心白开水送下。

【禁忌】生冷硬物。

十八、抚顺

(人参归脾丸)

【功能与主治】补气健脾，养血安神。主气血虛弱，精神倦怠，头目眩暈，气短形消，納少自汗，筋骨痠軟，或發汗太过，冷汗如油，气短冰冷，气陷阳脫。經血崩漏，脾不攝血，气不升提，或因閃挫經崩，或漏久而不止，气短面蒼，心跳泛嘔，头晕自汗，气随血脫。失眠健忘，怔忡惊悸，思虑过度，心脾受伤，失眠不寐。便血，先便后血，名远血症，緣由脾虛，久服自止。瘡瘍不斂，瘡瘍轉陰，久不收口，縮口青紫。

【处方】白参 当归各二兩 白朮 茯神 远志各六兩 棗仁一兩 元肉四兩 广木香二兩 黄芪六兩 制草二兩 大棗三兩

【制法】共为細面，蜜丸二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，重症二丸，大棗水送下。

【禁忌】内有痰火者忌服；忌食腥冷。

十九、吉林、哈尔滨

(人参归脾丸)

【功能与主治】补气健脾，养血安神。主治：

(1) 气血虛弱，精神倦怠，头目眩暈，气短形消，納少自汗，筋骨痠軟，或發汗太过，冷汗如油，气短冰冷，气陷阳脫。

(2) 經血崩漏，脾不攝血，气不升提，或受閃挫，經崩或漏，久而不止，气短形消，心跳泛嘔，头晕自汗，气随血脫。

(3) 失眠健忘，怔忡惊悸，思虑过度，心脾受伤，失眠不寐，寐而惊觉，健忘恍惚，怔忡志忒，惊悸心跳。

(4) 便血，先便后血，名远血症，緣由脾虛，久服自止。

(5) 瘡瘍不斂，瘡瘍轉陰，久不收口，膿清塌陷，縮口青紫。

【处方】黄芪(炒)二兩 当归(酒洗)一兩 白朮(土炒)二兩 人参二兩 炙草五錢 茯神二兩 远

志(去心)一兩 棗仁(炒)二兩 青木香五錢 元肉二兩 鮮姜五錢 大棗二兩

【制法】共为細面，煉蜜为二錢重丸。

【剂量及用法】每服一丸，重症二丸，大棗湯为引，日三次。

【禁忌】内有痰火者忌服；忌食腥冷。

二十、呼和浩特

(人参归脾丸)

【处方】人参 白朮 茯神 棗仁 黄芪 当归 远志 元肉各四斤 木香一斤 炙草二斤

【制法】共为細面，蜜小丸。

附参考古方

【来源】济生方(归脾湯)。

【功能与主治】治思虑过度，劳伤心脾，健忘怔忡。

【处方】白朮 茯苓(去木) 黄耆(去蘆) 龙眼肉 酸棗仁(炒、去壳)各一兩 人参 木香(不見火)各半兩 甘草(炙)二錢半

【制法】上咬咀。

【剂量及用法】每服四錢，水一盞半，生薑五片，棗一枚，煎至七分，去滓溫服，不拘时候。

补益丸(子午丸)

沈 陽

【功能与主治】鎮靜安神。主心腎俱虛，夢寐惊悸，体弱自汗，煩悶气短，憂郁不爽。

【处方】榧子二兩 蓮肉 枸杞子 白龙骨 巴戟 破故紙 琥珀 枳实 白朮 赤茯苓 白茯苓 蓮心 芡实 牡蠣 文蛤各一兩 硃砂一兩五錢

【制法】除琥珀、硃砂另研外，余則共碾極細面，用肉蓯蓉一斤八兩酒蒸杵爛为膏，合煉蜜为丸，二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，空心白开水送下。

【禁忌】忌过度劳累及房事。

妙香丸

沈 陽

【功能与主治】补心固腎，鎮靜安神。主元气不足，心悸不穩，惊恐怯弱，喜怒不常，夜多盗汗，头目暈

眩，夢遺滑精。

【处方】茯苓一兩 茯神 人參 杞梗 甘草各五錢 薯蕷一兩 硃砂三錢(另研) 麝香一錢(另研) 木香一錢五分

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，早晚空心服，白開水送下。

柏子養心丸

一、北京、承德

【功能與主治】滋補氣血，強心安神。主心血虧損，精神恍惚，怔忡驚悸，失眠健忘。

【處方】柏子仁二錢五分 黃耆一兩 茯苓二兩 酸棗仁二錢五分 川芎 當歸 半夏各一兩 甘草一錢 人參(去蘆) 肉桂 五味子 遠志各二錢五分

【制法】共為細粉，煉蜜為小丸，硃砂為衣。

【劑量及用法】每服三錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌思慮勞累。

二、天津(柏子養心丹)

【功能與主治】強心補血，養氣安神。主心臟衰弱，精神恍惚，失眠健忘，夜多怪夢。

【處方】熟地 元參(去蘆)各二兩 當歸一兩 枸杞子三兩 菖蒲 麥冬 茯苓(去皮)各一兩 甘草五錢 柏子仁四兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，三錢重，每斤丸藥用硃砂面二錢上衣，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

三、上海

【功能與主治】失眠心悸，口舌干燥。

【處方】柏子仁 茯苓 生地各二兩 五味子五錢 甘草(炙)四錢 當歸身 酸棗仁各二兩 犀角五錢 黃芪二兩

【制法】共研細粉，煉蜜為丸，如梧桐子大，硃砂五錢為衣。

【劑量及用法】每服三錢，溫開水送服。

【禁忌】便溏者忌服。

四、南京

【功能與主治】滋腎養心。主怔忡怔忡，失眠健忘。

【處方】柏子仁四兩(蒸晒去壳) 西當歸一兩(酒浸) 枸杞子二兩 石菖蒲一兩 大熟地二兩(酒蒸) 白茯苓一兩 黑元參二兩 粉甘草五錢 麥門冬一兩(去心)

【制法】先將熟地，柏子仁蒸制後，放于石臼內和余藥搗碎、晒干研末，加煉蜜為丸，每錢約做二十粒。

【劑量及用法】每服三錢，一日一次，臨臥時開水吞服。

五、武漢

【功能與主治】心血虧損，神志不寧，精神恍惚，夜多怪夢，怔忡驚悸，健忘遺泄。

【處方】柏子仁四兩(去油) 枸杞子二兩(酒洗，研) 麥冬(去心) 當歸 石菖蒲 茯神各一兩 玄參 熟地各二兩(酒蒸) 甘草五錢

【制法】小丸——先將柏子仁、熟地蒸過，在石器內搗如泥，取余藥進行干燥，研細，混合均勻，加煉蜜30—35%，迭成小丸，每錢不得少于二十粒。大丸——加煉蜜70—75%，和成大丸，每丸重為二錢。

【劑量及用法】每服一錢，日服二次，溫開水送下。

六、南昌

【功能與主治】健忘失眠，怔忡怔忡，精神不安。

【處方】茯神 石菖蒲 當歸(酒浸) 麥冬 枸杞(酒洗晒)各一兩 柏子仁二兩 甘草五錢 熟地 元參各二兩

【制法】先將柏子仁、熟地蒸過，石器內搗如泥，余藥研面和勻，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，早晚用燈心湯送下。

【禁忌】有外感者忌服；忌食辛辣及生痰動火之物。

七、重慶、福州

【功能與主治】寧心定志，補腎滋陰。治勞慾過度，心血虧損，精神恍惚，夜多怪夢，怔忡驚悸，健忘遺泄。

【處方】柏子仁四兩 枸杞二兩

補 益 藥

麥冬 當歸 石菖蒲 茯神各一兩 玄參 熟地各二兩 甘草五錢

【制法】共碾細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每早晚用三錢，燈心湯下；或杜圓湯下。

八、昆明

【功能與主治】心血虧損，精神恍惚，睡眠不足，津液不足。

【處方】柏子仁 茯苓 棗仁 生地 當歸各四兩 五味一兩六錢 硃砂四兩 甘草二兩 口芪 黨參各四兩

【制法】煉蜜為丸，硃砂為衣。

【劑量及用法】每服一丸，幼童減半，用開水早晚各服一次。

【禁忌】感冒風寒忌服。

九、蘭州(柏子養心丹)

【功能與主治】強心、補血、安神。主心臟衰弱，貧血，記憶衰退失眠，盜汗遺精。

【處方】柏子 熟地 元參各二兩 當歸一兩 枸杞子二兩 柯子四兩 菖蒲 麥冬 茯神各一兩 炙甘草五錢

【制法】以上共為細末，煉蜜為小丸，硃砂衣。

【劑量及用法】每次服三錢，白開水送下。

十、大同(柏子養心丹)

【功能與主治】精神短少，夜不安眠，心神恍惚。

【處方】茯神 茯苓 當歸 生地各二斤 炙芪一斤一兩 遠志一斤七兩 川芎 柏子仁 棗仁各一斤六兩 半夏一兩三兩 黨參 炙草各九兩六 五味子 硃砂各一斤半

【制法】共為細面，蜜為丸，硃衣。

【劑量及用法】每服三錢。

十一、濟南

【功能與主治】怔忡驚悸，失眠健忘。

【處方】白茯苓 茯神各一兩五錢 肉桂 黨參各一兩 炙黃芪一兩五錢 遠志一兩 川芎一兩五錢 柏子仁一兩 炙甘草五錢 五味子一兩 當歸一兩五錢 棗仁一兩 半夏一兩五錢

【制法】共为細末，煉蜜为小丸，梧桐子大，硃砂为衣。

【剂量及用法】每服三錢，白开水送下。

【禁忌】忌生冷食物，戒思虑劳慾过度。

十二、青 島

【处方】茯神 茯苓 当归 生地 炙芪 远志各一兩二 川芎 杞子一兩八 半夏二兩四 棗仁二兩八 人參 五味子各一兩 甘草二兩

【制法】共研細末，蜜小丸。

十三、沈 陽

【功能与主治】强心安神。主劳慾过度，精神恍惚，夜多怪夢，怔忡惊悸，心血亏损，健忘遺精。

【处方】柏子仁二兩 枸杞三兩 菖蒲二兩 麦冬 茯神 熟地黄 当归 远志 玄参 酸棗仁 制甘草各一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸，二錢重，硃砂为衣。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下。

【禁忌】忌食生菜菹。

十四、撫 順

【功能与主治】安神定志，生津止渴。主气血虛弱，惊悸不安，夜臥不宁，怔忡心跳，口干舌燥，心神苦悶，头暈倦怠。

【处方】柏子六兩 寸冬 茯神各四兩 元参二兩 节菖蒲 杞子 熟地 甘草各二兩 当归四兩

【制法】共为細面，蜜丸二錢重。

【剂量及用法】每服二錢，早晚服，白水送下。

【禁忌】辛辣。

十五、呼 和 浩 特

(柏子养心丹)

【处方】茯苓 茯神 全归 生地各四斤 炙芪 远志各三斤四兩 川芎 杞子 棗仁各二斤十二兩 半夏六兩 人參二斤 炙草一斤二兩 五味子一斤

【制法】共为細面，蜜小丸，硃衣。

硃砂安神丸

一、北 京、承 德

【功能与主治】养心安神。主神經衰弱，虛煩惊悸，失眠怔忡，記憶減退。

【处方】硃砂五錢(一半为衣) 黃連一錢 甘草二錢五分 熟地三錢 生地二錢 当归五錢 生黃耆 酸棗仁各一兩 牛龙齿六錢 茯苓五錢 柏子仁一兩 远志五錢 共十二味，計六兩四錢五分。

【制法】共为細粉，煉蜜为小丸，用方內硃砂二錢五分为衣。(承德大丸二錢重)

【剂量及用法】每服二錢，日服二次，溫开水送下。(大丸每服一丸)

【禁忌】孕妇忌服。

二、天 津

【功能与主治】鎮靜安神。主神經衰弱，失眠心跳，思虑过度，記憶不强。

【处方】当归 生白芍 川貝 炒棗仁各二兩 生地二兩 陈皮 麦冬各一兩五錢 黃連四錢 茯苓(去支) 兩五錢 甘草五錢 川芎一兩五錢 远志肉(甘草水制)五錢

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，二錢重，每斤丸药用硃砂面一錢上衣，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，白开水送下。

三、上 海

【功能与主治】头暈气浮，寤寐不安。

【处方】生地(酒炒)五兩 黃連(酒炒)一兩五錢 当归身 硃砂各一兩 甘草(炙)五錢

【制法】先將生地打爛和黃連、当归身及甘草搗和，焙干，研成細粉，硃砂一半和人，加蜜为丸，如梧桐子大，另一半硃砂为衣。

【剂量及用法】每服三錢，临臥时溫开水送服。

四、南 京

【功能与主治】鎮靜安眠。主怔忡，失眠，心乱，煩热，多夢不安。

【处方】川黃連一錢五分 西当 归一兩五錢 飞硃砂各一錢(酌留

为衣) 炙甘草五分

【制法】共研細末，加煉白蜜为丸，每錢約做二十粒，硃砂为衣。

【剂量及用法】每服一錢至二錢，一日一次，临臥时开水吞服。

五、杭 州

【功能与主治】治血虛肝旺，神煩乱，惊悸健忘，夜不安床，懊惱时作，怪夢頻多等症。

【处方】黃連兩半 当归头 大生地各一兩 炙甘草五錢 飞硃砂一兩(一半和人，一半为衣)

【制法】共研細末，熟餅糊为丸，硃砂为衣。

【剂量及用法】每服錢半至二錢，临臥灯心湯送下。

六、南 昌

【功能与主治】惊悸健忘，心神顛倒，怔忡失眠，兀兀欲吐，胸中气乱而热，有似懊惱之狀。

【处方】生地 当归头各一兩 炙甘草五兩 黃連(酒洗)一兩五錢 飞硃砂(留一半为衣)一兩

【制法】共研細末，煉蜜为丸，如梧桐子大，方內留硃砂为衣。

【剂量及用法】日服二次，每服一錢，溫开水送下。

【禁忌】忌食辛辣、烟、酒。

七、重 庆 (1)

【功能与主治】心經血虛，心乱煩热，头暈气浮，惊悸怔忡，心神顛倒，欲吐不吐，睡眠不安，胸中气乱，神志懊惱等症。

【处方】黃連一兩五錢 炙甘草五錢 生地黃 当归 硃砂各一兩

【制法】硃砂另研，余药共研細末，煉蜜为丸，硃砂穿衣，紙盒包裝。

【剂量及用法】一至二錢。

八、重 庆 (2)

(东垣硃砂安神丸、黃連安神丸)

【功能与主治】治心神煩乱，發热怔忡不寐，或寐中惊悸等症。

【处方】生地 硃砂(为衣)另飞 当归各一錢 甘草五分 黃連一錢半

【制法】共为末，湯浸餅蒸和蜜为丸，黍米大。

【剂量及用法】每服十五丸或二十丸，津液嚥之；或食后用溫开水送

下。

九、昆明

【功能与主治】健忘怔忡，眠不穩。

【处方】生地二兩 硃砂一兩
当归二兩 甘草一兩 云連五錢
路党參 茯神各三兩 炙远志二兩
淮棗仁三兩 益智仁二兩

【制法】研末煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服一丸，水丸
每服二錢半，用开水早晚各服一次。

【禁忌】感冒忌服。

十、西安

【功能与主治】有强壯、补血、鎮靜中樞神經之功效，主治輕性貧血，腦貧血，神經過敏，精神不安，心悸亢进，心神煩乱不安，苦悶不眠等病症。

【处方】硃砂二錢五 当归五錢
炙草二錢五 黃連五錢 生地錢半

【制法】共研細粉，煉蜜成丸，硃砂加衣，每丸重二錢。

【剂量及用法】每服一丸，日二、三服，小兒減半，灯心煎湯送下。

【禁忌】因消化不良，胃部嘈杂，有似煩悶而怔忡不安，或不眠等症忌服。

十一、南州

【功能与主治】鎮靜安神，清热化痰。主神經衰弱，失眠心跳，思慮過度。

【处方】当归 白朮 川貝各二兩
川芎 茯神各一兩五錢 棗仁二兩
生地三兩 桔梗一兩五錢
远志五錢 麦冬一兩 川連四錢
甘草五錢

【制法】將藥軋細面，蜜小丸，硃砂为衣。

【剂量及用法】每服三錢，开水送下。

十二、大同

【功能与主治】心神恍惚，心血不足，夜不安眠。

【处方】党參 茯神 茯苓 栝子仁 炒远志 炒棗仁 当归各一兩
琥珀 菖蒲 川連各五錢

【制法】共为細面，煉蜜为丸，硃砂为衣。

【剂量及用法】每服三錢。

十三、济南

【功能与主治】惊悸健忘，怔忡失眠。

【处方】硃砂五錢(研水飞，一半为衣) 生地黃 黃連(酒洗，去鬚) 甘草各五錢五分(炙) 当归二錢五分

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，栝子仁，硃砂为衣。

【剂量及用法】每服三錢，日服二次，溫开水送下。

【禁忌】辛辣食物。

十四、青島

【处方】生地 当归 白芍 茯神 麦冬 陈皮 川貝各二兩 远志 川芎各一兩四錢 棗仁 川連 甘草各一兩

【制法】共研面，蜜小丸，硃砂衣。

十五、沈陽

【功能与主治】鎮靜安神。主惊悸怔忡，寤寐不安，心中煩躁，头眩失眠，心慌心跳，倦怠無力。

【处方】硃砂(另研) 黃連各五錢 生地黃三錢 当归 甘草各二錢

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸，二錢重，硃砂为衣。

【剂量及用法】每服一丸，临睡时白开水送下。

【禁忌】油腻。

十六、撫順(安神丸)

【功能与主治】清热，鎮靜，安神。主惊悸語無倫次，阳癇卒然倒地，昏迷不省，吐沫抽搐，移时自起，神經刺激太深發为狂癲，叫罵奔走，神經錯乱，不分亲疎，哭笑無定，憂郁欲死。

【处方】硃砂一兩 酒黃連兩半 生地五兩 当归二兩 甘草五錢 白參 白朮 茯神 棗仁各一兩 寸冬八錢

【制法】共为細面，蜜丸二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，一日三次，白水送下。

【禁忌】忌食辛辣及有刺激性食物。

十七、吉林、哈尔滨 (安神丸、琥珀安神丸、 珠珀安神丸)

【功能与主治】清热鎮靜，安神宁智。主惊悸，阳癇，精神病。

【处方】橘紅 远志 云連 棗仁 云苓 川貝 生地 寸冬 当归 甘草 硃砂各五錢

【制法】共碾細面，硃砂另研，煉蜜为二錢一分重丸，硃砂为衣。

【剂量及用法】每服一丸，日服三次，姜水送下。

【禁忌】忌食辛辣及有刺激性食物。

十八、呼和浩特

【处方】生地 白芍 当归 茯神 麦冬 陈皮各三斤 川貝三斤 远志 川芎各三斤四兩 棗仁 黃連 炙草各一斤半

【制法】共为細面，蜜小丸，硃衣。

附参考古方

【来源】1. 内外伤辨惑論。

【处方】硃砂五錢(另研水飞为衣) 甘草五錢五分 黃連(去鬚淨，酒洗)六錢 当归(去蘆) 生地黃各二錢五分

【制法】上件除硃砂外，四味共为細末，湯浸蒸餅为丸，如黍米大，以硃砂为衣。

【剂量及用法】每服十五丸或二十丸，津唾嚥下，食后，或溫水、凉水少許送下亦得。

2. 增补寿世保元。

【功能与主治】心煩懊憹，惊悸怔忡，胸中气乱，此血虛而火盛也。

【处方】硃砂(另研水飞过)五錢 当归(酒洗)二錢五分 生地黃(酒洗)一錢五分 黃連(酒洗)六錢 甘草(炙)二錢五分

【制法】一方加入參、白朮、茯神、酸棗仁、炒麦門冬(去心)各等分为末，煉蜜为丸，如黍米大。

【剂量及用法】每服五十丸，食远，米湯送下。

3. 女科証治准繩。

【功能与主治】治心經血虛，头暈，心神惊悸等証。

【处方】硃砂(飞过)五錢 黃連(酒洗)六錢 甘草(炙)五分 生地

黄 当归各一錢五分。

【制法】上为末，飯糊为丸。

【剂量及用法】每服十五丸。如服不应，当服归脾湯补之。

人参琥珀丸

沈 陽

【功能与主治】鎮惊定悸。主夜間不寐，惊恐心悸，神志不安，精神恍惚，坐臥不宁。

【处方】人参 琥珀 茯神 茯苓 菖蒲 远志各五錢 乳香 硃砂 酸棗仁各二錢五分

【制法】除琥珀、硃砂另研外，余者共研細面，蜜丸二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，食后紅棗煎湯送下。

【禁忌】五辛

附参考古方

【来源】杂病証治类方。

【功能与主治】癰

【处方】人参(去蘆) 琥珀(另研) 茯神(去木) 白茯苓(去皮) 石菖蒲(节密小者) 远志各半兩(酒浸半日去心) 乳香(另研) 酸棗仁(溫酒浸半日去壳紙上炒令香熟) 硃砂(另研水飞)各二錢半

【制法】上为細末，煉蜜丸桐子大。

【剂量及用法】每服二十丸，食后溫酒送下，日再服。如不能飲棗湯下，可常服。

琥珀多寐丸

上 海

【功能与主治】心悸怔忡，臥寐不安。

【处方】党参 茯苓 甘草 羚羊角 琥珀 远志(炒)各一兩

【制法】共研細粉，煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服三錢，灯草煎湯送服。

【禁忌】忌刺激性食物。

宁神丸

广 州

【功能与主治】神經衰弱，惊悸失眠。

【处方】生地一兩半 当归 白芍 茯神 麦冬 陈皮 貝母各一兩 远志 川芎各七錢 酸棗仁 黄連 甘草各五錢

【制法】將上列各药洗淨切碎，隔水蒸透，晒干研成粉，拌蜜糖为大丸，每丸重一錢五分，蜡壳封固。

【剂量及用法】每服一丸。

宁神定志丸

呼 和 浩 特

【处方】当归 生地 杭芍 川芎各四兩 菖蒲一兩 人参 远志各五錢

【制法】共为細面，蜜大丸，重二錢五分，臥衣。

宁志丸

沈 陽

【功能与主治】强心鎮靜，安神催眠。主心慌心跳，气短神衰，神智不清，夜間不寐，心臟衰弱，健忘怔忡。

【处方】人参 茯苓 茯神 柏子仁 琥珀 当归 炒棗仁 远志各五錢 乳香 硃砂 石菖蒲各一兩

【制法】除琥珀、硃砂另研外，余者共研極細面煉蜜为丸二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，飯后紅棗煎湯送下。

附参考古方

【来源】幼科証治准繩。

【功能及主治】心虛多惊，若有痰亡生之。

【处方】人参 白茯苓 茯神 柏子仁 琥珀 当归 酸棗仁(溫酒浸半日，去壳) 远志(炒)各半兩 乳香 硃砂 石菖蒲各一錢

【制法】上为末，蜜丸，桐子大。

【剂量及用法】每服二十丸，食后棗湯下。

定心丸

武 汉

【功能与主治】血虛心跳，惊悸怔忡，五心烦热，神志不宁。

【处方】党参一兩 茯神 远志各二兩 白蜡五錢 棗仁 生地

麦冬各二兩 黄芩一兩 当归二兩 柏子仁三兩(去油) 琥珀五錢 硃砂四錢 石菖蒲二兩 五味子五錢 炙甘草一兩

【制法】取上药进行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜90~100%，和成大丸，每丸重二錢，用蜡壳封固。

【剂量及用法】每服一丸，早晚各一次。

安神定志丸

一、蘭 州

【功能与主治】安神定志，益气养血。主心臟衰弱，惊悸失眠，精神恍惚等症。

【处方】酒地四兩 元肉二兩 当归一兩 於朮一兩五錢 川芎一兩 菖蒲 茯神 远志(炙)各八錢 棗仁一兩 黄芪一兩 杭芍 党参 炙草各一兩

【制法】共为細末，蜜小丸或三錢重，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服三錢，开水送下或清水湯送下。

二、濟 南

【功能与主治】神志不足，心虛多夢，煩躁盜汗。

【处方】党参 茯苓 柏子仁 远志 棗仁 茯神 当归各一兩 琥珀 石菖蒲 乳香各五錢

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，硃砂二錢为衣，每丸重二錢。

【剂量及用法】每服一丸，日服二次，溫开水送下。

参茸固本丸

一、南 昌

【功能与主治】五劳七伤，元氣不足，腰痛耳鳴，四肢痿軟。

【处方】肉苁蓉 茯神各二兩 漂於朮一兩五錢 广陈皮 小茴香 杭白芍各一兩五錢 石柱参二兩 甘草一兩 熟地六兩 当归 淮山 药 菟絲子 巴戟各一兩 枸杞 桂心 牛膝(酒浸熟) 黄芪各二兩 鹿茸片一兩五錢

【制法】共研細末，另將熟地搗爛，加煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服三錢，淡鹽

湯送下。

【禁忌】陰虛陽浮，有口焦、舌干、面赤、浮熱等現象者忌服。

二、福州

【功能与主治】生精添髓，大补气血，固本培元。治諸虛百損，壯筋健骨，腰膝痠軟，步履乏力。

【处方】人參二兩 鹿茸五錢 天冬 麦冬 生地 熟地 各四兩

【制法】共研細末，冬蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢，開水送下。

三、沈陽(參茸補腎丸)

【功能与主治】滋補強壯，助氣生血。主諸虛百損，五勞七傷，元氣不足，腰痛耳鳴，四肢痠軟，形體瘦弱，大便溏瀉，手足發冷。

【处方】司南昌。

【制法】共碾極細面，將熟地搗爛，加煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，淡鹽湯送下。

【禁忌】萊菔、蔥、蒜、油膩。

參茸補腎丸

撫 順

【功能与主治】補氣，養血，壯陽。主氣血虛弱，瘦弱神倦，便溏久瀉，氣短無力，腰腿痠痛，怔忡健忘，失眠心悸，腎虛陽痿，見色自洩，精液清稀。

【处方】遠志 核桃 炙肉 巴戟肉各二兩 杜仲二兩 椿實子 川牛膝各二兩 山藥二兩 黃桂一兩 茯苓二兩 川附子二兩 丁香一兩 故紙二兩 寸芸二兩 母丁香二兩 菟絲子二兩 熟地八兩 茴香一兩 虎骨 茸片 鹿腎各二兩 淫羊藿一兩 柏仁霜 紅參各二兩 枸杞子二兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服二錢重，食前白水送下。

【禁忌】忌食生冷，火盛者忌服。

人參固本丸

一、上海(固本丸)

【功能与主治】腰痠軟，大眩

耳鳴。

【处方】党參(炒)五錢 麦冬(炒) 天冬 熟地 生地(酒洗)各一兩

【制法】共研細粉，煉蜜為丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，淡鹽湯送下。

二、福州

【功能与主治】治脾虛熱，金水不足及肺氣燥熱，作渴作嗽，或小便短赤，亦色，澀滯如淋，大便燥結，此陰虛有火之聖藥也。

【处方】人參二兩 天冬(炒)

麦冬(炒) 生地 熟地各四兩

【制法】冬蜜為丸，梧桐子大。

【劑量及用法】每服五、六十丸，空心溫酒或淡鹽湯下。

三、杭州

【功能与主治】治肺勞虛熱，咳嗽吐血，自汗盜汗，虛痰上泛，精血枯涸等症。凡肺勞患者宜常服之。

【处方】潞黨參二兩 天門冬

麦門冬 人參 熟地各四兩

【制法】上藥研為細末，先將二地黃搗爛，少加煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二至四錢，淡鹽湯或開水送下。

四、南昌

【功能与主治】肺勞虛熱，咳嗽吐血，自汗盜汗。

【处方】吉林人參 熟地(洗蒸) 天冬(炒) 麦冬(炒)各一兩

【制法】研末，蜜和丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，空腹鹽湯送下，開水送下亦可。

【禁忌】火盛者忌服。

五、青島

【处方】生地 熟地 天冬 麦冬 人參 甜棗仁各一兩

【制法】共軋研，蜜小丸。

六、呼和浩特

【处方】人參八兩 五味二兩 生地四兩 天冬六兩 黃芪八兩

【制法】共為細面，蜜小丸。

老 奴 丸

一、杭州(健陽老奴丸)

【功能与主治】補腎助陽，生精益髓。治高年腎氣虛衰，風濕腰脚疼痛，精寒乏嗣，虛寒疝氣等症。

【处方】木香五錢 胡桃肉(另研)一兩 花蜘蛛七個 蔓澄茄 川單藤 車前子 馬蘭花(酒浸) 蜜木通 蝦蟇 韭菜子各一兩 灯心二錢 全蠍(去毒) 山萸肉 補骨脂(酒浸)各一兩五錢 蛇床子 淡菴蓉(酒浸) 菟絲子(酒浸) 巴戟肉 淫羊藿 八角茴香各一兩 沉香七錢 遠志肉 當歸 白茯苓各二兩 干漆(炒去烟)一兩 熟地黃五兩 桑螵蛸(酒浸) 龍骨各一兩五錢 母丁香 紫稍花各二兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢，空腹時溫酒或淡鹽湯送下。

二、沈陽(金精老奴丸)

【功能与主治】健腦添精益髓，促進生殖機能。主中年虛損，五臟衰弱，元氣不足，腿痠腰痛，下部虛寒，小腸疝氣。

【处方】木香五錢 灯心二錢 人蜘蛛七個 蔓澄茄 胡桃肉 車前子 馬蘭花 單藤 生蠍 韭菜子 木通各一兩 全蠍 山萸肉 破故紙 桑螵蛸 龍骨各五錢 母丁香 紫稍花 蛇床子 肉菴蓉 菟絲子 白茯苓 淫羊藿(羊脂拌炒) 人茴香 巴戟 遠志 當歸各二兩 沉香二兩 干漆二兩 熟地五兩

【制法】上藥除熟地搗膏外，余則碾面，加煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空心淡鹽湯送下，冬月溫黃酒送下。

【禁忌】戒房事。

三、撫順(金精老奴丸)

【处方】稍花 灯心炭 蛇床子 車前 寸芸 澄茄各二兩 絲子 馬蘭花 人茴各二兩 韭菜子二兩 棟子二兩 故紙二兩 杞子二兩 核桃仁 柏仁 羊藿 白苓各一兩半 母丁七錢 炙肉 桑螵各一兩半 遠志二兩 澤瀉五錢 川烏 巴戟各二兩 蜘蛛七個 金櫻 木

內 科

香各二兩 干姜 木通 沉香各一兩 肉桂二兩 鎖陽一兩 川椒 附子 杜仲 牛膝各二兩。

【制法】共為細面，蜜丸三錢大。

四、哈爾濱(如童老奴丸)

【功能与主治】補血填精。主精血衰弱，榮養不足，神倦體軟，氣短心跳，不能支持，風寒濕痹，五撈七傷，陽事不舉。

【處方】稍花 燈心灰 蛇床子 車前 菴蓉 菟絲 馬蘭花 大茴 韭子 澄茄 故紙各二兩 川棟 羊養 枸杞 胡桃肉 茯苓各一兩半 母丁 遠志 澤瀉 川附各五錢 巴戟二兩 蜘蛛七個(酒浸) 杞仁一兩半 桑螵一兩半 黃芩一兩半

【制法】共碾為細面，煉蜜為小丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，淡鹽湯送下，日服二、三次。

五、呼和浩特

【處方】紫稍花 蛇床子 車前子 大云各四兩 大料一兩 故紙二兩 羊養 韭菜子各二兩 菟絲子四兩 熟地八兩 巴戟三兩 澄茄 金櫻子各二兩 遠志三兩 母丁香三錢 桑螵一兩 枸杞二兩 杭莢四兩 燈心炭四兩 附子一兩 柏子仁二兩 澤瀉二兩 木通二兩 蜘蛛十四個 馬蘭子二兩 茯苓四兩 鹿茸五錢 全蠍一兩 木香 沉香各二錢

【制法】共為細面，蜜小丸。

打老兒丸

一、青島(1)

【處方】石菖蒲三兩 楮實 牛膝 遠志 巴戟 茯苓 山萸 杜仲 枸杞各四兩 山藥 川斷 小茴香各六兩 五味子二兩 菴蓉四兩 熟地八兩

【制法】共軋面，蜜丸如桐子大。

二、青島(2)

【處方】菖蒲 大茴 枸杞 牛膝 熟地 山藥 川斷 菴蓉 遠

志 茯苓 五味 杜仲 巴戟天各四兩 人參二兩 蓮鬚 黃芩 楮實子各四斤。

【制法】共為細末，蜜丸。

三、撫順

【處方】寸云二兩 巴戟二兩 山萸四兩 楮實二兩 川斷二兩 白芍二兩 枸杞三兩 五味一兩半 菖蒲一兩半 遠志一兩半 杜仲二兩 小茴二兩 熟地八兩 山藥四兩 牛膝二兩 盆子二兩。

【制法】共為細面，蜜丸三錢大。

四、吉林

【功能与主治】滋陰補虛，散風消痰，舒筋活血之功。主精神不振，四肢痠疼，中風不足，形容憔悴，胃弱停食停水，筋骨痠痛等症。

【處方】人參一兩二錢四分 生地二兩 鎖陽一兩二錢四分 五味 虎膠骨 首烏 山藥 各一兩二錢四分 當歸一兩七錢 川柏六錢七分 黃芩 川附子各一兩二錢四分 菖蒲 菟絲各六錢七分 杜仲一兩二錢四分 申薑一兩二錢四分 酒芍六錢七分 牛膝六錢七分 木瓜一兩二錢四分 熟地二兩 然銅六錢七分 茯苓一兩二錢四分 粟仁六錢七分 寸云一兩二錢四分 炙芪一兩七錢 蓮鬚六錢七分 遠志六錢七分 茯神一兩二錢四分 肉桂一兩二錢四分 續斷六錢七分

【制法】共研為細面，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，用淡鹽水送下。

五、呼和浩特

【處方】熟地 杭莢 山藥 枸杞 巴戟 川斷 菖蒲 牛膝 杜仲 大云 五味子 遠志 茴香各八兩 楮實子十二兩

【制法】共為細面，蜜小丸。

補血榮筋丸

沈 陽

【功能与主治】滋補強壯，養血止痛。主關節疼痛，骨痠筋疲，四肢無力，腰膝疼痛，胸悶氣逆，腹痛瘕瘕，手足麻痺。

【處方】肉菴蓉 菟絲子 天麻

各二兩 牛膝四兩 鹿茸一兩 熟地六兩 木瓜一兩 五味子一兩

【制法】共軋極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空腹時人參湯或米湯或溫酒送下。

附參考古方

【來源】張氏醫通。

【功能与主治】治肝衰筋緩不能自收持。

【處方】肉菴蓉(酒制) 菟絲子(酒煮搗碎) 天麻(煨)各二兩 牛膝(酒煮)四兩 鹿茸(酒炙)一對 熟地黃六兩 木瓜(姜汁炒) 五味子各一兩。

【制法】為末，蜜丸梧子大。

【劑量及用法】每服七十丸，空心參湯米湯臨臥溫酒送下。

虎 膠 丸

廣 州

【功能与主治】四肢酸軟。

【處方】黃柏三兩 白芍 陳皮各二兩 龍骨一兩 知母三兩 炙龜版四兩 牛膝二兩 熟地三兩 鎖陽一兩五錢 羊肉四兩 虎膠 全歸 土姜各一兩

【制法】上藥蒸透晒干，研為細末，煉蜜糖為小丸。

【劑量及用法】每日早晚服二次，每次服四錢。

葆 真 丸

一、沈 陽

【功能与主治】滋補強壯，去風濕，壯筋骨。主五撈七傷，左癱右瘓，腰酸腿痛，倦怠無力，少腹痠痛，男子遺精，腎虛頭暈，心臟衰弱，失眠自汗。

【處方】豨薟草 白蒺藜各一斤六兩 天冬 熟地 人參各八兩 茯神 棗仁 枸杞 牛膝 杜仲 續斷 五加皮 山藥 山萸 白朮 菟絲餅 沉香 硃砂 南星 沙苑子 半夏 鹿茸 虎胆各四錢 乳香 沒藥 黃芩 山楂 龍骨 地龍 土鱉 甜瓜子 骨碎補 肉桂 附子 炙甘草各二兩

【制法】共研極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，黄酒送下。

【禁忌】忌食生冷辣物，孕妇忌服。

二、撫 順

【处方】山藥二兩 牛膝 鹿膠各一兩 个虫一兩半 益智仁 川棟子 杞子 柏仁 巴戟各一兩 杜仲三兩 小茴香一兩 寸芸 白茯苓 沉香 山甲各三兩 故紙一兩 熟地二兩 胡蘆巴 远志 山萸 菟絲餅各一兩

【制法】共为細面，蜜丸三錢大。

附参考古方

【来源】1. 惠直堂經驗方。

【处方】何首烏二十兩（愈大愈妙，赤白各半，米泔浸一宿，磁片去皮，竹刀切碎，以牛膝十兩，黑豆三升同蒸，九蒸、九晒、九露，豆丸九易，首烏、牛膝俱用）熟地黄六兩（擇懷庆大者酒洗，拌砂仁、白茯苓末各五錢，蒸至透熟为度）人参（去蘆）三兩 山藥四兩 菟絲淘淨八兩（酒浸蒸一炷香）天冬（去心）

麦冬（去心） 生地（酒洗） 归身（酒洗） 枸杞（去蒂）各六兩 柏子仁八兩（湯泡七次去油淨） 茯苓（人乳拌蒸） 茯神各六兩 补骨脂（核桃肉研碎拌炒） 杜仲各四兩（鹽水炒）

【制法】共为末，煉蜜丸，梧子大。

【剂量及用法】每日清湯下三、五錢。如年四十以上，阳气弱而精不固者，加山萸肉、鎖陽、菟蓉各四兩，如健忘者加九节菖蒲、远志肉各二兩，如思慮過度不睡者，加棗仁炒黑二兩。

2. 女科証治准繩。

【功能与主治】專治九醜之疾，王莖弱而不振，振而不丰，丰而不循，循而不实，实而不坚，坚而不久，久而無精，精而無子，謂之九醜之疾。此藥補十二經絡起陰發陽，能令阳气入胸，安魂定魄，开一焦积聚，消五壳进食，强陰益子精安五臟，除心中伏热，强筋骨，輕身明目，去冷除風，無所不治。

【处方】鹿角膠半斤（剉作豆大，就用鹿角霜拌炒成珠，研細） 杜仲（去粗皮，切碎，用生姜汁一兩，同蜜

少許拌炒斷絲）三兩 干山藥 白茯苓（去粗皮，人乳拌，晒干，凡五七次） 熟地黄各二兩 菟絲子（酒蒸搗焙） 山萸肉各一兩半 北五味子 川牛膝（去蘆，酒蒸） 益智仁（去壳） 远志（泔煮，去骨） 小茴香（青鹽三錢，同炒） 川棟子（去皮核，取淨肉，酥炙） 川巴戟（酒浸，去心） 以上各一兩 破故紙 胡蘆巴（同故紙入羊腸內煮，焙干）各一兩 柏子仁（去壳另研如泥）半兩 穿山甲（酥炙） 沉香各三錢 全蠍（去毒）一錢半

【制法】各为極細末，以好嫩肉從蓉四兩酒洗淨，去鱗甲皮垢、开心，如有黄白膜亦去之，取淨二兩，好酒煮成膏，同煉蜜和前藥末搗千余下，丸如桐子大。

【剂量及用法】每服五十丸，淡秋石湯溫酒任下，以干物压之，漸加至白丸，服七日。

龙骨續断丸

沈 陽

【功能与主治】壯筋骨，通經絡，活血助腎。主色慾過度，筋骨痿軟，腎虛腰痛，肢節痠痛。

【处方】淨土龙七錢五分 虎骨續断 單麟各一兩 乳香 制穿山甲各五錢 沒藥二錢五分 茴香 狗腎 當歸 砂仁 鹿茸各一兩 杜仲二兩 青鹽七錢五分 菟絲四兩

【制法】共碾極細面，面糊为小丸。

【剂量及用法】每服一錢，空心，淡鹽湯送下。

起 痿 丸

沈 陽

【功能与主治】利湿舒筋。主腎虛寒湿，腰痠腿痛，步履艰难，筋痿骨軟，四肢痠攣，足心隱痛，下湿脚气，赤腫疼痛，气促喘滿，遍身浮腫。

【处方】薏仁 附子 天南星 当歸 杜仲 牛膝 續断 石楠叶 草薢 防風 炙芪 石斛 羌活 明天麻各一兩 蒼朮一兩五錢 木瓜四兩 檳榔五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸，二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下。

【禁忌】忌食辣腥，生冷。

金 剛 丸

一、上 海

【功能与主治】治筋骨痿軟，四肢無力。

【处方】淡菴蓉 杜仲（炒） 菟絲子 川草薢各八兩 猪腰二具

【制法】先將猪腰洗淨煮爛，加入余藥打和焙干，研成細粉，煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服三錢，溫开水送服。

二、杭州（补腎金剛丸）

【功能与主治】治腎虛精耗，筋骨痿弱，腰膝沉重，痛不能忍，四肢無力，步履艰难等症。

【处方】川草薢 杜仲（鹽水炒） 淡菴蓉 菟絲子（酒蒸）各八兩 猪腰子三具

【制法】共研細末，酒煮猪腰子，打爛和糊为丸。

【剂量及用法】每服四錢，溫酒或淡鹽湯送下。

三、沈 陽

【功能与主治】强腰腿，壯筋骨。主腰腿疼痛，行步艰难，足膝痿軟，不能起立，叉骨作痛，四肢麻木。

【处方】川草薢 杜仲 肉菴蓉 菟絲子 巴戟肉各四兩 制鹿胎二兩

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸，二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，空腹时，參湯或米湯臨臥时送下。

附参考古方

【来源】素問病机气宜保命集。

【功能与主治】治腎損骨痿，不能起于床，宜益精。

【处方】草薢 杜仲（去絲炒） 菴蓉（酒浸） 菟絲子（酒浸）各等分

【制法】上为細末，酒煮猪腰子为丸，如桐子大。

【剂量及用法】每服五、七十丸，空心酒下。

大补陰丸

一、上海

【功能与主治】煩熱易飢，骨蒸盜汗。

【处方】熟地六兩 龟板(炙)六兩 知母(酒炒)四兩 黄柏(鹽酒炒)四兩

【制法】共研細粉，以猪脊筋十條打和，加煉蜜為丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二至三錢，食前溫開水送服。

二、杭州

【功能与主治】滋陰降熱。治陰虛熱盛，肺痿欬血，煩熱虛呃，骨蒸盜汗，足膝疼痛等症。

【处方】黄柏(鹽酒拌炒)四兩 知母(鹽酒拌炒)四兩 大熟地六兩 炙龟板六兩 猪脊筋十條

【制法】共研細末，將猪脊筋酒蒸打爛，和煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服三至四錢，姜鹽湯或淡鹽湯送下。

三、福州(丹溪大补陰丸)

【功能与主治】降陰火，補腎水，為滋養陰分之要藥。

【处方】黄柏(鹽水炒) 知母(鹽酒炒)各四兩 熟地(酒洗蒸搗爛) 龟板(酥炙黃)各六兩

【制法】右為細末，用猪脊筋蒸熟搗爛，加煉蜜和丸梧子大。

【劑量及用法】每服五六十丸，空心姜鹽湯或酒送下。

四、青島

【处方】熟地 当归 菟絲子 知母 黄柏 山藥 杜仲 青盐 沉香 龟板各等分

【制法】共軋面，蜜小丸。

五、呼和浩特

【处方】九地 龟板 知母 黄柏各半斤

【制法】共為細面，蜜小丸。

附參考古方

【来源】1. 丹溪心法(大补丸)。

【功能与主治】降陰火，補腎水。

【处方】黄柏(炒褐色) 知母(酒浸炒)各四兩 熟地(酒蒸) 龟

板(酥炙)各六兩。

【制法】上為末，猪脊髓蜜丸。

【劑量及用法】服七十丸，空心鹽白湯下。

2. 丹溪心法(大补丸)。

【功能与主治】去腎經火，燥下焦濕。治筋骨軟。

【处方】黄柏(炒褐色)

【劑量及用法】上以水丸服。

【備考】氣虛以補氣藥下，血虛以補血藥下，並不單用。

大补元煎丸

福州

【功能与主治】治男婦氣血大壞，精神失守危風等症，此回天贊化救本培元第一要方。

【处方】人參(補氣補陽，以此為主少則用一二錢多則用一二兩)

山藥(炒)二錢 熟地(補精補陰以此為主少則用二三錢多則用二兩) 杜仲二錢 当归二錢(若泄瀉者去之) 山茱萸一錢(如畏酸吐酸者去之) 枸杞二錢 炙草一二錢

【制法】共研細末，蜜煉為丸。

百补丸(長春百补丸)

吉林、哈尔滨

【功能与主治】滋陰補腎，清熱養血。主腎虛滑精，精寒腎冷，氣弱腰痠腿疼，筋骨麻木，陰津失潤，枯燥生熱，口干舌燥，干咳無痰，五心發熱等症。

【处方】熟地四兩 萸肉二兩 茯苓兩半 菖蒲 巴戟 儿膝 菟蓉 杜仲 絲餅各兩半 大冬一兩 山藥二兩 玄參兩半 洋參二兩 丹皮兩半 寸冬二兩 五味二兩 廣皮一兩 沉香一兩 山楂二兩 澤瀉兩半 当归兩半

【制法】共研為細面，用絹羅篩之煉蜜為丸，每丸二錢一分。

【劑量及用法】每服一丸，早晚空心服之，用棗湯送下。

【禁忌】忌食刺激性之物。

滋陰百补丸

一、重慶

【功能与主治】男女陰虛，五心煩躁，四肢無力，困倦羸疲。自汗盜

汗，遺精白濁，五淋帶下。

【处方】熟地八兩 牡丹皮四兩 澤瀉二兩 山萸 山藥 龟板各四兩 茯苓 知母 黄柏各二兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】一錢。

二、大同

【功能与主治】陰虛，淋濁。

【处方】熟地八兩 山萸 山藥 續斷各三兩 芡實四兩 当归 杜仲 云苓 丹皮 澤瀉 麥冬 丹參各二兩 遠志一兩五錢 蓮鬚三兩 白芷二兩

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】早晚每服一錢，開水送下。

三、濟南

【功能与主治】腎虧腰痛，陽痿遺精。

【处方】熟地 山藥 澤瀉各八斤 茯苓 丹皮 山萸肉 巴戟 肉蓯蓉 補骨脂 杜仲各二斤 枸杞子六斤 怀牛膝四斤 蓮鬚一斤

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，三錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下，一日二次。

【禁忌】生冷。

四、青島

【处方】熟地八兩 菟絲子 菟蓉各二兩 知母一兩 黃芪四兩 五味子 黄柏 炙草各一兩 枸杞 龟板 天冬 山萸各二兩 人參一兩

【制法】共軋面，蜜丸。

五、沈陽

【功能与主治】滋陰補陰，強腎固精。主男子腎陰虛損，身體瘦弱，面色萎黃，行步無力，腰腿痠痛，一般衰弱症。

【处方】魚鱉一斤 蛤粉(炒成珠) 菟絲子 巴戟 遠志肉 枸杞子 芡實 牛膝 女貞子 山茱萸 炒棗仁 鎮陽 沙苑 蒺藜 蓮鬚 当归 復盆子 白茯苓 柏子仁各四兩

【制法】共碾極細面，酒糊為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，空心

白开水送下。

六、撫 順

【处方】熟地八兩 山藥 山茱萸肉各六兩 白朮 澤瀉 棗仁 鱉甲 炙甘草 冬各五兩 白芍 五味 遠志各二兩 川斷六兩 杜仲五兩 丹皮三兩。

【制法】共為細面，蜜丸三錢大。

七、呼和浩特

【处方】九地二斤半 菟絲子 大芸 人參各十兩 知母 五味 黃柏 炙甘草各五兩 枸杞 黃芪各一斤四兩 龜板一斤四兩 天冬 杭黃各十五兩

【制法】共為細面，蜜小丸。

滋陰補腎丸

武 漢

【功能與主治】頭目昏眩，骨痿精枯，飲食不思，肢體倦怠，及一般虛損勞熱症狀。

【处方】熟地四兩 知母一兩半 巴戟大 菟絲 建澤瀉 山藥 菟絲子各二兩 枸杞子 丹皮各一兩半 茯苓二兩 黃柏 山茱萸各一兩半

【制法】小丸 一上藥干燥，混合碾細，照細粉量加煉蜜64~68%，迭成小丸，每錢不得少于二十五粒。

大丸 加煉蜜115~125%，和成大丸，每丸重三錢。

【劑量及用法】每服三至四錢，早晚各一次，用鹽湯送下。

金匱腎氣丸

一、北 京

【功能與主治】滋補、散寒、利水。主虛弱腰痛，男子消渴，小便短少，足膝浮腫。

【处方】熟地四兩 茯苓三兩 山藥 山茱萸各二兩 丹皮 澤瀉各一兩五錢 懷牛膝 車前子各一兩 川附片 肉桂各五錢

【制法】共為細粉，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服三錢，日服二次，溫開水或淡鹽湯送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天 津

【功能與主治】滋補、散寒、利

水。主身體虛弱，腰疼腹痛，小便頻數，腎囊潮濕，足膝浮腫，腎虛作喘。

【处方】熟地八兩 山藥 山茱萸肉各四兩 茯苓(去皮) 丹皮 澤瀉 車前子(鹽炒) 懷牛膝 制附子 肉桂(去粗皮)各二兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，三錢重，紙皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、上 海

【功能與主治】消渴，四肢浮腫，虛勞腰痛。

【处方】熟地八兩 山藥(炒) 山茱萸肉(酒炒)各四兩 茯苓 牡丹皮(酒炒) 澤瀉(鹽酒炒)各二兩 桂枝一兩 附子(泡去皮制)五錢

【制法】共研細粉，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，溫開水送服。

四、南京(腎氣丸)

【功能與主治】主腎虛腰痛，小便不利，腫脹喘急等症。

【处方】懷牛膝一兩 萸肉二兩 車前子一兩 山藥二兩 炙附子五錢 茯苓三兩 肉桂五兩 丹皮一兩五錢 熟地四兩 澤瀉一兩五錢

【制法】共研細末，煉白蜜為丸，每錢約做二十粒。

【劑量及用法】每服三錢，一日二次，開水吞服。

五、福 州

(薛氏金匱腎氣丸)

【功能與主治】治脾胃陽虛，不能行水，小便不利，腰重脚腫，或肚腹腫脹，四肢浮腫，或喘急痰盛，已成臌症，其效如神。

【处方】熟地四兩(酒拌蒸) 山藥 山茱萸 牛膝 丹皮 澤瀉 車前子 肉桂各一兩 茯苓三兩 附子五錢

【制法】共為末，煉蜜同地黃膏搗丸，桐子大。

【劑量及用法】每服七、八丸，空心米泔飲下。

六、杭 州

【功能與主治】治脾腎虛弱，腰

補 益 藥

痛脚腫，胸腹膨脹，四肢浮腫，喘急痰盛，小便不利等症。

【处方】大熟地八兩 白茯苓三兩 制附子一兩 山茱萸肉四兩 粉丹皮三兩 桂枝一兩 山藥四兩 澤瀉三兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸，或水泛丸。

【劑量及用法】每服三錢，溫酒或開水送下，日再服。

七、南 昌

【功能與主治】虛癆腰痛，脚氣上冲，小腹不仁，及男子消渴小便多，婦人轉胞不得溺等症。

【处方】熟地黃八兩 山藥 山茱萸各四兩 澤瀉 茯苓 丹皮各三兩 附子(泡) 桂枝各一兩

【制法】共為細末，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二至三錢，溫酒送下，日服二次。

【禁忌】肝腎火旺者忌服。

【備考】非經醫師处方，不得服用。

八、重 庆

【功能與主治】腎氣不化，小便頻數。

【处方】熟地四兩 山藥 山茱萸各二兩 茯苓三兩 牡丹皮 澤瀉各一兩五錢 川牛膝 車前子各一兩 制附子 肉桂各五錢

【制法】共研細末，煉蜜和丸。

【劑量及用法】二至四錢。

九、昆 明

【功能與主治】體質不健，肚腹脹滿，四肢浮腫，氣喘痰多。

【处方】熟地八兩 淮山藥 桑皮各四兩 茯苓三兩 淮牛膝一兩 車前八錢 澤瀉(鹽炒) 粉丹皮各三兩 肉桂 天雄各一兩

【制法】研末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服一丸(水丸二錢半)，幼童減半，用開水早晚各服一次。

【禁忌】感冒及燥熱症忌服。

十、西 安

【功能與主治】治腎虛命門火衰，真水不足，腎石陽痿，腰背痠楚，小腹拘急，小便不利，消渴小便多，

單腹脹，頭暈目眩等症。

【處方】干地黄八兩 山藥 山萸肉各四兩 茯苓 丹皮 澤瀉各兩 炮附子一只 桂枝一兩

【制法】蜜制為丸。

【劑量及用法】每服二至三錢，(梧桐子大丸十五丸，可加至二十丸，日再服)，酒水下。

十一、蘭州

【功能與主治】滋補強壯，利水散寒。主身體虛弱，腹脹腹痛，小便不利，四肢浮腫，水腫氣喘。

【處方】六味丸面一斤半 車前子 牛膝 附子 肉桂各三兩

【制法】共軋細面，蜜為小丸。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

十二、大同

【功能與主治】暖丹田，行小便，消脹滿。主腎虛下寒，小便不通，肚腹脹滿，四肢浮腫，已成蠱症。

【處方】茯苓十六斤四兩 川牛膝 肉桂 車前草 澤瀉 山藥 丹皮 山萸各五斤七兩 川附子十五兩 熟地二十二斤半

【制法】以上共為細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服三錢。

十三、禹縣

【功能與主治】脾腎虛弱，腰疼足腫，小便不利，四肢浮腫。

【處方】熟地黄八兩 川牛膝 附子各一兩 山萸肉 山藥各四兩 白茯苓 牡丹皮 澤瀉各三兩 車前子 肉桂各一兩

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢，空心白開水送下。

【禁忌】孕婦忌用。

【備考】有效期間一年。

十四、濟南

【功能與主治】腎虛腰痛，口渴溲多，氣喘浮腫。

【處方】熟地八兩 山藥 山萸肉各四兩 茯苓 丹皮 澤瀉各三兩 肉桂 附子各一兩

【制法】共為細末，煉蜜為丸，梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

【禁忌】忌生冷食物，患臟症者忌服。

十五、青島

【處方】附子 肉桂 牛膝 車前子各二兩 熟地八兩 山藥 山萸各四兩 茯苓 丹皮各三兩 澤瀉二兩

【制法】共軋面，蜜丸，如桐子大。

十六、沈陽

【功能與主治】補腎、祛寒。主腎臟利尿機能障礙，腰重脚軟，小便不利，腹脹水腫，四肢浮腫，喘急痰盛，腎囊濕冷，舉丸發涼。

【處方】白茯苓二兩 附子五錢 牛膝 肉桂 澤瀉 車前子 山萸肉 山藥 牡丹皮各一兩 熟地四兩

【制法】共碾極細面，熟地杵成膏，少加煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，淡鹽水送下。

【禁忌】葱、蒜。

十七、撫順(腎氣丸)

【功能與主治】補腎利尿。主生殖器官衰弱，腎虛浮腫，泌尿失職，溲澀或數，腰腿痠痛，筋疲痿軟，健忘怔忡。

【處方】熟地八兩 山藥 山萸各四兩 澤瀉 丹皮 茯苓各三兩 川附子 桂楠各一兩 車前 牛膝各二兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服二錢，一日二次，早晚服，淡鹽湯送下。

【禁忌】滑精者忌用。

【備考】一方蜜丸三錢重。

十八、哈爾濱(腎氣丸)

【功能與主治】補腎利尿。主腎虛浮腫，腎虛腰痛。

【處方】熟地黄四兩 云茯苓三兩 淮山藥 山萸肉各二兩 粉丹皮一兩 建澤瀉一兩五錢 真牛膝 車前子各一兩 熟附片 肉桂心各五錢

【制法】共碾為細面，煉蜜為小

丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，淡鹽湯或白水送下。

【禁忌】滑精者忌用。

十九、承德

【功能與主治】主腎虛，小便不利，肚腹脹滿，四肢浮腫。

【處方】同北京。

【制法】共為細粉，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二至四錢，黃酒送下，白水亦可。

二十、呼和浩特

【處方】照六味地黄丸方，加肉桂、附子、車前、牛膝各一兩

【制法】軋細面，蜜小丸。

附參考古方

【來源】金匱要略方論。

【功能與主治】利小便。

【處方】干地黄八兩 薯蕷 山茱萸各四兩 澤瀉 茯苓 牡丹皮各一兩 桂枝 附子各一兩(炮)

【制法】上八味，末之，煉蜜和丸，梧子大。

【劑量及用法】酒下十五丸，加至二十五丸，日再服。

左 歸 丸

一、上 海

【功能與主治】腰痠肢軟，盜汗遺精，神疲口燥，頭目眩暈。

【處方】熟地四兩 枸杞子 鹿角膠 菟絲子(制) 龜板膠各二兩 茯苓一兩五錢 山茱萸肉 懷山藥(炒)各二兩 懷牛膝(酒洗蒸熟)一兩五錢

【制法】除鹿角膠龜板膠外，余藥共研細粉，以鹿角膠龜板膠烱化，和煉蜜為丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每服一錢，溫開水送服。遵醫師指示服用。

二、廣 州

【功能與主治】目眩頭暈，耳鳴心跳。

【處方】大生地八兩 絲子四兩 牛膝二兩 杞子四兩 鹿膠一兩 淮山藥四兩 龜膠一兩 炙肉四兩

【制法】共藥八味研為細末，煉蜜成小丸。

【剂量及用法】滾水或鹽水送下，每日早晚服二次，每次服三錢。

三、福州

【功能与主治】治真陰不足，虛熱往來，營衛衰弱，神不守舍，精髓內亏，自汗盜汗，遺淋不禁，昏暈眼花，耳聾口燥，腰痠脚軟，津液枯涸等症。

【处方】熟地八兩 鹿膠(炒) 龟膠(炒) 山藥 萸肉 杞子 菟絲各四兩 茯苓三兩 怀牛膝三兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

四、杭州(景岳左归丸)

【功能与主治】治腎虛陰亏，營衛衰弱，虛熱往來，自汗盜汗，頭暈目眩，耳聾口燥，腰膝痠軟，一切精髓內亏，津液枯涸等症。

【处方】大熟地四兩 白茯苓兩半 怀牛膝兩半 山萸肉二兩 枸杞子二兩 鹿角膠二兩 怀山藥二兩 菟絲子二兩 龟板膠二兩

【制法】共為細末，將二膠溶化，略加煉蜜為丸。

【剂量及用法】每服三至四錢，開水或淡鹽湯送下。

五、南昌

【功能与主治】腎虛虛熱，自汗盜汗，遺精淋濁，頭暈目眩，耳鳴，口燥舌干，腰痠肢軟。

【处方】同福州。

【制法】前藥研極細面，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二至三錢，早晚各服一次，用鹽開水吞下。

【禁忌】外邪未除，吐酸水均忌服。

【備考】非經醫師处方不得使用。

六、沙市

【功能与主治】治腎亏，頭暈目眩，腰痠足痛，自汗盜汗，小便過多等症。

【处方】同福州。

【制法】諸藥研細末，煉蜜為丸。

【剂量及用法】每次服三錢，空腹淡鹽開水下，每日服二次。

【禁忌】胃弱痰多者忌服。

七、青島

【处方】杜仲 麥冬各二兩 熟地八兩 山藥 山萸各四兩 茯苓 澤瀉 丹皮各二兩

【制法】共軋細面為丸。

八、沈陽

【功能与主治】培養腎臟，補益精血。主腎虛不足，精血枯竭，自汗盜汗，滑精遺溺，頭目眩暈，口燥舌干，腰疼腿軟，肢體無力。

【处方】熟地黃八兩 山藥 枸杞 山萸 菟絲子 鹿角膠 龟膠各四兩 川牛膝三兩

【制法】先將熟地蒸搗成膏，再將其餘藥品碾極細藥面，兌煉蜜為丸二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，淡鹽水送下。

【禁忌】蔥蒜。

九、撫順

【处方】熟地八兩 山藥 山萸 龟板 絲餅 牛膝 杞子各三兩。

【制法】共為細面，蜜丸三錢大。

十、吉林

【功能与主治】補陽滋陰健脾之功。主命門火衰，脾胃虛寒，嘔逆膨悶，翻胃噎膈，臍腹多痛，虛淋寒症，便溏泄瀉，肢節腹痛，水邪浮腫，陽衰陰弱等症。

【处方】熟地五兩四錢 川附一兩二錢四分 當歸二兩六錢七分 肉桂一兩二錢四分 枸杞二兩六錢七分 山藥二兩六錢七分 山萸二兩 人參一兩二錢四分 絲餅二兩六錢七分 鹿膠二兩六錢七分 杜仲二兩六錢七分

【制法】共研為細末，煉蜜為小丸。

【剂量及用法】每服二錢，如陽少精枯，加故紙二兩，如嘔惡吞酸加干姜一兩二錢四分，如腰膝無力酸痛者，加核桃肉二兩，如陰虛陽微加巴戟二兩六錢七分，杜仲二兩，海狗腎一具酒煮，加入前藥一處服之。

十一、呼和浩特

【处方】熟地八兩 山藥四兩 杭萸四兩 枸杞二兩 絲子一兩 鹿角膠二兩 龟板四兩 牛膝二兩

【制法】共為細面，蜜小丸。

附參考古方

【来源】景岳全書。

【功能与主治】真陰腎水不足，不能滋養營衛，漸至衰弱，或虛熱往來，自汗盜汗，或神不守舍，血不歸原，或虛損傷陰，或遺淋不禁，或氣虛昏運，或眼花耳聾，或口燥舌干，或腰痠腿軟，凡精髓內亏津液枯涸等証，俱速宜壯水之主，以培左腎之元陰，而精血自充矣，宜此方主之。

【处方】大怀熟地八兩 山藥(炒)四兩 枸杞四兩 山萸肉四兩 川牛膝(酒洗蒸熟，精滑者不用)三兩 菟絲子(制)四兩 鹿膠(敲碎炒珠)四兩 龟膠(切碎炒珠無火者不必用)四兩

【制法】上先將熟地蒸爛杵膏，加煉蜜丸桐子大。

【剂量及用法】每食前用滾湯或淡鹽湯送下百余丸。

归 腎 丸

福 州

【功能与主治】治腎水真陰不足，精衰血少，腰痠脚軟，形容憔悴，遺泄陽衰等症。此左归右归二丸之次也。

【处方】熟地八兩 山藥 山萸 茯苓各四兩 當歸三兩 枸杞 杜仲(鹽水炒) 菟絲子(制)各四兩

【制法】共研末，煉蜜同熟地膏為丸桐子大。

【剂量及用法】每服百余丸，飢時或滾水或淡鹽湯送下。

小安腎丸

武 漢

【功能与主治】下體沉重，夜多遺溺，倦怠羸瘦，憔悴昏憤，耳鳴目眩，牙齦動搖出血，小腹寒疝作痛。

【处方】香附一斤 川椒四兩 川陳子一斤 小茴香十二兩 制川烏一斤 熟地八兩

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于三十粒。

【剂量及用法】每服二至三錢，鹽湯送下。

附參考古方

【来源】杂病証治类方。

【功能与主治】治腎气虛乏，下元冷憊，夜多旋溺，肢體倦怠，漸覺羸瘦，腰膝沉重，嗜臥少力，神昏憤，耳作蟬鳴，面無顏色，泄瀉腸鳴，眼目昏暗，牙齒蛀痛。

【处方】香附子 川烏頭 川楝子以上各一斤(用鹽四兩水四升) 茴香十二兩 熟地黃八兩 川椒(去目及閉口者微炒出汗)四兩

【制法】上六味為細末，酒糊為丸如桐子大。

【劑量及用法】每服二十丸至三十丸，空心臨臥鹽湯溫酒任下。

古菴心腎丸

一、大 同

【功能与主治】陰虛血熱，耳鳴腹痛，神志不寧，腎水不足。

【处方】生地 熟地 山藥 茯苓 當歸 澤瀉 酒柏 黃肉 枸杞 牛膝 龜板 茸片各四兩 川連二錢 丹皮四兩 炙草二兩。

【制法】蜜為丸，硃砂為衣。

【劑量及用法】每日早晚各服三錢。

二、呼 和 浩 特

【处方】熟地 生地 杭黃 山藥各四兩 丹皮 茯苓 澤瀉 枸杞各三兩 龜板 牛膝 當歸各一兩 鹿茸五錢 黃連 炙草各一兩

【制法】共為細面，蜜小丸硃衣。

海狗健腎丸

蘭 州

【功能与主治】為強壯劑。主身體虛弱，體力不振，腎虛陽痿，滑精。

【处方】海狗腎四條 黃芪 芡實各八兩 鹿腎一具 煅龍骨十兩 蓮鬚二兩 酒地十兩 山藥八兩 羊腎二付 盆子二兩 鎖陽八兩 淫羊藿十兩 牛骨髓二條 枸杞三斤 牛腎二斤

【制法】共為細面，黃芪、黨參、車前子各二斤煮水，加青鹽半斤打小丸；用砂仁、薏仁、杜仲、姜炭各等分，用鹽水炒過，共研細面為衣，瓶裝封固。

【劑量及用法】每服三十粒，淡鹽湯或開水送下，日服二次。

【禁忌】陽亢者忌服。

海 參 丸

一、撫 順

【处方】海參一斤 羊腰十個 桃肉一百個 杜仲八兩 杞子四兩 菟絲餅八兩 鹿膠 巴戟 牛膝 龜板 故紙 當歸各四兩 豬脊髓十條

【制法】共為細面，蜜丸三錢大。

二、吉 林

【功能与主治】強精固腎，補氣扶虛壯力。主咳嗽氣喘，陽痿腎虛，精冷腰腿酸軟，四肢拘攣，體力衰危，滑精等症。

【处方】海參一斤六錢七分 鹿膠 龜膠 巴戟 枸杞 故紙 當歸 牛膝各二兩六錢七分 菟絲餅 杜仲各五兩三錢四分 羊腰十個 豬脊髓十五條 核桃肉一百個

【制法】共為細面，用煉蜜制為小丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，用淡鹽水送下。

大菟絲子丸

上 海

【功能与主治】頭目眩暈，耳鳴心悸，腰痠足軟，小溲頻數。

【处方】茯苓 懷牛膝(酒浸焙) 杜仲(炒) 石斛 畢澄茄 防風 淡菴蓉(酒洗焙) 巴戟肉 山茱萸肉 熟地 補骨脂(酒炒) 續斷各二兩 附子(泡去皮制)一兩 沉香二兩 菟絲子(酒洗制) 鹿茸(酥炙，去毛)各一兩 小茴香二兩 澤瀉 肉桂各一兩 五味子 桑螵蛸(酒浸炒) 川芎 復盆子各五錢 石龍芮一兩

【制法】共研細粉，用麵糊為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服一錢五分，食前開水送服。

【備考】遵醫師指示服用。

附參考古方

【来源】太平惠民和劑局方。

【功能与主治】治腎氣虛損，五

癆七傷，少腹拘急，四肢酸疼，面色黧黑，唇口干燥，目暗耳鳴，心怯氣短，夜夢驚恐，精神困倦，喜怒無常，悲憂不樂，飲食無味，舉動乏力，心腹脹滿，腳膝痿緩，小便滑數，房室不舉，股內濕痒，水道凝痛，小便血出，時有遺瀝，並宜服之。久服填骨髓，續絕傷，補五臟，去万病，明視听，益顏色，輕身延年，聰明耳目。

【处方】菟絲子(洗，酒浸) 鹿茸(酥炙，去毛，剉) 肉桂(去粗皮) 附子(炮，去皮臍) 石龍芮(去上) 澤瀉各一兩 巴戟(去心) 防風(去苗叉) 肉菴蓉(酒浸，切焙) 杜仲(去粗皮，剉炒) 茴香(炒) 沉香 白茯苓(去皮) 牛膝(酒浸一宿) 石斛(去根) 續斷 山茱萸(去核) 補骨脂(炒) 熟干地黄(酒蒸) 畢澄茄各三分 桑螵蛸(酒浸炒) 五味子 復盆子(去枝莖) 芎藭各半兩

【制法】上藥為末，以酒煮熟糊，丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二十丸，溫酒或鹽湯下，空心服。如脚膝無力，木瓜湯下，晚食前再服。

河車大造丸

一、上 海

【功能与主治】治體虛夢遺，肢軟神疲，潮熱。

【处方】紫河車 懷牛膝 麥冬 天冬各一兩 杜仲(炒)一兩五錢 黃柏 黨參各一兩五錢 龜板(炙) 熟地(用砂仁二錢拌炒)各二兩 茯苓六錢

【制法】先將熟地煎爛，和入余藥搗和焙干，研細粉，加煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，溫開水送服。

二、福 州

【功能与主治】治虛損勞瘵，神志失守，內熱水亏。常服能烏鬚黑髮，聰耳明目。

【处方】河車一具 人參 黃柏(鹽水炒) 杜仲各一兩五錢 牛膝 天冬 麥冬各一兩 龜板(炙) 熟地各二兩

【制法】共研末，另用云苓六錢，煮爛和勻，酒米糊為丸。

三、杭州

【功能与主治】治劳伤虚损，肺腎兩亏，陰虛潮熱、盜汗遺精，神志不寧，一切虛怯等症。

【处方】紫河車一具 潞黨參 杜仲(鹽水炒) 川黃柏(鹽水炒)各一兩五錢 麥門冬 懷牛膝(鹽水炒) 天門冬 白茯苓各一兩 炙龜板 大熟地(砂仁二錢五分同拌炒)各二兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服四錢，空腹時淡鹽湯或開水送下。

四、濟南

【功能与主治】補五臟虛損。

【处方】人參二兩 黃芪(蜜炙) 白朮各一兩(土炒) 當歸(酒蒸) 棗仁(炒) 遠志(去心炙) 白芍(酒炒) 山藥 茯苓各一兩五錢 枸杞子 大熟地各四兩 河車一具(甘草水洗) 鹿角一斤 龜板八兩(與鹿角同熬膏)

【制法】以龜鹿膠和藥，加煉蜜為丸。

【劑量及用法】每早開水下四錢。

五、青島

【处方】生地 天冬 麥冬 牛膝 杜仲各一兩五錢 熟地二兩 當歸 枸杞 茴香 白朮 陳皮 山萸 鎖陽 川斷 地骨皮 知母 丹皮 五味子 炮姜各一兩

【制法】共研細面，煉蜜為小丸

六、沈陽(補天大造丸)

【功能与主治】滋補強壯。主男婦老幼氣血兩虧，頭暈心跳，氣短耳鳴，四肢疲乏，健忘怔忡，自汗盜汗，食慾不振，性慾減退，積勞內傷，喘咳呃逆，面黃肌瘦，胸悶脹痛，足膝無力，煩躁失眠，神經衰弱。

【处方】黃柏一兩 杜仲 牛膝各一兩五錢 西當歸一兩 熟地黃二兩 天冬 生地各一兩五錢 枸杞一兩 茴香七錢 麥冬一兩五錢 陳皮七錢五分 白朮一兩 五味子七錢 干姜二錢 柏叶二兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空心

米湯送下，一日二次。

七、撫順(大造丸)

【处方】河車一具 白朮五錢 天冬一兩 寸冬五錢 當歸一兩 知母一兩 盆子 巴戟 元茂各一兩 白朮 杞子 小茴 熟地 五味 鹽柏 生地各五錢 山萸 牛膝 川斷 骨皮 洋參各一兩 陳皮五錢 丹皮一兩 杜仲八錢半 鎖陽一兩 肉桂一兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

八、呼和浩特

【处方】人參 黃芪 九地各半斤 紫河車一具 茯苓 川斷 山萸 枸杞 天冬各四兩 棗仁 杜仲 五味子 肉桂各二兩 牛膝一兩 寸冬 山藥 炙草各二兩

【制法】共為細面，蜜小丸。

附參考古方

【來源】沈氏尊生書。(大造丸)

【功能与主治】陰虛。

【处方】紫河車一具(如法洗淨，盛竹器，長流水中浸一刻以回生氣，盛小瓦盆，于木甌或瓦甌內蒸極熟如糊，先傾取自然汁，將河車于石臼中搗千下，同汁和勻) 生地四兩 龜板 杜仲 天冬 黃柏各兩半 牛膝 麥冬 歸身各兩二錢 人參一兩 五味子五錢

【制法】河車泥加米糊丸。

【劑量及用法】鹽湯溫酒任下，日再服。

五子衍宗丸

一、上海(五子丸)

【功能与主治】補益精氣。

【处方】枸杞子八兩 菟絲子(酒浸)八兩 復盆子(酒洗)四兩 車前子(炒)二兩 五味子一兩

【制法】共研細粉，煉蜜為丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，淡鹽湯送服。

二、南京(五子補腎丸)

【功能与主治】補腎生精。主腰膝痠軟，小便短數。

【处方】枸杞子 菟絲子(酒浸搗成餅)各八兩 復盆子四兩(酒洗

補 益 藥

去蒂) 炒車前子二兩 五味子一兩

【制法】共研細末，加煉白蜜為丸，每錢約做二十粒。

【劑量及用法】每服三錢，一日一次，用開白水或淡鹽水吞服。

三、福州

【功能与主治】治男人精虛無子，陽事不舉。

【处方】菟絲子八兩 枸杞子 復盆子各四兩 五味子 車前子各三錢

【制法】共研細末，蜜煉為丸。

四、杭州

【功能与主治】補腎生精。治男子稟賦不足，腎氣虛弱，房勞過度，精血衰少，陽痿精薄，難于子嗣。

【处方】枸杞子 菟絲子(酒蒸)各八兩 復盆子(酒洗)四兩 車前子(炒)二兩 五味子一兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服三至四錢，淡鹽湯送下。

五、南昌

【功能与主治】補精益腎，腰膝痠軟，陽痿。

【处方】甘枸杞 菟絲子(酒浸)各八兩 五味子一兩 復盆子(酒洗去目)四兩 車前子(炒)二兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，日二服，空腹時開水或淡鹽湯送下。

【禁忌】忌刺激性食物。

六、蘭州

【功能与主治】強壯身體養精。主身體虛弱，夢遺滑精等症。

【处方】復盆子四錢五分 枸杞子八兩 車前子九錢 菟絲子六兩五錢 五味子五錢

【制法】共為細末，蜜小丸。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

七、青島

【处方】枸杞子 五味子 車前子 菟絲子 復盆子各二兩 熟地八兩 山藥四兩 山萸四兩 茯苓二兩 澤瀉二兩 丹皮二兩

【制法】共碾細面，蜜丸桐子大。

八、吉林、哈尔滨 (五子丸)

【功能与主治】添精液，补骨髓，益腦力，强腎部。主腎虛無子，精薄精薄，夢遺精滑，精冷精淡，阳痿不举，腰膝酸軟，四肢無力。

【处方】同南京。

【制法】共为細末，煉蜜为小丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每次服二錢（只限成人服用），日服二次，早晚空心淡鹽水送下。

【禁忌】忌食辛辣。

九、呼和浩特

【处方】熟地 杭莖 山藥各四兩 丹皮 茯苓 澤瀉各二兩 枸杞子 菟絲子 复盆子 楮實子 破故紙各一兩 五味子五錢

【制法】共为細面，蜜小丸。

壬子丸

一、青島

【处方】熟地 山萸 山藥 生地 茯苓 茯神 天冬 麦冬 棗仁 丹參 当归 黃芩 硃砂各一兩

【制法】共軋面，蜜小丸。

二、呼和浩特

【处方】熟地四兩 山藥 山萸 茯苓 生地各二兩 茯神二兩 天冬 麦冬各一兩 黃芩 棗仁 丹參 归身各一兩五錢 硃砂五錢

【制法】共为細面，蜜小丸。

五腰丸

吉林

【功能与主治】滋陰补腎，助阳强心。主心腎不足，阳痿不举，遺精早洩，腎囊潮湿，腰腹作痛，面黃肌瘦，四肢無力等症。

【处方】枸杞 杜仲各六兩 巴戟 益子 川斷 全歸 牛膝 首烏 鎖陽 川附 菟絲子 金櫻子 女貞子 仙茅 菰蓉 茴香 故紙各二兩 申姜二兩二錢 肉桂 柏霜各二兩 熟地四兩五錢 远志二兩三錢 母丁香一兩五錢 鹿腰子

雞腰子 羊腰子 猪腰子 牛腰子各一个

【制法】共为細末，煉蜜为小丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】大人每服二錢，淡鹽水为引，一日服二次，早晚空心服下。

【禁忌】孕妇忌服。

保元丸

一、青島

【处方】鹿膠十斤 小茴香 五味子 淫羊藿 故紙各一斤零四兩 熟地 山藥各二斤半 牛膝各一斤零四兩 沉香二兩 胡蘆巴 菟絲子各一斤零四兩 杜仲十斤 巴戟 益智 远志 杜仲仁各一斤零四兩 甲六兩 茯苓二斤半 山萸 一斤零四兩 全蠍二兩 菰蓉五斤

【制法】共为細末，蜜丸。

二、呼和浩特

【处方】沙苑子 复盆子 山藥 杭莖 龙骨 棗仁 茯苓 芡實 牡蠣 菟絲子 蓮鬚 炙甘草各四兩 炙芪 人參各半斤

【制法】共为細面，蜜小丸。

坎离既济丸

一、上海

【功能与主治】遺精盜汗，煩热咽干。

【处方】生地 熟地各四兩 黃柏（鹽水炒、酒炒）各二兩 怀山藥二兩 天冬 麦冬各四兩 当归（酒炒）二兩 五味子 龟板（炙）各二兩 知母（鹽水炒、酒炒）各二兩 山萸肉 怀牛膝（酒炒）各四兩 川芎一兩 白芍藥（炒）二兩

【制法】共研細粉，煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢，食前淡鹽湯送服。

二、武汉（既济丸）

【功能与主治】口燥舌干，骨蒸發熱，五心煩躁，自汗盜汗，夜夢遺精等症。

【处方】熟地 生地 山萸肉 天冬 麦冬 白芍各四兩（炒） 五味子 当归身 黃柏各二兩（鹽水

炒） 党参四兩 菰蓉 枸杞子 茯苓 茯神 丹皮 澤瀉 棗仁 远志各二兩

【制法】取上药进行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜45~50%迭成小丸，每錢不得少于二十粒。

【剂量及用法】每服二錢，溫開水送下。

三、杭州

【功能与主治】养精补，和血脉，宁神益腎。治勞伤过度，虛火上炎，口燥舌干，煩热盜汗，虛痰咳嗽，夜夢遺精等症。

【处方】大熟地 当归各四兩 川黃柏（鹽水炒）一兩 山萸肉四兩 北沙參一兩 肉桂三錢 怀山藥四兩 川貝母一兩 川黃連三錢 白茯苓一兩 天門冬四兩 炒棗仁 粉丹皮各一兩 麦門冬四兩 炙龟板 澤瀉 生玉竹 地骨皮 知母 防皮各一兩 炙甘草五錢 大生地四兩

【制法】共研細末，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服四錢，淡鹽湯送下。

四、青島（1）

【处方】人參八兩 茯苓半斤 山萸 山藥 当归 牛膝 楮實 杜仲 枸杞 龙骨 菟絲子 远志各四兩 生地 熟地 天冬 麦冬 菖蒲各八兩

【制法】共研面，蜜小丸。

五、青島（2）

（坎离丸）

【处方】黃柏 知母各一斤 童便炮九蒸丸酒九露 熟地四兩

【制法】共研面，蜜小丸。

六、沈陽

【功能与主治】益智宁神，滋补强壯。主腦貧血，头晕头痛，精神倦怠，神昏健忘，怔忡失眠。

【处方】人參五錢 山藥 当归各一兩 石菖蒲五錢 枸杞二兩 天冬 远志各一兩 熟地二兩 山萸 棗仁各一兩 龟板五錢 五味子 麦冬各一兩 龙骨五錢 知母 生地 茯苓 栢仁 黃柏各一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸，二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，清晨空心服，鹽湯送下；冬令用元酒送下。

【禁忌】五辛，菜菔。

七、撫順(坎离丸)

【处方】当归 川芎 白芍 熟地 黄柏 丹皮 澤瀉 山藥 白茯苓 肉桂 知母 山萸各二兩

【制法】共为細末，蜜丸二錢大。

八、吉林(坎离丸、滋陰坎离丸)

【功能与主治】滋陰抑阳。主陰虛火盛，头晕目眩，耳鳴口燥，多夢遺精，晡热心煩，怔忡失眠，精神倦怠等症。

【处方】熟地(酒制)一兩 熟地(酒制) 萸肉 牛膝(酒制) 天冬 寸冬 白芍(酒制)各四兩 五味 山藥 龟板(酥炙)各二兩 知母(酒制)二兩 知母(鹽制)二兩 川柏(酒制)二兩 川柏(鹽制)二兩 川芎一兩

【制法】共研細面，蜜为小丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢，一日二次早晚服，开白水送下。

九、哈尔滨(滋陰坎离丸)

【功能与主治】同吉林。

【处方】当归二兩(酒制) 熟地(酒制) 萸肉 牛膝(酒制) 天冬 寸冬各四兩 白芍二兩(酒制) 五味 山藥 龟板各一兩(酥制) 知母二兩(酒制) 知母二兩(鹽制) 川柏二兩(酒制) 川柏二兩(鹽制) 川芎一兩

【制法】同吉林。剂量及用法亦同。

【禁忌】大便瀉泄，四肢清冷者忌服。

十、呼和浩特(1)(坎离丸)

【处方】当归四兩 川芎 杭芍各二兩 九地四兩 知母 黄柏 肉桂各二兩 茯苓 山藥 杭萸 澤瀉 丹皮各四兩 龙骨二兩

【制法】共为細面，蜜小丸。

十一、呼和浩特(2)(神仙既济丸)

【处方】人参二兩 当归 山藥 杭萸各四兩 杜仲二兩 枸杞一兩 五錢 九地四兩 寸冬 龙骨 柏子仁各二兩 茯苓四兩 金櫻肉一兩九錢 菟絲子 五味各五錢 牛膝二兩 茯苓四兩 炙草一兩五錢

【制法】共为細面，蜜小丸。

附参考古方

【来源】惠直堂經驗方

【功能与主治】治四十岁之前，陰虛火动，將成勞瘵之症。

【处方】当归六兩 川芎一兩 白芍二兩 熟地(酒蒸) 生地 大冬(去心) 麦冬(去心)各四兩 五味子 山藥各二兩 山萸 牛膝各四兩 龟膠二兩(酒化) 知母二兩(鹽水炒) 黄柏九兩(二兩蜜水浸炒，二兩鹽水浸炒，二兩酒浸炒)

【制法】共为末，煉蜜丸。

【剂量及用法】每服二錢，空心鹽湯下。四十以后者，減黄柏。

神仙巨胜子丸

一、青島

【处方】巨胜子六兩五錢 茯苓四兩二錢 枸杞一兩二錢 人参 川附各一兩 首烏 牛膝各四兩 熟地 楮實 茯苓 天冬 桑仁 菟絲子 川断各一兩二錢 虎腔 鹿茸各一兩 肉桂 复盆子 蓮鬚各五錢 沉香二錢 柏子仁 巴戟各一兩二錢 故紙 五味子 韭菜子 山藥 炙實 胡蘆巴 川椒 甘草 各五錢

【制法】共研面，蜜小丸。

二、吉林(巨胜丸)

【功能与主治】补肾、添精神子。治亏腎、夢遺、阳痿等症。

【处方】巨胜子 茯苓 萸肉 怀牛膝 鹿茸 枸杞 茯苓 川断 蓮肉各一兩二錢四分 木香 桑仁 柏仁 故紙 菖蒲 山參 韭子 蓮鬚 天冬 寸冬 炙實 杜仲各六錢七分 白首烏 熟地 生地各二兩七錢 复盆子二錢四分 五味一兩 蒼朮八錢七分 赤首烏二兩七錢 远志六錢七分

【制法】共为細面，煉蜜为丸，每丸如梧桐子大。

【剂量及用法】每日三次，每次二錢，用元酒送下。

柏子仁丸

一、上海

【功能与主治】陰虛火旺，寐則盜汗。

【处方】柏子仁二兩 党参一兩 麦麸(炒)五錢 麻黄根(炙) 白朮(炒) 五味子各一兩 半夏糖(炒)二兩 牡蠣(醋煅)一兩

【制法】共研細粉，用紅棗二兩煮爛，去皮核打和，加煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二至三錢，空腹时溫开水送服。

【禁忌】忌刺激性食物。

二、杭州

【功能与主治】治血虛有热，月經耗損，漸至不通、羸瘦潮热，及室女思慮過度，經閉成癆等症。

【处方】柏子仁 怀牛膝 卷柏各五錢 澤蘭叶二錢 續斷二兩 大熟地二兩

【制法】共研細末，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服二至四錢，气腹时米飲湯或开水送下。

附参考古方

【来源】类症普济本事方。

【功能与主治】戢阳气，止盜汗，进飲食，退經絡热。

【处方】新柏子仁(研) 半夏糖各二兩 牡蠣(甘鍋子内火煅，用醋淬七次，焙干) 人参 麻黄根(煨火炙，拭去汗) 白朮 五味子各一兩 淨熟半兩(炒)

【制法】上为末，漿肉丸，如梧子大。

【剂量及用法】空心米飲下二、五十丸，日二服，得效減一服，如愈即住；作散調服亦可。

桑麻丸

一、上海

【功能与主治】主头眩目花。

【处方】桑叶一斤 黑芝麻四兩

【制法】先將黑芝麻蒸熟搗爛，

加桑叶粉，水泛为丸。

【剂量及用法】每服三錢，温开水送服。

【禁忌】忌刺激性食物。

二、南 京

【功能与主治】主眼目昏花，咳久不愈，肢麻便燥。

【处方】嫩桑叶一斤（最好采取嫩叶洗净晒干）黑芝麻四兩

【制法】共研細末，用白蜜一斤煉透，和末为丸，每錢約做八十粒。

【剂量及用法】每服四錢，一日二次，空腹时用淡鹽水吞服。

三、武汉(扶桑丸)

【功能与主治】主体力羸弱，久咳眼花，肌膚甲錯，風湿麻痺。

【处方】嫩桑叶末一斤 黑芝麻四兩

【制法】上药干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜50~53%，迭成小丸，每錢不得少于二十五粒。

【剂量及用法】每日早晚各三錢，用鹽湯吞服。

四、福州(扶桑丸)

【功能与主治】除風湿，起羸瘦，駐容顏，烏鬚髮，卻病延年。

【处方】嫩桑叶（去蒂洗净晒干，为末）一斤 生芝麻（别号巨胜子，淘淨）四兩 白蜜一斤

【制法】將芝麻搗碎，熬濃汁，和蜜煉至滴水成珠，入桑叶末为丸。

一方：桑叶为末，芝麻蒸搗等分，蜜丸。

【剂量及用法】早鹽湯，晚酒下。

五、杭州(扶桑丸)

【功能与主治】祛風凉热，补肝益腎。治肝陰不足，眼目昏花、痛痒流淚，以及風湿麻痺、髮黃膚糙等症。

【处方】霜桑叶四兩 黑芝麻一兩

【制法】共研細末，水泛为丸。

【剂量及用法】每服三錢，早用淡鹽水湯，晚用溫酒或开水送下。

六、南 昌

【功能与主治】陰虛瘦弱，肌膚枯燥，及久咳不愈。

【处方】嫩桑叶（五月五日，六月六日，立冬日采者佳，去蒂洗净，晒

干，研细）一斤 黑芝麻（淘淨）四兩

【制法】將胡麻搗碎，熬濃汁，和白蜜一斤，煉至滴水成珠，入桑叶末为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每日服二次，每服三錢，早晚米酒兌白开水送下。小孩視年齡及病情酌減，开水化服。

七、撫順(扶桑丸)

【处方】桑叶八兩（元酒九蒸九晒） 黑芝麻一斤

【制法】共为細面，蜜丸三錢大。

三 腎 丸

一、天 津

【功能与主治】滋補腰腎，強陰補陽。主腰腎不足，腰腿痠痛，腎囊湿冷，身体衰弱，倦怠少食。

【处方】鹿腎 驢腎 狗腎各一条 生黃芪 人參（去蘆） 當歸 熟地 龟板（醋制） 茯苓（去皮） 枸杞子各二兩 生於朮 生阿膠 山萸肉（酒蒸） 制附子 羊藿（羊油炒） 蒺藜（鹽炒） 故紙（鹽炒） 菟絲子 魚鱉（滑石燙） 杜仲炭（鹽炒） 鹿茸（去毛）各一兩 肉桂（去粗皮）八錢

【制法】先將方內三腎用水煮爛，連原湯与群药共串一处晒干，共为細粉，煉蜜为丸二錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，白开水送下。

二、蘭 州

【功能与主治】強壯身体，添精補髓，兴奋神經。主身体虛弱，气血不足，阳虛早洩，遺精等症。

【处方】鹿腎五条 狗腎五条 驢腎五条 淫羊藿 云苓 澤瀉 杞子 丹丁香 肉桂 茴香各二斤 木香 菖蒲各四兩 大云五兩 归身二斤 每斤兌广嗣丹面一斤

【制法】共为細面，蜜小丸。

【剂量及用法】每服三錢，鹽开水送下。

【禁忌】阳亢者忌服。

三、大同(壯陽三腎丸)

【功能与主治】壯陽補腎。阳痿不举。

【处方】熟地四兩 龟板二兩

当歸二兩 枸杞三兩 鹿膠二兩 菟蓉二兩 五味子二兩 附子二兩 川斷二兩 牛膝一兩五錢 韭子二兩 菟絲子二兩 故紙一兩 盆子二兩 杜蠟一兩 木瓜一兩 金櫻子二兩 炙芪三兩 玉竹四兩 元肉一兩 炙草一兩 肉桂一兩 杜仲一兩五錢 山萸二兩 云苓三兩 驢腎一条 狗腎一条 鹿腎一条 海馬一对。

【制法】共为細面，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服三錢。

四、禹 县

【功能与主治】腎臟虛弱，精血亏损，阳痿不起，精冷易泄。

【处方】熟地八兩 山藥四兩 丹皮二兩 澤瀉二兩 山萸肉四兩 茯苓二兩 肉桂一兩 附子一兩 鎖陽一兩 菟絲子一兩四錢 枸杞子一兩二錢 巴戟天一兩 破故紙一兩 黃柏一兩 蓮鬚八錢 棗仁八錢 車前子一兩 牛膝一兩 淫羊藿一兩 鹿腎二兩六錢 驢腎二兩六錢 海狗腎三兩六錢

【制法】共为細面，煉蜜为丸如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢，一日二次，早晚白开水送下。

【禁忌】妇人忌用，火热症忌用。

【备考】有效期間二年。

五、沈陽(1)(至宝三腎丸)

【功能与主治】益腎添精，强筋壯骨，促进生殖机能旺盛。主腎虛氣弱，畏寒怕冷，过劳气喘，四肢倦怠，精神不足，腰腿疼痛。

【处方】熟地四兩 海馬一对 肉桂五錢 茯苓二兩 鹿茸二兩 牛膝二兩 澤瀉一兩 虎骨膠二兩 韭子一兩五錢 附子一兩五錢 海狗腎一具 菟絲餅三兩 巴戟一兩 人參一兩 柏子霜一兩 核桃四兩 菟蓉二兩 怀山藥一兩 淫羊藿二兩 盆沉香五錢 故紙二兩 枸杞四兩 青鹽一兩五錢 鹿鞭二条 山萸二兩 驢腎一具 母丁香五錢 車前子一兩 鹿腎膠二兩 复盆二兩 杜仲二兩

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸二錢重。

【剂量及用法】每服一丸淡鹽湯空心服。

六、沈陽(2) (至宝三腎丸)

【功能与主治】补肾添精，强筋壮骨，促进生殖机能旺盛。主肾虚气弱，畏寒怕冷，过劳气喘，四肢倦怠，精神不足，腰腿痠痛。

【处方】肉桂一兩五錢 熟地三兩五錢 山萸肉三兩 山藥二兩 益沉香五錢 茯苓二兩 故紙二兩 澤瀉(鹽炙)二兩 大海馬一對 附子一兩五錢 車前一兩五錢 巴戟二兩 鹿茸一兩 菴蓉二兩 杜仲二兩 韭子一兩五錢 紅人參二兩 菟絲子二兩 復盆二兩 核桃肉四兩 腦髓一具 柏子仁二兩 枸杞四兩 牛膝二兩 鹿鞭五兩 炙羊鞭一兩 青鹽五錢 母丁香一兩 虎腿骨四兩

【制法】共為細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，淡鹽水送下。

七、沈陽(3) (古方三腎丸)

【功能与主治】溫煖腎臟，強精壯髓。主腎臟衰弱，畏寒怕冷，過勞氣喘，四肢疲乏，下焦虛寒，腰腿痠痛，生殖機能減退，一切腎病偏于寒涼者皆能治之。

【处方】熟地六兩 丹皮二兩 廣砂二兩 鎖陽二兩 菴蓉二兩 車前一兩 茯苓二兩 故紙二兩 枸杞二兩 川斷二兩 白朮六兩 附子五錢 川芎八錢 萸肉一兩五錢 懷膝一兩五錢 制草一兩五錢 山藥二兩 杜仲二兩 澤瀉二兩 當歸二兩 羊鞭二兩 絲瓜二兩 白芍一兩 肉桂五錢 廣木香八錢 首烏二兩 黑驢腎一具 黃狗腎一個

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，淡鹽湯送下。

【禁忌】忌食生冷；禁房事。

八、撫順(1) (海馬三腎丸)

【功能与主治】溫補。主心腎不交，陽痿不舉，舉而不堅，堅而不久，夢遺滑精，腎不藏精，精冷自遺，見色即洩，腰痛腿痠，腎子濕涼，小便頻數。

【处方】熟地四兩 附子兩半

盆子二兩 山藥二兩 黃桂五錢 沉香五錢 車前一兩 巴戟二兩 山萸二兩 青鹽五錢 丁香五錢 淫羊鞭一兩 核桃仁四兩 云苓二兩 故紙一兩 寸云二兩 菟絲子二兩 韭子兩半 杜仲二兩 柏子仁二兩 杞子四兩 海馬一對 海狗腎一具 茸一兩 驢腎二兩 龜鹿膠各二兩 丹皮兩半 鹿腎二兩 牛膝二兩 澤瀉兩半

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服二錢，早晚二次服，淡鹽湯送下。

【禁忌】忌食生冷。

九、撫順(2) (至宝三腎丸)

【处方】熟地四兩 附子一兩半 盆子二兩 山藥二兩 肉桂五錢 沉香五錢 車前一兩 巴戟二兩 山萸二兩 青鹽五錢 丁香五錢 羊鞭一兩 核桃仁四兩 白朮二兩 故紙二兩 寸云二兩 菟絲子二兩 韭子一兩半 杜仲二兩 澤瀉一兩半 柏仁二兩 杞子四兩 海馬一對 海龍一兩 狗腎一兩 茸片二兩 驢腎一具 龜鹿膠各二兩 丹皮一兩半 鹿腎膠二兩 牛膝二兩

【制法】共為細面，蜜丸三錢重。

十、撫順(3) (古方三腎丸)

【处方】寸云二兩 母丁二兩 杜仲三兩 羊鞭二兩 附子二兩 牛膝二兩 丹皮一兩半 故紙二兩 白朮二兩 熟地一兩 杞子二兩 韭子二兩 巴戟二兩 核桃仁二兩 驢腎一具 鹿腎一兩半 狗腎一具 澤瀉一兩半 山藥三兩 山萸二兩 肉桂二兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

十一、吉林、哈爾濱

(海馬三腎丸)

【功能与主治】補腎壯陽，添精遺髓，興元陽，種子嗣，烏鬚髮，壯形體，具培元贊化之功。主陽痿，滑精早洩，夢遺，腎虛腰痛，房勞過度，手淫為害，見色即洩等疾患。

【处方】海狗腎一具 黑驢腎一具 花鹿腎一具 大海馬一對 大蛤蚧一對(去頭) 大熟地六兩 胡桃肉四兩 血鹿茸二兩 附子片二兩 上人參二兩 懷山藥二兩 桑

螻蛄二兩 母丁香一兩 黃油桂一兩 紫稍花一兩 韭菜子一兩 山萸肉二兩 復盆子一兩 枸杞子一兩 肉苁蓉一兩 巴戟天一兩 破故紙一兩 淫羊鞭一兩 菟絲餅一兩 上仙茅一兩 蛇床子一兩 畢澄茄一兩 大茴香一兩 小茴香一兩

【制法】將三腎及海馬蛤蚧均各用滑石燙法，燙成存性，再和群藥一處研為細末，煉蜜為丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每日三次，早午晚服之，每服二錢，淡鹽水送下。

十二、呼和浩特 (古方三腎丸)，附：(人參鹿茸丸)

【处方】九地八兩 山萸 山藥 丹皮各四兩 澤夕 茯苓二兩 大料 茴香 枸杞各一兩 杜仲 益智二兩 川斷一兩五錢 狗腎 鹿腎 黑驢腎各一條 廣皮一兩五錢 青鹽一兩 砂仁一兩五錢 炙草八錢

【制法】蜜小丸

【備考】人參鹿茸丸：照方每斤面加鹿茸二錢五分 硫黃三錢 人參五錢 三腎兩二兩

三、腎氣丸

一、青 島

【处方】人參四兩 生地八兩 肉桂二兩 熟地八兩 茯苓八兩 山藥八兩 赤苓六兩 山萸八兩 丹皮八兩 牛膝四兩 澤瀉六兩 枸杞四兩 鎖陽六兩 麥冬四兩 天冬四兩 龜板六兩 五味子四兩 知母二兩 黃柏二兩

【制法】共為細面，煉蜜為小丸。

二、呼和浩特

【处方】熟地 生地 山藥 杭萸各四兩 龜板三兩 枸杞 牛膝 寸冬 天冬各二兩 知母二兩 黃柏二兩 丹皮 茯苓 澤瀉各三兩 鎖陽二兩 人參二兩

【制法】共為細面，蜜小丸。

六味地黃丸

一、北 京

【功能与主治】滋補。主虛損頭暈，目眩耳鳴，腰膝痠軟，小便短少。

【处方】熟地八錢 山茱萸 山藥各四錢 澤瀉 丹皮 茯苓各三錢

【制法】共為細粉，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服三錢，日服二次，溫開水或淡鹽湯送下。

二、天津

【功能與主治】滋陰強壯補血。主身體虛弱，貧血遺精，腰痠腿痛，頭暈目眩，氣弱心跳。

【处方】熟地八兩 山茱萸（酒制） 生山藥各四兩 丹皮 澤瀉 茯苓（去皮）各三兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸三錢重，蠟皮或蠟紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

三、上海

【功能與主治】自汗盜汗，頭暈目眩，腰膝痠軟。

【处方】熟地八兩 懷山藥（炒） 山茱萸肉（酒炒）各四兩 澤瀉（鹽酒炒） 杜仲皮（酒炒） 茯苓各三兩

【制法】共研細粉，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二至三錢，淡鹽湯送服。

四、南京

【功能與主治】養陰補虛。主身體虛弱，頭目眩暈，口燥咽乾，耳鳴齒搖，腰膝痠軟等症。

【处方】同北京。藥量為北京的十倍。

【制法】先將熟地煮爛和余藥共杵成粗末，晒干再研為細末，加煉白蜜為丸，每錢約十粒。

【劑量及用法】每服三錢，一日二次，食前開水吞服。

五、武漢

【功能與主治】頭目暈眩，口燥咽乾，腰腿痠軟，耳鳴耳聾，遺精便血，自汗盜汗，消渴淋瀝，及虛火牙痛等症。

【处方】熟地黃八兩（蒸搗） 山茱萸 山藥（炒）各四兩 丹皮（酒炒）二兩 澤瀉（鹽酒炒）二兩 茯苓三兩

【制法】小丸——取上藥進行干

燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜50—52%，達成小丸，每錢不得少于二十五粒。

人丸——加煉蜜120—130%，和成人丸，每丸重為三錢。

【劑量及用法】每服三至五錢，空腹食前淡鹽湯送下。

六、廣州

【功能與主治】神經虛性亢奮，大暈眩。

【处方】熟地七分 山茱萸五分 丹皮三分 澤瀉四分 淮山一錢 茯苓一錢

【制法】將上列各藥洗淨切碎，晒干隔水蒸透，研成細末，拌蜜糖制成小丸。

【劑量及用法】用淡鹽湯送服。

七、福州

【功能與主治】治腎水虧損，小便淋瀝，頭目眩暈，腰腿痠軟，陰虛發熱，自汗盜汗，憔悴瘦弱，精神疲困，失血失音。水泛為痰病，為腫脹，水制火之劑也。

【处方】熟地黃八兩蒸搗 山茱萸 山藥（炒）各四兩 丹皮 澤瀉 白茯苓各二兩

【制法】共為細末，和地黃膏，加煉蜜為丸梧桐子大。

【劑量及用法】每服七八十丸，空心食前滾白湯或淡鹽湯任下。

八、杭州

【功能與主治】治肝腎虧損，陰血枯竭，憔悴羸弱，腰背痠楚，自汗盜汗，虛熱咳嗽，頭暈目眩，遺精夢洩。

【处方】熟地（砂仁酒拌九蒸九晒）八兩 白茯苓三兩 山茱萸（酒潤）四兩 粉丹皮三兩 懷山藥四兩 澤瀉二兩

【制法】共為細末，煉蜜為丸或水泛丸。

【劑量及用法】每服四錢，空腹淡鹽湯或開水送下。

九、南昌

【功能與主治】陰精不足，虛火上炎。

【处方】熟地八兩 淮山藥（炒） 山茱萸（酒炒）各四兩 澤瀉（鹽酒炒） 丹皮（酒炒） 茯苓各三兩

【制法】共研細面，煉蜜為丸如

梧桐子大。

【劑量及用法】每服三至五錢，空腹食前淡鹽湯或開水送下。

十、沙市

【功能與主治】治肝腎不足，虛火上炎，頭眩口燥，腰痠足痛等症。

【处方】懷熟地（砂仁酒拌以制透為度）八兩 山茱萸（酒潤去子） 淮山藥各四兩 澤瀉 粉丹皮 白茯苓各二兩

【制法】諸藥研細末，蜜丸。

【劑量及用法】每服三錢，空腹或食前用淡鹽湯或白開水下，每日服二次。

【禁忌】體寒及大便滑泄者忌服，孕婦亦忌。

十一、重慶

【功能與主治】治肝腎不足，真陰虧損，虛火上升，面生雀斑，頭目眩暈，咽喉燥痛，口舌瘡裂，耳聾齒搖，腰膝痠軟，遺精夢洩，自汗盜汗。

【处方】同北京。藥量為北京的十倍。

【制法】研為細末，煉蜜和丸，紙盒包裝。

【劑量及用法】一至四錢。

十二、昆明

【功能與主治】頭昏耳鳴，身體虧損，肺熱咳嗽，水分不足。

【处方】熟地八兩 淮藥 桑皮各四兩 茯苓三兩 廣粉皮 澤瀉（鹽炒）各二兩

【制法】研末煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服一丸（水丸每服二錢半），幼童減半，用開水早晚各服一次。

【禁忌】感冒忌服。

十三、西安

【功能與主治】主治神經衰弱，遺精便血，耳鳴目眩，失音咽燥，自汗盜汗，腰背痠楚等肝腎真陰不足之症。

【处方】熟地（砂仁酒拌九蒸九晒）八兩 山茱萸（酒潤） 懷山藥各四兩 粉丹皮 茯苓（乳拌） 建澤瀉各二兩

【制法】蜜制為丸。

【劑量及用法】每服三、四錢，淡鹽湯送下。

十四、蘭 州

【功能与主治】滋陰强壯補血。主身體虛弱，貧血遺精，腰痠腿痛，頭暈目眩，盜汗氣弱心跳等症。

【處方】同北京。藥量為北京的十倍。

【制法】共為細粉，蜜小丸。

【劑量及用法】每次三錢，日服兩次，淡鹽水送下。

十五、大同(六味丸)

【功能与主治】滋陰降火，腎水不足。

【處方】同北京。藥量為北京的十倍。

【制法】共研細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】早晚每服二錢，開水送下。

十六、禹 县

【功能与主治】腎陰不足，氣壅痰嗽，水泛為痰，眼花耳聾，腰腿痠弱，血虛發熱，自汗盜汗，便血諸血。

【處方】同北京。藥量為北京的十倍。

【制法】共為細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢，空心白開水送下或鹽水送下。

【禁忌】胃弱忌用。

【備考】有效期間一年。

十七、濟 南

【功能与主治】身體虛弱，頭目眩暈，耳鳴齒搖，腰膝痠軟等症。

【處方】同北京。藥量為北京的十倍。

【制法】共為細末，蜜為成丸，梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，空心淡鹽湯送服。

【禁忌】生冷等食物。

十八、青 島

【處方】同北京。藥量為北京的十倍。

【制法】共軋面，蜜丸如桐子大。

十九、沈 陽

【功能与主治】補腎强精利尿。主腎氣不足，真陰虧損，精血枯竭，憔悴羸瘦，腰痛足痠，足跟作痛，盜

汗大暈，發熱干嗽，耳鳴遺精，消渴失音。

【處方】同北京。藥量為北京的十倍。

【制法】共軋極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，淡鹽湯空心服。

【禁忌】葱蒜

二十、撫 順

【功能与主治】滋養。主腎水不足，陰虛火炎，耳聾耳鳴，二目昏花，骨熱痠痛，自汗盜汗，夢洩遺精，消渴尿多，腰膝痠軟，乏困無力，肺癆吐血等症。

【處方】同北京。藥量為北京的十倍。

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服二錢，食前淡鹽湯或白開水送下。

【禁忌】忌食辛辣等物。

二十一、吉林(六味丸)

【功能与主治】滋腎水、補精液、強身體、固真元、除骨蒸之邪熱，散浮熱之虛火。主治腎水不足，陰虛作熱，浮火上炎，頭目眩暈，咽干鼻燥，耳鳴耳聾，耄老眼花，骨熱痠痛，小便頻數，遺尿不禁，夢遺脫精，自汗盜汗；消渴，煩渴多飲；並治腰疼腿軟，筋疲骨弱，乏困無力，疲倦喜臥，精神不振。

【處方】熟地五兩三錢四分 山藥 萸肉各二兩六錢七分 茯苓 丹皮 澤瀉各二兩

【制法】將熟地用砂仁酒拌，九蒸九晒，搗膏，萸肉酒浸炒，山藥炒，丹皮酒洗微炒，茯苓乳汁制焙，澤瀉淡鹽酒拌炒，一處研為細面，和地黃膏煉蜜為丸如綠豆大，蜡紙包。

【劑量及用法】每日服一次，大人用二錢，早晚服之，七歲至十二歲，每服一錢，四歲至七歲，每服五分，淡鹽湯或白開水送下。

二十二、哈爾濱(六味丸)

【功能与主治】滋水補腎。主腎水不足，陰虛內熱，虛火上炎，頭暈目眩，咽，鼻燥，耳聾耳鳴，二目昏花，骨熱痠痛，小溲淋瀝，自汗盜汗，夢洩遺精，面生雀斑，水泛為痰；消

渴，煩渴多飲；小溲頻數，腎氣虛衰，遺尿不禁，小溲頻多；腰膝痠軟，筋疲骨軟，乏困無力，疲倦喜臥，精神靡昧；吐血，津虛火旺，血熱妄行，嘔嗽鮮血，胸脇疼痛。

【處方】同北京。藥量為北京的十倍。

【制法】將熟地黃用砂仁酒拌，九蒸九晒，搗膏，山萸肉酒浸炒，淮山藥炒，粉丹皮酒洗微炒，白朮等入乳汁制焙，澤瀉淡鹽酒拌炒，一處軋為細面，和地黃膏加煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，空腹食前淡鹽湯或白開水送下，腰腿痠痛加牛膝杜仲各二兩，小便頻數，去澤瀉加益智仁二兩，月經不調，加香附米二兩（童便浸炒）、艾葉一兩（去筋醋煮）。

【禁忌】忌食辛辣。

二十三、承 德

【功能与主治】主身體虛弱，頭目眩暈，耳鳴齒搖，腰膝痠軟等症。

【處方】熟地八兩 丹皮（酒炒）澤瀉（鹽酒炒） 茯苓各二兩 山藥（炒） 山萸肉（酒炒）各四兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二至三錢，淡鹽湯送下。

二十四、呼 和 浩 特

【處方】同北京。藥量為北京的十倍。

【制法】以上軋細面，蜜小丸。

七味地黃丸

青 島

【處方】肉桂一兩 熟地八兩 山藥 山萸各四兩 茯苓 澤瀉 丹皮各三兩

【制法】共軋面，蜜丸如桐子大。

附參考古方

【來源】瘍區大全。

【功能及主治】治腎水不足，虛火上炎，發熱作渴，口舌生瘡，牙齦潰爛，咽喉作痛或形體憔悴，寢汗發熱。

【處方】熟地黃八兩（酒煮拌膏） 山萸肉（酒潤去核炒） 干山藥（炒）

黃)各四兩 牡丹皮(酒洗微炒)
白茯苓(人乳制焙) 澤瀉(淡鹽酒
拌炒)各二兩 肉桂一兩(應用去皮
忌火勿出氣)

【制法】為末，蜜丸如桐子大。

【劑量及用法】空心淡鹽湯下四錢。

歸芍地黃丸

一、天津、撫順

【功能與主治】滋補養血。主肝腎不足，血虛頭疼，煩躁不寧，腰痠腿軟，盜汗骨蒸。

【處方】熟地八兩 生山藥 山茱萸肉(酒制)各四兩 茯苓(去皮) 丹皮 澤瀉各二兩 當歸 生白芍各二兩 共八味計一斤十二兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，淡鹽水送下。

二、上海

【功能與主治】肝陽上升，大眩耳鳴。

【處方】熟地八兩 山茱萸肉(酒炒)四兩 當歸二兩 茯苓二兩 白芍藥(炒)二兩 牡丹皮(酒炒)三兩 懷山藥(炒)四兩 澤瀉(鹽酒炒)三兩

【制法】共研細粉，煉蜜為丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，溫開水送服。

三、福州(歸芍六味丸)

【功能與主治】治真陰不足，血少氣多，陽盛陰虧，頭眩耳鳴，午後潮熱，肝血不足，兩脇攻痛等症。

【處方】六味地黃丸加當歸、白芍各二兩。

四、杭州

【功能與主治】治肝腎陰虧，虛熱內盛，大眩耳鳴，午後潮熱，兩脇攻痛，手足心熱等症。

【處方】大熟地(砂仁酒拌九蒸九晒)八兩 白茯苓三兩 全當歸三兩 山茱萸肉(酒潤)四兩 粉丹皮二兩 生白芍二兩 懷山藥四兩 澤瀉三兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服三至四錢，開水送下。

五、南昌

【功能與主治】肝腎真陰不足，相火內動，頭暈耳鳴，午後潮熱，或兩脇攻痛，手足心熱。

【處方】當歸二兩 熟地(砂仁酒拌九蒸九晒)八兩 山茱萸(酒潤)四兩 淮山藥四兩 白芍二兩 茯苓(乳拌)三兩 丹皮二兩 澤瀉二兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，空心溫開水送下，每日早晚各一次。

六、沙市

【功能與主治】治貧血，午後潮熱，頭眩耳鳴，或兩脇作痛，手足心熱等症。

【處方】當歸四兩 白芍四兩 熟地八兩 山茱萸四兩 淮藥四兩 茯苓三兩 丹皮二兩 澤瀉三兩

【制法】諸藥八味研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每次服三錢，溫開水下，每日服二次。

【禁忌】體虛無熱及人便滑瀉者忌服。

七、昆明

【功能與主治】補血潤燥。主午後潮熱，大眩耳鳴。

【處方】同沙市。

【制法】研末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服一丸，水吞，每服二錢半，用開水早晚各服一丸。

【禁忌】感冒忌服。

八、蘭州

【功能與主治】滋養補血，主血虛人疼，虛熱咽干，虛汗身疲等症。

【處方】六味地黃丸一斤半 當歸二兩 杭芍二兩

【制法】共為細面，蜜小丸。

【劑量及用法】每次服三錢，早晚空心各服一次，淡鹽湯送下。

【禁忌】脾胃虛寒者忌服。

九、大同

【功能與主治】滋陰降火。

【處方】同沙市。

【制法】共為細面，蜜為丸。

【劑量及用法】早晚每服三錢，開水送下。

十、禹縣

【功能與主治】肝腎雙虧，頭眩耳鳴，午後潮熱，兩脇攻痛，手足心熱，陽盛陰虧。

【處方】同沙市。

【制法】共為細面，煉蜜為丸，每丸重一錢。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

【禁忌】胃弱忌用。

【備考】有效期二年。

十一、濟南

【功能與主治】血虛潮熱，頭眩耳鳴，盜汗遺精。

【處方】熟地八兩 山茱萸四兩(酒炒) 白芍二兩(炒) 當歸二兩(酒洗) 丹皮三兩(酒炒) 山藥四兩(炒) 澤瀉三兩(鹽炒) 茯苓三兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，溫開水送服。

十二、青島

【處方】同沙市。

【制法】共為細面，蜜丸如桐子大。

十三、沈陽

【功能與主治】補肝腎，解郁熱。主肝腎不足，飲食少進，大眩耳鳴，午後潮熱，兩脇攻痛，血虛內熱，四肢無力。

【處方】同沙市。

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】菜飯忌食。

十四、呼和浩特

【處方】照六味地黃丸方加當歸杭芍各四兩

【制法】軋細面，蜜小丸。

知柏地黃丸

一、北京、承德

【功能與主治】除煩渴，退潮熱，

主虛煩口渴，體倦潮熱，盜汗耳鳴。

【處方】熟地八兩（砂仁四錢拌）山茱萸 山藥各四兩 丹皮 茯苓 澤瀉各二兩 知母 黃柏各二兩

【制法】共為細粉，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水或淡鹽湯送下。

【禁忌】忌食刺激乾食物。

二、天津

【功能與主治】除煩渴，退潮熱。主水不火旺，虛煩口渴，身倦潮熱，盜汗耳鳴，身體瘦弱。

【處方】熟地八兩 生山藥 山茱萸肉（酒制）各四兩 丹皮 茯苓（去皮） 澤瀉各三兩 知母 黃柏各二兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，三錢重，蠟皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

三、上海（知柏八味丸）

【功能與主治】主肝壯夢遺，慾念妄動，小便短赤澀痛。

【處方】熟地八兩 懷山藥（炒） 山茱萸肉（酒炒）各四兩 茯苓 牡丹皮（酒炒） 澤瀉（鹽酒炒）各三兩 知母 黃柏各二兩

【制法】共研細粉，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，淡鹽湯送服。

四、南京（知柏八味丸）

【功能與主治】主陰虛火旺，勞熱虛煩，耳鳴咽疼，夢遺盜汗等症。

【處方】肥知母二兩 川黃柏各二兩 白茯苓 建澤瀉 牡丹皮各三兩 懷山藥 山茱萸肉各四兩 熟地八兩

【制法】共研細末，加煉白蜜為丸，每錢約做十五粒。

【劑量及用法】每服三錢，一日二次，開水吞服。

五、武漢

【功能與主治】主骨蒸勞熱，腰痛耳鳴，骨蒸咽痛，虛煩盜汗。

【處方】熟地黃八兩（砂仁四錢拌） 山藥（炒） 山茱萸肉（酒潤，炒）各四兩 茯苓 丹皮（酒洗，微炒） 澤瀉（淡鹽、酒拌炒）各三兩 知母

黃柏各二兩。

【制法】小丸 一取上藥進行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜50—52%，達成小丸，每錢不得少于二十五粒。

大丸 一加煉蜜 130—140%，和成人丸，每丸重為二錢。

【劑量及用法】每服一至六錢。

六、廣州（知柏八味丸）

【功能與主治】主神經衰弱，口乾，頭暈，心悸。

【處方】地黃一錢 山萸 澤瀉 丹皮各六分 知母八分 淮山藥 云苓各一錢二分 黃柏四分

【制法】洗淨切碎，隔水蒸透，晒干研成細末，拌蜜糖制成小丸。

七、杭州

【功能與主治】治腎陰虧損，虛熱旺盛，骨蒸髓枯，夜熱盜汗，虛煩骨蒸，耳鳴遺精等症。

【處方】大熟地（砂仁酒拌，九蒸九晒）八兩 白茯苓 知母（鹽水炒） 粉丹皮 黃柏（鹽水炒）各三兩 山萸肉（酒潤） 懷山藥 澤瀉各四兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服四錢，淡鹽湯送下。

八、南昌

【功能與主治】主陰虛火旺，頭目眩暈，耳鳴口干，遺精盜汗，腳膝痠軟，骨蒸煩熱，齒搖痛不腫，小便淋瀝澀痛。

【處方】知母（鹽水炒） 黃柏（鹽水炒） 云茯苓 丹皮 澤瀉各二兩 山茱萸 淮山藥各四兩 熟地八兩

【制法】共研細面，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，日服二次，淡鹽湯或溫開水送下。

【禁忌】陽虛畏寒，足冷自汗，小便遺瀝不禁，及脾胃虛弱，腹滿不食，經常泄瀉者忌服；忌食蘿蔔。

九、沙市

【功能與主治】治水份不足，虛性充血，咽痛耳鳴，勞熱骨蒸，虛煩盜汗，骨蒸髓枯等症。

【處方】同杭州，制法亦同。

【劑量及用法】每服三錢，日服

二次，空腹或食前用淡鹽湯或白開水下。

【禁忌】體虛無熱者忌服，孕婦亦忌。

十、重慶

【功能與主治】主相火旺盛，咽痛耳鳴，骨蒸勞熱，虛煩盜汗，骨蒸髓枯等症。

【處方】同南京。

【制法】研為細末，煉蜜和丸，紙盒包裝。

【劑量及用法】一至五錢。

【禁忌】陰虛者忌服。

十一、蘭州

【功能與主治】滋養補血。主潮熱往來，虛煩口渴，水不火旺，身體瘦弱諸症。

【處方】六味地黃丸面一斤半 知母 黃柏各二兩

【制法】共研細面，蜜為小丸。

【劑量及用法】每次服二錢，日二次，白開水送下。

【禁忌】脾胃虛弱者忌服。

十二、大同

【功能與主治】滋陰降熱。

【處方】同南京。

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】早晚每服三錢，開水送下。

十三、禹縣

【功能與主治】主腎臟虛損，腰疼耳鳴，腎水不足，骨蒸潮熱，遺精便血，盜汗虛煩，消渴淋濁，失血虛勞。

【處方】同南京。

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】腎寒忌用。

【備考】有效期間一年。

十四、濟南

【功能與主治】主腰痛耳鳴，虛煩盜汗。

【處方】同南昌。

【制法】共為細末，煉蜜為小丸，梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】忌食生冷、菜菔、葱、蒜等。

十五、青島

【处方】同南京。

【制法】共軋面，蜜丸如桐子大。

十六、沈陽

【功能与主治】滋養強壯，補腎降火。主腎虛火動，骨蒸髓枯，咽痛勞熱，骨蒸虛煩，頭暈耳鳴，心煩不寐，夢遺滑精，牙痛衄血，一切腎虛有熱。

【处方】同南京。

【制法】以熟地搗膏，余則碾細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空心淡鹽水送下。

【禁忌】忌食菜菔、葱、蒜。

十七、撫順

【处方】同南昌。

【制法】共為細面，蜜丸，二錢重。

十八、哈爾濱 (知柏八味丸)

【功能与主治】滋陰清火。治陰虛火盛，耳鳴目赤，鼻干咽燥，口舌糜破，骨蒸虛煩，盜汗食減，消瘦無力，神倦遺精，小溲疼痛，咳嗽痰血，陽事易舉。

【处方】熟地黃八兩 山萸肉 淮山藥各四兩 粉丹皮 白朮 茯苓 建澤瀉各二兩 鹽知母 鹽黃柏各一兩半

【制法】共碾為面，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，空腹淡鹽水送下。

【禁忌】忌食辛辣。

十九、呼和浩特

【处方】照六味地黃丸方 加知母 山柏各一兩

【制法】軋細面，蜜小丸。

麥味地黃丸

一、北 京

【功能与主治】滋養生津。主口渴煩熱，倦怠咳嗽。

【处方】熟地 山藥各五百七十

六兩 丹皮 山萸肉 茯苓 澤瀉 麥冬各一百四十四兩 五味子七十六兩

【制法】共為細粉，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服三錢，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天 津

【功能与主治】滋養生津。主口渴煩熱，身體倦怠，虛火上升，陰虛咳嗽。

【处方】熟地八兩 生山藥四兩 山萸肉四兩(酒制) 茯苓(去皮) 丹皮 澤瀉各二兩 麥冬 五味子(酒蒸)各二兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸三錢重，貼皮或蠟紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

三、上 海

(八仙長壽丸、五麥八味丸)

【功能与主治】遺精，潮熱，盜汗。

【处方】熟地八兩 懷山藥(炒) 山萸肉(酒炒)各四兩 茯苓 牡丹皮(酒炒) 澤瀉(鹽酒炒) 麥冬各二兩 五味子二兩

【制法】共研細粉，煉蜜為丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每服四錢，食前淡鹽湯送服。

四、福州(八仙長壽丸)

【功能与主治】治真陰大虧，金水相涸，五心煩熱，痰中見紅，筋脈痠楚，羸弱消瘦，咳嗽咯血等症。久服生精益血，形神壯健，却病延年。

【处方】熟地八兩 山藥(炒) 山萸肉各四兩 丹皮 澤瀉 茯苓 麥冬各二兩 五味子一兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

五、杭州(八仙長壽丸)

【功能与主治】保肺補腎，滋陰益血。治陰虛咳嗽，吐血遺精，面容憔悴，虛損耳鳴，潮熱盜汗等症。

【处方】熟地(砂仁酒拌九蒸九晒)八兩 白茯苓 麥門冬 澤瀉 粉丹皮各二兩 五味子二兩 懷山藥 山萸肉(酒潤)各四兩

【制法】共為細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服四錢。空腹淡鹽湯送下。

六、沙市(八仙長壽丸)

【功能与主治】治水份不足，咳嗽潮熱，遺精盜汗等症。

【处方】熟地黃八兩 淮藥四兩 山萸肉四兩 澤瀉二兩 粉丹皮三兩 茯苓三兩 北五味二兩 麥冬二兩

【制法】諸藥研極細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每次服三錢，用淡鹽湯或溫開水下，每日服二次。

【禁忌】體寒痰多及大便滑泄者忌服。

七、重慶(八仙長壽丸)

【功能与主治】專治陰虛火盛，金水不足，咳嗽吐血，遺精潮熱，盜汗等症。

【处方】熟地八兩 山萸肉 山藥各四兩 牡丹皮 茯苓 澤瀉 麥冬各二兩 五味二兩

【制法】共為細面，煉蜜為丸，紙盒包裝。

【劑量及用法】每服三錢。

八、蘭 州

【功能与主治】滋養補血，止渴生津。主腿腳無力，津液不足，虛火上升，口渴，心內煩熱，肺虛咳嗽。

【处方】六味面一斤半 麥冬三兩 五味子三兩

【制法】將前藥軋細面，蜜小丸。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

【禁忌】脾胃虛寒者忌。

九、大同(麥味丸)

【功能与主治】陰虛火壯，腎水不足。

【处方】熟地八兩 山萸肉 山藥各四兩 茯苓 澤瀉 丹皮各二兩 麥冬 五味子各二兩

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

【劑量与用法】早晚每服三錢，開水送下。

十、禹 县

【功能与主治】腎水不足，咳嗽痰血，眼目昏花，盜汗遺精，腰疼耳

鳴，心火發熱。

【處方】熟地八兩 白茯苓三兩
山藥四兩 澤瀉三兩 山萸肉四兩
麥冬 牡丹皮 五味各三兩

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢，空心淡鹽湯送下。

【禁忌】胃弱便溏忌用。

【備考】有效期間一年。

十一、濟南、承德

【功能與主治】休虛咳嗽，耳鳴目昏，口渴咽干，遺精盜汗。

【處方】熟地八兩 山藥四兩（炒） 澤瀉（鹽炒） 茯苓 丹皮（酒炒）各三兩 五味子二兩 麥冬三兩 山萸肉四兩（酒炒）

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，如梧桐子大（承德蜜丸重三錢）。

【劑量及用法】每服一錢，食前淡鹽湯送服。

十二、青島

【處方】麥冬二兩 五味子一兩 熟地八兩 山藥 山萸各四兩 茯苓 澤瀉 丹皮各三兩

【制法】共為細面，蜜丸，如桐子大。

十三、沈陽

【功能與主治】生津解熱，滋補強壯。主腎水不足，心胸煩熱，口渴咽干，午後發熱，鼻干鼻衄，大便干燥，小便赤澀，干咳頭暈，虛煩不寐。

【處方】同沙市。

【制法】前七味共碾極細面，地黃一味搗膏，少加煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空心淡鹽湯送下。

十四、撫順

【處方】寸冬 五味 熟地各一兩 山藥 山萸各四兩 丹皮 白茯苓 澤瀉各三兩。

【制法】為細面，蜜丸三錢大。

十五、吉林、哈爾濱 （麥味丸、八仙長壽丸）

【功能與主治】滋陰清燥。主治：腎水不足，耳鳴目眩，頭昏體倦，四肢痠軟，骨蒸發熱，夢遺滑精，自汗盜汗，或消渴症，飲水多

而不小便者。並治肺燥咳嗽，干咳無痰，痰咳帶血，骨蒸發熱，自汗煩渴。

【處方】熟地黃八兩 淮山藥 山萸肉各四兩 丹皮 塊苓 澤瀉 門冬各三兩 五味子一兩半

【制法】共研細面，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，空腹白開水服。

【禁忌】忌食辛辣；孕婦忌服。

十六、呼和浩特

【處方】照六味地黃丸方，加麥冬二兩 五味子一兩

【制法】軋細面，蜜小丸。

柴芍六味丸

福州

【功能與主治】滋腎，平肝，益陰養血。治血虛，肝燥，骨蒸內熱等症。

【處方】六味地黃丸加柴胡 白芍各一兩

參麥六味丸

一、上海

【功能與主治】虛勞咳嗽，內熱口燥。

【處方】熟地八兩 澤瀉（鹽酒炒）北沙參 山萸肉（酒炒） 淮山藥各四兩 麥冬 茯苓 牡丹皮（酒炒）各三兩

【制法】共研細粉，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，溫開水送服。

二、福州

【功能與主治】治真陰不足，金水並虧，肺損咳嗽，口渴咽干，咽喉作痛，骨蒸盜汗及遺精淋濁等症。

【處方】六味地黃丸加入參四兩 麥冬三兩 澤瀉一兩

三、杭州

【功能與主治】治肺腎兩虛，咳嗽氣喘，咽痛口燥，潮熱咯血，一切陰虛勞熱等症。

【處方】大熟地（砂仁酒拌，九蒸九晒）八兩 北沙參 淮山藥 山萸肉（酒潤）各四兩 白茯苓 粉丹

皮 麥門冬 澤瀉各三兩

【制法】共為細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服三至四錢，開水送下。

【備考】此丸一方用黨參，而治陰虛肺熱當以北沙參為宜。

滋陰八味丸

一、福州

【功能與主治】治陰虛火盛，下焦濕熱等症。

【處方】山藥四兩 丹皮 茯苓各三兩 山萸肉四兩 澤瀉 黃柏（鹽水炒）各三兩 熟地八兩（蒸搗） 知母（鹽水炒）三兩

【制法】共為末，加煉蜜搗丸，梧桐子大。

【劑量及用法】空心或午後，用滾白湯或淡鹽湯，送下百餘丸。

二、杭州

【功能與主治】滋陰退熱。治男婦陰虛，兩耳虛鳴，煩熱盜汗，以及小兒骨蒸內熱症。

【處方】大熟地七兩 制首烏三兩 青蒿子二兩 淮山藥 麥門冬 桑葉各三兩 粉丹皮二兩 知母三兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服一至四錢，淡鹽湯或開水送下。

都氣丸（七味都氣丸）

一、上海

【功能與主治】陰虛咳嗽，津液枯燥，咽痛聲啞。

【處方】五味子一兩 熟地八兩 淮山藥（炒） 山萸肉（酒炒） 澤瀉（鹽酒炒） 牡丹皮（酒炒） 茯苓各三兩

【制法】共研細粉，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，淡鹽湯送服。

二、南京

【功能與主治】滋腎，納氣。主陰虛咳嗽，虛喘浮腫，久咳失音咽痛等症。

【處方】五味子 白茯苓 粉丹皮 建澤瀉各三兩 大熟地八兩

怀山药 山萸肉各四兩

【制法】共研細末，煉蜜为丸，每錢約二十粒。

【剂量及用法】每服二錢，一日兩次，開水吞服。

三、武 汉

【功能与主治】主咳嗽，滑精，痰喘不得臥。

【处方】熟地八兩 山萸 山茱萸 澤瀉各四兩 丹皮 茯苓 五味子各二兩

【制法】取上藥进行干燥，混合碾細，照粉量加煉蜜50—52%迭成小丸，每錢不得少于二十五粒。

【剂量及用法】每次三錢，早晚各服一次，開水送下。

四、福 州

【功能与主治】治虛嗽，虛喘，陰虛咳嗽，水泛为痰，喘不得臥等症。

【处方】熟地八兩 山茱萸 山萸(炒)各四兩 丹皮 澤瀉 茯苓各二兩 五味子二兩

【制法】共研細末，煉蜜为丸。

五、杭 州

【功能与主治】治陰虛痰嗽，腎不納氣，喘不得臥，津液枯燥，咽痛音啞等症。

【处方】同南京。大熟地用砂仁酒拌，九蒸九晒。

【制法】共研細末，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服四錢，淡盐湯送下。

六、南 昌

【功能与主治】主腎虛气喘，勞咳精滑等症。

【处方】熟地黄八兩 建澤瀉 粉丹皮 白茯苓 淮山藥各二兩 山茱萸四兩 北五味一兩

【制法】研極細面，煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服三錢，淡盐湯送下。

【禁忌】胃寒吐酸水，食慾不振，以及外邪未除均忌服。

七、沙 市

【功能与主治】滋腎納氣。治腎水不足，肺弱咳嗽，喘不得寧等症。

【处方】同南京。怀熟地用砂仁

酒拌，以制透为度，山萸肉酒潤去子。

【制法】諸藥研細末，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每次服三錢，空腹用淡盐湯或白開水下，日服一次。

【禁忌】肺炎痰多者忌服。

八、重 庆

【功能与主治】滋腎納氣。治陰虛咳嗽，水泛为痰，腎水不固，滑精，津液枯燥，喘不得臥，咽痛声啞。

【处方】同南京。

【制法】共碾細末，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服三錢，淡鹽湯下。

九、禹 县

【功能与主治】主陰虛癆嗽，虛火上炎，口燥舌干，咽喉疼痛，痰血失音。

【处方】同南京。

【制法】共为細面，煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服三錢，白開水送下。

【禁忌】胃弱忌用。

【备考】有效期間二年。

十、青 島

【处方】同福州。

【制法】共軋面，蜜丸如梧桐子大。

十一、呼 和 浩 特

【处方】照六味地黃丸方，加五味子一兩

【制法】軋細面，蜜小丸。

附参考古方

【来源】医方集解。

【功能与主治】治勞嗽。

【处方】地黃(砂仁酒拌，九蒸，九晒)八兩 山茱萸肉(酒潤) 山萸各四兩 茯苓(乳拌) 丹皮 澤瀉 五味各二兩

【制法】蜜丸。

【剂量及用法】空心盐湯下，冬酒下

獼 肝 丸

南 昌

【功能与主治】傳尸癆瘵及鬼挂一門相染。

【处方】獼肝(新鮮者)一具

【制法】陰干陳酒浸透，再陰干研末，神糲水泛为丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每日服三次，每服二錢，開水送下。非經區所处方不得使用。

三 才 丸

福 州

【功能与主治】治五臟陰虛，生津潤燥，肺腎虛癆，不咳不嗽之症。

【处方】天冬 熟地 人參等分

【制法】上为末，煉蜜为丸

滋陰降火丸

昆 明

【功能与主治】煩熱干咳，咽干舌燥，牙痛口渴等症。

【处方】熟地八兩 淮藥 桑皮各四兩 茯苓 粉丹 澤瀉(鹽炒)各二兩 知母 黃柏各一兩

【制法】研末，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服一丸，水丸每服二錢半，幼童減半，用開水早晚各服一次。

【禁忌】感冒及實熱症忌服。

滋補大力丸

一、北 京

【功能与主治】養血生精，強壯筋骨，活絡止痛。主身體虛弱，腰膝痠軟，跌傷血瘀，筋骨疼痛。

【处方】熟地四兩 酸棗仁 菟絲子 冬朮 山茱萸 龟板(炙) 茯苓 枸杞子 杜仲 山藥各二兩 當歸二兩 地龍肉五錢 虎骨二兩(炙) 土鱉虫二十只 白芍 復盆子 自然銅(煅) 肉蓯蓉 補骨脂各一兩 大青鹽 乳香 沒藥各三錢

【制法】鱉魚一條，酒煮去骨和群藥共为細粉，煉蜜为丸，重二錢。

【剂量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水或黃酒送下。

二、福 州

【功能与主治】健脾開胃，強筋壯骨，填精髓。治五臟虛衰，勞傷諸損。

【处方】熟地四兩 山藥 茯苓

杞子 桑仁 莢肉 当归 冬朮
杜仲 菟絲 龟版 虎骨各二兩
白芍 菴蓉 补骨脂 复盆子
自然銅(醋煅)各一兩 青鹽 乳香
沒藥各二錢 地龙五錢 地鳖虫二十个

【制法】共研末，用大黃鱉一条煮熟去骨，同熟地打爛，加蜜为丸。

三、青 島

【处方】当归 川断 麦冬 自然銅 土龜各一兩 白朮 茯苓 牛膝 白芍 枸杞各二兩 菴藜四兩 人參 魚鱉各一兩五 馬錢子三兩

【制法】共为細面，蜜为丸。

四、承 德

【功能与主治】养血生精，强壯筋骨，活瘀止痛。主身体衰弱，腰膝痠軟，跌伤血瘀，筋骨疼痛。

【处方】虎骨十一斤四兩 甘草 黃耆 当归 陈皮 菟絲餅 續断 甜瓜子 枸杞子 巴戟 白芍 白朮 砂仁 山藥 申姜 杜仲 茯苓 川牛膝 破故紙 熟地 川芎 木瓜 菴蓉各一斤十四兩 乳香 自然銅 土龜虫 沒藥 地龙肉各五兩 沙苑菴藜十一斤十四兩 人參一斤八兩 川附子 川烏各十兩

【制法】共軋細面，煉蜜为丸，重三錢，硃砂为衣。

【剂量及用法】每服一丸，日服二次，溫开白水或黃酒送下。

五、呼 和 浩 特

【处方】当归 川断 麦冬 自然銅 土龜各七兩 茯苓 牛膝 杭芍 枸杞各十四兩 菴藜一斤四兩 人參二兩五錢 魚鱉十兩五錢 熟地一斤五兩

【制法】共为細面，蜜大丸，重三錢。

二 至 丸

一、上 海

【功能与主治】老人腎虛，头晕眼花，腰背痠痛，下肢痠軟。

【处方】旱蓮草 女貞子各四十兩

【制法】將女貞子研細粉，以旱蓮草煎汁成膏，和勻，加煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服三錢，溫开水送下。

二、南 京

【功能与主治】滋養。主腰膝痠軟，头痛头眩。

【处方】女貞子(最好于冬至日采用为佳) 旱蓮草(最好于夏至日采用为佳) 各四兩

【制法】前藥共研細末，煉蜜为丸，每錢約二十粒。

【剂量及用法】每服三錢，淡鹽開水吞服。

三、杭 州

【功能与主治】壯筋健骨，补腎滋陰。治气血亏損，腎陰虛弱，腰背痠痛，足膝無力。

【处方】女貞子(冬至日采陰干，加蜜酒蒸透擦去皮) 旱蓮草(夏至日采，打汁熬膏)

【制法】上將女貞子九蒸九晒，研为細末，以旱蓮草膏酌加煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服四錢，空腹时用胡桃肉細嚼服之，以淡鹽湯或溫酒送下。

青 娥 丸

一、上 海

【功能与主治】腰腿痠軟，头晕耳鳴，溺有余瀝。

【处方】杜仲(鹽酒炒)八兩 核桃肉(青鹽二兩炒)六十只 补骨脂(酒炒) 蒜头各八兩

【制法】先將蒜头煮爛，和余藥搗勻焙干，研細粉加煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢，食前溫开水送服。

二、武 汉

【功能与主治】体虛勞傷，腰部痠重或疼痛如折，及妊娠腰痛。

【处方】补骨脂八兩(酒炒) 杜仲十六兩(去粗皮，鹽酒炒斷絲，或用姜二兩半，浸汁炒) 胡桃肉二兩 蒜四兩

【制法】小丸 一 先取胡桃肉榨油，將油留存，再取蒜同群藥搗勻，进行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜40~42%，並留存的油加入，迭成

补 益 类

小丸，每錢不得少于二十五粒。大丸——加煉蜜75~80%，並留存的油，和成大丸，每丸重为二錢。

【剂量及用法】每服二錢，空腹鹽湯或溫酒送下。

三、福 州

【功能与主治】益精补阳，烏鬚壯脚力。治腎虛腰痛。

【处方】破故紙四兩(炒香) 杜仲淨八兩(姜湯炒) 胡桃肉十兩

【制法】上为末，用蒜四兩搗膏和丸，桐子大。

【剂量及用法】每服三、五十丸，空心溫酒送下。

【备考】一法：不用蒜，或煉蜜为丸，服者更佳。酒糊为丸亦可。

四、杭 州

【功能与主治】补腎养血，祛風除濕。治腎氣虛寒，腰背痠痛，不能轉側，腿膝軟弱，难以行动及妊妇腰腹背痛等症。

【处方】补骨脂(酒炒)四兩 杜仲(姜汁炒)八兩 胡桃肉(連衣)五十枚 青鹽一兩 大蒜头(姜炒熬膏)四兩

【制法】研为細末，將胡桃肉、青鹽、大蒜头共搗成膏，略加米糊为丸。

【剂量及用法】每服三錢，溫酒或淡鹽湯送下。

五、大 同

【功能与主治】腎水不足，腰困腿痠。

【处方】破故紙四兩 杜仲半斤 核桃仁十兩 巴戟 菴蓉 生大茴各四兩

【制法】共为細面，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服三錢。

六、青 島

【处方】故紙(鹽炒) 杜仲(姜汁炒) 核桃三十个

【制法】前二味研細，再加核桃肉搗均，变成膏，和蜜为丸。

七、沈 陽

【功能与主治】强筋，壯骨，止痛。主腰腿痠痛，足膝無力，耳聾耳鳴，头晕目昏。

【处方】破故紙 杜仲 草薢

牛膝 黃柏 知母各四兩 胡桃肉八兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸。

【禁忌】禁房事。

八、撫順(神效青娥丸)

【處方】牛膝 杜仲 萆薢各二兩 故紙四兩 元柏 知母各五錢 桃肉八兩 熟地四兩 山萸 白芍 當歸各二兩 丹皮 小茴香各一兩 砂仁五錢。

【制法】共為細面，蜜丸二錢大。

九、哈爾濱

【功能與主治】益精助陽，烏鬚壯力。治腎虛腰痛，精冷腎虛，腰脊痠痛，筋骨疲軟，大暈耳鳴，壯年髮白，神氣蕭索。妊娠腰腹背痛，妊娠期間，血分不充，營養不足，腰腹背痛。

【處方】補骨脂(酒炒) 杜仲各四兩(去粗皮鹽酒炒斷絲，或生薑二兩五錢擦臍炒)。

【制法】共碾極細面，用胡桃三十枚(連皮)和青鹽一兩同搗成膏，少入煉蜜為小丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，空腹時溫酒送下。

【禁忌】忌食生冷。

【備考】一方有大蒜四兩，姜炒熬膏。

附參考古方

【來源】太平惠和劑局方。

【功能與主治】治腎氣虛弱，風冷乘之，或血氣相搏，腰痛如折，起坐艱難，俛仰不利，轉側不能，或因勞役過多，傷于腎經，或處卑濕地氣傷腰，或墮墮傷損，或風寒客搏，或氣滯不散，皆令腰間似有物重墜，起坐難辛者，悉皆治之。

【處方】胡桃肉三十箇(去皮膜，別研如泥) 補骨脂(用芝麻同于銀器內，炒熟) 杜仲皮(去粗皮剉，麩炒，黃色，去麩，乘熱，略杵碎，又用酒洒勻，再炒)各六兩

【制法】上為細末，入研藥，令勻，酒糊丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三五十丸，溫酒鹽湯下，空心食前服。

立安丸

沈 陽

【功能與主治】健腰溫腎，舒筋壯骨。主腰腿疼痛，足膝無力，腎囊濕痒，四肢拘急，精神不振，形容憔悴，筋骨疼痛，腰腎虛寒。

【處方】破故紙 木瓜 杜仲 牛膝 續斷 萆薢各一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空腹時溫酒或鹽湯送下。

補腎丸

沈 陽

【功能與主治】鎮陽固精，滋陰補腎。主腎水不足，陰虛陽亢，頭暈咳嗽，腰膝痠痛，四肢無力，夢遺滑精等症。

【處方】黃柏 知母 龜板 鎮陽 天門冬 白芍藥各二兩 熟地黃五兩 枸杞子三兩 干姜五錢 五味子一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空心炒鹽湯送下。

附參考古方

【來源】1. 申視瑤函。

【處方】杜仲(姜汁炒) 牛膝(酒洗) 陳皮各二兩 黃柏(鹽水炒) 龜板(酥制各四兩) 五味子夏加一兩(焙干) 干姜冬加五錢(炒)

【制法】以上為細末，煉蜜為丸，如桐子大。

【劑量及用法】每服三十丸，空心鹽湯送下。

【備考】按黃柏、龜板、杜仲、牛膝，皆濡潤味厚物也，故能降而補陰，復用陳皮假以疏滯，夏加五味者，扶其不勝之令也，冬加干姜者壯其無光之火也，經曰：“無伐天和此之謂爾”。

2. 沈氏尊生書。

【功能與主治】腎水不足陰虛。

【處方】酒龜板四兩 酒黃柏 酒知母各二兩 干姜一兩

【制法】粥丸。

【劑量及用法】空心鹽湯下。

增精補腎丸

沈 陽

【功能與主治】助腎增精，強壯滋補。主腎虧陽痿，夢遺滑精，頭暈腰痠，筋骨無力，四肢倦怠，虛損等症。

【處方】菟絲子二兩 五味子五錢 枸杞 石斛 熟地黃 復盆子 楮實子 萆薢 車前子 沉香各一兩 附鹽五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，淡鹽湯送下。

【禁忌】生冷食品。

安神固精丸

沈 陽

【功能與主治】滋補強心，固精安神。主夜夢遺精，虛弱盜汗，心跳耳鳴，煩躁不寧，頭目眩暈，精神衰弱，倦怠無力，睡眠不安。

【處方】蓮子肉二兩 當歸一兩 金櫻一兩 芡實 茯神 龍骨 鎮陽 牡蠣各八錢 肉桂四錢 川連二錢 遠志 棗仁 蓮鬚各六分 生地 黃柏 知母各五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空心淡鹽水送下。

【禁忌】五辛烟酒。

加味腎氣丸

上 海

【功能與主治】由于腎虛而發生腰重，腳腫，小便失利等症。

【處方】熟地黃 肉桂 附片 淮牛膝各五錢 云茯苓 山萸肉 車前子 澤瀉 山藥各一兩 丹皮一錢

【制法】小丸——上藥干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜50—52%，選成小丸，每錢不得少于二十五粒。

大丸——加煉蜜115—120%，和成大丸，每丸重為二錢。

【劑量及用法】每服二錢至四錢。

附参考古方

【来源】所生方。

【功能与主治】肾虚腰重，脚腫，小便不利。

【处方】附子(炮)二箇 白茯苓 澤瀉 山茱萸(取肉) 山藥(炒) 車前子(西莢) 牡丹皮各一兩(去水) 官桂(不見火) 川牛膝(去蘆酒浸) 熟地黄各半兩

【制法】七为細末，煉蜜为丸如桐子大。

【用法和用量】每服七十丸，空心米飲下。

金鎖固精丸

一、上 海

【功能与主治】精关不固，夢遺滑洩。

【处方】潼蒺藜(炒) 芡实各二兩 龙骨(煨)一兩 蓮鬚二兩 牡蠣(鹽水煨)一兩 蓮子四兩

【制法】共研細粉，水泛为丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每服三錢，空腹时淡鹽湯送服。

二、南 京

【功能与主治】主精关不固，無夢滑精。

【处方】沙苑蒺藜二兩 煨花龙骨一兩 芡实二兩 煨牡蠣一兩 蓮鬚 蓮子各二兩

【制法】共研細末，用沸水候溫泛丸，每錢約計八十粒。

【剂量及用法】每服三錢，一日一次，临臥时淡鹽湯吞服。

三、武 汉

【功能与主治】滑精早洩，夢遺盜汗，腰痛耳鳴，头晕目眩等症。

【处方】沙苑蒺藜二兩(炒) 龙骨(煨) 牡蠣各一兩(煨) 蓮鬚二兩 芡实各一兩 蓮子四兩

【制法】上药干燥，混合碾細，用淨水迭成小丸，每錢不得少于三十粒。

【剂量及用法】每服三錢，空腹淡鹽湯送下。

四、广州(固精丸)

【功能与主治】精神亏损。

【处方】蒺藜 熟蓮子 熟芡实 各一兩 煨牡蠣 煨龙骨各一兩 新蓮鬚一兩

【制法】將药洗淨，切碎蒸熟，焙干，研成粉末，煉蜜为小丸。

【剂量及用法】用淡鹽水送服，每服一錢。

五、福 州

【功能与主治】治夢遺滑精，以及陰虛煩勞，心煩內熱，心腎不交等症。

【处方】芡实(蒸) 蓮鬚 沙苑蒺藜(炒)各二兩 龙骨(酥炙) 牡蠣(鹽水煮一日一夜，煨粉)各一兩

【制法】共研細末，蓮子粉为糊丸。

【剂量及用法】鹽湯或酒下。

六、杭 州

【功能与主治】固气攝精，止滑脫。治真元亏损，心腎不交，夢遺滑精，盜汗虛煩，腰痠耳鳴，四肢無力等症。

【处方】潼蒺藜 蓮鬚各二兩 牡蠣(鹽水煨)一兩 芡实二兩 煨龙骨一兩 蓮子肉二兩

【制法】共研細末，水泛为丸。

【剂量及用法】每服三至四錢，空腹时淡鹽湯送下。

七、南 昌

【功能与主治】治虛煩盜汗，心腎不交，夢遺滑精，腰痛耳鳴，四肢無力。

【处方】沙苑蒺藜(炒) 芡实(蒸) 蓮鬚 炙酥龙骨 牡蠣(鹽水炒)各二兩

【制法】共研細末，用蓮子肉四兩煮糊，加煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服三錢，空腹时淡鹽湯送下。

八、沙 市

【功能与主治】治心腎虛損，夢遺滑精，虛煩盜汗，四肢無力等症。

【处方】沙苑蒺藜 芡实 蓮鬚各二兩 龙骨(炙酥) 牡蠣(煨)各一兩 蓮米二兩

【制法】研極細末，用米粉打糊为丸。

【剂量及用法】每次服二錢，空

腹淡鹽開水下，日服三次。

【禁忌】因腎臟發炎而滑精者忌服。

九、重 庆

【功能与主治】治真元亏损，心腎不交，夢遺滑精，盜汗虛煩，腰痛耳鳴，四肢無力。

【处方】沙苑蒺藜 芡实 蓮鬚各二兩 煨龙骨 煨牡蠣各一兩

【制法】共研細末，蓮肉煮粥加蜜少許和丸。

【剂量及用法】三錢。

十、蘭 州

【功能与主治】滋陰、補腎、斂精。主身体衰弱，夢遺滑精，陽痿等症。

【处方】酒地 金櫻子各二兩 山藥三兩 黃柏一兩 遠志八錢 山萸六錢 芡实 赤苓各八錢 知母一兩 牡蠣 龙骨各五錢 蓮鬚一兩 鹿茸三錢 枸杞四兩

【制法】共为細末，蜜小丸。

【剂量及用法】每服三錢，鹽水送下。

附参考古方

【来源】医方集解。

【功能与主治】治精滑不禁。

【处方】沙苑蒺藜(炒) 芡实(蒸) 蓮鬚各二兩 龙骨(酥炙) 牡蠣(鹽水煮一日一夜，煨粉)各一兩

【制法】蓮子粉为糊丸。

【剂量及用法】鹽湯下。

金鎖玉关丸

昆 明

【功能与主治】夢遺滑精，虛煩耳鳴。

【处方】芡实 龙骨 蓮鬚各三兩 龟板八兩 炙远志二兩 淮山藥六兩 茯苓二兩 鎖陽八兩 牡蠣三兩 砂仁二兩 黃柏(鹽炒) 知母各三兩 五味 菖蒲 石蓮子各一兩

【制法】研末，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服一丸，水丸每服二錢半，用開水早晚各服一次。

【禁忌】感冒忌服

鎖陽固精丸

一、北 京

【功能与主治】补虚固精。主梦遗滑精，目眩耳鸣，腰膝痠痛，四肢無力。

【处方】当归 熟地 山药 人参(去蘆) 白朮 茯苓 鎖陽 牡蠣 蛤壳 黃柏 知母 杜仲 椿根皮 補骨脂各一兩

【制法】共为細粉，煉蜜为小丸。

【剂量及用法】每服三錢，日服二次，淡鹽湯或溫开水送下。

【禁忌】忌色慾，及食刺激性物品。

二、天 津

【功能与主治】补虚固精。主男子身体虛弱，夢遺滑精，虛煩心跳，目眩耳鳴，腰膝痠痛，四肢無力。

【处方】黃柏 知母各一兩 煅牡蠣 芡实(麸炒) 蓮鬚各二錢 煅龙骨二錢 鎖陽三錢 山萸肉(酒制)五錢 茯苓(去皮) 远志肉(甘草水制)各二錢。

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，二錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每服一丸，淡鹽水送下。

三、南 昌

【功能与主治】夢遺滑精，腰膝痠痛。

【处方】芡实 蓮鬚 山萸肉 桑螵蛸 龙骨 澤瀉 牡蠣 丹皮 柏子仁 鎖陽 鹿角霜 茯苓 怀山药各四兩

【制法】共研細末，煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢，日服二次，溫开水送下。

【禁忌】風寒外感忌服。

四、蘭 州

【功能与主治】强阳固精。主男子身体衰弱，心跳头晕，出虛汗，腰膝痠痛，夢遺滑精，四肢無力。

【处方】黃柏 知母各一兩 牡蠣 芡实 蓮鬚 远志各二錢 龙骨 鎖陽各二錢 山萸五錢

【制法】共为細末，煉蜜为小丸。

【剂量及用法】每次服三錢，白开水送下。

【禁忌】戒性慾。

五、大 同

【功能与主治】滋陰补腎，滋精壯阳。

【处方】党参一兩 肉桂 炙芪各二兩 破故紙四兩 杜仲三兩 小茴香四兩 巴戟二兩 山药四兩 鎖陽一兩 菟絲子八兩 枸杞三兩 核桃仁四兩 龙骨 牡蠣各一兩。

【制法】共为細面，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服三錢。

六、禹 县

【功能与主治】夜夢遺精，盜汗虛煩，陰囊濕汗，真元不固。

【处方】熟地八兩 山萸肉四兩 川黃柏二兩 山药 菟絲子各四兩 建澤瀉 鎖陽 枸杞子 白茯苓各二兩 蓮鬚二兩 巴戟天 牡丹皮各二兩 桑仁二兩 破故紙三兩

【制法】共为細面，煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢，白开水送下。

【禁忌】火热症忌用。

【备考】有效期間一年。

七、濟 南

【功能与主治】夢遺滑精，腰膝痠痛。

【处方】芡实米 巴戟天 茯苓 鎖陽 肉苁蓉 鹿角霜 蓮鬚 龙骨(生) 牡蠣(生) 韭子各一兩

【制法】共为細末，煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢，白开水送下。

【禁忌】生冷等食物。

八、青 島

【处方】黃柏 知母 龙骨 芡实 蓮須 远志 牡蠣 白朮 金櫻子 鎖陽 熟地 山药 山萸 茯苓 澤瀉 丹皮各一錢

【制法】共研面，蜜小丸。

九、青島(鎖陽固精丹)

【处方】鹿角霜 龙骨 牡蠣 芡实 北棗子各一斤零四 蓮須二斤半 鎖陽 菟絲子 石蓮肉各一斤零四 蛤粉五斤 牛膝一斤零四 八味面十斤

【制法】共为細面，蜜丸。

十、沈 陽

【功能与主治】滋补腎气。主夜夢遺精，盜汗虛煩，腰痛耳鳴，四肢無力，神經衰弱。

【处方】当归 熟地黃 山药 人参 白朮 茯苓 鎖陽 牡蠣 蛤粉 黃柏 知母 杜仲 椿皮 破故紙各一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸，二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，空心淡鹽湯送下。

十一、撫順(鎖陽丸)

【功能与主治】滋精、补腎。主滑精，心腎兩虛，精白滑脫，心动自流，精冷精薄；妇女白帶，腰痠体軟，火最目眩，耳鳴心跳；老人小兒遺尿，腎气不固。

【处方】芡实 桑螵蛸 牡蠣 鎖陽 云苓 蓮鬚 龙骨 丹皮 鹿角霜 山药 山萸 澤瀉各四兩 柏子仁一兩

【制法】共为細面，蜜丸一錢重。

【剂量及用法】每服一丸，一日三次，白水送下。

【禁忌】腥辣物。

十二、哈爾濱
(鎖陽丸、固精丸)

【功能与主治】滋精补腎，溫肝縮泉。主滑精，遺尿。

【处方】鎖陽四兩 龙骨 牡蠣各三兩 芡实 桑螵蛸各二兩半 熟地六兩 山萸四兩 山药二兩 茯苓三兩 澤瀉 丹皮各二兩 蓮鬚 桑仁 远志各二兩 柏子二兩

【制法】共碾为細面，煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢，日三次，白水送下。

【禁忌】腥辣。

十三、承 德

【功能与主治】夢遺滑精，腰膝痠痛。

【处方】芡实 蓮鬚 山萸 桑螵蛸 龙骨 澤瀉 牡蠣 丹皮 山药 鎖陽 鹿角霜 茯苓各四兩 柏子仁一兩

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，重

錢。

【劑量及用法】每服一丸，日服一次，白開水送下。

十四、呼和浩特

【處方】知母 黃柏各九斤 芡實一斤 白朮八斤 蓮鬚 鎖陽 牡蠣 龍骨 遠志各三斤 櫻肉一斤

【制法】共為細面，蜜小丸。

萃仙丸

一、青島

【處方】沙苑 菟絲 八兩 蓮鬚 山萸 菟絲餅 枸杞 金櫻子膏六兩。

【制法】沙苑 菟絲 粗細各半，細入藥粗入熬膏用。共研面，蜜為丸。

二、呼和浩特(萃仙丹)

【處方】山萸四兩 芡實二兩 蓮鬚一兩 沙苑子一兩 菟絲五錢 金櫻子一兩 復盆子五錢 川斷一兩 枸杞二兩 川棟五錢 澤瀉一兩 炙草五錢

【制法】共為細粉，蜜小丸。

斑龍丸

一、上海(1) (青囊斑龍丸)

【功能與主治】遺精。

【處方】熟地 菟絲子 柏子仁 霜 鹿角霜 鹿角膠各四兩 補骨脂(炒) 茯苓各二兩

【制法】先將熟地煮爛，和余藥打和焙干，研成細粉，再將鹿角膠烱化和勻，加煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，淡鹽湯送服。

二、上海(2)(斑龍二至丸、 斑龍二至百補丸)

【功能與主治】小溲頻數，體弱遺精，腰膝無力。

【處方】鹿角片二十兩 鹿角霜十兩 黃芪(炙)四兩 黨參五兩 黃柏(炒) 懷山藥(炒) 山茱萸肉 茯苓 生地(酒洗蒸) 知母(鹽水炒)各四兩 五味子一兩 芡實四兩

【制法】共研細粉，再用鹿角片三十兩 黃精(制)八兩 枸杞子

熟地 菟絲子 金櫻子(去毛子)各四兩 懷牛膝(酒洗) 天冬 麥冬 枳實子各二兩 桂圓肉一兩 煎膏和入粉內，加煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服五十丸，食前淡鹽湯送服。

三、福州(青囊斑龍丸)

【功能與主治】治諸虛百病，駐顏益壽。

【處方】同上海。分量各等分。

【制法】共研細末，冬蜜為丸。

四、杭州(1)(青囊斑龍丸)

【功能與主治】壯精神，除百病，養氣血，補虛損，悅顏澤，育子嗣。治老年腎虧體虛，中年元氣不足，精虛陽痿。

【處方】同上海。

【制法】共為細末，將膠溶化，加陳酒和蜜為丸。

【劑量及用法】每服三至四錢，空腹淡鹽湯或溫酒送下。

五、杭州(2)

(斑龍二至百補丸)

【功能與主治】保元壯陽，生精補血，強健筋骨。治腎虛腰痛，陽痿夢洩，精神衰弱，元氣虛弱等症。

【處方】鹿角五兩(錐一寸長，長流水洗，米泔水浸一宿，刷洗淨晒干) 制黃精八兩 枸杞子 大熟地 菟絲子各四兩 懷牛膝 天門冬 麥門冬 枳實子各二兩 桂圓肉一兩 金櫻子四兩(以上同鹿角共煎濃汁濾清，文火熬膏，約煉四兩，再入后藥)

鹿角霜五兩 五味子一兩 芡實 山萸肉 人參地 懷山藥各四兩 潞黨參五兩 知母(鹽水炒) 白茯苓 炙黃芪各四兩 夏月加炒黃柏四兩

【制法】藥研為細末，將前膏和煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服三至四錢，空腹時淡鹽湯送下。

六、南昌(斑龍百補丸)

【功能與主治】精虛血弱，身體羸瘦，腰膝無力。久服聰耳明目，黑髮鬚。

【處方】鹿角鎊二十兩 黃柏(炒) 生地(酒洗蒸)各四兩 鹿角霜二十兩 懷山藥(炒) 知母(鹽

補益藥

水炒) 黃芪(炙) 山茱萸各四兩 五味子一兩 黨參五兩 茯苓 芡實各四兩(以上為第一宗) 鹿角鎊三十兩 黃柏制八兩 枸杞子 熟地 菟絲子 金櫻子(去毛子)各四兩 懷牛膝(酒洗)二兩 天冬 麥冬 枳實子各二兩 龍眼肉一兩(以上為第二宗)

【制法】第一宗研為細粉，第二宗煎膏，將膏和入藥粉內，加煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服五錢，食前淡鹽湯送下，並可用煮熟蓮子肉，或晒干棗子數枚同服。

七、重慶

【功能與主治】壯精神，除百病，養血氣，補虛損，育子嗣。

【處方】同上海。

【制法】除鹿角膠另用酒溶化合丸外，余藥共碾細末，煉蜜膠酒和丸，每重三錢，蜡壳封固。

【劑量及用法】每次一丸，空腹時溫酒送下；或開水放少許食鹽送下亦可。

八、青島(斑龍百補丸)

【處方】同上海。

【制法】共軋面，蜜小丸。

九、呼和浩特

【處方】鹿角膠 上藥 杭萸 天冬 麥冬 牛膝 菖蒲 知母各二兩 杜仲 龜板 故紙各二兩 川柏 遠志 丹皮 枸杞各二兩 牡蠣一兩

【制法】共為細面，蜜小丸。

聚精丸

一、上海

【功能與主治】夢遺滑泄。

【處方】線魚膠十六兩 潼蒺藜八兩

【制法】先將線魚膠用牡蠣粉炒成珠，同潼蒺藜共研細粉，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二至三錢，淡鹽湯送下。

二、杭州

【功能與主治】補元固精。治腎虧元虛，精氣不固，夢遺滑泄，精薄

每子。

【处方】潼蒺藜(牛乳拌)一斤
線魚膠(牡蠣粉炒)二斤

【制法】共研細末，煉蜜加陳酒打丸。

【劑量及用法】每服二錢，空腹時淡鹽湯或開水送下。

附參考古方

【來源】女科證治准繩。

【功能與主治】胎前求子。

【处方】黃魚鱔膠白淨者一斤
(切碎用蛤粉炒成珠，以無聲為度)
沙苑蒺藜八兩(馬乳浸兩宿，隔湯蒸一炷香久，取起焙干)

【制法】上為末，煉蜜丸，如梧子大。

【劑量及用法】每服八九丸，空心溫酒白湯任下。

【禁忌】忌食魚及牛肉。

茯 菟 丸

一、上 海

【功能與主治】主遺精。

【处方】茯苓三兩 懷山藥六兩
五味子八兩 菟絲子(酒洗)十兩

【制法】共研細粉，用石蓮肉三兩煎湯泛丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二至三錢，淡鹽湯送服。

二、福州(局方茯菟丸)

【功能與主治】治思慮太過，心腎虛損，真陽不固，尿有余瀝，或小便白濁，夢寐遺精等症。

【处方】菟絲子(制)五兩 白茯苓三兩 石蓮肉二兩

【制法】共為末，酒糊丸，桐子大。

【劑量及用法】每服三、五十丸，空心鹽湯或米湯下。

【備考】一方有北五味子四兩，兼治三消。

三、杭 州

【功能與主治】治思慮過度，心腎虧損，遺精滑精，虛體白濁，溺有余瀝，婦人白帶等症。

【处方】菟絲子(酒浸)十兩 懷山藥(另研) 五味子各六兩 石蓮子肉 白茯苓各三兩

【制法】上藥研為細末，將菟絲子浸過酒，煮山藥糊為丸。

【劑量及用法】每服三錢，淡鹽湯送下。

附參考古方

【來源】1. 太平惠民和劑局方。
(茯菟丹)

【功能與主治】治消渴消中消腎，遺精白濁，夢泄不禁皆治之。

【处方】菟絲子(酒浸三宿，水淘去砂，搗成餅，焙干)一十兩 辽五味子(去梗)七兩 白茯苓(去皮)五兩 石蓮肉(去壳)二兩

【制法】上為細末，用淮山藥六兩，碾細，煮糊搜和，搗三五百杵，丸如桐子大。

【劑量及用法】每服五、六十丸，空心食前米飲下。

2. 李病証治類方。

【功能與主治】治思慮太過，心腎虛損，真陽不固，溺有余瀝，小便白濁，夢寐頻泄。

【处方】菟絲子(酒浸)五兩 石蓮子(去壳)二兩 白茯苓(去皮)三兩

【制法】上為細末，酒糊丸，如桐子大。

【劑量及用法】每服三、五十丸，空心鹽湯下。

威 喜 丸

一、南 京

【功能與主治】主久濁久帶，余瀝不尽。

【处方】白茯苓(用猪苓二錢五分，同煮二十余沸后，去猪苓晒干)淨黃蜡各四兩

【制法】將白茯苓與猪苓同煮后，去猪苓不用，研為細末，以黃蜡隔水沸湯烺化，乘熱和末為丸，每錢約做十五粒。

【劑量及用法】每服二錢，一日一次，開水吞服。

二、福 州

【功能與主治】治元陽虛憊，精滑白濁，遺尿及婦人血海久冷，淫帶夢泄等症。

【处方】同南京。

【制法】上以茯苓為末，熔黃蜡搜和丸，彈子大。

【劑量及用法】空心細嚼，滿口生津，徐徐嚥服，得小便清利為效。

【禁忌】忌米醋，惟糖醋可用；尤忌氣怒動性。

三、杭州(補虛威喜丸)

【功能與主治】治元陽虛憊，精氣不固，濕阻膀胱，男子遺精白濁，溺如米泔，婦人血海久冷，白帶白淫等症。

【处方】同南京。

【制法】將黃蜡融化，和入茯苓末為丸。

【劑量及用法】每服二錢，空腹時細嚼，滿口生津，徐徐嚥服，得小便清利為效。

【禁忌】忌食米醋，並忌氣怒勞累。

附參考古方

【來源】太平惠民和劑局方。

【功能與主治】治丈夫元陽虛憊，精氣不固，余瀝常流，小便白濁，夢寐頻洩，及婦人血海久冷，白帶白濁，下部常濕，小便如米泔，或無子息。

【处方】白茯苓(去皮，四兩作塊，同猪苓一分，同于瓷器內，煮二十沸，取茯苓日干，去猪苓為末)

【制法】上熔黃蜡四兩搜為丸，如彈子大。

【劑量及用法】空心細嚼，滿口生津，徐徐嚥服，以小便清為度。

【禁忌】忌米醋，忌使性氣。

滋 腎 丸

一、上海(通關滋腎丸)

【功能與主治】小腹痛滿，小溲熱澀。

【处方】知母(酒炒) 黃柏(酒炒)各二兩 肉桂二錢

【制法】共研細粉，煉蜜為丸，如梧子大。

【劑量及用法】每服二錢，溫開水送服。

二、南 京

【功能與主治】清熱，利尿。主陰虛濕熱，小便澀疼，肚腹腫脹。

【处方】川黃柏 肥知母各二兩 上肉桂二錢(去粗皮)

【制法】共研細末，加煉白蜜為丸，每錢約做二十粒。

【劑量及用法】每服二錢，一日

一次,开水吞服。

三、武汉

【功能与主治】少腹胀满,小便澀痛,足膝软弱,或作渴便赤。

【处方】知母(酒炒) 黄柏各二两(酒炒) 肉桂二钱

【制法】小丸——取上药进行干燥,混合碾细,照净粉量加炼蜜40—45%,达成小丸,每钱不得少于二十五粒。

大丸——加炼蜜 110—120%,和成大丸,每丸重为二钱

【剂量及用法】温开水送服,每服三钱。

【备考】服后可能有前阴刀刺火灼,潮如泉涌的反应。

四、杭州

【功能与主治】治下焦虚,热阻膀胱,小便不通,溺管涩痛,腹胀喘急,阴汗阴痿,足心虚热等症。

【处方】川黄柏(盐酒拌炒) 知母(盐酒拌炒)各二两 肉桂二钱

【制法】共研细末,水泛为丸。

【剂量及用法】每服三钱,开水送下。

五、沙市(通关丸)

【功能与主治】治肾热癃闭,小便澀点滴,足膝无力,阴痿阴汗等症。

【处方】黄柏(酒炒) 知母各二两 中安桂二钱

【制法】上药三味研细末,炼蜜为丸。

【剂量及用法】每服二钱,淡盐开水下,日服二次。小兒老人酌减。

【禁忌】体虚无热者忌服。

济生肾气丸

一、上海

【功能与主治】小便澀数。

【处方】附子(炮去皮制) 肉桂各一两 车前子(炒) 怀牛膝各二两 山茱萸肉(酒炒) 怀山药(炒)各四两 茯苓六两 熟地八两 牡丹皮(酒炒) 泽泻(盐酒炒)各二两

【制法】共研细粉,炼蜜为丸,如梧桐子大。

【剂量及用法】每服一至二钱,每日服三次,米汤送下。

二、杭州

【功能与主治】治脾肾阳虚,不能行水,小便不利,腰重脚肿,四肢浮肿,腹胀喘急,食少便溏等症。

【处方】大熟地(砂仁酒拌,九蒸九晒)八两 粉丹皮 泽泻各二两 怀山药 山茱萸肉各四两 制附子 肉桂各一两 白茯苓六两 怀牛膝 车前子各二两

【制法】共研细末,炼蜜为丸,或水泛丸。

【剂量及用法】每服三钱,开水送下,日二服或三服。

三、南昌

【功能与主治】肾虚小便不利。

【处方】熟地四两 山茱萸 淮山药各二两 茯苓二两 粉丹皮 泽泻各一两五钱 附片 肉桂各五钱 车前子 牛膝各一两

【制法】共为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二钱,日服三次,开水送下。

【备考】非医师处方不得服用。

四、沙市

【功能与主治】健利肾脏之机能,而又能排泄血液中之毒素。治小便澀,肾虚喘嗽,腿脚便溏等症。

【处方】怀熟地(砂仁酒拌,以制透为度)四两 茯苓二两 淮山药 山茱萸(酒润,去子) 粉丹皮各二两 泽泻二两 车前子二两 川牛膝一两 附片 中安桂各五钱

【制法】上药研细末,蜜丸。

【剂量及用法】每服三钱,日服二次,空腹用温开水下。小兒老人酌减。

【禁忌】水份不足,肾脏发炎者忌服。

五、西安(金匱肾气丸)

【功能与主治】主消化弱,脾肾阳虚,不能行水,小便不利,腰重脚肿,喘急痰盛,膨脹等症。

【处方】九蒸熟地(捣膏)八两 怀山药 山茱萸肉各四两 丹皮 茯苓 泽泻各二两 肉桂 制附子 车前子 怀牛膝各一两

【制法】炼蜜为丸。

【剂量及用法】每服二至三钱,

开水送下。

【禁忌】忌鹽。

六、济南

【功能与主治】肾虚小便不利,肚腹胀满,四肢浮肿。

【处方】熟地八两 山药 山茱萸肉各四两 茯苓 丹皮 泽泻各三两 肉桂 附子各一两 车前子 牛膝各二两

【制法】共为细末,炼蜜为丸,梧桐子大。

【剂量及用法】每服三钱,白开水送下。

【禁忌】忌生冷食物;患脚症者忌鹽。

猪肚丸

一、上海

【功能与主治】小便频数。

【处方】白朮(炒)四两 苦参(酒浸)三两 牡蛎(煅)四两 猪肚一具

【制法】先将白朮、苦参、牡蛎共研细粉,再将猪肚洗净煮烂,同药粉打和加糊为丸,如梧桐子大。

【剂量及用法】每服一钱五分至三钱,温开水送服,日服一、二次。

【备考】猪肚一具,以一斤为计算标准,如份量有出入,白朮、苦参、牡蛎用量,按以上比例增减。

二、杭州(松石猪肚丸)

【功能与主治】治本元虚弱,湿热蕴结,男子梦遗白濁,小便频数,妇人赤白带下,淋濁穢臭等症。

【处方】炒冬朮五两 煅牡蛎四两 苦参三两 猪肚一具

【制法】共研细末,将猪肚煮熟打烂为丸。

【剂量及用法】每服一至四钱,开水送下。

附参考古方

【来源】杂病証治类方。

【功能与主治】治小便频数。

【处方】猪肚一箇(以蓮子一升同煮一周日,取出去皮心,焙干,为末)舶上茴香 破故紙 川楝子 母丁香各一两

【制法】上为细末,炼蜜丸,如梧子大。

【劑量及用法】每服五十丸，空心溫酒送下。

縮泉丸

一、上海

【功能与主治】小便頻數。

【處方】懷山藥 烏藥 益智仁（鹽水炒）各六兩

【制法】共研細粉，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二至三錢，淡鹽湯送服。

【禁忌】忌刺激性食物。

二、南京

【功能与主治】主小便頻數，溺有余瀝。

【處方】台烏藥 益智仁各二兩（鹽拌炒去鹽）

【制法】共研細末，以酒煮山藥二兩打糊為丸，每錢約做二十粒。

【劑量及用法】每服二錢，一日一次，空腹前淡鹽開水吞服。

三、杭州

【功能与主治】治元氣不足，衛氣不固，小便頻數，夜睡遺尿等症。

【處方】台烏藥 益智仁（鹽水炒） 懷山藥（酒浸）各八兩

【制法】共研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服三錢，開水送下。

玉屏風散

一、上海

【功能与主治】氣虛自汗，動輒傷風。

【處方】黃芪六兩 白朮（炒）防風各二兩

【制法】共研細粉，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每次二至三錢，開水送服或包煎服湯。

二、福州

【功能与主治】固榮衛，斂汗。治表虛自汗。

【處方】炙芪 防風各一兩 白朮二兩（炒）

【制法】共為末。

【劑量及用法】加姜三片，煎服。

三、杭州

【功能与主治】治衛氣虛弱，自汗不止，肌腠不密，易感風寒等症。

【處方】生黃芪 生白朮 防風各二兩

【制法】共研細末，姜棗湯泛丸。

【劑量及用法】每服二至四錢，開水吞服。

龍虎散

沈陽

【功能与主治】補心益腎，養血安神。主骨蒸癆熱，血液不足，耳鳴目昏，大暈心煩，怔忡不安。

【處方】煅龍骨二兩 琥珀一兩 龜版四兩 生龜甲二兩 桂枝 煅磁石（醋淬一次） 赤芍各一兩 遠志五錢 桑仁（炒）一兩 牡蠣 菖蒲各四兩

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二錢，薑湯水送下。

肘后癩肝散

沈陽

【功能与主治】滋陰補虛。主停尸癆瘵，潮熱骨蒸，咳嗽氣短，虛弱貧血，形消骨立，一切虛癆等症。

【處方】癩肝一具（制干）。

【制法】碾極細面。

【劑量及用法】每服二錢，每日服三次，開白水送下。

附參考古方

【來源】金匱要略方論。

【功能与主治】治冷勞，又主鬼疰，一門相染。

【處方】癩肝一具

【制法】炙干，木之。

【劑量及用法】水服方寸匕，日三服。

六合散

一、青島

【處方】杜仲 從蓉 巴戟 小茴香 故紙 青鹽各一兩

【制法】共研極細面。

二、呼和浩特

（豬腰六合散）

【處方】杜仲 大芸 巴戟各二兩 茴香一兩 故紙二兩 青鹽五錢

【制法】共細面。

十珍散

沈陽

【功能与主治】助氣開胃，止瀉消食。主病後虛弱，乏力氣短，情志萎頓，精神不暢。

【處方】蜜黃芪 人參 白朮 茯苓 白扁豆 山藥各一兩 縮砂 桔梗 五味子 炙甘草各半兩

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二錢，用薑三片，棗一枚，煎至半盞，食前服。

【禁忌】生冷油膩。

妙香散

一、福州

【功能与主治】安神利氣。治驚悸夢遺。

【處方】山藥二兩（姜汁炒） 人參 黃芪（蜜炙） 茯苓 茯神 遠志各一兩（炒） 桔梗 甘草各二錢 辰砂二錢 木香二錢半 麝香一錢

【制法】共研細末。

【劑量及用法】每服二錢，酒下。

二、杭州（良方妙香散）

【功能与主治】安神定志，益氣固精，通經解郁。治元氣虧損，精神恍惚，驚悸郁結，虛煩少睡，夢遺失精。婦人產後神志不寧等症。

【處方】路黨參一兩 懷山藥（姜汁炒）二兩 廣木香一錢五分 炙黃芪 遠志肉各一兩 飛硃砂二錢 白茯苓一兩 桔梗二錢 麝香一錢 白茯神一兩 炙甘草二錢

【制法】共研細末，后入麝香和勻，貯于錫器內，勿令泄氣。

【劑量及用法】每服二錢，溫酒或開水送下。

再造膏

天津

【功能与主治】補氣固精，養血

散寒。男子遺精，婦女血寒，赤白帶下，腰痠腿疼，身體瘦弱。

【處方】細辛一兩五錢 生黃芪二兩三錢 生杜仲一兩五錢 羌活八錢 茯苓 懷牛膝 防風各一兩五錢 甘草一兩二錢 生白芍一兩五錢 川芎一兩五錢 人參(去蘆)一兩五錢

【制法】以上藥料用香油十五斤，炸枯去渣濾淨，煉至滴水成珠，再入葶丹九十兩攪勻成膏。每膏葶油十五斤兌：肉桂面一兩二錢 麝香一錢五分 攪勻。每大張淨油八錢，每小張淨油五錢。

【劑量及用法】男子貼氣海穴(即臍腹)。女子貼關元穴(即臍下)。腰腿疼痛貼患處。

【禁忌】孕婦忌用。

益壽比天膏

青 島

【處方】鹿茸一雙 菟絲子 虎脛一雙 肉桂 蛇床子 海馬 川斷 遠志 菟蓉 天冬 麥冬 杏仁 杜仲 元胡 天麻 甘草各一兩

【制法】用香油五斤，鮮桑、榆、槐、柳條七寸煎枯去渣而熬之滴水成珠入黃丹攪勻成膏，再入：龍骨面 赤石脂面各一兩 母丁香面 冰片 乳香面各二錢 木香面一錢。

參芪膏

一、南 京

【功能與主治】強壯體力。

【處方】西黨參 蜜炙黃芪各五斤

【制法】共煎熬三次，去渣取汁，濃清濃縮，加冰糖十斤收膏。

【劑量及用法】每服三五錢，一日二次，早晚開水和服。

二、武 漢

【功能與主治】體虛氣弱，四肢無力。

【處方】黃芪(炙) 黨參(炙)各五斤

【制法】取上藥置容器中，照量加水八倍，入鍋煮四小時，取汁另貯；再將殘渣加水六倍，照例煮沸二次，每次過濾，最後取濾汁和前汁合

併，濃縮至三十斤，加冰糖十斤，使成膏十五斤即得。

【劑量及用法】每服五錢，日服二次，開水沖服。

黃 芪 膏

一、上 海

【功能與主治】虛損羸瘦，消渴自汗。

【處方】黃芪(炙)九百六十兩

【制法】將黃芪煎汁三次，榨淨，將各次所煎藥汁澄清過濾，蒸發成濃汁，加冰糖廿四斤收膏，成膏七百兩。

【劑量及用法】每次半羹匙至一羹匙，開水化服。

二、杭州(綿上黃芪膏)

【功能與主治】補肺清熱，助氣益血，壯筋長肉，排膿止痛。主寒熱虛損，羸瘦自汗，痢症久敗，癰瘰五痔，疔瘡不起，及小兒百病。

【處方】綿上黃芪。

【制法】煎煉成膏。

【劑量及用法】每服二至五錢，不拘時，開水沖服。

代 參 膏

一、上 海

【功能與主治】形瘦心悸，汗多氣短。

【處方】黨參 黃芪(炙) 桂圓肉 於朮(炒)各十六斤

【制法】共煎汁三次榨淨，將各次所煎藥汁澄清過濾，蒸發成濃汁，加冰糖十五斤收膏，成膏七百六十兩。

【劑量及用法】每次一羹匙，開水化服。

二、南 京

【功能與主治】補氣血，健脾胃。

【處方】西黨參 西黃芪 於朮 桂圓肉各八兩

【制法】共熬二次去渣取汁，濃清濃縮，加冰糖二斤收膏。

【劑量及用法】每服五錢，一日二次，早晚開水和服。

三、杭 州

【功能與主治】補中益氣，潤肺

補 益 類

健脾，開胃進食，生津止渴。主氣血兩虛，心悸健忘，潮熱自汗，虛損羸弱諸症。

【處方】路黨參 炙黃芪 炒野朮 桂元肉各十斤

【制法】共煎濃汁去渣，加冰糖十斤，文火收成膏。

【劑量及用法】每服三至五錢，不拘時，開水沖服。

兩 儀 膏

一、上 海

【功能與主治】體力衰弱，腰痠肢軟。

【處方】黨參八兩 熟地一千六百兩

【制法】共煎汁三次，榨淨，將各次所煎藥汁澄清過濾，蒸發成濃汁，加冰糖八百兩收膏，成膏一千七百六十兩。

【劑量及用法】每次一羹匙，食後開水化服。

二、南 京

【功能與主治】補益劑。主氣血兩虧之症狀，及病後體虛。

【處方】熟地十斤 路黨參五斤

【制法】共熬三次，去渣取汁，濃清濃縮，加冰糖十五斤收膏。

【劑量及用法】每服三至五錢，一日二次，早晚開水和服。

三、武 漢

【功能與主治】血虛胃弱，身體羸瘦。

【處方】黨參八兩 熟地一斤

【制法】取上藥第一次加水六倍，煮沸四小時；第二次將殘渣加水六倍，煮沸三小時；第三次加水五倍煮沸二小時；取汁過濾，濃縮至一百二十兩，加糖八十兩使成膏五斤半即得。

【劑量及用法】每服一餐匙或兩餐匙，開水沖服，早晚各一次。

四、福 州

【功能與主治】治精氣太虛，諸藥不應，或以克伐太過，耗損真陰；凡虛在陰分而精不化氣者宜用。

【處方】人參半斤或用四兩 大熟地一斤

【制法】以河水煎膏。

【剂量及用法】不拘时服。

五、杭州

【功能与主治】滋陰生精，益氣補血。治氣血不足，陰陽並虧，精神倦怠，驚悸健忘，耳鳴目眩，陰虛津耗等症。

【处方】潞党参 大熟地各二十斤

【制法】二味煎濃汁去渣，加冰糖十斤收膏。

【剂量及用法】每服三至五錢，不拘时，开水中服。

附参考古方

【来源】景岳全書。

【功能与主治】治精氣大亏，諸藥不應，或以克伐太過，耗損真陰。凡虛在陽分而氣不化精者，宜參朮膏。若虛在陰分而精不化氣者，莫妙于此；其有未至大病而素覺陰虛者，用以調元，尤稱神妙。

【处方】人參半斤或四兩 大熟地一斤

【制法】上二味用好甜水，或長流水十五盞浸一宿，以桑柴文武火煎取濃汁，若味有未盡，再用水數盞煎煮，取汁並熬稍濃，乃入磁罐重湯熬成膏，入真白蜜四兩或半斤收之。

【剂量及用法】每以白湯點服。若勞損咳嗽多痰，加貝母四兩亦可。

当归补血膏

重 庆

【功能与主治】益氣補血，健胃養陰。

【处方】当归五兩 党参 川芎各二兩 白芍一兩 茯苓 生地各二兩 白朮一兩 甘草五錢 佛手片一兩 冰糖八兩

【制法】共用文武火煎濃汁，去渣，冰糖收膏，玻璃瓶裝。

【剂量及用法】每用一調羹，空腹開水化服。

十全大補膏

一、上海(十味補膏)

【功能与主治】體弱虛損，夢遺滑洩，耳鳴目眩，足膝無力。

【处方】党参 白朮(炒焦) 茯

苓各二十兩 川芎 肉桂各十兩 当归十六兩 黃芪(炙)二十兩 熟地四兩 白芍藥(炒)十六兩 甘草(炙)十兩

【制法】共煎汁三次，榨淨，將各次所煎藥汁澄清過濾，蒸發成濃汁，加冰糖八十兩收膏，成膏一百五十兩。

【剂量与用法】每次三錢，開水化服。

二、南 京

【功能与主治】主男婦體弱，久病虛損，潮熱倦怠，腰膝無力。

【处方】潞党参一兩五錢 炒白朮一兩 炙黃芪一兩五錢 上肉桂一兩 大熟地一兩五錢 白茯苓八錢 炒白朮一兩 炙甘草八錢 西當歸一錢 撫川芎八錢

【制法】上藥加鮮生薑三片，人參三枚，用清火煎熬三次，去渣取汁，濃淨濃縮，加冰糖十兩收膏。

【剂量及用法】每服三至五錢，一日二次，早晚開水和服。

【禁忌】孕婦慎服。

三、杭 州

【功能与主治】大補氣血，強壯精神。治男婦氣血兩虧，諸虛百損，頭痛昏暈，耳鳴目眩，形容憔悴，四肢困倦，畏風自汗，時發潮熱等症。

【处方】潞党参八十兩 川芎四十兩 白茯苓八十兩 焦冬朮八十兩 炒白朮八十兩 炙甘草四十兩 炙黃芪八十兩 大熟地一百二十兩 当归八十兩 上肉桂二十四兩

【制法】上藥煎濃汁去渣，加冰糖十斤收成膏。

【剂量及用法】每服三至四錢(約一湯匙)，不拘时開水沖服。

鹿 茸 膏

沈 陽

【功能与主治】滋補強壯。主生精補腎，五勞七傷，半身不遂，腹痛疝氣，陽痿早洩，婦女白帶，腰痛崩漏，虛冷腹痛。

【处方与制法】麻油一斤四兩入甘草二兩，熬至六分下諸藥：第一下芝蔴四兩，第二下紫草二錢，第三下人參冬 寸冬 遠志 生地 熟地 牛膝 蛇床子 虎骨 菟絲子 鹿

茸 菟蓉 川斷 紫稍花 木鱉子 杏仁 谷精子 官桂以上各三錢，文武火熬至枯黑色，去渣下黃丹五兩，第四下松香八兩，使槐柳枝不停攪，滴水不散，第五下煅硫黃 雄黃 龍骨 赤石脂各為末二錢，再上火熬半小時，第六下乳香 沒藥 木香 母丁香各為末五錢，再熬離火放溫，第七下蟾酥 麝香 陽起石各二錢，滴水不散，第八下黃片一兩，用瓷罐盛之，以燭封口，入水浸三日去火毒，用紅絹攤貼之。

【剂量及用法】每日一帖，貼臍上。

毓麟固本膏

北 京

【功能与主治】滋補散寒，固精止痛。主身體虛弱，夢遺滑精，偏墜疝氣，腰痠腿軟，婦女痛經帶下。

【处方】杜仲 小茴香各二兩 川附片二兩 海馬四兩 懷牛膝 續斷 甘草 大茴香 天麻子 紫稍花 補骨脂 肉菟蓉 熟地各三兩 木香 生龍骨各一兩 鎖陽五錢

【制法】上藥用香油二百四十兩炸枯去渣，煉至滴水成珠，入黃丹一百兩攪勻成膏為兌；沉香五錢 乳香 沒藥各一兩 鹿茸六錢 母丁香一兩 每二百四十兩膏油兌以上細粉，攪勻攤貼。

【剂量及用法】男子貼腎俞穴，婦人貼臍上。

【禁忌】忌食寒涼，孕婦忌貼。

固 本 膏

一、天 津

【功能与主治】滋補散寒，固精止痛。主身體虛弱，夢遺滑精，偏墜疝氣，腰痠腿軟，婦女經痛帶下，腹痛腹脹。

【处方】生杜仲 甘草 紫稍花 生茴香 熟地各二兩二錢 生附子一兩一錢 懷牛膝 大茴香各二兩二錢 冬虫草九錢 菟絲子 生地 生故紙各二兩二錢 海馬一錢 續斷 天麻 蛇床子 菟蓉各二兩二錢 羊腰子一對

【制法】以上藥料用香油十五斤，炸枯去渣濾淨，煉至滴水成珠，

再入漳丹九十兩攪勻成膏。每膏葯油十五斤兌。

雄黃面 乳香面各四錢 母丁香面一兩 肉桂面二兩二錢 廣木香面五錢 生龍骨面六錢 沒藥面四錢 陽起石面二錢 生赤石脂面四錢 攪勻。每大張淨油一兩，小張淨油五錢。

【劑量及用法】男子貼腎俞穴（即後腰），婦女貼臍上。

【禁忌】孕婦忌貼。

二、蘭 州

【功能與主治】強壯養血。主胸滿腹脹，四肢疲倦，腎虛遺精，婦女血寒，白帶痞塊等症。

【處方】生杜仲一兩 附子五兩 牛膝 斷 甘草 大茴 菟絲 天麻 紫梢花各十兩 羊腰子二十兩 生地 蛇床子 小茴 官桂 故紙 大芸 熟地各十兩 小海馬一對 冬蟲草四兩

【制法】用香油六十七斤半，漳丹三百三十七兩五錢熬膏，每十五斤膏油兌細末料四兩。

細末方：雄黃 赤石脂 乳香 沒藥各八兩 陽起石四兩 龍骨十二兩 母丁香十兩 木香十兩 共軋細面。

【劑量及用法】每次一貼，貼患處。

三、青 島

【處方】冬蟲 海龍各四 杜仲 熟地各一斤零四 附子十兩 菟絲 牛膝 故紙 川斷 官桂 甘草 生地 大茴香 小茴香 菟絲子 蛇床子 天麻 紫梢花各一斤零四 鹿茸十兩 羊腰油二十斤。

金櫻子膏

一、上 海

【功能與主治】夢遺滑精，小便不禁。

【處方】金櫻子九百六十兩

【制法】將金櫻子煎汁三次，榨淨，將各次所煎葯汁澄清過濾，蒸發成濃汁，加冰糖三百廿兩收膏，成膏四百八十兩。

【劑量及用法】每次一錢匙，開水沖服。

二、武 漢

【功能與主治】夢遺滑精，小便不禁。

【處方】金櫻子五斤

【制法】取金櫻子照量加水五倍，煮四小時，共兩次，每次過濾去渣，取汁濃縮，約四斤，再入溶化冰糖一斤，使成膏二斤七兩即得。

【劑量及用法】每服一至五錢，早晚開水沖服各一次。

三、南昌(金櫻膏)

【功能與主治】補精固氣及婦人白帶虛而無火者相宜。

【處方】金櫻子（未成熟者去皮剖用）五斤

【制法】煮汁去渣，再入冰糖收膏。

【劑量及用法】每服五錢，開水沖服。

【禁忌】陰虛火熾，小便滯澀，精氣滑脫，吐酸，外邪未除者忌服。

四、重慶(金櫻膏)

【功能與主治】治肝腎兩虧，夢遺滑精，脾瀉下痢，小便頻數等症。

【處方】金櫻子十斤 冰糖一斤

【制法】鮮金櫻子打碎熬汁去渣，加冰糖成膏，玻璃瓶包裝。

【劑量及用法】五錢至一兩。

五、濟 南

【功能與主治】夢遺滑精，小便不禁。

【處方】金櫻子二十斤

【制法】上一味葯煎熬成汁，每汁一斤兌蜜二斤成膏。

【劑量及用法】每服五錢，白開水化服。

六、青島(金櫻子煎膏)

【處方】金櫻子十斤

【制法】去毛刺煎膏，滴紙不散，加沙苑蒺藜膏一斤，再加蜜成膏。

七、呼和浩特

【處方】金櫻肉二斤

【制法】水泡三日，熬濃去渣，加蜜一斤收膏。

桑 椹 膏

一、上海(桑椹子膏)

【功能與主治】大便艱行，肢節疼痛。

【處方】桑椹子一千六百兩

【制法】將桑椹子煎汁三次，榨淨，將各次所煎葯汁澄清過濾，蒸發成濃汁，加冰糖六百六十兩收膏，成膏九百兩。

【劑量及用法】每次一錢匙，開水化服。

二、南 京

【功能與主治】明目活絡，止渴生津。

【處方】鮮桑椹子用紫色者十斤

【制法】以清水熬成濃汁，去渣濾淨，濃縮加冰糖收膏。（每清膏一斤加冰糖二斤）

【劑量及用法】每服一至五錢，一日一次至二次，開水和服。

三、武漢(文武膏)

【功能與主治】體虛便秘，足膝無力，亦治瘰癧結核。

【處方】桑椹子一百斤

【制法】照量加水八倍，至濕透後，入鍋內煮沸四小時，過濾，取濾汁置另器中，將濾渣再加水五倍，煮沸三小時，過濾去渣，取濾汁與前汁合併入鍋內，濃縮至二百四十兩，加冰糖三十七斤半，使成膏五十六斤四兩。

【劑量及用法】每服一至五錢，日服一次，開水沖服。

附參考古方

【來源】素問病機氣宜保命集（文武膏）

【功能與主治】治瘰癧。

【處方】文武實二斗黑熟者

【制法】以布袋取汁，銀石器中，熬成薄膏。

【劑量及用法】白湯點一匙，日三服。

正 元 丹

福 州

【功能與主治】治命門火衰，吐利厥冷，陰火上沖，頭面赤熱，眩暈

惡心，濁氣逆滿，胸脇刺痛，臍肚脹急。

【處方】人參二兩（用附子一兩五錢煮汁，收入去附子）黃耆一兩五錢（用川芎一兩酒煮，收入去川芎）山藥一兩（用干姜二錢煎汁，收入去干姜）白朮（用陳皮五錢煎汁，收入去陳皮）茯苓各二兩（用肉桂六錢酒煮汁，收入去肉桂）甘草一兩五錢（用烏藥一兩煎汁，收入去烏藥）

【制法】上六味，除茯苓外，用文武火緩緩焙干，勿炒傷藥性，為末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢，用姜三片，紅棗一枚，煎數沸，入鹽一捻，服後飲熱酒一杯，以助藥力。

老年延壽丹

濟 南

【功能與主治】老人氣血衰弱，失眠無力等症。

【處方】茯神八兩 棗仁（炒黑）當歸 元肉 茯苓 兩參 麥冬 熟地 遠志各四兩 香附二兩（酒制）

【制法】共研極細面，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，小米湯送下。

長壽丹

禹 縣

【功能與主治】氣血雙虧，精神減少，骨蒸盜汗，腰膝痠軟。

【處方】當參六錢 麥冬 天冬 茯神 肉桂 當歸 玄參 生地 柏子仁 白朮 遠志 杜仲 川芎 各五錢 辽五味 續斷 巴戟天 芡實 陳皮 薏米 扁豆 肉蓯蓉 甘草各四錢 棗仁 桔梗 川牛膝 鎮陽 青鹽 菖蒲各二錢 砂仁 枸杞子 破故紙各二錢 丹參 黃連各一錢 黃芪八錢 熟地二兩

【制法】共為細面，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服七粒，白開水送下。

【禁忌】孕婦及小兒忌服。

【備考】有效期間二年。

回陽救急丹

沈 陽

【功能與主治】銀痛散寒，強心助氣。主陽氣衰弱，腎寒精冷，性交感寒，小腹絛痛，腰膝痠軟。

【處方】鹿茸 人參 小茴香 故紙各一錢 附子 肉桂 吳萸 沉香各二錢 麝香一錢 官桂二錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，姜水送下。

【禁忌】忌食生冷；孕婦忌服。

補益丹

沈 陽

【功能與主治】補脾固腸。主下肢厥冷，小便不利，小腹疼痛，惡寒自汗，腰部痠痛，腎虛久瀉。

【處方】杜仲 單藤 巴戟各二兩 龍骨一兩 故紙二兩 訶子五個 胡桃仁一百二十個 砂仁五錢

【制法】共碾極細面，酒糊為小丸，珠砂衣。

【劑量及用法】每服二錢，鹽湯送下。

【禁忌】生冷。

天真丹

沈 陽

【功能與主治】固腎、去寒、除疝。主腎虛陽痿，陰囊濕冷，遺精腰痛，白濁身弱，疝氣便濁，小便寒痛。

【處方】沉香 巴戟 茴香 單藤 葫蘆巴 故紙 杜仲 琥珀 黑牽牛（鹽炒）各一兩 官桂半兩

【制法】共碾極細面，酒浸打糊為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，淡鹽湯送下。

【禁忌】生冷，酸性食物。

枕中丹

（孔聖枕中丹）

一、北京、承德

【功能與主治】強心益智，健腦安神。主神經衰弱，健忘失眠。

【處方】龜版（炙） 龍骨（燬）

遠志 節菖蒲各等份

【制法】共為細粉，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水送下。

二、上 海

【功能與主治】健忘少寐。

【處方】龜板（炙）二十兩 雄雞一只 九節菖蒲 龍骨 遠志（炒）各二十兩

【制法】先將雞去毛，破腹洗淨，煮爛去骨，將余藥加入打和焙干，共研細粉，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服一錢，溫開水送服。

【備考】每料用雞二斤為計算標準，依此類推。

三、南京（枕中丸）

【功能與主治】主精神恍惚，健忘多夢。

【處方】敗龜板 花龍骨（研末納入雞腹內，煮一宿，去雞不用）遠志（甘草水制） 九節菖蒲各四兩

【制法】共研細末，用溫沸水泛為丸，每錢約做八十粒。

【劑量及用法】每服二至三錢，一日一次，淡鹽開水吞服。

四、武 漢

（枕中丸、孔聖枕中丸）

【功能與主治】健忘失眠，神思恍惚。

【處方】敗龜板（酥炙） 龍骨（燬） 遠志 菖蒲 各等分

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜40-50%造成小丸，每錢不得少于二十五粒。

【劑量及用法】每服一錢，日服一次，溫開水送下。

五、福 州

【功能與主治】補益心腎。治讀書善忘，久服令人聰明。

【處方】炙龜板 龍骨（研末，入雞腹煮一宿） 遠志 九節菖蒲各等份

【制法】共研細末，水泛為丸，酒送下。

六、杭 州

【功能與主治】益智聰明，能增加記憶力。治讀書健忘，心神恍惚，

夜不成寐，腎虛滑精，及心腎兩虧之症。

【处方】五花龙骨十兩 炙龟版十兩(二味研末用白毛烏骨雞一只，破肚去杂，將二味入雞腹內煮極透，將雞搗爛，同藥晒干) 远志肉 九节菖蒲各十兩

【制法】共為細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服三錢，臨臥桂圓湯送下。

七、南昌

【功能与主治】健忘。

【处方】龟板(酥炙) 龙骨(研細末，入雞腹煮一宿) 远志 九节菖蒲各等分

【制法】研為細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服一錢，日三服，溫開水送下。

八、濟南

【功能与主治】健忘失眠，神思恍惚等症。

【处方】老龙骨(生) 龟板(制) 石菖蒲 远志各四兩(制)

【制法】共為細末，煉蜜為小丸，梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

【禁忌】生冷油膩食物。

九、青島

【处方】敗龟板(酒炙) 龙骨 远志 菖蒲各一斤

【制法】共研細面，煉蜜為小丸。

十、哈爾濱

【功能与主治】補腦益智。治腦筋疲倦，讀書善忘，神倦多困。

【处方】敗龟板五兩(酥炙) 龙骨五兩(研末，入雞腹煮一宿) 远志五兩 九节菖蒲五兩

【制法】共碾為細面，水泛為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服一錢，熱湯送下，早晚二次。

【禁忌】戒房事，少思慮，忌辛辣。

附參考古方

【来源】备急千金要方。(孔子大甲知枕中方)

【处方】龟甲 龙骨 远志 菖

蒲。

【劑量及用法】上四味等分治下篩 酒服方寸匕，日三，常服令人大聰。

清腦慧智丹

沈陽

【功能与主治】清腦，強心，安神。主腦力衰弱，心腎不足，健忘怔忡，自汗失眠，滑精夢遺，腰背酸痛，心跳無力，不耐工作。

【处方】酥制敗龟版 龙骨各一兩 远志八錢 菖蒲 蓮心各五錢 茯神 棗仁 麦冬各一兩 甘草 川芎各五錢 生地八錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

靜神丹

沈陽

【功能与主治】清火、鎮驚、安神。主耳聾目瞽，心煩不安，心跳心熱，恍惚健忘，倦怠無力，睡臥不寧等症。

【处方】当归(酒洗) 生地黄 远志 茯神各五錢 菖蒲 黃連各二錢五分 硃砂二錢 牛黃一錢

【制法】共碾極細面，新猪心血為小丸，金箔為衣。

【劑量及用法】每服五十丸，灯心湯送下。

天王補心丹

一、北京(補心丹)

【功能与主治】強心安神。主神經衰弱，煩躁失眠，健忘怔忡，心跳氣短。

【处方】人參(去蘆) 茯苓 玄參 桔梗 远志各五錢 当归 五味子 麦冬 天冬 丹參 酸棗仁各一兩 生地四兩 柏子仁一兩

【制法】共為細粉，煉蜜為小丸，硃砂為衣。

【劑量及用法】每服三錢，日服二次，溫開水送下。

二、天津

【功能与主治】強心安神。主神經衰弱，頭昏耳鳴，煩躁不安，心跳

補益類

氣短，失眠健忘。

【处方】生地四兩 黃連 菖蒲各五錢 当归 柏子仁各一兩 人參(去蘆)五錢 天冬一兩 甘草 茯苓(去皮) 丹參 桔梗各五錢 炒棗仁 麦冬各一兩 元參(去蘆)五錢 五味子(酒蒸)一兩 远志肉(甘草水制)五錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，三錢重，每斤丸藥用硃砂三錢上衣，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

三、上海(寧神丹)

【功能与主治】失眠心悸，口舌干燥。

【处方】党參一兩 茯苓五錢 柏子仁一兩 远志(炒)五錢 天冬一兩 丹參 桔梗各五錢 五味子一兩 玄參五錢 麦冬一兩 生地四兩 酸棗仁(炒) 当归各一兩 硃砂五錢

【制法】除硃砂外，余藥共研細粉，煉蜜為丸，硃砂為衣，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二至三錢，溫開水送服。

四、南京(補心丹)

【功能与主治】養血，寧心，安神。主心悸健忘，神煩失眠。

【处方】生地四兩 远志五錢 当归一兩 丹參五錢 柏子仁一兩 元參五錢 天冬一兩 桔梗五錢 麦冬一兩 党參五錢 棗仁一兩 茯苓五錢 五味子一兩

【制法】共研細末，加煉白蜜為丸，每錢約十五粒，硃砂為衣。

【劑量及用法】每服三錢，臨臥時開水吞服。

五、武漢(補心丸)

【功能与主治】神志不寧，失眠多汗，怔忡健忘，大便溏。

【处方】党參 白茯苓 玄參 桔梗 远志各五錢 当归 五味子 麦冬 天門冬各一兩 丹參五錢 酸棗仁一兩 生地四兩 柏子仁一兩(去油) 硃砂二錢

【制法】小丸——取上藥進行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜30~33%，迭成小丸，每錢不得少于二十五粒。

大丸——加煉蜜70~75%，和成大丸，每丸重為三錢。

【劑量及用法】每服三至五錢。

六、廣州(1)(補心丹)

【功能與主治】煩躁不安，自汗，盜汗。

【處方】當歸五兩 熟地二十兩 天冬 麥冬 棗仁各五兩 遠志 柏子仁 丹參各七兩 沙參 黨參 茯神 桔梗各十兩 五味子五兩

【制法】各藥制蒸，晒干，研末，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】白滾水服，每服三錢。

七、廣州(2)(補心丹)

【功能與主治】驚悸善忘，神經衰弱。

【處方】人參 丹參各五錢 玄參 天門冬 麥門冬 菖蒲各一兩 生地四兩 茯神 遠志各五錢 酸棗仁二兩 當歸 硃砂 桔梗各五錢 柏子仁 五味子各一兩

【制法】將上列各藥洗淨，切碎隔水蒸透，晒干研為細末，煉蜜拌勻制成丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，熱湯送下。

八、福州

【功能與主治】寧心保神，固精益血，壯力強志，令人不忘，消煩熱，除驚悸，清三焦，解干渴，育養心氣。

【處方】生地四兩(洗淨) 人參 元參(炒) 丹參(炒) 遠志(炒) 桔梗 茯苓各五錢 五味(炒) 當歸(酒洗) 麥冬(炒) 天冬(炒) 柏子仁(炒) 棗仁(炒)各一兩

【制法】共為細末，煉蜜為丸，每兩分作十丸，金箔為衣。或作小丸，硃砂衣亦可。

【劑量及用法】每服一丸，燈心棗湯化下，食遠臨臥服。

九、杭州

【功能與主治】安神寧志。治思慮過度，心血不足，心悸健忘，神志不寧，失眠，咽干煩熱等症。

【處方】人參 生地四兩 桔梗 五錢 天門冬 炒棗仁 當歸 麥門冬 路黨參各一兩 遠志肉 玄參

丹參各五錢 柏子仁 五味子各一兩 白茯苓五錢

【制法】共研細末，煉蜜為丸，硃砂為衣。

【劑量及用法】每服三至四錢，開水送下。

十、南昌(補心丹)

【功能與主治】思慮過度，心血不足，神志不寧，心悸失眠，健忘津液不足，咽干口燥，入使不利，心煩多汗，口舌生瘡。

【處方】生地四兩 黨參一兩 柏子仁 麥冬 當歸 酸棗仁 茯苓 五味子各一兩 丹參 玄參 遠志 菖蒲 天冬 桔梗 炙甘草各五錢

【制法】共為細面，煉蜜為丸，如梧桐子大，硃砂為衣。

【劑量及用法】每服二至三錢，食后臨臥白開水送下。

【禁忌】忌食辛辣物。

十一、沙市

【功能與主治】治思慮過度，心血不足，怔忡健忘，神志不寧，心煩不寐，汗多便秘，口舌生瘡等症。

【處方】生地四兩 黨參 當歸 柏子仁 天冬 寸冬 棗仁 北五味 丹參 玄參 遠志 茯神 桔梗各一兩

【制法】諸藥研細末，蜜丸，硃砂為衣。

【劑量及用法】每服三錢，每日服三次，溫開水下。

【禁忌】體虛無熱者忌服。

十二、重慶

【功能與主治】寧心安神，益元固精，壯力強志，清三焦，化痰涎，祛煩熱，除驚悸。

【處方】生地 黨參 茯苓 遠志 石菖蒲 玄參 柏子仁 桔梗 天冬 丹參 酸棗仁 炙甘草 麥冬 白朮 杜仲 茯神 當歸 五味子各一兩 硃砂一兩九錢(穿衣用)

【制法】研為細末，煉蜜和丸，硃砂穿衣，紙盒包裝。

【劑量及用法】二至四錢。

十三、昆明(補心丹)

【功能與主治】心臟衰弱，神志

不寧。

【處方】生地 黨參 元參各四兩 丹參二兩 茯神四兩 桔梗 炙遠志各二兩 柏仁四兩 天冬 麥冬各二兩 當歸八兩 棗仁四兩 五味 菖蒲各一兩 甘草二兩

【制法】研末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服一丸，水吞每服三錢半。用開水早晚各服一次。

【禁忌】感冒忌服。

十四、西安

【功能與主治】安志寧神。治思慮過度，心血不足，神經衰弱，健忘心煩，心悸，怔忡大便秘結，口舌生瘡等症。凡腦弱血虧之失眠症均能醫治。

【處方】大生地(酒浸)四兩 茯苓五錢 當歸(酒浸)一兩 桔梗五錢 炒大麥冬一兩 丹參五錢 棗仁 五味子 天門冬各一兩 人參 遠志 元參各五錢 柏子霜六錢

【制法】煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服四錢，急臥桂元湯或灯心湯下。

十五、蘭州

【功能與主治】強心臟，活血脈，安神經，除煩熱。主神經衰弱，煩躁不安，心跳氣短，失眠健忘。

【處方】生地四兩 黃連 菖蒲各五錢 當歸一兩 黨參二兩 柏子仁 棗仁各一兩 元參 茯神 丹參 桔梗 遠志各五錢 五味 天冬各一兩 甘草五錢 麥冬一兩

【制法】共研細末，蜜小丸，硃砂衣。(或大丸，每丸重三錢)

【劑量及用法】每次服三錢，白開水送下。

十六、大同

【功能與主治】心血虧損，夜不成寐。

【處方】生地四兩 黨參 當歸 五味子 天冬 麥冬 柏子仁 炒棗仁 元參 茯神 丹參 桔梗 遠志各五錢

【制法】共為細面，煉蜜為丸，硃砂為衣。

【劑量及用法】每服三錢。

十七、禹县

【功能与主治】心血不足，神志不宁，津液枯竭，健忘怔忡，大便不利，口舌生疮。

【处方】潞党参 白茯苓 玄参 桔梗 远志 当归 五味子 麦冬 天冬 丹参 酸枣仁各一兩 生地四兩 柏子仁一兩 石菖蒲四錢

【制法】共为細面，煉蜜为丸，每丸二錢重，硃砂为衣。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下。

【备考】有效期間一年。

十八、济南(补心丹)

【功能与主治】神志不宁，心悸失眠，健忘。

【处方】生地四兩 川黃連二兩 党参五錢 当归 五味子各一兩 天冬一兩五錢 麦冬 柏子仁 酸枣仁各一兩 玄参 茯神 丹参 桔梗 远志各五錢

【制法】共为細末，煉蜜为丸，梧桐子大，硃砂六錢为衣。

【剂量及用法】每服三錢，灯心，竹叶湯送下；白开水亦可。

【禁忌】生冷辛辣食物。

十九、青島(1)

【处方】当归 麦冬 天冬各一斤 五味子半斤 棗仁一斤 元参半斤 生地二斤 柏子仁一斤 茯苓 丹参 远志各半斤 人參四兩

【制法】共研細末，煉蜜为丸，硃衣。

二十、青島(2)

【处方】当归十斤 生地二十斤 麦冬 柏子仁各十斤 远志五斤 棗仁十斤 人參二斤半 元参 丹皮各五斤

【制法】共为細面，蜜丸，如梧桐子大。

二十一、沈陽(1)(补心丹)

【功能与主治】补心安神。主心臟衰弱，怔忡健忘，失眠自汗，心煩易惊，及妇女一切血虛生热，手心發燒，四肢倦怠，津液枯干，气短心跳等症。

【处方】人參 白茯苓 元参

桔梗 远志各五錢 当归 五味子 麦冬 天冬 丹参 棗仁 柏子仁 霜各一兩 生地黄四兩

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸，二錢重，硃砂衣。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下。

【禁忌】辣物。

二十二、沈陽(2)(补心丸)

【功能与主治】养心益气，补心安神。主怔忡健忘，煩躁失眠，精神不安，心慌心跳，面色萎黃，肢体瘦弱。

【处方】川芎 当归 生地黄各一兩五錢 人參 甘草各一兩 远志二兩五錢 炒棗仁三兩 麝香一錢 琥珀三錢 茯神七錢 硃砂胆南星各五錢 石菖蒲六錢

【制法】除麝香、琥珀、硃砂另研外，余則共碾極細面，蒸餅糊为小丸。

【剂量及用法】每服二錢，姜湯送下。

【禁忌】五辛油腻。

二十三、撫順

【功能与主治】健腦、养心、鎮靜。主心血不足，思慮勞心，心神忙跳，終夜失眠，健忘怔忡，神志不宁，筋疲力倦，惊恐多夢，虛熱盜汗遺精等症。

【处方】党参二兩 远志 丹参各四兩 天冬八兩 麦冬六兩 节蒲四兩 桔梗五兩 当归八兩 茯神四兩 五味二兩 黃連四兩 生地八兩 元参五兩 棗仁八兩 茯苓五兩 柏仁 制草各四兩

【制法】共为細面，蜜丸二錢重，硃砂为衣。

【剂量及用法】每服一丸，早晚兩次，食前服之，白水送下。

【禁忌】忌食辛辣酒類。

二十四、吉林、哈尔滨(补心丹)

【功能与主治】养陰、清熱、宁神、补心。主治：

(1) 陰虛內熱；津液不足，五心煩燒，溲而便澀，心緒焦煩。

(2) 心血不足；思慮勞心，心神忙跳，終夜失眠，健忘怔忡，神志不宁，筋疲力倦，惊悸多夢。

(3) 胃熱；胃熱津亏，口干舌燥，納少泛嘔，喜飲冷水。

【处方】生地四兩 党参二兩 柏仁 寸冬 当归 棗仁 茯神 五味各一兩 丹参 玄参 远志 菖蒲 天冬 桔梗 制草各五錢

【制法】共为細面，煉蜜为二錢一分重丸，硃砂为衣。棉紙包，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，日二、三次，用白水調服。

【禁忌】忌食辛辣。

二十五、承德

【功能与主治】主神志不宁，心悸失眠健忘等症。

【处方】生地四兩 党参二兩 麦冬 当归 柏子仁 茯神 酸棗仁 五味子各一兩 丹参 玄参 远志 菖蒲 天冬 桔梗 炙甘草各五錢

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，重二錢一分，硃砂为衣。

【剂量及用法】每服一丸，日三至四次，白开水調服。

【禁忌】忌食辛辣湯。

二十六、呼和浩特

【处方】生地十五斤 当归一斤十四兩 石菖蒲三斤十二兩 人參一斤十四兩 黃連十二兩 五味 天冬 麦冬 柏子仁 棗仁 元参 茯神 丹参 桔梗 远志各一斤十四兩

加料照前，人參照加二錢重。

【制法】共为細面，蜜小丸，硃衣。

附参考古方

【来源】1. 世医得效方。

【功能及主治】宁心保神，益血固精，壯力强志，令人不忘，清三焦，化痰涎，祛煩热，除惊悸，疗咽干口燥，育养心气。

【处方】熟地黄(洗) 人參(去蘆) 白茯苓(去皮) 远志(去心) 石菖蒲(去毛) 黑参 柏子仁 桔梗(去蘆) 天門冬(去心) 丹参(洗) 酸棗仁(去骨炒) 甘草(炙) 麦門冬(去心) 百部(洗) 杜仲(姜汁炒断絲) 茯神(去木) 当归(去尾) 五味子(去枝梗)各等份

【制法】上为末，煉蜜丸，每一兩

作十丸，金箔为衣。

【剂量及用法】每服一丸，灯心枣汤化下，食后卧服；作梧子丸吞服亦可。

2. 沈氏尊生书。

【功能与主治】水衰火旺。

【处方】人参 当归 天冬 柏子仁 五味子 麦冬 丹参 元参 茯苓 杏仁 远志 桔梗 生地 黄连

【制法】蜜丸。

琥珀养心丹

一、沈 陽

【功能与主治】补血清心，鎮靜安神。主健忘怔忡，惊悸失眠，心跳不宁，睡臥不宁，四肢倦怠，精神不爽，头暈心煩，口干液短，气血兩亏，面黃肌瘦。

【处方】琥珀(另研)二錢 远志五錢 龙齿(煨，另研)一兩 石菖蒲 茯神 人参(去蘆) 杏仁(炒)各五錢 当归 生地黄各七錢 黄连二錢 柏仁(去油)五錢 硃砂(另研)三錢 东牛黄(另研)一錢

【制法】共碾極細面，先將牛黄、硃砂、琥珀、龙齿研極細，以猪心血为小丸，金箔为衣。

【剂量及用法】每服一錢，宜在晚間，灯心湯送下。

【禁忌】辛辣物。

二、吉林(琥珀丹)

【功能与主治】安神定志，生津止渴。治气血虛弱，惊悸不安，夜臥不宁，怔忡等症。

【处方】琥珀 龙牙各二錢四分 远志 节蒲各二錢七分 杏仁一錢 当归二錢七分 茯神二錢四分 沉香 香附 寸冬 天冬 柏仁各二錢七分 生地 硃砂各二錢

【制法】共碾为細面，用煉蜜制为丸剂，每丸二錢七分七厘重。

【剂量及用法】每服一丸，白水送下。

附参考古方

【来源】杂病証治类方。

【功能与主治】治心血虛惊悸，夜臥不宁，或怔忡心跳者。

【处方】琥珀(另研)二錢 龙齿

(煨，另研)一兩 远志(黑豆、甘草同煮，去骨) 石菖蒲 茯神 人参 酸枣仁(炒)各五錢 当归 生地黄各七錢 黄连二錢 柏子仁五錢 硃砂(另研)三錢 牛黄(另研)一錢

【制法】上为細末，將牛黄、硃砂、琥珀、龙齿研極細，以猪心血，丸如黍米大，金箔为衣。

【剂量及用法】每服五十丸，灯心湯送下。

九轉黃精丹

一、北京(黃精丹)

【功能与主治】强壯补血。身体衰弱，面黃肌瘦，飲食減少。

【处方】当归 黃精各二百二十兩

【制法】用黃酒三百二十兩浸透蒸黑为度，共为細粉，煉蜜为小丸。

【剂量及用法】每服三錢，溫开水送下。

二、天 津

【功能与主治】强壯补血。主身体衰弱，腰膝痠軟，面黃肌瘦，精神倦怠，飲食漸少，自汗盜汗。

【处方】当归 生黃精各一斤 共二味一斤

【制法】以上藥料用黃酒一斤八兩浸透蒸黑为度，晒干，共为細粉，煉蜜为丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下。

三、蘭 州

【功能与主治】强壯补血。主身体衰弱，筋骨不足。

【处方】当归 黃精各一斤

【制法】前藥以黃酒浸透蒸黑为度，共研細，蜜小丸。

【剂量及用法】每次服三錢，白开水送下。

四、青島(黃精丹)

【处方】当归 黃精各十九斤

【制法】共为細面，煉蜜为丸。

五、呼和浩特

【处方】黃精十斤

【制法】九蒸九晒，轧細面，蜜小丸。

七宝美髯丹

一、天 津

【功能与主治】滋补肝肾，調血固精。主女子血亏脫髮，精神衰弱，男子腰腎不足，筋骨不壯。

【处方】故紙(鹽炒)四斤 怀牛膝 当归 茯苓(去皮) 菟絲子 枸杞子各八斤 制何首烏三十二斤

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每服一丸，淡鹽水送下。

二、上 海

【功能与主治】气血不足，肢体痿軟。

【处方】首烏二斤(用黑大豆二十四兩制，制后除去黑大豆) 茯苓 枸杞子 当归身(酒洗) 怀牛膝 补骨脂(用黑芝麻四兩炒，炒后除去黑芝麻) 菟絲子(蒸)各八兩

【制法】共研細粉，煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服三錢，食前用溫开水，或淡盐湯、米湯送服。

【禁忌】忌食蘿蔔、糟醋。

三、武汉(七宝美髯丸)

【功能与主治】身体羸弱，腰背酸痛，消渴淋瀝，遺精崩帶。常服久服，能烏鬚髮。

【处方】首烏二斤 菟絲子 淮牛膝 北枸杞 茯苓 全当归各八兩 补骨脂四兩

【制法】取上藥进行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜48—50%，迭成小丸，每錢不得少于二十五粒。或照淨粉量加煉蜜100—105%，合成大丸，每丸重三錢。

【剂量及用法】每服三錢，白开水或淡盐湯送服。

四、福 州

【功能与主治】治腎元气血不足，肝腎兩虛，羸弱周痺，消渴淋瀝，遺精崩帶，癰瘡痔腫等症。久服烏鬚、黑髮、却病延年。

【处方】何首烏雌雄各半三十二兩(制) 黑芝麻(炒)四兩 茯苓(人乳汁拌) 当归(酒洗) 菟絲 枸杞 故紙 牛膝 赤苓各八兩

【制法】共研細末，冬蜜为丸。

【备考】时方無芝麻。

五、杭 州

【功能与主治】滋补肝肾，补益气血。治气血兩亏，虛弱身痛，腎虛乏嗣，遺精崩帶，牙動髮白之症。

【处方】赤白何首烏二斤（切片用黑豆拌九蒸九晒，忌鉄器，研末）补骨脂（用黑芝麻拌透，去芝麻）当归 白茯苓（人乳拌） 菟絲子（酒蒸） 怀牛膝（酒蒸） 枸杞子（酒浸）各八兩

【制法】共研細末，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服二至四錢，溫酒或淡盐湯送下。

【禁忌】忌食萊菔、猪血、糟醋。

六、南 昌

【功能与主治】肝腎血虛，遺精崩帶，羸弱周痺，烏髮。

【处方】赤白何首烏（黑豆拌蒸晒）各一斤 牛膝（酒浸同首烏黑豆拌蒸晒） 当归身（酒洗） 枸杞子（酒浸） 菟絲子（酒浸） 补骨脂（黑芝麻拌炒） 白茯苓（人乳拌）各八兩

【制法】研为細末，煉蜜和丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢，淡盐水或升水送下。

【禁忌】辣椒、蘿蔔、生姜等有刺激食物；有風寒外感勿服。

七、蘭 州

【功能与主治】滋补肝肾，調血固精。主女人血亏，脫髮，崩漏帶下，男子腰腎不足，筋骨不壯，遺精衰弱等症。

【处方】何首烏三十二斤 牛膝 当归 茯苓 菟絲子 枸杞子各八斤 故紙四斤

【制法】以上共軋細末，蜜小丸。

【剂量及用法】每次三錢，淡鹽水送下，每日早晚各一次。

八、濟 南

【功能与主治】气血不足，榮衛不調，羸瘦諸瘵，腎虛無力，消渴遺精，鬚髮早白，牙齒動搖，筋骨無力，倦懶少食等症。

【处方】何首烏二十二斤 菟絲子 牛膝各八斤 故紙四斤 当归

杞子 茯苓各八斤

【制法】共为細面，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服三錢，白开水送下。

九、青 島

【处方】首烏雌雄各一斤 牛膝半斤 赤苓人乳拌蒸晒，白茯苓人乳拌蒸晒，枸杞 菟絲子各半斤 酒浸一夜 蒸晒。

【制法】將首烏先用泔水浸一夜，竹刀割去粗皮切片，再用黑豆鋪甑中一层、牛膝一层，鋪好以黑豆复之，豆熟为度，去豆晒干，次日如前法加豆蒸之，七蒸七晒去豆，可用归身一兩晒故紙酒洗，用黑芝麻同炒，無声，去芝麻，再和余药，共軋面，蜜小丸。

十、沈 陽

【功能与主治】补腎烏鬚。主鬚髮早白，未老先衰，容顏枯槁，腰痠腿疼，精神衰弱，气血不足。

【处方】何首烏一斤 牛膝（以何首烏先用米泔水浸一日夜，以竹刀割去粗皮，后切作大片，用黑豆鋪甑中一层，置何首烏一层，每鋪豆一层却鋪牛膝一层，层层相間，上鋪豆复之，以豆熟为度，去豆晒干次日如前，再用牛豆蒸，如法蒸七次，去豆用）八兩 破故紙 当归 茯苓 赤苓 菟絲子 枸杞各五兩

【制法】共軋極細面，煉蜜为丸，一錢重。

【剂量及用法】每日空心嚼一至二丸，溫酒或米湯、白鹽湯送下。

十一、吉林(美髯丹)

【功能与主治】补腎虛，壯元阳，烏鬚黑髮。治腎虛阳弱，气短血衰，鬚髮焦枯，遺精腎寒等症。

【处方】首烏一斤六錢七分 茯苓 当归 枸杞 怀牛膝 菟絲餅各五兩三錢四分 故紙二兩六錢七分

【制法】共为細面，煉蜜为小丸。

【剂量及用法】每服二錢，开水送下。

十二、呼 和 浩 特

【处方】首烏八兩 茯苓 故紙 当归 牛膝 枸杞 菟絲子各四兩

【制法】共为細面，蜜小丸。

既济固真丹

沈 陽

【功能与主治】补心腎，健脾胃。主精神恍惚，头目昏眩，阳痿陰湿，多汗遺精，脾胃虛弱，心腎不宁。

【处方】白茯苓 沉香 肉蓯蓉 五味子 附子 龙骨各一兩 巴戟 当归 川椒各五錢 栝子仁 金鈴子 酸棗仁（炒） 菟絲子 益智 补骨脂各二兩

【制法】共軋極細面，酒糊为小丸，以硃砂为衣。

【剂量及用法】每服一至二錢，空心盐酒送下。

附参考古方

【来源】杂病証治类方。

【功能与主治】治水火不既济，精神恍惚，头目昏眩，阳道痿弱，陰湿多汗，遺瀝失精，脾胃虛怯，心腎不宁；凡腎水欲升而沃心，心火欲降而滋腎，則坎离既济陰阳協和，火不炎上則神自清，水不滲下則精自固；常服壯阳固气，溫脾益血。

【处方】白茯苓 沉香 肉蓯蓉（酒浸一宿；如無，以鹿茸酥炙代之） 北五味子 附子 龙骨各一兩 川巴戟（去心） 当归（酒浸） 川椒（去目）各半兩 栝子仁（去壳炒） 酸棗仁（去壳炒） 金鈴子（去核炒） 菟絲子（酒浸別研） 益智仁 补骨脂（炒）各二兩

【制法】上共为細末，酒糊为丸，如梧桐子大，以辰砂末三錢为衣。

【剂量及用法】每服五、七十丸，空心用鹽酒送下。

金鎖正元丹

沈 陽

【功能与主治】滋补心腎，强身益气。主內臟衰弱，四肢倦怠，心虛盜汗，飲食減少，小便頻數，遺精白濁，精神昏憤，手足厥冷。

【处方】五倍子八兩 蓯蓉一斤 补骨脂一斤 巴戟一斤 炒胡蘆巴一斤 茯苓八兩 龙骨 硃砂（另研）各三兩

【制法】共軋極細面，酒糊为小丸。

【剂量及用法】每服二錢，鹽水

送下。

【禁忌】酸物。

附参考古方

【来源】太平惠民和剂局方。

【功能与主治】治真气不足，元藏虚弱，四肢倦怠，百节酸疼，头昏眩痛，目暗耳鸣，面色黄黑，鬓髮脱落，火皮腫痒，精神昏困，手足多冷，心胸痞闷，腰膝切痛，膝脛酸疼，不能久立，或脚弱隐痛，步履艰难，腰背拘急，不得俯仰，腹痛气刺，两胁虚胀，水谷不消，大便不调，嘔逆恶心，飲食减少，恍惚多忘，气促喘乏，夜多異夢，心忪盜汗，小便滑数，遺精白濁，一切元藏虛冷之病並治之。

【处方】五倍子 茯苓(去皮)各八兩 补骨脂(微炒)十兩 紫巴戟(去心) 葫蘆巴(炒) 菴蓉(淨洗焙)各一斤 朱砂(別研) 龙骨各三兩

【制法】上为細末，入研药今匀，酒糊为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服十五丸至二十丸，空心食前，温酒或鹽湯下。

草 还 丹

沈 陽

【功能与主治】补肾强精。主腎虛陽痿，腰痠腿疼，四肢倦怠，虛軟無力。

【处方】山萸肉一斤 破故紙半斤 当归四兩 麝香一錢

【制法】共碾極細面，煉蜜为小丸。

【剂量及用法】每服一至二錢，临臥酒鹽湯下。

附参考古方

【来源】扶寿精方。

【功能与主治】益元阳，补元气，固元精，壯元神；此延年續嗣之至药也。

【处方】山萸肉(酒浸，取肉)一斤 破故紙(酒浸一日，焙干)半斤 当归四兩 麝香一錢

【制法】上为細末，煉蜜为丸，梧桐子大。

【剂量及用法】每服八十一丸，临臥酒鹽湯下。

补 天 丹

一、沈 陽

【功能与主治】补肾固精，强心安神。主腎虛陰痿，早洩遺精，腰腿痠痛，盜汗自汗，疝气腹疼，四肢厥冷，癆傷虛損，怔忡健忘，神經衰弱，形容憔悴，淋漓白濁，腎囊涼湿。

【处方】杜仲二兩 貢白朮二兩半 白芍 故紙 熟地 远志各二兩 当归 枸杞各一兩五錢 核桃仁二兩 牛膝二兩 黃耆二兩 海狗腎一具 川陳了二兩 川芎 人參各一兩五錢 沉香五錢 木香一兩 小茴一兩五錢 甘草 茯神各一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸，二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，鹽湯送下。

【禁忌】生冷。

二、撫 順

【功能与主治】添精壯阳，补气，生血，强壯。主生殖器衰弱，腎虛滑精，陽痿不举，見色早洩，精液清冷，及气血衰弱，瘦弱难支，食少便溏，气息微弱，动則作喘，腰痠腿軟，健忘怔忡，自汗盜汗，寐而不实。

【处方】驢腎二兩 制芪五兩 柏仁兩半 杜仲三兩 白朮五兩 附子兩半 萸肉二兩 五味子兩半 白參 白芍各三兩 云苓二兩半 龙骨二兩 故紙 菴絲子各二兩 杞子四兩 砂仁六錢 巴戟四兩半 熟地四兩 当归三兩 复盆子兩半 鹿膠二兩

【制法】共为細面，蜜丸二錢重。

【剂量及用法】每服二錢，早晚食前各服一次，白水或淡鹽湯送下。

【禁忌】火盛者勿服。

三、吉林、哈尔滨 (神效补天丹)

【功能与主治】补气养血，添精壯阳。主治气血衰弱，氣虛血亏，百病叢起，瘦弱难支，納入便溏，气息微弱，动則作喘，腰酸腿軟，健忘怔忡，自汗眩暈，寐而不实。並治腎虛陽痿，腎虛滑精，陽痿不举，举而不坚，見色自洩，精液清冷，缺乏子嗣。

【处方】制芪五兩 巴戟四兩半

枸杞 熟地各四兩 杜仲 白朮 白芍 人參 故紙 菴絲子各三兩 塊苓 远志各二兩半 边桂 棗仁 萸肉 龙骨 当归各一兩 栝仁 五味 附子 复盆子各一兩半 鹿膠三錢 黑驢腎一具 砂仁二兩

【制法】先將驢腎用滑石燙焦，再合諸药一处碾細，煉蜜为小丸，如梧桐子大。包于紙袋內严封或貯于瓷罐內。

【剂量及用法】每服二錢，早晚空腹各服一次，白水或淡鹽湯送下。

【禁忌】忌食生冷；相火盛者勿服。

七宝益寿丹

沈 陽

【功能与主治】补肾气，益精髓。主头目眩暈，心跳气促，耳鳴眼花，四肢倦怠，腰痠膝冷，手足麻痺，中气不足，呼吸不暢，腎虛脾弱。

【处方】故紙(酒浸洗淨，用黑芝麻同炒無声为度，去芝麻用) 当归(去头尾，酒洗) 白茯苓(用人乳拌，浸透干蒸) 赤苓(黑牛乳浸，晒干蒸) 枸杞子 菴絲子(酒浸一宿，晒干)各半斤

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸，七分大。

【剂量及用法】每日空心嚼化一至二丸，温酒或米湯、淡鹽湯水送下均可。

补 髓 丹

沈 陽

【功能与主治】滋补心腎，益精保髓。主血虛無力，心腎不足，脾弱少食，四肢倦怠，腰背腹痛，五癆之症，自汗盜汗，諸虛百損。

【处方】猪脊髓 羊脊髓各一条 团魚一枚 烏雞一只(四味制淨，去骨存肉，用酒一大盤子沙壘內煮熟濾細) 大山藥一斤 蓮肉五兩 京棗一百个 柿餅十个

【制法】上四味用水一大瓶子壘內煮熟濾細，入前熟肉一处，以慢火熬之，再下明膠四兩 黃蜡三錢和一处研成膏，和平胃散，四君子丸面餅知母、黃柏木各一兩共十兩，搜和成剂，如十分坚硬入白蜜同熬，放青石上用水槌打如泥丸小丸。

【剂量及用法】每服二錢，燒棗湯送下。

附参考古方

【来源】沈氏尊生書。

【功能与主治】專治虛癆羸瘦，能補髓生精，和血順氣。

【处方及制法】雄猪脊髓 羊脊髓各一条 鳇魚一个 烏雞一只 將四样制淨，去骨取肉，用酒一大碗，沙鍋內煮熟，打爛，再入大山藥五条、建連肉半斤、大棗百个、柿餅十个，將四味修淨用井華水一大碗，于沙鍋內煮爛，与前肉合一处，慢火熬之，再下由明膠四兩，黃蜡五兩二味，逐漸添下，与前八味和打成膏，和平胃散末、四君子湯末、知母黃柏末各一兩，共十兩，如干入蜜同熬，起于青石上，以木槌打如泥为丸。

【剂量及用法】每百丸，不拘时，棗湯下。

延寿丹

禹县

【功能与主治】添精補髓，健脾養胃，調經養血，赤白帶下。

【处方】土炒白朮 青皮 生地 巴戟 姜炒厚朴 陈皮各一兩 花椒五錢 白茯苓 鹽炒杜仲各一兩 青鹽四兩 黑豆十斤 小茴香 鹽炒故紙 肉蓯蓉各一兩

【制法】先將上諸藥除青鹽、黑豆外，入銅鍋內熬，所得藥水用黑豆、青鹽再煮，水尽为度。

【剂量及用法】每服一錢，空心白開水送下。

【禁忌】火熱症忌服；孕婦及小兒忌服。

【备考】有效期間二年。

八味丹

沈陽

【功能与主治】補精髓，壯筋骨，益心智，理虛損，明目益睛，安神定驚。

【处方】珠砂 磁石 赤石脂 代赭石 人中黃 禹余糧 乳香 沒藥各一兩

【制法】共礮極細面，糯米湯为小丸。

【剂量及用法】每服一錢，鹽湯

送下。

壯陽丹

沈陽

【功能与主治】補腎益精。主腎虛遺精，腰痠氣弱，四肢痿乏，頭昏心悸，精寒精冷。

【处方】蓮肉八兩 甘枸杞 芡實 干山藥 白茯苓 山茱萸各四兩

【制法】共礮極細面，糯米一升，炒黃色为末，白糖五兩、香油五兩拌勻，磁器貯。

【剂量及用法】每早沸米湯任調二錢至四錢，食干物压之。

附参考古方

【来源】扶壽精方。（胡尚書壯陽丹）

【功能与主治】滋補元陽，美顏益壽。

【处方】蓮肉（水浸，去皮心）八兩 甘枸杞 芡實 干山藥 白茯苓（去皮） 山茱萸（去核）各四兩

【制法】上为細末，熟糯米一升，炒黃色为末，白糖五兩、酥油五兩拌勻，磁器貯。

【剂量及用法】每早朝沸米湯任調五六匙下，干物压之。年老人加辽參四兩。

濟陰丹

沈陽

【功能与主治】補腎、養血、生精。主腎虛精亏，房勞過度遺精，失眠健忘，筋骨痿弱，骨蒸癆熱，腰膝痠軟，手脚發冷。

【处方】龍骨一兩 黃柏（鹽酒炒）二兩 當歸（酒）一兩 熟地二兩 鎖陽（酒）一兩 白芍（酒）一兩五錢 牛膝三兩 虎脛骨（酥炙）一兩 知母（鹽炒）二兩 陈皮（酒）七錢五分 敗龜版（酥制）二兩

【制法】共礮極細面，羊肉二斤酒煮，搗膏为小丸。

【剂量及用法】每服二錢，淡鹽湯送下。

【禁忌】生冷食品。

滋補強壯丹

沈陽

【功能与主治】補氣養血，生精益髓。主體力虛弱，氣血兩亏，腎氣不足，四肢無力，肌肉消瘦，面色蒼白，未老先衰，髮白赤禿。

【处方】何首烏 赤白芍各四兩（用米泔水浸，竹刀刮去皮，切片，黑豆煎汁，浸透陰干，却用甘草汁拌，晒干搗末，不許蒸煮） 地骨皮（酒浸，晒干） 白茯苓（同上制）各五兩 生地黃 熟地黃 天冬 麥冬 人參各三兩

【制法】共礮極細面，煉蜜为丸，二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，溫酒送下。

宮方草靈丹

杭州

【功能与主治】強筋骨，壯氣血，益精髓，固牙齒。治勞傷過度、腎氣不足、老人陽虛、便溺不禁等症。

【处方】川椒（去目，炒出汗）四兩 白茯苓二兩 大熟地三兩 茅山朮（米泔水浸）四兩 制川烏頭一兩 懷山藥三兩 小茴香（鹽水炒）二兩 炙甘草一兩

【制法】共研細末，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服二錢，空腹時溫酒或淡鹽湯送下。

乾坤丹（乾坤種子丹）

吉林

【功能与主治】補腎壯陽，調經種子。治男子腎亏陽痿遺精，夢遺白濁，女子月經不調，赤白帶下，子宮寒冷。

【处方】當歸二兩七錢 山萸 鹿膠各二兩 枸杞 遠志 蛇床 酒芍 茯苓各一兩三錢四分 母丁香 川附子各六錢七分 香附一兩七錢 龍骨一兩 陈皮一兩七錢 杜鵑一兩 木瓜 杜仲 澤瀉 懷牛膝各一兩

【制法】共为細面，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服二錢，用黃酒送下。

还 少 丹

一、上海(楊氏还少丹)

【功能与主治】神疲肢軟，遺精盜汗。

【处方】杜仲(炒)一兩 怀牛膝 怀山药各一兩五錢 山茱萸肉 楮實子各一兩 石菖蒲五錢 淡菴蓉 五味子 茯苓 小茴香 远志(炒)各一兩 枸杞子 熟地各五錢 巴戟肉一兩

【制法】先將紅棗十只煮爛去皮核，余藥研細粉，和棗糊為丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢，溫開水送服。

二、南 京

【功能与主治】主神倦力弱，腰痠遺精，食慾不振。

【处方】怀山药 怀牛膝各一兩五錢(酒焙) 白茯苓 山茱萸肉 楮實子(酒蒸) 炒杜仲 炒五味子 巴戟天(酒浸，去心) 淡菴蓉(酒浸) 远志(甘草水制) 炒小茴香各一兩 石菖蒲 大熟地 枸杞子各五錢

【制法】共研細末，用紅棗皮四兩煮爛杵融，加煉白蜜為丸，每錢約前做二十粒。

【剂量及用法】每服二錢，早晚開水吞服。

三、武汉(还少丸)

【功能与主治】腰痠體倦，飲食不進，發熱盜汗，牙齒浮腫等症。

【处方】熟地黃五錢 山藥一兩半 山茱萸 杜仲各一兩(姜湯炒) 枸杞五錢 怀牛膝一兩半(酒浸) 远志(姜汁浸，炒) 肉菴蓉(酒浸) 五味子 楮實子 小茴香 巴戟肉各一兩 茯苓二兩 石菖蒲五錢 紅棗肉一兩

【制法】小丸——取上藥進行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜50~54%，迭成小丸，每錢不得少于二十五粒。

大丸——加煉蜜95~100%，和成大丸，每丸重為三錢。

【剂量及用法】每服二錢至三錢。

四、福 州

【功能与主治】治脾腎虛寒，氣血衰乏，不嗜飲食，發熱盜汗，遺精久濁，肌體瘦弱，牙齒浮腫等症。

【处方】熟地五錢 巴戟肉 萸肉 五味 远志 楮實 伏神(人乳制) 杜仲各一兩 杞子五錢 菴蓉一兩 怀牛膝 山藥各一兩五錢 小茴一兩(鹽水炒) 石菖蒲五錢 人參一十枚(牛膝、楮實、巴戟、菴蓉、枸杞俱酒炒，杜仲姜酒炒)

【制法】共為末，蜜司紅棗肉，搗煉為丸。

【剂量及用法】每服五錢，鹽湯送下。

五、杭州(楊氏还少丹)

【功能与主治】補血益精，強身壯體。治脾腎虛寒，精血虧耗，飲食少思，肌體瘦弱，耳鳴目眩，牙齒浮腫。凡老年血氣就衰，中年精髓虧損，腰膝痠痛，陽痿遺精等症。

【处方】大熟地(砂仁酒拌九蒸九晒)二兩 远志肉 巴戟肉(酒浸) 楮實子(酒蒸) 杜仲(姜汁炒) 淡菴蓉(酒浸)各一兩 枸杞子(酒浸)一兩五錢 石菖蒲五錢 五味子 白茯苓(人乳拌)各一兩 怀牛膝(酒蒸)一兩五錢 小茴香(鹽水炒)一兩 怀山药一兩五錢 山茱萸一兩 大棗肉八兩

【制法】共研細末，將棗肉煮熟打爛，酌加煉蜜為丸。

【剂量及用法】每服三至四錢，淡鹽湯或開水送下。

六、南 昌

【功能与主治】精血不足，精髓不固，頭暈盜汗，牙齒浮腫，神衰力弱，腰痠體倦，遺精白濁，子宮寒冷。

【处方】熟地二兩 杜仲(姜汁酒拌同炒斷絲) 楮實(酒蒸) 五味子(炒) 巴戟(酒浸去心) 肉菴蓉(酒浸一宿，去腐) 茯苓(人乳炙制)各一兩 山藥一兩五錢 远志(甘草炙) 山茱萸 小茴(鹽水炒)各一兩 怀牛膝(酒浸焙)一兩五錢 枸杞(酒浸)二兩 石菖蒲 甘草各五錢

【制法】共研細末，煉蜜及紅棗肉各半和丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每三至五錢，清

晨淡鹽湯下，臥時溫酒下。

七、重 慶

【功能与主治】大補心腎脾胃，四經虛損。治精血不足，精髓不固，飲食不進，發熱盜汗，牙齒浮腫，神衰力弱，腰痠體倦，兼煖子宮。

【处方】石菖蒲五錢 山藥 川牛膝各一兩五錢 山茱萸 远志 巴戟大 五味子 茯苓 楮實子各一兩 枸杞 熟地各五錢 小茴香 肉菴蓉 杜仲各一兩

【制法】共研細末，另用紅棗二兩熬膏，加蜂蜜為丸。

【剂量及用法】每服三錢，早晨鹽湯，臥時溫酒下。

八、昆 明

【功能与主治】機能日減，肢軟腰痛。

【处方】熟地 山藥各一兩五錢 淮牛膝 枸杞 棗皮各一兩 茯苓一兩五錢 杜仲 炙远志 五味 小茴 楮實 炒巴戟 大芸各一兩 菖蒲五錢 大棗一兩五錢

【制法】研末，煉蜜為丸。

【剂量及用法】每服一丸，水吞，每服二錢半，用開水早晚各服一次。

【禁忌】感冒忌服。

九、蘭 州

(參茸固本还少丹)

【功能与主治】滋補強壯，益體健腦。主氣血兩虧。

【处方】白芥子二斤半 砂仁六斤四兩 白芍二斤半 蓮子五斤 花椒二斤半 焦朮 黃芩各五斤 远志二斤半 巴戟天三斤半 山藥七斤半 小茴香六斤四兩 菴絲子七斤半 故紙三斤十二兩 麥芽神曲各七斤半 貢膠十斤 龟板二斤半 蒺藜十斤 杜仲三斤十二兩 龟膠十封(二斤半) 夏虫 土九各五斤 海馬二兩 淫羊藿五斤 鹿筋(代骨)十斤 炙芪五斤 炙草四斤 五味子六斤四兩 當歸七斤半 川芎三斤十二兩 木瓜六斤四兩 川牛膝 仙茅各三斤半 黑豆十二斤半 酒地十五斤 麥冬 陳皮 广木香各二斤半 大芸 地龍各五斤 法夏二斤半 附片七斤半 生地五斤 母丁香二斤半 云苓 枸杞各七斤半 天冬二斤半 萸肉

三斤半 貝母五斤 柏仁二斤半
月石二斤 首烏 东山楂各七斤半
旱蓮草二斤半 菊花五斤 怀牛膝
九斤 龙骨五斤 元桂五斤 鹿茸
丽参各一斤半 党参五斤 阳起石
一斤半 硃砂一斤四兩 魚膠五斤

【剂量及用法】每服三錢，鹽開水送下。

十、青 島

【处方】山藥 牛膝 远志 山
萸 茯苓 五味子 巴戟 菟蓉
菖蒲 杜仲 茴香各二兩 枸杞
熟地各四兩

【制法】共為細面，蜜小丸。

十一、沈 陽

【功能与主治】补心腎，益脾胃。
主怔忡健忘，心神不安，脾胃虛弱，
飲食少思，遺精白濁，腰腿痠軟，盜
汗倦怠，虛損瘦弱。

【处方】山藥 牛膝 远志 山
萸肉 茯苓 五味子 巴戟 楮實
子 肉菟蓉(酒浸一宿) 石菖蒲
杜仲(姜汁、酒同拌炒) 茴香各一
兩 枸杞子 熟地黃各二兩

【制法】共碾極細面，煉蜜同棗
肉為丸，二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，用溫
酒或鹽湯送下。

十二、撫順(真人还少丹)

【处方】熟地二兩 白朮一兩
枸杞 山藥各一兩半 杜仲 楮實
小茴 巴戟各一兩 菟絲子三兩
寸芸五錢 远志一兩 菖蒲五錢
山萸 牛膝 五味 首烏各一兩

【制法】共為細面，蜜丸三錢大。

十三、吉林、哈尔滨

(真人还少丹)

【功能与主治】补腎添精。主治
腎虛，腰痛肢痠，头晕目眩，髮落健
忘，心跳怔忡，精神疲倦，耳鳴齒搖，
虛弱盜汗。並治滑精，腎不藏精，精
自滑脫，精冷清薄，子嗣缺乏。

【处方】熟地四兩 山藥 萸肉
菖蒲 远志 楮實 小茴 五味
枸杞 菟蓉 巴戟 怀牛膝 杜仲
茯苓各二兩

【制法】將以上藥品 共為細面，
煉蜜為小丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢，白水
送下，早午晚服三次。

十四、呼和浩特

(真人还少丹)

【处方】九地八兩 山藥 茯苓
各四兩 枸杞二兩 远志二兩五錢
茴香 巴戟 杜仲各二兩 大芸
一兩五錢 五味五錢 牛膝一兩五
錢 石菖蒲 楮實子 故紙各二兩

【制法】共為細面，蜜小丸。

附参考古方

【来源】楊氏家藏方。

【功能与主治】大补本氣虛損及
脾胃怯弱，心忪恍惚，精神昏憤，氣
血凝滯，飲食無味，肌瘦體倦，目陷
耳聾。

【处方】下山藥 牛膝(酒浸一
宿焙干)各一兩半 白茯苓(去皮)
山萸肉 楮實 杜仲(去粗皮生薑
汁和酒炙令香熟) 五味子 巴戟
(去心) 肉菟蓉(酒浸一宿，切焙
干) 远志(去心) 茴香各一兩
石菖蒲 熟干地黃(洗焙) 枸杞子
各半兩

【制法】上件為細末，煉蜜入蒸
熟去皮核棗肉和勻，丸如梧桐子
大。

【剂量及用法】每服五十丸，空
心食前，溫酒鹽湯下，日三服。若只
一服，倍加丸數。五日有力，十日眼
明，半月筋骨盛，二十日精神爽，一
月夜思飲。

【备考】此藥無毒，平補性溫，百
無所忌，久服牢固，身輕目明難老，
百病俱除，永無症疾，行步輕健。

水陸二仙丹

一、上海(水陸二味丸)

【功能与主治】夢遺滑泄。

【处方】金櫻子 芡實各一斤

【制法】芡實研細粉，金櫻子煎
膏泛丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每服二錢，淡鹽
湯送服。

【禁忌】忌刺激性食物。

二、福州

【功能与主治】瀉精固脫。治男
子遺精白濁，婦女諸淋淫帶等症。

【处方】芡實 金櫻子各十六兩
【制法】芡實研末，金櫻子煎膏，
和為丸。

【剂量及用法】每服三錢，空心
淡鹽湯送下。

三、杭 州

【功能与主治】滋陰益精，降熱
止脫。治腎虛陰虧，精關不固，遺精
滑精，虛體白濁，婦人白帶等症。

【处方】芡實(蒸熟研粉)一斤
金櫻子(煎膏)一斤

【制法】將芡實粉和金櫻子膏為
丸。

【剂量及用法】每服二錢，淡鹽
湯送下。

四、南 昌

【功能与主治】脾虛肝熱，男子
白濁，夢遺泄精，婦人淋漓帶下。

【处方】金櫻子 芡實米各五斤

【制法】先將金櫻子熬膏，芡實
米研為細粉，以金櫻子膏和芡實粉
為丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每日服二次，每
服三錢，食前溫酒或淡鹽湯送下。

【禁忌】戒房勞。

五、沈 陽

【功能与主治】清淋上濁。主五
淋白濁，尿道赤腫，小便疼痛，經久
不愈。

【处方】金櫻子(去子洗淨，蒸熟
用湯淋之，取汁入銀鍋內，慢火熬稀
膏) 芡實粉各一兩

【制法】將煎膏混芡實粉，酒糊
為小丸。

【剂量及用法】每服一錢至二
錢，溫酒或鹽湯送下。

【禁忌】忌食辣腥及有刺激性食
物。

三才封髓丹

一、上 海

【功能与主治】血虛內熱，夢遺
滑泄。

【处方】黨參一兩 黃柏(酒炒)
二兩 熟地二兩 甘草(炙)七錢五
分 天冬二兩 砂仁一兩五錢

【制法】共研細粉，煉蜜為丸，如
梧桐子大。

【剂量及用法】每服三錢，溫開

水送服。

【禁忌】忌刺激性食物。

二、武汉(三才封髓丸)

【功能与主治】骨蒸潮热，咳嗽带血，夢遺失精，腰膝無力。

【处方】同上海。

【制法】小丸——上药干燥，混合碾细，照淨粉量加煉蜜50—54%，迭成小丸，每錢不得少于二十五粒。

大丸——加煉蜜115—120%，和成大丸，每丸重为二錢。

【剂量及用法】每服三至五錢。

三、福州(1)

【功能与主治】降心火，益肾水，滋陰养血，潤而不燥，中和純粹，培养三焦。

【处方】天冬 熟地 人参各一兩 黄柏(炒褐色)二兩 砂仁五錢 甘草(炙)七錢

【制法】上为末，麵糊丸，桐子大。

【剂量及用法】每服五、七十丸，以肉苁蓉五錢切片酒浸一宿，次日煎三、四沸，空心送下。

四、福州(2)(原方封髓丹)

【功能与主治】治夢遺失精及与鬼交。

【处方】砂仁一兩 黄柏二兩 炙甘草七錢

【制法】共研細末，冬蜜为丸。

【剂量及用法】每服三錢，淡鹽湯送下。

五、杭州

【功能与主治】滋陰养血。治虛熱內盛，腎气衰弱，精关不固，夢遺失精，欬嗽肌瘦，虛人便秘等症。

【处方】潞党参一兩 黄柏(酒炒)二兩 淡苁蓉(酒浸)五錢 大熟地二兩 春砂仁一兩五錢 天門冬二兩 炙甘草七錢五分

【制法】共研細末，水煮麵糊为丸。

【剂量及用法】每服三至四錢，淡鹽湯或开水送下。

六、大同

【功能与主治】滋陰清热，固精。

【处方】天冬一兩 党参五錢 鹽黄柏 生地各一兩 砂仁五錢

甘草一兩。

【制法】共为細面，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服三錢。

七、沈阳

【功能与主治】补肾固精，治夢中遺精，神疲气促，心悸头眩，中气不足。腰腿痠軟，精关不固，淋瀝便溺，神經衰弱。

【处方】天冬 熟地黄 人参各五錢 黄柏二兩 砂仁一兩 炙甘草七錢

【制法】共碾極細面，麵糊为小丸。

【剂量及用法】每服二至三錢，空心食前，用白水送下。

附参考古方

【来源】衛生宝鑑。

【功能与主治】降心火益肾水，滋陰养血，潤补下燥。

【处方】天門冬(去心) 熟地黄 人参各半兩 黄柏二兩 砂仁一兩半 甘草(炙)七錢半

【制法】上六味，为末麵糊丸，如桐子大。

【剂量及用法】每服五十丸，苁蓉半兩切作片子，酒一錢浸一宿，次日煎三、四沸，去粗，空心食前送下。

周公百岁酒

一、福州

【功能与主治】此酒大补气弱阳衰。治亡血失精，諸風癱瘓，勞伤虛損；常服烏鬚髮。

【处方】党参 於朮 麦冬 黄肉 枸杞 陈皮 川芎 防風 龟板膠各一兩 黃芪二兩(炙) 生地 熟地 当归各一兩二錢 茯神二兩 五味 羌活各八錢 桂心六錢(或另加大紅棗 冰糖各二斤)

【制法】共为粗末，裝入夏布袋，浸高粱酒二十斤。

二、哈尔滨

【功能与主治】补血、益气、疎風。主虛弱，中風。虛弱，諸虛百損，气血不充，亡血失精，勞伤腎衰。中風，風中經絡，左癱右瘓，半身不遂，麻木不仁。

【处方】黃芪 茯神各二兩 肉桂六錢 归 生地 熟地各一兩二錢 党参 白朮 寸冬 茯苓

陈皮 黄肉 枸杞 川芎 防風 龟膠各一兩 五味 羌活各八錢 高粱酒二十斤

【制法】將药剉粗末，裝夏布袋內，浸酒中，入大罈密封口，重湯煮三柱香，取起安置靜室七日。

【剂量及用法】每日早晚，隨量斟飲。

【禁忌】孕妇忌飲。

参茸药酒

天津

【功能与主治】滋补强壮。主身衰弱，筋骨痿弱，腰膝疼痛，胸腹脹滿，腹瀉痞积，男子遺精阳痿，妇女經血不調。

【处方】生黃芪一斤四兩 熟地十兩 木通二兩 广木香二兩 菟絲子 淫羊藿(羊油炒)各四兩 紫稍花二兩 灯心四錢 巴戟肉(甘草水制) 蛇床子各四兩 煅龙骨 車前子(鹽炒)各二兩 苁蓉(酒蒸)四兩 馬蘭子 澄茄各一兩 韭菜子二兩 煅干漆 故紙(鹽炒)各二兩 桑螵蛸 沙参各二兩 枸杞子一斤二兩 大茴香四兩 煅牡蠣二兩 全蠍二兩 山萸肉(酒制)四兩 海馬五錢 当归八兩 巢解三兩 海龙一兩 茯苓(去皮)四兩 核桃仁五兩 青楓藤 海楓藤各四兩 川芎 木瓜 灵仙各四兩 白朮(麸炒) 白芷各六兩 怀牛膝 紅花 菊花各八兩 五加皮 广皮各一斤 色萎黃一斤八兩 独活二兩 制川烏 制草烏各二兩 肉豆蔻(滑石煨)二兩 馬蘭花一兩 玉竹四斤 党参(去蘆)四斤八兩 人參(去蘆)二斤 远志肉(甘草水制)二兩七錢

【制法】先將白酒四百斤放入缸內，用梔子三斤泡色适合为度去渣。以上各药用水熬汁去渣濾淨，煉成稀膏狀，化白蜜二十斤、阿膠十二斤兌入酒內，冰糖四十斤水化开兌入酒內。另兌：

鹿茸面一斤 沉香面一兩二錢 母丁香面二兩 檀香面四兩 薏仁面三兩 公丁香面 砂仁面 肉桂面各二兩

【剂量及用法】每次溫服五錢，每日服二次。

【禁忌】青壯年气盛血燥者忌

服。

阿 膠

一、北 京

【功能与主治】滋补潤肺，养血調經。主体虛久嗽，吐血衄血；妇人經血不調，崩漏帶下。

【处方】驢皮二十張

【制法】先將驢皮洗淨，浸透，煎七晝夜，加黃酒四十八兩、冰糖八十兩成膠。

【劑量及用法】每服三錢，黃酒或白開水蒸化，加糖少許，早晚各服一次。

二、上海(驢皮膠)

【功能与主治】补血潤燥。

【处方】驢皮

【制法】將驢皮鐮去毛，刮去皮甲腐肉，漂洗清潔，晒干，候至冬季入鍋，煎一天一夜(煎前一天先以水浸，切開)，將出鍋藥汁澄清，過濾收膠。

【劑量及用法】加黃酒燉化，開水沖服，每次一羹匙。

三、重 庆

【功能与主治】清肺養肝滋腎，和血液，堅筋骨，利大小腸。

【处方】驢皮不拘多少

【制法】驢皮水浸，鐮去外皮毛，去肉筋。清水浸透洗淨，割成塊，放入銅鍋內加黃酒三斤、冰糖十斤，再入大量清泉水，文武火熬化，傾出汁去渣收成老膏候用。

【劑量及用法】每用數錢，酒化服或與其他藥同服。

【禁忌】服後勿服大黃。

四、禹 县

【功能与主治】清肺養肝，滋腎和血。主吐血衄血，虛勞咳嗽，止血安胎，經水不調。

【处方】驢皮三百六十斤

【制法】將驢皮刮淨，水浸一日，下鍋熬七晝夜，加冰糖三斤、香油五斤。

【劑量及用法】遵醫囑用之。

【禁忌】胃弱便糖忌用。

【備考】陳久者好。

五、

处方刪

六、哈尔滨(黑驢皮阿膠)

【功能与主治】清肺滋腎，養心補肝，益氣和血，安胎固漏。療腸風下血，打痛疽腫毒。

【处方】全黑驢皮 陳皮 甘草

【制法】阿井水加陳酒，桑木火煎熬，去藥渣收膠。切長方塊。

【劑量及用法】多用于醫生处方藥劑內。

龜 版 膠

一、北 京

【功能与主治】養血化癥，退蒸熱，祛痰疳。主午后發燒，久嗽痰疳，婦女微凝前帶。

【处方】龜版一千六百兩 橘皮 甘草各十六兩

【制法】將龜版洗淨，黃酒四十八兩噴，煎七晝夜，加阿膠一百六十兩，將方內橘皮、甘草煎膏兌入成膠。

【劑量及用法】每服三錢，黃酒燉服或入煎劑。

【禁忌】孕婦忌服。

二、上 海

【功能与主治】腰痠膝軟，骨蒸崩漏。

【处方】龜版

【制法】夏天將龜版放入缸中，加水爛去腐衣，漂洗清潔，再漂露數日，使毫無臭味為度。待冬季入鍋，煮三天三晚出鍋。將藥汁澄清過濾收膠。

【劑量及用法】加黃酒適量燉烱，開水沖服，每次一羹匙。遵醫師指示服用。

三、重 庆

【功能与主治】理血補心腎；治痰痞心虛，腎敗血弱，骨蒸勞熱，陰亏、腰痠骨痛。

【处方】龜版不拘多少

【制法】清水浸龜版，泡去肉筋及黑皮，放入鍋內，用姜、葱濯去腥味。再入鍋燉一日三夜，膠汁收成老膏候用。

【劑量及用法】每次用酒蒸化服，不拘多少或與其他藥物同服。

四、禹 县

【功能与主治】心腎血亏，骨蒸潮熱，勞傷陰亏，腰痠骨疼。

【处方】龜版 驢皮各三百斤

【制法】將龜版洗淨，驢皮刮淨，下鍋熬七晝夜。加冰糖、香油各五斤即成膠。

【劑量及用法】遵醫囑用之。

【禁忌】胃弱便糖忌用。

【備考】陳久者好。

五、濟 南

【功能与主治】骨蒸潮熱，腰痠膝軟。

【处方】龜版

【制法】夏季將龜版放入缸中，加水泡去腐肉漂洗清潔。再漂露數日，使毫無臭味為度。待冬季入鍋熬三晝夜，將藥汁澄清過濾收膠。

【劑量及用法】用適量黃酒燉化，開水沖服。每次一羹匙。

鼈 甲 膠

一、北 京

【功能与主治】退骨蒸，破結癖。主骨蒸潮熱、疳疾痞塊。

【处方】鼈甲一千九百零四兩

【制法】洗淨，加黃酒四十八兩，噴晒干後，煎七晝夜，加阿膠一百六十兩成膠。

【劑量及用法】每服三錢，黃酒調服，或入湯劑。

二、上 海

【功能与主治】勞瘦骨蒸。

【处方】鼈甲

【制法】夏天將鼈甲放在缸內，

加水爛去污衣，漂洗清潔，再漂露數日，使毫無氣味為度，待冬季入鍋，煎三天三夜，出鍋，將藥汁澄清，過濾收成膠。

【劑量及用法】加黃酒燉化，開水沖服。每次一羹匙或遵醫師指示服用。

【禁忌】虛寒體質及胃弱泄瀉者勿服。

三、杭 州

【功能與主治】滋陰益血，清肝退熱。主虛勞骨蒸，久瘧寒熱，血癥痞塊，瘡腫痔核，婦人經閉產難，小兒驚癇癰疹等症。乃補陰散結之品。

【處方】鼈甲

【劑量及用法】用酒水各半烱化，或酒浸隔湯燉化，酌加冰糖成膏，開水沖服。

鹿 角 膠

一、北 京

【功能與主治】興奮神經，滋補止血。主神經衰弱，腰膝痠痛，頭眩耳鳴及婦女崩漏帶下。

【處方】鹿角一千六百兩

【制法】將鹿角洗淨，切碎，煎七晝夜。加黃酒四十八兩、冰糖八十兩，熬汁兌入收膠。

【劑量及用法】每服三錢，黃酒燉服或入湯劑。

二、上海（白膠）

【功能與主治】貧血怯寒，肢體無力，腰膝痠軟。

【處方】鹿角

【制法】將鹿角鋸斷，漂洗清潔。至冬季入鍋，煎六天六晚。每天出鍋一次，將藥汁澄清過濾，收成濃汁。至最后一次將歷次濃汁和勻收膠。

【劑量及用法】加黃酒適量燉化，開水沖服。憑醫方處方購用。

三、重 慶

【功能與主治】補中益氣，長肌肉生髓，止痛安胎，強筋骨，壯腰膝，生精血，潤鬚髮。

【處方】鹿角不拘多少

【制法】先將鹿角截節，水泡吹血。入鍋內，文武火熬至對時，濾出膠汁。攪水再熬，如此三日三夜，將汁用銅鍋收成老膏候用。

【劑量及用法】不拘。

【禁忌】服後不能服大黃。

四、禹 縣

【功能與主治】補腎生精，強筋健骨，腎虧腰疼，虛損勞傷。

【處方】鹿角三十斤 牛皮一百斤

【制法】將鹿角洗淨，浸水七天。將牛皮刮淨，下鍋熬七晝夜。加無灰酒三斤、冰糖二斤、鹿角霜十斤。香油五斤。

【劑量及用法】遵醫方處方購用之。

【禁忌】痰火症忌用。

【備考】陳久者好。

五、濟 南

【功能與主治】體虛無力，腰膝酸軟，婦人崩漏帶下。

【處方】鹿角一百斤 冰糖五斤

【制法】鹿角洗淨切碎，煎七晝夜成濃汁，冰糖熬汁兌入收膠。

【劑量及用法】每服二錢，黃酒燉服，或入煎劑。

六、吉林、哈爾濱

（杜煎鹿角膠）

【功能與主治】益腎生精，強筋骨，壯腰膝。主四肢痠痛，頭暈眼花，崩帶遺精，一切元氣虛損，勞傷等症。

【處方】鹿角五十兩 黃精 熟地各八兩 枸杞 天冬 寸冬各四兩 牛膝 椿實 菟絲子 桂元肉各一兩 櫻子四兩

【制法】上藥用水煎熬去渣收膠，切成方塊，用蠟紙包裹。

【劑量及用法】溫酒化服或合湯藥煎服。

【禁忌】孕婦忌服。

黃 明 膠

一、杭 州

【功能與主治】補陰活血，潤燥利腸。主肺破出血，嗽嗽吐血，風濕脚氣，走注疼痛，瘰癧結核，痛疽腫毒，婦人胎動下血，小兒痘癰等症。

【處方】牛皮煎膠

【劑量及用法】酒浸隔湯燉化，酌加冰糖成膏。開水沖服。

二、禹 縣

【功能與主治】補陰潤燥。治諸

血症，癰疽。

【處方】牛皮三百六十斤

【制法】將牛皮浸水三日，下鍋熬七晝夜，去渣漂淨。加冰糖二斤、香油五斤攪勻即成膠。

【劑量及用法】遵醫方處方購用之。

【禁忌】胃弱便溏忌用。

【備考】陳久者好。

龜鹿二仙膠

一、北京（龜鹿膠）

【功能與主治】補氣補血，強壯身體。主氣虛血虧，骨蒸夢遺，精神萎靡。

【處方】龜版八百兩 鹿角八百兩 共二味

【制法】將鹿角、龜版洗淨，煎七晝夜，加入黃酒四十八兩、冰糖八十兩成膠。

【劑量及用法】每服三錢，黃酒燉服。

二、上海（龜鹿膠）

【功能與主治】骨蒸遺精。

【處方】鹿角膠二百四十兩 龜版膠三百六十兩 枸杞子 黨參各一斤

【制法】先將枸杞子、黨參煎汁三次，榨淨澄清，過濾，收成濃汁，再以鹿角膠、龜版膠共同化入收膠。

【劑量及用法】加黃酒適量燉化，開水沖服，每次一羹匙。憑醫方處方購用。

三、武漢（龜鹿參杞膏）

【功能與主治】體弱神倦，目視昏花。

【處方】龜膠四兩 鹿膠四兩 黨參八兩 枸杞八兩

【制法】先將黨參、枸杞，加水五倍，煮沸三小時，照例三次，末次压榨過濾去渣，將濾液合併，再投入龜膠、鹿膠，加熱融化後濃縮至四斤，加水糖一斤半，使成膏二斤半即得。

【劑量及用法】每服二錢，黃酒燉服。

四、福州（龜鹿二仙丸）

【功能與主治】大補精髓，益氣養神，壯陽滋陰之聖藥。

【處方】人參十五兩 枸杞二十兩 鹿角 龜版各十斤

【制法】共研細末，煉蜜为丸。

【备考】时方人参、枸杞各八兩
鹿膠、龟膠各四兩

五、南昌(龟鹿膠)

【功能与主治】体弱神倦，目視昏花。

【处方】石柱参 枸杞子各二斤
龟版膠 鹿角膠各五十斤

【制法】先將石柱参、枸杞子熬煮成膠，再和龟、鹿膠攪勻收膠。

【剂量及用法】每服三錢，黃酒燉服。

六、重 庆

【功能与主治】大补精髓，益氣養神。

【处方】龟版膠十兩 鹿角膠
枸杞子各二十兩 山藥一百兩 党参 元肉各十五兩

【制法】研細末，煉蜜和膠汁为小丸，紙盒包裝。

【剂量及用法】初服三錢，漸增至五錢。

【备考】因膠質过重，方中加山藥百兩，方能成丸。

七、沈陽(龟鹿二膠)

【功能与主治】补肾强精，补精填髓，益氣養神。主滑精易洩，腰腿痠軟，筋骨痿弱，一切虛損不足等症。

【处方】鹿角(血者)十斤 龟版五斤 以上二味另熬膏 枸杞子三斤 人参一斤五兩

【制法】上用鉛罈，如法熬膠。

【剂量及用法】初服酒化一錢，漸加至一錢半，空心下。

八、吉林、哈尔滨

(龟鹿膠)

【功能与主治】补肾益精，助氣血。主真陰亏损，精氣枯竭，瘦弱少氣，目視不明，夢遺滑精，腰腿無力。

【处方】龟版 鹿角 人参 枸杞各等分

【制法】水煎熬，去渣收膠，切成方塊，裝于鉄盒內。

【剂量及用法】好酒化服，或合湯剂处方並用。

附参考古方

【来源】蘭臺軌范。

【功能与主治】大补精髓，益氣養神。

【处方】鹿角(血者)十斤 龟版(自敗者)五斤 以上二味另熬膏 枸杞子(甘州者)三十兩 人参十五兩

【制法】上用鉛罈，如法熬膠。

【剂量及用法】初服酒化一錢五分，漸加至二錢，空心下。

鹿鞭膠(鹿腎膠)

上 海

【功能与主治】男子精力不足，腎虛耳鳴，妇人畏寒肢冷，腰脊痠痛。

【处方】鹿鞭

【制法】將鹿鞭洗淨去腐肉，漂淨，煎二天二晚出鍋，將藥汁澄清過濾收膠。

【剂量及用法】憑医师处方購用。

黃狗鞭膠、黃狗腎膠)

上 海

【功能与主治】腎亏体冷。

【处方】黃狗鞭

【制法】將黃狗鞭洗淨去腐肉，漂淨，煎二天二晚出鍋，將藥汁澄清，過濾收膠。

【剂量及用法】憑医师处方購用。

龟 龄 集

天 津

【功能与主治】兴阳助腎，大补真元。主阳虛氣弱，盜汗遺精，筋骨無力，行步艰难，头昏眼花，神經衰弱，妇女氣虛血寒，赤白帶下。

【处方】鹿茸(去毛)一斤九兩 人参(去蘆)一斤四兩 熟地六兩 制山甲八兩(用苏合油二兩制) 生地八兩 石燕十兩(用鮮薑一兩制) 茯苓(酒蒸)九兩 家雀腦一百个 地骨皮四兩(用蜜一兩制) 杜仲炭(鹽炒)二兩 甘草一兩(用蜜二錢制) 天冬四兩(用黃酒一兩制) 枸杞子三兩(用蜜一兩制) 川

牛膝四兩(用黃酒三兩制) 大蜻蜒(去足翅)二兩 海馬十兩(用苏合油三兩制) 大青鹽(清炒)八兩 淫羊藿二兩(用牛乳一兩制) 蚕蛾(去足翅)九錢 故紙二兩(用黃酒二兩制) 砂仁四兩 鎖陽二兩(用黃酒二兩制) 硫黃三錢 菟絲子三兩(用黃酒二兩制) 急性子二兩五錢(水煮) 細辛一兩五錢(用醋一兩五錢制) 公丁香二兩五錢(用川椒二錢炒去川椒) 生黑附子一斤二兩(用清水煮一次，用醋一斤二兩煮一次，用蜜三兩制)

【制法】用方內家雀腦、硫黃二味裝入豬大腸內，用清水煮之，至硫黃和家雀腦溶合一起時倒出，去豬大腸，晒干，再合以上藥軋成粗面裝入銀桶內蒸之，蒸至二十二小時，將粗面倒出，再將硃砂面二兩五錢，和藥面和勻，再裝入銀桶內繼續蒸三十二小時，倒出涼干裝瓶，每瓶裝一錢。

【剂量及用法】每瓶分十次服，白開水送下。

参茸三腎粉

北 京

【功能与主治】兴奋神經。主神經衰弱，用腦過度，腰膝痠痛，腎囊濕冷。

【处方】黃毛鹿茸七厘四毫 人参一分四厘七毫 鹿腎二分九厘四毫 驢腎四分四厘一毫 狗腎四厘四毫

【制法】共为細粉，裝瓶，重一錢。

【剂量及用法】春、夏每瓶分四次服，秋、冬分二次服。

法制黑豆

一、天 津

【功能与主治】滋養強身。主腰腿痠痛，記憶力衰退，眼睛昏曠，头晕耳鳴，貧血遺精。

【处方】雄黑豆八斤 熟地 当归 茯苓(酒蒸) 茯苓(去皮) 菟絲子 木瓜 杜仲炭(鹽炒) 枸杞子 旱蓮草各一兩 白朮(數炒) 怀牛膝 續斷 故紙(鹽炒)各八錢 厂皮 川芎 小茴香(鹽炒)各五錢 甘草四錢 制女貞子一兩 炒

智益仁五錢

【制法】以上除雄黑豆外，其余藥料熬汁去渣，加青鹽四兩，煮雄黑豆以汁干為度。

【劑量及用法】每次服四十粒，嚼碎白開水送下。

二、濟 南

【功能與主治】腰腿疼痛，記憶衰弱，目視昏暗，頭眩耳鳴各症。

【處方】同天津。

【制法】上藥熬汁去渣，加青鹽一兩，濾清將黑豆放入拌勻，慢火靠盡晾干。

【劑量及用法】每服四十粒，細嚼嚥下。

三、青 島

【處方】大黑豆五斤 青鹽二兩五錢 菖蒲一兩 大茴香 杜仲 核桃肉 白芨 沙苑 故紙各二兩

【制法】先將諸藥熬出濃汁，再入青鹽，再入黑豆煮熟取出入酒。九蒸九晒。

四、呼 和 浩 特

【處方】大雄黑豆五斤（綠里者佳）杜仲 木賊 當歸 故紙 青皮 蕤藜 菊花 陳皮 杭芍 首烏 九地 牛膝 元參 鮮桑葉 各五錢 大料三錢 旱蓮子二兩 砂仁三錢 青鹽二兩 木香二錢 薏仁三錢 枳殼 甘草 川斷 茯苓各五錢

【制法】上藥熬汁去渣，浸透黑豆，煮干為度，晒干。

風 痰 類

指迷茯苓丸

一、上 海

【功能與主治】痰多喘咳。

【處方】茯苓一兩 姜半夏二兩 枳殼（麩炒）五錢

【制法】共研細粉，用芒硝二錢五分化水泛丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服一錢半至三錢，溫開水送服。

【禁忌】便瀉者勿服。

二、武 漢（茯苓丸）

【功能與主治】胸間停留痰飲，筋脈攣急，四肢牽痛。

【處方】茯苓二兩 半夏二兩 枳殼五錢 玄明粉二錢半

【制法】上藥干燥，混合碾細，用玄明粉化水制成小丸，每錢不得少于四十粒。

【劑量及用法】每服二至三錢。

三、福 州

【功能與主治】治臂痛，手足不舉或時左右轉移，此伏痰在內，中脘停滯，脾氣不能流行，上與氣搏，脾屬四肢而氣不下，故上行攻臂，其脈沉細是也。但治其痰，則臂痛自止。及如產後發喘，四肢浮腫者，用此則愈，此治痰第一方也。

【處方】半夏（制）二兩 茯苓一兩 枳殼（炒）五錢 風化硝一錢五分

【制法】上為末，姜汁煮糊丸，桐子大。

【劑量及用法】每服三、五十丸，姜湯下。

四、杭 州

【功能與主治】治脾胃虛弱，痰飲留伏，臂痛難舉，筋脈攣急，四肢疼痛及婦人產後發喘，四肢浮腫等症。

【處方】白茯苓一兩 姜半夏二兩 炒枳殼五錢 風化硝二錢五分

【制法】共研細末，生薑汁和麵糊為丸。

【劑量及用法】每服三錢，淡姜湯或開水送下。

五、南 昌

【功能與主治】胸間停留痰飲，經脈攣急，四肢牽痛及遍身發無定處之痰氣痰核。

【處方】姜夏四兩 白茯苓三兩 枳殼（麩炒）三兩 風化硝五錢

【制法】共研細面，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每日服二次，每服三錢，溫水送下。

六、西 安

【功能與主治】主治停痰伏飲所致臂痛，不能自主，手足或左右時復轉移，神經諸痛，四肢浮腫及婦人產後發喘等症。

【處方】同杭州。

【制法】上四味搗細末，羅過，用生薑汁糊為丸如梧桐子大。

【劑量及用法】成人每次服一錢

至二錢，一日三次，飯前溫開水送下，小兒按年齡大小減半或服三分之一、二。

【禁忌】忌食鹽及生冷食物。

七、濟 南

【功能與主治】胸間停留痰飲，筋脈攣急，四肢牽痛。

【處方】風化硝二兩五錢 茯苓二兩 半夏一兩（生研澄粉）枳殼五錢（炒）

【制法】共研細末，姜汁二錢，竹瀝水三兩打丸，如綠豆大。

【劑量及用法】成人每服三錢，白開水送下。

【禁忌】忌食腥羶生冷等物。

青州白丸子

一、上 海

【功能與主治】風痰壅盛，嘔吐涎沫。

【處方】生白附子（漂淨）二兩 生川烏（去皮漂淨）五錢 生南星（漂淨）三兩 生半夏（漂淨）七兩

【制法】將藥和水研細，盛絹袋內，濾出細粉，以盡為度，置瓷盆中，日晒夜露，每日換清水攪之，春季五日，夏季三日，秋季七日，冬季十日，去水晒干，研細粉，再用生薑六兩打汁和水泛丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服一錢，姜湯送服。

【備考】憑醫師處方購用。

二、福 州

【功能與主治】風痰壅盛，手足癱瘓，嘔吐涎沫，牙關緊閉，痰喘麻木及小兒驚風嘔吐。

【處方】同上海。

【制法】上俱研羅為細末用生絹袋盛，以磁盆盛井花水攪洗粉出，未出者以手搖攪以盡為度，然後日晒夜露，每日一換新水，攪而復沉，春五夏三秋七冬十日，去水瀝干，白如玉片，以糯米糊作稀糊丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二十丸，生薑湯下如癱瘓用酒下，小兒驚風薄荷湯下五、七丸。

三、杭 州

【功能與主治】治風痰壅盛，嘔吐涎沫，口眼喎斜，手足癱瘓。小兒驚風，痰盛泄瀉等症。

【处方】同上海。

【制法】各生研为末，用絹袋盛之，于井水內摆出粉，以尽为度。置磁盆中日晒夜露，至晚撇去旧水，另用井水攪拌之，再晒再換，如是春五日，夏季二日，秋季七日，冬季十日。出水晒干研細，加生姜汁和米糊为丸。如綠豆大。

【剂量及用法】每服一至一錢，淡姜湯送下。小兒每服三至六分，薄荷湯調下。

【禁忌】热痰內閉者忌之。

四、南昌(青州白露丸)

【功能与主治】風痰壅盛，嘔吐涎沫，口眼喎斜，手足癱瘓及小兒惊風痰盛泄瀉等症。

【处方】同上海。

【制法】各藥生研为末，生用絹袋盛之于井水內摆出粉，以淨为度，置于磁盆中，日晒夜露至晚，撇去旧水另用井水攪之再晒再換，如是春五日，夏二日，秋七日，冬十日，去水晒干研面，水泛为丸如綠豆大。

【剂量及用法】每服三至五分，姜湯送下，癱瘓溫酒送下。小兒惊風每服一至二分，薄荷湯化服。

【备考】非經医师处方不得使用。

五、呼和浩特

【处方】半夏八兩 白附子一斤 南星一斤半 川烏四兩

【制法】共为細面，水泛小丸。滑石为衣。

附参考古方

【来源】太平惠民和剂局方。

【功能与主治】治男子妇人半身不遂，手足頑麻，口眼喎斜，痰涎壅塞，及一切風，他藥所不能疗者，小兒惊風，大人头風，洗头風，妇人血風，並宜服之。

【处方】天南星三兩 白附子二兩 半夏(以水浸洗过，白好者)用七兩 川烏头(去皮、臍)半兩各生用

【制法】上为細末，以生絹袋盛，用井华水摆，未出者，更以手揉令出，如有滓，更研，再入絹袋，摆尽为度，放磁盆中，日中晒，夜露至晚，棄水，別用井华水攪，又晒，至来日早，再換新水攪，如此，春五日，夏二日，秋七日，冬十日，去水晒干后如玉片

碎研，以糯米粉煎粥清为丸，如菉豆大。

【剂量及用法】初服五丸，加至十五丸，生薑湯下，不計時候。如癱瘓風，以溫酒下二十丸，日二服，至三日，后，谷当有汗，便能舒展，服經三五日，呵欠是应常，服十粒已来，永無風痰隔壅之患，小兒惊風，薄荷湯下兩三丸。

健步虎潛丸

一、北 京

【功能与主治】滋養精血，散風通絡。主筋骨痿軟，足膝無力。

【处方】当归 知母 黃柏 秦艽 獨活 熟地 龟版(炙) 白朮 白芍 黃耆 补骨脂 杜仲 羌活 鎖阳 伏苓 防風 菟絲子各四十兩 木瓜 續断 枸杞子 怀牛膝各八十兩 川附片十兩 人參(去蘆)十兩 虎骨(炙)六十兩

【制法】共为細粉，煉蜜为小丸。

【剂量与用法】每服三錢，日服二次，淡鹽湯送下，溫开水亦可。

【禁忌】孕妇忌服。

二、天 津

【功能与主治】去風湿，散寒通絡，强壯筋骨。主四肢疼痛，筋骨痿軟，腰痠腿疼，腎囊寒湿。

【处方】人參(去蘆)十兩 生黃芪二斤八兩 故紙(鹽炒)一斤八兩 枸杞子五斤 生白芍 龟版(醋制)各一斤八兩 怀牛膝五斤 熟地 獨活各二斤八兩 制附子十兩 秦艽二斤八兩 木瓜五斤 黃柏 知母 当归各二斤八兩 炒棗仁二斤 苧蒲二斤 制虎骨二斤十二兩 菟絲子 伏苓(去皮) 防風 鎖阳各二斤八兩 續断五斤 杜仲炭(鹽炒) 羌活 远志肉(甘草水制)各二斤八兩

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

三、上海(虎潛丸)

【功能与主治】筋骨痿軟，行步乏力。

【处方】黃柏(鹽酒炒)四兩 白芍藥(酒炒)一兩五錢 知母(鹽水炒)二兩 陈皮(鹽水洗)七錢五分 怀牛膝(酒蒸)二兩五錢 当归(酒洗)一兩 龟版(炙)四兩 熟地二兩 鎖阳(酒洗)一兩 虎骨(炙)一兩 羊肉二斤

【制法】先將羊肉洗淨，去筋膜，加黃酒煮爛，和入余藥打合焙干，研成細粉，煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服三錢，食前淡鹽湯送服。

【备考】如無虎骨，可用豹骨。

四、南 京

【功能与主治】主腎陰不足，精血亏损，筋骨痿軟，不能步履。

【处方】炙取龟版四兩 鹽水炒黃柏四兩 酒制怀牛膝三兩五錢 大熟地二兩 肥知母二兩 杭白芍一兩五錢 西当归一兩 炙虎骨(麻油炸酥)一兩 酒潤鎖阳一兩 陈皮七錢五分

【制法】用羊肉二斤，先將羊肉洗淨加黃酒煮爛，和余藥放入石臼內供杵碎，晒干，研为細末，加煉蜜为丸，每錢約做二十粒。

【剂量及用法】每服三錢，一日一次，空腹时淡鹽開水吞服。

【备考】如無虎骨，可用豹骨。

五、武 汉

【功能与主治】筋骨痿軟，不能步履，及骨蒸勞熱等症。

【处方】龟版(炙) 黃柏(鹽炒)各四兩 知母(鹽炒) 熟地各二兩 牛膝(酒蒸)三兩半 鎖阳(酒洗) 虎骨(炙) 当归(酒洗)各一兩 白芍一兩半 陈皮七錢半 羊肉二斤干薑五錢

【制法】小丸——先取羊肉洗淨去筋膜連骨，加黃酒煮爛，和余藥进行搗泥，干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜40~45%，制成小丸，每錢不得少于二十五粒。大丸——照淨粉量加煉蜜80~90%，制成大丸，每丸重三錢。

【剂量及用法】每服二至五錢，飯前淡鹽湯送下。

六、福 州

【功能与主治】治腎陰不足，筋骨痿軟，不能步履，膝冷，筋骨痿弱，

下元虛冷，精血虧損及骨蒸勞熱等症。

【處方】龜版(酥炙)四兩 虎胥骨(酥炙)一兩 熟地二兩 川柏(鹽酒炒)四兩 知母(鹽水炒)二兩 白芍(酒炒)一兩五錢 當歸(酒洗)一兩 鎖陽(酒潤)一兩 牛膝(酒蒸)一兩五錢 陳皮(鹽水制)七錢五分 干姜五錢 羊肉二斤

【制法】共研末，羊肉蒸爛，拌和蜜為丸。

七、杭州

【功能與主治】治肝腎陰虧，精血不足，筋骨痿弱，四肢麻木，足不任地，不能步履，以及骨蒸勞熱等症。此丸補腎益精，養血祛風，乃治痿躄之要藥也。

【處方】川黃柏(鹽酒炒)二兩 炙龜版四兩 人熟地三兩 懷牛膝(酒蒸)二兩 知母(鹽酒炒)二兩 鎖陽(酒潤)一兩五錢 酒炒白芍二兩 當歸一兩五錢 陳皮(鹽水潤)一兩 虎胥骨(酥炙)一兩 羯羊肉二斤

【制法】上藥研為細末，將羊肉酒煮搗爛，酌加煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服一錢，空腹時淡鹽湯送下。

八、南昌(虎潛丸)

【功能與主治】痿病及諸虛不足，腰腿疼痛，行步無力等症。

【處方】黃柏二兩 炙龜版四兩 知母二兩 熟地二兩 陳皮兩半 鎖陽兩半 虎胥骨(酥炙)兩半 羯羊肉(切片燉火焙)一斤 干姜五錢 白芍一兩 當歸一兩 牛膝(酒浸蒸)一兩

【制法】上藥均研末，蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，姜湯、鹽湯或酒隨意送下。

【禁忌】忌食生冷、辛辣以及能生痰滯氣之物。

【備考】非經醫師處方不得使用。

九、沙市(虎潛丸)

【功能與主治】治精血不足，筋骨痿弱，腰膝痠軟，不能步履等症。

【處方】黃柏(鹽酒炒) 知母(鹽酒炒) 熟地各二兩 虎胥骨(酥

炙)一兩 龜版四兩(酥炙) 鎖陽一兩五錢 當歸一兩五錢 懷牛膝(酒洗)二兩 白芍(酒炒)一兩五錢 廣陳皮(鹽水炒)一兩

【制法】諸藥研細末，另用羯羊肉二兩酒煮搗膏，加煉蜜為丸。

【劑量及用法】每次服三錢，日服一次，空腹淡鹽湯下。

【禁忌】體寒者忌服。

十、重慶(虎潛丸)

【功能與主治】治腎虛不足，筋骨痿軟，步履艱難，下元虛冷，精血虧損及骨蒸勞熱等症。

【處方】龜版 黃柏各四兩 知母 熟地各二兩 川牛膝三兩五錢 白芍一兩五錢 鎖陽 虎骨 當歸各一兩 橘皮七錢五分 干姜五錢 羯羊肉二斤

【制法】羯羊肉酒煮為膏，余藥共研細末，與羊肉膏加蜜為丸。

【劑量及用法】三錢。

十一、蘭州

【功能與主治】祛濕通絡，強壯筋骨。治四肢麻木，腳膝無力，腰腿疼痛，皮膚瘙癢等症。久服此藥，有強筋壯骨之效。

【處方】人參十兩 破故紙 黃芪各二斤半 枸杞五斤 白朮二斤半 龜版八兩 川牛膝五斤 酒地 獨活各二斤半 附子十兩 桑寄生二斤半 木瓜五斤 黃柏 知母 當歸各一斤半 棗仁 菖蒲各二斤 遠志一斤半 虎骨二斤半 菟絲子 防風 茯苓 鎖陽各二斤半 川續斷五斤 羌活 杜仲各二斤半

【制法】共研細面，蜜小丸。

【劑量及用法】每次二錢，日服三次。

十二、大同

【功能與主治】滋腎陰，壯筋骨。

【處方】黨參 熟地各四兩 炙黃芪 黃柏(炒) 白朮(炒) 白芍(炒) 當歸 牛膝 山藥各二兩 破故紙 五味子各一兩五錢 虎骨二兩 五加皮 杜仲各一兩五錢 龜版二兩 川斷 菟絲子 枸杞 木瓜各一兩

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】早晚每服三錢，開水送下。

十三、濟南

【功能與主治】筋骨無力，行步艱難，下部虛損，腿膝腰軟，四肢無力，陽事痿弱，陰囊濕汗等症，常服則步履有力。

【處方】虎骨 黃芪(炙) 伏神 當歸 木瓜 川羌活 獨活 防風 石菖蒲 知母(炒) 薏苡仁(炒) 生地 熟地 白朮(土炒) 枸杞 白芍(炒) 懷牛膝 鹽黃柏 補骨脂(炒) 杜仲(炒黑) 麥冬 遠志各二兩(炒) 五味子 沉香 附子(制)各十兩 龜版一兩半(炙) 人參二兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重三錢。

【劑量及用法】每服一丸，溫開水送下。

十四、青島

【處方】虎骨 木瓜 米仁 蒼朮 防己 五加皮 牛膝 菟根 當歸各四兩 金銀石斛 川斷 天麻 伏苓 南星 黃芪 防風 海風藤各二兩 肉桂一兩 川芎 黃柏寄生 人參各三兩

【制法】共研末，蜜小丸。

十五、沈陽

【功能與主治】強筋壯骨，補腎填精，燥濕利下。治筋骨痿弱，腰腿痠痛，四肢無力，陰虛盜汗，遺精白濁，腎虛脚氣，一切肝腎不足等症。

【處方】黃芪 當歸 枸杞 龜版 破故紙各一兩五錢 白朮二兩 白芍 生地黃 熟地黃 虎胥骨(酥炙) 牛膝 知母 麥冬 羌活 黃柏各二兩 人參 伏神 遠志 石菖蒲 炒棗仁 木瓜 薏仁 獨活 防風 五味子 沉香 附子各五錢 杜仲二兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空心鹽湯或黃酒送下。

【禁忌】忌食五辛、油膩之物。

十六、撫順(虎潛丸)

【功能與主治】強筋壯骨，補腎填精，宣濕滲水。治筋骨痿軟，腎虛精枯，血液枯耗，濕熱襲入，不能步履，蹣跚不寧，尻以代踵，痿軟難支，

起立困难。精血虧損，操勞過度，房事過度，精血兩虧，神形憔悴，足膝痠痛，迎風流淚，大目暈眩，耳鳴心悸等症。

【處方】黃芪 當歸 杞杷各四兩 牛膝 鹽知母各二兩 龜版二兩 薏仁 生地各四兩 破故紙 白芍各二兩 木瓜二兩 白朮二兩 杜仲四兩 虎骨一兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重，或三錢重。

【劑量及用法】每服二錢，空腹淡鹽湯送下。痿而冷厥者，附子一錢煎湯送下。日服二、三次均可。

【禁忌】忌食腥、冷之物。

十七、哈爾濱(虎潛丸)

【功能與主治】強筋壯骨，補腎填精，官濕滲水。主筋骨痠軟，精血虧損，腰痛。

【處方】龜版(酥炙) 黃柏(鹽酒制)各四兩 知母(鹽酒制) 熟地各二兩 牛膝(酒蒸)二兩五錢 白芍(酒炒)一兩五錢 鎖陽(酒浸) 虎胥(酥炙) 當歸(酒洗)各一兩 蘇皮(鹽水潤)七錢五分 干姜五錢

【制法】共碾為細面，羯羊肉二斤，酒煮搗膏為丸，如梧桐子大。(或用酒煮米糊為丸亦可。)

【劑量及用法】每服二錢，空腹時淡鹽湯送下。痿而厥冷者，附子一錢煎湯為引。日服二、三次均宜。

【禁忌】忌食腥、冷之物。

【備考】臨時服用，以羊肉膏制丸為佳，但不耐久存，久則霉穢生虫。米糊丸可存貯瓷罇，以免潮濕不潔。

十八、呼和浩特

【處方】人參 黃耆 白朮 當歸 虎骨 黃柏各二兩 鎖陽 枸杞 龜板 沉香各一兩 破故紙 杜仲各一兩五錢 五味子五錢 牛膝四錢 熟地八兩

【制法】共為細面，蜜小丸。

附參考古方

【來源】丹溪心法。(虎潛丸)

【功能與主治】治痿。

【處方】黃柏半斤(酒炒) 龜板四兩(酒炙) 知母二兩(酒炒) 熟

地 陳皮 白芍各二兩 鎖陽一兩半 虎骨一兩(炙) 干姜半兩

【制法】上為末，酒糊丸或粥丸。

武當救世丸

沈 陽

【功能與主治】發汗透表，祛風解毒。主瘡毒初起，頭痛身熱，骨節痠痛，憎寒壯熱，咳逆嘔吐，惡性腫毒，肌肉麻痺，毒氣內攻，傷風傷寒。

【處方】何首烏 全蝎 川烏 天麻 生甘草 麻黃 防風 石斛 川芎 草烏 羌活 細辛 荊芥 當歸各一兩 蒼朮八兩

【制法】共碾極細面，以硃砂、雄黃為衣，每丸一錢五分。

【劑量及用法】大人每服二丸，小兒一丸或半丸。

【禁忌】忌食生冷、油膩之物。

【備考】宜子寒性風毒初發在表者。

附參考古方

【來源】惠直堂經驗方

【功能與主治】治天時不正，傷風傷寒初起，瘟疫時氣，頭痛身熱，咳嗽骨痛，並惡毒生發身上寒熱等症。

【處方】生何首烏(赤色) 川芎 羌活 川烏 草烏 細辛 生甘草 全蝎 荊芥 防風 天麻 當歸 石斛 麻黃各一兩 茅山蒼朮八兩

【制法】上各依古法炮制，為末蜜丸，再用硃砂、雄黃各五錢為衣，每丸重一錢五分。

【劑量及用法】大人二丸，小兒一丸或半丸，姜二片，葱白五根，煎湯調服，被蓋取汗，甚有功效。

【禁忌】孕婦忌服。

消風丸

沈 陽

【功能與主治】疎風活血解表。主週身痛痒，四肢麻木，咳嗽氣喘，痰熱驚癇。

【處方】薄荷五錢 荊芥二錢 獨活二錢 細辛一錢 天麻二錢 川芎二錢 胆星三錢 羌活二錢 防風三錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸

七分重。

【劑量及用法】每服一丸白開水送下。

【禁忌】忌食辣腥生冷。

附參考古方

【來源】春脚集。

【功能與主治】能疏通腠理，清解表邪，發散皮毛，流通經絡，治小兒諸斑癩症。

【處方】南薄荷 羌活 獨活 防風 天麻 芥穗 川芎 細辛各一錢 胆星二錢

【制法】為末，蜜丸，重一錢。

【劑量及用法】每日服一丸，用薄荷湯化服，連服七日。

疏風定痛丸

北京、承德

【功能與主治】散寒去風止痛。主腰痛寒腿，四肢作痛。

【處方】馬錢子二兩(炒去毛) 麻黃四兩 乳香二錢 沒藥二錢 千年健三錢 地風三錢 杜枝三錢 懷牛膝三錢 木瓜三錢 自然銅三錢(煅) 甘草三錢 杜仲三錢(生) 防風三錢 羌活三錢 獨活三錢

【制法】共為細粉，煉蜜為大丸，重二錢。

【劑量及用法】每服一丸，溫開水送下。

【禁忌】孕婦禁服。

天 麻 丸

一、北 京

【功能與主治】散風活血，舒筋鎮痛。主筋脈牽掣，手足麻木，腰腿疼痛。

【處方】天麻 懷牛膝 草薢 玄參各六兩 杜仲七兩(生) 川附片一兩 當歸 羌活各十兩 生地十六兩 獨活五兩

【制法】共為細末，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天 津

【功能與主治】舒筋活血，散風止痛。主肩背疼痛，筋脈拘攣，四肢

麻木，腰腿痠軟，行步艱難。

【處方】天麻 懷牛膝 元參（去蘆） 單藤各六兩 杜仲炭（鹽炒）七兩 當歸十兩 制附子一兩 生地一斤 獨活五兩 羌活十兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、南京（易老天麻丸）

【功能與主治】主手足麻木，筋骨疼痛。

【處方】明天麻六兩（酒浸） 制附子一兩 懷牛膝六兩（酒浸） 全當歸十兩 川草薢六兩 川羌活十兩 黑元參六兩 炒杜仲七兩 大生地一斤（酒浸） 川獨活五兩

【制法】共研細末，加煉白蜜為丸，每錢約做二十粒。

【劑量及用法】每服二錢至三錢，一日一次或二次，空腹時開水吞服。

【禁忌】孕婦忌服。

四、武漢（易老天麻丸）

【功能與主治】手足麻木，筋骨疼痛，口眼歪斜，半身不遂。

【處方】大麻六兩（酒浸三宿晒干） 杜仲七兩（酒炒去絲） 生地一斤（酒浸焙） 牛膝六兩（酒浸一宿焙） 川附片一兩（炮，去皮） 獨活五兩 草薢六兩 當歸 羌活各十兩 玄參六兩

【制法】小丸——上藥干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜50—54%，制成小丸，每錢不得少于二十五粒。大丸——加煉蜜120—130%，和成大丸，每丸重為二錢。

【劑量及用法】每服一錢，日服二次，溫開水吞服。

五、杭州（易老天麻丸）

【功能與主治】治諸風筋脈攣急，遍身疼痛，手足麻木，口眼歪斜，半身不遂等症。

【處方】明天麻 川牛膝（酒浸） 川草薢 元參各六兩 杜仲七兩 制附子一兩 當歸 羌活各十兩 大生地十六兩 獨活五兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服三錢，冬日

溫酒，夏日開水送下。

六、昆明

【功能與主治】心臟衰弱，四肢麻木。

【處方】天麻 牛膝 桂心 茯苓各六兩 當歸十六兩 天雄六兩 羌活八兩 生地十六兩 元參六兩 杜仲七兩 獨活五兩

【制法】水疊為丸。

【劑量及用法】每服二錢半，幼童減半，開水送服。

【禁忌】溫熱及感冒忌服。

七、蘭州

（祛風天麻丸）

【功能與主治】散風活血，緩肚止痛。主筋骨疼痛，手足麻木，瀉肚受寒，胃疼，跌打損傷，瘡疽紅腫。

【處方】天麻 川牛膝 萆薢 元參各六兩 杜仲七兩 獨活五兩 羌活十兩 當歸四兩 附子一兩 生地十六兩

【制法】共研細末，蜜為小丸。

【劑量及用法】每服三錢，日服二次。白開水送下。

八、濟南

【功能與主治】諸風所傷，手足麻木，筋骨疼痛等症。

【處方】大麻（酒浸三宿晒干） 川牛膝（酒浸一宿焙干） 單藤（另研） 玄參各六兩 川杜仲七兩（薑汁炒） 羌活十兩 當歸十兩（酒洗） 生地黃一斤（酒洗） 獨活五兩 人附子一兩（泡）

【制法】共為細末，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】空腹黃酒送下，白開水亦可，每服三錢。

【禁忌】忌辛辣、油膩、生冷等食物。

九、青島

【處方】天麻 牛膝 單藤 元胡 川芎各四兩 川羌活半斤 甘草二兩 當歸 杜仲 獨活各四兩 生地八兩

【制法】共為細末，煉蜜為丸。

十、呼和浩特

（祛風天麻丸）

【處方】明天麻 川牛膝 川芎 杭白芷 川烏 人附子各二兩

全當歸 大酒地 川羌活各三兩

【制法】共為細面，水泛小丸。

附參考古方

1. 幼科証治准繩。

【功能與主治】治肝疳、風疳、疳眼。

【處方】青黛 川黃連 天麻 五靈脂 夜明沙（微炒） 川芎 蘆薈各二錢 龍胆草 防風 蟬退（去足）各一錢半 全蠍二枚（焙） 麝香少許 干蟻頭（炙焦）三錢

【制法】以上為末，豬胆汁浸膏，丸麻子大。

【劑量及用法】每服十丸，薄荷湯下。

2. 太原傅山產後編。

【功能與主治】治產後中風，恍惚語謔，四肢不利。

【處方】天麻一錢 防風一錢 川芎七分 羌活七分 人參 遠志 柏子仁 山藥 麥冬各一錢 棗仁一兩 細辛四兩 南星麴八分 石菖蒲一錢

【制法】研細末，煉蜜為丸，辰砂為衣。

【劑量及用法】清湯下六七十丸。

3. 醫方簡義。

【功能與主治】治風中濕熱而生，熱勝則痛，濕勝則重，此系養血清熱，滲濕治風之法。

【處方】煨天麻 懷牛膝（酒焙） 川草薢 元參各六兩 杜仲（酒炒）七兩 附子（炮）一兩 羌活十兩 當歸十兩 生地黃十六兩

【制法】為末，煉蜜為丸，如梧子大。

【劑量及用法】每服五十丸，溫酒送下。

【備考】一方加獨活六兩。

半夏天麻丸

一、大同

【功能與主治】痰厥頭痛。

【處方】半夏一兩 天麻五錢 廣陳皮一兩五錢 白朮一兩 神麴一兩 黨參五錢 蒼朮五錢 炙芪一兩 云苓一兩 白芥子五錢 澤瀉五錢

【制法】煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服三錢，開水

送下。

二、青 島

【处方】半夏 白朮 天麻 蒼朮 陳皮 茯苓 神曲 麦芽 澤瀉 黃柏 黃芪各等分

【制法】共研細面。

天麻琥珀丸

沈 陽

【功能与主治】祛風降逆。主头眩目昏，肩背痠痛，四肢麻木，手足厥冷，心腹串痛，腰膝無力，逆气上冲，肌膚刺痛，中風中寒，中湿中气。

【处方】天麻二兩 琥珀二兩 台烏一兩 茯苓二兩 肉桂五兩 黃柏一兩 防風五錢 郁金一兩 牡蠣一兩 蒼朮二兩 鈎藤一兩 柴胡八錢 桑朮一兩 怀牛膝二兩 藜香一錢

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸，一錢重，金箔为衣，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，黄酒为引，白水送下。

【禁忌】忌食葱蒜腥辣；孕妇忌服。

虎骨木瓜丸

一、北京、承德

【功能与主治】舒筋活血，散風上疼。主手足麻木，脚膝痠痛，筋骨無力，步履艰难。

【处方】虎骨(油炙) 木瓜 当归 白芷 威灵仙 青風藤 海風藤 川芎各十六兩 怀牛膝二十二兩 川烏 草烏各八兩 人參 兩(去蘆)

【制法】共为細粉，煉蜜为小丸。

【剂量及用法】每服二錢，日服二次，溫开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

二、天 津

【功能与主治】散風去湿，舒筋活血。主腰腿疼痛，筋骨無力，行步艰难，四肢麻木，常怕風寒。

【处方】同北京。

【制法】共为細粉，煉蜜为丸三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

三、上 海

【功能与主治】腰脚無力，腿膝痠痛。

【处方】虎骨(炙)十六兩 木瓜十六兩 天麻一兩 怀牛膝一兩五錢 川烏(制)一兩 淡苳蓉一兩五錢 乳香(制)五錢 沒药(制)五錢

【制法】共研細粉，黄酒和水泛丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每服二錢，溫开水送服。

【备考】如無虎骨，可用豹骨。

四、武 汉

【功能与主治】風湿热腫，筋骨疼痛，四肢痿弱無力。

【处方】虎骨八兩 制川烏一兩 乳香五錢 木瓜十二兩 川牛膝一兩半 明天麻一兩 苳蓉一兩半 沒药五錢

【制法】小丸 一上药干燥，混合研細，照淨粉量加煉蜜50~52%，制成小丸，每錢不得少于二十五粒。

大丸——加煉蜜120~130%，和成大丸，每丸重二錢。

【剂量及用法】每服二至四錢，开水送下，或用酒少許兌入开水服。

【禁忌】孕妇忌服。

五、杭州(加味四斤丸)

【功能与主治】治酒色过度，肝腎兩亏，風湿入絡，脚膝痠痛，行动無力，热冷諸痛等症。

【处方】炙虎胛骨十六兩 淡苳蓉一兩五錢 怀牛膝 兩五錢 宣木瓜十六兩 沒药(去油)五錢 明天麻一兩 制川烏一兩 乳香(去油)五錢

【制法】共研細末，酒糊打丸。

【剂量及用法】每服二至三錢，溫酒或开水送下。

六、蘭 州

【功能与主治】散風去湿，舒筋活血。主筋骨無力，四肢疼痛及腰背疼等症。

風 痰 类

【处方】虎骨 当归 川牛膝 木瓜 羌活 独活 防風各三兩 青風藤二兩 川芎四兩 白芷三兩 上元桂 海風藤各二兩 灵仙三兩 寄生三兩 广木香一兩五錢 杜仲四兩 蒼朮半斤

【制法】共研細面，煉蜜为小丸。

【剂量及用法】每服二錢重。

【禁忌】孕妇忌服。

七、大 同

【功能与主治】遍身疼痛，四肢不举，行步艰难。

【处方】当归半斤 酒芍一斤半 蒼朮四斤 熟地三斤 川芎六斤 羌活 防風 独活 寄生各八斤 木瓜一斤 牛膝 桂枝各八兩 虎骨一斤半

【制法】共为細面，煉蜜为小丸，梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢，白开水送下。

八、济 南

【功能与主治】風寒湿痹，四肢疼痛，足膝痿軟，筋骨拘攣。

【处方】当归 白芷 虎骨各一斤 怀牛膝二斤 川芎一斤 党参二兩(去蘆) 木瓜 威灵仙 青風藤 海風藤各一斤 川烏(制) 草烏(制)各八兩

【制法】共为細末，蜜小丸，桐子大。

【剂量及用法】每服二錢，白开水送下。

【禁忌】忌食生冷；孕妇忌服。

九、青 島

【处方】当归 白芍各二兩 蒼朮八兩 熟地六兩 川芎二兩 川羌 防風 独活 寄生 木瓜各二兩 牛膝 肉桂各一兩 虎骨二兩

【制法】共研細面，煉蜜为丸，如梧桐子大。

十、沈 陽

【功能与主治】疏風散寒，燥湿活血，强壯鎮痛。主風寒湿痹，筋骨疼痛，屈身不便，腰腿痠痛，步履困难，手臂麻木，足膝痿軟，一切風湿性关节痛。

【处方】紅人參二兩 牛膝三兩

独活二兩 寸冬一兩 附子二兩
木瓜一兩 沉香一兩 白芍一兩
炙龟板四兩 羌活二兩 知母二兩
故紙一兩 防風二兩 熟地二兩
黃柏一兩 黃芪四兩 远志肉一兩
五味一兩 棗仁二兩 枸杞一兩
云苓二兩 西归四兩 生地一兩
杜仲一兩 虎腿骨一兩 菖蒲一兩
白朮一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，溫水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

【備考】又方：

人參四兩 牛膝二兩 独活二兩
寸冬一兩 附子四兩 木瓜一兩
龟板四兩 沉香一兩 白芍一兩
川羌一兩 知母二兩 故紙一兩
防風二兩 熟地一兩 远志一兩
黃柏一兩 黃耆四兩 五味一兩
棗仁二兩 枸杞一兩 云苓一兩
西归四兩 生地一兩 杜仲一兩
虎骨一兩 菖蒲一兩 白朮一兩

制法及服法同上。

十一、撫順(1)

【功能與主治】疎風、散寒、利濕。主風寒濕痹，筋骨疼痛，不能伸屈，步履困難，麻痺筋攣，以及下肢痿軟等症。

【處方】虎骨一兩 木瓜 苡米 茅朮 加皮 牛膝 茄根 當歸 各二兩 天麻 川斷 云苓 南星 海藤各兩半 川附子五錢 防己一兩 石斛一兩半 黃耆兩半 羌活 黃柏 寄生各兩半 紅參二兩 防風二兩 大凡一兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服二錢，食前服。

【禁忌】孕婦忌服；忌食腥冷等物。

十二、撫順(2)

【處方】虎骨四兩 木瓜 苡米 茅朮 加皮 牛膝 茄根 當歸 各二兩 天麻 川斷 白朮 南星 海藤各一兩半 檳榔 附子各五錢 防己二兩 石斛 元茂 羌活 元柏 寄生各一兩半 人參五錢 防風二兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢大。

十三、哈爾濱

【功能與主治】疎風溫寒，化濕活血。主痹症，風寒濕氣，合而為痹，筋骨疼痛，屈伸不便。

【處方】人參 當歸 黃芪 龟版 杜仲 附子各四兩 虎骨 枸杞 知母 白朮 白芍 牛膝 生地 熟地 寸冬 故紙 木瓜 菖蒲 五朮 沉香 黃柏各一兩 羌活 独活 云苓 远志 棗仁 防風各二兩

【制法】共碾為細面，煉蜜為小丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，空腹時溫酒服。

【禁忌】忌食生冷。

十四、呼和浩特

【處方】當歸二斤四兩 杭芍二斤四兩 蒼朮六斤 川芎 羌活 防風 独活 寄生 木瓜各斤半 牛膝十二兩 肉桂十兩二錢 虎骨二斤四兩 酒地四斤半

【制法】共為細面，蜜小丸。

搜風順氣丸

一、北 京

【功能與主治】疎風順氣，潤腸通便。主腰腿百節痠痛，痔漏風熱秘結。

【處方】大黃(制)五兩 火麻仁 郁李仁 山藥 車前子 懷牛膝 山茱萸各二兩 菟絲子 防風 独活 檳榔 枳壳各一兩

【制法】共為細木，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天 津

【功能與主治】疎風順氣，潤腸通便。主四肢麻木，腸風秘結，小便不利，腰腿關節疼痛。

【處方】郁李仁 菟絲子各二兩 車前子(鹽炒)二兩五錢 懷牛膝三兩 独活二兩 檳榔二兩五錢 生山藥二兩 防風二兩 火麻仁二兩五錢 熟軍 枳壳(麩炒) 山茱萸(酒制)各二兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、上 海

【功能與主治】大便燥結，血熱膚痒。

【處方】生大黃 制大黃各二錢五分 菟絲子 懷牛膝各二兩 防風一兩 懷山藥(炒)二兩 車前子(酒炒)二兩五錢 郁李仁(開水浸去皮)二兩 枳壳(炒)一兩 檳榔三兩 独活一兩 火麻仁(炒)三兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服一至二錢，早晨及臨臥溫開水送服。

【禁忌】孕婦忌服。

四、杭 州

【功能與主治】治腸胃積熱，二便秘瀉，腸風便血，腰膝痠痛，肢節麻木，手足不遂，言語蹇澀，一切風氣，遍身虛痒等症。

【處方】酒制大黃五兩 火麻仁 懷牛膝各二兩 防風 江枳壳各一兩 車前子 檳榔 川独活 菟絲子 郁李仁肉 懷山藥各二兩

【制法】共研細木，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二至三錢，清溫或溫酒或開水送下。

五、西 安

【功能與主治】有促進腸蠕動，解除腸管麻痺，潤滑腸粘膜使大便通利之功。主治中風病後續發腸管麻痺性便秘，或身痒，或腸風下血等症。

【處方】大黃五錢 郁李仁 黃肉 車前子 牛膝各二兩 菟絲子 独活 防風 檳榔 枳壳各一兩

【制法】共研細粉，煉蜜成丸如綠豆大。

【劑量及用法】成人一日二、三次一次二三分，開水吞服。小兒按年齡服用。

【禁忌】實熱性便秘應謹慎服。

六、蘭 州

【功能與主治】舒氣活血，潤腸

利便。主四肢無力，大便秘結，小便不利，腰腿疼痛。

【處方】車前子 檳榔 火麻仁 各二兩五錢 郁李仁 菟絲子 牛膝 生山藥各三兩 西防風 獨活 酒軍 山萸肉 枳殼各二兩

【制法】共研細面，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每次一錢，每日二次，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

七、大同

【功能與主治】腸風血郁，大便秘結。

【處方】熟軍六兩 檳榔 麻仁 郁李仁 菟絲子 牛膝 山藥各三兩 枳殼 車前子 獨活 防風 歸尾 山萸肉各一兩

【制法】煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服三錢。

八、濟南

【功能與主治】腰腿疼痛，氣滯腹脹，大便秘結等症。

【處方】車前子(酒炒)二兩二錢 檳榔 火麻仁(焙去殼) 郁李仁(滾水浸去皮) 菟絲子(酒煮) 川牛膝(酒浸二日) 山藥(炒)各三兩 枳殼(炒) 防風 獨活各一兩 山萸肉二兩 大黃(酒浸蒸晒九次)五兩

【制法】將郁李仁、麻仁另研，余藥共為細粉和勻，煉蜜為丸，梧桐子大。

【劑量及用法】每服一至三錢，米湯或白開水送下，早晚各服一次。

【禁忌】孕婦忌服。

九、青島

【處方】車前子五兩 牛膝 檳榔 麻仁 郁李仁 菟絲子 山藥各六兩 防風 獨活 熟軍 山萸肉 枳殼各四兩

【制法】共軋細面，煉蜜為丸，如梧桐子大。

十、沈陽

【功能與主治】疏風順氣，降痰通便，補精助顏。主中風、中痰、中氣之閉症，及上熱下冷，腰腿疼痛，四肢無力，百節痠痛，癱瘓氣塊，肌膚瘙癢，腹脹腹痛，久患腸風下血，

經年勞瘵，瘡痢風濕，痔漏瘡瘍，腫毒，腸胃積滯，二便不調。

【處方】車前子二兩五錢 檳榔 火麻仁 郁李仁 菟絲子 牛膝 乾山藥各三兩 枳殼 防風 獨活各二兩 熟大黃五兩 山萸肉二兩

【制法】共軋極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，清茶水或溫酒送下。

十一、撫順

【功能與主治】疎風順氣，降痰通便。主腸風便血，腸內積熱，先血后便，症屬近血。

【處方】制軍五兩 菟絲子 車前子 火麻仁 枳殼 山藥 川牛膝各二兩 大活 山萸 防風各一兩 郁李仁 檳榔片各二兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，早晚各服一次，或米湯送下。

【禁忌】孕婦忌服。

十二、吉林(搜風丸)、

哈爾濱

【功能與主治】疏風順氣，降痰通便，補陽駐顏。中風閉症，中氣閉症，中痰閉症，腸風便血。

【處方】車前子(酒炒)二兩二錢(哈爾濱二兩五錢) 白檳榔 火麻仁(火焙去殼) 郁李仁(滾水浸去皮) 菟絲子(酒煮) 貢牛膝(酒浸二日) 懷山藥(炒)各三兩 炒枳殼 軟防風 川獨活各一兩 山萸肉二兩 錦紋軍(酒浸蒸晒九次)五兩

【制法】將郁李仁、火麻仁另研，余藥均一處研細，調勻，煉蜜為小丸，梧桐子大。

【劑量及用法】每服一至三錢，清茶或米飲熱湯送下，早晨臨臥各服一次。

【禁忌】內有虛寒之人，中風、中氣、中痰之脫。

十三、承德

【功能與主治】腰腿疼痛，氣滯腹脹，大便秘結。

【處方】車前子二兩二錢 檳榔 火麻仁(火焙去殼) 郁李仁(滾水浸去皮) 菟絲子(酒煮) 牛膝(酒浸二日) 炒山藥各三兩 炒枳殼

防風 大活各一兩 山萸二兩 大黃(酒浸蒸晒九次)二兩

【制法】將郁李仁、火麻仁另研，余藥共為細粉和勻，煉蜜為小丸，梧桐子大。

【劑量及用法】每服一至二錢，米湯或白開水送下，早晨臨臥各服一次。

【禁忌】孕婦忌服。

十四、呼和浩特

【處方】熟軍十兩 火麻仁四兩 山藥 郁李仁 檳榔 獨活 枳殼各二兩 車前子五兩 牛膝二兩

【制法】共為細面，蜜小丸。

附參考古方

【來源】太平聖惠方。(大黃丸)

【功能與主治】治風壅大腸澀滯。

【處方】大黃一兩半(剉碎微炒) 大麻仁一兩半 車前子一兩半 菟絲子三分(酒浸三日，晒干，別搗為末) 郁李仁一兩半(湯浸，去皮尖，微炒) 枳殼一兩半(麩炒微黃，去瓢) 防風三分(去蘆頭) 獨活三分 山茱萸三分 薯蕷三分 檳榔一兩半 牛膝二分(去苗)

【制法】上件藥搗，羅為末，煉蜜和，搗三、二百杵，丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每日臨臥時以溫漿水下二十丸。

豨薟丸

一、天津

【功能與主治】去風除濕，舒筋活血。主筋骨痿弱，麻木疼痛，腰膝痠軟，中風中寒。

【處方】豨薟草六斤

【制法】用黃酒六斤，一次蒸透晒干，共為細粉，煉蜜為丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

二、上海(九制豨薟丸)

【功能與主治】風濕疼痛。

【處方】豨薟草十斤

【制法】豨薟草用黃酒拌，九蒸九晒，研細粉，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，溫開

水送服。

三、武 汉

【功能与主治】四肢麻痺，筋骨疼痛，口眼喎斜，口吐涎沫，語言蹇澀，手足緩弱。

【处方】稀莖草一斤（揀去粗莖，留枝、叶、花、苞，用酒一兩六錢拌，蒸黑）

【制法】上药干燥碾細，照淨粉量加煉蜜 125—130% 制成小丸，每錢不得少于二十五粒。或照淨粉量加煉蜜 230—240%，制成大丸，每丸重为二錢。

【剂量及用法】每服四至六錢，开水送下。

四、杭州(九制稀莖丸)

【功能与主治】治風痺走痛，手足麻木，言語蹇澀，口眼歪斜，肝腎風氣，風濕諸瘡等症。

【处方】稀莖草不拘多少（以五月五日，七月七日，九月九日采者为佳）

【制法】揀去粗莖洗淨，用陈酒拌蒸，九蒸九晒，研細末，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服三錢，溫酒或米飲湯或开水送下。

五、青 島

【处方】稀莖叶一兩 当归 白芍 川芎 熟地 天麻 制川烏各一兩 防風 川羌五錢

【制法】共为細末，煉蜜成丸。

六、济 南

【功能与主治】風痺走痛，手足麻木，風濕諸瘡等症。

【处方】稀莖草五斤 当归五兩 白芍五兩 川芎五兩 熟地五兩 羌活二兩五錢 防風二兩五錢 川烏二兩五錢

【制法】稀莖草揀去粗莖，留枝叶花实，黄酒拌蒸晒九次，晒干同諸药共为粉，蜜丸，梧桐子大。

【剂量及用法】日服二次，每次服五十丸，黄酒送下，米湯亦可。

【禁忌】忌食生冷油膩等物；孕妇忌服。

七、呼和浩特

(古方稀莖丸)

【处方】稀莖草四兩 防風二兩

川烏五錢 归身 川芎 羌活 熟地各五錢 杭白芷一兩

【制法】共为細面，蜜丸重二錢五分。

附参考古方

【来源】張詠云方（据重修政和經史証类备用本草）（九制稀莖丸）

【功能与主治】治中風喎僻，語言蹇澀，肢緩骨痛，風痺走痛或十指麻木，肝腎風氣，風濕諸瘡等症。

【处方】稀莖草不拘多少（以五月五日，七月七日，九月九日采者为佳，揀去粗莖，留枝、叶、花、实）

【制法】酒拌，九蒸九晒，研为末，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服五十丸，空腹时無灰酒送下。

舒筋稀莖丸

一、吉林(舒筋丸)

【功能与主治】舒筋、活血、止痛。中風閉症，四肢抽搐，不能伸屈，筋骨疼痛，週身浮腫，言語蹇澀。

【处方】稀莖十二兩 当归四兩 川芎三兩 法半夏四兩 秦艽三兩 天麻三兩 天南星四兩

【制法】共碾为細面，煉蜜为丸，二錢一分重。

【剂量及用法】每服一丸，空腹溫酒或米湯送下，每日服一次。

【禁忌】孕妇忌服；中風脫症之緩縱、口开手撒、遺尿忌服。

二、撫 順

【处方】莖草三斤 南星二兩 半夏二兩 西归八兩 天麻四兩 大九四兩 川芎八兩 白芍八兩 熟地八兩 灵仙六兩 木瓜四兩 人參二兩

【制法】共为細面，蜜丸三錢大。

舒筋活絡丸

一、武 汉

【功能与主治】筋骨疼痛，拘攣麻木，腰膝無力。

【处方】当归二兩 木瓜二兩 桂枝二兩 川芎二兩 桑寄生二兩 秦艽二兩 灵仙二兩 地龙二兩 独活二兩 胆南星二兩 赤芍二兩 熟地六兩 乳香(去油)一兩半 川

烏(制)二兩 骨碎补二兩 防風二兩 羌活二兩 天麻二兩 虎骨膠二兩 五加皮二兩 沒药(去油)一兩半

【制法】上药干燥，混合碾細，按淨粉量加煉蜜 135—145%，和成大丸，每丸二錢重，蜡壳封固。

【剂量及用法】每服二錢。

二、广 州

【功能与主治】木梢神經癱瘓。

【处方】白花蛇 烏梢蛇 兩大 尖 草烏 天麻 全蠍 首烏 龟版麻黃 貴仲 甘草 羌活 肉桂 薑香 烏药 黃連 熟地 大黃 木香 沉香各二兩 細辛 赤芍 沒药 丁香 乳香 殭蚕 南星 青皮 骨碎补 白薏仁 安息香 附子 黃芩 香附 玄參 白朮各一兩 防風二兩 葛根 虎骨 当归各一兩五錢 血竭七錢 地龙 犀角 麝香 松脂各五錢 牛黃 龍腦各一錢五分 人參二兩

【制法】上药洗淨，切碎隔水蒸透，晒干研成药粉，拌蜜糖，制成大丸，用蜡壳封固，每丸重二錢。

【剂量及用法】除蜡壳，分成小粒，用开水送服，每服一丸。

三、南 昌

【功能与主治】筋骨疼痛，拘攣麻木，腰膝無力。

【处方】当归(酒炒)二兩 熟地六兩 制沒药 制乳香各一兩五錢 兩火尖一兩 木瓜 桂枝 桑寄生 川芎 五加皮 秦艽 威灵仙 地龙 独活 胆星 虎骨膠 赤芍 制川烏 骨碎补 防風 羌活 天麻各二兩

【制法】共研細末，煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二至三錢，溫开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

舒 筋 丸

大 同

【功能与主治】妇女腰腿疼痛。

【处方】枸杞半斤 木耳一斤 白巨子半斤 杜仲四兩 蒼朮四兩 牛膝四兩 木瓜二兩 当归半斤 龟板三兩

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢，開水送下。

附參考古方

【來源】雜病証治類方。

【功能與主治】治筋骨不能屈伸。

【處方】海桐皮 沒藥 血竭 木香各二錢 肉桂 牛膝 虎骨 防風 木瓜 天麻各二錢半 乳香 三錢 甜瓜仁半兩 沉香 楮實子 各一錢半 自然銅 當歸各一錢

【制法】上為細末，煉蜜為丸，如彈子大。

【劑量及用法】每服一丸，細嚼，用溫酒送下（未服藥，先飲酒半盞，後服藥）。

【禁忌】忌食熱物。

風 痛 丸

北京、承德

【功能與主治】補氣活血止痛，祛風濕通經絡。主中風痿痹，筋骨疼痛，麻木不仁。

【處方】虎骨二兩（油炙） 藏紅花五錢 白芍四兩 油松節五錢 桂枝 附片各一兩 細辛五錢 杜仲二兩（生） 片姜黃一兩 防己 地龍肉 殭蠶（炒） 鹿筋 狗脊各二兩 桑朮 海楓藤 當歸 川芎 各一兩 羌活四錢 獨活六錢 千年健一兩 木瓜 豨薟草 威靈仙 各二兩 黃耆四兩 蒼朮 懷牛膝 海桐皮 鉤藤 玄胡索 甘草 生 卷柏 追地風各一兩 沒藥二兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重二錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

當歸拈痛丸

南 京

【功能與主治】祛風，清濕熱。主風、濕、熱所致之遍身骨節疼痛，肩背沉重，胸膈不利，或足脛赤腫及瘡瘍等症。

【處方】羌活五兩 豬苓三兩 西茵陳五兩 西當歸二兩 黃芩五兩 西黨參二兩 粉甘草五兩 苦

參二兩 防風二兩 升麻二兩 肥知母三兩 粉葛根二兩 炒白朮三兩 炒蒼朮二兩（米泔水浸） 建澤瀉二兩

【制法】上約十五味，共研細末，用溫沸水泛丸，每錢約做一百粒。

【劑量及用法】每服二錢，日二次，空腹時開水吞服。

木 耳 丸

大 同

【功能與主治】寒濕性腰腿疼痛。

【處方】蒼朮 川椒 當歸 杜仲 附子各二兩 靈仙八錢 川牛膝一兩 木耳二十兩

【制法】蜜丸三錢重。

【劑量及用法】每服一丸。

【禁忌】孕婦忌服。

如意大力丸

撫 順

【處方】蒺藜 當歸 牛膝 生地 枸杞 知母 川斷 絲子 甜瓜子 熊掌 熟地 乳香 沒藥 龜板 云香 木瓜 杜仲各三兩 元柏八錢 腰骨一對

【制法】共為細末，蜜丸三錢重。

豹骨木瓜丸

禹 縣

【功能與主治】腰膝腿疼，脚膝拘攣，筋骨無力，肝腎双亏，兩腿麻木。

【處方】豹骨四兩 木瓜六兩 黃芪八兩 白芍八兩 黃柏八兩 當歸八兩 山藥四兩 鎮陽四兩 枸杞子四兩 龜板四兩 菟絲子四兩 破故紙六兩 杜仲六兩 五味子六兩 川牛膝一斤 熟地二斤

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢，空心白開水送下。

【禁忌】熱病忌服；小兒不用。

【備考】有效期一年。

追 風 丸

一、北京、濟南、承德

【功能與主治】祛風散寒，活絡

止痛。主腰腿疼痛，手足麻木，半身不遂。

【處方】川烏一兩 草烏一兩 乳香一兩 沒藥一兩 杜仲一兩（生） 菟絲子一兩 木瓜一兩 育紅花一兩 虎骨一兩（油炙） 當歸二兩 千年健五錢 追地風五錢 續斷五錢 獨活五錢 羌活五錢 麻黃五錢 蕲蛇五錢 甘草五錢 馬錢子六錢（炒去毛） 共為細粉，每十五兩六錢細粉兌，麝香五分

【制法】上藥和勻，煉蜜為丸重一錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，溫開水或溫黃酒送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天 津

【功能與主治】舒筋活血，散風化痰。主筋骨軟弱，手足麻木，風吹冷痹，腰背疼痛，經年舉發。

【處方】胆星六錢 橘絡一錢五分 生白芍二兩 法夏一兩五錢 桂枝八錢 當歸二兩 制川烏一兩 雄黃面五錢 甘草五錢 制草烏一兩 川芎二兩 炒殭蠶二兩 地龍一兩 防風二兩 荆芥二兩 白芷一兩 天麻一兩 生石膏一兩 制白附子五錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、大 同

【功能與主治】風寒麻木，筋骨疼痛，腰腿無力，行步艱難。

【處方】當歸五錢 川烏五錢 草烏五錢 地龍五錢 木瓜五錢 天麻五錢 杜仲五錢 麻黃五錢 獨活五錢 牛膝五錢 人參五錢 硃砂五錢 廣木香三錢 川斷三錢 紅花一錢 烏蛇肉一錢 全虫二錢 獨角蓮二錢 乳香一錢五分 沒藥一錢五分 冰片二分 麝香一分 正牛黃一錢五分

【制法】共為細面，煉蜜為一錢五分重丸，硃砂為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，重者二丸，日服二次，早晚黃酒送下，白開水亦可。

四、沈陽(1)

【功能与主治】疏風散寒，強筋壯骨。主骨節疼痛，手足麻木。

【处方】人參二兩 酥砂一兩 血竭一兩九錢 丁香一兩九錢 紅花二兩四錢 虎骨一兩 獨活一兩九錢 大麻二兩九錢 首烏一兩九錢 當歸二兩九錢 芥穗一兩九錢 白芷七兩五錢 冰片一錢五分 川芎二兩 甘草一兩九錢 防風一兩九錢 全蠍一兩 沉香一兩九錢 丁香二錢 乳沒二兩

【制法】除酥砂、血竭、冰片另研外，余則共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，早晚用黃酒送下。

【禁忌】忌食生冷油膩。

五、沈陽(2)

【功能与主治】追風利濕活血。主週身痛痒，風濕疙疸，白癩風，大痛身熱，惡寒發燒，嘔吐惡心，腹痛神疲。

【处方】苦參六兩 黃芩二兩 羌活一兩 荆芥二兩五錢 川芎一兩 麻黃二兩 當歸五錢 人參一兩 白朮五錢 白芍一兩 殭蠶一兩 蒺藜一兩 防風一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

六、蘭州

【功能与主治】舒筋活血，除濕化痰。主腰背疼痛，四肢疼痛手足麻木，以及头疼等症。

【处方】當歸二兩 秦艽一兩 羌活二兩 獨活一兩 松節一兩 牛膝一兩 天麻一兩 川烏一兩 烏蛇一兩 明雄一兩 杜仲一兩 細辛二錢 枸杞二兩 白朮一兩 續斷一兩 半夏一兩 麻黃一兩 黨參五錢 加皮一兩 木瓜一兩 虎骨一兩 石南藤八錢

【制法】蜜丸二錢重，蜡皮封固。

【劑量及用法】每次服一丸，每日早晚各一次，白開水送下。

七、禹县

【功能与主治】內熱感冒，急惊

風疹，傷風吐痰，寒熱往來。

【处方】胆南星二錢 天竺黃二錢 殭蠶二錢 蟬蛻二錢 半夏三錢 大黃四錢 防風二錢 硃砂四錢 前胡二錢 赤金三十張

【制法】共為細面，煉蜜為丸，每丸重五分，赤金為衣。

【劑量及用法】一歲至三歲服半丸，薄荷湯送下。

【禁忌】慢惊風忌用。

【備考】有效期一年。

八、青島

【处方】當歸一兩 川烏五錢 草烏五錢 赤芍二錢 香附一兩 南星五錢 羌活五錢 細辛二錢 麻黃一錢 桂枝五錢 茯苓 天麻 白朮各一兩 地龍 乳香 沒藥各五錢 防風一兩 白芷五錢 甘松五錢 甘草 秦艽各五錢

【制法】共為細面，煉蜜為丸，二錢五分，蜡皮封。

九、呼和浩特

【处方】當歸五錢 川烏二錢五分 草烏二錢五分 地龍肉二錢 乳香一錢五分 沒藥一錢五分 木瓜 天麻 虎骨 白附子 牛膝 杜仲 麻黃 獨活 人參各五錢 川斷 木香 紅花 烏蛇肉各二錢 全蠍一錢 共為細面，每料兌，麝香六分 冰片一分 牛黃六分 硃砂五錢

【制法】蜜丸重一錢五分，蜡皮封固。

牽正丸

沈陽

【功能与主治】諸風眩掉，散結行經。主中風口眼喎斜，惊癇抽掣，半身麻痺等症。

【处方】白附子 白殭蠶 全蠍各等分(皆生用)

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸一錢重。

【劑量及用法】每服一丸，溫酒送下。

【禁忌】氣虛者及孕婦忌服。

史國公葯酒丸

一、濟南

【功能与主治】左癱右瘓，四肢

頑麻，骨節酸痛，諸般風寒濕痺等症。

【处方】虎骨(酒浸一日焙干酥炙) 秦艽 當歸 鱉甲(炙) 羌活 草薢 川牛膝 晚蠶沙各二兩 防風一兩(去蘆) 松節二兩 白茄根八兩(蒸熟) 枸杞子五兩 陳皮二兩 蒼耳子四兩 蒼朮一兩 紅麴二兩 杜仲二兩

【制法】共為細末，煉蜜為丸，三錢重。

【劑量及用法】每服一丸，酒燉熱服。

【禁忌】類中風、腦充血等症禁用；孕婦忌服。

二、青島

【处方】當歸 檳榔 杭芍 白芷 川芎 獨活 藿香 紅花各二錢 生地 破故紙 紫草 甘草各一錢 麥冬 牛膝 厚朴 防風 丹皮 烏藥 杞子各二錢 熟地四錢 羌活 梔子 廣皮 香附 山楂 木瓜 蒼朮 枳殼 白朮各一錢 玉竹二兩 青皮一錢

【制法】共為細麵，煉蜜為丸，重二錢五分。

搜風丸

沈陽

【功能与主治】祛風邪通經絡，強腰補腎。主四肢不仁，半身不遂，口眼喎斜，肢體癱瘓，足膝麻痺，肢軟無力，風癱痛痒，郁滯等症。

【处方】大麻 元參 草薢各三兩 羌活七錢 附子五錢 杜仲 牛膝 獨活各二兩五錢 當歸五錢 生地一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸一錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

獨活寄生丸

武漢

【功能与主治】腰膝酸痛，冷痺無力，筋骨攣痛，不得屈伸。

【处方】獨活 桑寄生 秦艽 防風 細辛 川芎(酒洗)各一錢半 當歸(酒洗) 白芍(酒炒) 熟地

各一錢 肉桂 茯苓 杜仲(生薑汁炒盡絲) 牛膝 黨參各一錢半 甘草一錢

【制法】上藥干燥,混合碾細,以生薑汁一錢,燒酒五兩,制成小丸,每錢不得少于二十粒。

【劑量及用法】每服一至三錢,開水送下。

【禁忌】孕婦忌服,或遵醫囑。

附參考古方

【來源】沈氏尊生書。(獨活寄生丹)

【功能與主治】濕病外因虛。

【處方】獨活 桑寄生 熟地 牛膝 杜仲 秦艽 白芍 細辛 人參 茯苓 當歸 防風 甘草 姜

【制法】共為細末,水泛為丸。

神仙藥酒丸

膏 島

【處方】陳皮 當歸 加皮 砂仁 官桂 木香 松香 茜草 紅絨 枳殼 獨活 丹參 梔子各等分

【制法】共為細面,煉蜜為丸,重二錢五分。

蘇合香丸

一、北京、承德

【功能與主治】通竅祛風,順氣化痰。主中風痰迷,神志不清,牙關緊閉,口眼歪斜,四肢麻木,行動艱難。

【處方】訶子 香附 乳香 檀香 公丁香 沉香 木香 白朮 藁朮 白膠香(煎膏)各五十兩 共為細粉,每五百兩細粉兌犀角二十二兩四錢 硃砂九十六兩 麝香 冰片各八兩

【制法】上藥和勻加蘇合油三十兩,煉蜜為丸,重一錢,蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸,日服二次,溫開水送下。

【禁忌】孕婦禁服。

二、天津(蘇合丸)

【功能與主治】通竅去風,鎮驚化痰,順氣止痛。主中風痰迷,神志不清,牙關緊閉,口眼歪斜(俗稱緊痰厥),行動艱難,感受時邪。

【處方】訶子肉 檀香各五兩 制乳香二兩五錢 公丁香 白朮

(麩炒) 香附(醋制) 藁朮 廣木香 沉香各五兩 共為細粉,每細粉二斤十兩五錢兌犀角粉三兩七錢五分 硃砂面九兩 麝香 冰片各七錢五分 安息香 錢 蘇合油三兩

【制法】以上研細和勻,煉蜜為丸,一錢重,蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每服一丸,白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、上海

【功能與主治】中惡昏迷,小兒驚搐。

【處方】硃砂 藁朮 香附(炒制) 公丁香 青木香各一兩 乳香(制)五錢 麝香七錢五分 檀香一兩 蘇合香五錢 沉香 犀角各一兩 冰片五錢 訶子肉(煨)一兩

【制法】各研細粉,加蘇合油及煉蜜,打和為丸,每丸潮重一錢,蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸,溫開水送服。

【備考】憑醫下處方購用。

四、南京

【功能與主治】主氣閉,寒閉,卒然昏倒,中惡痰厥,中寒吐瀉,腕腹疼痛等症。

【處方】蘇合香油五錢 煨訶子肉 青木香 烏犀角(磨汁) 公丁香 飛硃砂(一半為衣) 沉水香各一兩 制乳香五錢 白檀香一兩 麝香七錢五分 藁朮一兩 冰片五錢 香附一兩

【制法】上藥生晒,各研細末,各取淨粉,細料另乳后和勻,以蘇合香油燉化加煉白蜜為丸,每粒潮重八分,硃砂為衣。蜡壳封護。

【劑量及用法】每服一丸,小兒減半。

【禁忌】孕婦忌服。

五、武漢(1)

【功能與主治】卒然昏倒,痰涎壅盛,牙關緊閉,不省人事,霍亂吐利,婦女血瘀經閉,小兒吐乳。

【處方】蘇合香油 公丁香 藁朮 檀香 犀角 沉香(粉) 香附 硃砂(飛) 廣木香 訶子肉各一兩 麝香七錢半 乳香(去油) 梅片各

一兩 白朮 安息香各二兩

【制法】取上藥混合碾細,按淨粉量加煉蜜100—110%,和成為丸,每丸重八分,蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸。

六、武漢(2)(追風蘇合丸)

【功能與主治】中風昏倒,手足抽掣,口眼歪斜,痰涎壅塞。

【處方】天麻二兩 細辛二兩半 白朮 烏藥 白芷 薄荷 乳香各二兩 飛硃砂七錢 犀角一兩 蘇合油 檀香 香附 藁朮 木香 羌活 制半夏 炙甘草各二兩 牙皂一兩二錢 麝香 沒藥 肉蔻 防風 砂仁 訶子肉 丁香 沉香各二兩 冰片 麝香各二錢

【制法】取上藥除冰片、麝香、硃砂、犀角另研后入外,將其余藥混合碾細,再將冰片、麝香、硃砂、犀角加入內拌勻。以蘇合油化入110%—120%煉蜜內,和成為丸,每丸重八分,蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸,小兒減半,開白水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

七、廣州(蘇合丸)

【功能與主治】中風,痰厥,小兒驚風。

【處方】丁香 安息香 木香 檀香 藁朮 香附 訶子 犀角各一兩 蘇合香油 蘇合香油各五錢 硃砂一兩 龍腦五錢 麝香七錢五分

【制法】將上列各藥洗淨,切碎隔水蒸透,晒干研成細末,和入硃砂、蘇合香油、龍腦、麝香,拌蜜糖制成大丸,每丸重一錢二分,蜡壳封固。

【劑量及用法】去壳,用水燉溶內服,每次服一丸。

八、福州

【功能與主治】治中氣或卒暴,氣逆心痛,鬼魅惡氣等症。

【處方】麝香 丁香 沉香 白檀香 香附 藁朮 白朮 訶子(煨去皮) 硃砂(水飛) 青木香 烏犀角各二兩 蘇合香油 龍腦各一兩 蘇合油二兩(入安息香膏內) 安息香二兩(另為末用無灰酒一升熬膏)

【制法】上為細末，用安息香膏並煉蜜為丸，每粒重一錢，蜡壳封。

九、杭州（神香蘇合丸）

【功能與主治】治小兒急驚，抽搐吐乳，目睛上視，牙關緊閉，痰涎壅盛，危急諸症。並治男婦中風痰厥，昏迷僵仆，寒証氣閉，霍亂吐瀉，時氣瘴癘等症。此丸避穢開竅，祛痰行氣，效驗極著，若瘟疫流行時，綢袋盛佩胸際，可避穢毒。

【處方】蘇合香油二兩 金銀香一兩 公丁香 广木香 貢沉香 牛香附 犀角尖 飛硃砂各二兩 滴乳香（制）一兩 生於朮二兩 梅冰片 麝香各五錢

【制法】上藥各取細粉，將金銀香酒烱化成膏，和蘇合香油，加煉白蜜打丸。每潮重五分，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，小兒酌減。中風昏迷，用薄荷湯化服。霍亂吐瀉，用淡姜湯化服。驚風抽搐，用鈎藤灯心湯化服，或用開水化服亦可。

十、南昌

【功能與主治】大人中風痰厥，卒然昏倒，痰涎壅盛，牙關緊閉，不省人事及小兒驚搐吐乳。

【處方】蘇合香（另研）五錢 沉香（另研） 白檀香 青木香 公丁香（另為末，用無灰酒五合熬膏） 安息香各一兩 元寸（另研）七錢五分 蘇合香油 龍腦（另研）各五錢 飛硃砂（以一半為衣） 云犀角鎔（另研極細） 訶子（煨取肉） 炒香附（去毛） 藁朮各一兩

【制法】研細末，入另藥和勻用安息香膏並煉白蜜為丸，每丸重一錢，硃砂為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】大人中風痰厥，每服一丸，薄荷湯送下。小兒驚搐吐乳，服量視年齡及病情應酌減服，用灯心湯下。

【禁忌】孕婦忌服。

十一、重慶

【功能與主治】治骨蒸肺癆，癆瘵，中風痰厥，心腹猝痛，昏迷僵仆，寒証氣閉，霍亂吐利，時氣瘴癘，赤白暴痢，女性瘀血、經閉，小兒驚搐、吐乳等症。

【處方】蘇合香油五錢 丁香

安息香 青木香 白檀香 犀角 沉香 香附 藁朮 訶子 硃砂各一兩 乳香 龍腦香各五錢 麝香七錢五分

【制法】蘇合香油另下，麝香、龍腦香另研，余約共研細末，煉白蜜為丸，每重一錢，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸。

十二、西安

【功能與主治】芳香興奮中樞神經，使思想銳敏，理智清醒，精神活力增進，並能刺激腸胃粘膜，刺激氣管粘膜使痰易于咳出，故有祛痰回甦之效。主治急性腸胃型、肺炎型、中毒型、小兒腦炎急驚風，急性神經和心臟衰弱，痰塞氣管，呼吸困難，神智昏迷，時氣瘴癘及一切急性腦貧血，失神等病症。

【處方】蘇合香五錢 安息香 丁香 木香 檀香 沉香 藁朮 香附 犀角 硃砂 蘇合香油各一兩 冰片五錢 麝香七錢五分 訶子一兩

【制法】共研細粉，煉蜜成丸，如芡實大，硃砂，蜡皮封固。

【劑量及用法】成人一日一次至二次，每服一丸約八分至一錢。小兒按年步酌減，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

十三、蘭州（蘇合丸）

【功能與主治】化痰順氣，通導散風。治中風痰迷，牙關緊閉，四肢麻木，行步困難，卒感昏迷不醒等症。

【處方】沉香 广木香 檀香 丁香 香附子 白朮 訶子肉 犀角各一兩 乳香五錢 藁朮一兩 麝香一錢 硃砂二兩 梅片五錢 蘇合香油一兩 安息香二錢 藁朮一兩

【制法】共為細粉，每粉二斤十兩五錢，兌與以上細料。蜜丸一錢重，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

十四、大同

【功能與主治】中痰中氣，神經錯亂，不省人事，小兒驚風。

【處方】沉香 木香 丁香 檀香 香附各一兩 犀角四錢五分

白朮 藁朮 訶子肉 乳香各一兩 蘇合香油六錢四分 安息香一分 硃砂一兩九錢 冰片一兩 麝香一錢六分

【制法】共為細面，煉蜜為丸，一錢重，蜡皮封固。

【劑量及用法】日服二次，每次一錢。

【禁忌】孕婦忌服。

十五、禹縣

【功能與主治】中風中氣，卒然昏倒，不省人事，手足厥冷，吐瀉肚疼，小兒急驚。

【處方】白朮二兩 青木香 犀角 香附子 硃砂 訶子 白檀香 安息香 沉香各一兩 麝香三錢 丁香 藁朮各一兩 龍腦七錢 蘇合香油 蘇合香（即乳香）各五錢

【制法】共為細面，入安息膏，煉蜜為丸，如芡實大。

【劑量及用法】每服四丸，白開水送下，小兒每服一丸，空心服之。

【禁忌】孕婦忌用。

【備考】有效期二年。

十六、濟南

【功能與主治】卒然昏倒，痰涎壅盛，牙關緊閉，不省人事。

【處方】蘇合香油五錢 安息香 母丁香 广木香 沉香 生香附 烏犀角各一兩 鏡面硃砂（水飛，留三錢為衣）一兩 乳香 冰片各五錢 麝香七分五厘 生於朮一兩

【制法】用黃酒半斤將安息香熬膏入蘇合油，余藥十味為細末，入安息香膏內，加煉蜜為丸，每丸重一錢。硃砂為衣，白蜡固封。

【劑量及用法】成人每服一丸，小兒半丸，淡姜湯沖服，白水亦可。

【禁忌】忌食腥葷生冷之物；孕婦忌服。

十七、青島

【處方】沉香二兩 木香 丁香 各三兩 檀香二兩 白朮三兩 乳香一兩 訶子肉一兩四錢 藁朮 香附各二兩 安息香二錢 沒藥一兩 犀角三錢 蘇合香五錢 硃砂一兩 冰片一錢 麝香一錢

【制法】共為細面，煉蜜為丸，重一錢，蜡皮。

十八、沈陽(1)

【功能与主治】理气化痰，兴奋神經，芳香開閉。主中風中寒中痰，霍亂轉筋，瘧瘧時疫，驚癇抽搐，諸語發狂，心中痛，感冒風寒，痢疾腹痛，昏亂。

【处方】苏合香油五錢 安息香 母丁香 木香 沉香 香附 犀角 硃砂各一兩 乳香五錢 麝香七錢五分 梅片五錢 生於朮 檀香 藁撥各一兩

【制法】除硃砂、梅片另研外，余則共研極細末，煉蜜為丸，大丸一錢四分重，小丸七分重。

【劑量及用法】每服一丸，白开水或姜汁送下，小兒酌減。

【禁忌】中風脫症及孕婦忌服。

十九、沈陽(2)(苏合丸)

【功能与主治】理气化痰，強心通絡。主中風，中寒，痰壅，霍亂轉筋，瘧氣時疫，驚癇抽搐，胃寒暴痛，感冒風寒。

【处方】苏合油五錢 水安息二兩 公丁香 广木香 益沉香 香附 片砂 乳香各一兩 麝香七錢五分 梅片五錢 白朮 檀香 藁撥 訶子肉 广角各一兩

【制法】除片砂、梅片、麝香另研外，余則共研極細末，煉蜜為丸，大丸一錢四分，小丸七分，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白开水或姜水送下。

【禁忌】中風脫症及孕婦忌服。

二十、撫順(苏合丸)

【功能与主治】芳香，兴奋神經，鎮痛開竅，疏風溫寒。主中風、中寒、中氣、中痰、胃痛、驚癇，並主血寒經閉，少腹痛結，疼痛拒按等症。

【处方】木沉香二兩 广木香二兩 丁香二兩 檀香二兩 白朮二兩 訶子二兩 藁撥二兩 香附二兩 冰片五錢 苏合油五錢 犀角五錢 硃砂一兩 麝香二錢 乳香兩半

【制法】共為細面，蜜丸一錢四分或七分重，蜡皮封。

【劑量及用法】大人每服一丸，小兒七歲服一小丸，姜湯送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二十一、吉林、哈尔滨(苏合丸)

【功能与主治】清里解表，除邪解抽止痛。主治：(1)中風：風邪外襲，筋拘攣，口眼歪斜，腰腿疼痛，不能伸屈。(2)中寒：中寒腹痛，便澀脘悶，四肢清冷。(3)中氣：暴怒氣逆，忽然昏倒，不省人事，或胸膈脹痛，頻頻咯氣。(4)中痰：寒痰凝結，迷塞清竅，氣道阻塞，窒息暈倒，痰鳴氣促。(5)霍亂：吐瀉交作，逆轉轉筋，臍腹絞痛。(6)風瘧時氣：淫瀉濁氣，吸入中毒，欲吐不吐，欲瀉不瀉，攪鬧煩悶，無可奈何。(7)產後風：婦人新產，百病開，寒風侵入，筋骨疼痛，口噤項強，角弓反張。(8)白痢：寒濕凝結，泄下白痢，形如魚腦，腹痛下墜，里急后重。(9)鬼忤狐祟，神經錯亂，如見鬼神，語言無倫，哭笑不定。(10)心胃暴痛：心胃久寒，卒然暴痛，不敢欠伸，不敢俯仰，叫号呻吟。(11)驚癇：驚恐傷神，四肢搖擗，項強反轉，戰戰不寧。(12)血塞經閉：少腹結塊，痛疼拒按。(13)感冒風寒：發熱惡寒，大痛體痛，泛噁嘔。

【处方】苏合香油(白色者佳)七錢 母丁香七錢 安息香二錢五分 广木香 白檀香 益沉香各七錢 炙香附二兩一錢 訶子(煨取肉) 烏犀角 藁撥 白朮各一兩四錢 滴乳香七錢 梅片二錢五分 麝香一錢四分 硃砂一兩四錢

【制法】將麝香、梅片、硃砂等另研，陸續將諸藥細末合均，用煉蜜烱化，苏合油調和為丸，每丸七分重，大亦合為衣。棉紙包，蜡皮封。

【劑量及用法】每服一丸。中風昏迷，驚癇鬼忤，不省人事，薄荷湯送下。卒暴心胃痛，霍亂吐瀉，淡姜湯送下。時氣瘧瘧，白痢，霍香湯送下。瘀血經閉，溫酒下。驚風，灯心湯下。

【禁忌】孕婦忌服。中風脫症，自汗遺尿，口开手撒，眼合声嘶者忌用。

二十二、呼和浩特

【处方】木香 藁撥 香附 丁香各三兩 檀香 乳香 訶子肉 白朮各二兩 沉香四兩 麝香五分 冰片一兩 硃砂二兩 苏合香一兩

【制法】共為細面，老蜜為丸。加料不滿金衣，單料八分半金衣，蜡皮封固。

附參考古方

【来源】太平惠民和劑局方。

【功能与主治】療傳屍、骨蒸、癰疽、肺癰、疔忤、氣卒心痛，霍亂吐利，時氣鬼魅瘴癘，赤白暴痢，瘀血月閉，瘰癧疔腫，驚癇鬼忤，中風小兒吐乳，大人狐狸等疾。

【处方】苏合香油(入安息香膏內) 薰陸香(另研) 龍腦(研)各一兩 青木香 白朮 白檀香 丁香 朱砂(研，水飛) 沉香 香附子(炒，去毛) 烏犀(鎔屑) 藁撥 安息香(別為末，用無灰酒一升，熬膏) 麝香(研) 訶黎勒(煨，去皮)各二兩

【制法】上為細末，入藥研勻，用安息香膏，並煉白蜜和劑，每服旋丸，梧桐子大。

【劑量及用法】早朝取井花水溫冷，任意化服四丸，老人、小兒服一丸，溫酒化服亦得，並空心服。用蜡紙裹一丸，如彈子大，緋絹袋盛，當心帶之，一切邪神，不敢近去。

感應丸(苏合感應丸)

吉 林

【功能与主治】消痰清痰，去寒止痛。主中氣。

【处方】益沉 公丁 木香 檀香 巴豆霜 天麻 貢朮 肉蔻各二錢四分 犀角 香附 烏藥 杏仁 薏仁 乳香 大活 藁撥 干姜各一錢七分 草霜 苏合油 大梅片各二錢四分 麝香 訶子各一錢

【制法】共為細面，用煉蜜制成丸劑每丸七分重，硃砂為衣。

【劑量及用法】每服一丸，用姜水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

再 造 丸

一、北京、承德

【功能与主治】祛風散寒，化痰活絡，鎮靜安神。主中風半身不遂，左癱右瘓，口眼歪斜，腰腿不利，四肢麻木，言語不清，筋骨痠痛。

【处方】蕪蛇肉(酒制)二十兩

紅花 檀香各五兩 母丁香 細辛
天竺黃各十兩 玄參二十兩 香附
(醋炒)十兩 地龍肉五兩 熟地二
十兩 旱三七五兩 乳香 青皮
紫豆蔻仁各十兩 防風 何首烏
川芎各二十兩 片姜黃二兩五錢
黃耆 甘草各二十兩 茯苓十兩
竹節香附 黃連 桑寄生 大黃各
二十兩 葛根十五兩 薑香二十兩
骨碎補十兩 麻黃二十兩 赤芍
川附片 虎骨(油炙) 僵蚕(炒)各
十兩 蕁藤二十兩 穿山甲(醋炙)
龜版(醋炙) 沉香 白朮各十兩
於朮八兩 天麻 肉桂(去皮)各二
十兩 血竭七兩五錢 草豆蔻 白
芷各二十兩 威靈仙十五兩 沒藥
十兩 羌活二十兩 烏藥 當歸各
十兩 人參二十兩(去芦) 油松節
十兩 健神曲 毛橘紅各四十兩
全蝎十五兩 共為細粉，每三百二
十兩細粉兌：牛黃一兩 麝香二兩
冰片一兩 犀角二兩 朱砂四兩

【制法】上藥和勻煉蜜為丸，重
三錢，大赤金滿衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服
二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天 津

【功能與主治】舒筋活血，化痰
通絡，鎮靜安神。主中風痰火，半身
不遂，左癱右瘓，口眼歪斜，腰腿疼
痛，四肢麻木，筋骨痠軟，言語不清。

【處方】制龜版 制山甲 青皮
(醋制)各十兩 萬應絀二斤八兩
麻黃 制首烏 祁蛇肉各一斤四兩
旱三七五兩 赤芍 天竺黃 寇仁
各十兩 全蝎十五兩 黃連一斤四
兩 葛根十五兩 天麻一斤四兩
松節 沉香 細辛各十兩 防風
桑寄生 川芎 大黃各一斤四兩
骨碎補 當歸各十兩 血竭七兩五
錢 香附(醋制)十兩 片姜黃二兩

五錢 紅花五兩 生黃芪 熟地
薑香各一斤四兩 制虎骨十兩 草
豆蔻一斤四兩 制附子十兩 生於
朮一斤 地龍五兩 土草一斤四兩
母丁香 制乳香 茯苓(去皮) 制
沒藥各十兩 蕁藤一斤四兩 威靈
仙十五兩 炒僵蚕十兩 白芷 羌
活各一斤四兩 烏藥十兩 七爪橘
紅二斤八兩 肉桂(去粗皮) 人參
(去芦) 元參(去芦) 竹節香附各
一斤四兩 共為細粉，每四十九斤
二兩兌：朱砂面九兩八錢 冰片二
兩四錢五分 麝香四兩九錢 犀角
粉六兩五錢七分 牛黃二兩四錢五
分

【劑量及用法】每服一丸，白開
水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、

處方刪

四、南京(人參再造丸)

【功能與主治】祛風散寒，逐痰
活絡。主痰壅氣結，筋骨痠痛，手足
拘攣及風濕諸痹。

【處方】人參二兩 陳胆星一兩
蘇合香油四兩 西牛黃 威靈仙
日葛根 冰片 全蝎各二錢五分
綿紋大黃二兩 制乳香一兩 琥珀
朱砂各二兩 麝香五錢 制沒藥
天竺黃 當歸 黃芪 白芷 川芎
羌活 天麻各二兩 地龍五錢 蕁
蛇四兩 白朮 白附子 青皮各一
兩 川蕁藤二兩 制南星一兩 炮
山甲 虎脛骨 玄參 茯苓 麻黃
白寇仁各二兩 薑香 烏藥各一兩
赤芍二兩 紅花八錢 生地二兩
制香附一兩 桑寄生二兩 草蔻仁
一兩 片姜黃 肉桂 川黃連 甘
草 制龜版各二兩 母丁香一兩
廣木香四錢 沉水香五錢 骨碎補

一兩 松香五錢 首烏二兩 生薑
血竭各一兩

【制法】上藥除西黃、麝香、冰
片、琥珀、朱砂、血竭、松香、乳香、沒
藥、天竺黃須另研細末外，余藥生晒
共研細末，加入上藥另研和勻，以
陳胆星熬化蘇合香油溶開加煉蜜為
丸，每粒潮重三錢，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一粒，溫開
水化服。

【禁忌】孕婦忌服。

【備考】根據古方匯編方劑，取
消兩頭尖一味，將水安息香改用蘇
合香油，虎膝改用虎脛骨，余藥不
動。

五、武 漢

【功能與主治】凡因風寒濕熱和
虛弱所引起的各種疼痛、麻痺、痿
痺、抽搐、嘔吐、積聚等症，均可適
用。

【處方】烏頭尖五錢 犀角二錢
乳香二錢半 安息香一兩 龜版二
錢半 天麻 琥珀各五錢 骨碎補
二錢半 熟地 穿山甲 當歸各五
錢 沉香二錢半 松香一錢三分
草果五錢 紅花二錢 姜黃五錢
僵蚕二錢半 川貝五錢 葛根六錢
二分 防風五錢 附子二錢半 西
牛黃六分二厘 寇仁五錢 血竭二
錢 沒藥二錢半 黨參五錢 飛朱
砂 烏藥各二錢半 地龍一錢半
桑寄生六錢二分 赤芍 母丁香各
二錢半 肉桂 黃連 首烏各五錢
天竺黃二錢半 玄參五錢 細辛二
錢半 川芎 薑香 麻黃各五錢
廣木香一錢 白朮二錢半 黃耆
甘草 茯苓各五錢 冰片六分 青
皮二錢 威靈仙六錢 羌活五錢
全蝎六錢 香附二錢 胆星二錢
麝香一錢二分 白芷 大黃各五錢
虎膝一對(四錢) 真蕁蛇一條(去
皮骨并去頭、尾各三寸，酒浸一兩)

【制法】取上藥進行干燥，混合
碾細，照淨粉量加煉蜜120~130%，
和成大丸，每丸重三錢，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服半丸，小兒酌減。

【禁忌】孕婦忌服，或遵醫囑。

六、福州(人參再造丸、人參回生再造丸)

【功能與主治】主中痰，中風，口眼歪斜，手足拘攣，言語不清，左癱右瘓，筋骨疼痛，半身不遂，步履艱難。

【處方】人參 當歸 川芎 黃連 羌活 防風 元參(酒炒) 藿香(炒) 白芷(炒) 茯苓(炒) 麻黃(炒) 天麻(炒) 草薢(炒) 姜黃(炒) 炙草 肉桂(勿見火) 薏仁(勿見火) 首烏(制) 琥珀(另研) 炙桑 大黃(酒蒸) 草薢仁(另研) 鼠糞 熟地 穿山甲(麻油炙)各二兩 水安息 蕲蛇(酒浸炙去骨淨末)各四兩 金蠟身 蜈蚣(酒炒) 葛根(炒) 桑寄生(烘干)各二兩五錢 細辛 赤芍(炒) 烏藥(酒炒) 青皮(數炒) 於朮(土炒) 殭蠶(洗炒) 乳香(去油) 沒藥(去油) 辰砂 骨碎補(酒炒) 制香附 竺黃 白附子(制) 龜版(炙) 沉香 母丁香 胆星各一兩 紅花(酒炒) 犀角各八錢 川朴 地龍(炙) 松香(煮九次)各五錢 木香(勿見火)四錢 冰片 牛黃各二錢五分 血竭八分 虎胫骨(炙)一對

【制法】共研細末，蜜煉為丸，每粒重二錢，金箔衣，蜡壳封固(原重一錢)。

【禁忌】孕婦忌服。

七、杭州(1)(人參回生再造丸)

【功能與主治】培元固本，順氣養血，化痰祛風，舒筋活絡。主男婦中風中痰，口眼歪斜，手足拘攣，言語蹇澀，筋骨疼痛，半身不遂，步履艱難以及癱風氣厥，癱瘓痰疾。蓋其有宣通百脈之效，具回生再造之功。凡有久虛未病者，即宜常服；或已成疾者，尤所急需。

【處方】吉林人參 當歸(酒炒) 川芎(酒炒) 川黃連 羌活 防風 烏元參 廣藿香 白芷 茯苓(乳拌) 麻黃(去節) 明天麻 川草薢 片姜黃(炒) 炙甘草 肉桂心

白豆蔻 制首烏 西琥珀 制黃芪 制大黃 草豆蔻 制草烏 大熟地 炙山甲各二兩 金銀香四兩 葛根 金蠟 威靈仙各二兩五錢 赤芍(酒炒)一兩 桑寄生二兩五錢 北細辛 於朮(炒) 烏藥(酒炒) 小青皮 制沒藥(去油淨) 炒天虫 制乳香(去油淨) 制香附 飛辰砂 骨碎補(去毛淨烘燥) 制龜板 天竺黃 制白附子 杜胆星 貢沉香 母丁香各一兩 川厚朴五錢 杜紅花 犀角各八錢 廣木香四錢 淨地龍 制松香各五錢 鞭血竭八錢 梅冰片 西牛黃各二錢五分 麝香五錢 虎胫骨二兩 真蕲蛇四兩(小者為佳，去骨並頭尾三寸，取淨肉，酒浸炙)

【制法】上藥五十九味，各取淨粉，加煉白蜜搗數千槌為丸，每重大顆二錢，小顆一錢五分，金箔為衣，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，細嚼用溫酒或淡姜湯或開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

八、杭州(2)(回天丸)

【功能與主治】化痰順氣，活血通絡。治中風昏迷，半身不遂，四肢麻木，口眼歪斜，並上疫癘流行，胸悶頭痛，頸項疼痛，肢厥抽搐。小兒驚風等症。

【處方】山羊血五錢 北細辛 炙龜板 烏藥各一兩 兩人尖二兩(非鼠糞也，惟制白附子可代) 真蕲蛇(去皮骨並頭尾各二寸，酒浸，取淨肉)四兩 炙黃芪二兩 母丁香 乳香(去油)各一兩 麻黃 粉甘草各二兩 小片皮一兩 大熟地二兩 犀角尖八錢 沒藥(去油) 西赤芍 羌活各一兩 白芷二兩 虎胫骨一兩 白蠟八錢 淨全蠍二兩五錢 青防風 明天麻各二兩 制附子一兩 全當歸二兩 骨碎補(去毛烘燥)制香附各一兩 烏元參(酒炒)制首烏 大黃各二兩 威靈仙 粉葛根各二兩五錢 貢沉香一兩 白豆蔻 廣藿香各二兩 炒冬元一兩 紅樅八錢 川草薢二兩 西牛黃二錢五分 草豆蔻 川黃連 白茯苓 炒殭蠶各二兩 制松香五錢 川芎二兩 廣山漆一兩 桑寄生二兩五錢 梅冰片一錢五分 當門子五錢 飛辰砂一兩 肉桂二兩

天竺黃一兩 廣地龍五錢 炙山甲(麻油五錢浸) 片姜黃各二兩

【制法】上藥各取淨粉，煉白蜜為丸，每潮重一錢五分，金箔為衣，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，小兒減半，開水化服。

【禁忌】孕婦忌服。

九、南昌(人參再造丸)

【功能與主治】半身不遂，四肢麻木，口眼歪斜，腰腿不利，言語不清，筋骨疼痛。

【處方】蕲蛇十兩 玄參 甘草 川芎 制熟地 何首烏 桑寄生 防風 兩頭尖 黃耆 大黃 麻黃 天麻 羌活 肉桂 黃連 白芷 藿香 草薢 真別直參 草豆蔻各二十兩 檀香 紅樅 地龍 田三七 麝香各五兩 龜板 細辛 母丁香 制香附 天竺黃 山羊血 青皮 乳香 紫豆蔻仁 虎骨 川附片 沉香 茯苓 赤芍 穿山甲(醋制) 油松節 骨碎補 殭蠶 白朮 當歸 烏藥 沒藥 飛辰砂各十兩 橘紅四十兩 片薑黃 牛黃 冰片各二兩五錢 葛根 全蠍 威靈仙各十五兩 神樅四十兩 於朮八兩 血竭 真靈犀角各七兩五錢

【制法】共研細末，煉蜜為丸，每丸重三錢五分，金箔為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【備考】非經醫師處方不得使用。

十、沙市(人參再造丸、回生再造丸)

【功能與主治】治風痰口眼歪斜，手足拘攣，言語不清，左癱右瘓，筋骨疼痛，半身不遂，步履艱難等症。

【處方】水安息(安南者佳)四兩 高時參二兩 蕲蛇(小者為佳，去骨並頭尾三寸，酒浸炙，取淨末)四兩 當歸(酒炒) 川芎(酒炒) 黃連(酒炒) 羌活(酒炒) 防風(酒炒) 玄參(酒炒) 廣藿香 白芷 茯苓 麻黃 明天麻 草薢 片薑黃 甘草(炙) 中安桂(研不見火) 白薏仁(研不見火) 何首烏(黑豆水拌蒸) 琥珀(研) 黃芪(炙) 大黃(酒洗) 草薢(研) 雄鼠

矢 熟地 穿山甲(麻油浸,炙)各二兩 全蠍(去頭尾足) 威靈仙(酒炒) 葛根(炒) 桑寄生(炙干) 各二兩五錢 細辛 赤芍(炒) 烏藥(酒炒) 乳皮(炒) 於朮(土炒) 殭蠶(炒) 乳香(去油) 沒藥 硃砂 骨碎補(酒炒) 香附(酒炒去毛) 天竹黃 附塊 龟板(火炙) 沉香 母丁香 胆星各一兩 紅花(酒浸烘干) 烏犀角各八錢 川厚朴 地龍(炙干) 松香(煮九次)各五錢 廣木香(不見火)四錢 正梅片 牛黃各二錢五分 血竭八分 虎膠(炙酥)二兩

【制法】上藥研細煉蜜為丸,每丸重二錢,金箔為衣,以蜡丸護之,勿使藥性揮發。

【劑量及用法】每次服一丸,生薑湯送下,病重者酌量再服。

【禁忌】非因風痰者忌服,孕婦亦忌服。

十一、西安(回天再造丸)

【功能与主治】中風不語,半身不遂,牙关不开,痰壅氣閉。

【处方】蕲蛇二兩 當歸二兩 血竭八錢 沒藥一兩 川棟肉二兩 龟板一兩 元參二兩 天麻二兩 白芷二兩 當歸子五錢 犀角八錢 兩頭尖二兩 毛茛一兩 白朮一兩 全蠍二兩五錢 乳香一兩 細辛一兩 首烏二兩 熟附子一兩 制松香五錢 青皮一兩 黃芪二兩 山羊血五錢 制香附一兩 廣地龍五錢 赤芍一兩 麻黃二兩 烏藥一兩 大黃一兩 紅絨八錢 虎膠骨二兩 熟地二兩 母丁香一兩 威靈仙二兩五錢 防風二兩 羌活一兩 草薢仁二兩 甘草二兩 白薢仁二兩 姜黃二兩 川芎二兩 葛根二兩五錢 冰片二錢五分 藿香二兩 殭蠶一兩 川草薢二兩 天竹黃一兩 廣三七一兩 犀角一錢五分 沉香一兩 桑寄生一兩五錢 茯苓二兩 肉桂二兩 辰砂一兩 穿山甲二兩

【制法】煉蜜為丸,蜡皮為衣。

【劑量及用法】凡中風卒然昏迷不論何種急症,用此丸一粒,開水化開,扶病人仰臥徐徐灌下,但悉數下咽使有良効,然此時効力表面直看不出。兩點鐘后再灌一粒,服第二粒時使不如第一粒之艱難。從此每隔六點鐘服藥一粒。痰多可用胆草,

竹瀝,半夏;火盛(如目赤、唇干、舌絳)用菊花、鉤鉤、鮮生地;風威(即抽搐利舌)用虎骨、天麻、獨活;虛甚者可以加參。若諸症並見,即諸藥並用。又有全見寒象,痰壅不通,而有冷汗者,可重用附子、吳茱萸。服丸至二、三十粒,自然清醒,初醒之後險期已過,再換用調理之藥。

十二、蘭州(人參再造丸)

【功能与主治】去風除痰,鎮痙止痛,舒筋活血,鎮靜安神。主男婦痰熱中風,半身不遂,口眼歪斜,腰膝疼痛,風痰癱瘓,四肢麻痺。

【处方】蕲蛇二兩 藿香二兩 檀香一兩 母丁香一兩 細辛一兩 元參一兩 香附子一兩 地龍肉五錢 白芷一兩 三七五錢 乳香一兩 青皮一兩 薢仁一兩 防風二兩 首烏二兩 山芎二兩 片姜黃二錢半 生黃芪二兩 粉甘草二兩 云苓一兩 赤芍一兩 川連二兩 大黃一兩 寄生二兩 葛根一兩五錢 麻黃二兩 蠍子一兩五錢 毛茛一兩 虎骨一兩 殭蠶一兩 琥珀五錢 天雄一兩 羣攢二兩 龟板一兩 沉香一兩 白朮一兩 天麻二兩 元桂二兩 全當歸一兩 白芷二兩 草薢二兩 沒藥一兩 炙甘草一兩五錢 烏藥一兩 羌活二兩 兩參二兩 建櫨四兩 毛橘紅四兩 硃砂四錢 血竭花三錢 牛黃一錢 梅片一錢 麝香一錢 天竹黃一兩 犀牛角三錢

【制法】共研細面,每面二十斤,兌入以上細料,合前藥共為蜜丸,每丸重二錢四分,蜡皮封固。

十三、大同

【功能与主治】神志昏亂,癲癇,瘧疾,血管硬化症。

【处方】蕲蛇一兩 當歸一兩 生軍二兩 靈仙一兩五錢 片姜黃一錢五分 麻黃一兩 母丁香一兩 細辛一兩 穿山甲一兩 犀角七錢五分 紅絨五錢 龟板一兩 赤芍一兩 茯苓一兩 竺黃一兩 生草二兩 沒藥一兩 地龍五錢 三七一兩 虎骨一兩 乳香一兩 川芎二兩 葛根一兩五錢 首烏二兩 肉桂二兩 川連二兩 元參二兩 殭蠶一兩 川芎二兩 附子二兩 薢仁一兩 白芷二兩 防風二兩

藿香二兩 黃芪二兩 附子一兩 草薢二兩 檀香五錢 寄生二兩 烏藥一兩 全虫一兩五錢 熟地一兩 白朮一兩 香附一兩 青皮一兩 碎補一兩 天麻二兩 草薢二兩 兩參一兩 沉香一兩 山羊血一兩 硃砂一兩 血竭七錢五分 麝香五錢 冰片二錢五分 牛黃一錢五分

【制法】共軋細面,煉蜜為丸,每丸重二錢五分,金箔為衣,蜡皮封固。

【劑量及用法】日服二粒。

【禁忌】孕婦忌服。

十四、禹县(回生再造丸)

【功能与主治】中痰中風,口眼歪斜,手足拘攣,言語不清,左癱右瘓,筋骨疼痛,半身不遂,步履艱難。

【处方】蕲蛇二兩 丁香一兩 土白朮一兩 黃芪一兩 毛茛一兩 上血竭八錢 藿香一兩 牛黃一錢半 沒藥一兩 穿山甲二兩 乳香一兩 烏藥一兩 大黃二兩 川厚朴五錢 冰片二錢半 肉桂二兩 硃砂一兩 蕲蛇四兩 殭蠶一兩 川芎二兩 白茯苓一兩 琥珀二兩 麝香五錢 全蠍一兩 紫薢二兩 熟地二兩 香附一兩 犀牛角八錢 水安息四兩 胆南星一兩 虎膠骨二兩 首烏二兩 當歸一兩 松香五錢 明天麻二兩 赤芍一兩 葛根二兩半 桑寄生二兩 附子一兩 廣木香一兩 甘草二兩 青皮二兩 草薢二兩 羌活二兩 元參二兩 細辛一兩 片姜黃二兩 紅花八錢 防風二兩 地龍五錢 黃連二兩 靈仙二兩半 草薢一兩 麻黃二兩 龟板一兩 沉香一兩 天竹黃一兩 兩頭尖二兩 白芷一兩

【制法】煉蜜為丸,金箔為衣。

【劑量及用法】每服一錢,白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

【備考】有效期二年。

十五、濟南

【功能与主治】半身不遂,四肢麻木,口眼歪斜,腰腿不利,言語不清,筋骨疼痛等症。

【处方】蕲蛇 玄參 川芎 熟地 何首烏 桑寄生 防風 兩頭尖 黃耆 大黃 麻黃 天麻 羌活 肉桂 黃連 白芷 藿香 草

蘇 人參 草豆蔻各二十兩 檀香
紅麴 地龍 旱三七 麝香各五兩
龜板十一兩 細辛 母丁香 制香
附 紫豆蔻仁 虎骨 川附片 沉
香 茯苓 赤芍 穿山甲(醋制)
油松節 骨碎補 殭蠶 白朮 當
歸 烏藥 沒藥 硃砂各十兩 片
姜黃 牛黃 冰片各二兩五錢 葛
根 全蝎 威靈仙各十五兩 建神
麴 橘紅各四十兩 干朮八兩 血
蝎 犀角各七兩五錢 天竺黃 山
羊血 青皮 乳香各十兩 甘草二
十兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，納入磁罐中封至一年再製成丸，重二錢五分，金箔為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

十六、青島

【處方】人參 元參各一錢 炙
芪一兩 白朮五分 熟地 茯苓
赤芍 首烏 當歸各一錢 血竭四
分 炙龜板五分 乳香 沒藥 松
香各五分 寄生一錢二分 天麻
羌活 防風 甘葛 川芎 麻黃各
一錢 靈仙一錢二分 白芷 華蘼
各一錢 全蠍一錢二分 紅花 姜
黃(炒)五分 殭蠶(炒)五分 薏
仁一錢 香附(炙)二錢 藿香一
錢 木香二錢 烏藥五分 穿山甲
(炙)一錢 草薢(炒)一錢 骨碎補
(炒)五分 細辛五分 川附子五分
桂心 兩尖尖各一錢 大黃五分
黃連一錢 犀角四分 青皮(炙)五
分 虎骨五分 蕲蛇二錢 安息香
二錢 母丁香五分 天竺黃五分
炙草一錢 地龍(去土)二錢五分
沉香五分 琥珀一錢 硃砂五分
冰片二分 麝香二分 牛黃二分

【制法】共軋細末，煉蜜為丸，重三錢，赤金為衣，紙裹蜡皮封固。

十七、沈陽(1)

【功能與主治】鎮靜神經，疏通經絡，防止癱瘓，恢復血液循環。主中風各症，卒然仆倒不省人事，牙關緊閉，半身不遂，左癱右瘓，口眼喎斜，痰壅氣閉，筋骨拘攣，手足麻木，痰迷氣厥，抽搐疼痛。

【處方】花蛇肉一兩五錢 黃連二兩 申姜一兩 沒藥一兩 片硃

砂一兩 首烏二兩 胆星一兩 靈
仙二兩五錢 肉桂二兩 草薢二兩
熟地二兩 當歸一兩 紅人參二兩
(去渣計算) 兩尖尖二兩 川軍二
兩 烏藥一兩 片角七錢五分 竺
黃一兩 乳香一兩 茯苓一兩 龜
板一兩 元參二兩 梅片二錢五分
焦朮一兩 葛根二兩五錢 川芎二
兩 地龍五錢 羌活二兩 麝香五
錢 青皮一兩 白芷二兩 殭蠶一
兩 个牛黃二錢五分 黃耆一兩
赤芍一兩 防風二兩 薏仁一兩
甘草一兩 細辛一兩 貢沉一兩
香附一兩 全蠍(去勾)二兩五錢
藿香一兩 血竭七錢五分 麻黃二
兩 松節五錢 天麻二兩 虎脛骨
一兩 附子一兩 水安息一个 公
丁香一兩

【制法】共軋細面，煉蜜為丸，每丸二錢一分重，金衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】早晚各服一丸，重者加一丸，得效減一丸。

【禁忌】忌食豬肉、油膩之物；孕婦忌服。

【備考】凡遇中風，不省人事，切勿驚惶，用通關散或痧藥吹入鼻中，得嚏者輕，倘牙關緊閉者，用烏梅擦牙自開，然后再服此藥。

十八、沈陽(2) (回天再造丸)

【功能與主治】鎮靜神經，疏通經絡，防止癱瘓，恢復血液循環。主中風各症如中腑、中臟、中經絡、中血脉，卒然仆倒，不省人事，牙關緊閉，以致半身不遂，左癱右瘓，口眼喎斜，痰壅氣閉，四肢不收，筋骨拘攣，手足麻木，痰逆氣厥，抽搐疼痛等症。

【處方】祁蛇肉一盤 川連二兩 申姜一兩 沒藥一兩 硃砂一兩 首烏一兩 胆星一兩 靈仙二兩 貢桂一兩 草薢二兩 熟地二兩 當歸一兩 老山參二兩 兩尖尖二兩 川軍一兩 殭蠶一兩 東黃二錢五分 黃芪二兩 赤芍一兩 防風二兩 玄羊血一兩 白芍一兩 龜板一兩 元參二兩 梅片二錢 葛根二兩五錢 焦朮一兩 川芎二兩 白薏仁一兩 粉草一兩 細辛一兩 烏藥一兩 暹羅角七錢五分 竹黃一兩 乳香一兩 地龍五錢 台麝五錢 羌活一兩 青皮一兩

白芷二兩 盤沉一兩 香附一兩 全蠍二兩五錢 藿香一兩 血竭七錢五分 麻黃一兩 松節五錢 明天麻二兩 虎脛一對 水安息一个 公丁香一兩 黑附子一兩

【制法】共軋極細面，煉蜜為丸，二錢一分重，金衣蜡皮封固。

【劑量及用法】早晚各服一丸，白開水送下。

【禁忌】忌食油膩之物。

【備註】本品為溫性強壯劑。

十九、撫順(回天再造丸)

【功能與主治】疎風活絡，化痰鎮靜，鎮瘓。主中風氣血素弱，風邪外襲，筋骨弛張，左癱右瘓，半身不遂，四肢麻痺，不能運用，顏面神經麻痺，舌強難言等症。中寒身體衰弱，寒邪外侵，筋骨拘急，不能俯仰，屈伸疼痛，牙關緊閉。中氣暴怒氣逆，腦部貧血，卒然昏倒，不省人事。中痰體肥，痰盛致腦溢血，痰鳴漉漉，口角流涎。

【處方】白花蛇二兩 貢桂一兩 甘松二錢半 乳香五錢 本色沉香五錢 虎骨一兩 天麻一兩 黃連一兩 胆星五錢 天竺黃五錢 草薢一兩 犀角一兩 於朮五錢 硃砂五錢 川牛膝一兩 細辛五錢 川軍一兩 川附子五錢 烏藥五錢 首烏一兩 薏仁五錢 龜板一兩 羌活一兩 葛根一兩二錢 靈仙一兩二錢 麝香一錢 冰片錢半 防風一兩 甘草五錢 麻黃一兩 公丁香五錢 當歸五錢 青皮五錢 沒藥五錢 地龍二錢半 赤芍五錢 茯苓五錢 川芎一兩 白芷一兩 熟地一兩 血竭一錢七分 藿香一兩 香附五錢 紅參一兩 申姜五錢 全蠍一兩二錢 元參一兩 殭蠶五錢 牛黃四錢半 炙芪一兩

【制法】共為細面，蜜丸一錢或二錢重，蜡皮封。

【劑量及用法】病在左半身者，用四物湯煎湯送下。病在右半身者，用四君子湯煎湯送下。全身皆痛者用八珍湯送下，但遇手撒口開、尿尿不禁者，則為中風虛脫症，必須于八珍湯中重加入參兩許，加黃耆三、四兩，貢桂二錢煎湯送下。余症均用安湯黃酒調服，復被取汗為宜。病重者用人丸，輕者用小丸。

【禁忌】孕婦忌服。

二十、吉林、哈尔滨

(回天再造丸、

人参再造丸)

【功能与主治】峻补，温运气血，定風溫寒，理气豁痰，解热鎮惊(腦溢血)。主中風，类中風，中寒，中气，中痰。

【处方】白花蛇(即蕲蛇，約 兩重一条，去骨並头尾 寸，酒浸炙，取淨末。) 犀牛角五錢五分 滴乳香(去山 上錢 母丁香七錢 蘇沉香七錢 片硃砂 明沒药 会胆星 天竺黃 猴申姜 白殭蚕(洗炒) 熟附片 炙龟板 北細辛 土炒白朮 香附(去皮毛酒炒) 玄羊血各七錢 虎脛骨一对 川黃連(酒炒)一兩四錢 草豆蔻 錦紋軍 蜜黃芪 何首烏(料豆水拌，熬九次) 軟防風(酒炒) 白豆蔻仁 兩头尖 全当归(酒炒) 炙甘草 京赤芍(炒) 撫川芎(酒炒) 川羌活(酒炒) 云茯苓 芳白朮 京玄參 广藿香 明天麻(炒) 淨麻黃(炒) 老山參 貢油桂 川草薢 川姜黃(炒) 穿山甲(麻油浸炙) 西琥珀(研細)各一兩四錢 威灵仙(酒炒)一兩七錢五分 粉葛根 全蠍子(分去人尾足) 桑寄生各一兩七錢五分 地龙 二錢五分(去土) 东牛黃 梅花片各一兩七錢五分 台烏藥(酒炒)七錢 均青皮(酒炒)七錢 水安息 二兩八錢 广松香(水熬九次)三錢五分 台麝香 二錢五分 血竭花五錢六分 藏紅花(酒浸烘干)五錢六分 紫油朴 二錢五分 广木香二錢(哈尔滨 二錢八分) 熟地黃一兩四錢

【制法】將台麝香、梅花片、西琥珀、片硃砂等貴重藥品，各另研細。其余諸藥均合一处，碾为細粉。然后陸續將貴重藥品，研配一处。煉蜜調和数千捶为丸。每小丸二錢一分重，大丸三錢五分重，人赤金为衣，蜡皮封固。

【剂量及用法】病在右半身者，用四君子湯为引調服此丸。病在左半身者，用四物湯为引。全身皆病者，用八珍湯为引。但遇手撒、口开、流涎、尿尿不禁者，則为中風脫症，必須于八珍湯中重用參兩許，加黃芪三、四兩，貢油桂二錢，濃湯服此丸。其余諸症均用姜湯或黃西調

服，服后复被取汗为宜。病重用大丸，輕者用小丸。老人冬季常服，以資防止風症。男婦咸宜。

【禁忌】孕婦忌用。

二十一、呼和浩特

(回生再造丸)

【处方】人參 元參 土白朮 炙黃芪 九地 茯苓 首烏 当归 明大麻 防風 羌活 葛根 白芷 草薢 竹香附 姜黃 殭蚕 薏米 蠶香 山甲 草薢 桂心 大黃 黃連 琥珀 炙草各二兩 赤芍 龟板 乳香 沒药 川芎 麻黃 烏約 骨碎补 青皮 細辛 附子 母丁香 沉香 辰砂 胆星 竹黃 二七各一兩 香附 祁蛇 每料兌，硃砂二兩 人參一兩 冰片一兩二分五厘 安息香一兩 沉香二兩 犀角五錢 麝香五錢

【制法】共为細面，老蜜为丸，加料重一錢不滿金衣，八分半金衣，蜡皮封固。

牛黃清心丸

一、北京、承德

【功能与主治】鎮惊安神，化痰熄風。主神志昏乱，言語不清，怔忡恍惚，惊恐虛煩，痰涎壅盛，癰癩惊風。

【处方】当归二十二兩五錢 膠棗四十五兩(去核) 白芍三十七兩五錢 川芎十九兩五錢 白朮 人參(去蘆)各二十七兩五錢 甘草七十五兩 茯苓二十四兩 六神麝三十七兩五錢 山藥一百零五兩 桔梗十九兩五錢 肉桂二十七兩 黃芩 防風 麦冬各二十二兩五錢 杏仁十八兩七錢五分 柴胡十九兩五錢 白蘇十一兩二錢五分 大豆卷二十七兩二錢五分 阿膠二十五兩五錢 蒲黃三兩七錢五分(炒) 雄黃十二兩 干姜十一兩二錢五分 共为細粉，每一百二十八兩兌；牛黃一兩四錢 麝香六錢 冰片一兩五錢 犀角一兩二錢二分 羚羊角二兩六錢五分 硃砂六兩五錢

【制法】上藥和勻煉蜜为丸重一錢，今范为滿衣，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌食辛辣动火之物；孕

婦忌服。

二、天津

【功能与主治】清心化痰，鎮惊去風。主神志昏乱，言語不清，痰涎壅盛，口眼歪斜，癰癩惊風，痰迷心窍(俗称痰火、痰厥)。

【处方】生白芍 麦冬 黃芩 当归 防風各一兩五錢 炮姜七錢五分 生阿膠一兩七錢五分 白蘇七錢五分 生山藥七兩 人參(去蘆)二兩五錢 甘草 棗肉各五兩 白朮(數炒)一兩五錢 柴胡 桔梗 川芎 茯苓(去皮) 杏仁(去皮炒)各一兩二錢五分 神曲(數炒) 蒲黃(微炒)各二兩五錢 肉桂(去粗皮) 黃豆卷各一兩七錢五分 共为細粉，每二斤十四兩五錢兌；牛黃一兩二錢 羚羊粉 冰片各一兩 犀角粉二兩 雄黃面八錢 硃砂面一兩五錢 麝香一兩

【制法】研細和勻，煉蜜为丸，一錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、上海

(万氏牛黃清心丸)

【功能与主治】痰癰眩暈，語塞神昏。

【处方】牛黃五分 黃連一兩 黃芩五錢 黃郁金四錢 硃砂三錢 山梔仁(生)六錢

【制法】共研細粉，糊糊为丸，每丸潮重四分五厘，蜡壳固封。

【剂量及用法】每服一丸，溫開水化服。憑医师处方購用。

四、南京(1)

【功能与主治】开郁清热，鎮心安神。主神志昏迷，痰涎壅塞，牙关緊閉，手足抽搐。

【处方】鲜附片一兩 防風二錢 明雄黃五錢 制白附子二錢 天竺黃五錢 全蠍二錢 降香五錢 蟬衣一錢 伏神五錢 西牛黃一錢五分 怀山藥三錢 麝香一錢 殭蚕三錢 苏合香油五錢(另化)

【制法】上藥除細料外，生晒各研細末，各取淨粉，細料后加，乳細和勻，以苏合香油熬化，加煉白蜜为丸，每粒潮重一錢。蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，小兒減半。開水化服。

【禁忌】孕婦忌服。

五、南京(2) (万氏牛黃清心丸)

【功能與主治】主溫熱神昏，痰涎結，譫語抽搐，小兒驚風。

【處方】川黃連五錢 生梔子三錢 黃芩二錢五分 黃郁金一錢 飛硃砂一錢五分 西牛黃七分

【制法】上藥生晒，各研為末，各取淨粉，西黃硃砂后加，乳細和勻，加煉白蜜為丸，每粒按潮重一錢，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，開水和服。小兒酌減。

六、武漢 (万氏牛黃清心丸)

【功能與主治】熱盛神昏，手足抽搐，亦治驚風痰壅。

【處方】西牛黃一分半 黃連五錢 黃芩二錢半 生梔仁三錢 郁金一錢 硃砂一錢半

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，按淨粉量加煉蜜100—110%，和成為丸，每丸重五分，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，灯心湯送下，溫開水亦可。

七、廣州 (清心牛黃丸)

【功能與主治】溫熱病，痰涎壅盛，神昏不語。

【處方】牛黃二錢 胆星一兩 黃連一兩 當歸五錢 甘草五錢 辰砂五錢。

【制法】將上藥洗淨，切碎隔水蒸透，晒干研成細粉，和入辰砂，用米糊制成人丸，每個重五分，用蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，用開水送服。

八、福州(1)

【功能與主治】主治神氣不清，煩熱，癲狂，言語謔妄，一切伏邪蒙閉三焦及小兒風痰上壅，口噤，煩躁，傷寒，邪陷諸症。

【處方】牛黃 雄黃 犀角 郁金 辰砂 川連 黃芩 山梔各一兩 珍珠五錢 麝香 冰片各二錢

五分

【制法】共研細末，冬蜜為丸，每重一錢，金箔衣，蜡封固。

九、福州(2) (万氏牛黃清心丸)

【功能與主治】治溫邪內陷包絡，神昏謔語，不省人事，及痰迷心竅，發癲等症。

【處方】黃連(生)半兩 黃芩 梔子各三錢 郁金二錢 辰砂一錢 半 牛黃二分半

【制法】共為細末，水泛為丸，每粒重一錢。

十、杭州(1) (万氏牛黃清心丸)

【功能與主治】清熱安神，化痰鎮驚。治傷寒溫病熱入心包，神昏謔語，口干舌燥，中風痰熱秘結，言語蹇澀。小兒急痰盛，痧痘煩躁，四肢抽搐等症。

【處方】西牛黃五分 生山梔仁六錢 黃連一兩 廣郁金四錢 黃芩五錢 飛辰砂一錢

【制法】各取淨粉，用冰雪水調為餅，打糊為丸，每潮重五分，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，重症倍之，用灯心湯送下。

十一、杭州(2) (局方牛黃清心丸)

【功能與主治】治中風卒倒，不省人事，言語蹇澀，手足拘攣，健忘恍惚，痰涎壅盛以及心神不足，驚悸悲憂，虛煩少睡，神志昏亂。小兒驚風潮熱，抽搐等症。

【處方】犀牛角二兩 羚羊角 麝香 梅冰片各一兩 西牛黃一兩二錢 明腰黃(水飛)八錢 黃芩一兩五錢 龍黃(炒)二兩五錢 懷山藥七兩 炙甘草 當歸各一兩五錢 神曲(炒)二兩五錢 吉林人參二兩五錢 防風一兩五錢 肉桂七錢五分 白芍一兩五錢 柴胡一兩二錢五分 大豆卷(炒)一兩七錢五分 麥門冬一兩五錢 桔梗一兩二錢五分 阿膠(蛤粉炒)一兩七錢五分 冬朮一兩五錢 川芎一兩一錢五分 白蘇七錢五分 茯苓一兩二錢五分 杏仁(去皮尖炒)一兩二錢五分 干姜(炮)七錢五分 人參、蒸

去皮核)一百枚 金箔一千二百張

【制法】上藥除大棗、杏仁、金箔、牛黃、龍腦、麝香、腰黃另研細末外，其餘共研細末和勻，棗肉打爛和勻，煉白蜜為丸，每重一錢，金箔為衣，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，小兒酌減，用竹葉湯化服。

十二、南昌(1) (万氏牛黃清心丸)

【功能與主治】溫熱邪入心包，神昏，手足抽搐，眩暈，語言蹇澀，小兒風痰閉厥。

【處方】牛黃五分 川連一兩 黃芩五錢 生梔子六錢 郁金四錢 飛辰砂一錢

【制法】研極細末，煉蜜為丸，每丸一錢五分，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，灯心湯化服。

【備考】非經醫師處方不得使用。

十三、南昌(2) (局方牛黃清心丸)

【功能與主治】諸風癱瘓，語言蹇澀，眩暈煩郁，痰涎壅塞，喜怒無時，或發癲狂，神情昏亂，小兒角弓反張，時發時醒。

【處方】肉桂一兩七錢五分 杏仁(去皮，麩炒黃)一兩二錢五分 鹽皮膠(蛤粉炒)一兩七錢五分 大豆黃卷(炒)一兩七錢五分 炒神曲二兩五錢 炒蒲黃二兩五錢 當歸一兩五錢 川芎一兩二錢五分 云犀角屑一兩 牛黃(另研)一兩二錢 桔梗一兩二錢五分 炒粉草五兩 麥冬一兩五錢 防風一兩五錢 麝香(另研)一兩 羚羊角一兩 黃芩一兩五錢 白芍一兩五錢 白朮一兩五錢 吉林人參(去蘆)二兩五錢 茯苓一兩二錢五分 明雄黃(飛)八錢 冰片(另研)一兩 白蘇七錢五分 炮干姜七錢五分 金箔一千二百張(內以四百張為衣) 大棗一百個蒸熟(去皮核研成膏) 柴胡一兩二錢五分 干山藥七兩

【制法】除棗、杏仁、金箔、羚羊、云犀角、雄黃、冰、麝另研外，余共研末，再和勻煉蜜同棗膏合丸，每丸重一錢一分，金箔為衣，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，溫開

水送下。小兒驚癇依年齡大小酌定多少，竹葉湯化服。

【禁忌】孕婦忌服。

【備考】非經醫師處方不得使用。

十四、沙市(清心牛黃丸)

【功能与主治】治風火內郁，癰瘰眩暈，語蹇神昏，小兒驚風，痰涎壅盛，手足牽掣等症。

【处方】防風八錢 僵蚕一兩 薄荷叶一兩 明大蘇 胆南星各八錢 琥珀一錢 大竹黃一兩二錢 牛黃麝香各一錢

【制法】藥研極細末，煉蜜為丸，淨重二分，硃砂一兩為衣，蜡壳护勿泄氣。

【劑量及用法】成人量每次服一粒至二粒，病重者再服，小兒老人酌減，溫開水送下。

【禁忌】體虛無痰者，孕婦忌服。

十五、重慶(1)(萬氏牛黃清心丸)

【功能与主治】治傷寒邪入心包、中風、痰火秘結、癰瘰眩暈，語蹇神昏。小兒驚風，痰涎，手牽掣，疹疹煩躁。

【处方】同武漢。劑量為其十倍。

【制法】牛黃、硃砂另研，余藥另研細末，煉蜜為丸，每重一錢，蜡壳封固。

【劑量及用法】一丸。

十六、重慶(2)(局方牛黃清心丸)

【功能与主治】治諸風緩縱不隨，言語心怔，健忘恍惚，眩冒煩郁，痰涎壅塞及心神不足，驚恐悲憂，虛煩少睡，喜怒無常，發狂發癲，神昏昏亂。小兒躁悶，項背強直角弓反張等症。

【处方】牛黃一兩二錢 白芍 麥門冬 黃芪 歸 防風 白朮各一兩五錢 柴胡 桔梗 人參 茯苓 杏仁各一兩二錢五分 神曲 蒲黃 黨參各二兩五錢 羚羊角 麝香各一兩 肉桂一兩七錢五分 龍腦香一兩 大豆卷 阿膠各一兩七錢五分 白蘇 干姜各七錢五分 犀角二兩 雄黃八錢 山藥七兩

甘草五兩 金箔一千一百片 大棗一白枚。

【制法】除牛黃、麝香、龍腦香另乳，犀角、羚羊角另研，阿膠蒸化，金箔為衣外，余藥共研細末，加入上列各品，煉蜜為丸，每重一錢，金箔為衣，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，小孩減半。

十七、昆明

【功能与主治】神經失常，言語顛倒，握拳聲奇，大開發熱。

【处方】胆南星二兩 全蠍五錢 蟬蛻 北防風各一兩二錢 白附片一兩 僵蚕一兩二錢 牛黃一錢 天麻一兩五錢 麝香三分 硃砂一兩 九 三錢 琥珀一錢

【制法】研末煉蜜蜡壳為丸。

【劑量及用法】每服一丸，幼童減半。凡水服。

【禁忌】衰弱脫症忌服。

十八、西安

【功能与主治】熱性流行病末期高熱稽留不降，心臟衰弱(邪熱內陷包絡)，現腦症如神智昏迷，嗜眠謔語，氣厥或發癲，呼吸困難等病症。

【处方】牛黃五分 山梔肉六錢 黃芩 黃連各五錢 郁金四錢 辰砂一錢(或加麝香一錢)

【制法】共為細末，煉蜜為丸，每丸重一錢，金箔為衣。

【劑量及用法】成人每次服一丸至二、三丸，一日二、三次，同清心醒腦劑合服或開水送下。小兒按年歲減少。

【備考】本丸約在病輕者最宜，倘病勢稍重應用牛黃安宮丸。

十九、蘭州

【功能与主治】鎮驚，化痰，清心，除胃中之煩熱。主頭痛，暈眩，胸膈作嘔，痰液過多，又暈不清，眼暈耳鳴等症。

【处方】當歸一兩二錢 川芎一兩 杭芍 白朮各二兩 蒼朮一兩二錢 山藥五兩五錢 神曲二兩 桔梗一兩 黃芩一兩二錢 干姜六錢 元桂一兩四錢 麥冬 防風各一兩二錢 柴胡一兩二錢 杏仁一兩 黃豆卷一兩四錢 白蘇六錢

大棗肉二兩五錢 貢膠一兩三錢 生蒲黃二兩 麗參二兩 硃砂一兩三錢 雄黃六錢 羚羊角一兩 犀牛角 牛黃各八錢 麝香七錢 梅片八錢 粉甘草二兩五錢。

【制法】煉蜜為丸，每丸一錢重，蜡皮封固。

【劑量及用法】每次服一丸，每日二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二十、大同

【功能与主治】中風不語，神志不清，口眼歪斜，牙關緊閉。

【处方】山藥十四兩 炙甘草十兩 白朮五兩 神曲五兩 阿膠三兩四錢 豆卷三兩五錢 肉桂二兩六錢 當歸二兩 茯苓二兩二錢 麥冬二兩 黃芩二兩 白蘇二兩五錢 蒲黃六錢 大棗六兩 羚羊角一錢 犀角二兩 硃砂三兩 雄黃一兩六錢 麝香一錢 冰片二兩 牛黃一兩 高麗參五兩 干姜一兩五錢 赤金二百四十張

【制法】共軋細面，煉蜜為丸。每丸一錢重，金箔衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】急病者日服一錢，普通隔日服一粒。小兒週步每丸分三次，十二歲以上者服一粒，可治驚風症。

【禁忌】孕婦忌服。

二十一、禹縣

【功能与主治】男女諸風，緩縱不隨，言語錯亂，癲狂癰病，或歌或哭，驚悸恐怖，心神恍惚，小兒急驚。

【处方】潞黨參二錢五分 牛黃一錢二分 犀牛角二錢 羚羊角一錢 赤金八十張 明雄黃八分 麝香 冰片各一錢 阿膠、蛤粉炒一錢五分 肉桂一錢八分 山藥七錢 當歸一錢八分 生白芍一錢五分 生川芎一錢二分 白茯苓 生白朮 麥冬 杏仁各一錢五分 白蘇八分 大豆黃卷一錢八分 蒲黃二錢五分 干姜八分 黃芩 防風 桔梗各一錢五分 柴胡一錢三分 神曲二錢五分 甘草五錢 大棗十個去核

【制法】共為細面，煉蜜為丸，赤金四十張為衣，每丸重一錢。

【劑量及用法】每服一粒，俱用

竹叶湯送下。一、二岁者每丸分三次服，五、六岁服半丸。

【禁忌】孕妇、体弱者忌用。

【备考】有效期二年。

二十二、济南(1)

【功能与主治】諸風緩縱不随，言塞心怔，健忘恍惚，眩冒煩郁，痰涎壅塞及心神不定，惊思悲憂，虛煩少睡，喜怒無时或發狂癲，神情昏乱，小兒躁悶，項背强直，腰背反張，時發時醒等症。

【处方】牛黃(研)一兩二錢 麝香(研) 羚羊角粉 龍腦(研)各一兩 當歸(去蘆頭) 防風(去苗叉枝) 黃芩 白朮 麥門冬 白芍藥各一兩五錢 柴胡(去苗) 白茯苓(去皮) 桔梗各一兩二錢五分 杏仁二兩二錢五分(去皮尖炒另研) 川芎一兩二錢五分 肉桂(去粗皮) 阿膠(碎炒)各一兩七錢五分 蒲黃一兩五錢(炒) 大黃豆卷一兩七錢五分(碎炒) 神麴(研炒) 人參(去蘆)各二兩五錢 雄黃八錢(飛) 甘草五兩(剉炒) 白蘇 干姜各七錢五分 犀角粉二兩 金箔一千二百張(內四百張為衣) 大棗一百枚(去核焙干) 干山藥七兩

【制法】上藥共為細粉，和勻煉蜜為丸，每重一錢，金箔為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】成人每服一丸，五岁或六岁服半丸，嬰兒四分之一丸，白開水送下。中風痰涎壅盛，姜湯化下。驚風五癇，薄荷叶煎湯化下。

【禁忌】忌食辛辣、油膩等物。

二十三、济南(2)

【功能与主治】溫熱神昏，手足抽搐。

【处方】牛黃五分 郁金四錢 生梔子仁六錢 黃芩五錢 黃連一兩 硃砂二錢

【制法】共為細粉，糊為丸，每丸潮重四分五厘，蜡皮封固，蜜為丸亦可，每丸重五分。

【劑量及用法】每服一丸，溫開水化服。

【禁忌】忌食葷腥、油膩、辛辣等；孕婦忌服。

二十四、青島

【处方】京牛黃 冰片 麝香各

二錢 硃砂一兩 羚羊二錢 杏仁 白朮各一兩 當歸一兩五錢 雄黃一兩 茯苓一兩五錢 人參一兩 甘草 白芍 黃芩 川芎各一兩五錢 犀角三錢 黃柏一兩五錢 防風 柴胡 桔梗 花粉各一兩 白蘇八錢 山藥一兩 半夏二兩五錢 橘紅 神麴各一兩 麥冬一兩五錢 木通一兩 紅棗(去皮核)四兩

【制法】共為細面，煉蜜為丸，重一錢，赤金為衣，蜡皮封固。

二十五、沈陽(1)

【功能与主治】鎮靜強心，清腦開痰，防止癱瘓。主痰火內發，猝然昏倒，口眼喎斜，痰涎壅閉，便秘潮赤，癱瘓強直，似老抽搐，風邪中臟。

【处方】牛黃一兩 錢 麥冬 黃芩 防風各一兩五錢 羚羊 麝香 龍腦各一兩 犀角二兩 雄黃二錢 人參一兩五錢 甘草五錢 金箔一千二百張 大棗百枚

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸一錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

二十六、沈陽(2)

【功能与主治】疎風透表，通經活絡，清心滌痰，開竅鎮靜。主風從外中，肢體不用，顏麻不仁，四肢抽搐，頭暈頭風，偏正頭痛，口眼喎斜，半身偏廢，痰火迷竅，舌塞語塞，痰涎壅閉，驚思憂郁，精神昏乱，一切風火郁閉等症。

【处方】牛黃五錢 犀角一兩八錢 大麻 防風各二兩四錢 薄荷一兩二錢 大棗二十個 細辛一兩二錢 白芷二兩 粉草一兩二錢 硃砂五錢 川芎一兩八錢 台麝一錢 梅片五分(五分全一錢)

【制法】共研極細面蜜丸(大丸一錢四分，小丸七分)，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二十七、沈陽(3)

(高麗清心丸)

【功能与主治】清心火，瀉腸胃實熱。主熱性頭風頭痛，胃腸實熱，牙痛目赤，大便秘結，小便赤痛 熱

風 痰 類

淋尿血，熱痢便血，齒齦出血，鼻中衄血，傷寒熱病，神昏譫語。

【处方】黃連一兩 梔子 生石膏各二兩 黃芩 防風各一兩 細辛五分 菊花 白芷 粉甘草 野軍 薄荷各一兩 川黃一錢 硃砂二錢

【制法】除牛黃硃砂另研外，余則共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，小兒減半。

【禁忌】體弱虛寒泄瀉者忌服。

二十八、沈陽(4)

(萬氏牛黃清心丸)

【功能与主治】清火開竅，鎮靜防抽。主傷寒熱病，火熱內陷，神昏癱厥，手足痲痺，壯熱體實，心煩躁扰，哭笑無常，精神錯乱。

【处方】同武漢。

【制法】共碾極細面，為丸三分五厘重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】忌食五辛；孕婦忌服。

二十九、撫順

【功能与主治】能解熱毒，清痰火，清熱生津。主感冒、傷寒所發生之高熱惡寒，神昏譫語，煩躁不眠；斑疹傷寒在皮膚潛伏或遍體皆赤，氣促喘急，嘔吐煩躁，神經病，癲癇，哭笑無常，痴呆不明，狂乱奔走，抽搐癱瘓，喉頭炎，咽喉腫痛，嚥下困難；暴發火眼，目赤腫痛，結膜炎，角膜炎；小兒麻疹收沒太速合併肺炎，喘促神昏，呼吸困難；小兒急癇，卒然抽搐，發熱項強，角弓反張，以及一切火症均能治之。

【处方】牛黃錢半 冰片一錢 犀角一兩 川芎七錢 白芷 防風各一兩三錢 黃連一兩 天麻一兩三錢 細辛三錢 硃砂四錢 薄荷一兩 麝香五分 甘草六錢 梔子仁一兩 雄黃二錢五分 黃芩五錢 真熊胆一錢 白人參三錢

【制法】共為細面，煉蜜為丸，七分或一錢四分重。

【劑量及用法】大人每服一大丸，十岁至十五岁服一小丸，五岁至十岁服半丸，白開水溶化沖服。

【禁忌】孕婦、形寒肢冷者忌服。

三十、哈尔滨、吉林 (清心丸)

【功能与主治】解潜伏毒热，滌滌痰火，清热生津。举凡温病，伤寒，瘟疫等症，热极侵犯内腑，發生哮喘，神昏，壯热，譫語，煩渴，躁狂，嘔吐，不眠，均宜。瘟疫斑疹，皮里隱伏，或紅或紫，形如云片錦紋，或遍体皆赤，嘔逆煩悶，狂妄叫罵，譫語神昏，气促喘急，大热不眠。痧痧，麻疹，收沒太速，毒热內陷，反攻心肺，喉爛喘嗽，舌起芒刺，唇焦綻裂，煩渴喜冷，神昏譫語。小兒急惊，卒然抽搐，昏厥癱瘓，角弓反張，口角流涎，牙关緊閉，痰鳴气急。乳蛾，喉痹，咽喉腫滿，勢將閉塞，滴水難嚥，疼痛悶乱。癲狂，風癰，中風痰火，等症，哭笑無定，癡呆昏昧，狂乱奔跑，惊恐畏怯，忽然抽搐，痰壅气阻，澀澀有声，不省人事，卒然倒地，口噤痰厥。普通火盛，头晕，口糜，衄腐，衄血，吐血，凡屬火症，無不咸宜。主温病，伤寒(阳明里实期或邪入心包期)瘟疫，瘟疫發疹，發斑(即斑疹伤寒)痧痧(即猩紅热)麻疹，急惊，乳蛾，喉痹，癲狂風癰，中風痰火秘結，一切热性火症。

【处方】东牛黄八錢四分 子条芩一兩零五分 羚羊角七錢 台麝香(另研) 梅花片(另研)各一錢 犀牛角一兩四錢 明雄黃(水飞另研)五錢六分 炒蒲黃一兩七錢五分

【制法】除將牛黄、雄黃、麝香、梅花片另研外，余均碾为細粉，陸續研配，一起調勻，煉蜜为丸，大丸七分重，小丸一分五厘重，大赤金为衣，蜡皮封固。

【剂量及用法】成人每服一大丸，小兒每服一小丸，食后溫水化服。小兒惊癇，以竹叶湯溫化服之；普通內热而兼感冒者，与苏合香丸合服各一丸，姜湯服下，汗出即愈，效力甚速；癲狂竹瀝湯調服。

【禁忌】孕婦、內無痰热者、形寒肢冷泄瀉者忌服。

附参考古方

【来源】1. 太平惠民和剂局方。

【功能与主治】治諸風，痰癱不隨，語言蹇澀，心忪健忘，恍惚去來，头目眩冒，胸中煩郁，痰涎壅塞，精

神昏憤。又治心气不足，神志不定，惊恐怕怖，悲憂慘感。虛煩少睡，喜怒無时，或發狂癲，神情昏乱。

【处方】牛黄(研)一兩二錢 麝香(研) 羚羊角(末) 龙腦(研)各一兩 当归(去蘆头) 防風(去苗叉枝) 黃芩 白朮 麦門冬(去心) 白芍药各一兩半 柴胡(去苗) 白茯苓(去皮) 桔梗 杏仁(去皮尖並双仁者麸炒黃，另研) 芎藭各一兩二錢半 肉桂(去粗皮，不見火) 阿膠(碎炒) 大豆卷(碎炒)各一兩七錢半 蒲黃(炒) 神麝(研炒) 人參(去蘆)各二兩半 雄黃(飞研)八錢 甘草(剉炒)五兩 白欬干姜各七錢半 犀角末二兩 金箔一千二百片(內四百片为衣) 大棗(蒸熟去皮核研乱成膏)一百枚 干山药七兩。

【制法】上除棗、杏仁、金箔三味及牛黄、麝香、雄黃、龙腦四味外，为細末，入余药和勻，煉蜜与棗膏为丸，每兩作十丸，用金箔为衣。

【剂量及用法】每服一丸，溫水化下，食后服。小兒惊癇，即酌度多少，以竹叶湯溫化。

2. 寶太师外科全書。

【处方】牛胆南星一兩 麝香五分 珍珠五分 冰片五分 黃連末二錢 防風末一錢 荆芥末一錢 五倍子一錢 桔梗末一錢 玄參一錢 茯苓一錢 当归一錢 雄黃二錢 輕粉三分 天竺黃一錢 犀角末一錢。

【制法】上为細末，和勻，甘草膏为丸，如龙眼大，辰砂为衣，日中晒干入磁瓶中，塞紧瓶口，勿令出气。

【剂量及用法】临服用薄荷湯磨服一丸。

3. 幼科評治准繩集之二

【功能与主治】治四証八候，去風痰，散惊热。

【处方】南星 半夏 白附 川烏各一兩(並洗) 川郁金半兩。

【制法】上五味为粗末，用腊月黄牛胆二枚，取汁和药入胆中，扎忌当風处一月，干取出，入添馬牙硝、朱砂、雄黃、硃砂各一錢，腦麝少許，如胆药一兩，硝砂四味各一錢，稀面糊丸麻子大。

【剂量及用法】金銀薄荷湯下，一岁十丸，二岁倍之。

4. 医宗金鑑

【功能与主治】鎮喉毒。

【处方】九轉胆星一兩 雄黃 黃連末各二錢 茯神 元參 天竺黃 五倍子(末) 荆芥 防風 桔梗 犀角末 当归各一錢 冰片 麝香 珍珠(豆腐煮)各五分 京牛黃輕粉各三分

【制法】各研極細，共和一处再研勻，甘草熬膏和丸如龙眼大，硃砂为衣，日中晒干收入磁瓶內，將瓶口堵严，勿令出气。

【剂量及用法】临服时一丸，薄荷湯磨服。

小硃砂丸

沈 陽

【功能与主治】鎮惊化痰。主痰涎壅塞，身热目赤，急惊風症，咳嗽失眠，心跳怔忡，痰厥昏睡。

【处方】硃砂一兩 胆南星 人參 茯苓 珍珠 清夏各五錢 同生薑五錢水煎一二百沸，焙干，加入：龙腦 麝香各二分

【制法】共研細面(珍珠、龙腦、麝香均另研)，面糊为小丸。

【剂量及用法】每服四至五丸。

【禁忌】忌食辣物。

附参考古方

【来源】沈氏尊生書。

【功能与主治】治小兒多涎，乳食不下。涎不流出者，乃名牌热多涎。

【处方】硃砂一兩 胆星 人參 茯苓 眞珠 半夏各半兩 冰片 麝香各少許

【制法】蒸餅丸，黍米大。

【剂量及用法】每四五丸，金銀湯下。

清神定志丸(定志丸)

哈 尔 濱

【功能与主治】心臟火盛，心跳怔忡，头晕煩躁，多慮不眠，神識不清，惡夢恍惚，睡臥不宁，譫語妄言，血热妄行，吐血衄血，舌爛口糜，二便秘澀。中風，心火熾盛，痰迷心竅，口眼喎斜，偏枯不用。

【处方】羚羊一兩 犀角二兩 柴胡一兩二錢半 雄黃八錢 阿膠一兩二錢半 山药一兩 寸冬一兩半 白朮七錢半 白芍二兩半 炮姜

七錢半 黃卷七錢半 邊桂一兩七錢 神曲 人參各二兩半 防風 白朮 云苓各一兩半 枯苓二兩 麝香一錢 牛黃二錢 大棗一兩 梅片一錢 桔梗 杏仁 川芎各一兩二錢半 生蒲黃二兩半 當歸一兩半 白珀三錢 炙草五錢

【制法】牛黃、麝香、梅片均各另研，將大棗蒸去皮搗泥，余藥均碾為細面，一處杵勻，煉蜜為一錢四分重丸，硃砂為衣，蜡皮封。

【劑量及用法】每服一丸，早午晚各服一次。

【禁忌】忌食辛辣興奮之物。

抱胆丸

沈陽

【功能與主治】鎮靜化痰，防止抽搐。主精神錯亂，目不識人，痰壅氣促，時發驚悸，項背反張，癲狂驚癇，言語失常。

【處方】郁金一兩 天竺黃一兩 雄黃五錢 白朮三錢

【制法】共碾極細面，用豬心血泛成小丸，每丸七分，硃砂為衣。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】忌食油膩、五辛、酒類。

附參考古方

【來源】春脚集。

【功能與主治】治諸般癲狂癇癇，痰迷心竅等症。

【處方】川郁金一兩 天竺黃一兩 雄黃五錢 白朮三錢

【制法】上為細末，用不落水豬心血搗勻為丸，如柱圓肉人，藥用硃砂為衣。

【劑量及用法】每日以石菖蒲五分，煎湯調送一丸。

驚悸丸

沈陽

【功能與主治】鎮驚定癇，驅風化痰。主驚悸不安，怔忡失眠，憂思氣結，風熱內壅，牙關緊閉，昏愢癱瘓，精神失常；一切肝腦疾患，屬于風痰者並皆治之。

【處方】白附子五錢 廣木香五錢 白殭蚕五錢 白花蛇（酒浸去皮骨）五錢 蘇橘紅五錢 明天麻五

錢 麻黃五錢 全蝎一兩 紫蘇子一兩 天南星（用薑汁浸之）五錢 硃砂五分 冰片二分 麝香二分

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，一錢五分重，用紙包裹，外以蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。小兒滿二歲者，每次服半丸。

【禁忌】忌食腥辣之物；孕婦忌服。

白金丸

一、天津

【功能與主治】鎮驚豁痰安神。主小兒痰壅內閉，驚癇發瘋，狂躁不安，神志不清。

【處方】白朮三兩 黃郁金七兩

【制法】共為細粉 每一兩細粉用白麵三錢打糊為小小丸，五分重裝袋。

【劑量及用法】每服一分，週歲以內酌減，白開水送下。

二、南京

【功能與主治】主癲癇痰疾。

【處方】同天津。

【制法】上藥共研細末，以沸水后溫泛丸，每錢約做二百粒。

【劑量及用法】每服一至二錢，開水吞服。

三、福州

【功能與主治】治癲狂失心，痰血迷心。

【處方】同天津

【制法】共研細末，薄荷糊丸。

四、杭州（癲癇白金丸）

【功能與主治】治痰迷清竅，癲癇癱瘓，猝然昏倒口吐涎沫之症。

【處方】同天津。

【制法】共研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服一錢五分至二錢，用石菖蒲煎湯或開水送下。

五、沈陽（白玉化痰丸、硃郁丸）

【功能與主治】開郁化痰，鎮靜安神。主痰迷清竅，猝然發狂，打人罵人，棄衣登高，不識親疎，呌号奔走，狂言亂語，癲狂等症。

【處方】同天津。

風 痰 類

【制法】共碾極細面，面糊為小丸。

【劑量及用法】每服一錢五分，空心時用白開水送下。

【禁忌】忌食發物、油膩等。

六、吉林

【功能與主治】安神定魄，消痰去風。主癲癇失眠，瘋癲痰逆，風邪內熱，痰火上沖等症。

【處方】廣郁金 白朮各二錢七分 菖蒲 胆星各三錢四分 全蝎 桑仁 殭蚕各一錢七分 竺黃一錢 硃砂七分

【制法】共研細面，用絹羅篩之，后用醋面糊制如稗米大小丸劑。

【劑量及用法】患者每服七分，早晚服之，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌用。

癲症鎮心丸

杭州

【功能與主治】治內熱熾盛，痰迷清竅，癲癇狂疾，僕地流涎，叫喊畜聲，獨言妄笑，恐怖多忪諸症。

【處方】西牛黃七分 陳胆星五錢 犀角五錢 川黃連三錢 飛硃砂三錢 粉甘草一錢 麥冬七錢 茯神七錢 遠志肉二錢 珍珠粉二錢 炒桑仁一兩 九節石菖蒲二錢

【制法】上藥各取淨粉，煉蜜和胆星粉為丸，每潮重四分，硃砂為衣，白蜡封固。

【劑量及用法】每服一丸，淡姜湯或開水送下。

龍虎丸

一、上海

【功能與主治】主神志失常，癲癇發狂。

【處方】牛黃 巴豆霜 白朮各二分 硃砂一分

【制法】除硃砂外，余藥共研細粉，糯米糊為丸，硃砂為衣，每粒潮重五厘。

【劑量及用法】每服一丸。

【備考】憑五疔處方購用。

二、南京（癲狂丸）

【功能與主治】主文武癲狂，神志失常。

【处方】西牛黄 煅白砒(煅至淨烟) 巴豆霜 飞硃砂各三分

【制法】共研細末,以米飯搗融做丸,每料分作二十丸,硃砂为衣。

【备考】憑医师处方服用。

三、武 汉

【功能与主治】譫瘋狂癲,神識昏迷,气郁痰盛,精神失常等症。

【处方】同上海。

【制法】取上药进行干燥,混合碾細,照淨粉量加淀粉30%,用适量水和成为丸,每丸重为六厘,蜡壳封固。

【剂量及用法】輕症用半丸至一丸,开水吞服。

【禁忌】孕妇忌服。

【备考】得涌吐痰涎即停用药。

四、杭州(癲狂龙虎丸)

【功能与主治】驅痰涎,安心神。治痰迷清窍,神識昏乱,陰癲阳癲,武狂文痴,言語無倫,叫罵不休,痰涎壅盛,口噤肢搐等症。

【处方】同上海。白信用豆腐煮过。

【制法】共研細末,用米粉打糊为丸,辰砂酌量为衣。每粒一厘,六粒为一丸,白蜡封固。

【剂量及用法】輕症每用一丸,重則二、三丸。以半溫开水送下。若不肯服者,納于粉糕中,使其不覺而食之。服后半时許,非吐即瀉,逾时再服一丸,以俟之。如年远者,須多服数丸方見效驗。

【禁忌】孕妇忌服。

医癲無双丸

一、北京(医癲丸)

【功能与主治】散風化痰,安神定搐。主癲癇抽搐,时發时愈。

【处方】白附子五錢(制) 半夏二兩 猪牙皂二兩 天南星一兩(制) 白矾一兩 烏蛇一兩 全蝎二錢 蜈蚣半条 殭蚕一兩五錢 硃砂二錢五分(上衣用) 雄黄一錢五分 共为細粉,每丸兩三錢五分細粉兌 麝香六分

【制法】上药和匀,水泛小丸,用方內硃砂二錢五分加滑石二兩五錢为衣闔丸。

【剂量及用法】每服二錢,日服

二次,溫开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

二、天 津

【功能与主治】散風化痰,鎮癲安神。主忽然跌倒,悶乱無知,口吐涎沫,眼目上視,小兒惊癇,大人癲癇羊癲,一月一發或一月数發均治。

【处方】全蝎一斤 烏蛇(酒制)五斤 法半夏五斤 制南星五斤 炒殭蚕五斤 蜈蚣四十条 白矾七斤八兩 制白附子二斤八兩 牙皂角二十五斤(打碎,另用白矾二十五兩化水浸透微炒)以上九味共为細粉,每細粉五十六斤一兩兌,硃砂面一斤 雄黄面十二兩

【制法】以上研細和匀,用鮮姜一斤熬湯泛小丸,一錢重裝袋。

【剂量及用法】成年人每次服一袋,小兒週岁以上,每袋分六次服,五、六、七岁分二次服,白开水送下。

【禁忌】孕妇及病久气虛者忌服。

三、大 同

【功能与主治】癲癇風症,痰迷心竅。

【处方】皂角(白矾十四兩制)三斤半 半夏一斤四兩 南星一斤四兩 殭蚕四兩 烏梢蛇二兩 白附子半斤 全蝎二兩 硃砂二兩 雄黄一兩五錢

【制法】共軋細面,姜汁水为小丸,綠豆大。

【剂量及用法】日服一次,每次服五十粒,竹瀝湯为引。

【禁忌】孕妇忌服。

四、禹 县

【功能与主治】五种癇症。

【处方】白附子五錢 烏蛇一兩 硃砂二錢五分 半夏二兩 全蝎二錢 雄黄一錢五分 牙皂二兩 蜈蚣一条 天南星一兩 殭蚕一兩五錢 生白矾一兩 麝香一分

【制法】共研細末,生姜汁面糊和丸,如梧桐子大。

【剂量及用法】每服三十丸,食后溫牛黄水送下。

【禁忌】孕妇忌用。

【备考】有效期二年。

五、济 南

【功能与主治】羊癲風。

【处方】全蝎二兩 清半夏五兩 殭蚕五兩 蜈蚣十条 白附子五兩 雄黄五兩 南星五兩 皂角五兩 硃砂五兩 白矾五兩

【制法】共研細末,水打为丸。

【剂量及用法】成人每服一錢,小兒酌減,白开水送下。

【禁忌】忌食辛辣、油膩等物;孕妇忌服。

六、呼和浩特

【处方】荆芥穗 生白矾各一斤

【制法】共为細面,水泛小丸,雄黄为衣。

五癲再生丸

一、济 南

【功能与主治】風癲。

【处方】大黄一斤二兩 海沉香二兩 黄芩八兩 胆星二兩 礞石二兩 白矾四兩 百药煎一兩五錢

【制法】头一次用黄酒半斤,將大黄拌浸晒干,二次童便四兩,三次韭汁四兩,四次姜汁四兩,五次米泔,六次側柏叶,七次藕汁,八次人乳,晒干共为細末,水打小丸,雄黄为衣。

【剂量及用法】每服二錢。

【禁忌】忌食魚。

二、呼和浩特

【处方】白附子一斤 法夏四斤 南星二斤六兩 皂角四兩 蜈蚣十六条 天虫一斤二兩 烏蛇二斤半

【制法】共为細面,水泛小丸,硃砂为衣。

羊癲瘋丸

天 津

【功能与主治】清熱化痰,鎮惊安神。主痰涎壅盛,牙关紧閉,昏迷不醒,眼目上視,角弓反張,羊癲瘋症。

【处方】黄郁金一斤 白矾十二兩 黄連一兩 煅磁石二兩 人黄一兩 橘紅一兩 生梔子二兩 神麝(麝炒)二兩 黄柏二兩 黄芩二兩 煅金礞石六兩 沉香一兩 炒

白芥子四兩

【制法】共為細粉，涼開水泛小丸，三錢重裝袋。

【劑量及用法】成年人每次服一袋，小兒一至四週歲每袋分六次服，五至七週歲分三次服，白開水送下。

【禁忌】孕婦及久病氣虛者忌服。

解毒蕪蛇丸

福州

【功能與主治】此丸瀉火、解毒、祛風、涼血、滑腸利便。

【處方】蕪蛇四兩 蟬蛻一兩 全蝎五錢 川連一兩二錢 大楓二兩 苦參一兩 大黃二兩 木通一兩五錢 防風一兩六錢 荊芥一兩 羌活一兩五錢 獨活一兩 稀莖草一兩五錢 胡麻二兩 蒼朮二兩 銀花二兩 首烏二兩 土茯苓三兩 山梔二兩 薄荷二兩 枯芩一兩 甘草一兩 元參二兩 黃柏二兩 連翹一兩五錢 川朴一兩五錢 朴硝一兩 苦梗二兩 苡米四兩

【制法】共研細末，水泛為丸。

螃蟻丸

撫順

【處方】絲餅四兩 丹皮二兩 申姜四兩 枸杞二兩 沒藥二兩 桂枝八錢 靈仙四兩 白朮二兩 熟地二兩 元連二兩 木瓜四兩 蒺藜四兩 羌活四兩 虎骨二兩 乳香二兩 牛膝四兩 寸朮四兩 螃蟻二十個 蕎麥一斤。

【制法】共為細面，蜜丸三錢重。

猴棗散

一、上海

【功能與主治】止咳化痰，順氣平喘。

【處方】猴棗三分 天竺黃一錢五分 川貝母 沉香 仙半夏各二錢 硃砂(飛)二分

【制法】各取淨粉，和勻研極細粉，瓶裝封固。

【劑量及用法】每服一分，溫開水調服。

二、南京

【功能與主治】主氣急痰壅、兼治癲狂。

【處方】猴棗四錢 羚羊尖一錢(磨粉) 天竺黃三錢 川貝母二錢 煅青礞石(乳細水飛) 伽楠香 飛月石各一錢 麝香四分

【制法】將羚羊角用鯊魚皮磨成細粉，余藥亦各研細末，共勻和勻乳細為度，密藏。

【劑量及用法】每服一至二分，一日一次，開水和服。

三、杭州(精制猴棗散)

【功能與主治】治小兒風痰壅盛，致成急驚，壯熱昏狂，咳嗽氣喘，驚悸煩躁，喉際痰鳴，舌強口噤，四肢抽搐，以及成人中風，痰厥氣喘，昏仆倒地，語言蹇澀等症。此散豁痰定喘，通竅醒神，乃急症之要藥也。

【處方】猴棗二錢 伽楠香五分 川貝母一錢 麝香二分 天竺黃二錢五分 青礞石(煅) 飛月石 羚羊尖各五分

【制法】共研細末為度。

【劑量及用法】每服一分，重則加倍，小兒酌減。

神效散

福州

【功能與主治】專治風火痰郁，樞機不轉，服之開竅。

【處方】海蛤 海石各二兩 秋蟬衣五錢 鱖魚胆(大)二十粒

【制法】共研為散。

稀涎

南昌

【功能與主治】痰厥，喉中聲如曳鋸或中溼腫滿。

【處方】大半夏十四枚 炙甘草一錢 豬牙皂角一挺 白矾二錢

【制法】研末。

【劑量及用法】每服一錢，用生薑汁少許沖服，溫開水灌之，吐痰涎即止。

【備考】非經醫師處方不得使用。

風痰類

追風散

撫順

【處方】細辛 防風 川烏 草烏 薄荷 川芎 白芷 蒼朮各五錢 雄黃二錢。

【制法】共為細面。

金料散

撫順

【處方】當歸 川斷 沉香 血竭各二錢 龍骨八分 硃砂一錢 故紙 牛膝 三七 乳香各二錢 中藥 年健各五錢 虎骨四錢 紅花 木香各一錢 沒藥二錢 白芷六分 土虫二錢 台麝一分 飛羅面五錢 甜瓜子一兩 降香一錢。

【制法】共為細面。

【劑量及用法】分四服，元酒送下。

【備考】上川芎，手桂枝，下部牛膝，大便燥川軍，小便出血三七，不通不通。此方加然銅毛狗二錢、加皮五錢更妙。

木耳散

吉林

【功能與主治】舒筋活血，通絡散風止痛。主手足抽搐，腰腿疼痛，濕痺，血不流通等症。

【處方】木耳 當歸各二兩七錢 川芎 牛膝 杜仲各二錢 木瓜三錢四分 乳香 沒藥各一錢

【制法】共研細末，用絹羅篩之。

【劑量及用法】成人每服二錢，七歲至十二歲每服一錢。

侯氏黑散

沈陽

【功能與主治】驅風除熱，通經活絡。主左癱右換，半身不遂，中風不語，手足拘攣，口眼歪斜，麻木不仁。

【處方】菊花四錢 白朮一錢 桔梗八分 黃芩五分 防風一錢 細辛 干姜 人參 茯苓 當歸 川芎 牡蠣 桂枝各三分

【制法】共研極細面。

【劑量及用法】每服一錢，日一至三次，溫酒調服。

【禁忌】忌食一切魚肉、大蒜、醋；孕婦忌服。

附參考古方

【來源】金匱要略方論。

【功能與主治】治大風，四肢煩重，心中惡寒不足者。

【處方】菊花四十分 白朮十分 細辛三分 茯苓三分 牡蠣一分 桔梗八分 防風十分 人參二分 礞石三分 黃芩五分 當歸三分 干姜三分 芍藥三分 桂枝三分。

【制法】上十四味，杵為散。

【劑量及用法】酒服方寸匕，日一服；初服二十日，溫酒調服。

【禁忌】禁一切魚肉、大蒜。

【備考】常宜冷食，自能助藥力，在腹中不下也，熱食即下矣。

牽正散

一、南京

【功能與主治】主中風，口眼歪斜，無他症狀者。

【處方】炙白附子 白僵蚕 全蠍尾各一兩

【制法】共研為極細末。

【劑量及用法】每服二錢，一日一次，溫酒或白開水和服。

二、吉林

【功能與主治】鎮驚，除風熱。主中風不語。

【處方】明天麻 白附子各四錢 全蠍 僵蚕各二錢七分

【制法】共為細面，用絹羅二、三次至極細末，除包裝保存外，用玻璃瓶或瓷罇存貯。

【劑量及用法】每服一錢四分，用白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

六石風引散

福州

【功能與主治】專治大人左癱右瘓，痰厥昏憤，脚氣腫毒並小兒驚癇癰瘰。

【處方】大黃 干姜 龍骨(熬)各四兩 桂枝(去皮)三兩 炙甘草 牡蠣(煅)各二兩 滑石 寒水石 赤石脂 白石脂 紫石英 石膏各六兩

【制法】共研為散。

驚風散

武漢

【功能與主治】神志昏迷，痰涎壅滯，手足抽搐，口喎眼斜。

【處方】胆南星五錢 白附子八錢 天麻 全蠍各一兩 僵蚕 薄荷 蟬蛻 白花蛇各五錢 防風四錢 川烏 雄黃各五錢 麝香一錢二分 硃砂二錢 冰片一錢

【制法】取上藥混合碾細，成淨粉85~90%即得。

【劑量及用法】此散多用于小兒，每服半分至一分，開水送下。

【禁忌】孕婦忌用。

奇風散

撫順

【處方】僵蚕 全虫 荆芥 桔梗 天麻 清夏 桂枝各四錢 甘草二錢 胆星四錢 鉤藤四錢。

【制法】共為細面。

【劑量及用法】大人二錢，小兒錢半。

通關散

一、北京

【功能與主治】開竅取嚏。主中風痰厥，昏迷不省。

【處方】細辛十兩 豬牙皂二十兩 薄荷 苦參各四兩 共為細粉兌入：麝香二錢

【制法】上藥和勻。

【劑量及用法】用少許吹入鼻內取嚏。

【禁忌】孕婦忌用。

二、廣州

【功能與主治】小兒驚風，抽搐。

【處方】南星 僵蚕 皂角各一錢 麝香五分 蜈蚣一條

【制法】洗淨切碎，焙干，各研為細末後入麝香研勻。

【劑量及用法】擦入鼻中取嚏。

三、南昌

【功能與主治】治卒中風及其他急病閉症，喉口氣塞，不省人事。

【處方】細辛 薄荷 生半夏

牙皂角 明雄黃各一錢

【制法】共研極細末。

【劑量及用法】每用少許入鼻中取嚏。

【禁忌】脫症忌用。

四、沙市

【功能與主治】治痧毒氣閉，不省人事等症。

【處方】北細辛 鵝不食 豬牙皂各一錢 麝香一分

【制法】上藥研細末，磁瓶存貯。

【劑量及用法】每次用少許吹鼻得嚏。

【禁忌】體虛非因于實閉者忌服。

五、昆明

【功能與主治】卒然昏倒，口噤手握，牙關緊閉，不省人事。

【處方】細辛 薄荷各二兩 牙皂二兩 蟾酥一錢 麝香五分 鵝不食草五錢 枯礞三錢

【制法】研極細末。

【劑量及用法】每次一、二厘，吹入鼻孔。

【禁忌】陽虛氣弱者忌用。

六、西安

【功能與主治】刺激鼻腔嗅覺神經，令人發生噴嚏。具有通竅醒腦強心作用。

【處方】牙皂四兩 細辛一兩

【制法】共為極細末，每兩兌入麝香二厘、梅片二分，再研為細面。

【劑量及用法】每次二分、三分即可，作二、三次吸入或吹入。

七、蘭州

【功能與主治】通關，開竅。主中風，口噤氣塞，不省人事。

【處方】細辛 牙皂 薄荷 白芷 雄黃各二錢 麝香五厘 梅片二分 蟾酥五分

【制法】共研細末，雷細。

【劑量及用法】用少量吹鼻取嚏。

八、大同

【功能與主治】中風痰厥，昏迷不省。

【處方】牙皂 細辛各一兩 麝香二分

【制法】共為細面。

【劑量及用法】吹鼻孔有嚏即甦。

九、青島(1)

【處方】凡烏 草烏 半夏 牙皂 占月 狼毒 藥室各二兩 苦丁香 冰片 麝香

【制法】共研細面，磁瓶裝貯。

十、青島(2)

【處方】牙皂 細辛 薄荷各一錢，川芎五分 西歸二分

【制法】共研細面，磁瓶裝貯。

十一、沈陽

【功能與主治】開關通竅，急驚風症，卒中尸厥，忽然暈倒，神氣昏憤，氣滯痰壅，不省人事。

【處方】半夏 皂角 細辛 薄荷各等分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】用竹管吹入鼻內少許。

十二、撫順

【功能與主治】開關竅，避瘟氣。主瘟疫吐瀉，四時不正之氣，關竅不通，中風癱瘓，卒然昏倒，不省人事，牙關緊閉，四肢厥冷。

【處方】牙皂 一兩 細辛二錢 麝香一分

【制法】共為細面。

【劑量及用法】吹鼻孔內聞之。

十三、哈爾濱

【功能與主治】開通關竅，卒中風，驚風。

【處方】細辛 皂角 薄荷 雄黃各一錢

【制法】共碾為細面，絹羅篩過。

【劑量及用法】每用少許，吹入鼻中取嚏，無嚏難活。

【禁忌】孕婦忌用。

十四、承德

【功能與主治】牙關緊閉，不省人事。

【處方】細辛 生半夏 南星(炙) 牙皂 薄荷 雄黃各一兩

【制法】共為細粉。

【劑量及用法】用少許吹入鼻內取嚏。

【禁忌】孕婦忌用。

十五、呼和浩特

【處方】豬牙皂四兩 細辛 一兩

【制法】共為細面，每料兌麝香二分，冰片二分。

附參考古方

【來源】雜病証治類方。

【功能與主治】治腦風鼻息不通，不聞香臭，或鼻流清涕多嚏，肩項拘急，大目昏痛，風府怯寒。

【處方】原蠶蛾(瓦上焙黃) 白附子(炮) 益智(去皮) 蒺藜(炒去角) 薄荷 苦參各半兩

【制法】上為細末。

【劑量及用法】每服二錢，不拘時，溫酒調下。

開 關 散

濟 南

【功能與主治】中風不語，痰迷心竅，不省人事，小兒急驚風，羊癇風等。

【處方】礞砂 丁香 麻黃 大黃 川芎 廣木香 粉甘草 上沉香 橘紅各二錢 豆霜六錢 牛黃二錢 麝香二錢 上梅片二錢 硃砂六錢

【制法】共為細粉，用磁瓶收貯。

【劑量及用法】大人每服四分，小兒一分，黃酒沖服，開水亦可。

【禁忌】忌食辛辣、油膩、葷腥等物。

三蛇胆陳皮散

武 漢

【功能與主治】痰濁閉塞，不省人事，喘咳氣逆，四肢不舉。

【處方】廣東皮五兩(用好酒二兩浸透，勿泄氣，蒸半日，蓋好，再晒干) 蛇胆十兩(約一錢五分)(加好酒二兩，將胆潤透，以干為止，再晒干研末) 西牛黃二錢 鹽蛇二十條(重四錢五分)

【制法】取上藥混合碾細，得淨粉五兩零四分，用玻璃管裝，每管裝五分，外加硬紙套盒。

【劑量及用法】每服五分至一錢。

天 麻 散

撫 順

【處方】川芎二錢 杜松二錢 薄荷一錢半 防風二錢 生草一錢半 天麻二錢 首烏一錢半 麻黃一錢半 細辛一錢半 荆芥二錢 川羌二錢 白芷二錢 荊子二錢

【制法】共為細面。

附參考古方

【來源】衛生寶鑑。

【功能與主治】治小兒急慢驚風，其效如神，及大人中風涎盛，半身不遂，言語難，不省人事。

【處方】半夏七錢 老生姜 白茯苓(去皮) 白朮各二錢 甘草(炙)三錢 天麻二錢半

【制法】以上剉，用水一觔，磁器內同煮，水干焙為末。

【劑量及用法】每服一錢半，生姜漿湯調下，大人三錢。

琥 珀 散

沈 陽

【功能與主治】安神鎮靜，補心清熱。主怔忡癲癇，心煩口渴，言語失次，哭笑無常，神經錯亂，驚悸失眠等症。

【處方】人參 白芍 煅磁石 琥珀各二錢 硃砂一錢 遠志肉 石菖蒲各八分 牛黃四分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服五分，薑湯送下。

鎮 驚 定 痛 散

沈 陽

【功能與主治】清熱安神，鎮驚定痛。主中惡氣絕，中風不語，中驚毒物，疫毒煩躁，吐逆悶脹，邪入心胞，神昏瞤亂，頭目眩暈，心悸不眠，癲狂癱厥，小兒急驚，卒中客忤，精神錯亂，風痰流涎，四肢搐搦。

【處方】犀角一兩 冰片二錢 麝香一錢 玳瑁一兩 雄黃 牛黃各三錢 琥珀一兩 硃砂五錢 金箔五十片 安息香二錢 羊角虫二十個 蠶蜋一兩 生鐵落三錢 寒水石 胆星各一兩

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服一錢，輕者減半。小兒一歲以上者每服一分，五歲以下者每服二分，白開水送下。

【禁忌】忌食辛辣刺激性食物。

癲狂馬寶散

北 京

【功能與主治】鎮靜豁痰安神。主神經錯亂，狂躁不安。

【處方】馬寶二兩 琥珀 龍涎香各一錢 珍珠一分 牛黃五分

【制法】共為細粉，裝瓶重二分。

【劑量及用法】每次病輕者服半瓶，病重者服一瓶。

【禁忌】孕婦忌服。

育 赤 散

撫 順

【功能與主治】鎮靜，鎮痙。主羊癲瘋經年或數月發病一次，卒然昏倒，全身抽搐，牙關緊閉，口角流涎，角弓反張，痰涎漉漉等症。

【處方】硃砂一兩 天竺黃二兩 磁石一兩(醋煨) 冰片一錢 龍骨 牡蠣各五錢

【制法】共為細面。

【劑量及用法】每服四分，早晚二次，食前服之，白開水送下。

【禁忌】忌食辛辣發物。

金不換膏

一、北 京

【功能與主治】散風活血止痛。主手足麻木，腰腿疼痛及跌打損傷。

【處方】川芎 細辛 大黃 懷牛膝 防風 熟地 草烏(生) 羌活 當歸 大黃 五加皮 杜仲(生) 川烏(生) 山藥 桃枝 香附 白芷 威靈仙 紅花 青風藤 連翹 橘皮 遠志 穿山甲(生) 續斷 桃仁 烏藥 麻黃 白蘇 蒼朮 桑枝 何首烏 赤芍 獨活 榆枝 金銀花 槐枝 殭蠶 柳枝 芥穗 羌參 大楓子各五錢 蜈蚣一條

【制法】上藥用香油二百四十兩炸枯去渣，煉至滴水成珠，入黃丹一百兩，攪勻成膏，分兌：血竭 乳香 輕粉 沒藥 樟腦各六錢(共為細粉) 每二百四十兩香油兌以上細粉

攪勻攤貼。

【劑量及用法】微火化開貼患處。

二、天 津

【功能與主治】散風活血，強筋壯骨。主受風受寒，四肢麻木，腰腿痠痛，跌打損傷，傷筋傷骨，筋骨疼痛。

【處方】當歸 獨活 秦艽 蒼朮 白芷 生杜仲 羌活 生川烏 山藥 良姜 荊芥 防風 牛草烏 川芎 元參 生地各一兩五錢 十草七錢 麻黃六錢 生山甲七錢

【制法】以上藥料用香油十斤，炸枯去渣濾淨，煉至滴水成珠，再入草丹九十兩攪勻成膏。每膏藥油十五斤兌：肉桂面一兩五錢 麝香五分 乳香面一兩 沒藥面一兩 血竭面五錢 樟腦一兩 海螵蛸面(去壳)五錢 煨龍骨面六錢攪勻。每大張淨油一兩，小張淨油五錢。

【劑量及用法】貼患處。

三、禹 縣

【功能與主治】左癱右瘓，感受風寒，筋骨疼痛，跌打損傷，氣血痞塊，無名腫毒，癰疽疔瘡。

【處方】川芎 穿山甲 蜂房 連翹 麻黃 白芍 白蘇 鈎藤 川芎 草烏 年健 地風 桂枝 木瓜 當歸 木鱉 牛膝 首烏 防風 乳香 沒藥各二兩 白胡椒一兩 麝香二錢 冰片二錢 香油二斤 丹六斤 血竭二兩 大黃二兩 赤芍二兩 鱉甲二兩 外入桃柳桑槐棗樹枝

【制法】將藥煎枯，再將膏取出，將膏藥熬成時，外入穿山甲 乳香 沒藥 白胡椒 麝香 冰片

【劑量及用法】成人貼一張，用熱茶壺暖開貼患處。

【禁忌】孕婦、虛弱腰疼者忌用。

【備考】有效期二年。

四、青島(1)(金不換神化膏)

【處方】牛軍 川芎 梔子 柴胡 牛地 威靈仙 薄荷 白芍 木通 烏藥 澤瀉 當歸 桑皮 枳殼 白烏 廣皮 香附 青皮 白芷 知母 杜仲 黃柏 甘草 細辛 銀花 黃芩 蒺藜 杏仁

川連 桃仁 元參 白朮 防風 豬苓 殭蠶 桔梗 升麻 蘇皮 麻黃 前胡 山藥 遠志 牛膝 藜蘆 良姜 貝母 川斷 全蝎 坤草 青風藤 桃枝 羌活 南星 草烏 文蛤 獨活 天麻 白芍 柳枝 穿山甲 蒼朮 羌活 苦參 元花 蜈蚣 人風子 蒼耳子 兩頭尖 茵陳 五加皮 槐枝 榆枝 秦艽各五錢

【制法】用香油十斤，將諸藥熬枯，滴水成珠，再加草丹五斤，再用細料：乳香 沒藥 血竭 輕粉 龍骨各三錢 海螵蛸 赤石脂各五錢 樟腦一兩五錢 冰片 丁香各一錢 共研面，入膏內。

五、青島(2)(神仙金不換膏)

【處方】殭蠶 青皮 獨活 川附子 防風 生草烏 何首烏 白蘇皮 秦九皮 穿山甲 半夏 生川烏 青風藤 馬錢子 桃仁 虎骨 天麻 歸尾 良姜 威靈仙 各七錢 生薑 菲菜 牛蒜 青蔥各二具

【制法】用香油七斤，將藥炸枯去渣，熬之滴水成珠，加草丹三斤四兩涼透，再將下列細料入內：乳香六錢 沒藥六錢 公丁香五錢 白粉一兩二錢 冰片五分 木香八分 共研極細面攪入膏內。

六、沈 陽

【功能與主治】舒筋通絡，驅風散寒，調經止痛。主腰痛癱痿，關節疼痛，麻痺不仁，心腹諸痛，男子遺精，女子帶下，虛冷泄瀉，月經閉漏，瘧疾疝氣，偏正頭風，寒濕脚氣。

【處方】梔子 防風 良姜 海風藤 靈仙 牛膝 熟地 桃仁 柴胡 白蘇皮 全虫 枳殼 白芷 甘草 黃連 細辛 白芍 元參 豬苓 前胡 麻黃 桔梗 殭蠶 升麻 地丁 人黃 木通 橘皮 川烏 生地 香附 雙花 知母 薄荷 當歸 杜仲 白朮 澤瀉 青皮 黃柏 杏仁 黃芩 穿山甲 荊藜 天麻 苦參 烏藥 羌活 半夏 茵陳 浙貝 加皮 續斷 山藥 桑皮 白朮 蒼朮 獨活 荊芥 羌花 藜蘆 連翹 遠志 草烏 坤草 五倍子 天南星 何首烏 大風子各一兩

【制法】香油十斤熬枯去渣，滴水成珠時再入：黃丹五斤 乳香 沒藥 血竭 輕粉 樟腦 龍骨 海螵蛸 赤石脂各一兩 梅片五錢 麝香五錢 以上共研細末，另兌攪勻。

【劑量及用法】隨症按穴攤貼之。

七、撫順

【處方】川烏 山梔 柴胡 薄荷 木通 川芎 白朮 靈仙 蘇合 牛地 豬苓 當歸 熟地 烏藥 香附 首烏 殭蠶 元參 澤瀉 枳殼 知母 白芷 細辛 廣皮 九柏 前胡 元連 甘草 杏仁 雙花 蒺藜 元芩 桃仁 防風 白芍 加皮 桔梗 麻黃 牛膝 草烏 山藥 地榆 川斷 遠志 風藤 良姜 川貝 蒼朮 獨活 肉桂 坤草 荊芥 連翹 半夏 桑木 羌活 鼠黃 南星 苦參 白蠟 全虫 白芫 芫花 蒼耳 文蛤 穿山甲 楓子各五錢 蜈蚣二十條 柳桑 槐柏各二十寸

【制法】香油十二斤將藥泡在油內按春五，夏三，秋七，冬十日泡之，熬枯去渣，自熬至成珠，將油數稱准，投入黃丹，按一丹二油用槐木棒不住手攪勻，冷時下乳香 沒藥 輕粉 龍骨 洋老 海硝 赤石脂各一兩 冰片 台麝各五錢。

八、哈爾濱(金絲萬應膏)

【功能與主治】活血散瘀，溫寒消腫。主痺症：風寒濕氣，閉塞經絡，筋骨疼痛，手足拘攣。痞積：氣血瘀食，各種積聚，胸脇脹硬，脘腹疼痛。血瘕：血寒凝結，經血不調，腹痛拒按，皮膚甲錯。寒痢：寒濕凝滯，泄瀉白痢，腹內冷痛，里急下墜。脾胃虛寒：胃脘疼痛，消化不良，咯氣嘈雜，泄瀉糟粕。傷力身痛：勞役過度，筋骨疲憊，體痛肢痠，精神頹靡。疝氣：寒疝下串，腸逸陰囊，下墜疼痛，不敢仰息。頑癬：頑癬如錢，漸次擴大，搔痒起屑，經年不愈。腫毒初發：外科腫瘍，初起發見，癰腫疼痛，風熱喉逆。

【處方】野軍 川烏 山梔 柴胡 薄荷 靈仙 白朮 木通 首烏 生地 熟地 桑皮 烏藥 知母 當歸 澤瀉 廣皮 香附 杜

仲 青皮 白芷 細辛 蒺藜 黃 栢 甘草 杏仁 川連 黃芩 銀 花 防風 白芍 桃仁 玄參 桔 梗 蘇皮 豬苓 殭蠶 前胡 升 麻 麻黃 牛膝 加皮 草烏 山 藥 遠志 川斷 海藤 良姜 連 翹 貝母 桑木 茵陳 坤草 地 丁 半夏 荊芥 羌活 獨活 南 星 鼠黃 占參 蒼朮 穿山甲 白芫 文蛤 芫花 天麻 全蠍 楓子 蒼耳各一兩 蜈蚣 十條 桃枝 柳枝 桑枝 槐枝 榆枝各二尺 香油十五斤

【制法】將藥泡入香油內，夏浸二宿，春浸五宿，秋浸七宿，冬浸十宿，方用火熬，以藥枯油黑為度。濾去約渣，口熬至滴水成珠，再入黃丹一兩，用柳枝攪之，再加乳香 沒藥 輕粉 血竭 樟腦 龍骨 海硝 赤石脂(細面)各一兩，梅片 麝香各五錢 攪勻，傾入水缸中，令人扯扯，色如黃金，即成。

【劑量及用法】痺症，痞積，血瘕，寒痢，俱貼臍上，脾胃虛寒貼前心，傷力身痛貼后心，疝氣貼臍下，頑癬，腫毒俱貼患處。

【禁忌】孕婦忌用。

【備考】每貼重五錢，攤置膏約背紙上，對合之。

九、呼和浩特

【處方】當歸 川芎 白芷 靈仙 杜枝 官桂 川烏 穿山甲 獨活 年見 木瓜 牛膝 川斷 天麻 仙茅各一兩 地風一兩 麻黃一兩五錢

【制法】用香油十斤炸枯去渣，將油熬至滴水成珠為度，樟丹成膏時，再入黃蜡三兩 松香三兩。又用：血竭 輕粉 龍骨 乳香 沒藥 硫黃 海螵蛸 赤石脂各一兩 冰片五錢 麝香一錢 蟾酥三錢 肉桂一兩 貝母細面，每斤膏藥兌細料五錢。膏藥先用白漂布裱一層白膠宣紙，每張大小四錢五分至五錢

救急膏

沈陽

【功能與主治】驅風去寒，逐瘀止痛。主腰疼腹痛，關節作痛，風寒濕氣，麻痺不仁，拘攣癱瘓，手足不遂。

【處方】陀僧面四兩 蓖麻子 甘遂 木鱉子 大黃各二兩 莪朮 草烏 生地 三稜 川烏各一兩 當歸一兩五錢 蜈蚣十條 黃丹三斤四兩 柳枝一寸五 大戟 枳實 麻黃 黃柏 巴豆 白芷 牙皂 肉桂 川芎各八錢 元參 桃仁 細辛 獨活 防風 杏仁 厚朴 文蛤 檳榔 全蠍 花粉 穿山甲 芫花 香附各七錢 蛇蛻 黃連各五錢

【制法】將諸藥入鍋內浸七日，熬枯去渣以香油七斤內熬至滴水成珠，再下黃丹用柳枝攪之，冷后再入麝香五分。

【劑量及用法】貼患處。

【禁忌】忌食豬肉。

救苦膏

沈陽

【功能與主治】解毒，散風，活血。主風寒濕痺，腰腿作痛，筋骨麻木，四肢不仁，半身不遂，口眼喎斜，癰疽積聚，肚腹疼痛，女子經血不調，赤白帶下，膨悶脹飽，水腫癰疽，發背砍頭，對口無名腫毒。

【處方】大黃二兩 花粉七錢 牙皂八錢 蓖麻子二兩 全蠍七錢 枳殼八錢 半地黃一兩 桃仁七錢 白芷八錢 草烏一兩 五倍子七錢 莪朮一兩 羌活 麻黃 肉桂 紅大戟各八錢 香附 厚朴 穿山甲各七錢 蛇蛻五錢 當歸一兩五錢 甘遂 木鱉子各二兩 川烏一兩 三稜一兩 巴豆 黃柏各八錢 芫花 杏仁 防風 獨活 檳榔 細辛 玄參各七錢 黃連五錢 蜈蚣十條。

【制法】用麻油五十兩，入群藥浸數日，用慢火熬之，待滴水成珠後將藥除去，兌入：黃丹二十四兩 密陀僧四兩 成膏待用。

【劑量及用法】貼患處。

舒筋活絡膏

天津

【功能與主治】散風活血，化痰止痛。主筋骨疼痛，手足麻木，跌打損傷，瘡瘍紅腫。

【處方】生虎骨二兩四錢 防風九錢 紅花六錢 木瓜九錢 老薑

草九錢 怀牛膝六錢 骨碎補九錢
青楓簾九錢 海風簾九錢 功劳叶
六錢 当归九錢 麻黃一錢

【制法】上藥用香油十五斤炸枯去渣濾淨，煉至滴水成珠，再入草丹九十兩攪勻成膏，每膏藥油十五斤兌：乳香面九錢 沒藥面九錢 麝香一錢 二分攪勻，每大張淨油一兩，小張淨油五錢。

【劑量及用法】貼患處。

【禁忌】孕婦忌貼腹部。

追風膏

一、天津

【功能與主治】舒筋活血，追風散寒。主筋骨疼痛，四肢麻木，行步艱難，腰背疼痛及風濕性關節炎。

【處方】怀牛膝 生桃仁 麻黃 当归 牛草烏 生草大戟 天麻 羌活 生山甲 細辛 烏藥 白芷 良姜 獨活 赤芍 海風簾 紅花 各二兩五錢 蛇蛻六錢 蘇木一兩二錢 蜈蚣十二條 蜈蚣二兩五錢 生地 熟地各一兩二錢 生川烏六錢 續斷一兩二錢 五加皮六錢

【制法】上藥用香油十五斤炸枯去渣濾淨，煉至滴水成珠，再入草丹九十兩攪勻成膏。每膏藥油十五斤兌：肉桂面一兩五錢 冰片一錢二分 沒藥面 雄黃面 檀香面 血竭面各二錢七分 麝香一錢二分 乳香面二錢七分 公丁香面一錢二分 每大張淨油一兩，小張五錢。

【劑量及用法】貼患處。

【禁忌】孕婦忌貼腰腹部。

二、沙市

【功能與主治】治風濕風寒，四肢麻木疼痛等症。

【處方】当归 川芎 千年健 桑皮 五加皮各二兩 蒼朮四兩 川烏二兩 草烏四兩 杜仲 血簾 良姜 白朮 天麻各二兩 生薑一斤 金毛狗脊 桑寄生 劉寄奴 殭蠶 續斷 附子各二兩 艾葉四兩 地風皮二兩 麻黃四兩 獨活三兩 桂皮四兩 血余五錢 馬錢子四兩 羌活二兩 蒼耳子六兩 烏藥二兩 大蔥一斤

【制法】上藥切片用香油十五斤浸泡(春秋七日，夏季四日，冬季十日)，文武火熬枯去渣，入黃丹七斤

半 左半夏二兩 肉桂子二兩 白胡椒二兩 血竭二兩 乳香 沒藥各四兩 兒茶二兩 共為細末，候熬成膏后，微溫再入，攪勻，退火攤用。

【劑量及用法】用時烘化貼患處。

【禁忌】非因寒濕之病及有炎症者忌貼；孕婦忌貼腹部。

三、大同

【功能與主治】祛風。主筋骨麻木。

【處方】大黃 当归 桃仁 蟹甲 連翹 黃芩 4 膝 半夏 麻黃 牙皂 細辛 白朮 柴胡 千金子 烏藥 赤芍 穿山甲 草烏 白蘇 殭蠶 火麻子 大戟 白芷 官桂 貝母 天麻 全虫 海風簾 各二錢 花粉 防風 銀花 巴豆 甘草 蜂房 元參各二兩 防己 荊芥 羌活 獨活 黃連 黃芪 苦楝皮各二兩 良姜 紅花 牛子 蘇木 黃柏 兩頭尖各五錢 狸皮一兩 血余五錢 蜈蚣十條 蛇蛻二錢 香油十斤

【制法】浸藥二日，文武火熬去渣，下黃丹四斤五兩再入，木香 玄香 血竭 沉香 丁香 雄黃 檀香 乳香 沒藥 麝香各二錢 麝香一錢 冰片一錢

【劑量及用法】貼患處。

四、濟南

【功能與主治】風寒濕痺，疼痛麻木。

【處方】牛牛膝二兩 續斷一兩 威靈仙 天麻 麻黃 生草烏 良姜 穿山甲 生烏藥各二兩 蛇蛻五錢 肉桂 海風簾各二兩 生川烏五錢 蜈蚣十條 生地一兩 桃仁二兩 五加皮五錢 大戟 羌活 獨活 白芷 細辛 南紅花 各二兩 蘇木一兩 赤芍二兩 熟地一兩

【制法】用香油十二斤浸藥三日，用文武火炸枯去渣，再入黃丹四斤半收膏，待溫升入：丁香一錢 沒藥二錢 雄黃二錢 檀香二錢 血竭一錢 麝香一錢 乳香三錢 冰片一錢 研細粉和勻，每大貼重一兩，小貼重五錢。

【劑量及用法】先用溫熱毛巾擦

敷患處，再用微火化開，此膏每一貼用二星期。

沈陽

【功能與主治】祛風散寒，活絡鎮痛。主四肢麻痺，經絡作痛，風寒濕氣，腰腿痠痛，遺精白濁，崩漏帶下，久瀉久痢，產後風寒。

【處方】虎骨四錢 制馬錢子二斤 地龍淨半斤 川烏 草烏 乳香 沒藥各二兩 当归四兩 肉桂 天麻各二兩 香油十五斤

【制法】熬成膏，每斤兌：麝香二分 冰片三錢。

【劑量及用法】攤成膏約按穴貼之。

追風活血膏

禹 縣

【功能與主治】主筋骨疼痛，跌打損傷，腰背疼痛，手足麻木，癰瘡疔瘡，口眼歪斜，左癱右瘓，半身不遂，鶴膝風疹，偏墜疝氣，乳巖乳癰，小腹疼痛。

【處方】虎骨二兩 烏蛇一條 当归 川芎各一兩 廣木香五錢 威靈仙一兩 乳香 沒藥 自然銅(煅)各一兩 杜仲五錢 小茴香 川牛膝 桂枝 破故紙各一兩 羌活二兩 獨活 紅花 黃芩 鈎藤各一兩 殭蠶二兩 全蠍一兩 白附子二兩 麝香五錢 甘草一兩 廣丹五十五兩 香油十斤

【制法】將藥熬枯去渣，再入廣丹熬成膏，外入以上沒藥、乳香、自然銅、麝香。

【劑量及用法】成人一大張，攤紅布貼之；小兒一小張。

【禁忌】孕婦忌用。

【備考】有效期一年。

海馬追風膏

大 同

【功能與主治】追風散寒。治腰腿痛。

【處方】海馬十二兩 穿山甲 杜仲 地膚子各一兩 怀牛膝一兩 当归一錢 赤芍 連翹 花粉 廣木香 松香 追風草 薄荷 云苓 土茯苓 木通 麻黃各一兩 草丹一斤 麻油二斤

【制法】用鉄鍋將麻油熬開，入上料熬煉成膏。

【劑量及用法】外用貼患處。

紅花活血膏

大同

【功能與主治】活血追風。

【處方】當歸二錢 川芎二錢 血竭花二錢 穿山甲二錢 地龍三錢 海馬二錢 沒藥二錢 乳香三錢 杜仲二錢 防風二錢 麻黃三錢 木瓜二錢 牛膝二錢 木香三錢 青艾二錢 川椒三錢 馬錢子五錢 麻油一斤 章丹半斤

【制法】用鍋熬成膏。

【劑量及用法】貼患處。

桂附膏

武漢

【功能與主治】腎脊腰腹，掣引疼痛。

【處方】鮮側柏葉十斤 鮮松毛三斤 生天雄一斤 麻油六斤 炒黃丹三十六兩 肉桂一斤

【制法】用麻油六斤，將前藥浸七日，入鍋內熬至藥枯黑，去渣濾淨，加炒黃丹三十六兩，攪微冷，加肉桂一斤，攪勻，成膏一百一十八兩八錢；稍冷，裝入瓦鉢中，用紅布攤貼，每張大重五錢，小重三錢。

【劑量及用法】視患處大小，攤于布上，焙干貼患處。

桑枝膏

上海

【功能與主治】骨節疼痛，筋絡牽強。

【處方】桑枝一千六百兩

【制法】將桑枝煎汁三次榨淨，將各次所煎藥汁澄清過濾，蒸發成濃汁，加冰糖四十斤收膏，成膏八百四十兩。

【劑量及用法】每次一錢匙，開水沖服。

虎骨膏

一、北京、濟南(1)

【功能與主治】散風止痛。主腰腿疼痛，筋脈拘攣，四肢麻木。

【處方】虎骨二十四兩 草烏(生) 當歸 川烏(生) 白芷 細辛 川芎 天麻 懷牛膝 熟地 何首烏 羌活 五加皮 生地 杜仲(生) 桃枝 香附 威靈仙 白朮 肉桂 穿山甲(生) 續斷 白蘇 蒼朮 桑枝 獨活 榆枝 槐枝 殭蠶 川棟子 柳枝 人楓子各一兩 蜈蚣二條

【制法】上藥用香油二百四十兩炸枯去渣，煉至滴水成珠，入黃丹一百兩，攪勻成膏另兌：肉桂 公丁香 沒藥 乳香 血竭各五錢 麝香三錢 共為細粉，每二百四十兩膏油兌入以上細粉攪勻攤貼。

【劑量及用法】微火化開貼患處。

【禁忌】忌食生冷；孕婦忌貼。

二、濟南(2)(熊油虎骨膏)

【功能與主治】手足麻木，半身不遂，筋骨疼痛，腰腿痠軟。

【處方】虎骨 熊油各十斤 當歸 川芎 木瓜 川牛膝 杜仲 天麻 南星 薑本各八兩 羌活 防風 骨碎補 川斷 胡蘆巴 淫羊藿 草豆蔻 海風藤 鑽地風 青風藤各四兩

【制法】用真麻油八十斤浸七日，如法熬膏入炒黃丹，收膏後將凝定，再下入：肉桂 丁香 乳香 沒藥 血竭 兒茶各八兩，麝香 冰片各二兩

【劑量及用法】將膏攤于布上，貼患處，大小酌用。

【禁忌】忌食生冷之物；孕婦忌用。

三、天津、蘭州

【功能與主治】去風、散寒、舒筋、活血、止痛。主筋骨疼痛，四肢麻木，跌打損傷，閃腰岔氣。

【處方】生虎骨四兩 石斛二兩 赤芍一兩五錢 白芍 川芎各一兩 羌活一兩五錢 桂枝二兩 生杜仲一兩五錢 生地四兩 生兒烏 白蘇 穿山甲各一兩 獨活一兩五錢 麻黃一兩 透骨草二兩 當歸四兩 生草烏 紅花 大黃各一兩 防風一兩五錢 甘草一兩

【制法】以上藥料用香油十五斤炸枯去渣濾淨，煉至滴水成珠，再入章丹九十兩攪勻成膏。每膏藥油十

五斤兌：肉桂面一兩五錢 乳香面一兩 沒藥面一兩 麝香五分 血竭面一兩五錢 廣木香面五錢 公丁香面五錢 攪勻。每大張淨油一兩，小張淨油五錢。

【劑量與用法】貼患處。

【禁忌】孕婦忌貼腹部。

四、大同、承德

【功能與主治】腰腿疼痛，關節風痛經久不愈；手足麻木，半身不遂，鶴膝風痛；老年人冬令氣喘，少腹寒冷。

【處方】川芎 細辛 天麻 懷牛膝 梔子 防風 熟地 赤石脂 草烏 首烏 木通 羌活 當歸 大黃 加皮 生地 杜仲 川烏 五味 薄荷 山藥 桃枝 香附 白芷 枳殼 靈仙 豬苓 元參 半夏 白朮 前胡 青楓 連翹 陳皮 遠志 穿山甲 續斷 桃仁 烏藥 杏仁 甘草 川棟皮 青皮 蒼耳 麻黃 白蘇 薑本 黃連 知母 楮實 蒼朮 桑枝 浙貝 蒺藜 澤瀉 地榆 黃芩 赤芍 獨活 榆枝 銀花 槐枝 殭蠶 桔梗 川棟子 柳枝 荊芥 茵陳 苦參 楓子 黃柏各二錢五分 蜈蚣二條 虎骨一斤半

【制法】上藥用香油十五斤，熬枯去渣，再熬至滴水成珠，入章丹九十兩，成膏候溫再入下列藥面三兩攪勻：

肉桂 丁香 龍骨 沒藥 乳香 血竭各二斤 麝香一錢七分共軋細面，按上述之法兌之。

【劑量及用法】按穴貼用。

五、沈陽(虎骨熊油膏)

【功能與主治】驅風散寒，通竅止痛。主筋骨疼痛，麻痺不仁，癱瘓腹痛，四肢拘攣，肩背風濕，腰腿寒痛。

【處方】乳香 沒藥 冰片 當歸 荊芥 全蠍 杜仲 莪朮 藏紅花 母丁香 肉桂各二兩 虎骨一架 麝香二兩 熊油五斤 蜈蚣十條 白花蛇一盤 細辛一兩 白芍 天麻 羌活 羌活 牛膝 青風藤 三稜各二兩

【制法】上藥用香油四十斤熬至滴水成珠，再下黃丹收之，同時下入乳香、沒藥面，攤時每斤油兌入梅片

四分 麝香四分。每貼重量淨油大者二錢八分，小者減半。

【劑量及用法】攤貼。

六、抚 順

【功能与主治】活血疏風，鎮痛。主風寒濕為病，以至神經癱瘓，筋骨麻木，腰膝疼痛，筋骨拘急等症。

【處方】虎骨一斤 白花蛇二兩 貫桂一兩 當歸二兩 細辛 明天麻 全蝎各一兩 羌活 杜仲 川烏 三稜 文龍 乳香 沒藥 母丁香各二兩 生馬前四兩 鮮姜二斤 麝香二錢 冰片五錢

【制法】香油四十斤熬至滴水成珠，再將樟丹兌妥，入乳香、沒藥后，兌麝香、冰片。

【劑量及用法】貼敷患處。

七、哈爾濱(虎骨熊油膏)

【功能与主治】活血疏風，溫寒化濕。主風寒濕三氣合而為痹，氣血閉塞，筋骨麻木，腰腿疼痛，筋骨拘急。

【處方】全虎骨一架 台麝香一兩 真油桂二兩 全當歸八兩 血余炭四兩 明沒藥五兩 滴乳香六兩 炒黃丹二斤 真熊油六兩 香油十斤

【制法】將各藥入香油內，熬至藥枯，去渣，入黃丹收膏，以柳枝急攪之，以滴水成珠為度，后入麝香攪勻，俟冷即成。攤置緞質膏藥背上，對合之，每重約四錢，陰冷處存置。

【劑量及用法】文火焙煉，貼敷腎俞穴或疼痛處。

狗 皮 膏

一、北 京

【功能与主治】祛風散寒，舒筋活血止痛。主風寒麻木，腰腿疼痛，閃腰岔氣，跌打損傷。

【處方】枳殼 蛇床子 木香 香皮 甘草 細辛 川楝子 烏藥 續斷 大楓子 牛膝 菟絲子 赤石脂 羌活 白芷 僵蚕 黃柏 桃仁 赤芍 補骨脂 生附子 官桂 威靈仙 川芎 天麻 川烏(生)

草烏(生) 小茴香 當歸 杜仲(生) 遠志 香附 橘皮 穿山甲(生) 白朮 青風藤各一兩

【制法】上藥用香油二百四十兩炸枯去渣，煉至滴水成珠，入黃丹一百兩攪勻成膏，每二百四十兩膏油另兌：輕粉 樟腦 血竭 兒茶 沒藥 乳香 公丁香 均用細粉)各五錢攪勻攤貼。

【劑量及用法】微火化開貼患處。

二、天 津

【功能与主治】舒筋活血，散寒止痛。主筋骨疼痛，跌打損傷，受風受寒，四肢麻木，腰背疼痛，腹脹腹痛。

【處方及制法】生枳殼 香皮 青風藤 大楓子 生僵蚕 赤芍 天麻 生茴香 蛇床子 甘草 烏藥 懷牛膝 羌活 黃柏 生故紙 威靈仙 生川烏 當歸 生杜仲 生草烏 川芎 生附子 生桃仁 白芷 菟絲子 續斷 細辛 廣木香 生遠志 生香附 橘皮 生山甲 生白朮 生川楝子各一兩

【制法】以上藥料用香油十五斤，炸枯去渣濾淨，煉至滴水成珠，再加入草丹九十兩，攪勻成膏，每膏藥油十五斤兌：肉桂面一兩 樟腦 血竭面 兒茶面 沒藥面 乳香面 公丁香面各五錢攪勻。每大張淨油八錢，小張五錢。

【劑量与用法】貼患處。

【禁忌】孕婦忌貼肚腹。

三、

處方刪

四、武 漢

【功能与主治】對風寒或濕熱所引起的一切腫痛麻痺，均可施用。

【處方】羌活 白芷 獨活 良姜 川烏 草烏 麻黃 蒼朮各二兩

【制法】取上藥，用麻油六斤，加鮮側柏葉八斤 松毛尖八斤 生天雄一斤 同群藥炸枯黑去渣，熬至

滴水成珠；下黃丹三十二兩(油、丹共重一百二十八兩)，攪勻，九折成膏一百一十五兩二錢；用皮版攤，攤時加肉桂末十六兩，共成膏一百三十兩二錢，大張一兩二錢，中張八錢，小張五錢。

【劑量及用法】焙開貼患處，隔一至二日換一次。

五、蘭 州

【功能与主治】舒筋活血，散寒止痛。主筋骨疼痛，手足麻木，跌打損傷，小腸疝氣，腹脹腹痛等症。

【處方】枳殼 防風 杏仁 澤瀉 地榆 天麻 五味子 川烏 浙貝 猪苓 赤石脂 白芷 甘草 赤芍 五加皮 梔子 薄荷 山藥 首烏 羌活 苦參 青皮 黃芩 故紙 熟地 香附 遠志 半夏 獨活 荆芥 麻黃 茯苓 小茴香 草烏 白芷 陳皮 前胡 銀花 牛膝 藜蘆 附片 大茴香 木通 五靈脂 官桂 連翹 僵蚕 續斷 蛇床子 桔梗 大黃 當歸 知母 茵陳 細辛 黃柏 台烏藥 蒼耳子 川芎 生地 杜仲 蒼朮 元參 川楝 桃仁 葵藜 楮實子 大楓子 青風藤 菟絲子 白朮 穿山甲各四兩 蜈蚣十四條

【制法】用香油一百另八斤，將前藥炸枯，去渣，兌草丹三十三斤十二兩，每七斤半膏油兌細料二兩，攪勻。

細料面用：血竭 淨冰 兒茶 木香 丁香 沒藥各一兩 研勻，用布背、皮背均可。

六、大同、麝香狗皮膏)

【功能与主治】腰腿痛，寒腿風痛 關節痛。

【處方】生虎骨一兩 當歸 牛膝 紅花 加皮 秦艽 獨活 川烏 草烏 木瓜 羌活 防己各一兩五錢 烏梢蛇五個 申姜一兩五錢 天麻一兩 白芷 威靈仙 防風各一兩五錢 地龍一兩 寄生二兩 麻黃八兩 全虫一兩 大茴香 小茴香 鉗地風各一兩五錢 土鱉一兩 杜仲 干姜各一兩五錢 蒼朮二

藁本二兩 芥子五錢 海楓 年健桂枝各一兩五錢

【制法】共為一處，用香油二十斤熬炸去渣，煉油滴水成珠，兌章丹一百二十兩成膏，再兌下列藥面：細辛 沒藥 乳香 兒茶 母丁香 血竭各六錢 樟腦一兩 丁香六錢 麝香六分 每斤油用藥面一兩。

【劑量及用法】貼患處。

七、濟 南

【功能與主治】腰痛，腿痛，臂痛。

【處方】枳殼 殭蠶 大茴香 澤瀉 附子 豬苓 川黃柏 小茴香 烏藥 官桂 首烏 黃連 故紙 續斷各一兩 蜈蚣四條 半夏 沒藥 五加皮 川牛夕 桔梗 前胡 丁香 五味 兒茶 血竭 川芎 連翹 輕粉 香附 天麻 梔子 細辛 潮腦 穿山甲 沙蒺藜 熟地 川棟子 貝母 青楓藤 荊芥 草烏 苦參 木通 楮實子 知母 蒼朮 元參 白蘇 當歸 大楓子 蛇床子 杏仁 杜仲 菟絲子 靈仙 乳香 桃仁 山藥 遠志 防風 白芷 木香 蒼耳 陳皮 赤石脂 薄荷 藁木 地榆 白朮 羌活 川烏 麻黃 赤芍 茵陳 獨活 生地 青皮 黃芩 銀花 大黃 甘草 蕤仁 麝香 冰片各一兩

【制法】以上藥料用香油二十六斤熬膏，除沒藥、兒茶、血竭、輕粉、潮腦另兌外，其他各藥隨油下鍋炸焦過濾去渣，每斤油用章丹七兩，因狗皮缺乏，以羊皮代替。

【劑量及用法】貼患處及穴道（另有說明）

【禁忌】孕婦忌用。

八、承 德

【功能與主治】風痺疼痛，四肢麻木，閃腰岔氣，跌打損傷。

【處方】枳殼 連翹 木香 澤瀉 半夏 楮實子 青皮 懷牛膝 細辛 赤石脂 烏藥 豬苓 人風子 藁本 防風 前胡 蛇床子 甘草 何首烏 川棟子 麻黃 續斷 菟絲子 金銀花 沙苑子 杏仁 羌活 桃仁 苦參 地榆 殭蠶 肉蓯蓉 黃柏 浙貝 蜈蚣 知母 黃芩 川烏 川附片 薄荷

蒼朮 熟地 威靈仙 大黃 天麻 獨活 川烏 白蘇 草烏 黃連 荊芥 蒼耳子 赤芍 遠志（煎炙去心） 補骨脂 穿山甲 官桂 茵陳 桔梗 大茴香 白芷 山藥 梔子 香附（炙） 生地 白朮 木通 玄參 小茴香 杜仲 五味子 陳皮 青風藤 當歸（酒洗） 五加皮各一兩二錢

【制法】以上各藥用香油三十斤，炸枯，去渣，熬至滴水成珠，入黃丹一百八十兩成膏，再入下列藥粉攪勻：輕粉 樟腦 血竭 兒茶 沒藥 乳香 公丁香各一兩 共為細粉

【劑量及用法】用微火化開貼患處。

風寒麻木膏

濟 南

【功能與主治】風寒麻木，筋骨疼痛。

【處方】川烏 草烏各四兩 透骨草半斤 穿山甲二兩 乳香四兩 沒藥二兩 明天麻 地風各四兩 槐枝 柳枝 榆枝 桃枝，各二十斤 生姜半斤 葱半斤 蒜半斤 香油十斤 章丹四斤

【制法】將群藥入鍋煎枯，去渣，將油熬至滴水成珠，入丹，溫火熬至成膏。

【劑量及用法】先將生姜搓患處，去皮泥垢，再將膏藥貼患處。

老鸛草膏

南 京

【功能與主治】祛風和絡。主麻木疼痛。

【處方】老鸛草十斤

【制法】以清水煎煮，熬成濃汁，去渣濾淨，加冰糖收膏（每湯膏一斤加冰糖一斤）。

【劑量及用法】每服一至五錢，一日一次，早晚開水和服。

稀莖膏

杭 州

【功能與主治】治纏綿風氣，四肢麻木，筋骨冷痛，腰膝無力以及風濕瘡瘍等症。

【處方】稀莖草（蜜拌九蒸九晒）

【制法】煎取濃汁，酌加冰糖，文

火收老成膏。

【劑量及用法】每服一至五錢，不拘時，開水沖服。

竹 瀝 膏

福 州

【功能與主治】專治痰火上炎，痰迷心竅，以及中風氣喘，並治小兒驚風發癇。

【處方】天竺黃三兩 鮮瓜萎十六兩 硃砂五錢 枳殼 桔梗 胆星 川貝 川連各三兩 九節蒲七錢 鮮竹瀝八兩

【制法】共煎成膏。

回 陽 膏

撫 順

【處方】公藤一兩 生姜二兩 草烏 川烏各一兩 大黃 當歸 白芍各八錢 乳香五錢 白芷八錢 皂刺五錢 穿山甲一兩 白蘇 木鼈 烏藥各五錢 台麝二分 章丹二十兩 油五斤 沒藥五錢

【制法】共熬成膏。

牽 正 膏

濟 南

【功能與主治】主風斜風，口眼歪斜。

【處方】烏藥三錢 沉香二錢 白芷 天麻 蘇叶各三錢 薄荷二錢 川羌二錢 川芎二錢 全蠍一錢 秦艽 靈脂 甘草 台參各三錢

【制法】用香油二斤下鍋熬15分鐘，將以上藥料下油炸黑取出，再用章丹一斤收膏。

【劑量及用法】向左歪貼右邊，向右歪貼左邊。

黑 錫 丹

一、北 京

【功能與主治】溫寒散結，墜痰定喘。主卒暴中風，痰涎上壅，胸腹冷痛，腰背沉重。

【處方】黑錫 硫黃各二兩 沉香 川附片 胡蘆巴 補骨脂 小茴香 肉豆蔻 川棟子 木香各一兩 肉桂五錢 陽起石一兩

【制法】將黑錫入鉄勺內溶化，入硫黃結成砂子出火毒，研極細與

羣藥共為細粉，和勻，每兩用白麵三錢，酒糊為丸。

【劑量及用法】每服五分，日服一次，溫開水送下，淡鹽湯亦可。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天津

【功能與主治】助腎扶陽，溫補下元，散寒止痛。主陰寒囊縮，腎寒疝氣，寒涼腹痛，虛寒哮喘，胃寒嘔吐酸水。

【處方】制附子 薏巴子(酒炒) 川棟子(酒蒸) 破故紙(酒炒) 沉香 肉豆蔻(滑石煨) 廣木香 茴香(鹽炒)各一兩 肉桂(去粗皮)五錢 生陽起石一兩(用黃酒一兩煮干為度) 黑錫 硫黃各一兩

【制法】先將黑錫入鐵勺內化開，再將硫黃撒入勺內，隨即冒起濃煙，有時能發生火光(要注意燒傷、燙傷、和其他事故)候至結成砂狀，倒出晾涼，再和藥料共為細粉。每細粉十二兩五錢，用江米面四兩五錢，黃酒八兩五錢，蒸糊制小丸；或用江米面蒸熟晒干碾粉與藥料細粉和勻，用黃酒打小丸亦可。

【劑量及用法】每服一錢，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、上海

【功能與主治】痰喘冷氣刺痛，腰背沉重。

【處方】肉桂五錢 硫黃二兩 肉果(煨) 木香 附子(炮去皮制) 沉香 補骨脂(炒)各一兩 青鉛二兩 胡蘆巴(酒浸炒) 陽起石(煨) 大茴香(炒) 川棟子(酒蒸去皮核)各一兩

【制法】先將青鉛在鐵鍋內煇化去渣加硫黃炒成砂，攤下淨石上，待冷後研極細粉，余藥共研細粉，充分研勻，酒糊為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】憑醫師處方購用。

【禁忌】忌食生冷食物。

四、南京

【功能與主治】回陽，鎮逆。主痰壅氣逆，肢冷喘急。

【處方】黑鉛二兩 硫黃二兩 破故紙 炒茴香 上沉香 煨肉果 制附子 川棟子 胡蘆巴(酒炒)

廣木香 陽起石各一兩 肉桂五錢(去粗皮)

【制法】先將黑鉛入鐵勺內煇化，再將硫黃放入，制成砂粒狀時，傾出攤地上，退去火氣後，研為極細，與另研之其各藥細末和勻，置乳鉢中，乳研至黑色光亮為度，加糯米糊為小丸，每錢約做五十粒。

【劑量及用法】每次用量一錢，一日二次，用姜棗湯吞服。

五、武漢(黑錫丸)

【功能與主治】痰壅吐瀉，虛損癱瘓，男子精冷滑瀉，腳膝酸軟，女子虛寒帶下，腰背重痛。

【處方】制硫黃二兩 黑錫二兩 沉香 烏附片 破故紙 小茴香 肉豆蔻 金鈴子 廣木香各一兩 肉桂五錢 胡蘆巴 巴戟天各一兩

【制法】將黑錫入小鐵鍋內熔化，加硫黃，結成砂了，出火毒，與羣藥混合碾細，照淨粉量加淀粉40%，用適量之水制成小丸，每錢不得少于四十粒。

【劑量及用法】每服一錢，日服一次，溫開水送下，淡鹽湯亦可。

六、廣州

【功能與主治】心臟性喘息。

【處方】黑鉛二兩 硫黃二兩 沉香 附子(炮) 胡蘆巴(酒浸炒) 陽起石(煨研細木飛) 破故紙 舶上茴香(炒) 肉豆蔻(麵裹煨) 金鈴子(酒蒸去皮核) 木香各一兩 肉桂五錢

【制法】將上列各藥，個別依法制妥後，和勻共研為細末，拌米糊制成小丸。

七、福州

【功能與主治】治陰火逆中，真陽暴脫，氣喘痰鳴之急症。

【處方】黑錫二兩 硫黃二兩 胡蘆巴五錢 故紙一兩 小茴一兩 沉香五錢 木香一兩 肉桂五錢 附子五錢 金鈴子一兩 肉蔻一兩(霜)

【制法】將黑錫同硫黃炒透至無聲為度，研末和糊為丸。

八、杭州(局方黑錫丹)

【功能與主治】治元氣衰憊，上盛下虛，痰飲喘逆，奔豚上氣，四肢

厥冷、陽氣欲脫、男子精冷滑泄，婦人宮寒帶下等症。此丹為鎮納陽氣，調和升降，墜痰定喘，扶元固脫之要藥。

【處方】黑鉛二兩 硫黃二兩

貢沉香 制附子 胡蘆巴(酒炒) 陽起石(醋煨研細) 補骨脂 廣木香 小茴香 巴戟肉 煨肉蔻 川棟子各一兩 肉桂五錢

【制法】將黑鉛入鐵內熔化，投入硫黃，急炒成砂，傾地上出火毒，研令極細。再將各藥研為細末，和勻，酒調麥糊為丸，陰干用布袋擦令光瑩。

【劑量及用法】每服百丸，姜湯或淡鹽湯送下。

九、南昌

【功能與主治】陰寒腹痛吐瀉，四肢厥冷，虛喘汗出等症。

【處方】黑鉛二兩 硫黃(先用豆腐煮硫黃將鉛溶化後入硫黃同炒盡煙為度研末)二兩 沉香 附片(炮) 胡蘆巴(酒浸炒) 陽起石(煨研細水飛) 補骨脂 小茴香(炒) 肉豆蔻(面裹煨) 川棟子(酒蒸去皮核) 廣木香各一兩 上肉桂五錢

【制法】黑鉛、硫黃另制，余藥共研細末酒水為丸，用黑鉛硫黃末和酒為衣如芥子大。

【劑量及用法】每服五分至一錢，空腹時溫開水送下，淡鹽湯、大棗湯、姜湯亦可，婦人艾湯送下。急症可服一錢。

【禁忌】孕婦忌服。

十、沙市

【功能與主治】治脾胃虛寒，痰飲上逆，奔豚喘促，腳氣上攻等症。

【處方】黑錫二兩 硫黃二兩 將錫溶化，投入硫黃急炒成砂候冷研末再入後藥 肉果(煨)一兩 小茴香一兩 沉香五錢 破故紙一兩 安桂一兩 附塊一兩 上木香一兩 川棟子(酒蒸)一兩 胡蘆巴(酒浸炒)一兩 巴戟(酒浸炒)一兩

【制法】共研細末，用酒少許和水煮麵糊為丸，如梧桐子大，陰干後以布袋擦令光瑩。

【劑量及用法】每次服二、三錢，空腹淡鹽開水或姜湯送下，病重者

酌量再服。

【禁忌】因气管發炎痰熱喘促或腎臟發炎者忌服；孕婦忌服。

十一、重 庆

【功能与主治】升降陰陽，墜痰定喘。治真元虧損，上盛下虛，心火炎盛，腎水枯竭，三焦不和，嘔吐痰涎，男女精冷滑精，女性赤白帶下及陰虛、陰冷、四肢厥冷等症。

【处方】同北京。

【制法】黑鉛溶化，入硫黃去煙，結成砂子，攤地上出火毒，另研，肉豆蔻用霜，余藥研細末加肉豆蔻和勻，水泛為丸，再用鉛硫粉穿衣，陰干擦令光瑩，紙盒包裝。

【劑量及用法】一分起遞加一錢止。

十二、昆 明

【功能与主治】挽救虛脫。主治汗出腹痛，氣喘痰鳴。

【处方】黑錫 洋硫黃各四兩 天雄 沉香 胡蘆巴 廣香 上桂 肉豆蔻 破故紙 金鈴子 陽起石 炒小茴各二兩

【制法】黑錫、洋硫黃合炒酥為度，再入其他藥劑，研極細末，水疊為丸。

【劑量及用法】每服一錢，開水送服。

【禁忌】一切溫熱症忌服。

十三、西 安

【功能与主治】治命門火衰，心力衰弱，氣短喘促，或痰鳴胸滿，人汗大出，手足厥冷，元氣欲脫，及中心脚氣等症。

【处方】黑鉛 硫黃各三兩 肉果(去油) 茴香(大小均可) 破故紙各一兩 肉桂 制附子各五錢 木香 川棟子各一兩 胡蘆巴五錢(或加陽起石(煨)一兩 沉香五錢)

【制法】先將鉛在鐵勺內溶化，再將硫黃加入于鉛上，急以鏟搗拌，使鉛與硫黃結成砂狀而色成赤色為適，冷后研末，不能研細末者為未化之鉛，應除去勿用，再將各藥研細末，與鉛末混合勻，用酒煮糊成丸，如梧桐子大，陰干以布袋擦令光亮，密藏瓶中。

【劑量及用法】成人每服四、五十丸，姜湯送下，一日二次。

【備考】鉛與硫黃化合，一部分變成硫化鉛，另一部分變成氧化鉛，有劇毒，應謹慎，不可多用，並應憑醫生升方使用。

十四、蘭 州

【功能与主治】暖腹，開胃，止痛，助消化。主臍腹冷痛，四肢疼痛，大便稀瀉，冷汁作嘔。

【处方】川棟子 廣木香 肉豆蔻 破故紙 小茴香各一兩 九制蘆巴子 益沉香各五錢

【制法】共為細面。用硫黃、黑錫各二兩合炒成砂狀，候冷將以上藥，再加在一起，攪勻研細，黃酒打糊為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送服。

十五、濟 南

【功能与主治】痰壅氣逆，頭眩喘促，冷氣刺痛，腰背沉重，男子精冷滑瀉，女子虛寒帶下等症。

【处方】肉桂五錢 沉香 附子 胡蘆巴(酒浸炒) 小茴香(炒) 補骨脂(酒浸炒) 肉豆蔻(面煨) 金鈴子(酒炒去核) 廣木香 硫黃 黑錫 陽起石(酒煮焙干研)各一兩

【制法】將黑錫入鐵鉢內，溶化入硫黃，結成砂子，出火毒，研極細，與羣藥和勻，每兩用白面二錢，酒糊為丸，每兩分作二百粒。

【劑量及用法】每服十粒，日服二次，溫開水送下，淡鹽湯亦可。

【禁忌】忌食腥冷。

十六、青島(回生黑錫丹)

【处方】沉香 炒附子 胡蘆巴 肉桂各五錢 小茴香 破故紙 肉豆蔻 木香 金鈴子各一兩 硫黃 黑鉛各二兩

【制法】用鐵鍋先將鉛溶化，再將硫黃入內煨盡為度，共軋細面，江米糊為丸，如綠豆大。

十七、沈 陽

【功能与主治】鎮靜祛痰，強心，納氣歸經，潛陽固脫。主頭痛喘嗽，痰壅氣逆，甚則喘息欲脫，下虛寒冷，精竭氣脫，赤白濁帶，精氣不固。

【处方】補骨脂一兩 茴香一兩 胡蘆巴五錢 肉桂一兩 肉桂五錢 黑附子五錢 木香一兩 金櫻子一兩 沉香五錢 巴戟五錢 硫黃三

錢 黑鉛三錢 陽起石五錢

【制法】先將硫黃與黑鉛同炒為珠，再入羣藥為極細面，以面糊為小丸。

【劑量及用法】每服一分至一錢，姜湯送下。

附參考古方

【来源】太平惠民和劑局方。

【功能与主治】治脾元久冷，上實下虛，胸中痰飲或上攻頭目微痛。目眩昏眩及奔豚氣上沖胸腹，連兩肋膨脹，刺痛不可忍，氣欲絕者；及陰陽氣不升降，飲食不進，面黃羸瘦，肢體浮腫，五種水氣，脚氣上攻；及牙齦腫痛，滿口生瘡，齒欲落者。兼治脾寒心痛，冷汁不止。或辛暴中風，痰壅上膈，言語艱澀，神昏氣亂，喉中痰响，狀似難緩，曾用風藥，吐不出者，宜用此藥白粒，煎姜棗湯灌之，壓下風涎，即時甦省，風涎自利。或感冒寒邪，霍亂吐瀉，手足逆冷，唇口青黑；及男子陽事痿怯，脚膝酸軟，行步乏力，臍腹虛鳴，大便久滑；及婦人血海久冷，白帶赤下，久無子，血氣攻注頭面四肢，並宜服之。兼療胸膈煩壅，痰飲虛喘，百病不愈者。常服起化飲食，養精神，生陽逐陰，消磨冷滯，除濕破癖，不動真氣，使五臟安寧，六腑調暢，百病不侵。

【处方】金鈴子(蒸，去皮核) 胡蘆巴(酒浸，炒) 木香(不見火) 附子(炮去皮臍) 肉豆蔻(鹽裹，煨) 破故紙(酒浸，炒) 沉香(不見火) 茴香(舶上者，炒) 陽起石(酒煮一日，焙干，研)各一兩 肉桂(不見火)半兩 黑錫(去滓，淨秤) 硫黃(透明者結子)各二兩

【制法】上用黑蓋，或新鐵鉢內，如常法，結黑錫硫黃砂子地上，出火毒，研細余藥，並杵羅為末，都一處和勻，入研，自朝至暮，以黑光盡為度，酒糊丸，梧子大，陰干布袋內，擦令光瑩。

【劑量及用法】每三、四粒，空心姜鹽湯或棗湯下，如人又醋湯下。

大活絡丹

一、北京(活絡丹)

【功能与主治】舒筋活絡，祛風除濕豁痰。主中風癱瘓，卒然昏迷，

半身不遂，筋絡拘攣，腰腿沉重，風濕痺痛。

【處方】蕪蛇，四兩 藿香 何首烏 大黃(制) 白芷 麻黃 羌活 黃芩 竹節 香附 沉香 玄參 肉桂 天麻 甘草 黃連 熟地各三十兩 烏蛇肉 地龍肉 全蠍各七兩五錢 青皮 香附 虎骨(油炙) 木香 黑附子 細辛 天竺黃 白朮 烏藥 松香脂 茯苓 人參(去蘆) 殭蠶 公丁香 龜板(炙) 申薑 沒藥 紫豆蔻 乳香 赤芍各十五兩 葛根 威靈仙 當歸各十七兩五錢 防風二十七兩五錢 血竭 一兩二錢五分 共為細粉，每九百四十七兩七錢五分細粉兌：麝香五兩四錢 犀角六兩六錢 硃砂十八兩 冰片一兩八錢 牛黃一兩

【制法】上藥和勻，煉蜜為丸重一錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天津(活絡丹)

【功能與主治】舒筋活絡，去風散寒，鎮痙止痛。主四肢麻木，腰腿疼痛，半身不遂，言語不清，手足拘攣。

【處方與制法】蕪蛇肉 烏蛇肉 靈仙 制草烏 天麻 全蠍 制首烏 制龜板 麻黃 貫眾 甘草 羌活 藿香 烏藥 黃連 熟地 广木香 熟軍 沉香各二兩 細辛 赤芍 制沒藥 公丁香 制乳香 炒殭蠶 制南星 青皮(醋炒) 骨碎補 白朮 制附子 黃芩 香附(酒制) 元參(去蘆) 白朮(麸炒) 各一兩 防風二兩五錢 血竭七錢 制松香 地龍各五錢 葛根 制虎骨 當歸各一兩五錢 肉桂(去粗皮)二兩 人參(去蘆)三兩 竹節 香附一兩 共為細粉，每細粉四斤四兩七錢兌：犀角粉五錢 麝香五錢 牛黃一錢五分 冰片一錢五分 安息香一兩

【制法】以上研細和勻，煉蜜為丸，一錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、上海

【功能與主治】舒經活絡，祛風行血。

【處方】牛黃一錢五分 青皮(酒炒)一兩 葛根一兩五錢 冰片一錢五分 烏梢蛇(去頭骨尾)二兩 公丁香 乳香(制) 沒藥(制) 各一兩 犀角五錢 貫眾二兩 地龍 麝香各五錢 苣荳蔻 白朮(炒) 細辛 赤芍藥 殭蠶(炒) 玄參 申姜(去毛) 香附(制) 黃芩(酒炒) 南星(制) 附子(泡去皮制)各一兩 松香(制)五錢 天麻(煨) 木香 首烏(制) 蕪蛇(去頭骨尾) 草烏(制) 藿香 威靈仙 全蠍(漂淡) 官桂 羌活 龜板(炙) 甘草(炙) 沉香 黃連 大黃(制) 熟地 烏藥 麻黃(去毛)各二兩 虎骨(炙) 當歸各一兩五錢 防風二兩五錢 人參三兩 血竭七錢

【制法】各取細粉，充分和勻，煉蜜為丸，每丸潮重一錢二分，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，黃酒化服。

【禁忌】孕婦禁忌。

【備考】無虎骨可用豹骨。

四、南京(大活絡丸)

【功能與主治】疏風祛痰，活血通絡。主關節疼痛，手足拘攣，肌膚麻木，肢軟偏廢。

【處方】人參三兩 川黃連二兩 制附子一兩 白花蛇二兩 熟地黃二兩 制香附一兩 烏梢蛇二兩 制大黃二兩 玄參一兩 威靈仙二兩 广木香二兩 白朮一兩 制草烏二兩 元香二兩 防風二兩五錢 明天麻二兩 北細辛一兩 葛根一兩五錢 全蠍二兩 赤芍一兩 制虎骨一兩五錢 制首烏二兩 公丁香一兩 西當歸一兩五錢 制龜板二兩 制乳香一兩 硃血竭七錢 麻黃二兩 制沒藥一兩 地龍五錢 貫眾二兩 殭蠶一兩 烏犀角五錢 炙甘草二兩 制南星一兩 麝香五錢 川羌活一兩 青皮一兩 松脂五錢 官桂二兩 骨碎補一兩 西牛黃一錢五分 廣藿香二兩 白苣仁一兩 梅片一錢五分 台烏藥二兩 淡黃芩一兩 蘇合香油一兩 兩天竺草二兩

【制法】上藥生晒，共研細末，各取淨粉，細料另乳后下，和勻，以蘇合油烱化加煉蜜為丸，每粒潮重一錢五分，用蜡壳封護。

【劑量及用法】每服一丸，每晚臨臥時用黃酒化開溫服。

【禁忌】孕婦忌服。

五、武漢

【功能與主治】口眼喎斜，半身不遂，筋骨拘攣，手足麻木疼痛，小兒驚癇，婦女停經。

【處方】白花蛇(酒浸，焙干)二兩 烏梢蛇(酒浸，焙干)二兩 麻黃(去節)二兩 防風 炙甘草 官桂 草豆蔻 羌活 玄參 天麻 藿香 何首烏 白芷 黃連 黃芪 熟地 綿紋大黃各二兩 細辛 赤芍 硃砂(水飛) 沒藥(去油) 乳香(去油) 殭蠶(去黑嘴) 天竺黃 敗龜板(米泔水漂酥炙) 丁香 虎脛骨(酥炙) 台烏藥 青皮 黑附子 白苣仁(炒) 骨碎補 白茯苓 白朮(土炒) 當歸(酒洗) 沉香各一兩 全蠍(去尾勾)一兩半 葛根一兩半 威靈仙一兩半 血竭七錢半 犀角二錢 麝香二錢 地龍五錢 松香五錢 川芎二兩 牛黃二錢半 冰片二錢半

【制法】除麝香、冰片外，進行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜125—130%，和成大丸，重一錢，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，溫酒或開水送下，日二次。

【禁忌】孕婦忌服。

六、福州(聖濟活絡丹)

【功能與主治】治一切中風，癱瘓，痿痺，痰厥，拘攣疼痛，癰疽流注，跌仆損傷，小兒驚癇，婦女停經等症。

【處方】白花蛇 烏梢蛇 威靈仙 兩頭尖(以上黃酒浸) 制草烏 明天麻(煨) 全蠍(去毒) 何首烏(黑豆水浸) 蘇龜板(炙) 麻黃草 貫眾草 炙甘草 川羌活 油官桂 真藿香 天台烏 川黃連 熟地 香大黃(蒸) 广木香 真沉香各一兩 北細辛 赤芍藥 制沒藥 公丁香 制乳香 真殭蠶 制南星 大青皮 骨碎補 香白苣 安息香 黑香附 枯黃芩 烏附子 黑元參 漂白朮各五錢 粉葛根

秦当归 正虎骨(炙)各七錢半 軟
防風一兩二錢半 正血竭一錢半
地龍(炙) 正犀角 松脂各二
錢半 真牛黃七分半 正片腦七分
半 真人參一兩半 原寸香二錢半

【制法】共研細末，老蜜煉丸，每
電一錢，金箔衣，全員式蜡封。

七、杭州(聖濟大活絡丹)

【功能与主治】專治頑痰惡風、
熱毒瘀血入于經絡，一切中風癱瘓，
痿痹痰厥，腿膝痠痛，四肢麻木，筋
脈拘攣，步履艱難，以及風寒入腦，
頭脹耳鳴，癰疽流注，跌仆損傷。並
治婦人停經，產後血瘀。小兒驚癇
諸症。此丹宣暢氣血，通利經絡。

【處方】蕪蛇(去骨並頭尾取淨
肉酒浸) 制白附子 烏梢蛇(黃酒
浸焙) 威靈仙 制草烏 煨天麻
淨全蠍 制首烏 制龜板 麻黃
貫眾 炙甘草 羌活 肉桂 廣
藿香 烏藥 川黃連 大熟地 制
大黃 廣木香 貢沉香各二兩 北
細辛 赤芍藥 沒藥(去油) 公丁
香 乳香(去油) 炒殭蠶 制南星
金銀香 制附子 小青皮 骨碎
補(烘燥) 白豆蔻 黃芩 白茯苓
制香附 烏元參 於朮各一兩 青
防風二兩五錢 葛根 虎脛骨 全
当归(酒炒)各一兩五錢 血竭七錢
廣地龍 犀角 麝香 制松香各五
錢 西牛黃一錢五分 梅冰片一錢
五分 吉林人參三兩

【制法】上藥研取淨粉，煉白蜜
打丸，湖重一錢五分，金箔為衣，蜡
壳封固。

【劑量及用法】每服一至二丸，
細嚼溫酒或開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

八、沙市

【功能与主治】治風痰湧甚，熱
毒瘀血入于經絡，癱瘓痿痹，拘攣疼
痛，癰疽流注，跌仆損傷等症。

【處方】白花蛇(酒浸) 烏梢蛇
(酒浸) 威靈仙(酒浸) 兩頭尖
(酒浸) 草烏 天麻 全蠍(去毒)
龜板(炙) 何首烏(黑豆水浸) 麻
黃 貫眾 甘草(炙) 羌活 中
安桂 廣藿香 大台烏 黃連 熟
地 大黃 廣木香 沉水香各二兩
細辛 赤芍 沒藥(去油) 公丁
香 乳香 殭蠶 南星(薑制) 青

皮 骨碎補 白蔻仁 安息香(酒
燉) 附塊 黃芩 茯苓 香附
(酒浸) 玄參 白朮各一兩 防風
二兩五錢 粉葛一兩五錢 虎脛骨
(炙) 一兩五錢 当归一兩五錢 血
竭七錢 地龍(炙) 烏犀角 麝香
松節各五錢 牛黃一錢五分 正梅
片一錢五分 麗參一兩

【制法】煉蜜為丸，重一錢，金箔
為衣，蜡壳護之。

【劑量及用法】每次服一丸，溫
開水下(或兌酒少許)，病重者酌量
再服。

【禁忌】體質虛弱而無風痰者忌
服。

九、重慶

【功能与主治】治一切中風癱
瘓，痿痹痰厥，拘攣疼痛，癰疽流注，
跌仆損傷，小兒驚癇，婦女停經。

【處方】白花蛇 烏梢蛇 草烏
全蠍 龜板 威靈仙 兩頭尖 天
麻 何首烏 麻黃 熟地 炙甘草
貫眾 羌活 官桂 烏藥 沉香
黃連 大黃 廣木香 藿香各二兩
赤芍 細辛 沒藥 乳香 丁香
殭蠶 天南星 青皮 白豆蔻 安
息香 制附子 黃芩 香附 玄參
白朮各一兩 防風二兩五錢 葛根
虎骨 当归各一兩五錢 血竭七錢
犀角 麝香 松脂各五錢 牛黃
龍腦香各一錢五分 黨參二兩 骨
碎補一兩 地龍五錢

【制法】共研細末，煉蜜為丸重
一錢，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，小兒
減半。

十、西安

【功能与主治】治風濕關節痛
痹，中風偏癱(半身不隨)，單癱(手
足不隨，舉動行步艱難)，顏面神經
麻痺及癱瘓(口眼歪斜)，肝腸肌癱
瘓(筋骨拘攣)，或血虛亢進，動脈
硬化之諸般動作緩慢，容易蹉跌，
或癱發癱瘓樣癱瘓等病症。

【處方】白花蛇 烏梢蛇 靈仙
兩頭尖(俱酒浸) 草烏 天麻
(煨) 全蠍 首烏(黑豆水浸) 炙
龜板 麻黃 貫眾 炙草 羌活
官桂 藿香 烏藥 黃連 熟地
熟大黃 木香 沉香各二兩 細辛
赤芍 沒藥 乳香 丁香 殭蠶

制南星 青皮 骨碎補 白蔻 安
息香(酒蒸化) 熟附子 黃芩(蒸)
云苓 香附(酒炒) 元參 白朮
各一兩 防風二兩半 葛根 虎脛
骨(炙) 当归各一兩五錢 血竭七
錢 地龍(炙) 犀角 麝香 松節
各五錢 牛黃 片腦各一錢五 人
參一兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸，重
一錢，金箔為衣。

【劑量及用法】每次服一丸至二
丸，一日二次，開水送下或酒服。

【禁忌】中風初發體溫增高，神
智未復時，以及孕婦忌用。

十一、蘭州(活絡丹)

【功能与主治】此藥舒肝活血，
除濕化痰。主風濕麻痺，四肢麻木，
腰腿疼痛，筋骨疼痛，痰熱熾盛，卒
然昏迷。

【處方】蕪蛇肉 虎骨 苓塊
草蔻 白蔻 羌活 毛姜 首烏
酒軍 靈仙 烏蛇肉 元參 地龍
細辛 烏藥 天麻 青皮 黃連
乳香 沒藥 白附子 蝎子 黃
芩 赤芍 麻黃 当归 元桂 葛
根 酒地 殭蠶 香附子 甘草
桂枝 杜仲 川芎 白芷 防風
龜板 藿香 白朮 廣木香 血竭
花 天竹黃 公丁香 油松節 川
牛膝 梅片各五錢 麝香二錢 犀
角二錢 麗參一錢 硃砂五錢 益
沉香五錢 牛黃一錢 安息香五錢

【制法】共研細末，煉蜜為丸，一
錢重，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開
水送服，每天二丸。

【禁忌】孕婦忌服。

十二、大同

【功能与主治】風痰諸痹，麻木
不仁，筋骨拘攣，步履艱難。

【處方】白花蛇二具 沒藥 青
皮 黃芩 白朮各一兩 烏梢蛇二
兩 乳香 蔻仁 虎骨 骨碎補各
一兩 麻黃二兩 丁香 茯神 草
蔻 川芎各一兩 防風二兩 殭蠶
附片 鉤藤 石楠叶 各一兩
細辛二兩 竹黃 元參 靈仙 白
芷各一兩 兩頭尖二兩 龜板 藿
香 黃連 熟地各一兩 甘草二兩
烏藥 大黃 当归 木香各一兩
川芎二兩 全虫一兩五錢 葛根

一兩五錢 首烏二兩五錢 血竭五錢 赤芍一兩 生地五錢 松节五錢 硃砂 麝香 安息香 冰片 沉香各一兩 犀角五錢 麝香一錢

【制法】共為細面，煉老蜜為丸一錢重，金箔滿衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每次一丸，重者每日二次，黃酒送下。

十三、禹 县

【功能與主治】中風癱瘓，痿痹痰厥，拘攣疼痛，半身不遂。

【處方】白花蛇 烏梢蛇各二兩 赤芍一兩 防風二兩五錢 當歸一兩五錢 羌活二兩 冰片一錢五分 草烏二兩 明天麻二兩 丁香一兩 麻黃一兩 黃芩一兩 香附一兩 犀牛角五錢 黃連一兩 松脂五錢 熟地二兩 首烏二兩 骨碎補一兩 白朮一兩 殭蠶一兩 潞黨參二兩 藿香二兩 安息香一兩 官桂二兩 烏藥二兩 白芷一兩 大黃一兩 延胡索一兩 沉香二兩 青皮一兩 甘草二兩 玄參一兩 葛根一兩五錢 黑附子一兩 天南星一兩 龜板二兩 豹骨一兩五錢 地龍五錢 兩頭尖二兩 血竭七錢 麝香五錢 牛黃一錢五分 全蝎二兩 茯苓一兩 木香二兩 威靈仙二兩 乳香一兩 沒藥一兩 貫眾二兩

【制法】共為面，煉蜜為丸，每丸重一錢，赤金為衣。

【劑量及用法】每服一丸，白酒送下。

【禁忌】孕婦及小兒忌用。

【備考】有效期二年。

十四、濟 南

【功能與主治】半身不遂，筋脈攣急，腰腿沉重，風濕疼痛。

【處方】白花蛇(酒焙) 烏梢蛇(酒焙) 威靈仙(酒焙) 草烏 天麻(煨) 全蝎(去毒) 首烏(黑豆水浸) 龜板(制) 麻黃 貫眾 炙甘草 羌活 官桂 藿香 烏藥 黃連 熟地 大黃 廣木香 沉香各二兩 細辛 赤芍 沒藥(去油另研) 公丁香 乳香(去油另研) 殭蠶 南星(姜制) 青皮 骨碎補 薏仁 安息香 黑附子(制) 黃芩 茯苓 香附(酒浸焙) 元參 白朮各一兩 防風二兩五錢

葛根 虎骨(制) 當歸各一兩五錢 血竭七錢 地龍五錢(酒制) 犀角五錢(另研) 冰片一錢五分 黨參一兩 麝香五錢(另研) 松枝五錢 牛黃一錢五分(另研)

【制法】上藥為末，蜜丸，重一錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】成人每服一丸，每日服一次，黃酒送下或白開水送下。

【禁忌】忌食腥葷，生冷及有刺激性之食物，孕婦及類中風(即血壓高)忌服。

十五、青島(神效活絡丹)

【處方】烏梢蛇(酒炒)三錢五分 麻黃 川芎各五錢 全蝎三錢五分 干葛三錢五分 細辛二錢五分 赤芍三錢五分 兩頭尖 犀角各三錢五分 防風五錢 地龍一錢三分 青皮二錢五分 炙草 丁香 殭蠶 乳香 沒藥 肉桂 草薢 川羌 虎骨 元參各二錢五分 天麻三錢 龜板 竺黃 人參 白芷 藿香 靈仙 首烏 香附 附子 黃芩 白朮 薏仁 申姜各二錢五分 茯苓三錢 當歸三錢五分 松节一錢五分 黃連 大黃 生地 木香 沉香各五錢 血竭三錢五分 硃砂一兩二錢 冰片一錢 麝香一錢 牛黃五分

【制法】共為細面，煉蜜為丸，重一錢，蜡皮封固。

十六、沈陽(1)(活絡丹)

【功能與主治】舒筋活絡，止痛舒風。主中風癱瘓，痰厥拘攣，打仆創傷，癱疽流注，小兒驚癇，婦女經閉，接骨疼痛，一切風症。

【處方】熟地 木香 白花蛇 威靈仙 草烏 全蝎 龜板 貫眾 羌活 藿香 黃連 大黃 沉香 烏藥 官桂 甘草 麻黃 首烏(黑豆水浸) 兩頭尖 烏蛇各二兩 細辛 沒藥 丁香 天南星 骨碎補 黑附子 黃芩 香附 白朮 赤芍 乳香 殭蠶 青皮 白豆蔻 安息香 元參各一兩 防風二兩半 葛根 虎骨 當歸各一兩半 血竭(另研)七錢 地龍 犀角 松节各五錢 人參三兩 牛黃(另研) 龍腦(另研)各一錢半

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸。

大丸一錢四分，小丸七分，金箔為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】忌食豬肉、菜蕪、鹽、魚、葱、蒜。

十七、沈陽(2)(活絡丹)

【功能與主治】舒筋活絡，祛風止痛。主中風癱瘓，痰厥拘攣，打仆創傷，痿痹疼痛。

【處方】白花蛇肉 烏蛇 防風 細辛 赤芍 紅參 公丁香 乳香 殭蠶 盤沉 天竺黃 龜板 烏藥 青皮 紫菀 申姜 白茯苓各五錢 水安息一兩 片砂砂五錢 麻黃 全蝎(去勾) 當歸 葛根 兩頭尖 草薢 羌活 元參各一兩 麝香二錢五分 廣角二錢五分 藿香 威靈仙 白芷 黃連各一兩 血竭 花一錢五分 甘草 熟地 大黃 廣木香各一兩 梅片 地龍各二錢五分 附子五錢 首烏一兩五錢 松节二錢五分 虎腿骨三兩 川芎一兩 黃芩 焦朮各五錢

【制法】硃砂、麝香、血竭花、冰片另研，與余共碾極細面，煉蜜為丸，大丸二錢 小丸一錢，蜡皮封固。

【禁忌】孕婦忌服。

十八、撫 順

【功能與主治】祛風化痰，活絡鎮痙。主中風卒然昏倒，不省人事，左癱右瘓，半身不遂，四肢麻痺，不能運用，知覺全無，顏面神經麻痺，舌強難言，以及風濕痹痛，筋骨拘急，不能伸屈，神經痛，步履艱難等症。

【處方】白花蛇 烏蛇 防風 赤芍 羌活 黃連 川芎 杜仲各一兩 首烏一兩半 云苓五錢 川牛膝一兩 殭蠶五錢 靈仙 全蝎 藿香 當歸 熟地各一兩 紫菀五錢 川附子五錢 大黃一兩 黃芩五錢 元參 桂枝 草薢各一兩 青皮五錢 血竭 甘草 葛根各一兩 沉香五錢 申姜五錢 白芷一兩 龜板五錢 紅人參五錢 沒藥一兩 公丁香五錢 白朮五錢 香附一兩 於朮一兩 烏藥 硃砂 天竺黃各五錢 松节二錢五 細辛一兩 麻黃五錢 黃柏一兩 乳

香五錢 麝香四錢 地龍二錢五
廣木香一兩 虎骨五錢 冰片一錢
犀角五錢 牛黃一錢

【制法】共為細面，蜜丸一錢或二錢重，蜡皮封。

【劑量及用法】每服一丸，姜水送下，黃酒亦可。

【禁忌】孕婦忌服。

十九、承德

【功能與主治】半身不遂，筋肉掣急，腰腿沉重，風濕疼痛。

【處方】舊香 何首烏 熟大黃 麻黃 草豆蔻 青皮 虎骨 黑附子 葛根 當歸 細辛 天竺黃 白朮 白芷 川芎 羌活 制香附 木香 沒藥 威靈仙各十七兩五錢 斷蛇十四兩 麝香五兩四錢 硃砂十八兩 牛黃三兩 兩頭尖一斤四兩 血竭十一兩二錢五分 犀角六兩六錢 冰片一兩八錢 黃芩一斤四兩 申薑十五兩 沉香 玄參 肉桂 天麻 甘草 黃連 熟地各一斤四兩 烏蛇 地龍 全蠍各七兩五錢 松香 茯苓 人參 殭蠶 公丁香 龜板 沒藥 紫豆蔻 乳香 赤芍各五兩 防風二斤五兩五錢

【制法】牛黃、麝香、犀角、冰片、硃砂、血竭另研，與羣藥共為細粉，煉蜜為丸，重一錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。

小活絡丹

一、上海

【功能與主治】主寒濕侵襲經絡作痛。

【處方】川烏(制) 草烏(制) 干蚯蚓(炙) 胆星各六兩 乳香(制) 沒藥(制)各二兩二錢

【制法】各研細粉和勻，煉蜜為丸，每丸潮重一錢。

【劑量及用法】每服一丸，黃酒送服。

【禁忌】孕婦忌服。

【備考】憑醫師處方購用。

二、南京

【功能與主治】主寒濕侵襲經絡，肢體作痛，不能屈伸，麻木不仁，及跌打損傷日久疼痛不愈者。

【處方】同上海。

【制法】上藥共研細末，陳胆星另研用黃酒化開，酌加煉蜜為丸，一錢重，蜡紙裹護(不用蜡壳)。

【劑量及用法】每服一丸，飯前用黃酒加開水化服。

【禁忌】孕婦忌服。

三、武漢

【功能與主治】瘀血頑癢，停聚經絡，麻木不仁，肢體不能屈伸或作痛，並治跌打損傷。

【處方】制川烏 制草烏 胆星各六兩 地龍(洗淨焙干) 乳香(制) 沒藥(制)各二兩二錢

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜105—110%，和成大丸，每丸重一錢，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一錢，溫酒或開水送下。

【備考】痛處色紅腫者勿用，孕婦忌服。

四、福州

【功能與主治】專治中風，手足不仁，經絡中有濕痰，死血，腦臂間忽有一二點痛日久不愈者。

【處方】同武漢。

【制法】共研細末，胆星烔化，和蜜為丸，每丸壹錢五分(原重六分)。

五、杭州(獨痛活絡丹)

【功能與主治】治寒濕風痰入丁經絡，肢體作痛，不能屈伸，跌打損傷，瘀血凝滯等症。此丹祛風活血，化痰通絡。

【處方】川烏(姜汁制) 草烏(姜汁制) 杜胆星各六兩 廣地龍二兩 乳香(去油) 沒藥(去油)各二兩五錢

【制法】共研細末，煉白蜜為丸，每重一錢，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，溫酒送下。

六、南昌

【功能與主治】中風手足不仁，經絡中有濕痰，死血，臂間忽有一二點痛日久不愈者，並治小兒急驚風。

【處方】同武漢。

【制法】共研細末，胆星烔化，酌加煉蜜為丸，每丸潮重一錢(蜡護)。

【劑量及用法】每服一丸，陳酒

風 痰 類

送下。小兒視年齡及病情酌減服。

【禁忌】孕婦忌服。

七、沙市

【功能與主治】治濕痰、敗血瘀于經絡，唇口牽引，掣痛，肩臂腰腿麻木不仁等症。

【處方】同武漢。

【制法】上藥研細末，煉蜜為丸，每丸重一錢，蜡壳護之。

【劑量及用法】每次服一丸，溫開水下(或兌酒少許)，病重者酌量再服。

【禁忌】體虛而無風痰者忌服。

八、禹縣

【功能與主治】主治諸風，筋脈牽掣，遍身疼痛，手足麻木，口眼歪斜，半身不遂，寒痰相搏。

【處方】同武漢。

【制法】共為細面，白蜜為丸，金箔為衣，每丸一錢重。

【劑量及用法】每服一錢，男子蒸酒引，婦女黃酒引。

【禁忌】氣弱者及孕婦忌用。

【備考】有效期一年半。

九、濟南

【功能與主治】肢體疼痛，麻木拘攣。

【處方】川烏(制) 地龍(炙) 草烏(制)各六兩 乳香二兩二錢(制) 胆南星六兩 沒藥六兩二錢(制)

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重一錢。

【劑量及用法】每服一丸，陳酒送下，白開水亦可。

【禁忌】孕婦忌服。

十、哈爾濱

(活絡丹、追風活絡丹)

【功能與主治】溫榮活絡，逐瘀止痛。主風寒濕氣，合而為痹，血液凝結，經絡閉塞，肢節筋骨疼痛，或痛有定處，或遊走無定，肢體不能屈伸。跌打損傷，瘀血凝結，疼痛異常。

【處方】川烏頭(泡去皮臍) 草烏頭(泡去皮臍) 地龍(去土) 天南星(泡中胆制)各四兩二錢 滴乳香 明沒藥(酒研飛，晒干)各一兩五錢四分

【制法】共研为細粉，酒煮面糊为丸，如梧桐子大，干透；或煉蜜为丸，七分重，大赤金衣。

【剂量及用法】面糊丸每服二、三十粒，蜜丸每服一丸，空腹日午用冷酒或荆芥湯或四物湯化下。

【禁忌】孕妇忌服，痛处色紅腫者勿用。

【备考】蜡皮封，切忌混入生水，致易生虫；或瓷罐存貯。

附参考古方

【来源】1. 太平惠民和剂局方。（活絡丹）

【功能与主治】治丈夫元臟气虛，妇人脾血久冷，諸般風邪濕毒之气留滯，經絡流注，脚手筋脉攣拳，或發赤腫，行步艱辛，腰腿沉重，脚心吊痛，及上冲腹脇膨脹，胸膈痞悶，不思飲食，冲心瀉亂，及一切痛風走注，渾身疼痛。

【处方】天南星（炮） 川烏（炮，去皮尖） 草烏（炮，去皮尖） 地龙（去土）各六兩 乳香（研） 沒藥（研）各二兩二錢

【制法】上为細末，入研藥和勻，酒麵糊丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二十丸，空心日午冷酒送下，荆芥茶下亦得。

2. 景岳全書。（活絡丹）

【功能与主治】治中風手足不用日久不愈，經絡中有濕痰死血者。

【处方】草烏（泡去皮） 川烏（泡去皮臍） 膽星各六兩 地龙（去土，焙干） 乳香（去油） 沒藥各二兩二錢

【制法】蜜丸桐子大。

【剂量及用法】每服一、三十丸，溫酒茶清任下。

追風活絡丹

天 津

【功能与主治】追風散寒，舒筋活絡。主腰背疼痛，跌打損傷，風濕麻痺，行步艱難。

【处方】獨活 續斷 天麻 秦艽各二兩 懷牛膝一兩 杜仲炭（鹽炒）一兩 骨碎補 血竭 紅花各二兩 防風二兩 當歸二兩 羌活 制乳香 制沒藥各二兩 土鱉虫一兩 制草烏一兩 川芎二兩 白芷一兩 寄奴一兩 麻黃三兩

木瓜一兩

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

舒筋活絡丹

一、濟 南(1)

【功能与主治】身体麻木，手足拘攣，行步艱難，举手难伸。

【处方】麻黃四兩 馬錢子二斤半（土炒） 乳香 沒藥 年健 地風 川芎 防風 桂枝 川牛膝 木瓜 杜仲 然銅（煨） 灵仙 五加皮 獨活 歸尾 广桂各二兩 地龙 并各半斤

【制法】共为細面，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服二錢，黃酒为引，白水送下。

【禁忌】忌食生冷；忌气怒。

二、濟 南(2)

【功能与主治】風濕諸痹，肩背腰腿筋骨疼痛，麻木不仁，半身不遂，口眼歪斜。

【处方】木瓜四兩 秦艽二兩 蕲蛇三兩 生耆四兩 乳香二兩 沒藥二兩 當歸四兩 紅花二兩 麻黃四兩 防風四兩 夏枯草一兩 土鱉四兩 牛膝二兩 獨活四兩 杜仲二兩 甘草一兩 冰片二兩 麝香五分

【制法】共为細面，煉蜜为丸，二錢五分重，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，黃酒送下，白水亦可。

通絡益氣丹

天 津

【功能与主治】除濕去風，活絡豁痰，鎮靜安神。主風濕內閉，痰涎壅盛，週身麻木，神志昏亂，肝熱上冲，头晕头眩，身重脚輕，常服預防血压高。

【处方】生山甲六兩 絳藜草一斤八兩 木瓜一斤十二兩 苏地龙一斤二兩 灵仙一斤八兩 海楓藤一斤十一兩 麻黃三兩 橘紅一斤二兩 殭蚕一斤八兩 薄荷一斤八兩 生牡蠣三斤 生龙骨一斤八兩

元明粉一斤八兩 黃柏十二斤 川牛膝一斤二兩 黑郁金十二兩 蒺藜一斤八兩 生磁石一斤二兩 生鱉甲四斤 夜交藤三斤 龍胆草一斤八兩 生梔子一斤八兩 車前子一斤一兩 菟絲子四斤 蕲蛇肉四兩五錢 紫貝齒一斤三兩 烏藥一斤二兩 蓮子心一斤一兩 法夏一斤八兩 藿香一斤八兩 砂仁一斤三兩 生白芍一斤八兩 黃豆卷十二兩 生赭石一斤三兩 广寄生六斤 復花十二兩 全蠍十二兩 雞血藤二斤四兩 生石決明二斤 伏苓（去皮）二斤四兩 青皮（醋炒）一斤二兩 共为細粉，每細粉七十六斤五兩五錢兌，琥珀面四兩 硃砂面九兩 瓜蒌三斤 胆星三斤 竹瀝水一兩五錢 生石決明六斤

【制法】將以上熬清膏和水打小丸，再用滑石四斤 生石膏八斤 知母四斤 花粉四斤 竺黃一斤八兩 竹茹粉四斤研細为衣，裝盒，每盒二兩重。

【剂量及用法】每服四錢，一天服二次，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

舒 筋 丹

天 津

【功能与主治】強筋壯骨，舒筋活血。主受風受寒，四肢麻木，筋骨疼痛，腰腿不利，行步艱難。

【处方】麻黃二兩 年健 地風 懷牛膝 羌活 獨活 制乳香 制沒藥 木瓜 桂枝 防風 杜仲炭（鹽炒） 甘草各一錢五分 馬錢子（沙燙去毛）二兩

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，一錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下。

【备考】遵医嘱服用。

愈 風 丹

一、天 津

【功能与主治】散風化痰，活血止痛。主半身不遂，腰腿疼痛，手足麻木，偏正頭痛，風寒濕痹。

【处方】當歸 天麻 防風 荆芥穗 麻黃 石斛 制首烏 羌活 獨活各一兩 制川烏 制草烏

炒蒼朮 白芷各四兩 川芎五錢
甘草一兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，二錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

二、濟南(1)

【功能與主治】癱瘓不遂，半身麻木，言語蹇澀。

【處方】當歸一斤十四兩 羌活一斤十四兩 天麻一斤十四兩 獨活一斤十四兩 防風一斤十四兩 川烏七斤八兩 首烏一斤十四兩 草烏七斤八兩 芥穗一斤十四兩 蒼朮七斤八兩 麻黃一斤十四兩 白芷七斤八兩 石斛一斤十四兩 川芎十五兩 甘草一斤十四兩

【制法】共軋細面，煉蜜為大丸，重二錢。

【劑量及用法】每次一至二丸，白開水送下。

【禁忌】忌發氣怒。

三、濟南(2)

【功能與主治】癱瘓不遂，半身麻木，言語蹇澀。

【處方】大麻 牛膝 草薢 元參各六兩 杜仲七兩(炒) 川芎十四兩 當歸 熟地 生地各一斤 獨活五兩 肉桂二兩

【制法】煉蜜為丸，每丸二錢半。

【劑量及用法】每次一至二錢，白開水送下。

靈應愈風丹

一、杭州

【功能與主治】治氣血虛弱，風邪所傷，筋骨疼痛，肢體麻木，手足不遂，諸風癱瘓等症。

【處方】明天麻六兩 杜仲七兩 大熟地十六兩 全當歸十六兩 肉桂二兩 烏元參六兩 獨活五兩 懷牛膝六兩 川草薢六兩 羌活十四兩 大生地十六兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢，開水送下。

二、青島

【處方】天麻 牛膝 草薢 元參各一兩 杜仲八兩 川芎四兩

當歸 熟地 生地各一斤 獨活五兩 肉桂二兩

【制法】共軋細末，煉蜜成丸。

三、呼和浩特

【處方】黃柏 麻黃 黃芩 川芎 黃連 獨活 細辛 九地 牛膝 防風 天麻 全蝎 人參 官桂 羌活 知母 杜仲 黃耆 柴胡 枳殼 薄荷 秦艽 白朮 防己 木鱉子 菊花 蒼朮 法夏 當歸 粉草各一兩

【制法】共為細面，蜜丸重二錢五分，硃砂為衣。

追風透骨丹

一、沈陽

【功能與主治】通經絡，散風濕，鎮痛祛寒。主風寒濕痹，四肢痠痛，神經麻痺，手足麻木，腰腿疼痛，邪滯經絡，步履艱難。

【處方】赤芍 麻黃 天南星 地龍 川芎 香附 草烏 川烏 細辛 白芷 甘草 赤小豆 羌活各一兩 硃砂八錢 秦艽 乳香 沒藥 桔梗 防風 甘松 天麻 當歸 茯苓各五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重，硃砂衣。

【劑量及用法】每服一丸，薑湯或黃酒化服。

【禁忌】孕婦忌服。

二、撫順

【功能與主治】疎風活絡鎮痙。主風寒濕症，經絡閉塞，神經麻痺，筋骨疼痛，項背疼痛，不能俯仰，四肢頑麻，難于屈伸等症。

【處方】川烏一兩 大芫五錢 香附 赤芍 川芎 細辛 南星 白芷 甘草各一兩 乳香二錢 沒藥二錢 云苓 天麻 防風 當歸 甘松各五錢 麻黃一兩 白朮五錢 地龍一兩 羌活一兩 桂枝五錢 草烏一兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重，硃砂為衣。

【劑量及用法】每服一丸，溫酒食前送服，出汗為度。

【禁忌】忌食腥辣；孕婦忌服。

三、吉林 (追風丹)、哈爾濱

【功能與主治】疎風化濕溫寒。主痹症，風寒濕氣合而為痹，經絡閉塞，筋骨疼痛，或發麻木，或動抽搐。風濕，風濕相搏，遇身疼痛，項背疼痛，不能俯仰，四肢頑麻，難于屈伸。

【處方】川芎 赤豆(飯用) 香附 羌活 川烏 赤芍 麻黃 細辛 首烏 南星 白芷 地龍 甘草各一兩 硃砂八錢 當歸一兩 白朮 天麻 防風 桂枝 甘松 茯苓 秦艽 沒藥 乳香各五錢

【制法】共碾為細面，煉蜜為二錢一分重丸，硃砂八錢為衣。

【劑量及用法】每服一丸，溫酒空腹服，取汗。

【禁忌】忌食腥辣，孕婦忌服。

透骨搜風丹

天津

【功能與主治】鎮風止痛，強筋健骨。主風濕痿痹，四肢麻木，腰痠腿軟，跌打損傷，虛寒腹脹。

【處方】菟絲子 枳殼(麩炒) 木通 制南星 米壳 香附(醋制) 莪朮(醋制) 全蝎 枳實(麩炒) 各十五兩 制川烏 制乳香各七兩五錢 杜仲炭(鹽炒) 荆芥 丹皮 干姜 生白芍各十五兩 廣木香七兩五錢 石楠藤 莖蓉(酒蒸) 木瓜各十五兩 公丁香 韭菜子 良姜各七兩五錢 炒殭蠶 制半夏 制沒藥 桔梗 烏藥 懷牛膝 生黃芪 砂仁各十五兩 甘草七兩五錢 五加皮 藿香 川芎 蘆巴子 麻黃各十五兩 山奈七兩五錢 防風 紅豆蔻各十五兩 大茴香 木賊 煨龍骨各七兩五錢 制虎骨 連翹(去心) 制厚朴 地骨皮 獨活 青皮(醋炒) 龜板(醋制) 天麻各十五兩 制草烏 細辛各七兩五錢 茯苓(去皮) 當歸 續斷 白芷 滑石 炒益智仁 杏仁(去皮炒) 炒蒼朮各十五兩 白豆蔻 制附子 青鹽各七兩五錢 陳皮 甘松 羌活 青楓藤 赤芍 栝子仁 海桐皮 熟地 吳萸(甘草水制) 各十五兩 川楝子(酒蒸) 七兩五錢 巴戟(甘草水制) 十五兩 白朮(麩炒) 七兩五錢 肉桂(去

粗皮)十五兩 破故紙(鹽炒)五
味子(酒蒸) 人參(去蘆)三稜
(醋制) 小茴香(鹽炒)各七兩五錢
遠志肉(甘草水制)十五兩 草薢
仁(姜炒) 肉苁蓉(滑石煨) 煨白
然銅(醋制)各七兩五錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

換骨丹

一、濟南

【功能與主治】發汗疎風。主左癱右瘓，遍身疼痛，行步艱難，下部痿痹，傷風，一切暗風風癰。

【處方】麻黃二斤八兩 槐角
川芎 靈仙 防風 荆子 五味子
桑皮 蒼朮 人參(去蘆) 白芷
苦參 首烏 木香各一斤四兩

【制法】共為細面，煉蜜為丸，重三錢，硃砂為衣。

【劑量及用法】每次一丸，白開水送下。

二、青島

【處方】人參 槐角 桑皮 蒼朮 白芷 生首烏 蔓荊子 威靈仙 防風各二兩 五味子 苦參 香附 川芎各一兩 龍腦叶二兩

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

三、呼和浩特

(神仙換骨丹)

【處方】人參一錢 靈仙二錢 川芎一錢五分 白芷二錢 防風二錢 木香二錢 槐角三錢 苦參二錢 五味子一錢五分 麻黃三錢 蒼朮二錢 桑白皮三錢 蔓荊子三錢 麝香二分 冰片二分

【制法】共碾極細面，蜜丸重三錢，硃砂為衣。

筋骨八仙丹

呼和浩特

【處方】桂枝一斤半 生炙芪一斤 茅朮二兩 木瓜一斤八兩 牛膝一斤六兩 片姜黃八兩 當歸身二兩 川芎二兩 杜仲一斤 破故紙一斤 附子二兩 虎骨膠四兩

肉桂 黃柏各二兩 蒼草四兩 人參 紫蘇 桑葉 山藥 連肉 山萸各二兩

【制法】共為細面，蜜小丸。

透骨鎮風丹

一、大同

【功能與主治】筋骨麻木，轉筋抽搐。

【處方】菟絲子 續斷 蘆杞子 遠志 龜板 杜仲 甘松 益智 栝子 防風 杏仁 木通 滑石 我朮 骨皮 加皮 丹皮 青楓 石楠 海桐 虎骨 沒約 米壳 黃芪 蒼朮 當歸 川芎 白芍 赤芍 熟地 陳皮 厚朴 烏藥 香附 枳殼 枳實 白芷 麻黃 吳萸 紅薏 荆芥 羌活 獨活 牛膝 木瓜 半夏 南星 殭蠶 全虫 人蔞 藿香 干姜 巴戟 茯苓 肉桂 連翹 桔梗 青皮 砂仁各一兩 黨參 云苓 伏神 小茴 大茴 細辛 良姜 川烏 附子 青鹽 草薢 丁香 白朮 白薏 赤薏 木香 炙草 破故紙 川棟 五味子 鹿茸 山奈 三稜 蓬子 首烏 制皮 蒺藜 木賊 乳香 龍骨 然銅 血竭各五錢 麝香二錢五分

【制法】共軋細面，煉蜜為三錢重丸。

【劑量及用法】日服兩次，每次兩粒。

【禁忌】孕婦忌服。

二、青島

【處方】人參 羌活 沒藥 鳳仙草 五加皮 烏藥 丹皮 首烏 生地 麻黃 白芍 紫荊皮 黃芩 獨活 骨皮 防風 川軍 赤芍 元參 靈仙 申姜 茯苓 香附 硃砂各一兩 草烏 川烏 木香 沉香 紅花 牛膝 甘草 小茴香 薏仁 川連 白芷 全蠍各五錢 細辛一錢 木瓜 天麻 殭蠶 當歸各一兩五分 丁香二錢 官桂二錢 秦艽八錢 蘇皮一兩 炙虎骨一兩

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

三、呼和浩特

【處方】人參五錢 鳳仙花 當

歸 白芍各二錢 丹皮 紫荊皮各二錢 五加皮三錢 川芎 羌活各二錢 烏藥三錢 首烏五錢 乳香 沒藥 黃芩各三錢 熟軍 青皮各二錢 香附五錢 防風三錢 獨活二錢 硃砂三錢 赤芍二錢 申姜 白朮各二錢 茯苓五錢 元參三錢 蘇皮 草薢 白薏 全蠍 紅花 甘草各二錢 茴香三錢 牛膝 大黃 細辛各二錢 木瓜五錢 殭蠶三錢 秦艽二錢 天麻 白芷各三錢 生地五錢 麻黃三錢 虎脛骨 沉香 丁香 官桂各二錢 祁蛇 菊花各三錢

【制法】共為細面，蜜丸重三錢，硃砂為衣。

活血壯筋丹

禹 縣

【功能與主治】筋骨疼痛，週身麻木，半身不遂，口歪眼斜，左癱右瘓。

【處方】制川烏八兩 川牛膝一兩六錢 地龍 桂枝 菖參 全蠍 土鱉各八錢 制乳香 制沒藥各四錢 血竭一兩

【制法】共為細面，水為丸，血竭為衣。

【劑量及用法】每服六粒，空心服，男用白酒，女用黃酒送下。

【禁忌】孕婦忌用，火熱症忌用，小兒不用。

【備考】有效期二年。

妙濟丹

蘭 州

【功能與主治】強筋壯骨，補血調經。主腰腿疼痛，麻木不仁，左癱右瘓，月經不調。

【處方】川芎四兩 杜仲八兩 茴香五錢 母丁香二錢 土茯苓一兩三錢 廣木香 乳香 白芍 公丁香各二錢 毛蒼朮一兩 當歸一兩二錢 川續斷 川牛膝各一兩一錢 云苓 龜板各二兩 木耳十二兩 蘇油五錢 木瓜二兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸，重一錢。

【劑量及用法】每服一丸，黃酒送下。

大金丹

天 津

【功能与主治】化痰順气。主卒然中風，痰壅氣閉，神昏不語，胸膈不利，頭眩耳鳴，哮喘咳嗽。

【处方】甘草 黑郁金各四兩 元明粉二兩 白矾八錢 生礬砂一兩 煅金礬石一兩 共為細粉兌入，冰片 薄荷冰各八分 硃砂面 姜汁各三錢 竹瀝膏四錢

【制法】以上研細和勻，煉蜜為丸，一錢五分重。蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

伏虎丹

沈 陽

【功能与主治】通經路，除風濕，散寒氣。主神經麻痺，癱瘓不仁，麻痺拘攣，風痰流注。

【处方】蔓荊子二錢半 五靈脂半兩 胆南星一兩 草烏頭一兩 干地黃二錢半 白殭蚕二錢半 躑躅花一兩 白膠香一兩

【制法】共碾極細面，酒煮半夏面糊為丸。五分重。

【劑量及用法】每服一丸。溫酒送下。

【禁忌】忌菜菔、蔥蒜、茗麵；孕婦忌服。

附參考古方

【來源】太平惠民和劑局方。

【功能与主治】專治左癱右瘓。

【处方】草烏頭 天南星 躑躅花 白膠香各一兩 五靈脂半兩 蔓荊子(去白) 生干地黃 白殭蚕各一分

【制法】上為細末，酒煮半夏末，為糊丸，如龍眼大。

【劑量及用法】每一丸分四服，酒吞下，日進二服。

神效回春丹

撫 順

【处方】牛子三錢 全虫一錢 鉤藤二錢 山藥五錢 白附 白苓各一錢半 川軍三錢 天麻二錢

法夏二錢 元芩 青葉各三錢 胆星二錢 菖蒲一錢半 殭蚕三錢 川貝 竹黃各二錢 赤芍一錢半 遠志二錢 白朮一錢半 人參二錢 元參四錢 枯梗一錢半 犀角一錢半 薄荷葉二錢 羚羊一錢 血珀二錢 台麝二分 珍珠三分 明雄二錢 冰片一錢 橘紅 花粉各二錢 牛黃三分。

【制法】共為極細面，蜜丸，二錢和一錢重，金衣蜡皮封。

梁会大津丹

一、沈 陽

【功能与主治】消炎鎮痛，活血定驚。主傷風傷寒，中風中惡，筋骨疼痛偏熱者。

【处方】川連 元枳 黃芩 生梔子 甘草各六兩 雄黃 硃砂各一兩五錢

【制法】共碾極細面，用大黃九兩熬膏為丸，三錢重，硃砂衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸。白開水送下。

二、青 島

【处方】川連 川柏 甘草 黃芩 生梔子各六兩 大黃(熬膏)九兩 硃砂一兩二錢 雄黃一兩二錢

【制法】以上共軋細麵，大黃膏為丸，硃砂衣，外加大赤金丹為衣一層。

三、呼和浩特

【处方】黃芩 黃柏 生梔 黃連 甘草各六兩 熟軍九兩

【制法】共為細面，蜜大丸，重二錢五分，硃砂雄黃衣，黃紙包。

十香返魂丹

一、北京(十香返生丹)

【功能与主治】芳香開竅，益智化痰。主中風不語，牙關緊閉及神智不清，哭笑無常。

【处方】沉香 殭蚕 公丁香 黃郁金 檀香 蓮子心 青木香 瓜蒌子 藿香 礬石(煅) 訶子肉 香附(醋炒) 紫降香 乳香 天麻各一兩 甘草二兩 共為細粉。每十兩細粉兌，琥珀一兩 牛黃

五錢 麝香五錢 冰片二錢五分 硃砂一兩 蘇合油一兩

【制法】上藥和勻，煉蜜為丸，重二錢，金箔為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天津(十香丹)

【功能与主治】開竅鎮驚，安神化痰。主牙關緊閉，昏迷不醒，痰涎壅盛，狂言亂語，哭笑無常，中風中痰。

【处方】同北京。分量为其一半。

【制法】以上研細和勻，煉蜜為丸，一錢三分重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、蘭 州

【功能与主治】舒氣，化痰，鎮驚。主中風不語，牙關緊閉，昏迷不醒，卒然昏倒，暈厥，夏令中暑暈倒，冬季感受煤氣。凡屬假死狀態，此丹可以救急。

【处方】竺黃三錢 殭蚕一錢 胆星一兩 鉤藤 大蘇 半夏 菖蒲各五錢 全蠍一兩 硃砂三錢 沉香五錢 牛黃二錢 梅片二錢半 麝香二錢 琥珀二錢 黃連五錢(姜炒) 薄荷五錢 雄黃二錢 防風 獨活 蒼朮 白朮各五錢 犀角一兩 羚羊角一兩

【制法】蜜丸，每丸一錢重，蜡皮封固。

【劑量及用法】每次一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

四、濟 南

【功能与主治】氣郁痰盛，精神失常。

【处方】壺沉 殭蚕 丁香 郁金 檀香 蓮子心 青木香 姜仁 霍香 礬石 訶子肉 香附 降香 琥珀 乳香 天麻各五錢 甘草一兩 共軋細面，每一斤二兩另兌：牛黃五錢 冰片二錢五分 硃砂一兩 安息香五錢 蘇合油一兩 麝香五錢

【制法】煉蜜為丸，重一錢三分，

大赤金滿衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

五、青 島

【處方】丁香 木香 檀香 降香 蘇合香 沉香 藿香 乳香 香附各二錢 麝香二錢 礞石三錢 七 枯紅各五錢 甘草六錢 殭蠶五錢 冰片一錢 硃砂二錢

【制法】共為面，蜜丸重一錢五分，大赤金衣，蜡皮。

六、撫 順

【處方】丁香 木香 乳香 沉香 降香 藿香 云香各二兩 安息香一兩 麝香一兩 蘇合香二兩 牛黃一兩 郁金一兩 礞石二兩 冰片五錢 蕤仁 血珀 蓮心 香附 硃砂 沒藥 殭蠶 天麻 訶子各二兩 返魂草四兩。

【制法】共為細面，蜜丸三錢重。

硃珀鎮神丹

沈 陽

【功能與主治】鎮靜，強心，除煩。主心悸亢進，夜臥不寧，精神恍惚，驚悸多夢，傷腦過度，心跳失眠，怔忡健忘，躁煩急驚。

【處方】胆南星三錢 硃砂五錢 琥珀四錢 黃連 竹黃 遠志 節蒲各三錢 茯神五錢 棗仁三錢 甘草二錢 金箔一錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，七分重。

【劑量及用法】每服一丸，飯後一時白開水送下。

醒迷至寶丹

沈 陽

【功能與主治】強心鎮靜。主新久癲疾，心臟衰弱，精神呆癡，怔忡健忘，精神萎靡，神識不清，倦怠嗜睡，盜汗頭昏。

【處方】胆星三錢 硃砂三錢 金箔十張 生棗仁二錢 遠志三錢 茯神三錢 柴胡二錢 半夏二錢 川貝母二錢 廣皮一錢 天花粉二錢 甘草一錢 木香一錢 砂仁一錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重，硃砂為衣。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】忌生冷食物，孕婦忌服。

附參考古方

【來源】惠直堂經驗方。

【功能與主治】治痰迷心竅，呆癡狂癲，不論新久。

【處方】膽星三錢 硃砂二錢（水飛為衣） 金箔十張 生棗仁三錢 遠志 茯神各三錢 柴胡三錢 半夏二錢 川貝母二錢 廣皮一錢 大花粉二錢 生甘草一錢 木香一錢 砂仁一錢

【制法】共為末，蜜丸梧桐子大，硃砂為衣。

【劑量及用法】每日清晨清湯下三四十九丸。

解 語 丹

沈 陽

【功能與主治】疎風化痰，清腦，止癲癇。主言語蹇澀，舌強不轉，心竅閉塞，神識不清，經絡壅滯，卒然昏倒，痰涎壅盛，手足痠癢。

【處方】白附子 石菖蒲 遠志（去心，甘草水浸煮） 全蠍（酒炒） 白殭蠶 羌活各一兩 木香五分 胆南星一兩

【制法】共碾極細面，糊為小丸，硃砂為衣。

【劑量及用法】每服一錢，薄荷煎湯送下。

金箔鎮心丹

沈 陽

【功能與主治】安神鎮驚，清熱化痰。主癲癇怔忡，痰火壅盛，譫語狂妄，夜臥不安，心悸煩躁，四肢拘急，氣促心煩，神昏昏亂。

【處方】胆南星一錢 硃砂 琥珀 竹黃各三錢 牛黃五分 珍珠一錢 麝香二分 金箔一錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，每丸二分五厘重，金箔為衣。

【劑量及用法】每服一丸，薄荷湯送下。含化亦可。

癲 狂 丹

沈 陽

【功能與主治】鎮靜安神。主癲狂不安，言語失次，悲哭無常，兇狂怒罵，自歌自舞，神經錯亂。

【處方】公丁香 沉香 雄黃 青皮 黃芩 胡黃連各三錢 乳香 麝香 熊胆各二錢五分 檀香三兩 輕粉四錢半 黃連 牽牛 三稜 甘草 莪朮 陳皮 雷丸（甘草水浸一宿酒拌蒸） 鶴虱各一兩 大黃一兩半 赤小豆三兩 巴豆（去油）七個

【制法】共碾極細面，蕎麥糊為小丸。

【劑量及用法】每服十粒，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

【備考】劇藥。

癲症鎮心丹

上 海

【功能與主治】清火旺肝郁之癲狂症。

【處方】犀角五錢 牛黃七分 黃連三錢 麥冬七錢 茯苓七錢 硃砂三錢 珍珠二錢 棗仁一兩 甘草一錢 胆星五錢 遠志（炒）二錢 石菖蒲二錢

【制法】除胆星外，余藥共研細粉，以煉蜜和胆星打和為丸，硃砂為衣，每丸潮重四分，蜡壳封固。

【劑量及用法】每次服一丸，溫開水化服。

【備考】遵醫師指示服用。

精制萬應錠

福 州

【功能與主治】中痰，中風，半身不遂，乳蛾，喉閉，痢疾，霍亂，小兒急慢驚風等症。

【處方】麝香二分 胡連二錢 川連二錢 老片二錢 珍珠二分 牛黃五分 殭蠶一錢 青黛七分 百草霜一錢 礞石二錢 大黃二錢 熊膽二分 灯灰五分

【制法】共研細末，和糯米糊為錠，赤金衣。

养血愈風酒

一、上海(愈風酒)

【功能与主治】筋絡牽強，骨節疼痛。

【处方】独活 杜仲(炒) 怀牛膝 玄参 大麻 川草薢各四兩 生地六兩 羌活四兩 熟地八兩 当归三兩 官桂二兩 玉竹一斤 燒酒二百八十斤

【制法】將藥搗粗粉用夏布袋盛裝，浸入酒內一星期，后將藥渣榨淨濾清，再加冰糖二十斤和勻。

【剂量及用法】日服三次，每次五錢。

二、杭州

【功能与主治】养血祛風，强筋健骨。治气血兩虛，感受風湿，四肢痠麻，筋骨疼痛，半身不遂，腰膝痿弱，一切遠近風痺之症。

【处方】青防風 冬朮各二兩 白朮根八兩 羌活 广皮各一兩 蚕沙一兩 枸杞子四兩 蒼耳子二兩 炙虎骨四兩 松节 当归 川草薢 秦艽各二兩 炙鳖甲一兩 川牛膝二兩 紅花一兩 杜仲三兩 冰糖五斤

【制法】用燒酒五十斤將上藥浸足一月。

【剂量及用法】隨量飲之。

八仙酒(八仙庆寿酒)

一、吉林

【功能与主治】活血疎風，散寒健脾，促動經絡靈活，运行血液流通。主中風痺症，左癱右瘓，半身不遂，頑麻不仁，風寒濕痺，筋骨作痛，屈伸不便等症。

【处方】川烏 草烏 薄荷 炮姜 当归 竹叶 陈皮 生草各一兩 燒酒十斤 醋一斤二兩 紅糖二斤 河水二斤 井水二斤

【制法】將上八味藥共研細末，裝入粗布袋內，投入酒醋水磁罐內，浸七晝夜，然后文武火煮之。

【剂量及用法】每日飯前飲一、二杯即可。

【禁忌】孕婦忌服。

二、哈尔滨

【功能与主治】疎風溫榮活絡。

主中風，痺症。

【处方】同吉林。

【制法】共泡一處，浸七日。瓷罈存貯，或玻璃瓶裝嚴封之。

【剂量及用法】早晚各服二、三杯。

【禁忌】孕婦忌服；忌食生冷。

史国公藥酒

一、沈陽

【功能与主治】活血散風，强筋止疼。主四肢麻木，手足不遂，骨節痠痛，癱瘓痿痺，風寒濕骨痛筋骨拘攣。

【处方】当归 虎骨(炙) 羌活 鳖甲 草薢 防風 秦艽 川膝 松节 蚕沙各二兩 枸杞五兩 茄根八兩(飯上蒸熟)

【制法】用純酒十斤，絹袋盛藥入酒內封浸，十日取飲。

【剂量及用法】每服二錢，一日兩次溫服。

【禁忌】忌食生冷，孕婦忌服。

二、撫順

【处方】(1) 当归五錢 灵脂 大朮 川膝各二錢 木香一錢 独活五錢 木瓜二錢 加皮二錢 白芍二錢 熟地五錢 青皮 桂枝 桑椹各二錢 羌活二錢 虎骨二錢 紅花五分 草薢三錢 丁香五分 防風 白朮各二錢 杞子二錢 檀香一錢

(2) 又方：

虎骨二兩 防風一兩 白朮二兩 当归二兩 花蛇一兩 龜甲一兩 杞子五兩 松节二兩 茄根八兩 羌活一兩 草薢一兩 蒼耳二兩 蚕沙二兩 牛膝二兩 大朮二兩 杜仲二兩

三、吉林、哈尔滨

【功能与主治】疎風，溫榮活絡，舒筋壯骨。主中風，左癱右瘓，半身不遂，麻木不仁，口眼喎斜。痺症：風寒濕邪蘊塞經絡，阻碍循环，血不週流，筋骨疼痛，腰腿痠楚，俯仰困难，屈伸不便。

【处方】虎骨(酥炙) 当归 鳖甲(炙) 羌活 防風 草薢 秦艽 牛膝 晚蚕沙 松节各二兩 干茄根八兩(蒸熟) 枸杞子五兩

高粱酒十斤 冰糖十斤

【制法】將藥剉末，絹袋盛之，浸高粱酒內，封十日，濾清加冰糖。

【剂量及用法】每日早晚隨量飲二次，不可間斷。

【禁忌】忌食發風動氣以及生冷之物；孕婦忌服。

附參考古方

【来源】杂病証治类方。

【功能与主治】專治左癱右瘓，四肢頑麻，骨節痠疼，諸般寒濕風氣。

【处方】当归 虎骨(酒浸一日焙干，酥炙) 羌活 鳖甲(炙) 草薢 防風(去蘆叉) 秦艽 川牛膝 松节 晚蚕沙各二兩 枸杞子五兩 干茄根八兩(飯上蒸熟)

【制法】用無灰酒一斗，絹袋盛藥，入酒內封十日，取飲時不可面向罈口，恐藥氣冲入頭面，飲酒不可間斷。

【禁忌】忌食發風動氣之物。

【備考】飲盡藥渣晒干為末，米糊丸梧子大，空心酒下五十丸。

五加皮藥酒

一、天津

【功能与主治】舒筋活血，除濕散風。主風濕痿痺，手足拘攣，四肢麻木，腰膝疼痛，腎囊濕冷。

【处方】当归 海狗鞭 海狗鞭 川芎 灵仙 木瓜各四兩 白朮(麸炒) 白芷各六兩 怀牛膝 紅花 菊花各八兩 五加皮 广皮各一斤 党参(去蘆) 色姜黃各一斤八兩 独活 制川烏 制草烏各二兩 肉豆蔻(滑石煨)二兩 檀香四兩 薏仁三兩 公丁香 砂仁 广木香 肉桂(去粗皮)各二兩 玉竹四斤

【制法】先將白酒四百斤放入缸內，用梔子三斤泡過適合為度，去渣。以上各藥用水熬汁去渣濾淨，煉成稀膏狀，以稀膏化冰糖四十斤兌入酒內。

【剂量及用法】每次一兩，日服三次，溫服。

【禁忌】孕婦忌服。

二、武汉

【功能与主治】風濕煩痺，足膝痠弱，骨節疼痛，跌打損傷。

【处方】五加皮五兩 川牛膝二兩 黃芪四兩 玉竹二兩 防風二兩 佛手二兩 桑枝五兩 白朮四兩 陳皮四兩 木瓜二兩 蘇木二兩 松節五兩 川芎三兩 建梔二兩 杜仲四兩 秦艽二兩

【制法】用上藥泡酒五十斤，浸七日后濾清，裝瓶：大瓶一斤，中瓶半斤，小瓶四兩。

【劑量及用法】每日早、晚各服半兩至一兩。

三、南昌

【功能與主治】男子腎虛，小便淋瀝，婦人陰中濕冷，腹脇痞塊身瘦，腰膝時痛及左癱右瘓，手足拘攣等症。

【处方】五加皮 熟地 丹參 杜仲（炙微黃） 蛇床子 干姜各一兩 地骨皮 一兩 大門冬 一兩 鐘乳石四兩

【制法】前藥除熟地、大冬切碎外，余藥共研粗末，用生絹布盛，用好高粱酒十五斤浸七天后濾清，然後加冰糖二十四兩。

【劑量及用法】每服一杯，每日服二至三次，飯后溫服，量小者酌減以不醉為度。

【禁忌】忌食螃蟹。

四、濟南

【功能與主治】中風癱瘓，筋骨拘攣，痿痺疼痛，男子腎囊濕汗，婦人陰氣不足。無病常服亦有利濕之效。

【处方】五加皮四兩 熟地二兩 首烏 杜仲 川斷 川芎 紅花 松節 威靈仙各二兩 海風藤 秦艽各六錢 川羌 獨活 虎骨各五錢 官桂 炙甘草各二錢 紅棗三斤四兩 玉酒三十斤 當歸一兩五錢

【制法】將以上各藥和酒一百一十斤裝罈內，煮至兩升為度，入缸封固。

【劑量及用法】每次溫服五錢，日服二次。

五、青島

【处方】當歸 青楓 海楓 川芎 菊花 靈仙 草烏 川烏 白朮 廣皮 獨活 川羌 白芷 木瓜 牛膝各一錢 金銀花六錢 黨參五錢 姜黃二錢 地骨皮一錢

紅花二錢 五加皮五錢 玉竹二兩

六、吉林、哈爾濱（加皮露）

【功能與主治】疏風化濕。治腎風虛寒，小便余瀝，婦人陰冷癰瘕，腰膝時痛，及癱瘓拘攣等証。

【处方】五加皮 熟地黃 丹參 杜仲（去粗皮，炙微黃） 蛇床子 干姜各一兩 地骨皮二兩 天門冬一兩 鐘乳石四兩 白酒二十斤 冰糖一斤八兩

【制法】細剉諸藥，生絹袋盛，浸酒內二宿后，濾清，加入冰糖。

【劑量及用法】每服一大杯，空腹時及晚食前溫飲之。

【禁忌】孕婦忌之。

七、呼和浩特

【处方】五加皮一兩 當歸二錢 秦艽三錢 松節五錢 木瓜一兩 防風三錢 茄根三錢 川芎二錢 官桂三錢 玉竹二兩 玫瑰花三錢 廣皮一錢 梔子一錢 丁香二錢 砂仁一錢 羌活一錢 姜黃五錢 紅花一錢 甘草五錢 檀香一錢 木香一錢

【制法】干酒二十斤，冰糖二斤，入酒內煮一杜香為度。

虎骨酒

一、北京

【功能與主治】祛風活血，壯筋骨，強膝力。主筋骨疼痛，四肢麻木，腰疼背痛。

【处方】虎骨（煎汁） 草薢 淫羊藿 薏苡仁 懷牛膝 熟地各八兩 白朮 羌活 烏藥 五加皮 蒼朮 防風 青皮 獨活 丹皮 川芎 白芷 木瓜 白芍 紫草 枸杞子 紅花 補骨脂 川烏 草烏各二錢 橘皮八兩 姜黃八兩 紅糖九十六兩 紅棗二十兩 蜂蜜一百六十兩 乳香面二兩 沒藥面二兩 油松節四兩 官桂面 木香面 公丁香面 檀香面 紫豆蔻面 佛手面 砂仁面 蕲蛇 人參面 鹿茸面各五錢 麝香二分（研） 杜仲（生） 續斷各五錢

【制法】燒酒一千七百六十兩，將以上各藥共裝罈內，煮至二升為度，入缸封固。

【劑量及用法】溫熱后有酒量者每服五錢，日服一次，無量者酌減。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天津（1）

【功能與主治】去風濕，活血止痛，強筋骨，助氣散寒。主筋骨疼痛，週身麻木，腰膝痠軟，風濕性關節炎，受風受寒，或因筋骨受傷，遇風雨潮濕天氣即感疼痛。

【处方】白酒一百斤 虎酒膏二斤八兩 紅糖五斤八兩 再造丸八丸 活絡丹九丸 搜風丹九丸 紅棗八兩 玉竹九兩 廣皮九兩 官桂面五錢 砂仁面五錢 薏仁面五錢 檀香面五錢 乳香面二兩 沒藥面二兩 松節面四兩 蜂蜜七斤八兩 廣木香面五錢 公丁香面五錢 虎骨膠濃汁八兩（如用膠塊即五兩六錢）

【制法】以上共裝罈內，煮升為度，倒入缸內封固，候藥渣沉淀后，將酒提出裝瓶。每大瓶裝酒一斤，中瓶八兩，小瓶四兩。

【劑量及用法】每次服三錢或五錢，早晚各一次，空心服。

【禁忌】孕婦忌服。

【附】虎酒膏：

【处方】黃柏 秦艽 生黃芪 杜仲炭（鹽炒） 茯苓（去皮） 知母 熟地 生龜板 菟絲子 鎮陽 老鸛草各四兩 烏藥 丹皮 枳殼（麩炒） 青皮（醋炒） 炒蒼朮 檳榔 薑香 川芎 牛膝子 紫草 厚樸（姜制） 佛手 五加皮 白芷 麥冬 生南杏 紅花各五兩 當歸 懷牛膝 防風 白朮（麩炒） 獨活 生白芍 破故紙（鹽炒） 羌活 川牛膝各八兩 木瓜 枸杞子 黨參（去蘆）各十二兩 制附子一兩 續斷七兩 生地十兩

【制法】以上藥煎汁去渣過濾，將汁煉至滴毛頭紙上，背面不溼為標準，收膏。每膏一斤，兌蜜二斤。

三、天津（2）

【功能與主治】同上。

【处方】羌活八兩 木瓜六兩 生黃芪八兩 防風六兩 枸杞子十兩 破故紙（鹽炒）十兩 杜仲炭（鹽炒）六兩 獨活二兩 懷牛膝八兩 制附子六兩 桂枝二斤八兩 生地四兩 熟地四兩 當歸 川芎 厚朴（姜制） 紅花 白芷 陳皮 香附（醋制） 檳榔 佛手 白朮

【制法】以上药料用水熬汁成稀膏状，再用，冰糖四十斤，蜂蜜十一斤，虎骨膠八兩，阿膠十二斤，虎潛丸面二斤，定痛散二斤，活絡丹面一斤，七厘散八兩，砂仁面二兩，薏仁面二兩，檀香面二兩，公丁香面二兩，麝香皮二个，白酒四百斤，同前药面及稀膏共入缸内兑匀。再用玉竹四斤熬汁对入。用紫草二兩，紅袖三斤入酒内泡色，至色适合为度。

【剂量及用法】每次服二錢或五錢，早晚各一次，空心服。

【禁忌】孕妇忌服。

六、南昌(虎骨药酒)

【制法】用升酒泡十五日。

【剂量及用法】每次三錢，早晚服用。

【禁忌】感冒、貧血者忌服。

七、蘭 州

【功能与主治】風寒湿痹，手足不仁，筋骨疼痛，腰膝無力。

【处方】同北京。

【制法】將上药和高粱酒一百一十斤裝罐內煮至兩开为度，再入缸封固(麝香不可煮，須待煮好后入缸时再行加入)。

【剂量及用法】日服二次，每次溫服五錢。

【禁忌】孕妇忌服，忌食油膩、生冷物。

八、西 安

【功能与主治】去風湿，活血止痛，祛風筋骨。主筋骨疼痛，手足麻木，膝軟腿弱，風湿性关节疼，腿部受風寒，筋骨受伤，遇風雨潮湿天即疼痛等症。

【处方】虎骨二兩，紅花二兩，归尾一兩，地楓，年健，川牛膝，焦杜仲，双鉤藤，青風藤，海風藤，羌活，独活，生黃耆，枸杞，川木瓜，續断，五加皮，秦艽，荆芥，桑皮，烏藥，灵仙，桂枝各五錢，燒酒七斤，蜂蜜一斤。

【制法】上药拌勻，裝入布袋內，盛于磁罐內泡三日，再將磁罐放在大鍋內沸煮三日夜为度，再將布袋取出，另兌放冰糖一斤，澄清裝瓶子。

【剂量与用法】每服五錢(即一酒杯)。

九、濟南(虎骨药酒)

【功能与主治】主治腰腿麻木，筋骨疼痛，左癱右瘓，半身不遂，口眼歪斜，湿痰流注。

【处方】大活絡丹十丸，大再造丸一丸，虎骨膠八兩，鎮風丹十丸，乳香，沒藥各二兩，松节四兩，虎骨膏一斤，史国公膏四兩，老鸛草膏二兩。

【制法】用国公酒一百一十斤將上药煮兩开后，裝瓶內封固备用。

【剂量及用法】飯前服，成人每次二杯，一日二次。

【禁忌】孕妇忌服。

十、青島(虎骨药酒)

【功能与主治】風寒湿痹，手足麻木，筋骨疼痛，腰膝無力。

【处方】同北京。人参改用党参。

【制法】將以上各药和酒一百一十斤，裝罐內煮至兩开为度，入缸封固。

【剂量及用法】每次溫服五錢，日服二次。

【禁忌】孕妇忌服。

十一、沙 市

(虎骨追風酒)

【处方】川芎五錢，杜仲一兩，秦艽五錢，川断一兩，防風五錢，松节一兩，威灵仙一兩，赤芍七錢五分，白朮(炒)七錢五分，南紅花一兩，桂枝八錢，川芎七錢五分，当归一兩，沒藥二錢五分，南紅袖一兩五錢，川牛膝一兩，乳香三錢，玉竹四兩，炙草五錢，虎骨二兩，冰糖八兩。

【制法】以燒酒五斤，黃酒亦可，瓶裝定將上药泡其內。

十二、沈 陽

(虎骨追風酒)

【功能与主治】治風寒湿痹，四肢不随，关节疼痛，筋脉拘攣等症。

【处方】虎胫骨，干石斛，石楠，防風，当归，千年健，杜仲(酒炒)，川牛膝(酒炒)，川芎，金毛狗脊(去毛)，續断，巴戟(去心)各一兩，羌活六錢。

【制法】上药泡酒四斤，十日后取飲。

【剂量及用法】每次服五錢，微溫服。

【禁忌】痹痛之因于热者忌服。飲酒后忌受風寒，忌食生冷油膩之品。

十三、沈 陽

(虎骨酒)

【功能与主治】强壯筋骨，驅風散寒，止关节疼痛。主腰腿麻木，手足不仁，半身偏枯，四肢痿痹，口眼歪斜，筋攣骨痛。

【处方】石斛，石楠叶，防風，虎胫骨(酥制)，当归，茵芋叶，炒杜仲，牛膝，川芎，狗脊，巴戟，川断各一兩。

五、昆 明

【功能与主治】舒經活血。主風湿。

【处方】虎骨(酒酥透)，草薢，仙灵脾，薏仁各四兩，怀牛膝二兩，酥龟板，木瓜各五兩。

【制法】共碾粗末，納入布袋中，以酒一斗浸漬一日。

【劑量及用法】每服一酒杯，早晚溫服。

【禁忌】孕婦忌服。

十三、撫順(1)

【功能與主治】驅風散寒，溫經活絡。主補血益氣，散風活絡，強健筋骨，風濕麻痺，腰腿疼痛，筋肉拘急，全身麻木，神經痙攣，步履困難，動轉艱難及風寒濕痺等症。

【處方】懷牛膝二兩七錢 木香破故紙 白芷 沒藥各一兩二錢 木瓜二兩七錢 佛手二兩七錢 玉竹一斤零七錢 白花蛇五兩四錢 紅花六兩七錢 南星二兩七錢 麻黃二斤零七錢 枸杞二兩七錢 申姜一兩一錢 桂枝五兩四錢 獨活二兩七錢 羌活五兩四錢 川芎一兩二錢 血竭二兩七錢 片姜黃一兩二錢 砂仁一兩二錢 加皮五兩四錢 防風五兩四錢 天麻二兩七錢 公丁香一兩二錢 秦艽二兩七錢 薏苡仁二兩七錢 當歸二兩七錢 川牛膝一兩二錢 乳香一兩二錢 陳皮五兩四錢 粉草一兩二錢 川烏一兩二錢 杜仲二兩七錢 地龍一斤零七錢 貫筋五兩四錢 官桂二兩七錢 紅參二兩七錢 馬錢片一兩二錢 鹿茸一兩二錢 年健二兩七錢 薄荷一兩二錢 草烏一兩二錢 黃芪一斤零七錢 良姜二兩七錢 香附二兩七錢 全蠍二兩七錢 虎骨二兩七錢

【制法】每料共燒酒一百六十斤，冰糖十斤。

【劑量及用法】每日早晚兩次，每次飲一酒盅。

【禁忌】孕婦忌服。

十四、撫順(2)

(白虎骨酒)

【功能與主治】疏風散寒，鎮痛。主風寒濕氣合而為痹，經絡閉塞，筋骨疼痛或發麻木或筋抽搐，腰膝疼痛，難於伸屈及婦人經閉血寒，抽筋麻木，關節作痛等症。

【處方】虎骨二兩 懷牛膝一兩二錢 木瓜一兩 蚕沙一兩 沒藥六錢 海膝六錢 杜仲一兩二錢 年健八錢 地楓八錢 赤朮八錢 西花一兩 桂枝六錢 當歸八錢

川斷六錢 防風七錢 白花蛇一兩二錢 鹿膠一兩二錢 公藤一兩二錢 公丁香七錢 松節四錢 紫葳一兩二錢 草薢四錢 廣木香四錢 良姜七錢 官桂七錢 紅參一兩二錢

【制法】用燒酒三十斤，用罈泡藥一天許，再以溫火燉數升，澄清去渣用之。

【劑量及用法】每早晚服二錢。

【禁忌】孕婦忌用。

十五、哈爾濱

【功能與主治】去風散寒除濕，舒筋活絡，補血益氣，壯筋骨，強脚力。主風寒濕痺，筋骨疼痛。

【處方】虎胛骨 單藤 淫羊藿 薏苡仁 牛膝 熟地黃各二兩 高粱酒三十斤

【制法】將諸藥細剉，生絹袋盛，浸酒中。瓷罈存貯，封口。

【劑量及用法】飲取藥酒一杯，復入高粱酒一杯，可服百日。

【禁忌】孕婦忌服。

十六、承德(虎骨藥酒)

【功能與主治】風寒濕痹，手足麻木，筋骨疼痛，腰膝無力。

【處方】虎骨八兩(炙研細) 川芎五錢 薏苡仁八兩 白芍五錢 單藤八兩 紅花五錢 牛膝八兩 草烏五錢 淫羊藿八兩 紅糖六斤 熟地八兩 乳香二兩(研細) 當歸官桂(研細) 五加皮 醋青皮 砂仁(研細) 鹿茸(研細) 烏藥 續斷 防風 羌活 丹皮 炒蒼朮 木瓜 獨活 枸杞 白芷 川烏 紫草 玉竹 補骨脂各五錢 白蜜十斤 陳皮八兩 松節四兩 紅糖二兩 公丁香五錢(研細) 沒藥二兩(研細) 佛手五錢(研細) 木香五錢(研細) 人參五錢(研細) 豆蔻五錢(研細) 杜仲五錢 蕲蛇五錢 麝香一分 檀香五錢(研細)

【制法】將以上各藥和燒酒一百一十斤，裝罐內煮至兩升為度，入缸封固。

【劑量及服法】每次溫服五錢，日服二次。

十七、呼和浩特

(虎骨藥酒)

【處方】虎骨五兩 生杜仲 木

瓜 防風 羌活 牛膝 枸杞子 當歸 白芷各五錢 玉竹四兩 年健五錢 川芎二錢 地楓五錢 桂枝五錢 廣皮五錢 砂仁五錢 廣寄生五錢 姜黃二兩 紅花二兩 麻黃二兩

【制法】以上共軋粗面，裝入布袋內，浸泡原酒十五斤，內歷七日，再將酒及藥傾入桶內，煮透去渣，再加白糖四兩，紅糖二兩，白蜂蜜四兩即成。

附參考古方

【來源】類證普劑本事方。

【功能與主治】去風，補血益氣，壯筋骨，強脚力。

【處方】真虎骨脛 草薢 仙靈脾 薏苡仁 熟地黃 牛膝各二兩

【制法】上細剉，絹袋浸酒二斗。

【劑量及用法】飲了一盞，入一盞，可得百日，婦人去牛膝。

【備考】又方，治腰脚疼痛，舉急不得屈伸及腿膝冷麻，虎骨一具及脛骨二草，用酥塗炙黃，搗碎，同無灰酒三斗，密封七日，空心晚食，溫之隨意飲。

虎骨木瓜酒

一、上海

【功能與主治】祛風活絡。

【處方】虎骨膠一兩二錢 川芎 秦艽 川膝各一兩 當歸 羌活 獨活 陳皮各二兩 紅花 桑寄生 千年健各二兩 玉竹十六兩 五加皮三兩 木瓜四兩 小紅梔四兩 山梔子二十兩 白糖二十斤 燒酒三百二十斤

【制法】除虎骨膠外，余藥搗成粗末，盛入夏布袋內，先用燒酒三十斤浸成濃汁(約一星期)，后去渣濾清，再將虎骨膠與糖化烱，和入余酒內。

【劑量及用法】每次一至四兩。

【備考】如無虎骨膠，可用豹骨膠。

二、南京

【功能與主治】祛風除濕，舒筋活絡。主筋骨疼痛，拘攣麻木。

【處方】制虎骨一兩 桑枝四兩 西當歸 川芎 川續斷 五加皮

各一兩 防風五錢 川牛膝 明天麻 紅花各一兩 宣木瓜三兩 西秦艽五錢 白加皮一兩 肥玉竹二兩

【制法】上約共研粗末，以絹盛，投入好高粱酒二十斤中，浸至七日，濾去渣，澄清后加冰糖二斤，化開攪勻為度。

【劑量及用法】隨量飲之。

三、福州

【功能與主治】追風定痛，除濕驅寒，壯筋強骨，調和氣血。治風寒濕氣流入經絡，筋脈拘攣，骨節酸痛，四肢麻木，口眼歪斜，山嵐瘴氣，歷節風痛等症。

【處方】同南京。

【制法】共為粗末，絹袋盛浸，高粱酒二十斤浸七日，濾清加冰糖二斤。

四、杭州

【功能與主治】追風定痛，調和氣血。治風寒濕氣流注經絡，筋脈拘攣，骨節痠疼，四肢麻木，歷節風痛之症。

【處方】虎骨膠五錢 紅花一兩 木瓜二兩 白朮一兩 當歸二兩 玉竹五兩 甘松一兩 大麻一兩 懷牛膝二兩 桑寄生一兩 川斷二兩 桑枝四兩 冰糖五斤

【制法】用燒酒五十斤，將前藥浸足一月。

【劑量及用法】隨量飲之。

五、南昌

【功能與主治】主風寒濕氣留于經絡，筋脈拘攣，骨節痠痛，四肢麻木及歷節痛風。

【處方】同南京。

【制法】將藥研為粗末，絹袋盛之，以高粱酒二十斤同浸半个月后，濾清加冰糖二斤。

【劑量及用法】飯前隨量飲之。

【禁忌】孕婦忌服。

六、重慶(1)

【功能與主治】追風定痛，除濕驅寒，壯筋強骨，調和氣血，疏經通絡。

【處方】同南京。天麻用一兩五錢。

【制法】虎骨一兩改用虎膠二錢，用酒蒸化。余藥用高粱酒二十斤

浸十五日，濾清，加入虎膠，另用水糖二斤。玻璃裝封。

【劑量及用法】盡量勿過。

【禁忌】孕婦忌服。

七、重慶(2)

【功能與主治】祛風濕。

【處方】虎骨一兩 木瓜 川芎 牛膝各一兩 天麻五錢 五加皮一兩 紅花五錢 川斷七錢 秦艽一兩 防風五錢 桑枝一兩 玉竹八錢 當歸二兩

【制法】每方用干酒十斤，泡十日即成。

【劑量及用法】每日一次，每次一至二兩。

八、濟南

【功能與主治】筋脈拘攣，筋骨疼痛，四肢麻木，口眼歪斜。

【處方】同南京。

【制法】共研為粗末，絹袋盛，用高粱酒二十斤浸七日，原罈蒸十二小時，濾清加冰糖二斤。

【劑量及用法】任量飲之，一日一次。

【禁忌】忌食生冷食物，挾內熱者忌服。

九、哈爾濱

【功能與主治】壯筋強骨，追風定痛，調和氣血。主風寒濕氣侵入經絡，筋脈拘攣，骨節痠痛，四肢麻木，口眼歪斜，山嵐瘴氣。

【處方】同南京。

【制法】碾為粗末，絹袋裝，浸酒內七日，濾清，加冰糖。

【劑量及用法】每日早晚兩次，任量飲之。

【禁忌】孕婦忌服。

參茸虎骨酒

一、沈陽

【功能與主治】舒筋活血，止痛散風。主筋骨疼痛，麻木不仁，半身不遂，胃腹寒脹，腰痠腿痛，癱瘓拘攣，難換痿痹，一切風寒濕病。

【處方】虎胛骨四兩 麻黃二兩 防風二兩 紅人參一兩 貫筋五兩 杜枝二兩 懷牛膝一兩 白花蛇四兩 炙馬錢二兩 防己四兩 陳皮三兩 杜仲二兩 當歸二兩 木瓜

風 痰 類

四兩 沒藥二兩 靈仙一兩 秦艽二兩 肉桂四兩 鹿茸一兩 乳香二兩 川斷一兩 補骨脂一兩 龜板膠一兩 羌活二兩 血竭花二兩

【制法】諸藥納入疏布袋內，放罈中入白酒一百斤，將口封固，放沸水鍋中煮六小時，取袋濾去渣，加冰糖六斤，血竭和冰糖后入。

【劑量及用法】每早晚各溫服一杯(約二錢)。

【禁忌】孕婦忌服。

二、撫順

【處方】花茸四錢 佛手 血簾各五錢 木瓜一兩 牛膝五錢 靈仙 桂枝各一兩 虎骨十二兩 申朮 狗脊 白附 台烏 青皮各五錢 烏蛇 花蛇各一兩 白朮五錢 全虫一兩 當歸二兩 乳香 公丁各五錢 血竭三錢 山楂 安息香 大活各五錢 人參一兩 兩頭尖一兩 鈎藤 海沉各五錢 川芎一兩 沒藥 年健 大芩 寄生各五錢 赤芍一兩 藿香五錢 首烏一兩半 加皮一兩半 紅楓六兩 川斷五錢 地龍一兩半 川芎五錢 貫筋 蒼朮各一兩 鹿膠二兩 燒酒六十斤 活絡丹十丸 冰糖五斤

祛風木瓜酒

(重料木瓜酒)

上 海

【功能與主治】肢節麻冷，筋絡牽強。

【處方】羌活 獨活 木瓜 秦艽各二兩 防風 鑽地楓各二兩 杜仲(炒)二兩 附子(泡去皮制)二兩 桑枝二兩 川芎 黨參各二兩 白朮根二兩 白菊花 甘松 桂枝 白芷 黃芪(炙) 甘草各二兩 紅花 五加皮 生地 熟地 玉竹各三兩 豆蔻仁一兩 白芍藥(炒) 天麻 桑寄生 千年健 枸杞子 陳皮 茜草各二兩 參三七 砂仁 小茴香 當歸 蕲蛇(去頭骨尾)各一兩 虎骨膠四兩 紅棗八兩 冰糖四十斤 紅柚一兩

【制法】先將藥搗粗末，用夏布袋盛裝，浸入酒內，約兩星期，並將藥渣榨淨濾清，再將虎骨膠用水化烊，連同冰糖四十斤和入。

【劑量及用法】日服二次，每次

五錢。遵醫師指示服用。

【備考】如無虎骨膠，可用豹骨膠。

白花蛇藥酒

沈 陽

【功能與主治】通經活絡，祛風除濕。主諸風痹症、周身麻木，半身不遂，口眼喎斜，筋攣足痿，肢體不仁，關節疼痛，惡瘡疥癩，左癱右瘓，一切風寒濕痹等症。

【處方】白花蛇（一條，溫水洗淨，頭尾各去三寸，酒浸，去骨刺）淨肉一兩 全蠍二錢 當歸 防風 羌活 白芷 天麻 赤芍 甘草 雞血藤 菊花 木瓜各五錢 馬錢子（炙）二錢 乳香 龜筋 沒藥 紅花各五錢 血竭二錢

【制法】上藥以絹袋盛貯，用燒酒五斤，白糖二斤同置罐中封口，放鍋內滾水煮三小時，離火待涼即可，去藥。

【劑量及用法】溫服一盅。

【禁忌】孕婦忌服。

追風露 (追風露藥酒)

一、吉林、哈爾濱

【功能與主治】活血舒筋，止痛。主痹症，筋骨疼痛。

【處方】虎膠二錢 懷牛膝一兩 木瓜八錢 毛狗六錢 海狗六錢 肉桂四錢 陳皮五錢 蒼朮五錢 桂枝四錢 地楓六錢 紅花八錢 枸杞五錢 青皮五錢 赤朮五錢 當歸六錢 松節六錢 杜仲五錢 生地五錢 川斷四錢 蚕沙八錢 花蛇一兩 木香五錢 補骨脂五錢 台烏二錢 獨活三錢 沒藥四錢 年健六錢 丁香三錢 白酒三十斤 冰糖四斤

【制法】上藥置布袋內浸于酒中，用文火煮，經一炷香時，然後入冰糖即可。

【劑量及用法】每飲二、三杯，早晚各一次。

【禁忌】忌食生冷；孕婦禁用。

虎 骨 膠

一、北 京

【功能與主治】驅風散寒，壯骨

止痛。主風寒痠痛，足膝無力。

【處方】虎骨一千六百兩

【制法】將虎骨洗淨打碎，煎七晝夜。加黃酒四十八兩、冰糖八十兩成膠。

【劑量及用法】每次燉服一錢，或入煎劑。

二、上 海

【功能與主治】氣血衰弱，筋骨痠軟。

【處方】虎骨四腿

【制法】將虎骨四腿預先剝淨，漂洗鋸斷去髓，用皂角水煮過。至冬季入鍋，煎五天五晚。每天出鍋一次，將藥汁澄清過濾，收成濃膠汁。至最後一次，將歷次濃汁和勻收成膠。

【劑量及用法】加適量黃酒燉化，開水沖服。遵醫師指示服用。

【備考】如無虎骨，可用豹骨。

三、重 慶

【功能與主治】補益氣血，壯健筋骨。治筋骨受風，不能屈伸等症。

【處方】虎骨不拘多少

【制法】先將虎骨水泡，刨去筋肉，捶破。用沸湯煮淨骨肉油脂，放入銅甕內猛火熬汁。熬至七日七夜為度，收成老膏候用。

【禁忌】孕婦及小兒不能服。

四、濟 南

【功能與主治】筋骨痠軟，足膝無力。

【處方】虎骨一百斤

【制法】將虎骨洗淨，碎，煎七晝夜成膠。

【劑量及用法】每次燉服一錢。或入煎劑。

如 意 油

武 漢

【功能與主治】風濕頭痛，關節痛，以及腹痛。

【處方】防己六兩 荊芥八兩 香附四兩 細辛十兩 苦杏仁四兩 沉香四兩 藿香四兩 杜枝十兩 乳香六兩 甘草八兩 木香四兩 丁香八兩 大黃二兩 血竭八兩 冰片十兩 棉油二斤半 樟腦油十

斤 薄荷油六斤 檀香油一斤半 丁香油一斤

【制法】先取棉油二斤半、樟腦油十斤，合群藥浸一星期後，再用蒸汽加溫七十度，經十八小時，冷後過濾去渣；再加薄荷油、檀香油、丁香油，混合搖勻，成油十七斤十二兩。

【劑量及用法】外用患處擦塗，少量可以內服。

坎 離 砂

一、北 京

【功能與主治】散寒止痛。主寒腿疼痛。

【處方】鉄砂一百六十兩

【制法】將鉄砂入砂礪內，煅紅為度，取出用米醋淬之，容其冷後，再將麝香一錢、活血定痛散二兩拌勻裝紙袋，每袋八兩。

【劑量及用法】對醋拌勻，盛布袋內，隔布敷患處。

【附】定痛散：

乳香 沒藥 香附 當歸各九十六兩 玄胡索 骨碎補各一百五十兩 共為細粉

二、天 津

【功能與主治】去風散寒，活血止痛。主腰腿疼痛，四肢麻木，閃腰岔氣，腹痛痞塊，風濕性關節作痛。

【處方】麻黃 歸尾 制附子 透骨草 紅花 干姜 杜枝 懷牛膝 白芷 荊芥 木瓜 羌活 防風 獨活 牛艾絨各一兩

【制法】共軋粗末，再將鉄渣四十斤煅紅待涼，再將藥末和鉄渣兌勻，每八兩裝一布袋。

【劑量及用法】將鉄砂子用好醋拌潮，仍裝布袋內，候熱放在患處。

【禁忌】孕婦腹痛忌用。

三、濟 南

【功能與主治】感受風寒，筋骨疼痛，四肢麻木等症。

【處方】上淨鉄砂十斤 乳香 沒藥各一兩

【制法】將鉄砂入干沙鍋內，用火煅紅為度，再用上高米醋淬之，容其三小時後將乳香、沒藥拌入，用紙袋裝之，每袋重八兩。

【劑量及用法】外用時用上好米醋拌勻裝入袋內，少待片刻自能生

热,將布袋熨患处,每次一袋。

【禁忌】熨后应避風寒。

雷 火 針

一、北京、南京(热熨針)、

济南

【功能与主治】祛風散寒,开窍活絡。主風寒湿痹,筋骨疼痛。

【处方】蕪艾一兩 硃砂 穿山甲(炙) 桃树皮 草烏(生) 川烏(生) 乳香 雄黃 沒藥 硫黃各一錢 麝香五分

【制法】共为細粉,以蕪艾絨鋪火紙上入藥粉二錢,卷成筒如爆竹。密藏。

【剂量及用法】先于患处用布摺数层,將針用火点着吹息,隔布針之,煖極即止。

【禁忌】忌飲冷水。

二、天 津

【功能与主治】舒筋活絡,驅風散寒。主筋骨麻木,受風受寒 肩臂疼痛,左癱右瘓,半身不遂。

【处方】生乳香 生沒藥 公丁香 牛松香 桂枝 杜仲炭(鹽炒) 生枳壳 皂角 細辛 川芎 独活 制山甲各一錢 以上共为細粉 艾絨二兩 硫黃面二錢 麝香五分 雄黃面一錢

【制法】先將艾絨放在火紙上用藤棍打平,將細粉撒勻,再將硫黃面、麝香、雄黃面二味和勻撒在上层,用紙一張盖在药上卷好,再用紙三張將外裹紧,赶至極坚固为度,去掉紙二張,再用紅京紋紙包严,每支長約九寸八分,外部塗刷鷄子清,待陰干后裝桶封固。

【剂量及用法】將針用火燃着一端熨患处。

三、南京(热熨針、雷火神針)

【功能与主治】主風寒湿所致之痹痛麻木。

【处方】同北京。

【制法】上药除艾叶外,共研細末,麝香后加和勻,將艾叶平鋪于粗紙上,以药末二錢撒于其上,务使均匀,將紙連同艾叶药末卷成筒狀,如爆竹式,外面再用大紅布或花布裹

之,使稍紧結。密藏。

【剂量及用法】先將患处以紅布数层鋪好,將針燃点着火,隔布慢慢熨之,以不过燙为宜。

附参考古方

【来源】瘍医大全。

【功能与主治】風寒湿氣痰滯于經絡血脉之中,閉塞不通而痛。

【处方】蕪艾一兩 硃砂二錢 穿山甲(土炙) 桃皮 草烏 川烏 乳香 雄黃 沒藥 硫黃各一錢 麝香五分

【制法】共为細末,以蕪艾鋪粗紙上,入药末二錢,卷成筒如爆竹式,擇吉日將药筒入瓶內,以箬叶油紙封口,埋屋下地中四十九日,取出任用。

【剂量及用法】此針能針百病,可于患处用青布或紅布摺二十四层,將針灯上点着吹息,隔布針之,患內煖極即止,不过三次即愈。

双了拐(神仙双了拐)

吉 林

【功能与主治】散風活血,除痰定痛。主筋骨麻木,腰腿疼痛,半身不遂,口眼歪斜,風湿凝結,氣血不通及跌打損傷等症。

【处方】麻黃 制馬錢 当归 蒼朮 防風 兩尖尖 川烏 地榆 川芎 人活 沒藥 年健 乳香 甲珠 草烏各一錢

【制法】共为細面,蜜制为丸,二錢重。

【剂量及用法】每服一丸,每日二次为度,用元酒送下。

时 感 类

羚翹解毒丸

一、北京、济南、承德

【功能与主治】解热散風。主热盛感冒初起,憎寒壯热,四肢痠懶。

【处方】金銀花 連翹各十二兩 桔梗 牛蒡子 薄荷各八兩 竹叶 制芥穗各六兩 甘草 淡豆豉各五兩 共为細粉兌入羚羊角二錢五分

【制法】上药和勻,煉蜜为丸,重二錢,蜡皮封固。

时 感 类

【剂量及用法】每服二丸,日服二次,溫开水或鮮蘆根煎水送下。

【禁忌】忌食油膩厚味。

二、天 津

【功能与主治】散風清热,解表退燒。主热盛感冒初起,憎寒壯热,四肢痠懶,头眩咳嗽,咽喉疼痛,瘟毒發頤,兩腮赤腫。

【处方】銀花 花粉 葛根 大青叶各二兩 黃栢六錢 生石膏四兩 生梔子一兩 赤芍八錢 馬勃 浙貝母 桑叶 枳壳(麸炒) 黃芩 炒殭蚕 知母各六錢 薄荷叶一兩六錢 連翹(去心)二兩 元參(去蘆)一兩六錢 共为細粉兌入羚羊粉一錢 冰片二錢

【制法】以上研細和勻,煉蜜为丸二錢重,蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸,白开水送下。

三、蘭 州

【功能与主治】發汗退燒,清热散風。主感冒發燒,火目眩暈,口渴咽干,四肢痠痛,热盛煩躁,大便燥結。

【处方】同天津。

【制法】以上共軋細面,蜜为丸,二錢重。

【剂量及用法】每次服一丸,早晚二次,小兒減半,白水送下。

【备考】如熬膏可用十料,每清膏一斤,兌蜜二斤,十料內兌羚羊粉一錢、冰片八錢。

四、大 同

【功能与主治】清热,化毒,解表。

【处方】羚羊角二分 連翹 銀花 梔子各二錢 川黃連二錢 桔梗二錢 赤芍二錢 生地二錢 元參 生草 茯苓 丹皮各二錢 薄荷 牛蒡子各一錢半 黃芩二錢 麦冬一錢半 防風二錢 荆芥一錢半

【制法】共研細面,煉蜜为丸重二錢,白蜡外衣。

【剂量及用法】每服二錢,白开水送下。

五、青 島

【处方】青叶 連翹 銀花各三

兩 竹叶二兩 紫草二兩 豆豉一兩
甘草二兩 芥穗二兩 寸冬五兩
葛根一兩五錢 蘆根一兩 牛蒡子二兩
蓮心一兩 薄荷一兩 元參四兩
丹皮三兩 小生地五兩 花粉澤瀉
郁金 公英 姜皮 大黃各三兩
生石膏六兩 羚羊 豉梗各一兩

【制法】共軋細面，蜜丸重二錢，金衣，蜡皮。

六、沈陽

【功能与主治】清瘟解毒退熱。主咽喉腫痛，四時感冒，清透疹毒，鎮驚解熱。

【處方】(1) 薄荷 連翹 芥穗 銀花 豆豉 豉梗各一兩二錢 牛蒡子八錢 生甘草 竹叶各四錢 血羚羊八分

(2) 上方加暹羅角八分

【制法】共軋極細面，煉蜜為丸，二錢重，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】忌食腥辣酸類。

七、呼和浩特

【處方】桔梗六錢 黃芩一兩 元參一兩 銀花六錢 連翹六錢 青葉一兩 生地六錢 薄荷二錢 甘草三錢 生石膏六錢 花粉五錢 桑葉四錢 赤芍五錢 黃連三錢 生梔五錢 羚羊三錢

【制法】共為細面，蜜大丸重一錢半，金衣蜡皮封固。

銀翹解毒丸

一、北 京

【功能与主治】清熱散風。主感冒初起，憎寒發熱，四肢痠懶，頭疼咳嗽，咽喉疼痛。

【處方】金銀花 連翹各一兩 桔梗 薄荷各六錢 竹叶四錢 甘草五錢 荆芥穗四錢 淡豆豉五錢 牛蒡子六錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重三錢。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水或蘆根煎水送下。

【禁忌】忌食油膩厚味。

二、天 津

【功能与主治】清熱解表，散風退熱。主流行感冒，發冷發熱，四肢痠懶，頭疼咳嗽，咽喉腫痛，瘟毒發頤，兩腮亦腫。

【處方】同北京。

【制法】共為細粉，煉蜜為丸三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

三、南京(銀翹解熱丸)

【功能与主治】疏風，清熱。主初起感冒風熱，發熱頭痛，目赤腮腫，喉痛等症。

【處方】同北京。

【制法】共研細末，加煉白蜜為大丸，一錢重，蜡紙包裝。

【劑量及用法】每服一丸，一日二次，開水和服，兒童酌減。

四、蘭 州

【功能与主治】清熱散風，除煩解毒，發汗退熱，潤大便，止嗽化痰。主流行性感冒，頭疼咳嗽，咽喉腫痛，四肢疲乏等症。

【處方】銀花六兩 花粉四兩 粉葛根一兩 薄荷葉一兩 連翹六兩 黃芩四兩 前胡三兩 蘇葉二兩 小生地五兩 梔子三兩 赤芍三兩 芥穗一兩 元參五兩 大力子二兩 川連三兩 生石膏一斤 桔梗一兩 甘草三兩 大青葉二兩

【制法】以上軋細面，蜜丸，一錢重。

【劑量及用法】每次一丸，白開水送下。

【備考】如熬膏每斤清膏兌蜜二斤，每服一兩。

五、濟 南

【功能与主治】風溫初起，頭痛鼻塞，咽痛咳嗽，身倦寒熱，及小兒風疹等症。

【處方】銀花一兩 生甘草五錢 連翹一兩 荆芥穗四錢 桔梗六錢 淡豆豉五錢 薄荷六錢 牛蒡子六錢 竹叶四錢 炒梔子四錢

【制法】共為細末，煉蜜為丸，重三錢。

【劑量及用法】每服二丸，溫開水化服。

【禁忌】忌食油膩，辛辣等物。

六、承 德

【功能与主治】風溫初起，頭痛鼻塞，咽痛咳嗽，身倦寒熱及小兒風疹等症。

【處方】同北京。

【制法】共為細粉，用蘆根一兩煎水泛小丸，滑石為衣，闔亮，每兩分作二百粒。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌食油膩。

感冒蘇風丸

昆 明

【功能与主治】感冒風寒，發熱咳嗽。

【處方】炙麻絨二兩 小杏仁三兩 枳殼三兩 炒白芍五兩 蘇葉二兩 防風一兩 谷芽五兩 桔梗二兩 生草二兩 大棗二兩 燒姜(引) 獨活二兩

【制法】研末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服一丸，早晚開水送服。

【禁忌】熱性病忌服。

和 解 丸

沈 陽

【功能与主治】辛散透表，疏風散寒。主四時感冒，頭痛發熱，鼻流清涕，骨節痠痛，咳逆嘔噦，四肢倦怠，寒熱往來，口渴自汗。

【處方】荆芥穗 羌活 白芷 葛根各四兩 川芎 花粉 玄參 赤芍 柴胡各二兩 黃芩 連翹 薄荷 甘草各一兩

【制法】共軋極細面，水泛為小丸。

【劑量及用法】每服二錢白開水送服，小兒減半后令微汗。

【禁忌】汗出避風，忌辛辣食品。

川芎茶調丸

上 海

【功能与主治】感冒風寒，大目昏重，偏正頭痛。

【處方】薄荷八兩 荆芥 川芎各四兩 細辛一兩 羌活 防風

白芷 甘草(炙)各二兩

【制法】共研細粉，水泛为丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每服二錢，一日三次，食后茶調服下。

九味羌活丸

一、西 安

【功能与主治】主伤風感冒，發熱鼻塞。

【处方】羌活 防風 蒼朮各三兩 黃芩 白芷 川芎 生地 甘草各二兩 細辛一兩

【制法】細末蜜丸。

【剂量及用法】每服二、三錢，姜葱湯送下

【禁忌】氣血虧損、陰虛等熱症者忌服。

二、重 庆

【功能与主治】通治六經感冒風邪。

【处方】羌活一兩五錢 防風 蒼朮各一兩 細辛五錢 川芎 白芷 生地 黃芩各八錢 甘草六錢

【制法】共研細末，用生薑二兩、葱二兩、大棗十二兩煎水泛丸。

【剂量及用法】每服三錢，白開水送下，服后宜臥被蓋好取汗。

清 眩 丸

一、北 京

【功能与主治】解熱散風。主感冒風寒，頭目眩痛。

【处方】川芎 白芷各二百兩 石膏一百兩(生) 薄荷 荊芥穗各九十二兩

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，重二錢。

【剂量及用法】每服二丸，白開水送下。

二、天 津

【功能与主治】清火散風，解熱止痛。主風熱上攻，頭暈頭眩，偏正頭痛，鼻塞不通，二便不利。

【处方】川芎 白芷各一斤四兩 薄荷九兩五錢 荊芥穗九兩六錢 生石膏 人黃各十兩 天麻八兩 菊花十兩 元參(去蘆)十兩

【制法】共为細粉，煉蜜为丸三

錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】貧血性頭眩頭疼症及孕婦忌服。

三、蘭 州

【功能与主治】去風發汗，解熱止痛。主頭痛眩暈，鼻塞發熱，大便干燥。

【处方】同天津。

【制法】共研細面，蜜为丸二錢重。

【剂量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】貧血性頭眩症忌服。

四、大 同

【功能与主治】主上焦風火，頭目眩暈，偏正頭痛，神經痛。

【处方】川芎 白芷各四十兩 芥穗 薄荷各十二兩 生石膏二十兩

【制法】共研細面，煉蜜为丸，每丸一錢五分。

【剂量及用法】每次服三錢，開水送下。

五、濟 南

【功能与主治】發熱口渴，頭目眩暈。

【处方】同天津。

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，重二錢。

【剂量及用法】每服一丸，每日服二次，白開水送下。

【禁忌】忌食辛辣、油膩等物。

六、青 島

【处方】川芎 細辛 白芷 芥穗 薄荷 甘草各四兩 石膏十兩 藜蘆十兩 天麻二十兩 元參十兩 菊花 金沸草 荊芥子各六兩

【制法】共为細面，煉蜜为丸，每丸重三錢。

七、呼 和 浩 特

(古方清眩丸)

【处方】川芎 細辛 芥穗 白芷 薄荷 石膏 藜蘆 元參 甘草 菊花 荊芥子 天麻各等分

【制法】共为細面，蜜丸重二錢五分。

清 蠟 丸

北 京

【功能与主治】清熱散風。主風熱郁結，頭目眩暈。

【处方】川芎三錢 柴胡三錢 白芍三錢 菊花四錢 白芷三錢 石決明三錢 當歸三錢 天麻三錢 黃芩二錢 半夏三錢 白茅根三錢 磁石三錢(煅) 甘草二錢

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，重二錢。

【剂量及用法】每服二丸，日服二次，溫開水送下。

神 仙 冲 和 丸

青 島

【处方】羌活半斤 細辛三兩 川芎十兩 白芷十兩 附片十兩 蒼朮十兩 甘草三兩 生地十兩 黃芩十兩

【制法】共为細末，水泛为丸。

【剂量及用法】每服一錢，白開水送下。

均 气 丸

吉 林

【功能与主治】解表清熱，理氣生津。主頭痛，目眩，周身發熱等症。

【处方】榔片一兩三錢四分 柴胡 羌活 白芍 葛根 知母 黃芩 藜蘆 川軍各六錢七分 根朴一兩三錢四分

【制法】共研細面，泛水为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服一錢，姜湯送下。

【禁忌】孕婦忌服。

防 風 通 聖 丸

一、北京、承德

【功能与主治】清熱去濕，散風止痒。主憎寒壯熱，頭痛目眩，鼻塞咳嗽，大便干燥，皮膚風毒刺痒。

【处方】防風 川芎 當歸 白芍 大黃 薄荷 麻黃 連翹 玄明粉各五錢 石膏(生) 黃芩 桔梗各一兩 滑石三兩 甘草二兩

荆芥穗 白朮 梔子各二錢五分

【制法】共為細粉，水泛小丸，滑石為衣闔亮。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌食油膩厚味；孕婦忌服。

二、天津

【功能與主治】疏風發汗，清熱利便。主感冒入疼，皮膚刺痒，鼻塞聲重，大便燥結，小便赤黃。

【處方】防風 當歸 川芎 生白朮 人黃 薄荷 麻黃 芒硝 生石膏 黃芩 桔梗 甘草 荆芥穗 生白朮 炒梔子 連翹(去心)各二兩五錢

【制法】共為細粉，涼開水泛小丸，每斤丸藥用桃膠二錢熬水，滑石二兩上灰，二錢重裝袋。

【劑量及用法】每次服一袋，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、上海

【功能與主治】濕熱內蘊，外科瘡瘍。

【處方】防風(酒炒) 川芎(酒炒)各五錢 白朮(炒)二錢五分 大黃(煨)五錢 山梔子(炒焦)二錢五分 連翹五錢 麻黃(去節)五錢 荆芥二錢五分 白芍藥(酒炒)五錢 當歸(酒炒)五錢 薄荷五錢 甘草二兩 芒硝五錢 黃芩一兩 桔梗一兩 石膏(生)一兩 滑石(飛)三兩

【制法】除芒硝外，余藥共研細粉，將芒硝化水泛丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二錢至三錢，用生薑三片，蔥白二根煎湯送服。

四、南京

【功能與主治】主濕熱之頭痛，目赤，耳鳴，舌干，便秘，溺澀，瘡瘍，癰疹等症。

【處方】桔梗一兩 連翹五兩 黃芩一兩 大黃五錢 防風五錢 麻黃五錢 川芎五錢 芒硝五錢(化水泛丸) 薄荷五錢 荆芥二錢五分 當歸五錢 白朮二錢五分 赤芍五錢 焦山梔一錢五分 飛滑石三兩(另研為衣) 生甘草二兩

(另研為衣) 石膏一兩(另研為衣)

【制法】上藥除滑石、甘草、石膏外，余藥共研細末，以芒硝化水泛丸，每錢約五十粒，滑石、甘草、石膏三味細末為衣。

【劑量及用法】每服二錢，一日二次，升水吞服；小兒酌減。

【禁忌】孕婦忌服。

五、武漢

【功能與主治】感冒頭痛，咳嗽便結，飲食停滯，憎寒發熱，及皮膚風痒等症。

【處方】同北京。

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用淨水制成小丸，每錢不得少于三十粒。

【劑量及用法】每服一錢至二錢。

【禁忌】忌食葷腥油膩之物。

六、福州

【功能與主治】治風熱壅盛，表里三焦皆實，頭項強痛，口苦舌干。

【處方】大黃(酒蒸) 芒硝 防風 荆芥 麻黃 黑梔 白芍(炒) 連翹 川芎 當歸 薄荷 白朮各五錢 桔梗 黃芩 石膏各一兩 甘草二兩 滑石二兩

【制法】共研細末，加葱薑湯泛丸。

七、杭州

【功能與主治】治風熱暑濕諸邪所傷，氣血郁結，表里俱實，畏寒發熱，頭痛無汗，目赤鼻塞，二便閉澀，以及斑疹瘡瘍等症。

【處方】同福州。

【制法】共研細末，元明粉泡水，姜蔥煎湯泛丸。

【劑量及用法】每服二至三錢，淡姜湯或開水送下。

八、南昌

【功能與主治】風溼暑溼及表里俱實，寒熱身痛，二便不利，及一切瘡疥，頭目昏暈。

【處方】麻黃(去節) 薄荷 大黃(煨) 白芍(焙) 當歸 川芎 防風各五錢 滑石(飛)一兩 桔梗 黃芩(焙) 石膏(煨)各一兩 芒硝 連翹各五錢 炒梔子 白朮(土炒) 荆芥穗各二錢五分 生甘草二兩

【制法】共研細末，芒硝化水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，食前溫開水送下，小兒視年齡及病情應酌減服。

【備考】非經醫師處方不得使用。

九、重慶

【功能與主治】治一切風濕暑濕，飢飽勞役，內外諸邪，氣血拂郁，表里三焦俱實，乍寒乍熱，頭目昏暈，目赤睛痛，耳鳴鼻塞，大便秘結，小便赤澀，驚狂譫語，丹斑癰疹等症。

【處方】同北京，量加倍。

【制法】除芒硝化水，余藥共研細末，用生薑煎湯化芒硝水泛丸，紙盒包裝。

【劑量及用法】二錢至三錢。

【禁忌】非表里俱實、大小便秘澀者忌服。

十、昆明

【功能與主治】風濕郁結，頭面生瘡，咽喉腫痛，大便不利。

【處方】大黃 防風 芒硝 荆芥 麻黃各五兩 梔子四兩 赤芍五兩 連翹四兩 甘草六兩 桔梗八兩 川芎五兩 秦艽尾四兩 石膏八兩 滑石一兩 薄荷四兩 黃芩八兩 白朮四兩 木通四兩

【制法】水疊為丸。

【劑量及用法】每服二錢半，幼童減半，開水送服。

【禁忌】體弱畏寒者忌服。

十一、蘭州

【功能與主治】發汗解熱，生津利便。主鼻塞聲啞，咳嗽清涕，頭痛腰痠，骨節疼痛，唇干口苦，邪熱惡寒。

【處方】防風 川芎 當歸 白芍 大黃 薄荷 麻黃 連翹 芒硝各五錢 石膏 黃芩 桔梗各一兩 滑石二兩 甘草一兩 荆芥 白朮 炒梔子各五錢

【制法】共為細面，水打為丸，滑石為衣。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

十二、大同

【功能與主治】內傷外感，表里

兩解。

【处方】防風 荊芥 連翹 麻黃 薄荷 當歸 川芎 白芍各一斤 黃芩 石膏各二斤 桔梗一斤 滑石六斤 白朮 大黃 芒硝 山梔各一斤 生草四斤

【制法】共軋細面，水泛為丸。

【劑量及用法】早晚每服三錢，開水送下，淡姜湯亦可。

【禁忌】孕婦忌服。

十三、濟南

【功能與主治】停食感冒，憎寒壯熱，人病身痛，鼻塞咳嗽，口干舌燥，大便不通，小便色赤，兼治皮膚風痒各症。

【处方】同北京。

【制法】共為細粉，水泛小丸，滑石為衣闕亮。

【劑量及用法】每服二錢至三錢，溫開水送下。

【禁忌】忌食辛辣、油膩等物；孕婦忌服。

十四、青島

【处方】防風 川芎 荊芥 當歸 大黃 薄荷 赤芍 連翹 芒硝 石膏 麻黃 桔梗各十兩 滑石二十兩 甘草 黃芩 蒼朮 梔子各二十兩

【制法】共軋細面，水泛成丸，如綠豆大。

十五、沈陽(防風解熱丸)

【功能與主治】解表清里，透汗利便。寒從外襲，發熱惡寒，溫病發熱頭痛身痛，咽干紅腫，乍冷乍熱，瘡瘍初起，無名腫毒，腸風便血，噤口痢疾，胃熱作嘔，尿赤便秘。

【处方】防風 麻黃 荊芥 薄荷 川芎 當歸 白芍 白朮 焦山梔 大黃 芒硝各五錢 黃芩 生石膏 桔梗各一兩 甘草二兩 滑石三兩

【制法】共軋極細面，水泛為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】忌烟酒辛辣等刺激性之物；出汗當避風。

十六、撫順

【功能與主治】解熱，瀉下。主

傷寒溫熱病初期之一切寒熱頭痛，體溫上升，便秘尿赤，煩渴思飲，瘡瘍腫毒，腸炎便血，咽喉腫痛，嚥下困難等症。

【处方】防風 黃芩 桔梗 山梔 麻黃 滑石 當歸 大黃 蒼朮 朴硝 薄荷 川芎 石膏 白芷 甘草各四兩 連翹一斤 荊芥一斤

【制法】共為細面，水泛小丸。

【劑量及用法】每服一錢至二錢，食前白開水或姜水送下。

【禁忌】表里無實熱者勿服；孕婦忌服；忌食辛辣之物。

十七、哈爾濱(通聖丸)

【功能與主治】解表清里，透汗利便。主傷寒；寒邪外襲，發熱惡寒，頭痛體痛，泛嘔便結。溫病；發熱惡熱，煩渴思飲，大痛體痛，便結澀結。喉痹；相火火盛，感冒寒涼，發為喉痹，咽喉紅腫，疼痛閉塞，寒熱往來，頭痛體痛，泛嘔便結。瘡瘍腫毒；血分毒熱，發為瘡瘍，無名腫毒，初起可消。腸風便血；腸熱便血，先血後便，病在大腸，症屬近血。便秘；腸胃內熱，津液失潤，便秘澀澀，口苦舌干，頭暈目眩，耳鳴口臭。

【处方】大黃 滑石各六兩 防風 麻黃 荊芥 石膏(生) 黃芩 梔子各四兩 薄荷 白朮 當歸 連翹 川芎各三兩 桔梗四兩 白芍三兩 甘草二兩 芒硝一兩

【制法】共軋為細面，水泛為小丸，如梧桐子大。每二錢為一付，封入印就之紙袋內。

【劑量及用法】每服一付，白開水送下。

【禁忌】表里無實熱者勿服；孕婦忌服；忌食辛辣之物。

十八、呼和浩特

【处方】防風 川芎 當歸 白芍 大黃 薄荷 麻黃 連翹 皮硝各五兩 生石膏 黃芩 桔梗各一斤四兩 蒼朮四斤十一兩 滑石五斤十兩 甘草三斤十二兩 荊芥四斤十一兩 生梔四斤十一兩

【制法】共為細面，水泛小丸，滑石為衣。

【備考】通聖膏照前方，麻黃、薄荷加半蜜膏，每斤成膏兌元明粉、川軍各二兩。

時 感 類

雙解丸

昆 明

【功能與主治】外感風寒，內傷飲食，頭痛咳嗽，寒熱身疼。

【处方】蘇葉九兩 香附 羌活 防風 焦楂 麥芽各六兩 枳實九兩 蒼朮十二兩 廣皮六兩 法夏 厚朴各十二兩 桑皮 白芷 黃芩 蘇子各六兩 甘草三兩

【制法】水疊為丸。

【劑量及用法】每服二錢半，幼童減半，開水送服。

【禁忌】體虛者勿服。

雙解香蘇丸

呼 和 浩 特

【处方】陳皮 香附 枳殼 前胡 干葛 川芎 蒼朮 白芷 羌活 蘇葉 防風各六兩 烏藥 麻仁 甘草各四兩

【制法】共為細面，水泛小丸。

雙解通聖丸

一、青 島

【处方】防風 川芎 當歸 赤芍 薄荷 連翹 麻黃各五兩 石膏 黃芩 桔梗各十兩 滑石 甘草各二十兩 荊芥 蒼朮 梔子各二十兩五錢

【制法】共軋細面，水泛成丸，如綠豆大。

二、呼和浩特

【处方】芥穗 防風 連翹 桔梗各二斤 生梔 黃芩 川芎 當歸 石膏 赤芍 薄荷 甘草各十二兩 麻黃二斤 滑石一斤

【制法】共為細面，水泛小丸。

消食蘇風丸

昆 明

【功能與主治】四時感冒，發熱怕冷，止咳祛痰，消食調味。

【处方】蘇葉二兩 荊芥二兩 防風二兩五錢 法夏二兩 陳皮二兩 粉葛三兩 枳殼二兩 厚朴三兩 桔梗二兩五錢 前胡二兩 焦楂四兩 麥芽三兩 杏仁三兩 薑

仁一兩五錢 白芷一兩五錢 甘草一兩

【制法】研末煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服一丸，開水送下。

【禁忌】生冷。

五 積 丸

一、武 漢

【功能與主治】頭目昏痛，肩背拘急，惡寒發熱，腹痛嘔吐，心腹痞悶，飲食不進，及婦女經候不調等症。

【處方】麻黃六兩 白芷三兩 蒼朮二十四兩 川芎三兩 干姜(炮)四兩 肉桂三兩 陳皮六兩 川朴四兩(姜制) 桔梗十二兩 枳殼六兩(麩炒) 法半夏三兩 云苓三兩 當歸三兩 白芍三兩(酒洗) 甘草二兩

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用葱及生薑各五兩煎水，送成小丸，每錢不得少于二十粒。

【劑量及用法】每服一錢至三錢，開水吞下。

【禁忌】一般熱性感冒及內熱盛者均慎用。

二、南 昌

【功能與主治】外感寒濕，內傷生冷，惡寒，身疼腹痛嘔吐。

【處方】半夏(姜制)三錢 泡干姜四錢 厚朴(姜制)四錢 陳皮(去白)五錢 枳殼(麩炒)五錢 麻黃(去節根)五錢 桔梗六錢 蒼朮(米泔浸炒去皮)八錢 川芎三錢 桂枝三錢 白芍(酒洗)三錢 當歸身三錢 白芷三錢 甘草三錢 茯苓三錢

【制法】共研細末，用葱白一兩五錢、生薑一兩煎水泛丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。蓋被取微汗。

【備考】非經醫師處方勿服用。

三、青 島

【處方】麻黃 茯苓 白芷 半夏 陳皮各六兩 當歸 川芎 甘草各三兩 桔梗二兩 干姜四兩 川朴四兩 蒼朮半斤 枳殼六兩 肉桂二兩 白芍一兩

【制法】共為細面，水泛成丸，為桐子大。

四、沈 陽

【功能與主治】和胃祛濕散風，主脾胃虛冷，腹肋脹痛，嘔逆惡心，外感風寒，頭痛項強，脊背拘緊，婦人血氣不調，心腹脹痛，惡寒帶下。

【處方】橘皮二兩 枳殼六兩 麻黃六兩 白芍 川芎 當歸 炙甘草 茯苓 半夏 肉桂 白芷各三兩 厚朴四兩 炮姜四兩 桔梗一斤

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，姜湯送下。

【禁忌】忌食生冷粘硬之物。

五、撫 順

【處方】白芷一兩 甘草五錢 白芍一兩 蒼朮一兩 陳皮一兩 邊桂五錢 半夏一兩 枳實八錢 川朴八錢 桔梗八錢 麻黃一兩 干姜五錢 川芎一兩半 白芍一兩 當歸二兩

【制法】共為細面，水泛小丸。

六、呼 和 浩 特

【處方】枳殼 厚朴 桔梗 當歸 干姜各二兩五錢 杭芍 茯苓各二兩五錢 白芷 川芎 法夏 官桂 甘草各二錢五分 蒼朮四兩 廣皮四兩 麻黃四兩

【制法】共為細面，棗水泛小丸。

如意丸(如意丹)

武 漢

【功能與主治】寒熱頭痛，悶亂嘔吐，內熱無汗，煩躁便秘。

【處方】茅蒼朮五兩 飛雄黃六兩 麝香五錢 蟾酥一兩六錢 大黃十兩 天麻六兩 飛硃砂六兩 甘草四兩 公丁香一兩 麻黃六兩

【制法】除蟾酥、麝香、硃砂外，取上藥進行干燥，混合碾細，將蟾酥用酒化開，用液送成小丸，再以飛硃砂、麝香為衣，每錢不得少于六十粒。

【劑量及用法】每服二十粒至六十粒，溫開水送下。對不能服藥的急症病，亦可研成細末吹入鼻內。

【禁忌】孕婦慎用，或遵醫囑。

時疫清瘟丸

一、北京、承德

【功能與主治】清熱解毒，生津化滯。主停滯感冒，發熱頭痛，咽疼口渴。

【處方】金銀花 連翹 黃芩 荊芥穗 赤芍 玄參 防風 天花粉 焦三仙 梔子 豆豉各四兩 白芷二兩 甘草 薄荷 生地各二兩 共為細粉，每九十二兩細粉兌，犀角一錢

【制法】上藥和勻，煉蜜為丸，重二錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服二丸，溫開水或蘆根煎湯送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、青 島

【處方】殭蠶五錢 元參一兩 連翹五兩 雙花五兩 川朴五錢 石膏一兩 橘紅五兩 生地五錢 梔子五兩 柴胡三錢 藿香五錢 黃連三錢 花粉五錢 大黃八兩 甘草三錢 羚羊二錢 冰片二錢

【制法】共碾細面，蜜丸重二錢，金衣蜡皮封。

三、大同(清瘟丸)

【功能與主治】瘟疫傳染，畏寒無汗，頭痛發熱，四肢無力。

【處方】蘇叶 元參 連翹 赤芍 天花粉 赤芍 生地各四錢 羌活二錢 川朴 半夏 粉葛 藿香 蒼朮 桔梗 橘紅 黃芩 柴胡 梔子 甘草 川柳各三錢 犀角二分 羚羊五分 冰片五錢

【制法】共為細面，煉蜜為丸。金泊衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服三錢，鮮姜水送下。

四、沈陽(清瘟丸)

【功能與主治】興奮清涼，清熱解毒。主四時感冒，頭痛牙痛，惡寒發熱，口渴咽干，目痛鼻塞，嘔吐煩悶，四肢無力，傷風咳嗽，痰涎壅盛，呼吸困難，目赤眩暈，神智不清，手足熱厥。

【處方】生芍一兩 菊花 生石膏各二兩 黃芩一兩 雙花二兩

荆芥穗一兩 山梔八錢 胆草一兩
白前五錢 薄荷七錢 楂炭八錢
前胡八錢 烏角五錢 枳殼八錢
青蒿七錢 黃連一兩 青皮一兩
滑石九錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】忌食生冷、魚腥、辛辣之物。

五、呼和浩特

【處方】藿香三錢 陳皮四錢
厚朴三錢 蒼朮六錢 腹皮四錢
蘇葉三錢 白芷五錢 赤芍六錢
夏橘三錢 桔梗八錢 甘草四錢
柴胡四錢 連翹四錢 川芎三錢
銀花三錢 花粉五錢 黃芩四錢
赤芍六錢 元參四錢 山葛三錢
杭菊六錢 黃連四錢 犀角三錢
羚羊三錢 冰片二錢

【制法】共為細面，蜜丸三錢重，半金衣，蜡皮封固。

清瘟解毒丸

一、濟南、承德

【功能與主治】主瘟疫初起，頭暈脹痛，身熱惡寒，咳嗽喉痛。

【處方】連翹三兩 銀花四兩
桃仁一兩 花粉二兩 菊花二兩
牛蒡子二兩 桔梗一兩五錢 桑葉二兩
浙貝母二兩 玄參三兩 竹葉二兩
甘草二兩 赤芍一兩 薄荷一兩五錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重二錢。

【劑量及用法】成人每服二丸，小兒酌減，溫開水化服。

【禁忌】忌食辛辣、油膩等物；孕婦忌服。

二、北 京

【功能與主治】散風解熱。主感冒頭痛，身熱畏寒，四肢痠疼。

【處方】羌活七十五兩 連翹七十五兩
桔梗七十五兩 黃芩一百兩
玄參一百兩 大青葉一百兩
竹葉一百兩 天花粉一百兩 葛根一百兩
牛蒡子一百兩 白芷五十兩
川芎五十兩 赤芍五十兩 柴胡五十兩
防風五十兩 甘草二十

五兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重二錢。

【劑量及用法】每服二丸，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌油膩麵食；孕婦勿服。

三、天 津

【功能與主治】清瘟解表，發汗退燒。主感冒頭痛，身熱畏寒，四肢發軟，骨節痠痛，風寒咳嗽，小便赤黃。

【處方】葯同北京，量為北京的十分之一。

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

四、蘭 州

【功能與主治】散風解熱。主四季流行性感風，作燒作冷，四肢發軟，骨節痠痛，頭暈無汗，小便赤黃。

【處方】同天津。

【制法】共軋細面，煉蜜為丸，三錢重。

【劑量及用法】每次服用一丸，白開水送下，見汗即可。

【禁忌】汗多者忌服。

【備考】如熬膏，每清膏一斤，兌蜜二斤。每次服一兩。

五、青 島

【處方】柴胡二斤半 干葛 白芷 桔梗 川芎 羌活 連翹 黃芩 花粉 元參各一斤 甘草半斤 赤芍一斤 竹葉一斤

【制法】共軋細面，煉蜜為丸，重二錢五分。

六、哈爾濱(清瘟解毒丹)

【功能與主治】清瘟解毒，透表發汗。主溫熱身熱口渴，頭痛體痛，心煩嘔逆，懊憹不安，口苦耳聾，溲澀便燥。瘟毒發頤，溫熱余毒，發為頤腫，便秘疼痛，咽喉閉塞。瘟毒發斑發疹，溫熱成毒，遍體發斑，形如云片，或發疹粒，壯熱蒸燒，神昏譫語。大頭瘟毒：君相火盛，風邪外襲，頭面焮腫，形如佛斗，壯熱頭痛，泛嘔嘔吐，煩躁思飲。感冒：感冒寒涼，發熱畏冷，頭痛體痛，泛嘔口

干。

【處方】連翹 柴胡 川芎各二兩 花粉 玄參各一兩 葛根 白芷 竹茹 黃芩 赤芍 桔梗 川芎各二兩 甘草一兩

【制法】共軋細面，煉蜜為二錢一分重丸。(一方有硃砂為衣)瓷罇存貯，或蜡皮封。

【劑量及用法】鮮姜湯為引，每服一丸，日夜三、四次，取汗為宜。

【禁忌】孕婦忌服。忌食腥辣。

七、呼和浩特

【處方】柴胡 斤半 葛根 白芷 川芎 羌活 桔梗 連翹 花粉 黃芩 元參 竹葉 赤芍各七斤 甘草三斤半

【制法】以上共為細面，蜜丸，重一錢。

【備考】熬膏，照原方加麻黃、蘇梗各七斤。

犀羚解毒丸

一、大 同

【功能與主治】感冒身熱，乍寒乍熱，或發斑疹，心煩體倦，風邪溫病。

【處方】薄荷 芥穗 連翹 銀花 牛蒡子 竹葉 淡豆豉 苦桔梗 甘草各一兩 犀角二分 羚羊二分 冰片一錢。

【制法】軋細末，煉蜜為丸，每丸二錢，金泊衣，蜡皮。

【劑量及用法】每次服一粒，視患者之需要或遵醫囑。

二、濟 南

【功能與主治】感冒發燒，頭痛咳嗽。

【處方】薄荷 芥穗 連翹 銀花 牛蒡子 竹葉 淡豆豉 苦梗 甘草各二兩 犀角 羚羊角各二分 冰片一錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重二錢，金衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下，不愈者日再服。

連翹解毒丸

武 漢

【功能與主治】瘟腫初起，憎寒

壯熱。

【处方】金銀花五兩 粉甘草 木通各一兩 防風 荊芥 連翹 牛蒡子各二錢

【制法】上藥進行干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于二十粒。

【劑量及用法】每服三錢，開水送下

清涼解毒丸

沈 陽

【功能與主治】清熱解毒，消腫止痛。主咽喉腫痛，風火牙痛，口瘡舌裂，牙齦出血，耳聾鼻腫，口中穢氣，偏正入痛，暴發火眼，音啞無聲，口中干渴，失暈目眩，飯後作嘔。

【处方】麥冬 黃芩 桔梗 金銀花 山梔 杏仁 黃柏 大黃 浙貝 連翹 生地 菊花各三錢 薄荷 赤芍 丹皮 甘草 烏角各二錢 雄黃 冰片 硃砂各一錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，七分重。

【劑量及用法】每服一丸，口中嚥化或白開水送下。

【禁忌】五辛發物油膩。

消炎解毒丸

沙 市

【功能與主治】治溫毒咽喉腫痛，耳前耳后腫，風熱上壅，頭面腫大及濕熱癰瘡等症。

【处方】玄參一兩 桔梗 粉甘草 赤芍 殭蠶各五錢 薄荷 竹葉 各三錢 板藍根 黃芩 山豆根 各五錢 連翹一兩 杭菊花四錢 天花粉五錢 二花一兩

【制法】上藥研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】成人每次服二錢，溫開水下，日服二次；小兒老人酌減。

【禁忌】體弱而無炎症者忌服。

普濟丸 普濟消毒丸

吉 林

【功能與主治】清瘟解毒，解表清里。主治：（一）大頭瘟：君相火盛，風邪外襲，頭面癰腫，起泡流水，發熱畏冷，嘔吐煩渴，神昏譫語，中

脘攪悶。

（二）喉痹：痰火熾盛，感冒風寒，咽喉紅腫，勢將閉塞，疼痛異常，滴水難嚥，寒熱往來，嘔吐煩渴。

【处方】黃芩（酒炒）二兩 黃連（酒炒）二兩 牛蒡子四錢 玄參八錢 生甘草八錢 桔梗八錢 板藍根四錢 柴胡八錢 升麻二錢八分 馬勃四錢 連翹四錢 陳皮八錢（去白） 殭蠶二錢八分 薄荷四錢 野軍一兩

【制法】共碾細面，煉蜜為二錢重丸，包裝或用瓶貯存。

【劑量及用法】每服一丸姜湯送取汁泄瀉為宜。

【禁忌】忌食腥辣。

普濟通宣丸

呼和浩特

【处方】人中白 防風 芥穗 羌活 白芷 柴胡 黃芩 桔梗 青葉 花粉 元參 赤芍 薄荷 熟軍各二兩

【制法】共為細面，羌葵水泛小丸。

普濟通眩丸

青 島

【处方】人參六兩 防風三兩 黃連十兩 陳皮四兩 桔梗四兩 黃芩十兩 柴胡四兩 甘草五兩 大力子五兩 元參四兩 板藍根三兩 連翹三兩 殭蠶三兩 馬勃三兩 薄荷三兩 升麻二兩 川芎二兩 當歸二兩

【制法】共為細末，水泛為丸。

犀角化毒丸

沈 陽

【功能與主治】清血，解毒，退熱。主牙宣口臭，心熱煩渴，痘疹余毒，肉齒出血，皮膚潰爛，頭面瘡癤。

【处方】廣角三錢 桔梗一兩 生地五錢 赤芍六錢 牛蒡子五錢 連翹六錢 元參三錢 青黛二錢 朴硝二錢 黃芩五錢 花粉五錢 甘草三錢 酒大黃三錢 大貝五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，

七分重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

達原丸(至聖達原丸)

吉 林

【功能與主治】避瘟去暑，解熱，止嘔利便。主時疫，傷風，頭痛，小便不利，嘔吐泄瀉。

【处方】檳榔 紫朴 知母 生芍 黃芩各六錢七分 菓仁 甘草各二錢四分

【制法】共為細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

代天宣化丸

一、吉林、哈爾濱

(宣化丸)

【功能與主治】清瘟解毒，透疹退熱。主治麻疹：溫熱發疹，皮里隱伏，毒勢反攻，氣喘壯熱，神昏煩躁，唇裂口干。瘟毒爛喉：瘟毒內蘊，咽喉糜爛，氣臭音啞，滴水難嚥。瘟毒發斑：熱蓄血分，體熱發斑，形如云片。癰痧（猩紅熱）：咽喉腐爛，皮膚癰腫，顆粒不分，舌起芒刺，壯熱煩躁，氣促煩躁，煩渴思飲，神昏譫語。

【处方】人中黃一兩 川黃連 川黃芩 山梔子 子條芩各五錢 苦參 荊芥穗 軟防風 淨連翹 山豆根 牛蒡子 紫蘇葉各四錢 神麴 硃砂 雄黃各二錢

【制法】除硃砂、雄黃另研為衣外，余藥均一處碾為細面，用升麻四兩煎汁合竹瀝二錢和蜜為丸，重七分。瓷罐貯貯或蜡皮封之。

【劑量及用法】每服一丸，日二、三服，竹葉湯為引。

【禁忌】忌食魚腥、辛辣之物。

二、青 島

【处方】人中黃 黃芩 梔子 黃柏 黃連 苦參 荊穗 防風 連翹 牛蒡 蘇叶

【制法】雪水為丸，硃砂、雄黃為衣。

三、沈陽(宣化丸)

【功能与主治】清溫解毒，退熱透疹。主瘟疫發熱，頭痛腹痛，譫語無汗，日久不愈，發黃及斑疹，二便不通，暑天一切熱症。

【處方】人中黃一兩 苦參四錢 甘草 黃芩 梔子 黃柏 黃連各五錢 神曲二錢 明雄黃二錢 硃砂一錢 蘇葉 荊芥穗 牛膝 防風 連翹 豆根各四錢

【制法】除硃砂、雄黃另研外，余則共碾極細面，水泛為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，小兒減半，白開水送下。

【禁忌】忌食辛辣、葷腥、油膩之物。

四、撫順

【處方】人中黃五錢 元連 元柏 山梔 元芩各二錢半 防風 連翹 豆根 牛蒡子 蘇葉 苦參 荊芥穗各二錢 神曲六錢。

【制法】一料加升麻二兩(熬膏)，竹瀝二錢，蜜丸，一錢大。

五、呼和浩特

【處方】人中黃 黃柏 黃芩 生梔 黃連各四兩 連翹二兩 荊芥穗三兩

【制法】共為細面，水泛小小丸，硃砂衣。

附參考古方

【來源】幼科証治准繩。

【功能及主治】痘疹預防。

【處方】人中黃(屬土，甲巳年為君)黃芩(屬金，乙庚年為君)黃柏(屬水，丙辛年為君)梔子仁(屬木，丁壬年為君)黃連(屬火，戊癸年為君)苦參(佐) 荊芥穗(佐) 防風(去蘆)，(佐) 連翹(酒洗)，(佐) 山豆根(佐) 牛蒡子(酒淘炒)(佐) 紫蘇葉(佐)

【制法】先視其年所屬，取其藥以為君，其余主歲者為臣，為君者倍之，為臣者半之，為佐者如臣四分之一，于冬至日修合為末，取雪水煮升麻和竹瀝調神曲為丸，外用辰砂、雄黃為衣。

【劑量及用法】服竹葉湯下。

代抵當丸

杭 州

【功能与主治】治傷寒瘀熱，膀胱蓄血，少腹硬滿，里熱發狂，大便黑色，小便自利等症。

【處方】大黃(酒浸)四兩 玄明粉 桃仁 芫歸尾 大生地 炙穿山甲各一兩 肉桂三錢

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服一錢五分至三錢，開水送下。

托毒丸

沈 陽

【功能与主治】散風解熱，托毒清血。主四時感冒，頭痛身痒，鼻流清涕，咳嗽作喘，痘疹將出，乍寒乍熱，驚風抽搐，睡臥不寧，嘔吐惡心，疔毒惡瘡。

【處方】羌活 前胡 薄荷 金銀花 黃芩各一兩 桔梗 烏藥 粉草各四錢 獨活 川芎 枳殼各一兩四錢 連翹 柴胡 天麻 茯神各五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，七分重，硃砂為衣。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】忌食五辛、油膩之物。

太平丸

沈 陽

【功能与主治】活絡止痛。主風寒時疫，胃腸疼痛，四時痧脹，小兒驚癇，胸膈不開，痰迷暈厥，一切時疫。

【處方】胆南星 木香 細辛 羌活 礞砂 冰片 酒化蟾酥各二錢 沉香 檀香 香櫞 白芷各一兩 佛手二兩

【制法】除冰片、蟾酥另研外，余則共碾極細面，水泛小丸。

【劑量及用法】每服五分，白開水送下。

【禁忌】忌生冷食物；孕婦忌服。

兌金丸

吉 林

【功能与主治】清熱去毒，消炎

殺菌。

【處方】紋軍六錢七分 黃芩一錢四分 黃柏二錢四分 山梔二錢 桔梗二錢七分 黃連二錢七分 甘草二錢七分 麝香一分四厘 梅片三分四厘 胆星七分 竺黃三錢四分 紫苑三錢四分 牛黃一分四厘 全蠍一錢三分四厘

【制法】共碾為細面，水泛小丸，滑石粉、青黛、硃砂、京墨、赤金等為衣即成。

【劑量及用法】每服七厘，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌用；忌食魚腥、油膩、生冷、面豆等物。

安宮牛黃丸

一、北京、天津、承德

(附：安宮牛黃散)

【功能与主治】解熱去毒，通竅鎮靜。主瘟疫熱盛，神昏譫語，狂躁不安，濁痰內閉，瘧厥抽動，不省人事，瘟疫癰疹，口渴目赤，言語不清。

【處方】黃連 郁金 黃芩 生梔子各一兩 共為細粉 牛黃一兩 硃砂面一兩 麝香二錢五分 珍珠五錢 犀角粉一兩 冰片二錢五分 雄黃面一兩

【制法】以上研細和勻，煉蜜為丸，一錢重(半丸五分重)，金箔為滿衣，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量与用法】每次服一丸，小兒服半丸，三歲以下者遵醫囑服用，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

【備考】安宮牛黃散則以上藥共為細粉和勻即得，每服四分，溫開水送下，小兒減半，三歲以下遵醫囑服用。(北京)

二、上 海

【功能与主治】暑溫時症，神志不清。

【處方】同北京。

【制法】各取淨粉，充分和勻，煉蜜為丸，每丸潮重一錢，蜡壳固封。

【劑量及用法】遵醫師處方服用，開水化服。

三、南 京

【功能与主治】主溫熱重症，神昏譫語，狂躁瘧厥，手足抽搐，小兒

急热惊風等症。

【处方】同北京。

【制法】上药生晒，共研細末，各取淨粉，細料方研，乳細后加，和均，加煉蜜为丸，每粒一錢。蜡壳封固。

【剂量及用法】、【禁忌】同北京。

四、武 汉

【功能与主治】同南京。

【处方】同北京。

【制法】除麝香、冰片、珍珠外，进行干燥，研極細，照淨粉量加煉蜜65%—70%成丸，每丸重二分半，蜡皮封固。

【剂量及用法】成人每服一錢，小兒每服五分，三岁以下者酌减（未效再服）。

五、广 州

【功能与主治】溫热病，神昏癱厥。

【处方】同北京。

【制法】上药研成細末，煉蜜糖为丸，每丸一錢，金箔为衣，蜡壳封固。

【剂量及用法】每服一丸。

六、福 州

【功能与主治】芳香化穢而利諸窍，瀉火陰痰。主治邪入心包，舌蹇肢厥。

【处方】同北京。

【制法】研極細末，煉老蜜为丸，每丸一錢，金衣蜡护。

【剂量及用法】因于热者，大人病重体实者，日再服，甚至日三服；小兒服半丸，不知，再服半丸。脉虛者，人参湯下；脉实者，銀花薄荷湯下。

七、杭 州

（新定牛黄清心丸）

【功能与主治】治溫暑湿邪，热入心包，痰濁内閉，神昏譫語，口禁癱厥，煩热昏狂以及小兒急热惊風，痰壅抽搐等症。此丸芳香化濁利窍，咸寒保腎清神，乃溫热病之要药。

【处方】同北京。

【制法】上药各取淨粉，煉白蜜为丸，每丸潮重八分，金箔为衣，蜡壳封固。

【剂量及用法】每服一丸。病重

体实者，日再服，甚至日三服；虛者人参湯送下，实者銀花薄荷湯送下。小兒服半丸，不知，再服半丸。

八、南 昌

【功能与主治】溫暑时邪，口禁神昏，五癰中惡及癱厥之因于热者。

【处方】、【制法】同北京。

【剂量及用法】每服一丸，溫开小水送下。脉虛者，用人参或党参湯送下；脉实者，用銀花薄荷湯送下。病重体实者，日服二至三次。小兒每服一丸，一岁以下者酌减。

【禁忌】孕妇忌服。

【备考】非經医师处方不得使用。

九、沙 市

【功能与主治】芳香利窍，化穢濁，醒心解热。凡腦充血及癱厥之因于热者皆宜之。

【处方】同北京。

【制法】上药研極細末，煉蜜为丸，赤金箔为衣，每丸淨重五分，蜡壳貯之，密藏勿泄气。

【剂量及用法】成人每次服一至二丸，凉开水下，病重者酌量再服；小兒、老人酌减。

【禁忌】体虛無热者及孕妇忌服。

十、重 庆

【功能与主治】化穢利窍，保腎安心。治溫暑时邪，痰涎内閉，口禁神昏，如尸卒厥，五癰中惡及癱厥因于热者。

【处方】同北京。

【制法】牛黄、麝香、珍珠、梅片、雄黄、冰片另研，余药共研細末，合前六味煉蜜和丸，每重一錢，金箔为衣，蜡壳封固，紙盒包裝。

【剂量及用法】每服一丸，小孩減半。

十一、西 安

【功能与主治】强心解热（芳香化濁），鎮惊（定風）鎮靜（安神），消炎利胆汁，恢复神經舌动力。主治伤寒时疫湿溫，流行性感冒（春溫、風溫、秋溫、冬溫之类），气管炎等热性病进行到末期，体温增高稽留不降，心臟衰弱（邪热内陷包絡），現腦神經症，如神智昏乱，嗜眠不語或

譫語，邪热蒙蔽或發惊厥，呼吸困難（气急）等病症。

【处方】、【制法】同北京。

【剂量及用法】大人一次一丸，每日一次，小兒五岁以下用四分之一丸，六岁至十岁用二分之一丸，十岁至十五岁用二分之一丸。脉虛心臟衰弱病人，用人参湯服下；脉实之病人，用薄荷銀花湯服下。

【禁忌】病人体溫驟然分离性下降，全身清冷，为虛脫現象，最忌服用，应速請医用兴奋救脫之药服之为要。

十二、蘭 州

【功能与主治】清熱解毒，鎮惊安神。主癰邪入内，神昏譫語，狂躁不安，手足抽搐，口渴各症。

【处方】同北京。

【制法】上药各軋極細面，均用足分量，蜜丸一錢重，金箔为衣。

【剂量及用法】每次服一丸，小兒服半丸，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

十三、大 同

【功能与主治】热邪内陷，清熱解毒。

【处方】牛黄三錢 郁金 犀角 川連 硃砂各一兩 梅片 麝香 珍珠各二錢五分 生梔子 雄黃 黃芩各一兩

【制法】共研細面，煉蜜为丸，每丸一錢重，金箔为衣，蜡皮封固。

【剂量及用法】日服一錢，或遵医囑。

【禁忌】孕妇忌服。

十四、青 島

【处方】同北京。

【制法】共研細面，煉蜜为丸，重一錢，赤金衣，蜡皮封。

十五、沈陽（牛黄安宮丸、安宮丸）

【功能与主治】强心鎮靜，清熱健腦，芳香化濁，除穢开窍。主伤寒热病，傳經中風，痰火内閉，心煩不宁，神昏譫語，火毒内陷，癱瘓抽搐，手足發厥，如尸卒厥，五癰中惡。大人病重体实者；小兒癱厥之因于热者。

【处方】同北京。

【制法】其礪極細面，煉蜜為丸，大丸一錢重，小丸五分重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下，小兒酌減。

【備考】另方安宮丸制法：大丸七分重，小丸二分五厘重。

十六、撫順(牛黃安宮丸)

【功能與主治】為芳香清涼消炎藥，有鎮靜清熱興奮強心之效。主傷寒、風傷寒、流行性感、熱、內臟、肺熱喘促、神昏譫語、壯熱煩渴、狂躁不眠。斑疹傷寒、猩紅熱、麻疹收沒太速、熱毒內陷或合併肺炎、舌起芒刺、煩渴喜涼。小兒急癇、卒然抽搐、昏厥顫動、角弓反張、牙關緊閉、痰鳴氣喘。喉炎、咽炎、咽喉腫滿、滴水難嚥。神經病、狂亂奔跑、神經錯亂、卒然昏倒、不省人事。

【處方】牛黃四錢半 硃砂一兩 麝香一錢半 冰片二錢半 蘇珍珠二分 郁金一兩 犀角五錢 黃連一兩 山梔一兩 雄黃一兩 黃芩一兩

【制法】共為細面蜜丸，七分或三分五厘，蠟皮封。

【劑量及用法】大人每服一大丸，小兒五歲以上每服一小丸，一年以上者服安宮散，每次一分，均用白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服；小便赤、大便滑忌服。

十七、吉林、哈爾濱(安宮丸)

【功能與主治】化穢濁，利諸竅，保腎水，安心強體，解毒生津。主溫病傷寒(邪明、甲、癸期，或邪入心包期)，瘟疫發疹發斑(斑疹傷寒)，痧疹(猩紅熱)，麻疹，急驚，乳蛾，喉痹，癲狂風癰，痰火秘結，一切熱性火症。

【處方】東牛黃一兩 郁金一兩 犀角一兩 黃連一兩 硃砂一兩 梅花片一錢七分五厘 台麝香一錢七分五厘 珍珠三錢五分 梔子仁一錢 明雄黃七錢 子桑七錢

【制法】將東牛黃、台麝香、硃砂、梅花片、珍珠、明雄黃另研，其餘諸藥均合一處，礪為細面，然後陸續倒入研均，煉蜜為丸，大丸七分重，小丸二分五厘重，大赤金為衣，蠟皮

封固。

【劑量及用法】成人每服一大丸，五歲以下小兒每服一小丸，或小黃安宮散五厘至一分。酌病輕重加減之。重者每日服二次，甚者每日服三次。斑疹內陷者，涼黃芩湯引；脈虛者，人參湯引；脈實者，金銀花、薄荷煎湯為引。

【禁忌】孕婦忌用；小兒清長大便唐、形寒肢冷、舌光脈沉遲者忌用。

【備考】其散劑為安宮散，亦即牛黃安宮散。

十八、呼和浩特(附：安宮牛黃散)

【處方】黃芩 明雄黃 生梔子 各一兩 珍珠五錢 麝香三錢 冰片三錢五分 硃砂 黃連各一兩 犀角一兩 郁金一兩 牛黃七錢

【制法】共為細面，老蜜為丸，加料重一錢五分，單料重八分。

【備考】照前方配牛黃散粗面二兩兌；珍珠一錢五分，麝香六分，冰片八分，牛黃二錢，犀角四錢，明雄黃三錢，每瓶裝五分。

附參考古方

【來源】溫病條辨。

【功能與主治】太陰溫病，汗出過多者，必神昏譫語，安宮牛黃丸為主。

【處方】牛黃一兩 郁金一兩 犀角一兩 黃連一兩 硃砂一兩 梅花片五錢五分 麝香一錢二分 珍珠五分 山梔一兩 雄黃一兩 黃芩一兩

【制法】上為極細末，煉老蜜為丸，每丸一錢，金箔為衣，蠟護。

【劑量及用法】每服一丸，日再服，見至日三服；小兒服半丸。脈實者，銀花薄荷湯下，脈虛者，人參湯下。

牛黃清宮丸

蘭州

【功能與主治】清熱解毒，止渴生津。凡屬火盛，身體發燒，昏迷不醒，舌紅唇干，譫語狂躁，頭痛眩暈，以及小兒急熱驚風，驚悸不安等症，均可服用。

【處方】元參一錢四分 連翹二

時 威 類

錢 梔子三錢四分 硃砂二錢七分 麥冬三錢四分 銀花六錢七分 明雄三錢七分 黃芩三錢四分 犀角三錢四分 連心三錢四分 郁金一錢 甘草三錢四分 生地一錢 大黃三錢四分 麝香三厘四 冰片七分 牛黃一厘四 花粉三錢四分

【制法】以上共礪極細面，蜜丸七分重，蠟皮封固。

【劑量及用法】每次大人服用一丸，小兒減半，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

瘧疾丸

沈陽

【功能與主治】化滯解毒，除瘧疾。主先寒後熱，先熱後寒或間日發作，頭痛嘔逆，周身疼痛。

【處方】青蒿八兩 青皮 檳榔 厚朴 炒神曲 姜夏各四兩 川貝母一兩四錢 甘草四錢

【制法】共礪極細面，用生薑汁泛為小丸，硃砂衣。

【劑量及用法】每服二錢，在臨發前三小時用生薑湯送下。

【禁忌】生冷。

【備考】間發之日一、大內少進飲食，可免再發。

瘧疾半貝丸

天津

【功能與主治】行水消滯，化痰截瘧。主發冷發燒，頭痛口苦，先冷後熱，或先熱後冷，心煩作渴，一日一發或隔日一發的瘧疾。

【處方】牛半夏一斤 常山二兩 柴胡二兩 川貝一斤 檳榔四兩 草薢仁(姜炒)二兩 甘草二兩

【制法】共為細粉，涼開水泛小丸，二錢重裝袋。

【劑量與用法】每次服一袋，在瘧疾發作前二小時，白開水送下。

【禁忌】忌食生冷；孕婦忌服。

瘧疾五品丸

沈陽

【功能與主治】清熱退暑，除瘧疾。主暑熱伏郁，寒熱往來，一日一發，間日一發，口渴大痛，譫語不食，日久不愈性的瘧疾。

【处方】姜夏八錢 貝母一兩二錢 青皮八錢 青蒿一兩 金雞納二錢

【制法】共碾極細面，姜水泛為小丸，硃砂衣。

【劑量及用法】每服一錢，在發瘧前二小時服之。白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

驚甲煎丸

一、沙 市

【功能與主治】瘧久不愈，脾臟腫大，結為癥瘕（俗名瘧母）。

【处方】驚甲一兩二錢 烏扇三錢 黃芩三錢 柴胡六錢 鼠婦三錢 干薑一錢 大黃一錢 桂枝一錢 石葦（去毛）一錢 厚朴一錢 凌霄一錢 半夏一錢 阿膠一錢 白芍一錢 丹皮一錢 廬蟲一錢 葶藶一錢 黨參一錢 瞿麥二錢 炙蜂窠四錢 芒硝一兩二錢 蜣螂六錢 桃仁二錢

【制法】除驚甲外，余藥研細末，用清酒加酒四兩，先煮驚甲令爛如膠漆，絞取汁，納諸藥和為丸。

【劑量及用法】成人量每次服二錢，溫開水兌酒少許送下，日服三次。

【禁忌】體虛者及孕婦忌服。

二、上海（人參驚甲煎丸）

【功能與主治】瘧久脾腫。

【处方】人參三錢 葶藶子三錢 生半夏（漂淨）一兩五錢 桃仁（去皮尖）六錢 石葦一兩五錢 銀硝三兩六錢 射干一兩二錢 蜂房（炒）一兩二錢 地蠶虫（炒）白芍藥（炒）牡丹皮 紫葳花 干姜 桂枝各一兩五錢 瞿麥（炒）一兩二錢 鼠婦虫九錢 蜣螂虫一兩八錢 柴胡一兩八錢 人黃 厚朴（制）鹽皮膠各一兩五錢 黃芩九錢 驚甲裙邊三十六兩

【制法】除驚甲裙邊、鹽皮膠外，將余藥研細粉，隨後將驚甲裙邊煮爛，鹽皮膠烱化，加入藥粉搗和，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服一錢，每日二次，食前溫開水送服。

【禁忌】忌生冷麵食。

三、南 京

【功能與主治】主瘧母，癥瘕。

【处方】鼠婦七錢五分 柴胡一兩五錢 炙驚甲三十兩 大黃一兩二錢五分 淡黃芩七錢五分 桂枝 淡干姜 石葦 制厚朴 阿膠 凌霄花 白芍 法半夏 廬蟲 牡丹皮各一兩二錢五分 黨參二錢五分 葶藶子三錢五分 瞿麥一兩 炒射干一兩 赤硝三兩 蜣螂一兩五錢 桃仁五錢 蜂房一兩（制）

【制法】除驚甲外，共研細末，另將炙驚甲研末，用灶下灰（約酒之容器一半），加黃酒五斤將灰浸透，俟酒化去一半時，取酒去灰渣，再以酒煮驚甲令爛如膠汁時，和入諸藥之末煎攪為丸（如難丸，可酌加煉蜜），每錢約做三十粒。

【劑量及用法】每服一錢，一日三次，每隔四小時一次，開水吞服。

【禁忌】孕婦忌服。

四、武 漢

【功能與主治】久瘧脾腫。

【处方】驚甲一錢二分（炙） 鼠婦虫一分 黃芩三分 柴胡六分 蜣螂六分 干姜 大黃 桂皮 石葦（去毛） 厚朴 紫葳各二分 半夏一分 阿膠二分 白芍 丹皮 廬蟲（炒）各五分 葶藶一分（炒） 紅參一分 射干二分（炒） 瞿麥二分 蜂窠四分（炙） 赤硝一錢二分 桃仁一分

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜60—64%，迭成小丸，每錢不得少于二十五粒。

【劑量及用法】每服一錢，日服三次，食前開水送下。

五、福 州

【功能與主治】主治瘧久不解，肋下成塊，謂之瘧母者。

【处方】驚甲十二分（炙） 烏扇（燒）二分 黃芩三分 柴胡六分 鼠婦（熬）二分 干姜三分 大黃三分 芍藥五分 桂枝三分 葶藶（熬）一分 石葦一分 川朴二分 丹皮五分 瞿麥二分 紫葳二分 半夏一分 人參一分 廬蟲（熬）五分 阿膠（炒）三分 蜂房（炙）四分 赤硝十二分 蜣螂（熬）六分 桃仁二分

【制法】共為細末，取煨灶下灰

一斗，清酒一斛五斗浸灰，俟酒盡一半，著驚甲于中煮令泛爛如膠漆，絞取汁納諸藥，煎為丸，如梧子大。

【劑量及用法】空心服七丸，日服三次。

六、杭州（金匱驚甲煎丸）

【功能與主治】治瘧疾寒熱往來，久發不愈，中結瘧母，痞塊攻痛，久則元氣日虧，病邪日旺，若以猛藥峻攻，恐成臟脹。此丸調和氣血，消除痰瘀，攻補兼施，乃治瘧疾病塊之良方也。

【处方】吉林人參二錢 葶藶子一錢 粉丹皮一兩五錢 大黃一兩 酒白芍一兩五錢 姜半夏 川厚朴各一兩 煨火硝三兩六錢 瞿麥 射干 石葦（去毛）各一兩 桃仁六錢五分 地蠶虫一兩五錢 蜣螂虫一兩八錢 大蜂房一兩二錢 干姜 鼠婦虫 黃芩各一兩 柴胡一兩八錢 凌霄花 桂枝 鹽皮膠各一兩 甲魚四斤（用裙邊）

【制法】共研細末，將膠烱化，甲魚裙邊用灶灰水洗，清酒一斗煮爛打丸。

【劑量及用法】每服七丸，開水嚼送，日服三次。

【禁忌】忌食生冷，豆麥、鷄蛋及難以消化之物。

七、南 昌

【功能與主治】瘧久不愈，左肋下結成痞塊（名曰瘧母，即脾臟腫大）。

【处方】炙驚甲十二兩 鼠婦（熬） 黃芩各三兩 柴胡 蜣螂（熬）各六兩 干姜五兩 射干（燒） 瞿麥 炙蜂窠各四兩 大黃 桂枝各五兩 炒葶藶一兩 石葦（去毛） 厚朴 半夏各五兩 石柱參一兩 桃仁二兩 鹽皮膠 白芍藥 牡丹皮 廬蟲（熬）各五兩 朴硝十二兩

【制法】除驚甲外，共研細末。取稻草灰一斤，米酒三斤，浸灰候酒盡一半，煮取汁去渣，再納驚甲煮令泛爛如膠漆去渣，納入諸藥，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每日服三次，每服七分，飯前開水送下。

【備考】非經醫師處方，不得使用。

八、重 庆

【功能与主治】治瘡母。

【处方】炙鱉甲一兩二錢 鼠妇
黃芩各三分 柴胡 螻蛄各六分
干姜 大黃 桂枝 石葦 厚朴
紫葳 法半夏 阿膠 白芍 牡丹
皮 蠶虫各五分 葶藶 沙參各一
分 射干 瞿麥 蜂房各四分 赤
硝一錢二分 桃仁二分

【制法】赤硝化水，余藥研細末，
用赤硝水泛丸，紙盒包裝。

【劑量及用法】一錢至二錢。

附參考古方

【來源】金匱要略方論。

【處方】鱉甲十二分(炙) 烏扇
三分(燒) 黃芩三分 柴胡六分
鼠妇三分(炙) 干姜三分 人黃三
分 芍藥五分 桂枝三分 葶藶一
分(熬) 石葦二分(去毛) 厚朴三
分 牡丹五分(去心) 瞿麥二分
紫葳二分 半夏一分 人參一分
蠶虫五分(熬) 阿膠三分(炙) 蜂
窠四分(炙) 赤硝十二分 螻蛄六
分(熬) 桃仁二分

【制法】上十三味，為末取鍛
灶下灰一斗，清酒一斛五斗，浸灰候
酒尽一半着鱉甲于中，煮令泛爛如
膠漆，絞取汁，內諸藥，煎為丸，如梧
子大。

【劑量及用法】空心服七丸，日
二服。

鱉 甲 丸

上 海

【功能与主治】二日瘡。

【處方】厚朴(制) 黃芩 山查
(炒焦) 麦芽(炒) 姜半夏 六神
糖(炒焦) 草果仁(炒)各二兩 制
首烏四兩 枳朮一兩五錢 陈皮二
兩 青皮(炒) 常山 三稜各一兩
五錢 鱉甲(炙)四兩 柴胡一兩五
錢。

【制法】共研細粉，用生薑四兩，
紅棗四兩，煎湯泛丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二錢至三
錢，溫開水送服。

五 積 散

一、昆 明

【功能与主治】外感風寒，微傷

飲食，兼有除濕調經作用。

【處方】當歸 麻黃 蒼朮各十
兩 厚朴八兩 白朮四兩 炒枳殼
三兩 桔梗二兩 桂枝二兩 炒杭
芍二兩 生薑二片 法半夏三兩
廣皮二兩 川芎二兩 甘草一兩
葱白兩個

【制法】研末。

【劑量及用法】每服二錢半，幼
童減半，開水調服。

【禁忌】重傷風不易服。

二、福 州

【功能与主治】治感冒寒邪，頭
痛身痛，項背拘急，惡寒嘔吐，肚腹
疼痛及寒濕客于經絡，腰脚骨節痠
痛及痘疹寒勝等症。

【處方】當歸 麻黃 蒼朮 陈
皮各一兩 厚朴(制) 干姜(炮)
芍藥 枳殼各八分 半夏(炮) 白
芷各七分 桔梗 甘草(炙) 茯苓
肉桂 人參各五分 川芎四分

【制法】共研為散。

【劑量及用法】水 鍾，姜三片，
葱白三莖煎八分，不拘時服。

附參考古方

【來源】重刻太平惠民和劑局
方。

【功能与主治】調中順氣，除風
冷，化痰飲，治脾胃宿冷，腹脇脹痛，
胸膈停痰，嘔逆惡心，或外感風寒，
內傷生冷，心腹痞悶，頭目昏痛，肩
背拘急，肢體怠惰，寒熱往來，飲食
不進，及婦人血氣不調，心腹脹痛，
經候不勻，或閉不通，並宜服之。

【處方】陳橘皮(去白) 枳殼
(去穢，麩炒) 麻黃(去根節)各六
兩 白芍藥 川芎 當歸(去蘆，
洗) 甘草(炙) 茯苓(去皮)
半夏(湯洗七次) 肉桂(去蘆皮)
白芷各三兩 厚朴(去粗皮) 干姜
(炮)各四兩 桔梗(去蘆)各十二
兩 蒼朮(淨洗，去皮)二十四兩

【制法】上除肉桂、枳殼外，別為
粉末，外十三味，同為粉末，慢火
熬，令色轉，攤冷，次入肉桂、枳殼
末，勻。

【劑量及用法】每服三錢，水一
盞半，生薑三片，煎一中盞，去滓稍
熱服。如冷氣奔沖，心脇脹腹，脹滿
心痛，反胃嘔吐，泄瀉清谷，及痲
癢癢，膀胱小腸氣痛，即入煨生薑三

片，鹽少許，同煎。如傷寒時疫，頭
痛體痛，惡風發熱，項背強痛，入葱
白二寸，豉七粒，同煎。若但覺惡寒，
或身不甚熱，肢體拘急，或手足厥
冷，即入炒柴萸七粒，鹽少許，同煎。
如寒熱不調，欬嗽喘滿，入棗煎，婦
人產後，入醋一合，同煎，並不拘時
候。

復 甦 散

昆 明

【功能与主治】感冒風寒，食積
氣滯，惡心嘔吐。

【處方】羌活 防風 粉葛各一
兩 砂仁八錢 厚朴 丁香 法夏
廣皮各六錢 薄荷 甘草 枳殼
細辛 牙皂 草果 板榔各四錢
雄黃二錢 硃砂四錢 草薢三錢
藿香 桔梗各八錢

【制法】研末。

【劑量及用法】每服二錢半，幼
童減半，開水送服。

【禁忌】非時令症不宜服。

百 解 散

昆 明

【功能与主治】傷風咳嗽，鼻流
清涕。

【處方】荆芥二兩 麻黃二兩
白芷二兩 蒼朮二兩 陳皮二兩
甘草一兩

【制法】研末。

【劑量及用法】每服二錢半，幼
童減半，開水送服。

【禁忌】身體虛弱者忌服，並忌
吃魚。

消風百解發汗散

一、青 島

【處方】麻黃四兩 干姜四兩
羌活四兩 天麻四兩 葛根四兩
綠豆粉八兩 松羅茶四兩 甘草四
兩

二、呼和浩特

【處方】干姜一兩 麻黃四兩
天麻二兩 羌活二兩 天麻一兩
豆粉一兩 青茶五錢

【制法】共為細面

芍蘇香葛散

沈 陽

【功能与主治】解表驅風，辟毒去穢。主傷風感冒，頭疼身痛，肢節痠倦，嘔逆惡心，胸膈脹滿，咳嗽氣促，口苦咽干。

【处方】紫蘇葉 炒香附 白茯苓 干葛 藿香 制半夏 前胡 陳皮 白芷各八錢 白芷一錢 防風七錢 甘草一錢 蒼朮兩半 羌活一兩

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】以姜三片，連葱白一莖，煎水沖服一錢，服後厚被覆之，汗出為度，無汗再服。

【禁忌】忌食鷄、魚、豬、羊肉。

附參考古方

【來源】匿使。

【功能及主治】治春月感冒傷寒，及山嵐瘴毒瘴氣，人感觸之，頭痛身痛，惡寒發熱，人迎脈浮大者是。

【处方】紫蘇葉(去梗)一錢 香附(炒)一錢 茯苓(去皮)一錢 藿香 半夏(制) 前胡(去蘆) 陳皮 川芎各八分 甘草二分 蒼朮一錢五分 羌活一錢 白芷 防風(去蘆)各七分

【劑量及用法】上用姜三片，葱白連鬚二根，水一鍾，煎一鍾，熱服，厚被復汗出為度，無汗再服。

【禁忌】鷄、魚、豬、羊肉。

白芷藿蘇散

沈 陽

【功能与主治】理氣驅風，解表松肌，主內寒外感，頭疼發熱，嘔吐眩暈，胸膈脹痛，惡食，鼻流清涕，咳嗽生痰，鼻塞聲重。

【处方】川芎一兩 白芷八錢 細辛五錢 干葛一兩 甘草一錢 蘇葉一兩 藿香八錢 半夏 枳殼七錢 陳皮各八錢 蒼朮一兩 桔梗七錢 淡豆豉八錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服一錢，煎姜三片，葱白一莖為引調服。

【禁忌】禁葷腥三五日。

六味通解散

沈 陽

【功能与主治】解表清熱。主感冒風寒，肢節疼痛，頭暈心煩，胸膈脹滿，發熱惡寒，嘔吐下痢。

【处方】麻黃一兩 防風兩半 黃芩一兩 石膏二兩半 滑石二兩半 蒼朮四錢 甘草一兩

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服一錢，以姜三片，葱白一莖，淡豆豉三十粒並水煎調服，汗即解。

【禁忌】酸及油膩之物。

蘇 解 散

吉林、哈爾濱(附：蘇解丸)

【功能与主治】解表，透汗，退熱，發和疹。主治：(一)感冒：感冒寒涼，發熱畏冷，頭痛體痛，泛噁干嘔。

(二)痘疹將出：發熱惡寒，頭痛腰痛，腹疼作脹。

【处方】紫蘇 葛根 防風 荆芥 白芷 蟬蛻 紫草 牛蒡 木通 甘草各一錢 升麻二錢

【制法】以上共為細面，用絹羅篩二、三次至極細為度。玻璃瓶存貯。

【劑量及用法】小兒二歲以上者，每服一分至四分，週歲以內者，每服一分，可隨意加減，鮮姜、薄荷為引。成人每服一錢。

【禁忌】孕婦忌服。忌食魚。

【備考】蘇解丸即將上藥細面加煉蜜為二錢重丸。

附參考古方

【來源】幼科評治准繩。

【功能与主治】治痘初起熱，頭痛腰痛，腹疼作脹，一切熱毒甚者。

【处方】紫蘇 葛根 防風 荆芥 白芷 蟬蛻 紫草 升麻 牛蒡子 木通 甘草各等分

【制法】上加灯心、葱白，各七根。

【劑量及用法】水煎熱服。

川芎茶調散

一、福州

【功能与主治】治傷風上攻，偏

正頭痛，鼻塞聲重。

【处方】薄荷葉二兩 川芎 荆芥穗各一兩 羌活 白芷 甘草各五錢 細辛 防風各二錢

【制法】共為末。

【劑量及用法】每服二錢，食后茶清調下。

二、杭州

(附：菊花茶調散)

【功能与主治】治諸風上攻，頭目昏重，畏寒發熱，偏正頭痛，鼻塞流涕等症。

【处方】白芷 炙甘草 羌活各二兩 荆芥 川芎各四兩 細辛一兩 防風一兩五錢 薄荷八兩

【制法】生晒研為細末。

【劑量及用法】每服一錢，濃茶調服。

【備考】菊花茶調散加白菊花三兩，殭蠶二兩。每服二錢，清茶調服。

三、西安

【功能与主治】發汗解熱鎮痛。主治感冒鼻塞，寒重發熱，惡風寒，無汗頭痛或神經性頭痛，偏頭痛等症。

【处方】川芎 荆芥 薄荷各四錢 防風五錢 羌活 細辛 甘草 白芷各一錢

【制法】共研成粉末。

【劑量及用法】成人每次服二錢，一日二、三次，小兒按年歲酌減，用清茶調藥末服下。

【禁忌】有汗者忌服。

四、大同(芍菊茶調散)

【功能与主治】傷風頭痛。

【处方】防風六兩 荆芥一斤 羌活半斤 菊花一斤 殭蠶一兩二錢 生草半斤 薄荷二斤 白芷半斤 川芎一斤 細辛四兩

【制法】共研極細面。

【劑量及用法】早晚每服二錢，白水送下。

五、青島(芍菊茶調散)

【处方】川芎 菊花 細辛

【制法】共軋細面。

六、沈陽

【功能与主治】疏散風熱。主偏正頭痛，鼻塞不通，目赤作痛，頭暈

目眩。

【处方】荆芥四兩 防風 白芷 甘草各二兩 細辛一兩 羌活二兩 薄荷 川芎各四兩

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】每服二錢，开白水送下。

【禁忌】忌食魚蟹驢肉。

七、撫 順

【功能与主治】解热，鎮痛。主偏正头痛，寒热往来，鼻流清涕，头目不清，風火牙痛。

【处方】川芎四兩 羌活 甘草各二錢 細辛一錢 白芷一錢半 防風一錢半 荆芥一兩 薄荷八錢 菊花五錢。

【制法】共為細面。

【剂量及用法】每服七分至一錢茶調服，取汗為宜。

【禁忌】忌食鯉魚。

八、吉林、哈爾濱

(茶調散、菊花茶調散)

【功能与主治】清头明目，头風疼痛，迎風流淚，風火牙痛。

【处方】川芎四錢 薄荷三錢 荆芥四錢 防風一錢半 細辛一錢 羌活 白芷 炙草 殭蚕 菊花各二錢

【制法】共研為極細面，用絹羅篩二、三次。貯于玻璃瓶或磁罐中。

【剂量及用法】①內服 每次一錢，小兒酌減，茶清調服，取汗為宜。

②外敷用蕎麥面和藥，茶清調敷天庭及太陽穴上。立止頭痛。

【禁忌】內服時忌食鯉魚；孕婦忌服。

九、呼和浩特(茶調散)

【处方】菊花 川芎 羌活 芥穗 白芷 防風 細辛各二兩 殭蚕 甘草各五錢 薄荷一兩

【制法】共為細面。

附參考古方

【来源】1.重刻太平惠民和劑局方。

【功能与主治】治丈夫婦人諸風上攻，头目昏重，偏正头疼，鼻塞声重，傷風壯熱，肢體煩疼，肌肉蠕動，腦熱痰盛，婦人血風攻注，太陽穴疼，但是感風氣，悉皆治之。

【处方】白芷 甘草(燉) 羌活各一兩 荆芥(去梗) 川芎各四兩 細辛(去蘆)一兩 防風一兩半 薄荷(叶，不見火)八兩

【制法】上為細末。

【剂量及用法】每服二錢，食后茶清調下，常服清头目。

2. 医宗金鑑：眼科心法要訣。

【功能与主治】冲風淚出。

【处方】荆芥 薄荷 甘草(炙) 木賊 防風 羌活 石决明(煨) 菊花 石膏 川芎各一兩

【制法】上為細末，令勻。

【剂量及用法】每服二錢，食后茶清調下。

头 風 散

沈 陽

【功能与主治】驅風，和血，鎮痛。主偏正头風，頭痛目眩，昏暈等症。

【处方】當歸 川芎各八錢 菊花 芥穗各二錢 薄荷 荆子各二錢 桃仁 紅花各一錢

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】每服一錢半，白开水送下。痛甚者用荷葉湯調服。兒童減半，酌量用之。

立止頭痛散

呼 和 浩 特

【处方】大黃二兩 全虫十个 硃砂三錢 麝香四分 冰片五分

【制法】共為細面裝三分，蜡壳封固。

防風通聖散

福 州

【功能与主治】治表里實熱，以及外科瘍毒。

【处方】大黃(酒蒸) 芒硝 防風 荆芥 麻黃 黑梔 白芍(炒) 連翹 川芎 當歸 薄荷 白朮各五錢 桔梗 枯芩 石膏各一兩 甘草二兩 滑石三兩

【制法】共研粗末。

【剂量及用法】加姜、葱沖湯服。

附參考古方

【来源】宣明論方。

【处方】防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 薄荷叶 麻黃 連翹 芒硝各半兩 石膏 黃芩 桔梗各一兩 滑石三兩 甘草二兩 荆芥 白朮 梔各一分

【制法】上為末。

【剂量及用法】每服二錢，水一大盞，生薑三片，煎至八分，溫服。涎嗽加半夏半兩薑制。

紫 花 散

沈 陽

【功能与主治】發表清里，退熱安神。主感冒高熱，驚恐不安，麻疹不出，疹毒未盡，痘疹斑痧，始終可服。

【处方】紫草四分 花粉五分 生梔四分 川連二分 薄荷三分 人中黃四分 防風三分 豆豉三分 連翹四分 元芩四分 冰片一分 廣角三分 雙花五分 硃砂二分 公英四分 牛地四分 石膏四分 赤芍三分 胆星六分 桔梗二分

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】小兒每服二、三分。白開水送下。

衛 生 散

沈 陽

【功能与主治】解熱清火，去毒安神。主傷寒熱病，頭疼發熱，嘔吐惡心，神昏譫語，咳嗽痰壅，咽喉腫痛，驚風抽搐，不省人事，噤口痢疾，疹后余毒。

【处方】琥珀 片砂 雄黃各二錢半 天竺黃三錢 山茨菇六錢 鈎藤二錢 白殭蚕二錢 牛黃錢半 千金霜二錢半 文蛤一兩 珍珠錢半 重樓七錢 紅人戟七錢 麝香一錢六分 人參一錢二分

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】三歲以下每次服一分，四歲至五歲每服二分，六歲至七、八歲服三分。白開水送下。

桑 菊 散

重 慶

【功能与主治】治風溫在肺，發熱咳嗽。

【处方】桑叶二兩五錢 菊花一

兩 連翹一兩五錢 薄荷 甘草各八錢 杏仁 桔梗 葦根各二兩

【制法】杵細末每袋五錢，紙盒包裝。

【劑量及用法】一袋。

銀翹散

一、沈陽

【功能與主治】辛涼解肌透表。主瘟病初起，大痛微惡風寒，身熱自汗，口渴或不渴或而咳，午后熱甚。

【處方】連翹一兩 桔梗六錢 竹叶四錢 金銀花一兩 淡豆豉生甘草各五錢 薄荷六錢 牛蒡子六錢 荆芥穗四錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每次服一錢至二錢。白開水送下。

二、武漢

【功能與主治】主治濕溫喉阻咽痛。

【處方】同沈陽。

【制法】干燥，混合碾細，成淨粉85~90%即得。

【劑量及用法】每服六錢，鮮葦根湯煎，香氣大出，即取服。病重者約二時一服，日三次，夜一服；輕者三時一服，日三次，夜一服。病不解，作再服。

三、重慶

【功能與主治】治濕溫喉阻咽痛。

【處方】金銀花一兩 連翹一兩 桔梗六錢 牛蒡子六錢 薄荷六錢 淡竹叶四錢 芥穗四錢 甘草五錢 淡豆豉五錢 葦根一兩

【制法】杵為細末，每袋五錢，紙盒包裝。

【劑量及用法】一袋。

四、西安(銀翹解毒散)

【功能與主治】主治春夏季節流行性感，惡心，潮熱，頭痛，咽干，發嘔及小兒風疹等症。

【處方】銀花 連翹 薄荷各一兩 桔梗六錢 淡豆豉八錢 芥穗牛蒡子各六錢 竹叶四錢 生甘草五錢

【制法】搗杵為細末，裝磁罐內封蓋。

【劑量及用法】成人每次五錢，用鮮葦根五錢，先煎湯去葦根入葯末再煎，香味出即取溫服，小兒按年齡遞減，一日三次夜間一次。以下為對症煎汁法，胸悶用藿香，郁金各二錢，渴者用大花粉二錢，項腫咽痛用馬勃二錢，玄參三錢，鼻衄用白茅根，側柏叶各二錢，咳嗽用杏仁三錢。

【禁忌】葯后衣服勿單薄，勿食辛辣物。

五、撫順

【功能與主治】辛涼解熱。主溫病，感冒發熱，口渴，頭疼，身痛，喉痛，嘔吐及小兒麻疹初期等症。

【處方】雙花 連翹各四錢 雙叶荆芥 杏仁 麥冬 犀角 菊花各二錢 元參 蘆根 黃芩 生地各一錢 薄荷一錢 甘草一錢

【制法】共為細面。

【劑量及用法】每服二錢重，蘆根湯送下。

【禁忌】辛辣。

六、哈爾濱

【功能與主治】辛涼清解。主流行感冒，溫病，瘟疫，兼治瘧疾。

【處方】同沈陽。

【制法】杵為細末，絹羅篩過。玻璃瓶或瓷瓶存貯。

【劑量及用法】每服四錢，蘆根煎湯，香氣大出即取服。病重者約二時一服，晝二服，夜一服；輕者三時一服，晝二服。病不解再服。小兒酌減。

【禁忌】忌食辛辣。

附參考古方

【來源】溫病條辨。

【功能與主治】太陰風溫、溫熱、溫疫、冬瘟初起，但熱不惡寒而渴者，辛涼平劑銀翹散主之。

【處方】連翹一兩 銀花一兩 苦桔梗六錢 薄荷六錢 竹叶四錢 生甘草五錢 芥穗四錢 淡豆豉五錢 牛蒡子六錢

【制法】右杵為散。

【劑量及用法】每服六錢，鮮葦根湯煎，香氣大出即取服，勿過煎。

【備考】溫毒，暑溫，濕溫，溫瘧不在此例。

桑菊銀翹散

昆明

【功能與主治】風濕傳染，解熱殺菌。

【處方】桑葉二兩 白菊 桑葉連翹 銀花各一兩 桔梗一兩五錢 薄荷 竹叶 荆芥 牛蒡子 杏仁各二兩 葦根一兩 虫蛻一兩 殭蠶一兩五錢 滑石一兩 綠豆二兩 淡豆豉一兩 甘草一兩

【制法】研末。

【劑量及用法】每服一錢，幼童減半，開水送服。

【禁忌】一切熱性病忌服。

荆防敗毒散

沈陽

【功能與主治】宣表疎風，透疹解毒，解肌清熱。主四時感冒，頭痛身熱，惡心嘔穢，傷風流涕，目赤流淚，干咳噴嚏，癰疹麻疹，遍身疼痛。

【處方】犀角(磋面) 連翹 淨蚕蛻 薄荷 防風 荆芥 當歸 紫花地丁 雙花 綠豆 赤芍各二錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服五分至一錢，白開水送下。

人參敗毒散

一、沈陽

【功能與主治】清解溫毒，避逐邪穢。主傷寒溫疫，頭痛目眩，四肢作痛，憎寒壯熱，噤口痢疾。

【處方】羌活 獨活 前胡 柴胡 川芎 枳殼 茯苓 桔梗 人參各一兩 甘草五分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二錢，水一盞，入生薑三片，煎成溫服。

【禁忌】五辛酒膩。

二、福州(敗毒散)

【功能與主治】治四時傷寒瘟疫，憎寒壯熱，風濕，風眩，項強身體疼痛，不問老幼皆可服用。

【處方】人參 茯苓 枳殼 甘草 川芎 羌活 獨活 前胡 柴胡 桔梗各等分

【制法】為細末。

【劑量及用法】水一鍾半，姜三片煎服，或為細末，沸湯點服。

三、南 昌

【功能與主治】主治感冒風寒，濕邪時疫，寒熱頭痛，身痛下痢，咳嗽聲重；又治瘡瘍病毒在表發汗者。

【處方】薄荷五錢 前胡 柴胡 獨活 羌活 黨參各一兩 甘草五錢 赤茯苓 桔梗(炒) 枳殼(麸炒) 川芎各一兩

【制法】研為粗末。

【劑量及用法】每日服二次，每次六錢，加生姜一二片，清水煎去渣服，小兒視年齡及病情酌減服。

【禁忌】生冷油膩。

四、昆 明

【功能與主治】濕毒流注，發熱下痢。

【處方】明黨參八兩 羌活 獨活各四兩 柴胡六兩 茯苓 前胡各四兩 桔梗 枳殼各三兩 川芎四兩 甘草 薄荷各二兩

【制法】研末。

【劑量及用法】每服二錢半，幼童減半，開水送服。

【禁忌】體虛感寒者忌服。

附參考古方

【來源】重刻太平惠民和劑局方。

【功能與主治】治傷寒時氣，頭痛項強，壯熱惡寒，身體煩疼，及寒壅欬嗽，鼻塞聲重，風痰頭痛，嘔噦寒熱並治之。

【處方】人參(去蘆，洗，焙) 茯苓(去皮) 甘草 前胡(去苗，洗，焙) 芍藥 羌活(去蘆) 獨活(去苗) 桔梗 柴胡(去苗，洗，焙) 枳殼(水浸，去穢剉，炒黃色)各等分

【制法】上為細末。

【劑量及用法】每服二錢，水一盞，生姜、薄荷各少許，煎七分去滓溫服，不拘時，寒多則熱服，熱多則寒服。

四 逆 散

緬 州

【功能與主治】治陽氣亢極，血脈不通，四肢厥逆，在臂脛之下者。

【處方】柴胡 芍藥 枳殼 甘草各等分

【制法】共為粗末。

【劑量及用法】每服二錢。米飲調下，日一服。嗽加五味子、干姜各五分，悸者加肉桂五分，腹痛加附子一枚(炮令折)，泄痢下重者濃煎薤白湯調服。

【禁忌】若是陰症則不通于肝，下过于膝。以此為辨，乃不當用此也。

解 表 散

沈 陽

【功能與主治】解毒散風，止咳定喘。主風寒咳嗽痰稀，惡寒壯熱，頭痛，惡心嘔吐，瀉利等症。

【處方】麻黃 杏仁 赤苓各一兩 防風 枳殼 川芎各一兩五錢 甘草錢半 生薑七錢五分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】忌食油膩之物。

附參考古方

【來源】幼科証治准繩。

【功能與主治】主傷風感冷，咳嗽痰喘，嘔吐瀉利，驚悸有熱，証在表里，並宜可投。

【處方】麻黃(去節，湯泡，汁過，炮焙) 杏仁(湯泡，去皮尖) 赤茯苓(去皮)各一兩 川芎 防風(去蘆) 枳殼(去穢，炒微黃)各一兩半 甘草(半生半炙)七錢半

【制法】上剉。

【劑量及用法】每二錢，水一盞，姜二片，葱白一莖，煎七分，有熱入薄荷同煎，溫服無時。

清 解 散

沈 陽

【功能與主治】解熱利水，清瘟降火。主瘟疫感冒，憎寒壯熱，頭痛身重，口苦咽干，小便不利，遍身痠痛，小兒驚癇，疹后余毒。

【處方】殭蚕二錢 蟬蛻一錢 神曲二錢 銀花二錢 川連一錢 化地二錢 車前子 木通 黃芩 黃柏各一錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二錢，開白水送下。

【禁忌】忌食辛熱之物。

附參考古方

【來源】幼科証治准繩。

【功能與主治】治感冒發熱，頭疼，鼻塞涕流，及溫壯熱悉主之。

【處方】北參 防風 天麻 北前胡 茯苓 北梗 枳殼(剉) 甘草各二錢 細辛 柴胡各一錢半 川芎三錢

【劑量及用法】上木，每一錢，水小盞，薄荷干參同煎溫服。

暹邏清解散

沈 陽

【功能與主治】清火解毒，消炎退熱。主內熱咳嗽，面紅目赤，身熱神昏，斑疹癰疹，諸種瘡毒。

【處方】暹邏角二錢 藏紅花三錢 黃連二錢 金銀花三錢 連翹二錢 牛蒡子二錢 荆芥穗二錢 防風二錢 赤芍二錢 生白芍二錢 薄荷五分 元芩二錢 山楂二錢 甘草二錢 冰片六分 牛黃二分 珍珠三分 片砂二錢

【制法】共為極細面。

【劑量及用法】每服一分至三分。白開水送下。

麝香透毒散

沈 陽

【功能與主治】解毒透表。主時疫斑疹，隱疹不出，毒火內攻，神昏煩躁，寒熱嘔吐，肌肉紅腫。

【處方】桔梗 蟬蛻 連翹 木通 甘草各一錢 全蠍 殭蚕各二錢 芥穗 防風 粉葛 牛蒡子 花粉各一錢 紅花二錢 冰片 牛黃各二分 麝香一分 蟾酥二分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】一歲以下服五厘，二歲至三歲服一分，五歲服二分。早晚空心白水送下。

【禁忌】忌食辛辣發物。

升 降 散

一、吉 林

【功能與主治】解散痼疾，表散

風寒，清內臟之瘟熱，降里實瘟毒，服后利通大便，腹稍痛無碍。主溫病內熱外感，凡一切四時瘟疫之疾，以及天行癘疫，絞腸痧(腹痛)，吐瀉不出，胸煩悶熱，痘疹瘟(紅腫成塊)，大火瘟(入部赤腫)，哈蟆瘟(頸項腫大)以及丹毒麻風等症。

【处方】殭蚕四兩 蟬蛻二兩 川軍八兩 姜黃六錢

【制法】共為細面，用絹羅篩之，以最細為度。

【劑量及用法】大人每服一錢五分，十二歲至八歲每服一錢，七歲至四歲每服五分，三歲至滿周歲者每服二分。一日三次服，鮮姜水為引。

二、哈 爾 濱

【功能與主治】解表清里。主溫病：發熱口渴，便秘腹瀉，頭痛體痛。內熱外感：發火內蘊，感冒寒涼，頭痛干嘔，發熱惡寒。

【处方】同吉林。

【制法】共碾為面，絹羅篩過，玻璃瓶存貯。

【劑量及用法】每服一錢半，小兒酌減，鮮姜湯調服。

【禁忌】忌食腥辣；孕婦勿服。

安宮牛黃散

一、濟 南

【功能與主治】溫熱重症，神昏譫語，狂躁極厥，手足抽搐，小兒急熱驚風等症。

【处方】牛黃一兩 黃連一兩 冰片一錢五分 郁金一兩 生梔子一兩 麝香二錢五分 犀角一兩 雄黃一兩 珍珠五錢 黃芩一兩 硃砂一兩

【制法】上藥各研細粉，合兌調勻，裝瓶，每瓶淨粉一分。

【劑量及用法】大人每服一瓶(二分)，十二歲至五歲者服半瓶，五歲以下者酌減，病重者隔三小時服一次，白開水送下。

【禁忌】忌辛辣、油膩及有刺激性之食物，孕婦忌服。

二、沈陽(牛黃安宮散)

【功能與主治】化濁利竅，通六腑，瀉心火。主溫暑熱邪，時疫挾痰，穢濁內閉，口噤神昏，尸卒厥，五癰中惡，癰厥之因于熱者。藥用

散劑與丸同功，凡因痰火熱極之病，較丸劑收效為速。

【处方】牛黃 郁金 犀角 川連 硃砂 山梔 明雄 黃芩各一兩 梅片 麝香各二錢半 珍珠六錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】小兒每服五厘至一分，大人每服一分，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

抑 肝 散

沈 陽

【功能與主治】調節肝臟，平抑肝經風火，肝經虛熱。抽搐，或發寒戰咬牙，或驚悸寒熱癱瘓，或嘔吐痰涎，腹脹不食，睡眠不安等症。

【处方】當歸 白朮 茯苓 鈎藤各一兩 川芎八分 柴胡五分 甘草五分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二錢，白開水調下。

【禁忌】戒忿怒，勿食辛辣物。

附參考古方

【來源】幼科証治准繩。

【功能與主治】治肝經虛熱發搐，或發熱咬牙，或驚悸寒熱，或木乘土而嘔吐，痰涎腹脹少食，睡臥不安。

【处方】軟柴胡 甘草各五分 川芎八分 當歸 白朮(炒) 茯苓 鈎藤各一錢

【劑量及用法】上水煎子母同服。

【備考】如養丸，名抑青丸。

截 瘧 散

一、沈 陽

【功能與主治】清熱止瘧。主新久瘧疾，寒熱往來，腹稍嘔逆，病腹中滿。

【处方】常山 檳榔 知母 廣皮 黃連 甘草各五錢 草果仁二錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二錢，十五歲以下者每服一錢，十歲以下者每服五分，每日早晚各服一次。白開水送下。

【禁忌】忌食生冷硬物，孕婦忌服。

二、呼和浩特

(神效截瘧散)

【处方】檳榔 青皮 柴胡 川木 常山 陳皮各四兩 草果 生甘草各二兩 蒼朮四兩

【制法】共為細面。

羚翹解毒膏

天 津

【功能與主治】散風清熱，解表退燒。主熱盛感冒初起，憎寒壯熱，四肢痠懶，頭眩咳嗽，咽喉疼痛，瘟毒發頤，兩腮赤腫。

【处方】銀花 連翹(去心) 葛根 大青葉 花粉各二兩 元參(去蘆) 薄荷葉各一兩六錢 生梔子一兩 赤芍八錢 馬勃 浙貝母 桑葉 枳殼(數炒) 黃芩 炒殭蚕 知母 黃柏各六錢 牛石膏四兩

【制法】以上藥熬汁去渣過濾，將汁煉至滴毛頭紙上，背面不陰為標準，收清膏，每膏八兩兌蜜一斤收膏，每膏一斤八兩兌羚羊粉一分，冰片八分攪勻裝瓶。

【劑量及用法】每次服一兩，白開水沖服。

銀翹解毒膏

天 津

【功能與主治】清瘟解表，散風退燒。主流行感冒，發冷發熱，四肢痠懶，火疹咳嗽，咽喉腫痛，瘟毒發頤，兩腮赤腫。

【处方】銀花一兩 苦桔梗 薄荷各六錢 竹葉 芥穗各四錢 甘草 豆豉各五錢 連翹(去心)一兩 炒大力子六錢

【制法】以上藥熬汁去渣過濾，將汁煉至滴毛頭紙上背面不陰為標準，收清膏。每清膏一斤兌蜜一斤收膏裝瓶。

【劑量及用法】每次服一兩，白開水沖服。

清瘟解毒膏

一、大 同

【功能與主治】瘟疫傳染，頭痛

身熱，身倦無力。

【處方】金銀花四兩 赤芍 貝母各一兩 黑元參 連翹各二兩 菊花 桑叶 牛蒡子 花粉 竹叶 甘草 丹皮各二兩 薄荷根叶 桔梗各一兩五錢

【制法】清水煮汁，加蜜熬膏。

【劑量及用法】每服二錢，用白水送下（溶化）。

二、天 津

【功能與主治】清瘟解表，發汗退燒。主感冒頭痛，身燒畏寒，四肢發軟，骨節痠痛，風寒咳嗽，小便赤黃。

【處方】羌活 桔梗各七兩五錢 白芷 川芎 柴胡 赤芍 防風 黃芩各五兩 花粉 元參（去蘆） 葛根 大青叶 竹叶各十兩 甘草二兩五錢 炒人力子十兩 連翹（去心）七兩五錢

【制法】以上藥熬汁去渣過濾，將汁煉至滴毛紙上，背面不陰為標準，收膏。每膏一斤兌蜜二斤，收膏裝瓶。

【劑量及用法】每次服一兩，白開水沖服。

太 陽 膏

禹 縣

【功能與主治】偏正頭痛，一切頭風。

【處方】當歸 大黃 白芷 白芨 白蘇 苦參 生川烏 生草烏 木鱉 烏藥 錫藤各四兩 香油十二斤 廣丹六斤 硃砂二兩

【制法】先將藥入油內，待藥煎枯再加廣丹，硃砂即成。

【劑量及用法】貼兩太陽穴。

【禁忌】一切火熱忌用。

【備考】有效期二年。

頭痛太陽膏

南 昌

【功能與主治】感冒頭痛。

【處方】廣生膠十兩 薄荷油一兩

【制法】先將生膠熔化，候溫將薄荷油加入攪勻塗紙上。

【劑量及用法】剪成小塊，貼兩太陽穴。

頭 痛 膏

一、上海（頭風膏）

【功能與主治】頭痛。

【處方】清膏藥肉八兩 薄荷腦二錢 細辛五錢 白芷五錢

【制法】將藥研細粉，和入清膏藥肉內，攤黑緞上。

【劑量及用法】貼太陽穴。

【禁忌】不可入口。

二、濟 南

【功能與主治】傷風頭痛。

【處方】清膏藥油八兩 細辛五錢 薄荷冰二錢 白芷五錢

【制法】共為細粉，和入清膏藥油內，攤黑緞上。

【劑量及用法】、【禁忌】同上。

萬應頭風膏

杭 州

【功能與主治】散風止痛。治感冒風濕，偏正頭痛及酒後吹風頭痛，眩暈之症。

【處方】每萬應靈膏藥肉一兩加細辛（研末）一兩 白芷（研末）一兩 薄荷油少許

【制法】調入藥肉攪勻，攤黑緞上。

【劑量及用法】貼太陽穴，兩邊痛則俱貼。

止 痛 膏

沈 陽

【功能與主治】去風止痛。主治頭痛，偏正頭風，痛攻眼目額角者。

【處方】天南星 川芎各等分

【制法】共碾極細面，同蓬蘽苞白搗爛作餅。

【劑量及用法】貼太陽穴。

瘡 疾 膏

禹 縣

【功能與主治】一切瘡疾，先冷后熱，先熱后冷，不分新舊。

【處方】甘草 甘遂各一兩 硃砂一錢

【制法】阿魏化痞膏一斤，將前藥面加入即成。

【劑量及用法】成人貼一張，在未發病時，兩點鐘前，將膏藥煖開，貼肚臍上。

【禁忌】孕婦、小兒及虛弱者忌貼。

【備考】有效期二年。

普濟回春丹

蘭 州

【功能與主治】發汗解表。主傷風感冒。

【處方】桂枝 云苓各二兩 白芍五兩 麻黃 紫蘇 陳皮各三兩 川芎 葛根 羌活 連翹 半夏 防風 藿香各五兩 白芷三兩 升麻二兩 生地五兩 牛草三兩

【制法】煉蜜為丸，每丸三錢重。

【劑量及用法】每服三錢，開水送下，小兒酌減。

【禁忌】發高熱、陽虛、心臟虛弱者均忌。

普濟靈砂丹

哈 爾 濱

【功能與主治】解表透汗清熱。主流行感冒。

【處方】羌活 獨活 石膏（生） 連翹 防風 薄荷各二兩 細辛四錢 甘草 生地 硃砂各二兩 川芎 山梔 當歸 黃芩 白芍 全蠍 荆芥 人參 菊花 白朮各五錢 桔梗 砂仁 寒水石各七錢半 滑石四兩

【制法】共為細面，煉蜜為一錢四分重丸，硃砂為研為衣。瓷罐存貯。

【劑量及用法】每服一丸，鮮姜湯為引。

【禁忌】忌食腥冷油膩。

精制靈砂丹

撫 順

【處方】羌活 獨活 荆芥 山梔 山楂 天麻 神曲 麻黃各四兩 薄荷 麦芽 白菊 白芷 川芎 細辛 甘草各二兩

【制法】共研細面，蜜丸三錢重，硃砂衣。

大灵砂丹

呼和浩特

【处方】党参 酒芩 当归 蝉蜕 苏叶 白朮 熟军 赤芍 荆芥 细辛 川芎 砂仁各六兩 連翹 薄荷 菊花 仁梔 甘草各十二兩 独活 羌活 石膏 升麻 滑石各六兩 寒水石 一斤半

【制法】共为細面，蜜丸重三錢。硃砂衣。

选料大灵砂丹

青 島

【处方】人參 黃芩 当归 川芎 白朮 苏叶 防風 芥穗 细辛 熟军 白芍 羌活 菊花 独活 梔子 薄荷 甘草 寒水石各六兩 天麻 砂仁各四兩 滑石 連翹 石膏 桔梗各半斤 麻黄十二兩

【制法】共研細面，煉蜜为丸重二錢五分。

神效冲和丹

呼和浩特

【处方】防風四兩 細辛四兩 甘草四兩 川芎 白朮 羌活 生地各二兩 蒼朮一兩

【制法】共为細面，蜜丸重二錢五分，硃砂衣。

【剂量及用法】每服五分至一錢，白飲下。

五 瘟 丹

吉 林

【功能与主治】清热解毒，除瘟去火，瀉下利便。主三焦实热，头頸身热，瘟熱結胸，大便燥結。

【处方】黃連 黃柏 黃芩 甘草 香附 紫苏叶各一兩

【制法】共为細末，用鍋投入大黃三兩熬膏，为丸如彈子大，硃砂、雄黃为衣，再貼金箔。

【剂量及用法】大人每服一丸，日服二次，开水送下。

附参考古方

【来源】沈氏尊生書。

【功能与主治】疫瘧。

【处方】黃連(火戊癸年为君) 黃柏(水丙辛年为君) 黃芩(金乙庚年为君) 甘草(土甲己年为君) 香附(木丁壬年为君) 紫苏叶各一兩

【制法】为君者倍入，皆生用，冬至日制为末，用錦紋大黃三兩熬成膏，为丸彈子大，硃砂、雄黃为衣，再貼金箔。

【剂量及用法】每一丸，井华水磨服。

驅 疫 丹

天 津

【功能与主治】避穢排濁，驅疫除瘟。主入昏嘔吐，腹疼泄瀉，手足厥冷，昏迷不省，中暑中寒，發燒發冷，四肢痠痛，濕郁悶脹。

【处方】生石膏五兩 黃連二兩 麻黃二錢 知母二兩 白芷一兩 生礬砂一兩 板榔一兩 苏叶七錢 广木香五錢 母丁香一錢 檀香二錢 炒蒼朮四錢 菖蒲四錢 香薷一兩 菊花一兩 茅慈菇三錢 甘草五錢 黑郁金三錢 木瓜五錢 1.赤二錢 藿香叶一兩五錢 紅大戟(醋制)五錢 共为細粉兌入：血竭面五錢 雄黃面一錢 琥珀面一兩 硃砂面六兩 牛黃一錢 麝香一錢 苏合油五兩 薄荷冰一兩五錢 冰片一兩五錢

【制法】先將苏合油、薄荷冰、冰片共研成水，再和以上細粉研勻，二分五厘重裝盒。

【剂量及用法】每次服一盒，重者二盒，白开水送下。

【禁忌】孕如忌服。

犀角化毒丹

一、沈 陽

【功能与主治】清血，解毒，退热。主心熱煩渴，瘡疹余毒，口齒出血，皮膚潰爛，牙宣口臭，頭面瘡癤。

【处方】犀角一錢 枯梗一兩 生地五錢 赤茯苓六錢 牛蒡五錢 連翹六錢 元參三錢 青黛二錢 朴硝三錢 黃芩五錢 花粉五錢 粉甘草三錢 酒大黃三錢

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸。二錢重。金箔为衣。

【剂量及用法】每服一至二丸。薄荷湯送下。如口臭以生地汁送下，空心服。

二、承 德

【功能与主治】清内热解毒，疹后諸熱，內熱牛瘡，牙根出血，胎毒胎火。

【处方】黃連 枯梗 元參 南紅花 薄荷 大黃 天花粉 甘草 紫草各一兩 雄黃五錢 犀角一錢 牛黃二分 冰片二錢 麝香五分

【制法】共軋細面，煉蜜为丸，重五分，蜡皮封固。

【剂量及用法】小兒一、二岁每服半丸，三岁以上每服一丸，早晚各服一次，薄荷湯送下，白开水亦可。

【禁忌】辛辣之物。

犀角透表丹

沈 陽

【功能与主治】解肌，清热，止嗽。主頭痛發燒，咳嗽口渴，神昏譫語，胃熱發斑，疹毒內閉。

【处方】暹羅犀角五錢 蘆根八錢 紫草八錢 連翹五錢 当归四錢 蟬蛻五錢 藏荷五錢 金銀花一兩 浮萍四錢 赤芍五錢 枯梗四錢 川貝母四錢 冰片三錢 葛根五錢 荆柳三錢 荆芥四錢 生地黄四錢 殭蚕五錢 台麝一錢半 西紅花四錢 元參一兩 麦冬五錢 甘草四錢

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸，七分重。

【剂量及用法】每服一丸，病重者二丸，小兒每服半丸，病輕者一丸，白开水送下。

【禁忌】忌辛辣食物。

犀角解瘟丹

沈 陽

【功能与主治】清毒解熱透疹。主瘟疹斑痧，丹毒牙疳，咽喉腫痛，以及溫熱初起，頭痛身熱，咳嗽鼻塞，呼吸喘促，腹痛嘔逆，四肢痠疼，中風中暑，諸般溫熱。

【处方】防風 荆芥 薄荷各一兩半 生地五錢 元參三兩 京母

一兩 桔梗五錢 川貝母一兩 連翹五錢 玄參 花粉 銀花 川連 杏仁 前胡 山梔 赤芍 骨皮 牛蒡子 葛根 升麻 甘草各三錢 犀角二兩 石膏一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，七分重。

【劑量及用法】每服一丸。白開水送下。

【禁忌】忌食生冷油膩；孕婦忌服。

時疫普濟丹

沈 陽

【功能與主治】除瘟毒，治疫痢，解暑熱。主流行瘟疫，發斑發疹，頭痛身熱，咽喉腫痛及疫痢暑病。

【處方】川大黃五兩（酒制一、姜制一、鹽浸一、白矾浸一、酒浸九蒸九晒） 元參（鹽水浸透） 紫蘇 葛根 柴胡 香薷各三兩 藿香 枳殼 花粉各二兩 赤芍 生草 薄荷各一兩半 連翹二兩半 羌活二兩 白芷二兩半 防風 荆芥 黃芩各二兩 靈仙一兩 細辛六錢

【制法】共碾極細面，用青蒿搗汁和陳倉米糊為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】忌食魚類；孕婦忌服。

附參考古方

【來源】春脚集（神效普濟丹）。

【處方】川大黃五兩（酒制一、姜制一、鹽浸一、白矾浸一、酒浸九蒸九晒） 元參淨三兩（鹽水浸透） 紫蘇三兩（淨末） 葛根二兩 柴胡三兩 香薷二兩 連翹二兩五錢 羌活二兩 白芷二兩五錢 防風二兩 荆芥二兩 黃芩二兩（生一半，酒炒一半） 藿香二兩 枳殼二兩 大花粉二兩 薄荷一兩五錢 赤芍一兩五錢 生草一兩五錢（數炒） 威靈仙一兩（酒炒） 細辛六錢

【制法】以上共為細末，用嫩青蒿尖搗汁，和陳倉米糊為丸，重三錢。

【劑量及用法】隨症用引。

神效普濟丹

撫 順

【處方】大黃四兩 蒼朮一兩

中黃一兩 麦芽一兩二錢 藿香一兩 竹葉一兩 豆豉一兩 蘆根一兩 荷葉一兩 犀角一兩半 甘草一兩

【制法】共為細面，蜜丸一錢大，蜡皮封。

清 宮 丹

一、沈 陽 (1)

【功能與主治】解表散風，清熱化毒。主流行感冒，頭痛鼻塞，發熱惡寒，遍身疼痛，煩渴干嘔，咳嗽氣促，神昏胸悶，大便秘閉，小便赤，兩肋引痛。

【處方】烏犀角五錢 元參四錢 杏仁三錢 寸冬四錢 粉葛根三錢 生石膏三錢 姜仁四錢 桔梗四錢 生地四錢 枳殼三錢 芥穗三錢 牛蒡子三錢 木通三錢 連翹四錢 山梔四錢 明雄四錢 黃芩五錢 硃砂四錢 粉草四錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸。一錢四分重。

【劑量及用法】每服一丸，姜湯送下，或用白開水亦可，但服后宜令微汗。

【禁忌】忌食辛辣發物及油膩之食物；孕婦忌服。

二、沈 陽 (2)

【功能與主治】清熱解表。主流行感冒，風熱頭痛。

【處方】片硃砂三錢 廣角三錢 元參三錢 蓮子心五分 竹葉三錢 連翹三錢 麥冬三錢 柴胡四錢 枳殼四錢 郁金三錢 薄荷三錢 清夏三錢 桔梗三錢 黃連四錢 山梔三錢 川羌四錢 甘草三錢 梅片三錢 川貝母四錢 杏仁四錢 黃芩三錢 粉葛根五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，姜湯或白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、撫 順

【功能與主治】清涼解熱，透表化毒。主溫熱病發疹感冒，發熱煩渴，大熱身痛，干嘔煩躁，寒熱往來。癰疹初期，發熱畏寒，隱疹潛伏，應出不出，煩熱咳嗽。大頭瘟，丹毒，

頭面紅腫，發熱畏冷，心煩欲吐，便秘神昏。

【處方】枳殼四錢 寸冬一兩 黃芩五錢 法夏四錢 花粉四錢 柴胡四錢 生石膏一兩 桔梗五錢 薄荷三錢 硃砂四錢 山梔四錢 郁金四錢 云苓四錢 胆草四錢 羌活三錢 獨活三錢 白參四錢 甘草四錢 犀角五錢 雄黃四錢

【制法】共為細面，蜜丸一錢四分重，蜡皮封。

【劑量及用法】大人每服一大丸，五歲至十歲每服一小丸，二歲以下小兒每服小丸三分之一。用雙葉、薄荷、菊花煎湯送下，白水、茶水亦可。

【禁忌】孕婦忌服；忌腥辣厚味。

【備考】另有一方用上藥共為細面，蜜丸二錢重。

四、吉林、哈爾濱

（犀角清宮丹）

【功能與主治】退熱解毒，透汗解表。主溫病，痧疹，大頭瘟毒，瘟毒發斑，感冒。

【處方】柴胡三錢 蒲黃五錢 枳殼 生石膏各三錢 寸冬五錢 黃芩 郁金 酒杭芍 薄荷 法夏 桔梗各三錢 云黃連二錢 山梔三錢 硃砂二錢 胆草 川羌活 獨活各三錢 犀角三錢 粉草 胆星各三錢

【制法】將硃砂另研，余均碾為細面，一處調勻，煉蜜為丸，大丸一錢四分重，小丸七分重，大赤金衣。棉紙包裹，蜡皮封。

【劑量及用法】大人每服一大丸，五歲至十歲小兒每服一小丸，二歲以上小兒，每服二分之一小丸，週歲以內小兒每服三分之一小丸，用桑葉、菊花、薄荷、鮮姜煎湯為引。

【禁忌】孕婦忌服；忌腥辣厚味。

牛黃清宮丹

一、天 津

【功能與主治】清熱解毒，止渴生津。主身體發燒，昏迷不醒，舌赤唇干，譫語狂躁，頭痛眩暈，以及小兒急熱驚風，驚悸不安。

【處方】麥冬三錢四分 銀花六錢七分 黃芩 蓮子心 花粉 甘草 大黃 生梔子各三錢四分 生

地 連翹(去心) 黃郁金各二錢
元參(去蘆)一錢四分 共為細粉兌
入。硃砂面二錢七分 犀角粉三錢
四分 麝香三厘四毫 牛黃三厘四
毫 冰片七分 明雄黃面三錢七分

【制法】以上研細和勻，煉蜜為丸，七分重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，小兒減半，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、沈 陽

【功能與主治】清熱解表，發散風邪。主流行感冒，風熱頭痛，四肢痠痛，咳嗽喘急，痰火壅盛，癰疽抽掣以及心火太盛，神昏譫語。

【處方】元參一錢 蓮子心五分 竹葉 連翹心 犀角各二錢 麥冬一錢 柴胡 枳殼各四錢 郁金 薄荷 清夏 桔梗各一錢 黃連四錢 山梔一錢 川芎四錢 甘草三錢 冰片二錢 川貝母 杏仁各四錢 黃芩二錢 牛黃一分

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重，赤金衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，姜湯或白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

清 瘟 丹

一、沈 陽 (1)

(清瘟至寶丹)

【功能與主治】清瘟退熱，止嗽除煩。主頭痛身熱，咳嗽嘔逆，咽痛口渴，心煩不寧。

【處方】蘇叶二兩 廣犀角二兩 黑元參五兩 木通一兩半 焦檳榔 煅石膏 大麥冬 赤芍藥各二兩 粉甘草一兩 蘇薄荷 茶菊花 重樓片 薏苡仁各一兩半 京知母 杭白芍各三兩 桂枝尖一兩半 山楂二兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

二、沈 陽 (2)

【功能與主治】清瘟，退熱，解毒。主四時瘟病，人痛咳嗽，肢體酸痛，寒熱往來。

【處方】赤芍六錢 京知母五錢 黃連二錢 花粉一兩 黃芩四錢 山梔四錢 生地八錢 牛蒡子一兩 石膏四錢 芫花四錢 連翹二兩 薄荷四錢 荊芥穗六錢 元參六錢 竹葉四錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

三、吉林(清瘟解毒丹、清瘟解毒丸)

【功能與主治】清瘟解毒，透表發汗。溫熱，瘟毒發頤。瘟毒發斑發疹，人入瘟毒，及感冒等症。兼治頭痛體痛。心煩嘔逆。懊憹不安。壯熱蒸燒，發熱畏冷。

【處方】連翹 柴胡 川芎各二兩 花粉 玄參各一兩 葛根 白芷 竹茹 赤芍 桔梗 川芎各二兩 甘草一兩

【制法】共研細面，煉蜜為丸，二錢一分重。(一方有硃砂為衣)用蜡紙包，貯于磁罐中。

【劑量及用法】每服一丸，鮮姜湯為引，日夜三四次，取汗為宜。

【禁忌】孕婦忌服，忌食腥辣之物。

四、撫順(清瘟至寶丹)

【功能與主治】辛涼解熱。主感冒，人痛身痛，寒熱往來，口渴咽痛，尿赤心熱，傷風流涕等症。

【處方】蘇叶二兩半 薄荷一兩半 犀角一兩半 菊花八兩 卓萊仁 木通 重樓各一兩半 元參六兩 生石膏四兩 白芷 京知母各三兩 芥穗一兩半 板蘭根二兩 山楂肉二兩半 赤芍三兩 桂枝一兩半 寸冬 焦檳榔各三兩 甘草一兩 硃砂五錢

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】忌辛辣、酒類。

牛黃清瘟丹

沈 陽

【功能與主治】解毒，消熱，除穢，避疫。主瘟疫瘟毒，腫項發頤，寒熱往來，神昏譫語，中暑中惡，頭

痛高熱，嘔逆脹滿，腹痛下痢。

【處方】檀香二錢 降香二錢 安息香四錢 木香二錢 藿香二錢 五分 山梔子二分 薄荷二錢 川芎五分 赤芍二分 紫草二錢 西紅花一兩五錢 蘇合香四錢 元參一錢 甘草一錢五分 犀角二錢 牛黃五分 硃砂二錢 丹砂三分 麝香五分 雄黃一錢 冰片五分

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，七分重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

牛黃解瘟丹

沈 陽

【功能與主治】清瘟解毒。主四時瘟病，流行感冒，肺熱咳嗽，頭痛身熱，驚悸不安，咽喉腫痛，耳痛牙痛，瘡毒發疹等症。

【處方】生石膏二兩 生地二錢 烏犀角二錢 真川連二分 桔梗一兩 生梔二兩 黃芩二兩 京母赤芍各一兩 元參二兩 丹皮五錢 牛黃二錢 連翹 竹葉 甘草各一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，七分重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

牛黃衛生丹

沈 陽

【功能與主治】清火解毒，強心鎮靜。主四時不正之氣，瘟疫疔邪，斑疹痘疹，發熱惡寒，嘔吐惡心，胸膈滿悶，邪熱內閉，譫語神昏，牙關緊閉，頭目眩暈，咽喉腫痛，胃肺郁熱，咳嗽喘促，疹毒內閉，一切危証。

【處方】川黃五分 黃連 黃芩 山梔各二兩 廣郁金一兩 犀角二兩 冰片五分 薄荷一兩 麥冬一兩 防風 木通 台麝各一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸。大丸一錢五分重，小丸七分重，赤金為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一小丸至一大丸。白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

玉雪丹

上海(救苦玉雪丹)

【功能与主治】时症感冒，寒热头痛，胸闷肢痠，痰涎壅塞。

【处方】象貝母 半夏麵(炒) 茅朮(炒) 麻黃(去節) 六神麵(炒焦)各八錢 麝香二分 牛黃三錢 大黃 車前子(炒) 連翹 荆芥 大麥仁(炒)各八錢 冰片二分 丁香 柴胡 桔梗各八錢 厚朴(制)一兩 赤芍 前胡 茯苓皮各八錢 珍珠一錢 硃砂二兩 秦艽八錢 鵝管石(煨)一錢 桂枝 生白朮 豆豉 大豆卷各八錢 白螺壳(煨)一錢 琥珀三錢 防風 枳壳(炒)各八錢 黃連一兩 枳實(炒) 蜜香 甘草(炙)各八錢 寒水石一兩 陳皮 青皮(炒) 木通 赤茯苓 天花粉 石膏 牛蒡子各八錢 大腹皮一兩六錢 蘇合香油二兩 建麵八錢

【制法】除大腹皮、蘇合香油外，余藥各取細粉，再將大腹皮煎汁，蘇合香油烱化，加入麵粉四兩，打糊和煉蜜為丸，每丸潮重六分，硃砂為衣，貼壳固封。

【劑量及用法】每服半丸至一丸，溫開水化服。

【備考】原方有水安息失真取出。

至寶丹

一、北京(局方至寶丹)

(附：局方至寶散)

【功能与主治】清熱解毒，鎮驚安神。主溫病神昏譫語，十指蠕動，循衣摸床，斑疹隱現，並治小兒急熱驚風。

【处方】犀角 硃砂 雄黃 玳瑁 琥珀各一兩 麝香 冰片各一錢 牛黃五錢 白膠香一兩五錢(為末以水攪澄，濾去砂土，微火熬成膏)

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重一錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，溫開水送下，小兒每服半丸，三歲以下者遵醫囑服用。

【禁忌】孕婦忌服。

【備考】局方至寶散：上藥共為細粉和勻，每服四分，溫開水送下，

小兒每服二分，三歲以下者遵醫囑服用。

二、天津(局方至寶丹)

【功能与主治】清熱解毒，鎮驚安神。主瘟熱傳里，謔言亂語，神志不清，循衣摸床，十指蠕動，舌卷苔老，斑疹隱現，小兒急熱驚風。

【处方】犀角粉一兩 冰片一錢五分 玳瑁面一兩 硃砂面一兩 麝香一錢五分 明雄黃面一兩 京牛黃五錢 琥珀面一兩 安息香面一兩五錢

【制法】以上共研細粉，用白面一兩五錢打糊為丸。每丸干重八分，半丸干重四分，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，小兒服半丸，三歲以下者遵醫囑服用，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、上海(牛黃至寶丹)

【功能与主治】清熱解毒。

【处方】人參 天竺黃 琥珀 硃砂 犀角 腰黃各一兩 麝香一錢 冰片一錢 玳瑁一兩 南星(制) 牛黃各五錢

【制法】各取淨粉和勻，加煉蜜為丸，每丸潮重七分，蜡壳固封。

【劑量及用法】每服半丸至一丸，溫開水化服。遵醫師指示服用

【備考】原方有水安息香，今已失真不用。

四、南京

【功能与主治】主溫病毒熱，神昏譫語，及中惡氣絕，痰厥不語，小兒驚癇抽搐，又產後惡血攻心等症。

【处方】烏犀角一兩(磨汁) 西牛黃五錢 玳瑁 飛硃砂 飛琥珀各一兩 麝香五錢

【制法】各取淨粉，乳細和勻，用蘇合香油一兩重湯燉化為丸(如難為丸，可酌加煉白蜜)，每料計做二白粒。蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，小兒減半。

【禁忌】孕婦忌服。

五、廣州

【功能与主治】溫熱病，神昏譫語，瘧瘳抽搐。

時 感 類

【处方】犀角 硃砂 雄黃 玳瑁 琥珀各一兩 麝香 冰片各一錢 安息香一兩五錢

【制法】將上列藥研成細末，和入麝香、梅片，加蜜糖制成丸。

【劑量及用法】每服五分。

六、福州(1)

【功能与主治】主治中風不語，中惡氣絕，疫癘瘴毒，邪內陷，熱入心包，舌絳神昏，痰迷譫語，伏熱嘔吐，煩躁喘急，兼治產後血暈，口鼻出血，吐逆閉亂，死胎不下等症。

【处方】人參 竹黃 胆星 牛黃各五錢 犀角 腰黃 玳瑁 琥珀 水安息 辰砂各一兩 麝香 冰片各一錢

【制法】共研細末，水安息和諸藥為丸，金箔衣，每粒重一錢。

七、福州(2)(局方至寶丹，六味至寶丹)

【功能与主治】除邪穢解熱結。主邪入心包，舌蹇肢厥。

【处方】犀角鎔一兩 飛硃砂一兩 琥珀研一兩 玳瑁一兩 牛黃五錢 麝香一錢

【制法】以安息重湯燉化和合諸藥為丸，作一百丸，蜡护，每粒重五分。

八、杭州(1)

(牛黃至寶丹)

【功能与主治】治中風不語，中惡氣絕，疫癘瘴毒，傷寒溫病，熱入心包，神昏譫語，伏熱嘔吐，煩躁喘急以及婦人產後血暈，吐逆閉亂，胎死腹中。小兒諸癇急驚，痰盛抽搐等症。此丹清熱醒神，化痰解穢，藥品珍貴，蒼萃靈異，有撥亂反正之功，立展神明之效。

【处方】犀角尖 飛硃砂 飛腰黃 玳瑁 西琥珀各一兩 麝香 梅冰片各一錢 西牛黃五錢 金箔五十張 金銀香一兩五錢(白酒攪澄，飛過，去砂土，約取淨一兩)

【制法】各取淨粉研勻，用金銀香烱化和寒食麵，如干，略加煉蜜為丸，每重七分，金箔為衣，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一錢至二錢，燈心湯送下。

九、杭州(2) (人參牛黃至寶丹)

【功能与主治】治伤寒温病，热入心包，神昏譫語，四肢逆冷，中風卒倒，中惡氣絕，口噤不語，神志恍惚，伏熱嘔吐，煩躁喘急，兼婦人產後血暈，吐逆悶亂，死胎不下等症。此丹扶元開竅，化痰醒神，效驗異常。

【处方】犀角尖 飛硃砂 飛腰黃 玳瑁 西琥珀各一兩 麝香 樟冰片各一錢 西牛黃五錢 金箔三十張 銀箔五十張 制南星五錢 吉林人參一兩 金銀香一兩五錢 (用酒攪澄，飛過，去砂土，約取淨一兩) 天竺黃一兩

【制法】各取淨粉研勻，用金銀香煨化，和神機糊，如干，略加煉蜜為丸，每重七分，金箔為衣，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，重症加倍之，灯心湯送下。

十、南昌 (局方至寶丹)

【功能与主治】發熱，神昏譫語，十指蠕動，尋衣摸床，斑疹隱現，並治中風中惡卒倒，痰壅不語，小兒痘厥。

【处方】銀箔(研)五十片 西牛黃(研)五錢 生玳瑁(鎊) 生雄黃(水飛) 犀角(鎊)各一兩 安息香(如無安息香，以蘇合香代之)一兩五錢 金箔(研)五十片 二梅片(研)一錢 麝香(研)一錢 琥珀(不見火研)一兩 龍腦(研)一錢

【制法】(一)將安息香為末，以無灰酒攪澄飛過濾去砂土，約取淨一兩，微火熬成膏。

(二)將犀角、玳瑁研為細末，再入余藥(除麝香、二梅片)合勻，以安息香膏隔水蒸煨候冷，再入麝香、冰片末和拌為丸，每料分做百丸，如干，加煉蜜少許為丸，蜡壳護之。

【劑量及用法】日服二次，每服半丸，溫開水送下。小兒減半，三歲以下再酌減服用。

【禁忌】忌辛熱、油膩；孕婦忌服。

【備考】非經醫師處方不得使用。

十一、重慶

【功能与主治】治中風卒倒，中惡氣絕，痰飲不語，神魂恍惚，頭目昏眩，睡眠不安，唇舌干燥，傷寒譫語，心肺積熱，邪氣攻心，寒熱交錯，女性難產，胎死不下，產後血暈，小兒諸癇，急驚心熱，煩躁不眠，風涎搐搦等症。

【处方】牛犀角 硃砂 雄黃 生玳瑁 琥珀各一兩 麝香五錢 龍腦香一分五厘 金箔五十片 西牛黃五錢 安息香一兩五錢 銀箔五十片

【制法】犀角、玳瑁生研細末，硃砂、雄黃水飛，麝香、龍腦、牛黃共研細末，安息香去泥沙研細，和勻，乳極細，煉熱蜜成丸，每丸一錢，金箔為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸。小兒分兩次服。

【禁忌】若病因頭痛，神昏不語，此乃肝虛，不能用此丹。

十二、西安

【功能与主治】強心解毒，解熱，鎮瘧，鎮靜。主治熱性病，斑疹傷寒至末期如神昏譫語，瘧發作，心臟衰弱，循環障礙，驚厥等病症。

【处方】牛黃五錢 犀角 琥珀 玳瑁 硃砂各一兩 麝香五錢 安息香一兩五錢 雄黃一兩 龍腦五錢 金銀箔各五十片

【制法】安息香重湯燉化，余藥研細粉加煉蜜為丸，一百粒，金銀箔為衣，蜡封固。

【劑量及用法】成人每服一丸，一日一次至二次，小兒五歲以下服四分之一，六歲至十歲服二分之一，十一歲至十五歲服二分之一。

【禁忌】患者體溫驟然下降，大汗身涼，現虛脫症時忌服。

十三、蘭州 (局方至寶丹)

【功能与主治】鎮驚解毒，清熱安神。主治邪入內，神昏譫語，頭目眩暈，狂躁不安，小兒驚癇。

【处方】玳瑁 明雄黃 血琥珀 硃砂 犀角各一兩 冰片一分 牛黃五錢 真安息香一兩五錢 麝香五分

【制法】以上各藥極細面，安息

香加面打糊，濕重一錢，半丸五分。

【劑量及用法】每次服一丸，遇歲以內小孩服四分之一，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

十四、大同 (局方至寶丹)

【功能与主治】熱邪內陷，神昏譫語，體溫高熱，勢在急危。

【处方】琥珀 玳瑁 硃砂 犀角各一兩 麝香 牛黃各五錢

【制法】共研細面，安息香二兩，打糊為丸，每丸一錢重，金箔為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每次服一粒。視患者之需要或遵醫囑。

十五、濟南 (局方至寶丹)

【功能与主治】瘟疫熱過盛，神昏譫語，十指蠕動，尋衣摸床，斑疹隱現，並治小兒急熱驚風等症。

【处方】犀角 玳瑁 硃砂 雄黃 琥珀各一兩 牛黃五錢 冰片 麝香各一錢 水安息一兩五錢 金箔五十片

【制法】以上各研細粉，稱准調勻，將水安息和搗(如系安息塊，可用一兩為末，以黃酒攪澄，飛過，濾去砂土，微火熬成膏和用)如干，加些煉蜜亦可，共為一百丸，金箔為衣，蜡壳封固。

【劑量及用法】成人每服一丸，重病日再服；十二歲以下之兒童，每服半丸，重病再服半丸；幼童酌減。去壳將丸研細，白水送服。

【禁忌】忌食油膩、辛辣，有刺激性之食物；孕婦忌服。

十六、沈陽(1)

【功能与主治】清熱，定驚，安神。主治中風，中惡，中毒，舌強難言，嘔吐悶亂，神識恍惚，頭目昏眩，譫語癲狂，痰厥氣悶，心肺積熱，寒熱往來，小兒急驚，諸癇風涎搐搦，氣喘嘔逆，昏不知人，一切危症。

【处方】烏犀角 生玳瑁 琥珀(另研) 硃砂(另研) 雄黃(研細)各一兩 冰片(另研)一分 麝香(另研)一分 牛黃(另研)五錢 安息香(酒研飛，淨刺一兩膏)一兩半

【制法】先將犀角、玳瑁碾細面，

后入余药研匀，将安息香膏重汤煮凝，最后入诸药中，和匀捣成小丸。

【剂量及用法】用人参五分煎汤送下三至五丸，小兒每两岁服二丸，亦用人参減半熬汤送下。（小兒每服一分至二分）

十七、沈陽（2） （牛黄至宝丹）

【功能与主治】芳香化濁，解毒避穢。主头痛發熱，惡寒战慄，謔語神昏，嘔吐头眩，妇人产后，惡血攻心，煩躁气喘，小兒惊癇，咳促气逆，脹滿下利。

【处方】犀角 硃砂 琥珀（另研） 玳瑁各一兩 牛黄 麝香各五錢

【制法】以安息香一兩五錢煎湯燉化，和諸药煉蜜为丸，七分重。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下，小兒酌量用。

【禁忌】孕妇忌服。

十八、吉林、哈尔滨 （牛黄至宝丹）

【功能与主治】芳香逐穢濁，而利諸竅，寒涼保心腎，而啓神明，發內陷之斑疹，解潛伏之毒熱，滌盪痰火，清熱生津，而有興奮強心，起死回生之作用。主治：（1）凡溫病傷寒，瘟疫等症；熱極侵犯內臟，牛喘喘，神昏壯熱，謔語，煩渴躁狂，嘔吐不眠。（2）瘟疫斑疹：皮膚隱伏，或紅或紫，形如云片，錦文，或遍體皆赤，嘔逆煩悶，狂妄叫罵，大熱不眠，神昏气促。（3）痘疹麻疹：收沒太速，毒熱內陷，反攻肺胃，爛喉喘嗽，舌起芒刺，唇焦綻裂，煩渴喜冷。（4）小兒急惊：卒然抽搐，昏厥癱瘓，角弓反張，口角流涎，牙關緊閉，气鳴气急。（5）乳蛾喉痹，咽喉腫滿，勢將閉塞，滴水難嚥，疼痛悶亂。（6）癲狂風癇，中風痰火等症；哭笑無定，癡呆昏昧，狂乱奔跑，惊恐慌怯，忽然抽搐，痰壅气阻，漉漉有声，不省人事，卒然倒地，口噤脛厥。（7）普通火盛：头晕口糜，衄腐衄血，吐血等症。（8）妇女难产，胎兒不下，乱悶欲死，产后血暈，或胎死腹中，口鼻出血，惡血攻心。

【处方】烏犀角 硃砂（研） 雄黄（研） 生玳瑁 琥珀（研） 麝香（研） 龙腦（研）各一錢 大赤金

（半入药为衣）五十張 东牛黄（研）五錢 安息香（研末）一兩半（以無灰酒攪澄飞过濾去砂土，約取一兩微火熬成膏，如無安息香，以苏合油代之）

【制法】先將犀角、玳瑁研成細面，入余药合均，將安息香膏煎烊，再入諸药中，和搜成剂，裝入瓷盒中，如干，納煉蜜少許，丸如梧桐子，分百为丸，入赤金为衣，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸至五丸，小兒二岁每服二丸，用人参湯，或溫湯送下，日服二三次。卒然中風癱瘓，一切風疔，及产后惡血攻心，用童便、牛黃汁三、五滴溫化服。

【禁忌】孕妇忌服；忌食辛辣。

附参考古方

【来源】太平惠民和劑局方。

【功能与主治】疗卒中急風不語，中惡气絕，中諸物毒，暗風中熱疫毒，陰陽二毒，山嵐瘴氣毒，蠱毒，水毒，产后血暈，口鼻血出，惡血攻心，煩躁气喘，吐逆，難產悶亂，死胎不下，已上並用童子小便一合，生姜自然汁三五滴，入于小便內溫過，化下二丸至五丸，神效。又疗心肺積熱，伏熱，嘔吐，邪气攻心，大腸風秘，神魂恍惚，头目昏眩，睡眠不安，唇口干燥，傷寒狂語，並皆疗之。

【处方】生烏犀屑 生玳瑁屑 琥珀（研） 朱砂（研細水飞） 雄黄（研水飞）各一兩 龙腦 麝香各一分 牛黄半兩（研） 安息香一兩半（为末，以無灰酒攪澄飞过，濾去砂石，約取淨数一兩，慢火熬成膏） 銀箔五十片（研） 金箔五十片（一半为衣）

【制法】上將生犀、玳瑁为細末，入余药研匀，將安息香膏重湯煮凝成后，入諸药中和搜成剂，盛不津器中，並旋丸如桐子大。

【剂量及用法】用人参湯化下三丸至五丸。又疗小兒諸癇，急惊，心熱，卒中，客忤，不得眠睡，煩躁，風涎搐搦，每二岁兒，服二丸，人参湯化下。

紫雪丹

一、北京（紫雪）

【功能与主治】瀉熱安神。主溫熱不解，神昏謔語，口中生瘡，狂躁

时 感 类

不安，大便干，小便赤，小兒惊癇。

【处方与制法】寒水石 磁石 石膏（生） 滑石各四十八兩 上药搗碎，用水煮二日，濾清去渣再入：

青木香 沉香各五兩 公丁香一兩 玄參 升麻各十六兩 甘草八兩 熬一日，濾清取汁成膏，用磁盆盛之兌：

玄明粉一百六十兩 火硝三十二兩 用木棍攪之俟凝陰干即成。

用前药六兩兌：羚羊角 犀角各六分 麝香三錢 硃砂一兩五錢 上四味共为細粉，入前药中和匀，每兩加金箔五張。

【剂量及用法】每服五分，小兒遵医囑服用，溫开水送下。

【禁忌】禁食油膩厚味；孕妇忌服。

二、天津（紫雪散）

【功能与主治】清瘟解表，鎮惊安神。主傷寒積熱，邪熱不解，神昏謔語，狂躁不安，瘟熱發斑，隱疹不透，口舌生瘡，心煩口渴，大便燥結，小兒惊癇。

【处方与制法】生石膏 滑石 寒水石 生磁石各三斤 上四味礱成小塊，再放置黃金塊用清水熬之，將料熬透取汁去渣，用原汁再加：

青木香 沉香各五兩 元參（去蘆） 升麻各一斤 甘草八兩 公丁香一兩 用微火繼續熬之（原汁如不够时加清水），將料熬透取汁去渣濾淨，再用微火收成膏狀。將淨芒硝十斤，淨火硝二斤兌入膏內溶化，用柳木棍攪勻，候凝固时，倒入盆中，待干研成細粉。每細粉六斤兌：麝香一兩二錢 硃砂面二兩 犀角粉 羚羊粉各一兩五錢 共研細和匀（裝入磁罐或玻璃瓶內封固），五分重裝瓶（如考售，不裝瓶亦可）。

【剂量及用法】每次服一瓶，白开水送下，小兒遵医囑服用。

【禁忌】孕妇忌服。

三、上海

【功能与主治】高熱神昏謔語，煩躁。

【处方】寒水石四兩八錢 犀角五錢 麝香一錢二分五厘 滑石四兩八錢 芒硝三兩二錢 磁石（醋

煨)四兩八錢 青木香五錢 銀硝三兩一錢 公丁香一錢 硃砂三錢 石膏四兩八錢 升麻一兩六錢 沉香五錢 玄參一兩六錢 甘草(炙)八錢 羚羊角五錢

【制法】先將寒水石、滑石、磁石、生石膏四味煎汁去渣，再將青木香、生甘草、升麻、玄參，再煎濃汁，去渣，隨后將公丁香粉、犀角粉、硃砂粉、沉香粉、銀硝、芒硝、羚羊角粉，和入藥汁內炒干，最后再加麝香和勻。

【劑量及用法】憑醫師處方購用。

【禁忌】孕婦忌服。

四、南京

【功能與主治】主時病熱閉，神昏譫語，小兒驚癇等症。

【處方與制法】生石膏 生滑石 寒水石 靈磁石各四兩八錢 搗碎，用水十斤文火煮至水量四斤時，去渣留汁，加入：

黑元參一兩六錢 上沉香五錢 升麻一兩六錢 青木香五錢 炙甘草八錢 公丁香一錢 文火煮至水量一斤半時，濾去藥渣，留汁，再兌入：

犀角五錢 羚羊角五錢（各用水磨成汁）入前藥汁內微火慢慢煮透，以能出汁為度，留渣不去，再入：元明粉十六兩 淨牙硝二兩 小火慢慢煎之，用柳木棒不住手攪至成霜形狀，以濕干而無水份為度，置冷水盆中，退去熱氣，俟冷后再加入：麝香一錢二分（乳細） 飛硃砂二錢 金箔一百頁 攪勻，勿再見火，一二日后，凝結成紫色霜狀。用磁罐密藏，勿使洩氣。

【劑量及用法】每次服二分至五分。

五、武漢

【功能與主治】瘟疫發熱，嘔吐狂躁，神昏譫語，鼻衄口瘡，斑疹熱結不透，便秘，小兒驚癇等症。

【處方】石膏 寒水石 磁石（醋煨） 白滑石各三斤 犀角 羚羊角 青木香 沉香各五兩 玄參 升麻各一斤 炙甘草八兩 公丁香一兩 朴硝十斤 焰硝七兩七錢半 麝香一兩二錢 硃砂（水飛）二兩

【制法】取上藥中之生石膏、寒水石、滑石、磁石等四味，加適量水，

煮沸十六小時后，取汁去渣；再加升麻、元參、炙甘草、青木香，煎二次，每次二小時，過濾濃縮成汁；再加犀角、羚羊角、火硝、元明粉之細粉投入汁內；俟微冷，再加沉香、硃砂、麝香，共研極細，混合攪勻，成淨粉90~95%即得。

【劑量及用法】成人每次服五分至一錢，小兒五厘至一分。

【禁忌】孕婦及無實熱者忌服。

【備考】此方清涼開竅，為現在治療流行性乙型腦炎要方之一。

六、福州、廣州

【功能與主治】主溫熱病邪入心包，舌蹇肢厥。

【處方與制法】滑石 石膏 寒水石各一斤 磁石二斤 四味搗煎，去渣，再入：

羚羊角 木香 犀角 沉香各五兩 丁香一兩 升麻 元參各一斤 炙甘草八兩 上八味並搗入前藥汁中，煎去渣，再入：

朴硝 硝石各二斤 提淨入前藥汁中，微火煎，不停地用柳木攪拌，候汁欲凝再加入：

辰砂（研細末）三兩 麝香一兩二錢 研末入煎藥拌勻合成，退火氣，冷。

【劑量及用法】每服一二錢，水調服。

【備考】廣州每瓶重五分。用冷開水送服。

七、杭州（局方紫雪丹）

【功能與主治】治暑濕溫熱，時疫溫瘧，熱毒內閉，舌強肢厥，神昏譫語，狂妄叫走，瘡毒昏暈，痧脹諸毒，斑疹不透，煩熱癰厥，小兒驚癇，痧熱閉等症。此丹清熱散結，開竅化濁，立見奇效。

【處方與制法】黃金十兩（用金箔一百張研細代之更佳） 寒水石 生滑石 靈磁石 生石膏各四兩八錢 搗碎，同金用清清水五升，煎至二升去渣，再入：

烏玄參一兩六錢 真沉香五錢 紫丁香一錢 升麻一兩六錢 犀角屑 青木香 羚羊角屑各五錢 炙甘草八錢 入前藥汁中再煎，用布濾去渣，再入：

硝石 朴硝各二兩二錢 入前藥汁中，微火上煎，柳條棒不斷的攪

拌，候有七合，投入木盆中，半日欲凝，再入：

飛硃砂二錢 麝香二錢 同前藥攪調令勻，凝成霜雪，紫色為度。

【劑量及用法】每服二分至一錢五分，臨時酌証加減，以沸開水調服。

八、南昌

【功能與主治】溫病熱入心包，神昏譫語，發斑吐衄，舌絳狂躁，發熱便秘，小兒驚癇等症。

【處方與制法】同福州。

【劑量及用法】成人每服一分至二錢，小兒視年齡及病情酌減服用，冷開水調服。

【備考】非經醫師處方不得使用。

九、沙市

【功能與主治】芳香辟穢，寧心安神，治狂越躁亂，神昏譫語，一切文火閉結，小兒驚癇等症，並解諸熱藥毒。

【處方與制法】西滑石 生石膏 寒水石各一斤 活磁石一斤 上四味研細，水煎汁去渣再入：

廣木香五兩 公丁香一兩 升麻 玄參各一斤 炙粉甘草八兩 上五味入前藥汁中煎去渣，再入：

玄明粉二斤 火硝二斤 提淨入前藥汁中微火煎，不住手用柳木攪，候汁欲凝，再加入：

羚羊角 烏犀角 沉香各五兩（先到后研極細末） 硃砂二兩 麝香一兩二錢 上藥合成，退火氣，磁瓶密封固封，勿泄氣。

【劑量及用法】成人量每次服五分至一錢，病重者再服，小兒老人酌減，涼開水下。

【禁忌】體虛無熱者忌服；孕婦不得輕服。

十、重慶

【功能與主治】治內外煩熱不解，狂亂奔走，實火閉結，發斑發黃，口瘡脚氣，瘡毒虫毒，熱毒藥毒及小兒驚癇。

【處方】金箔一百張 石膏 寒水石 磁石 滑石各三斤 犀角屑 羚羊角 青木香 沉香各五兩 玄參 升麻各一斤 甘草八兩 丁香一兩 芒硝十斤 火硝二斤 麝

香一兩二錢五分 硃砂三兩

【制法】先用金箔、石膏、寒水石、磁石、滑石、大量清水，猛火煎至半去渣，次用犀角、羚羊角、青木香、沉香、玄參、升麻、炙甘草、丁香入煎汁中再煎至半濾去渣，次用芒硝、硝石入煎汁中微火煎，柳木攪之不住手，又候全半投入瓦盆（木盆更好）中，輕放向陽處，候凝成水膜上，瓦罐貯藏，欲用時平均分兩，加麝香、硃砂后，玻璃瓶盛之，每瓶一錢，紙盒包裝。

【劑量及用法】二分至一錢。

十一、西安

【功能与主治】主治傷寒溫熱，高热不止，發斑吐衄，神昏譫語，癲狂叫走及小兒驚癇等症。

【处方与制法】同福州。

【劑量及用法】大人一分至一錢，小兒五厘至一分，冷開水調服。

【禁忌】如無實熱者忌服。

十二、蘭州

【功能与主治】除煩解熱，止渴生津。主瘟疫發熱，神昏譫語，狂躁不安，斑疹嘔吐，小兒驚癇等症。

【处方与制法】生石膏 滑石 寒水石 磁石各三斤 上四味藥用水二十五斤煮至六十斤，去渣，再加：

青木香 沉香各五兩 元參 升麻各一斤 甘草八兩 丁香一兩 煮至二十斤八兩，去渣，再加：

朴硝一斤 火硝二斤，用微火煮，以柳木棍攪動至水氣飛完，倒在淨木盆中，待欲凝時再加：

麝香一兩二錢五 硃砂二兩 羚羊 犀角各一兩五錢

【劑量及用法】大人每服一錢至二錢，小兒每服三至五分，冷開水送下。

十三、禹县

【功能与主治】內外煩熱，口舌生瘡，藥毒熱毒，傷寒時疫，斑疹不透，小兒驚癇。

【处方】赤金三百兩 寒水石 石膏 滑石 磁石各四兩八錢 升麻六錢 玄參一兩六錢 甘草四兩八錢 犀角 羚羊角各一兩 沉香 廣木香 丁香各五錢 朴硝 硝石各二兩二錢 硃砂 麝香各一錢

【制法】水五碗煎至一碗，去渣再煎至一碗，入銅鍋內，投朴硝微火熬，急攪后冷凝結，入磁器內，再下硃砂、麝香攪勻，候冷即成。

【劑量及用法】每服三分，小兒每服一分，冷開水送下。

【禁忌】寒症忌用，孕婦忌用。

【備考】有效期二年。

十四、濟南

【功能与主治】瘟疫發熱，嘔吐狂躁，神昏譫語，鼻衄口瘡，斑疹熱結不透，便秘，小兒驚癇等症。

【处方与制法】生石膏 滑石 寒水石 升麻 玄參各一斤 生磁石二斤 廣木香 公丁香各五兩 生甘草八兩 九味搗碎，用淨水四十斤煮兩小時，去渣再入：

朴硝 火硝各一斤提淨入煎藥汁中，微火煎，用柳枝不住手攪一小時半，稀布濾淨，投磁盆中，候汁欲凝，去水取膏。

每兩內加入：麝香一分 犀角粉 羚羊角粉 沉香面各三分 硃砂面二分 共研勻，晾去潮氣，瓶貯瓶口，勿令洩氣。

【劑量及用法】成人每服五分至一錢，重病輕重加減，重病日再服或日二服，小兒酌減，白開水沖服。

【禁忌】忌食葷腥及有刺激性的食物，孕婦忌服。

十五、沈陽(1)

【功能与主治】鎮靜安神，清熱解毒。主瘟疫煩熱，大眩譫語，神昏口渴，咽干舌赤，痰涎壅閉，邪熱實火，小兒驚癇，胸高氣促，咳促喘息，使燥發病，手心煩熱，驚悸不安。

【处方与制法】黃金（煮水用）五錢 寒水石 磁石 滑石 石膏各一斤 以上搗碎水煎，再入：

羚羊角屑 犀角屑 木香 沉香各五兩 丁香一兩 元參 升麻各一斤 生甘草八兩 入煎藥汁中再煮，去滓，兌入：

朴硝十斤，硝石四斤入煎藥汁中微火上煎，柳木棍攪不住手，投木盆中半日欲凝，入下藥：

當門子一兩 錢半 硃砂二兩入煎藥汁攪勻，磁器收藏，藥成霜馬紫色。

【劑量及用法】每服一分至二分，冷水或薄荷湯送下。

十六、沈陽(2)(紫雪玄霜丹)

【功能与主治】清熱，解毒，鎮驚。主瘡毒內攻，瘟病熱入，臟腑脚氣，毒遍內外，口瘡，吐血衄血，熱淋發狂，小兒毒熱驚癇等熱性症。

【处方】飛金一百兩 石膏 寒水石 磁石 滑石各一斤 犀角屑 青木香 羚羊角屑 沉香各五兩 玄參二斤 升麻一斤 甘草八兩 丁香一兩

【制法】以上清水煮去渣，微火煎，投木盆中，半日欲凝，冷一、三日，候凝成霜，紫色鉛罐收貯，加麝香一兩二錢五分，硃砂三兩水飛如法，調制為丸，重三分。

【劑量及用法】每服一丸至二丸。食后薄荷湯下。

【禁忌】忌食發物。

十七、沈陽(3)(紫雪散)

【功能与主治】清肝肺積熱，外受風寒而成咽喉腫痛，面赤腮腫，項前耳下紅腫焮熱，喉中腫痛，湯水難嚥，語言不出，寒熱往來，喉舌糜爛。

【处方】犀角 羚羊 石膏 寒水石 升麻各二兩 元參二兩 甘草八錢 盆沉香五錢 朴硝三兩六錢 硃砂三錢 廣木香五錢 赤金白炭

【制法】水五碗煎藥剩湯一碗，將渣用絹濾去，再煎滾，投入朴硝，文火慢煎，水氣將盡欲凝之時傾入碗內，下研細之硃砂、冰片、金箔，和勻，將藥碗放入涼水盆中候冷凝。

【劑量及用法】大人每服一錢，滿十歲每服五分，小兒二分或一分，徐徐嚥之。內服用竹葉，灯心湯化服。外用吹上亦可。

十八、吉林、哈爾濱(紫雪)

【功能与主治】清熱解毒。安神定驚。主治：(1)溫病：溫熱侵入心包，神昏譫語，壯熱不眠，唇裂舌干，氣促息高，發疹發斑。(2)瘧疾：山嵐瘴氣，穢毒濁氣，中人昏倒，口角流涎，嘔吐青水。(3)小兒急驚：痰火內熾，感冒驚風，卒然抽搐，頭項強急，睛定天吊，壯熱氣促。(4)痘疹遺毒：痘毒蘊伏，疹沒太速，毒火反攻，壯熱神昏，喘急抬肩，口糜舌

爛。(5)癲狂：痰火交煎，神識蒙蔽，哭笑無定，奔走叫罵，語無倫次。

【處方】黃金百兩（貨金舖中叶子者佳，以大赤金一百兩代之，尤妙）生石膏（搗細）寒水石（如無真者，以玄精石代之搗細）磁石（搗細）白滑石（搗細）各二斤 犀角 羚羊 青木香 沉香各五兩 玄參 升麻各十六兩 甘草八兩 丁香一兩 朴硝 硝石各二斤 麝香二兩二錢 辰砂五兩

【制法】先將黃金（或大赤金頁）生石膏、寒水石、磁石、滑石等五味，用水煎熬約一時間，去渣取湯。（金不損失還金舖）次用犀角、羚羊、青木香、沉香、玄參、升麻、甘草、丁香等八味細面入湯內再煮約一時間，去渣取湯。再將朴硝、硝石二味細面入湯內，微火上煎，以柳木拌之，然後投入木盆內，半日欲凝。再將麝香、辰砂研細納入攪勻，勿見火。冷二、三日，候凝結成紫色霜雪即成。將制成之品用鉛罐收貯或用玻璃瓶收貯。

【劑量及用法】每服三、四分至一錢，小兒酌減，白水或薄荷湯送下。

【禁忌】忌食辛辣；孕婦忌服。

十九、呼和浩特（紫雪散）

【處方及制法】生石膏 正滑石 寒水石 磁石各一斤 此四味藥用水將磁石熬至手拈成粉為度，用此汁再入：

升麻一斤 丁香一兩 甘草八兩 犀角五兩 羚羊五兩 沉香五兩 元參一斤 木香五錢 將此八味藥熬去渣，熬濃晒干，再加：

朴硝 硝石各二斤 硃砂兌色，晒干，每兩再兌冰片二分 麝香五厘 赤金一張 辰砂三錢（兌色）。

附參考古方

【來源】1. 太平惠民和劑局方（紫雪）。

【功能與主治】疔脚氣毒遍內外，煩熱不解，口中生瘡，狂易叫走，瘡疫毒癘，卒死溫瘧，五尸五疰，心腹諸疾，疔刺切痛，及解諸熱藥毒，發邪熱卒黃等，並解蠱毒，鬼魅野道熱毒；又治小兒驚癇白病。

【處方及制法】黃金一百兩 寒

水石 磁石 石膏 滑石各三斤 以上並搗碎，用水一斛，煮至四斗，去滓入下項：

羚羊角屑 犀角屑 青木香（搗碎） 沉香（搗碎）五斤 丁香一兩（搗碎） 玄參（洗焙、搗碎） 升麻各一斤 甘草（炙）八兩 以上入煎藥汁中，再煮取一斗五升，去滓入下項：

朴硝（精者）十斤 硝石四升（如闕也稍亦得，每升重七兩七錢半）

以上二味入煎藥汁中，微火上煎，柳木筴攪不住手，候有七升投在木盆中，半日欲凝，入下項：

麝香當門子一兩二錢半（研） 硃砂（飛研）一兩 以上二味，入煎藥中攪調令勻，停之二日，上藥成霜雪紫色。

【劑量及用法】每服一錢或二錢，冷水調下，大人小兒臨時以意加減，並食后服。

2. 醫宗金鑑（紫雪散）

【功能與主治】重舌、痰核、重膠、舌疔。

【處方】犀角（鎊） 羚羊角（鎊） 石膏 寒水石 升麻各一兩 元參二兩 甘草八錢（生） 沉香（剉） 木香各五錢（剉）

【制法】水五碗，煎藥剩湯一碗，將渣用絹濾去，將湯再煎滾，投提淨朴硝一兩六錢，文火慢煎，水氣將尽，欲凝結之時，傾入碗內，下硃砂、冰片各三錢，金箔一百張，各預研細和均，將藥碗安入涼水盆中，候冷凝如雪為度。

【劑量及用法】大人每用一錢，小兒二分，十歲者五分，徐徐嚥之即效，或用淡竹葉灯心煎湯化服亦可；咽喉腫痛等症吹之亦效。

神犀丹

一、北 京

【功能與主治】清熱解毒。溫熱初起，發熱，口渴，神昏煩躁，發斑衄血。

【處方】生地六兩 淡豆豉二兩 黃芩 菖蒲各一兩五錢 甘草 天花粉各一兩 玄參一兩七錢五分 金銀花四兩 板藍根二兩二錢五分 連翹一兩五錢 紫草一兩

以上熬成膏調下列各藥：

犀角 黃芩 菖蒲各七錢五分 甘草五錢 玄參八錢七分五 金銀花二兩 板藍根一兩一錢五分 天花粉五錢 連翹一兩二錢五分 紫草五錢

【制法】共為細粉，以前膏為丸，濕重一錢八分，候干，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下，小兒三歲以下者酌情遞減。

二、上 海

【功能與主治】溫熱暑症初起，神情昏躁，舌赤口干。

【處方】天花粉四兩 鮮生地一斤 紫草四兩 豆豉八兩 板藍根九兩 連翹十兩 玄參七兩 人中黃四兩 黃芩 犀角各六兩 金銀花一斤 鮮石菖蒲六兩

【制法】除鮮石菖蒲、鮮生地、豆豉外，余藥共研細粉，再將鮮石菖蒲、鮮生地搗汁，豆豉煮爛與藥粉拌和，加六神麵糊為丸，每粒潮重二錢，蜡壳固封。

【劑量及用法】每服一丸，溫開水化服。憑醫師處方購用。

三、武漢（神犀丸）

【功能與主治】溫熱暑疫，高熱發斑，煩渴舌赤，神昏狂躁，謔語瘡厥，口糜咽爛，斑疹毒盛。

【處方】犀角（水磨） 石菖蒲 黃芩各六兩 鮮生地（搗汁） 銀花各一斤 連翹一兩 板藍根九兩 淡豆豉八兩 玄參七兩 花粉 紫草各四兩

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，按淨粉量加煉蜜80~90%和成大丸，每丸重二錢，蜡壳封固。

【劑量及用法】日服三次，每服三錢，小兒酌減。

四、福州（叶天士神犀丹）

【功能與主治】專治溫熱暑疫初起，神情昏躁，舌赤口干或邪不即解，耗液傷營，逆傳內陷，瘡癤昏狂，謔語，發斑等症。兼治疔瘡腫毒，夾帶紫癰危症及痘疹后余毒內熾，口糜咽腐，目赤神煩等症。

【處方】犀角尖（磨汁） 石菖蒲 黃芩各六兩 鮮生地（水洗浸透絞汁） 銀花各一斤 養清（如無，可加入中黃四兩研入） 連翹各十

兩 板蘭根九兩 香豉八兩 元參七兩 花粉紫草各四兩

【制法】各藥生晒研末，忌火炒，以犀角、生地、糞清各汁泛為丸，每粒重一錢五分，蜡壳封。

【備考】原重三錢，忌蜜煉。

五、杭 州

【功能与主治】同福州。

【处方】犀角尖一兩二錢 石菖蒲二兩二錢 黃芩一兩二錢 大生地三兩二錢(冷水洗淨浸透搗汁) 連翹二兩 金銀花三兩二錢 人中黃八錢 烏元參一兩四錢 板蘭根一兩八錢 淡豆豉一兩六錢 西紫草八錢 入花粉八錢

【制法】各生晒研細，勿用火炒，以生地汁加金汁露打和為丸，切勿加蜜，如難成丸，可將豆豉煮爛打和為丸，潮重三錢，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，小兒減半，研碎用涼開水送下。

六、南 昌

【功能与主治】溫熱暑疫，神識混，瘧厥昏狂，譫語發斑等症。

【处方】同福州。

【制法】各藥生晒研細，忌用火炒，以犀角、地黃汁糞清搗水泛為丸(勿加蜜)。每丸重五分，以蜡皮封固。

【劑量及用法】每次二至六丸，小兒視年齡及病情酌減服，溫開水送下。

【備考】非經醫師處方不得使用。

七、沙 市

【功能与主治】、【处方】同福州。劑量減半，糞清改用人中黃二兩。

【制法】上藥各生晒研細末，忌用火炒，另將生地煮透搗爛絞汁去渣，再將豆豉煮爛，取各藥細末入生地汁及煮爛豆豉中共搗為丸，每丸干後淨重一錢，外以蜡壳護之。

【劑量及用法】成人量每次服一丸，涼開水下病重者酌量再服，小兒老人酌減。

【禁忌】體弱而無炎症者忌服。

八、重 庆

【功能与主治】、【处方】同福

州。糞清改用人中黃四兩。

【制法】犀角磨汁，生地絞汁，鮮金銀花絞汁，余藥生晒研末，以三汁和丸，每重三錢，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，小孩減半。

九、沈陽(眞犀丹)

【功能与主治】清熱，解毒，強心。主四時疫病，發斑發疹，咽喉腫痛，昏狂譫語，全身倦怠，一切暑熱之症。

【处方】烏犀角二錢 石菖蒲黃芩 生地黃各一錢 銀花 連翹各五錢 板藍根 香豆豉 元參 花粉各一錢 紫草二錢

【制法】共碾極細面，再以香豆豉煮爛為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，小兒減半，白開水化服。

【禁忌】孕婦忌服。

附參考古方

【來源】溫熱經緯。

【处方】烏犀角尖(磨汁) 石菖蒲 黃芩各六兩 眞犀 生地(冷水洗淨浸透搗絞汁) 銀花各一斤(如有鮮者搗汁用優良) 糞清(如無糞清，可加入人中黃四兩研入) 連翹各十兩 板藍根九兩(無則以飛淨青黛代之) 香豉八兩 元參七兩 花粉 紫草各四兩

【制法】各生晒研細，忌用火炒，以犀角、地黃汁、糞清，和搗為丸。

【劑量及用法】每重三錢，涼開水化服，日二次，小兒減半。

【備考】切勿和蜜，如難丸，可將香豉煮爛。

瘧 靈 丹

撫 順

【功能与主治】瘧疾。

【处方】雄黑豆四十九个 人言一錢 雄黃一錢

【制法】將黑豆于五月初四日提河水泡至初五日晨，去皮用石臼內搗亂，後入人言、雄黃，合一處做三丸。

【劑量及用法】每服十二丸，臨發之日，空心服，一丸。

七 宝 丹

一、北 京

【功能与主治】行水化滯，功可截瘧。主一切瘧疾，日發或二日三日一發。

【处方】常山 厚朴 青皮 橘皮 檳榔 草果仁各一兩 甘草七錢

【制法】共為細粉，生薑五錢熬水泛小丸。

【劑量及用法】每服三錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌生冷食物，孕婦忌服。

二、濟南(神應七寶丹)

【功能与主治】諸瘧不論先熱後寒 頭痛口苦 心煩作渴，乏力少食。

【处方】常山 陳皮 青皮 檳榔 厚朴各二兩 甘草二兩 草果五兩

【制法】共軋細面，水泛小丸。

【劑量及用法】每次三錢，白開水送下。

【禁忌】忌食生冷油膩之物。

三、青島(神應七寶丹)

【处方】當歸 川芎 白芍 生地 云苓各二兩 鱉甲四兩 神曲二兩五錢 貝母二兩 草果二兩五錢 麥芽二兩五錢 黃芩二兩 柴胡二兩 陳皮二兩 青皮六兩 浙貝二兩 檳榔三兩 厚朴二兩 常山三兩 甘草一兩

【制法】共為細末，水泛為丸。

四、呼和浩特

(截瘧七寶丹)

【处方】全歸 川芎 杭芍 白朮 茯苓 鱉甲 知母 浙貝 草果 麥芽 黃芩 柴胡各十兩 陳皮 青皮各斤半 檳榔 常山 厚朴各二斤 甘草半斤 肉桂四兩 法夏十二兩

【制法】用烏梅、黑丑各一斤，熬水泛小丸。

涼寒頭痛酒

重 庆

【功能与主治】傷風涼寒頭痛。

【处方】杜耳風 青酒缸各三兩

西牛草二兩 木將子根二兩 五皮
老陳艾各四兩 柴胡二兩 神
砂草 万年青 馬蹄草 石菖蒲各
四兩 淫羊藿二兩 桑皮根一兩
散寒草三兩 肺筋草 枇杷根 土
升麻 牛毛毡 四塊瓦 金紫木
年干次各四兩

【制法】每方用干酒十斤泡十日
后即成。

【劑量及用法】每日三次，每次
一至二兩，按病者輕重增減之。

万应神糊

昆 明

【功能与主治】四时感冒，消化
不良。

【处方】藜草 青蒿 香茹 蒼
耳草各十六兩 桂枝 藿香 苏叶
麻黃各六兩 吳茱萸十六兩 羌活九
兩 防風 荆芥 厚朴各六兩 陳
皮九兩 香附六兩 芸香草 魚翅
草果 蒼朮 檳榔各四兩 甘松
山柰 麦芽 薄荷各六兩 粉葛四
兩 柴胡六兩 木香四兩 法落海
十六兩

【制法】研末加麦面酒药为糊。

【劑量及用法】每服二錢，烘黃
以开水送服。

【禁忌】忌食不易消化之物。

存安糊

禹 县

【功能与主治】伤風感冒。

【处方】山查五斤 川芎 川羌
活各二斤 蒼耳子二斤 荆芥十五
斤 麻黃 茶叶 蒼朮各五斤 陳
皮二斤 紫苏二十斤 白芷 防風
各十斤 葛根五斤 川厚朴二斤

【制法】共为粗面，面糊为餅，每
塊一兩。

【劑量及用法】成人每次一塊，
小兒減半。冰糖水送下。

【禁忌】虛弱忌用。

【備考】有效期二年。

采芸糊

上 海

【功能与主治】感受風寒，吐酸
泛嘔。

【处方】桔梗八兩 白朮(炒)

六神糊(炒焦) 谷芽(炒) 紫苏各
十六兩 陳皮 白芍药(炒)各六兩
青皮(炒)八兩 山楂(炒焦)十六兩
藿香 厚朴(制)各四兩 蒼朮(炒)
茯苓 檀香 白芷 檳榔各六兩
枳壳(炒) 薄荷各五兩 明矾二兩
甘草 木香 姜半夏 卓果仁(炒)
羌活 官桂各三兩 姜黃 干姜各
二兩

【制法】共研粗末，加糊糊成塊。
每塊干重一兩。

【劑量及用法】每次一塊，包煎
服湯。

建 糊

一、武 汉

【功能与主治】寒熱頭痛，嘔吐
咳嗽，食滯瀉利，腹脹腹痛。

【处方】廣藿香四兩 川厚朴二
兩 砂仁一兩半 苏叶 香附 蒼
朮各四兩 白芷 薤壳 法半夏各
二兩 桔梗三兩 廣陳皮四兩 麥
芽八兩 山查六兩 甘草一兩 檳
榔三兩 茯苓二兩 陳糊六斤半

【制法】取上药进行干燥，混合
碾細，得淨中等細粉四七兩二錢半。
再加榆树叶(俗名糯米叶)粉十四兩
一錢七分，用適量水研勻，成糊六十
一兩四錢，以模子打成糊塊，每塊重
一兩，每包十六塊，外套仿單。

【劑量及用法】每服二錢至三
錢。

【禁忌】孕婦勿服。

二、蘭 州

【处方】廣皮一斤 蒼朮半斤
五味子十二兩 花椒 川芎各半斤
羌活一斤四兩 杏仁一斤 厚朴十
二兩 麦芽一斤 小茴香十二兩
藜本六兩 柴胡 甘葛 麻黃 細
辛各半斤 藿香六兩 甘草一斤
青蒿 郁金各半斤 山楂一斤六兩
揀砂 枳壳 大黃各半斤 白芷
當歸各一斤 薄荷 甘松 青皮
丁香 卓薤各半斤 副茶一斤半
木香四兩 苏叶一斤

【制法】以上三十三味共为粗
末，面糊成塊。每塊一兩重。

三、濟 南

【功能与主治】食滯受涼，惡寒
發熱，胸悶吐瀉，不服水土等症。

【处方】藿香四兩 厚朴二兩
砂仁一兩五錢 苏叶 香附 蒼朮
各四兩 白芷 豆薤壳 法半夏各
二兩 桔梗三兩 廣陳皮四兩 麥
芽八兩 山查六兩 甘草一兩 檳
榔三兩 茯苓二兩

【制法】共为粗末(砂仁軋細)，
加神糊六斤八兩，打糊为餅。

【劑量及用法】每服三兩，小兒
一兩，清水煎服。

四、呼和浩特(福建糊)

【处方】神糊五錢 青蒿 苏叶
各二斤 陳皮 大香叶 蒼朮 桔
梗 厚朴 香薷 枳壳 薄荷 葛
根 麦芽 山查各一斤 甘草八兩

【制法】共为粗末，加面糊作糊。

建 神 糊

一、上海(范志糊)

【功能与主治】感受風寒，食滯
胸悶。

【处方】厚朴(制) 木香 白朮
(炒) 青皮(炒) 檳榔 葛根 茯
苓皮 柴胡 桔梗 荆芥 前胡
香附(制) 羌活 紫苏 薄荷 茅
朮(炒) 独活 猪苓 防風 烏药
枳实(炒) 大腹皮 藿香 木通
香薷 澤瀉 白芥子各一兩 公丁
香 白豆薤 甘草 麻黃(去节)
川芎 木瓜 沉香 白赤子 肉果
(煨) 檀香 砂仁 卓果仁(炒)
秦艽 白芷各一兩 陳皮 蘿蔔子
(炒) 姜半夏 杏仁(去皮尖)各三
兩 麦芽(炒) 谷芽(炒) 山楂
(炒焦) 生姜各四兩 六神糊(炒
焦)二十三兩

【制法】上药除生姜、六神糊外
共研粗粉，再用生姜四兩煎汁，和
神糊粉加糊成塊，每塊一兩二錢。

【劑量及用法】每次一塊，包煎
服湯。

二、南京(范志糊)

【功能与主治】疏風健胃解熱。
主感冒寒熱，嘔吐腹瀉，氣滯食積，
胸腹脹痛等症。

【处方】川厚朴 冬朮 青皮
廣木香 茯苓皮 檳榔 葛根 川
羌活 大腹皮 柴胡 桔梗 前胡
荆芥 香附 紫苏 薄荷 独活
猪苓 防風 烏药 枳实 木通

藿香 香薷 蒼朮 澤瀉各二兩
丁香 豆蔻 甘草 麻黃 川芎
木瓜 沉香 肉果 砂仁 秦艽
白芷 白芥子 草果仁 檀香各一
兩 炙半夏 萊菔子 廣皮 杏仁
各二兩 炒麥芽 炒谷芽 山查肉
各四兩 白芥子二兩

【制法】研為細末，以生姜汁和神麴加糊作成餅，分大、小塊兩種，大塊每重一兩，小塊每重二錢。

【劑量及用法】每服三錢，煎水服。

三、重 庆

【功能与主治】搜風解表，消積行痰，開胸理膈，調胃健脾，止瀉消腫，透疹消癍。

【處方】司南京，惟無生姜、六神麴二味。

【制法】共研細末合勻，麴糊成塊。簸箕攤定，荷葉蓋面，置木架上，稍發酵為度。晒干瓦器裝置。

【劑量及用法】三錢至四錢。

自制建神麴

沙 市

【功能与主治】治外感風寒，內傷飲食，胸膈痞滿，寒濕瀉痢等症。

【處方】川厚朴 廣木香 白朮 青皮 檳榔 葛根 茯苓皮 桔梗 北柴胡 荊芥 前胡 香附 羌活 蘇葉 薄荷 蒼朮 獨活 豬苓 防風 烏藥 枳實 大腹皮 廣藿香 木通 香薷 澤瀉 白芥子各二兩 丁香 白蔻仁 粉甘草 麻黃 川芎 木瓜 沉香 蘇子 肉果 檀香 砂仁 秦艽 草果(去壳) 白芷各一兩 廣陳皮 法夏 萊菔子 杏仁各二兩 炒麥芽 炒谷仁 炒檳肉各四兩

【制法】共為粗末，用姜汁和小麥麴十二兩打糊做成小塊。

【劑量及用法】成人量每次服三錢，水煎去渣，溫服或加入適宜之湯藥丸中用之。

【禁忌】脾虛胃弱而無風寒滯積者忌服。

万应神麴糕

广 州

【功能与主治】感冒發熱，健胃

止痛，利尿，食滯，嘔吐，泄瀉。

【處方】前胡 大黃 良姜 蒼朮 羌活 防風 姜黃 山查 柴胡 厚朴 紫蘇 荳蔻 葛根 檳榔 薏米 黃芩 荊芥 麻黃 青皮 使君子 黃柏 百合 木香 益母草 麥芽 烏藥 桔梗 柯子 大腹皮 豬苓 茯苓 三稜 芫花 草果 半夏 懷山藥 木通 枳實 藿香 澤瀉 香薷 菖蒲 黃連 木瓜 香附 枳壳 小豆 花椒各四兩

【制法】先將各藥洗淨，切碎晒干，共研為細末，用鮮青蒿四斤，鳳尾草、大蓴草各二斤煎水，將藥與面粉，拌勻入草藥水，壓成塊狀，蒸三小時，候冷裝入桶內，一層稻草，一層神麴，蓋密經十二天取出晒干，極干為度。

【劑量及用法】大人每次服三錢，小兒每次服一錢，清水煎服。

午 时 茶

一、上 海(1)

【功能与主治】感冒頭痛，胸悶腹瀉。

【處方】茅朮(炒) 陳皮 柴胡 連翹 白芷 枳實(炒) 山楂(炒焦) 羌活 前胡 防風 藿香 甘草 六神麴(炒焦) 川芎各十兩 厚朴(制) 桔梗 麥芽(炒) 紫蘇各十五兩 紅茶二十斤

【制法】共研粗末，加面糊為塊，每塊干重二錢半。

【劑量及用法】每次二塊，包煎服湯。

二、上海(天中茶)(2)

【功能与主治】感冒頭痛，胸悶作嘔，腹瀉。

【處方】厚朴(制)三兩 枳實(炒)二兩 白芷一兩 藿香 荊芥 紫蘇 柴胡各二兩 六神麴(炒焦) 山楂(炒焦) 麥芽(炒)各四兩 姜半夏三兩 澤瀉 大腹皮 防風 桔梗 檳榔 前胡 茅朮(炒) 香薷各二兩 陳皮二兩 紅茶葉六斤 甘草一兩 白芍藥(炒)二兩 杏仁(去皮尖)三兩 秦艽一兩 薑青皮(炒) 獨活 藁本 車前子(炒) 白芥子 黑蘇子 白朮(炒) 羌活 豬苓 木通 薄荷各二兩

茯苓四兩 蘿蔔子二兩 草果仁 川芎各一兩

【制法】共研粗末，袋裝，每袋三錢。

【劑量及用法】每次一袋，包煎服湯。

三、南 京

【功能与主治】主外感風寒暑濕，內傷飲食停滯，惡寒發熱，頭暈身倦，胸悶腹脹等症。

【處方】陳茶葉八兩 白芍一兩 焦蒼朮二兩 枳壳一兩 焦麥芽二兩 淡黃芩一兩 焦山楂二兩 防風一兩 廣藿香二兩 蘇葉一兩 白扁豆一兩 青蒿一兩 飛滑石二兩 陳皮 川厚朴 木瓜 砂仁 白芷 桔梗 茯苓 羌活各一兩 甘草五錢 葛根一兩 川黃連五錢 西香薷一兩 薄荷五錢 西茵陳一兩 大腹皮一兩(煎汁)

【制法】上藥生晒共研細末，(大腹皮煎汁)兌入所用稀粥內，打糊或兌入面糊內和上藥粗末，做成長方形塊子，每塊計重二錢。

【劑量及用法】每服一塊或二塊，開水泡或微煎服之。

四、天 津

【功能与主治】散風去寒，消食健胃。主受風感冒，作冷作嘔，頭疼鼻塞，胸滿腹脹，消化不良。

【處方】炒蒼朮 枳實(麩炒) 山楂 陳皮 神麴(麩炒) 甘草各十兩 柴胡 前胡 川芎各一斤四兩 藿香 連翹(去心) 炒麥芽 防風 桔梗 羌活 蘇葉 厚朴(姜制) 白芷各十五兩

【制法】共為細粉，三級花三角茶葉二十斤，轧成粗末，用溫水將茶葉浸透，再將細粉混合一起攪勻，用神麴面九斤打糊制長方塊，每塊干重三錢。

【劑量及用法】每次兩塊，水煎服。

五、武 汉

【功能与主治】風寒感冒，頭痛停食，腹痛泄瀉，及水土不服等症。

【處方】蒼朮 山楂 陳麴 陳皮 羌活 川芎 柴胡 前胡各十兩 蘇葉 川朴 桔梗 麥芽各十

五兩 連翹 防風 白芷 藿香
枳實 甘草各十兩 陳茶葉二十斤
(隔年的)

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，得淨中等粉四七八兩四錢，加灰面一九一兩二錢六分，加適量水混合碾勻，作成塊狀，每塊重二錢五分，每盒二十塊。

【劑量及用法】每服一錢半，用開水泡服。

六、廣州

【功能與主治】風寒感冒。

【處方】同武漢。

【制法】將原料各藥研為細末，拌勻，米糊埋成小塊。

【劑量及用法】每服三錢，小兒折半，加姜、葱清水煎服。

七、福州

【功能與主治】、【處方】同武漢。

【制法】共研粗末，拌勻宜五月五日午時合糊成小塊。

【劑量及用法】每服一錢。

八、南昌

【功能與主治】、【處方】同武漢。

【制法】研為細末拌勻，于陰歷五月初五日午時面糊成小丸。

【劑量及用法】每服三錢，用葱一根，生薑一小片，同煎熱服，小兒視年令及病情酌減服。

九、沙市

【功能與主治】治風寒感冒，停食不消，腹泄腹痛等症。

【處方】同武漢。陳茶葉改用五斤。

【制法】諸藥研為細末拌勻，打糊制成小塊。

【劑量及用法】成人每次服三錢，加葱、姜少許煎湯熱服取汁，小兒老人酌減。

【禁忌】上呼吸道炎及胃腸發炎者忌服。

十、重慶

【功能與主治】、【處方】同武漢。

【制法】用炕上杆為粗末，和勻，用姜、葱煎水漿糊成塊，每重五錢，

晒干，瓦器貯藏。

【劑量及用法】每次一塊。

十一、蘭州

【功能與主治】去腸胃濕寒，助消化，發汗解熱。主風寒感冒，宿飲停食，腹痛腹瀉，不服水土。

【處方】蒼朮 枳實 山楂 陳皮 神曲 甘草 柴胡 防風 川芎各十兩 連翹 麥芽 桔梗各十五兩 羌活十兩 蘇葉 厚朴各十五兩 白芷十兩 藿香十五兩 香附 荊芥 豬苓各十兩

【制法】以上各藥用茶葉末二十斤，合為一處，用面糊拌勻，作成塊狀。

【劑量及用法】成人每服三錢，小兒酌減，煎熱服下；加葱、姜少許，效力尤速。

十二、禹縣

【功能與主治】、【處方】同武漢。

【制法】共研細面，面糊為餅。

【劑量及用法】每服兩塊，小兒每服一塊，每用兩塊，加冰糖二錢，開水包煎澄清服。

【禁忌】火熱症忌用。

【備考】有效期二年。

附參考古方

【來源】經驗百病內外方（陳修園醫書全集）。

【功能與主治】治一切風寒感冒，停食及不服水土，腹瀉腹痛等症。

【處方】茅朮 陳皮 柴胡 連翹 白芷 枳實 查肉 羌活 前胡 防風 藿香 甘草各十兩 陳茶二十斤 桔梗 麥芽 蘇葉 川芎各十五兩 建柚 川芎各十兩

【制法】上為細末，拌勻，宜五月五日午時，合糊成小塊。

【劑量及用法】每服三錢，服時加葱、姜少許，煎熱服，汗出即效。

神 糲 茶

南 昌

【功能與主治】治四時不正之氣，感冒發熱，大眩咳嗽及傷食腹痛，痞滿氣滯，嘔吐泄瀉痢疾，飲食不進，不服水土等症。

【處方】廣藿香四兩 川朴二兩 砂仁一兩五錢 蘇葉四兩 香附四兩 白芷二兩 蒼朮四兩 白蘞殼二兩 法夏二兩 桔梗一兩 廣陳皮四兩 麥芽八兩 山楂六兩 甘草一兩 花檳榔二兩 茯苓一兩

【制法】共研細面，加六神糲六斤八兩，糊為丸。

【劑量及用法】每服三錢，水煎去渣服，或加姜一至二片同煎更佳。小兒視年令及病情酌減服。

萬 壽 香 面

沈 陽

【功能與主治】解瘟疫，避瘴氣。主解瘟疫青癘，避山嵐瘴氣，避一切惡邪味。

【處方】檀香二兩 甘松 廣木香 零零香 芸香各五錢 白芷 辛黃 公丁香各三錢 山柰 大黃各二錢 香茅二兩 排草一錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】燃之爐內，利用煙氣亦可，或用紗布包裹帶之。

專治瘧疾方

呼 和 浩 特

【處方】密陀僧三錢 草丹一錢 杏仁二十個 飛羅面一握

【制法】共為細面，水泛小丸，如黃豆大，每服七粒。

暑 濕 類

二 妙 丸

一、北京(附：二妙散)

【功能與主治】清熱燥濕。主濕熱下注，腿腳發沉腫及膝下生瘡。

【處方】黃柏 蒼朮各等分

【制法】共為細粉，水泛小丸，滑石為衣闔亮。

【劑量及用法】每服一錢，日服二次，黃酒或溫開水送下。

【備考】二妙散即用上述藥細粉，劑量及用法同上。外用以香油炸花椒調敷。

二、天 津

【功能與主治】去風除濕。主遍身濕熱，足指腫痛，腰膝無力，四肢

浮腫，小便不利，濕熱下注，腳氣腫痛。

【處方】黃柏 炒蒼朮各一斤

【制法】共為細粉，涼開水泛小丸，三錢重裝袋。

【劑量及用法】每次服一袋，白開水送下。

三、上海

【功能與主治】主腳膝痛軟，足趾濕爛，小溲赤濁。

【處方】黃柏(炒) 蒼朮(炒)各八兩

【制法】共研細粉，用生薑四兩煎湯泛丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二錢，食前溫開水送服。

四、南京

【功能與主治】清熱祛濕。主濕熱之筋骨疼痛，痿軟麻木，濕瘡痛癢等症。

【處方】蒼朮(米泔水漂浸) 黃柏各一斤

【制法】各研細末，用溫沸水泛丸，黃柏為衣，每錢約七十粒。

【劑量及用法】每服二至三錢，一日一次，開水吞服。

五、武漢

【功能與主治】主濕熱麻痺，筋骨疼痛痿弱，亦治口赤瘡瘍，及風火牙痛。

【處方】黃柏 蒼朮各四兩

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于三十粒。

【劑量及用法】每服一錢至二錢，開水送下。

六、福州(附：三妙丸)

【功能與主治】治濕熱下注，腿足痿痺。

【處方】蒼朮 黃柏等分

【制法】共研細末，水泛為丸。

【備考】三妙丸照原方加牛膝。

七、杭州(清濕二妙丸)

【功能與主治】治濕熱下注，筋骨疼痛，腳膝痿弱，熱痛紅腫，氣血不行，肢節麻痺等症。

【處方】川黃柏(炒) 茅朮各八兩

【制法】共研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服三至四錢，開水送下。

八、蘭州

【功能與主治】除風祛濕。主治足趾腫痛，足膝無力，小便不利，下肢浮腫，腳氣腫痛等症。

【處方】川柏 蒼朮各一斤

【制法】共軋細面，水泛小丸。

【劑量及用法】每服二錢，開水送下，早晚各服一次，小兒酌減。

【禁忌】無風濕者忌服。

九、濟南

【功能與主治】主濕熱筋骨疼痛，痿弱，兼治瘡瘍。

【處方】蒼朮 黃柏各等分

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服三錢。

十、呼和浩特

【處方】蒼朮 黃柏各半斤 牛膝二兩 丹皮一兩 薏米二兩 木香五錢 澤瀉一兩 茯苓二兩 甘草五錢

【制法】共碾細面，水泛小丸。

三妙丸

一、杭州(清濕三妙丸)

【功能與主治】治濕熱下注，兩足麻痺，腫痛痿弱或如火烙，步履無力，新久腫痛等症。

【處方】川黃柏(酒炒)四兩 茅朮六兩 懷牛膝二兩

【制法】共研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服三至四錢，開水送下。

二、重慶

【功能與主治】治濕熱下注，兩腳麻痺，腳熱如火。

【處方】蒼朮六兩 黃柏四兩 川牛膝二兩

【制法】共研細末，水泛為丸，紙盒包裝。

【劑量及用法】每服二至五錢。

四妙丸

南京

【功能與主治】主濕熱下注，兩

足麻痺腫痛等症。

【處方】川黃柏 苡仁米各八兩 蒼朮(米泔水漂) 懷牛膝各四兩

【制法】上藥除黃柏外，共研細末，沸水泛丸，黃柏為衣，每錢約八十粒。

【劑量及用法】每服二錢，一日二次，開水吞服。

藿香正氣丸

一、北京

【功能與主治】祛寒暑，止吐瀉。主夏令外感，中暑頭痛，憎寒發熱，內傷飲食，吐瀉腹脹。

【處方】藿香三兩 大腹皮 白芷 茯苓 紫蘇葉各一兩 橘皮 白朮 厚朴 桔梗 半夏 甘草各二兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重三錢，硃砂為衣。

【劑量及用法】每服一丸，日服一次，姜湯或溫開水送下。

【禁忌】忌生冷厚味，孕婦忌服。

二、天津

【功能與主治】扶正氣，去暑邪，理腸胃，止吐瀉。主夏令外感，發熱發冷，中暑頭痛，內傷飲食，腹脹吐瀉，胸滿腹痛，嘔惡心。

【處方】藿香 板榔 白芷 茯苓(去皮) 蘇葉各二兩 陳皮 白朮(麸炒) 厚朴(姜制) 制半夏各二兩 甘草一兩 桔梗一兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，三錢重，每斤丸藥用硃砂面三錢上藥，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

三、上海

【功能與主治】主惡寒發熱，口淡胸悶，舌白作嘔，神疲肢重，腹痛便瀉。

【處方】厚朴(制) 陳皮 白朮(炒) 桔梗 姜半夏各二兩 紫蘇 白芷 藿香 茯苓各二兩 甘草(炙)一兩

【制法】共研細粉，以生薑一兩，紅棗一兩，大腹皮二兩，煎湯泛丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二錢，溫開水送服。

四、南 京

【功能与主治】主夏令感冒，發熱吐瀉。

【处方】广藿香三兩 炒白朮二兩 大腹皮二兩(煎水) 制厚朴二兩 香白芷二兩 桔梗二兩 白茯苓三兩 姜半夏二兩 紫蘇三兩 粉甘草一兩 广陈皮二兩

【制法】共研細末，加鮮生姜二兩，紅棗二兩及大腹皮共煎湯泛丸，每錢約做八十粒。

【剂量及用法】每服三錢，一日二次，空腹時開水吞服。

五、武 汉(1)

【功能与主治】主發熱惡寒，肢體痠軟，心腹冷痛，吐瀉霍亂等症。

【处方】藿香三兩 白芷一兩 炙甘草 陈皮 厚朴(姜制) 法半夏 桔梗 白朮(土炒)各二兩 紫蘇一兩 云苓 大腹皮各一兩 姜 棗各五錢

【制法】除大腹皮、姜、棗外，取上藥進行干燥，混合碾細，將大腹皮、姜、棗煎汁，迭成小丸，每錢不得少于四十粒。

【剂量及用法】每服三錢至五錢，開水送下。

六、武 汉(2)(大粒藿香丸)

【功能与主治】惡寒發熱，頭痛胸悶，中暑傷濕，霍亂嘔瀉等症。

【处方】藿香二兩 白芷一兩 炙甘草 陈皮 厚朴 半夏 桔梗 白朮各二兩 紫蘇 茯苓 大腹皮(煎水和丸)各一兩

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜90—95%，和成大丸，每丸重為二錢。

【剂量及用法】每服半丸或一丸，開水送下。

七、广 州(正氣丸)

【功能与主治】主感冒，消化不良。

【处方】藿香 桔梗 紫蘇各四兩 白芷 茯苓 白朮 厚朴 陈皮 半夏各二兩二錢 大腹皮二兩 甘草二兩

【制法】將上列各藥洗淨，切碎隔水蒸透，晒干研成細末，拌米糊制

成小丸。

八、福 州

【功能与主治】治外感內傷，山嵐瘴氣。

【处方】藿香 大腹皮 紫蘇 茯苓 白芷各三兩 陈皮 蒼朮土炒 厚朴(姜汁炒) 半夏 桔梗各二兩 甘草一兩

【制法】共研細末，加姜、棗煎湯泛丸。

九、杭 州

【功能与主治】治外感風寒，內傷飲食，畏寒發熱，頭痛嘔逆，胸悶腹脹，暑濕霍亂，瘧痢吐瀉，不服水土等症。

【处方】杜藿香 白芷 白茯苓 紫蘇叶各三兩 广陈皮 冬朮 川厚朴 苦桔梗 制半夏各二兩 炙甘草一兩 大腹皮三兩 生姜二兩 大紅棗四兩

【制法】共研細末，大腹皮、姜、棗煎湯泛丸。

【剂量及用法】每服三至五錢，開水送下。

十、南 昌

【功能与主治】暑令外感，風寒內傷，飲食憎寒，壯熱頭痛，嘔逆胸悶，腹脹傷冷，傷濕，傷暑，吐瀉，下痢，山嵐瘴氣，不服水土等症。

【处方】藿香 腹皮 白芷 云苓 紫蘇各二兩 陈皮 白朮(土炒) 厚朴(姜制) 桔梗 半夏各二兩 炙甘草一兩

【制法】研末，用生姜、大棗各四兩，及方中之大腹皮煎湯泛丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每日服三次，每服二錢，溫開水送下，每隔四到六小時服一次。

【禁忌】忌食生冷油膩食物。

十一、沙 市

【功能与主治】治外感風寒，內傷飲食，惡寒發熱，頭痛嘔逆，便泄胸悶，腹脹穢濁郁結等症。

【处方】广藿香叶三兩 蒼朮 川厚朴 广陈皮 法半夏各二兩 茯苓二兩 粉甘草一兩 蘇叶(連梗用) 桔梗 白芷 大腹皮 神麴 大棗 生姜各二兩

【制法】上藥除大腹皮、生姜、大棗外，余十一味共研細末，忌用火炒。腹皮、生姜、大棗三味煎湯去渣，俟冷以湯泛丸。

【剂量及用法】成人量每服三錢，溫開水下，每日服二次(四小時一次)，小孩、老人酌減。

【禁忌】水份不足者忌服，孕婦忌服。

十二、重 庆

【功能与主治】外感風寒，內傷飲食，憎寒壯熱，頭痛嘔逆，胸悶腹脹，痰咳氣喘，霍亂吐瀉，傷冷傷食，傷暑瘧痢，水土不服等症。

【处方】藿香 大腹皮 白芷 茯苓 紫蘇各二兩 橘皮 土炒白朮 厚朴 桔梗 姜半夏各二兩 炙甘草一兩

【制法】除大腹皮煎汁，余藥研細末，大腹皮和生姜二兩、大棗二兩煎濃汁泛丸，紙盒包裝。

【剂量及用法】三錢至五錢。

十三、西 安

【功能与主治】腸胃性感冒，神昏發熱，頭痛嘔逆，胸膈滿悶，咳嗽氣喘等症。瘧疾中暑，急性、亞急性胃腸炎，吐瀉腹痛。

【处方】藿香 大腹皮 白芷 茯苓 紫蘇叶各三兩 广陈皮 土炒冬朮 桔梗 半夏 姜制厚朴各二兩 甘草一兩

【制法】蜜制為丸。

【剂量及用法】每服二、三錢，開水送下。

【禁忌】身體虛弱者慎用。

十四、蘭 州

【功能与主治】強胃化痰，止嘔止瀉。主暑天受寒，發燒傷食，上吐下瀉，氣悶胸滿，頭疼腹痛。

【处方】藿香 蘇叶 云苓各三兩 陈皮 桔梗 半夏 川朴 白朮各二兩 白芷 檳榔各二兩 粉甘草一兩

【制法】共為細末，煉蜜為丸，每丸三錢重。

【剂量与用法】每次服一丸，姜湯送下，白開水亦可。

【禁忌】禁食生冷油膩，暑熱忌服。

十五、大同

【功能与主治】四时不正，感冒中暑，嘔吐下瀉。

【处方】藿香二兩 紫苏 白芷各一兩半 广皮 半夏 云苓 白朮 桔梗 檳榔各一兩 川厚朴 枳壳 炙草各一兩

【制法】共为細面，煉蜜为丸，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服三錢，姜湯水送下。

十六、禹县

【功能与主治】伤寒头痛，腹痛吐瀉，憎寒發热，暑犬感冒。

【处方】广藿香 全紫苏各一兩 陈皮 苦桔梗各二兩 白茯苓三兩 制半夏 川厚朴各二兩 白芷三兩 白朮二兩 甘草一兩 大腹皮三兩

【制法】共为細面，煉蜜为丸，重一錢。

【剂量及用法】每服一丸，急症服一丸，白开水送下。小兒每服半丸。

【禁忌】热症忌用。

【备考】有效期一年。

十七、济南

【功能与主治】暑令感冒，發热吐瀉。

【处方】藿香三兩 桔梗 半夏各二兩 紫苏 白芷各三兩 大腹皮三兩(煎水打丸) 白朮(土炒) 厚朴 陈皮各二兩 茯苓三兩 炙甘草一兩

【制法】共为極細末，水泛为丸，如菉豆大，滑石三兩为衣(松打)，装入紙袋，每袋三錢。

【剂量及用法】成人每服三錢，小兒酌減，白开水送下。

【禁忌】辛辣、油膩等物。

十八、青島

【处方】陈皮八兩 苏叶 腹皮(黑豆水洗) 桔梗 厚朴 茯苓 半夏 白芷各四兩 白朮 藿香各八兩 神曲(炒) 香附(炙) 砂仁各四兩 木香八兩 甘草(炙)二兩

【制法】共軋細麵，煉蜜为丸，重三錢，硃砂为衣。

十九、沈陽

【功能与主治】健胃整腸，除湿避穢。主四时瘟病，头痛發热，嘔吐惡心，霍乱吐瀉，不服水土，腹痛瀉痢，飲食停滯，胸脇痞滿等症。

【处方】藿香五兩 紫苏 白芷 橘皮 枳梗 茅朮 茯苓各三兩 厚朴 半夏各二兩 甘草一兩 大腹皮三兩

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸，二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，姜湯送下。

【禁忌】忌食生冷厚味。

二十、撫順

【功能与主治】健胃整腸，芳香解毒。專治四时感冒，伤暑伤湿，嘔吐瀉泄，头晕腹痛，寒热身痛以及水土不服，消化不良，脹悶瀉泄，身瘦食少等症。

【处方】藿香 川朴 桔梗 云苓 陈皮 蒼朮 紫苏 半夏各六兩 白芷 檳榔 甘草各五錢

【制法】共为細面，蜜丸二錢重。

【剂量及用法】大人每服一丸，小兒粉剂一分至一分酌年齡服用之，均用姜水送下。

【禁忌】忌食水果生冷硬物等。

二十一、沈陽(正氣丸)

【功能与主治】化痰解毒，健胃固腸。主四时感冒嘔吐泄瀉，胃痛腹痛，冷熱不熱，不服水土，傳染疫癘。

【处方】蒼朮二兩 玉金八錢 荆芥 桔梗 苏叶 牙皂各一兩二錢 硼砂八錢 公丁香四錢 雄黃一兩 麝香五分 甘草 川朴各八錢 明矾 花粉各一兩二錢 川芎二兩二錢 神曲一兩二錢 金銀花二兩 滑石八錢 乳香一兩二錢 柴胡一兩二錢 大黃八錢 人中黃一兩 細辛八錢 半夏 陈皮各二兩二錢 藿香二兩 木香六錢 白芷二兩二錢 硃砂一兩二錢 市蒲六錢 貫眾二兩

【制法】共碾極細面，水泛为小丸，硃砂为衣。

【剂量及用法】每服五分，姜湯水送下。

【禁忌】生冷油膩。

二十二、吉林(正氣丸)

【功能与主治】和中解表，化濁解毒。伤食，感冒，霍乱，嵐瘴，水土不服，时疫嘔吐等症。

【处方】藿香 紫苏 腹皮各三兩 炙草一兩 苦梗二兩 云苓三兩 白朮(土炒)三兩 油朴(薑制)二兩 半夏一兩 陈皮二兩 白芷三兩 大棗(去皮核)二兩

【制法】將大棗去皮核，取肉晒干合余药一处，碾細煉蜜为丸，每丸二錢一分重，即成。

【剂量及用法】患者每服一丸，每日一次用薑水送下。

二十三、哈尔滨

(正氣丸，藿香丸)

(附：藿香正氣散)

【功能与主治】和中解表，化濁解毒。主伤食感冒，霍乱，嵐瘴，水土不服。

【处方】藿香 紫苏 腹皮 云苓 白朮(土炒) 白芷 大棗(去皮核)各三兩 炙草一兩 苦梗 油朴(姜制) 半夏 陈皮各二兩

【制法】將大棗去皮、核，取肉晒干，合余药一处碾細，煉蜜为二錢一分重丸。棉紙包，蜡皮封。

【剂量及用法】成人每服一丸，小兒可酌服粉剂一分至五分。每日二次或三次。

【备考】藿香正氣散即上药之粉剂。

二十四、承德

【功能与主治】暑令感冒，發热吐瀉。

【处方】藿香三兩 白芷一兩 桔梗二兩 厚朴三兩(姜炙) 半夏 麝二兩 大腹皮 紫苏叶各一兩 白朮(土炒) 陈皮各二兩 茯苓一兩 甘草二兩

【制法】共为細粉，水泛为小丸，滑石为衣，圓亮每兩分作二百粒，煉蜜丸三錢重。

【剂量及用法】每服二十粒，日服二次，溫开水送下。

【禁忌】忌食生冷厚味。

二十五、呼和浩特

【处方】藿香 厚朴 陈皮 苏叶 腹皮 白芷 法夏 桔梗 赤

苓 白朮 茯苓 羌活 薄荷 川
芎 元參 花粉 梔子 連翹 枳
殼 木通 甘草各四斤

【制法】共為細面，蜜丸，三錢重，硃砂衣。

香 薷 丸

一、青 島

【處方】木香 陳皮 茯苓 半
夏 青皮 砂仁 神麴 麦芽各五
兩 山楂一兩 藿香二兩五錢 川
朴 紫蘇 木通各五錢

【制法】共為細面，蜜丸重二錢。

【備考】又方：藿香 香薷 黃
芪 厚朴 扁豆 丁皮 木瓜 蘇
叶 甘草各八兩 丁香五兩 檀香
五錢共軋細面，蜜丸重二錢。

二、沈 陽

【功能與主治】生津止渴，清暑
退熱。主傷暑入痛，白汗口渴，神昏
面垢，頭目眩暈。

【處方】香薷二兩 薄荷叶 礪
砂 柿霜 烏梅肉 藿香各二兩
甘草一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，
二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開
水送下。

【禁忌】忌食辣物。

三、撫 順

【處方】香薷 蘇叶 木瓜 藿
香 川朴 陳皮 扁豆 甘草 茯
苓各四兩 丁香 檀香各五錢

【制法】共為細面，蜜丸三錢重。

四、呼和浩特

【處方】香薷 藿香 厚朴 茯
苓 木瓜 蘇叶 丁香 檀香 炙
甘草各二兩

【制法】共為細面，蜜大丸，重二
錢五分。

附參考古方

【來源】1.重刻太平惠民和劑局
方

【功能與主治】治大人小兒傷暑
伏熱，燥渴發悶，頭目昏眩，胸膈煩
滿，嘔噦惡心，口苦舌干，肢體困倦，
不思飲食，或發霍亂，吐利轉筋。

【處方】丁木瓜 紫蘇(去粗梗)
香薷(去土)各一兩 白茯苓(去木)
藿香叶 檀香(剉) 甘草(炙) 丁
香各半兩

【制法】上為細末，煉蜜和勻丸，
每一兩作三十丸。

【劑量及用法】每服一丸至二
丸，細嚼，溫湯下，或新汲水化下，小
兒半丸，不拘時。

2.惠直堂經驗方

【處方】香薷三兩 薄荷叶 礪
砂 柿霜 烏梅肉 藿香各二兩
粉甘草一兩

【制法】共為細末，白糖白蜜為
丸，每丸重一錢。

【劑量及用法】噙化或冷水下。

蒼 薷 丸

沈 陽

【功能與主治】滌滯胃腸，解暑
除濕。主中濕傷暑，憎熱吐熱，生冷
停滯，嘔吐惡心，霍亂腹痛，水土不
服，膨悶脹飽，腹痛水瀉等症。

【處方】蒼朮 大黃 白芷各一兩
藿香八錢 竹茹五錢 香薷六錢

【制法】共碾極細面，水泛為小
丸。

【劑量及用法】每服二錢，姜湯
送下。

【禁忌】忌食生冷；孕婦忌服。

清 暑 益 氣 丸

一、南 京

【功能與主治】主夏令精神疲
倦，頭痛胸悶，白汗口渴，小便赤澀。

【處方】炒黃芪 米泔浸蒼朮各
一錢五分 青皮 炒黃柏 西當歸
潞黨參 麥冬各三分 炒白朮 六
神麴 廣陳皮 甘葛根 建澤瀉各
五分 五味子杵九粒 炙甘草三分
升麻一錢

【制法】共研細末，用鮮生薑三
片、紅棗二枚煎湯泛丸，每錢約做六
十粒。

【劑量及用法】每服二錢，日一
次，開水吞服。

【備考】醫生處方用量不拘。

二、沈 陽

【功能與主治】清暑解毒。主發
熱惡寒，身重疼痛，中暑昏憤，手足

逆冷。

【處方】黃芪 黃柏 青皮 炙
甘草 神麴 人參 澤瀉各一兩
麥冬二兩 當歸七錢 葛根 升麻
各三錢 五味子八錢 白朮 蒼朮
各一兩五錢 大棗二十枚

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，
二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，姜水
送下。

【禁忌】忌食生冷。

三、呼和浩特

【處方】人參 黃芪 蒼朮各一
斤 神麴 黃柏 麥冬 白朮 陳
皮 歸身 炙草 澤瀉 甘葛 五
味 青皮各四兩 升麻五兩

【制法】共為細面，蜜大丸，重三
錢。

菩 提 救 苦 丸

福 州

【功能與主治】治春夏感冒風
寒，時行瘟疫，暑濕頭痛，口渴身熱，
目脹，筋骨疼痛，惡心怯寒，內傷飲
食，外感風寒。

【處方】紫蘇 葛根 羌活各四
兩 蒼朮 赤芍 香附 花粉 元
參各三兩 陳皮 生地 白芷 防
風 川芎 黃芩 川朴各二兩 甘
草 細辛各一兩

【制法】共研細末，用新荷梗、荷
叶煎湯泛為丸，重一錢，蜡壳封。

菩 提 丸

一、大 同

【功能與主治】霍亂吐瀉，感冒
中暑，四時不正之氣。

【處方】厚朴(姜制) 半夏各十
兩 陳皮四錢 薄荷二錢 山查炭
二兩 枳殼二兩 砂仁一兩 香附
各十兩 扁豆 神麴 麦芽各二錢
藿香 蘇叶各三錢 黃芩 茅朮
茯苓 生草各十兩

【制法】共研細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】淡姜湯送下，開
水亦可。

二、沈 陽

【功能與主治】消痞積，清胃腸。
主傷風感冒，吐瀉痢疾，胃腸病等。

【处方】前胡 薄荷 蒼朮 厚朴 枳壳 香附 黃芩 砂仁 木香 板榔 神曲 麦芽 山楂 陈皮 甘草 白芍 藿香 紫苏 羌活 半夏各等分

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，姜湯送下。

【禁忌】忌食生冷。

菩提万应丸

撫 順

【处方】陈皮 川朴 蒼朮 半夏 薄荷 元芩 枳壳 香附 柴胡各一兩四錢 藿香五錢 甘草 神曲 麦芽 山楂 砂仁各一兩

【制法】共为細面，蜜丸三錢重。

普济消毒丸

一、沈 陽

【功能与主治】清瘟解毒，退热消腫，头面腫痛，感冒風寒，咽喉腫痛，大头瘟，喉痹等症。

【处方】連翹一兩 薄荷一錢 馬勃四錢 牛蒡子六錢 荆芥穗三錢 殭蚕五錢 元參 金銀花 桔梗 黃連 黃芩各一兩 蘭根 甘草各五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下。

【禁忌】忌食五辛油膩。

二、哈 尔 濱

【功能与主治】清瘟解毒，解表清里。主大头瘟，喉痹。

【处方】黃芩(酒炒) 黃連(酒炒)各二兩 牛蒡四錢 玄參 生草 桔梗各八錢 蘭根四錢 柴胡八錢 升麻二錢八分 馬勃 連翹各四錢 陈皮八錢(去白) 殭蚕二錢八分 薄荷四錢 野軍二兩

【制法】共碾为細面，煉蜜为二錢重丸。

【剂量及用法】每服一丸，淡姜湯服，取汗泄瀉为宜。

【禁忌】忌食腥辣。

六合定中丸

一、北 京

【功能与主治】祛暑散寒，健胃止瀉。主中暑感寒，吐瀉腹痛。

【处方】藿香 紫苏叶 香薷 扁豆各八兩 小香 檀香各十八兩 茯苓 枳壳 桔梗 木瓜 橘皮 山楂(炒) 厚朴 甘草各二十四兩 麦芽(炒) 谷芽(炒) 六神麴(炒)各九十六兩

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，重三錢，硃砂为衣。

【剂量及用法】每服二丸，日服二次，溫开水或姜湯送下。

【禁忌】忌食生冷油膩之物，孕妇忌服。

二、天 津

【功能与主治】除湿去暑，和胃止瀉。主中暑感寒，發熱發冷，头疼脹滿，嘔吐惡心，腹痛瀉肚，四肢痠懶。

【处方】檀香 广木香各一斤二兩 藿香 扁豆(去皮炒) 苏叶 香薷各八兩 木瓜 甘草 桔梗 焦山楂 广皮 厚朴(姜制) 茯苓(去皮) 枳壳(麸炒)各一斤八兩 炒麦芽 炒谷芽 神曲(麸炒)各六斤

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，三錢重，每斤丸药用硃砂面一錢上药，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，白开水送下。

三、上 海

【功能与主治】治夏秋畏冷，头痛發熱，胸悶噁心，腸胃不舒。

【处方】厚朴(制) 枳壳(炒) 赤茯苓 木瓜 甘草各六兩 檀香 木香各四兩五錢 香薷 紫苏 藿香各二兩

【制法】共研細粉，水泛为丸，潮重一錢五分。

【剂量及用法】每服一丸，溫开水送服。

【禁忌】孕妇忌服。

四、武 汉

【功能与主治】主中暑吐瀉，胸滿惡心，水土不服，头痛腹痛等症。

【处方】同天津。

【制法】取上药进行干燥，混合碾細，用淨水达成小丸，每錢不得少于三十粒。

【剂量及用法】每服三錢，小兒減半。

五、南昌、重庆

【功能与主治】主暑月畏冷，瘧疾霍乱，胸悶干嘔，头痛腹痛，或吐或瀉，寒熱如瘧，及小兒發熱抽搐，吐乳惊悸及其他腸胃不合等症。

【处方】同天津。(重庆分量为其一半，缺枳壳。)

【制法】研末，水泛为丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每服一錢，日服二次，溫开水送下；小兒根据年齡及病情酌減服。

【禁忌】忌食生冷油膩之物。

六、西 安

【功能与主治】主治急性、亞急性胃腸炎，吐瀉瘧疾，胸悶噁心，头疼腹痛。

【处方】同天津。

【制法】蜜制为丸。

【剂量及用法】每服一錢，開水送下。

七、大同(定中丸)

【功能与主治】夏令中暑，霍乱嘔吐，腹痛吐瀉。

【处方】藿香 木瓜 法夏 杏仁 厚朴各一兩 扁豆二兩 白朮 赤芍各一兩半 粉草 砂仁 香薷 葛梗 苏叶各二錢 广木香 檀香各二錢 党参一兩 丁香二錢

【制法】共为細面，煉蜜为丸，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服三錢，姜湯送下。

八、禹 县

【功能与主治】主暑月畏冷，伤食胸滿，霍乱吐瀉，紅白痢疾，四时伤寒，头疼身热。

【处方】藿香 苏叶 香薷各八兩 白檀香 广木香各一斤二兩 赤茯苓 川枳壳 宣木瓜 川厚朴 甘草各一斤八兩

【制法】共为細面，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服一丸，白开

水送下，小兒每服半丸。

【禁忌】熱症忌用。

【備考】有效期一年。

九、濟 南

【功能與主治】治中暑吐瀉，胸滿惡心，水土不服，頭痛腹痛等症。

【處方】紫蘇葉 香薷 藿香葉 各四兩 老檀香 廣木香 甘草 柴胡 赤茯苓 宣木瓜 羌活各二兩 枳殼（數炒）二兩五錢 厚朴（姜汁炒）一兩五錢

【制法】共為細末，煉蜜為丸，每丸重二錢。硃砂六錢為衣。

【劑量及用法】每服一丸，小兒酌減，姜湯，薄荷湯或開水送下。

【禁忌】忌食油膩、辛辣之物。

十、青 島

【處方】香薷十斤二兩 藿香 蘇葉各十斤六兩 厚朴六斤 檀香 木香 丁香 甘草 木通各四斤 赤苓八兩 枳殼十斤 木瓜各十斤

【制法】共軋細面，煉蜜為丸，重三錢。

十一、沈 陽

【功能與主治】健胃腸，止吐瀉。主山嵐瘴氣，頭痛發熱，惡寒嘔吐，泄瀉霍亂，傷暑瘧痢。

【處方】厚朴二分 藿香 赤茯苓 砂仁各六分 人參 半夏 杏仁 木瓜各一錢 扁豆 白朮 制甘草各二錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，姜湯送下。

【禁忌】忌食生冷。

十二、撫 順

【功能與主治】調整胃腸。主治傷食吐利，消化不良，嘔吐瀉泄，四肢逆冷，暑天感冒，頭疼身痛，發熱惡寒，以及水土不服腹痛脹滿等症。

【處方】廣砂仁 杏仁 炙草 川朴 香薷 扁豆各一兩 黨參 赤茯苓各二兩 木通 澤瀉 木瓜各一兩半 藿香四兩 半夏 車前子 陳皮各一兩 白朮二兩 蘇葉二兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，鮮姜

水送下。

【禁忌】孕婦忌服；忌食油膩瓜果生冷之物。

十三、吉林(六合丸)

【功能與主治】調和中氣，和解發表，化濁氣，解毒熱，寬中上嘔，消食利脾。主傷食，中暑，霍亂，嵐瘴，水土不服。

【處方】藿香 紫蘇 香薷各二兩六錢七分 枳殼 厚朴各一兩六錢七分 木香 木瓜 赤苓各一兩一錢四分 柴胡 一兩 羌活 檀香 甘草各六錢七分

【制法】共為細面，用絹羅篩過，煉蜜為丸，每粒二錢一分重，蜡紙包。

【劑量及服法】四歲至七歲者，每服半丸；一歲至四歲，一丸分二次服；七歲至十二歲，每服一丸；大人重症服二丸，輕症服一丸。鮮姜水為引。

十四、哈爾濱(定中丸)

【功能與主治】和中解表，化濁解毒。主傷食，食積傷脾，脘腹脹痛，泛嘔糟粕，噯氣納少。中暑，暑天感涼，發熱畏冷，頭痛體痛，泛嘔干嘔。霍亂，濕濁內蘊，感冒寒涼，四肢逆冷，嘔吐泄瀉。山嵐瘴氣，穢濁氣，卒然中人，昏厥仆倒。水土不服，離鄉行旅，水土不服，消瘦納少，吞酸泄瀉。

【處方】同天津。分量為其十分之一。

【制法】共碾細面，煉蜜為二錢一分重丸。瓷罐貯貯。

【劑量及用法】每服一丸，日二、三次，鮮姜湯為引。

【禁忌】孕婦忌服；忌食油膩之物。

十五、承 德

【功能與主治】主中暑吐瀉，胸滿惡心，水土不服，頭痛腹痛等症。

【處方】同天津。

【制法】共為細粉，水泛小丸（蜜丸二錢重），滑石為衣闌亮，每兩分作二百粒。

【劑量及用法】每服二丸（二十粒），日服一次，溫開水送下。

【禁忌】忌食生冷油膩之物。

十六、呼和浩特

【處方】蘇葉 藿香葉 香薷 枳殼 木瓜 赤苓 檀香 厚朴各六斤 甘草 木香 扁豆各一斤半 丁香六兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重，硃砂衣。

【備考】加料每斤再兌：檀香 丁香各三錢 冰片二錢，蜜丸重三錢，硃砂衣，蜡皮。

六 和 丸

福 州

【功能與主治】調和六氣。

【處方】藿香一兩半 川朴一兩 杏仁一兩半 砂仁五錢 半夏二兩 木瓜一兩半 赤苓二兩 白朮一兩半 人參一兩 扁豆二兩 甘草五錢

【制法】共研細末，加姜棗湯泛丸。

古方手拈丸

呼 和 浩 特

【處方】干姜 枳實 枳殼 青皮 烏藥 蘇葉 元胡 白朮 陳皮 厚朴 茯苓 香附 吳萸 藿香 草薢 官桂各等分

【制法】共為細面，姜汁水泛小丸。

甘露消毒丸

(普濟解毒丸)

南 昌

【功能與主治】主治氣分暑濕，發熱倦怠，胸悶腹脹，肢痠咽腫，斑疹身黃，頤腫口渴，溺赤便閉，吐瀉瘧痢，淋濁瘡瘍。

【處方】連翹 藿香各四兩 川貝母 木通各五兩 石菖蒲六兩 西茵陳十一兩 黃芩十兩 飛滑石十五兩 薄荷 射干 白豆蔻各四兩

【制法】干燥生研為末，用六神柚六兩煎水泛丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服三錢，溫開水送下，或布包煎每日二次。

【禁忌】忌食辛辣、烟、酒等物。

冰霜梅苏丸

一、蘭州(梅苏丸)

【功能与主治】清解暑天風热上升,清头目昏暈,口干舌燥。主中暑風热,头昏目眩,口干舌燥。

【处方】薄荷十二兩 苏叶四兩 烏梅半斤 粉草一兩 白糖三十斤

【制法】薄荷、苏叶、粉甘草共为細木,烏梅打碎熬水,白糖晒干篩細木,並將薄荷叶等药木加入,用烏梅水打为丸如小豆大。

【剂量与用法】每服三、五丸,小兒酌減,嚥在口內。

【禁忌】諸寒湿症忌服。

二、大同

【功能与主治】清热祛暑。

【处方】烏梅 苏叶各五兩 天花粉 葛根各二兩 薄荷八兩 柿霜四兩

【制法】共为細面,再加冰糖二斤、白糖二斤为丸。

【剂量及用法】每服二至三錢,开水送下。

三、青島

【处方】苏叶一兩 甘葛二兩 薄荷四兩 烏梅肉八兩 芸香五分 白糖十斤

【制法】共碾細面,水泛成丸,如芡实大。

四、沈陽

【功能与主治】生津止渴,清热消暑。主三焦积热,口燥咽干,津液短少,飲酒过度,头昏目眩。

【处方】烏梅肉五兩 新柿霜四兩 桂元二兩 薄荷叶六兩 紫苏叶一兩 白糖十斤

【制法】共碾極細面,以冰糖津为母,用白开水泛为小丸,五分重。

【剂量及用法】口內嚥化,随意服用。

五、撫順

【处方】薄荷叶 苏叶 粉葛各一兩 梅肉六兩 檀香五錢 白糖十斤 山楂六兩

【制法】共为細面,水泛为丸。

六、哈尔滨(梅苏丸)

【功能与主治】清热止渴,生津解煩。主暑症。

【处方】薄荷叶 紫苏叶各四兩 冰糖 烏梅肉 上白糖各六兩 柿霜 苏叶 麦門冬各四兩

【制法】共碾为細面,將二糖烱化,同烏梅肉搗杵为丸,如芡实大。瓷罐貯貯。

【剂量及用法】每服数丸,細嚼淡姜湯送下。

七、呼和浩特

【处方】花粉 葛根 苏叶各一兩 柿霜 薄荷 山楂各二兩 烏梅肉五兩

【制法】共为細面,冰糖渣起母子,袋比药面,如黄豆大,再包白糖打如扭扣。

純陽正氣丸

一、北京

【功能与主治】祛暑散寒,定痛止吐瀉。主中暑受寒,吐瀉腹痛。

【处方】藿香 橘皮 蒼朮 半夏 公丁香 冬朮 青木香 官桂 茯苓各一兩

【制法】共为細粉,花椒五錢煎湯泛小丸,紅灵丹四錢为衣。

【剂量及用法】每服一錢,日服二次,温开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

二、天津

【功能与主治】祛暑散寒,定痛止吐瀉。主受暑受寒,上吐下瀉,肚腹疼痛,手足厥冷,憎寒發热,湿郁腹痛。

【处方】青木香 藿香 广皮 公丁香 制半夏 炒蒼朮 白朮(數炒) 肉桂(去粗皮) 茯苓(去皮)各一兩

【制法】共为細粉,花椒五錢熬水泛小丸,“八”紅灵丹面四錢为衣,一錢重裝瓶。

【剂量及用法】每次服一瓶,白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

三、上海

【功能与主治】头昏胸悶,腸胃

不舒。

【处方】陈皮 生茅朮 官桂 公丁香 藿香 生冬朮 茯苓 姜半夏 青木香各一兩

【制法】共研細粉,花椒五錢煎湯泛丸,如高粱粟子大,紅灵丹四錢为衣。

【剂量及用法】每服一錢,温开水吞服。

【禁忌】孕妇忌服。

四、南京

【功能与主治】主腹痛腹瀉,中滿嘔吐,肢冷痧脹等症。

【处方】同上海。

【制法】生晒共研細木,花椒五錢煎湯泛为小丸,每錢約三百粒,紅灵丹四錢为衣。

【剂量及用法】每服五分,小兒酌減,热水吞服。

【禁忌】孕妇忌服。

五、武汉

【功能与主治】主腹痛中滿,腹鳴便瀉,嘔吐痰水,四肢厥冷。

【处方】同上海。

【制法】取上药进行干燥,混合碾細,用花椒五錢煎水送成小丸,紅灵丹四錢为衣,每錢不得少于一百粒。

【剂量及用法】每次五分,日服一錢至二錢,开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

六、杭州

【功能与主治】治四时不正之气,中暑中惡,陰寒湿濁,霍乱轉筋,絞腸腹痛,胸膈滿悶,嘔吐泄瀉,时行疫癘,山嵐瘴气,水土不服等症,無不应效。

【处方】杜蘅香 紫苏叶 白茯苓 生茅朮 广陈皮 广木香 公丁香 肉桂 姜半夏 生丁朮各一兩 降香五錢

【制法】共研細末,水泛为丸,如粟粒大,八宝紅灵丹一兩为衣。

【剂量及用法】每服五分,重症加倍,开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

七、南昌

【功能与主治】主感觸穢气,腹中絞痛,四肢厥冷,吐瀉轉筋。

【处方】藿香 肉桂 广陈皮 苍朮 姜半夏 公丁香 青木香 茯苓 白朮各一兩 紅灵丹五錢

【制法】研末，用花椒五錢煎汁泛丸如綠豆大，紅灵丹为衣。

【剂量及用法】每服一錢至二錢，日服二次，溫开水送下，小兒視年齡及病情酌減服。

【禁忌】孕妇忌服。

八、沙 市

【功能与主治】治寒湿穢濁，胃腸受伤，上吐下瀉，腹痛轉筋，四肢厥冷等症。

【处方】广藿香三兩 广陈皮 苍朮 白朮 法半夏各二兩 公丁香 桂皮一兩 茯苓三兩 广木香一兩 木瓜二兩

【制法】共研細末，用冷开水泛丸，以硃砂八錢 雄黃四錢 麝香一錢 共研末为衣，密封勿泄气。

【剂量及用法】成人量每次服一錢，溫开水下。小兒老人酌減，病重者每日服二次。

【禁忌】血压过高及水份不足者忌服，孕妇忌服。

九、蘭 州

【功能与主治】散寒止嘔，清理腸胃。主夏日受涼，上吐下瀉，腹中絞痛，胸膈脹滿，手足冰冷。

【处方】木香 藿香 白朮 广皮 半夏 丁香 蒼朮 肉桂 茯苓各一兩

【制法】共为細末，花椒五錢熬水制小丸，紅灵丹面四錢为衣，一錢重一付裝瓶。

【剂量及用法】每次服一付，開水送下。

【禁忌】暑熱者忌服。

十、濟 南

【功能与主治】主暑熱觸穢，腹中絞痛，四肢厥冷，吐瀉轉筋。

【处方】广藿香 陈皮 茅蒼朮 半夏(姜制) 公丁香 官桂 白朮 广木香 茯苓 苏叶各一兩 降香五錢

【制法】共为細面，花椒五錢煎湯泛丸，如芥子大，紅灵丹一兩为衣。

【剂量及用法】成人每服五分，病重者日再服，小兒酌減，白开水送

下。

【禁忌】忌食辛辣油膩等物，孕妇忌服。

十一、沈 陽

【功能与主治】通絡解毒，清瘟安胃。主中暑中寒，霍亂轉筋，絞腸腹痛，胸膈滿悶，山嵐瘴氣，嘔吐瀉痢，水土不服，一切痧症。

【处方】藿香 紫苏 蒼朮 白朮 茯苓 半夏 陈皮 官桂 公丁香 木香各一兩 降香五錢

【制法】共碾極細面，水泛为小丸。

【剂量及用法】每服五分，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

十二、呼 和 浩 特

【处方】茯苓 丁香 苏叶 降香 官桂 法夏 生白朮 广皮 茅朮 藿香 青木香各四兩

【制法】共为極細面，用灯心一兩二錢煎水泛为小丸，如小米大，外面上衣用：麝香二錢 硃砂一兩 青礞石四錢 冰片三錢 明雄黃六錢 象牙屑一兩 赤金五十張 月石六錢。

祛 暑 丸

一、北 京、承 德

【功能与主治】祛暑散寒，止吐止瀉。主暑外感，憎寒發熱，头疼身倦，腹脹吐瀉。

【处方】藿香九十六兩 蒼朮各九十六兩 木瓜五十二兩二錢 檀香二十四兩 茯苓八十二兩 扁豆甘草 紫苏叶各八十兩 香薷 橘皮各六十四兩 荷叶九十六兩 厚朴三十二兩

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，重二錢，硃砂为衣。

【剂量及用法】每服二丸，日服二次，溫开水送下。

【禁忌】忌食生冷厚味。

二、天 津

【功能与主治】清暑去濕，和胃止瀉。主中暑外感，憎寒發熱，头疼身倦，腹脹吐瀉。

【处方】藿香 苏叶各一斤 香薷六兩四錢 木瓜五兩 檀香 公

丁香各二兩四錢 甘草十二兩 茯苓(去皮)一斤九兩

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，三錢重，每斤丸藥用硃砂二錢上衣，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，白开水送下。

【禁忌】有汗者忌服。

三、西 安(金 衣 祛 暑 丸)

【功能与主治】解熱發汗，健胃利尿，鎮吐制瀉。主治暑天貪涼，飲食冰冷，發熱惡寒，頭痛無汗，煩悶，精神困倦，急性腸胃炎，嘔吐下利，腹痛等病症。

【处方】藿香一兩 云苓一兩五錢 丁香一錢五分 甘草二錢 木瓜 苏叶各二錢五分 薏仁 硃砂 香薷 檀香各五錢

【制法】共研細粉，煉蜜成丸，每丸重一錢，硃砂与金箔为衣。

【剂量及用法】大人一次服一、二丸，日二、三次，小兒減半，開水或姜湯服下。

【禁忌】中暑，面赤心煩，卒然昏倒，心臟衰弱，大汗淋漓之病症最忌服用。

四、濟 南、青 島

(金 衣 祛 暑 丸)

【功能与主治】主中暑中濕，头痛寒熱，惡心嘔吐，腹脹泄瀉。

【处方】藿香十斤 苏叶十斤 木瓜三斤八兩二錢 茯苓十五斤三兩二錢 檀香 丁香各一斤八兩二錢 香薷四斤 甘草七斤二兩二錢

【制法】共研細面，煉老蜜为丸，重二錢，硃砂衣，金衣二十四開，硃砂衣每斤三錢。

【剂量及用法】每次一丸或二丸，姜水送下。

【禁忌】忌生冷食物。

五、呼 和 浩 特(1)

(金 衣 祛 暑 丸)

【处方】藿香五兩 官木瓜七兩五錢 苏叶四兩 丁香九錢五分 香薷二兩五錢 茯苓七兩五錢五分 松香九兩五錢 粉草三兩二錢

【制法】共为細面，蜜大丸一錢五分，硃衣，丁果金紙包。

六、呼和浩特(2)

(加料祛暑丸)

【处方】上方加：紫厚朴二兩
沉香四錢 薄荷冰 冰片各二錢

【制法】共為細面，大丸重二錢，
硃砂、金衣，蜡皮封固。

肩鵲玉壺丸

杭 州

【功能與主治】治陽氣暴絕，陰
寒惡疾，寒氣厥脹，霍亂吐瀉以及小
兒慢驚之症。

【处方】西硫黃(研末) 麻油各
五斤

【制法】將硫黃打碎，入冷油內，
微火熬熱，用桑枝緩緩攪動，候硫黃
融盡，即傾入水缸內，急撇去上面浮
油，取缸底淨硫黃，稱見若干份量，
再用麻油若干兩，照前火候，再融再
傾，連前共制三次。照前法取淨硫
黃若干兩，用棉花子油若干兩，用前
火候，再融再傾入水缸內，急撇去上
面浮油，取淨硫黃，用肥皂四十兩，
加水同煮六小時。仍取硫黃，用皂
英四十兩，放水中同煮六小時。拔
淨油氣，再取硫黃，用爐灰淋碱水煮
六小時。取硫黃用豆腐加水煮六小
時，拔淨皂碱之氣性，取硫黃用田字
草搗汁和水煮六小時。取硫黃晒
干，研細如香灰，量加糯米糊為丸，
用布袋打光。

【劑量及用法】每服一錢，漸加
至三錢，開水送下。

五 苓 丸

一、上 海

【功能與主治】通利小溲。

【处方】澤瀉五兩 豬苓(去皮)
茯苓 白朮(炒)各三兩 桂枝二兩

【制法】共研細粉，水泛為丸，如
綠豆大。

【劑量及用法】每服三錢，溫開
水送服。

二、南 京

(附：五苓散)

【功能與主治】主水飲內停，小
便不利，煩渴嘔瀉等症。

【处方】澤瀉二兩 豬苓 茯苓

炒白朮各一兩五錢 官桂一兩

【制法】共研細末，沸水泛丸，每
錢約八十粒。

【劑量及用法】每服二至三錢，
開水吞服。

【備考】五苓散即上藥研粉，用
量同上，煎服或調服。

三、武 漢

【功能與主治】煩渴，小便不利，
暑令腹脹便瀉。

【处方】豬苓 白朮(土炒) 茯
苓各二兩 肉桂二兩 澤瀉五兩

【制法】取上藥進行干燥，混合
碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少
于三十粒。

【劑量及用法】每服三錢，溫開
水送下。

胃 苓 丸

一、北 京

【功能與主治】止嘔止瀉，消脹
利水。主嘔吐泄瀉，胸滿腹脹，小便
短少。

【处方】蒼朮 厚朴 橘皮 白
朮 茯苓各一錢五分 澤瀉一錢

豬苓一錢 甘草六分 肉桂五分

【制法】共為細粉，水泛小丸。

【劑量及用法】每服二錢，日服
二次，溫開水送下。

【禁忌】忌食生冷，孕婦忌服。

二、西 安

【功能與主治】主消化不良，泄
瀉，小便不利。

【处方】蒼朮 白朮 茯苓 厚
朴 廣皮各一兩五 肉桂五錢 澤
瀉 豬苓各一兩 甘草六錢

【制法】蜜制為丸。

【劑量及用法】每服三錢，開水
送下。

三、大 同

【功能與主治】主脾胃不和，嘔
吐痰水，胸膈痞悶。

【处方】蒼朮三兩 陳皮一兩五
錢 川朴五兩 生草二兩 茯苓一
兩五錢 澤瀉二兩 白朮一兩 豬
苓三兩 肉桂三錢

【制法】共研細面，水泛為丸。

【劑量及用法】早晚每服三錢，
開水送下。

四、濟 南

【功能與主治】主腹脹水瀉，小
便不利。

【处方】蒼朮(米泔浸炒) 陳皮
厚朴(姜汁炒) 豬苓 澤瀉各一
兩 白朮(土炒) 白茯苓各二兩
肉桂 炙甘草各五錢

【制法】共為細末，水泛為丸，綠
豆大。

【劑量及用法】每服二錢，日二
服，白開水送下。

【禁忌】忌食辛辣油膩生冷等
物；孕婦忌服。

四 順 丸

武 漢

【功能與主治】主霍亂吐痢，心
腹作痛，手足逆冷，脈微欲絕。

【处方】烏附子 黨參 炙甘草
各一兩 干姜三兩

【制法】上藥干燥，混合碾細，照
淨粉量加煉蜜50—54%，送成小丸，
每錢不得少于二十五粒。

【劑量及用法】每服二錢。

急 救 丸

一、沈 陽

【功能與主治】解熱鎮痛。主夏
日中暑，頭痛身熱，惡寒發熱，上吐
下瀉，四肢厥冷，腹中絞痛，遍身抽
搐。

【处方】人中黃三兩 天竺黃二
兩 麝香一錢 白殭蠶 防風 全
蝎 荆芥各一兩

【制法】共碾極細面，水泛小丸，
硃砂為衣。

【劑量及用法】每服五分，小兒
減半，姜湯送下。

【禁忌】忌食生冷油膩之物；孕
婦忌服。

【備考】又方：人中黃改用甘草
一兩。

二、撫 順 (1)

【功能與主治】整腸消炎，消暑
鎮痙。主時令不正，中暑中風，吐
瀉，轉筋抽搐，心腹攪痛，瘟疫發斑，
小兒痘疹，紅白痢疾，驚風等症。

【处方】全蠍 防風 荆芥各一
兩 殭虫 竺黃各二兩 麝香一錢

甘草五錢

【制法】共為細面，水法小丸，硃砂衣。

【劑量及用法】大人每服七分，小兒一服五服，用姜水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、撫順(2)

(雀亂急救丸)

【處方】人中黃 僵虫 竹黃各二兩 全虫 防風 荆芥各一兩 台麝一錢

【制法】為細面，水泛小丸，硃砂衣。

時症丸

一、大同

【功能與主治】頭暈目眩，吐瀉霍亂，中暑中熱。

【處方】蒼朮三兩 丁香六錢 大黃六兩 蟾酥九錢 麝香一錢五分 粉草二兩四錢 明雄黃 麻黃 硃砂 天麻各一兩六錢

【制法】共研細面，水泛丸如黃米大，硃砂為衣。

【劑量及用法】每服十二粒。

【禁忌】孕婦忌服。

二、沈陽

【功能與主治】興奮神經，清熱解毒。主山嵐瘴氣，中暑中惡，絞腸痧症，腹痛厥冷，惡心嘔吐，吐瀉不出，不省人事，口噤目瞪及毒虫咬傷。

【處方】茅朮三錢 杏仁三兩 公丁香 九節菖蒲 千金霜各六錢 麝香 梅片 馬牙硝 沉香各一錢 蟾酥 玉令 山茨菇 胆星 天竺黃 五倍子各一兩 青礬石(醋煅七次) 礬砂各二兩 野大黃六兩 明天麻 明雄黃各三兩四錢 牛黃一錢五分 紅茅大戟五錢

【制法】除麝香、牛黃、梅片、雄黃另研外，余則共碾細面，再用白薇 桑皮各一兩五錢 明礬二兩煎濃汁和白酒為丸，榮子大。

【劑量及用法】每服七丸，不見效者可加一倍，用白開水送下。如有蚊虫咬傷，白水調敷患處有效。

【禁忌】忌食油膩生冷之物；孕婦忌服。

三、撫順

【處方】茅朮一兩半 丁香三錢 大黃二兩 麻黃一兩半 粉草一兩 天麻 雄黃 硃砂各一兩八錢 台麝一錢半 蟾酥四錢半

【制法】水泛小丸，硃砂衣。

時疫丸(阿伽陀藥)

沈陽

【功能與主治】清瘟解毒，健胃止嘔。主感染時疫，嘔吐黃水，霍亂吐瀉，臍腹絞痛，頭痛惡心，驚恐健忘，產後血瘀。

【處方】紫檀(用蘇木亦可) 小檗(一名山石榴) 茜草 郁金 胡椒各五兩

【制法】共碾極細面，水泛為小丸。

【劑量及用法】每服一錢，白開水送下。

附參考古方

【來源】千金翼方。

【功能與主治】主諸種病及將息服法，久服益人神色，無諸病。

【處方】紫檀 小檗 茜根 郁金 胡椒各五兩

【制法】上五味，搗篩為末，水和內臼中，更搗一萬杵，丸如小麥大，陰干。

【劑量及用法】用時以水磨而用之。

四 症 丸

呼和浩特

【處方】清瘟解毒丸面 藿香正氣丸面各四兩 再兌：檀香一兩 冰片一錢

【制法】硃砂衣，蜜丸，重二錢，半金衣，蜡皮封固。

四 正 丸

北京、承德

【功能與主治】解熱祛暑止瀉。主夏令受暑感冒，憎寒發熱，嘔吐腹脹泄瀉。

【處方】藿香 人腹皮 茯苓 半夏 橘皮 厚朴 桔梗 香薷 甘

草 白朮 白芷 紫蘇葉 枳殼 木瓜 扁豆 六神麴各二兩 山查 麦芽 檳榔 檀香各一兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重二錢，硃砂為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服二丸，白開水或生姜湯送下。

【禁忌】孕婦忌服。

萬應時症丸

青島

【處方】藿香八錢 川朴 廣皮各二錢 茅朮四錢 半夏 赤苓 扁豆各八錢 香薷 砂仁 澤瀉 沉香 於朮 蘇葉 木瓜各六錢 檀香四錢 益元散八錢

【制法】共為細末，水泛為丸。

備 急 丸

沈陽

【功能與主治】解毒鎮痛。主各種痧症，心腹暴痛，憎寒壯熱，斑痧內悶，溫毒瘡瘍，毒氣內侵等症。

【處方】茅朮一兩 母丁香五錢 雄黃三錢 硃砂五錢 蟾酥一錢

【制法】除硃砂雄黃另研外，余共碾極細面，將蟾酥用酒化開，泛成小丸。

【劑量及用法】每服一粒置舌尖上，藥化痛止。重則服二粒。

【禁忌】忌食辣物。

附參考古方

【來源】惠直堂經驗方(珍本醫書集成)。

【功能與主治】治痧肚痛。

【處方】真茅朮(去皮尖) 母丁香 雄黃 硃砂各淨末六分 蟾酥六分

【制法】將蟾酥火酒化開，共研成丸，如芥子大。

【劑量及用法】每用一粒，置舌尖上，藥化痛止，重者二服。

痧藥丸(痧氣丸)

一、北京(痧藥)

【功能與主治】祛暑辟穢，開胃解毒。主夏令中暑，腹痛吐瀉，牙關緊閉，四肢逆冷。

【處方】天麻 麻黃各三兩六錢

甘草四两四錢 蒼朮三兩 大黃
公丁香各六錢 共為細粉 兌入：
麝香三錢 蟾酥九錢(燒酒化) 雄
黃一兩六錢 朱砂三兩六錢(上衣
用)

【制法】上藥和勻，用方內蟾酥
燒酒化水泛小丸，用方內朱砂為衣，
闔亮。

【劑量及用法】每服十粒，溫開
水送下。外用研細吹鼻取嚏。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天津

【功能與主治】去暑避穢，開竅
解毒。主夏令受暑，霍亂轉筋，牙關
緊閉，昏迷不醒，郁悶煩亂，四肢冰
涼，嘔吐惡心，絞腸痧症，蝎蟻虫
咬。

【處方】大黃三斤十二兩 甘草
二斤十二兩 天麻 麻黃各二斤四
兩 炒蒼朮一斤十四兩 公丁香六
兩 共為細粉 兌入：雄黃面 朱
砂各二斤四兩 蟾酥面九兩 麝
香一兩

【制法】以上研細和勻，涼開水
泛小丸(每一錢約一百五十粒)。每
片丸藥用朱砂面二兩上衣，闔亮，一
錢重裝瓶。

【劑量及用法】每次服七粒，白
開水送下。外用用水化開塗患處。

【禁忌】孕婦忌服。

三、

處方刪

四、南京(1)(蟾酥痧藥 丸、塘栖痧藥丸)

【功能與主治】主夏令發痧，心
煩意亂，肢麻，脹痛，嘔吐，泄瀉等
症。

【處方】西大黃六兩 炒甘草四
兩四錢 去節麻黃三兩六錢 飛朱
砂三兩六錢(為衣) 飛腰黃三兩六
錢 明天麻三兩六錢 茅蒼朮三兩
(米泔水浸) 蟾酥九錢(另用酒化
升) 公丁香六錢 麝香三錢

【制法】上藥生晒，各研細末，各
取淨粉，將麝香乳細，和勻，用高粱

酒泛為小丸，每分約二十粒，朱砂為
衣。放于烈日之下曬燥，趁熱裝蜡
袋中，打光至亮為度。

【劑量及用法】每服一分至二
分，小兒酌減，開水吞服。

【禁忌】孕婦忌服。

五、南京(2)

(冰麝痧藥丸)

【功能與主治】主受寒受暑，痧
脹，肚痛，吐瀉，卒倒昏迷等症。

【處方】冰片六兩 麝香三兩二
錢 蟾酥七兩五錢(另用酒化開研
細) 公丁香八兩 飛朱砂四兩(留
一半為衣) 明雄黃 煨西月石各二
兩

【制法】各取淨粉，和勻乳至極
細，用高粱酒泛為小丸，每分約計二
十粒，朱砂為衣。

【劑量及用法】每服七粒至十四
粒，涼開水吞服。

【禁忌】孕婦忌服。

六、武漢(犀黃痧氣丸)

【功能與主治】中暑昏厥，嘔吐
泄瀉，腹中絞痛，胸滿腹脹。

【處方】西大黃四兩 粉甘草六
錢 麻黃一兩 天麻一兩 毛慈姑
一兩 雄黃二兩 朱砂二兩 茅朮
二兩 麝香三錢 犀牛角一錢 蟾
酥三錢 丁香六錢

【制法】取上藥(除蟾酥外)進行
干燥，混合碾細，將蟾酥用燒酒發成
漿狀，用淨水送成小丸，每分不得少
于六十粒。

【劑量及用法】每服二分至五
分，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

七、廣州

【功能與主治】胃腸積滯，四時
感冒，痾嘔肚痛。

【處方】大黃一百八十兩 大黃
二百兩 蒼朮一百五十兩 丁香六
十兩 甘草一百八十兩 麻黃一百
八十兩 麝香五錢 杜蟾酥六兩
雄黃十四兩 朱砂二十八兩

【制法】各藥配合磨成粉末，以
水送成小丸，每瓶重二分。

暑 濕 類

【劑量及用法】開水送服，輕症
半瓶，重症一瓶，小兒減半。

八、福州(救急痧氣丸)

【功能與主治】絞腸腹痛，霍亂，
抽筋口閉，不省人事，又治山嵐瘴
氣，小兒急慢驚風，以及吐瀉，四肢
厥冷等症。

【處方】茅山朮三兩 公丁香六
錢 粉甘草二兩四錢 錦紋黃六兩
麝香一錢半 雄黃精三兩六錢 明
天麻三兩六錢 淨麻黃三兩六錢
蟾酥二兩 正朱砂三兩六錢 北細
辛二錢 牙皂角五錢

【制法】共磨細末，用陰明水泛
為小丸。

九、南昌(痧丸)

【功能與主治】中暑昏厥，嘔吐
泄瀉，腹中絞痛，胸滿腹脹。

【處方】北細辛八兩 蔓荊子十
二兩 蒼朮十二兩 牙皂六兩 麻
黃四兩 開陽花五錢 麝香四錢
明硃四兩 公丁香二兩 天麻四兩
明雄黃二兩 蟾酥六兩四錢 正梅
片二兩

【制法】前十味先研細末，水泛
為丸，后入麝香、蟾酥、梅片調高粱
酒，朱砂為衣，如芥子大。

【劑量及用法】每服一分至三
分，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

十、杭州(蟾酥痧氣丸)

【功能與主治】治夏暑貪涼飲
冷，食物不慎或觸移惡之氣，致成霍
亂痧脹，吐瀉轉筋，絞腸腹痛，山嵐
瘴毒，頭昏目眩等症，救急安危，功
效殊宏。

【處方】茅蒼朮(去皮)三兩 生
甘草(去皮)二兩四錢 大黃六兩
麝香三錢 麻黃(去節)三兩六錢
飛辰砂三兩六錢 飛腰黃三兩六錢
公丁香六錢 明天麻三兩六錢 杜
蟾酥九錢

【制法】上藥各取淨粉，燒酒泛
丸，辰砂為衣，磁碗撞打亮光。

【劑量及用法】每服七丸。重則
再服，甚則三服，涼開水送下。

【禁忌】孕婦忌之。

十一、重 庆

【功能与主治】治腹痛，肚瀉，假性霍乱，外感身热，山嵐瘴气，水土不合，急痧等症。

【处方】細辛一兩 公丁香三兩 大黃二兩 羌活一兩 广木香二兩 天麻三兩 蟾酥五錢 梅片二錢 五分 麝香四分 雄黃二兩 硃砂二兩

【制法】除蟾酥、麝香、梅片另研，雄黃、硃砂穿衣外，余药共研細末，水泛为丸。

【剂量及用法】每服十粒，小孩減半，白开水下。

【禁忌】孕妇忌服。

十二、昆 明

【功能与主治】时疫嘔吐，水土不服。

【处方】蒼朮三兩 麝香二錢 大黃二兩 蟾酥五錢 天麻三兩六錢 麻黃一兩六錢 丁香六錢 明雄一兩六錢 硃砂三兩六錢 牙皂二兩 細辛一兩

【制法】水磨硃衣小丸。

【剂量及用法】每服十余粒，用开水服。

【禁忌】非时令症不宜服，孕妇忌服。

十三、西安(痧药)

【功能与主治】主治夏季类似霍乱，或吐或瀉，头痛眼黑，肚腹脹痛如絞，手足逆冷，牙关紧闭等症。

【处方】茅蒼朮四兩 大黃四兩 天麻四兩 麻黃四兩 母丁香三兩 蟾酥一兩 明雄黃一兩 梅片一錢 麝香三錢 硃砂一兩 粉草四兩

【制法】分別搗研細末，合併，研細，江米汁泛如小米大，用玻璃瓶固封，或用玻璃紙作內袋，外用封袋，每袋五十至一百粒。

【剂量及用法】先將此药五至十丸研末，吹入鼻內，取嚏再放入肚臍眼上，用手揉擦，另用三十九姜湯冲服，小兒按年齡遞減。二小时服一次，酌病情減量服之。

【禁忌】孕妇不宜內服。

十四、蘭 州

【功能与主治】去寒散風，避瘟解毒，为夏季救急藥品。主夏季中暑，头昏眼黑，腹中絞疼，嘔吐惡心，

心口閉悶，不省人事，霍乱吐瀉，及小兒急热惊風，牙关閉紧。外科瘡疽、疔毒，毒虫咬伤等症。

【处方】大黃六兩 麻黃卅六兩 雄黃卅六兩 蒼朮卅六兩 丁香六兩 硃砂卅六兩 蟾酥九兩 麝香三兩 粉甘草四十四兩

【制法】水法制成小丸，硃砂为衣。

【剂量与用法】大人每服七粒，白开水送下，小兒酌減。亦可用水化开塗患處。

【禁忌】孕妇忌服。

十五、大同(苏痧药)

【功能与主治】头晕目眩，瘟疫流行，肚痛吐瀉。

【处方】硃砂一兩 明雄黃一兩 零陵香五錢 麻黃一兩半 公丁香一錢 茅蒼朮一兩半 細辛二錢 猪牙皂五錢 藿香二錢 冰片一錢 薄荷一錢 蟾酥一錢一分 麝香少許

【制法】共为細面，水泛丸(高粱米粒大小)硃砂为衣。

【剂量及用法】每服七粒至十五粒。

十六、禹县(痧气丹)

【功能与主治】暑夏食凉，飲冷食物，痧气腹疼，上吐下瀉。

【处方】蟾酥一兩八錢 天麻雄黃 硃砂 麻黃各一兩六錢 甘草四兩四錢 毛蒼朮二兩 麝香三錢 大黃六兩 丁香六錢

【制法】共为細面，水丸，如菜菔子大，硃砂为衣。

【剂量及用法】每服十五丸，納舌下陰阳水送下。

【禁忌】孕妇忌用，热症忌用。

【备考】有效期二年。

十七、濟 南

【功能与主治】中暑昏厥，嘔吐泄瀉，腹中絞痛，胸滿腹脹。

【处方】蟾酥九錢(酒制) 天麻二兩六錢 雄黃二兩六錢 麻黃三兩六錢 甘草二兩四錢 蒼朮三兩 麝香三錢 大黃六兩 丁香六錢

【制法】各取淨粉，兌合調勻，水泛为丸，如綠豆大，硃砂一兩五錢为衣，開亮。

【剂量及用法】成人每服七丸，

病重酌加，小兒酌減，納舌下少頃，白开水送下。

【禁忌】忌辛辣、油膩等食物；孕妇忌服。

十八、青島(灵应痧药)

【处方】茅蒼朮一十二兩 天麻二十五兩 丁香四兩二錢 麻黃二十七兩 川軍四十二兩 甘草二十四兩 蟾酥七兩 雄黃二十四兩 麝香二兩 冰片二兩

【制法】共軋細面，水發蟾酥为丸，衣用硃砂。

十九、沈陽(痧气灵丹)

【功能与主治】解毒，清瘟，避穢。主痧症霍乱，吐瀉轉筋，四肢厥逆，腹中絞痛，水土不服，流行瘟疫。

【处方】蟾酥九錢 天麻四兩四錢 雄黃二兩六錢 硃砂四兩四錢 麻黃三兩六錢 甘草四兩四錢 茅蒼朮三兩 麝香三錢 大黃六兩 丁香六錢

【制法】共碾極細面，(1)以糯米粥漿为丸，(2)以蟾酥打丸，(3)以高粱米酒化蟾酥泛为小丸，硃砂为衣。

【剂量及用法】每服十五丸，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

二十、撫順(痧气灵丹)

【功能与主治】芳香化濁，辛涼清解，殺菌。主風寒暑濕，汚穢濁气，或停飲食，或因傳染卒發痧症，大寒大热，头昏眩脹，欲吐不吐，欲瀉不瀉，悶气攪鬧，上吐下瀉，四肢厥冷，指甲青黑，手足麻痺，危難重病。

【处方】茅朮三兩 母丁香六錢 天麻二兩六錢 甘草二兩四錢 麻黃三兩六錢 雄黃二兩六錢 大黃六兩 硃砂三兩六錢 蟾酥九錢 麝香一錢

【制法】共为細面，水泛小丸，硃砂衣。

【剂量及用法】大人每服三分，小兒酌量用之。白水送下，研碎吹鼻用之亦可。

【禁忌】忌食腥冷；孕妇勿服。

二十一、吉林、哈尔滨(痧气灵丹、痧药蟾酥丸)

【功能与主治】芳香化濁，辛涼清解。主痧症。

【处方】蟾酥(燒酒化)九錢 天麻(焙干)二兩六錢 雄黃(水飛)三兩六錢 硃砂(水飛)三兩六錢 麻黃(去節焙)二兩六錢 甘草(去皮微炒)四兩四錢 茅朮(米泔浸焙干)二兩 麝香三錢 大黃六兩 丁香六錢

【制法】麝香、硃砂、雄黃均各另研，蟾酥酒化，余均研為細面，陸續一處調勻，以糯米粥漿和杵為小丸，如茱萸子大。辰砂為衣，圓亮。包裝，瓷罈存貯。

【劑量及用法】每服七丸，納舌下，若研細吹鼻孔亦可救急。小兒酌減。

【禁忌】孕婦忌服；忌食腥冷。

二十二、承德(痧藥)

【功能與主治】中暑昏厥，嘔吐瀉泄，腹中絞痛，胸滿腹脹。

【处方】同吉林。

【制法】除麝香、雄黃另研，對其他羣藥，共為細粉，用燒酒化蟾酥，水泛小丸，硃砂為衣圓亮，每兩分作五百粒。

【劑量及用法】每服五粒，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌食油膩。

二十三、呼和浩特

(痧氣靈丹)

【处方】茅朮一兩五錢 丁香三錢 天麻一兩八錢 麻黃一兩八錢 大黃二兩 甘草一兩二錢 雄黃一兩八錢 蟾酥四錢五 麝香二分 硃砂一兩八錢(上衣) 冰片二錢

【制法】共為細面，水泛小丸，硃砂為亮衣，務干再上衣為要。

二 妙 散

一、福州(丹溪二妙散)

【功能與主治】治濕熱在經，筋骨疼痛。

【处方】黃柏(炒) 蒼朮(去皮炒制)等分

【制法】共為末。

【劑量及用法】搗生薑煎沸湯調服。

【備考】如有氣滯加利氣藥，血虛加補血藥，痛甚加姜汁熱辣服之。

二、沈陽、呼和浩特

【功能與主治】祛濕熱。主脾濕蘊熱，腰膝無力，足重筋痛，小便赤黃，大便滑瀉，婦女陰痛，陰痒，濕熱帶下等症。

【处方】蒼朮 黃柏各等分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二錢，無灰酒調下。

【禁忌】忌食辛辣酒類。

附參考古方

【來源】丹溪心法。

【功能與主治】筋骨疼痛。

【处方】黃柏(炒) 蒼朮(米泔浸炒)

【制法】上二味為末。

【劑量及用法】沸湯，入姜汁調服；二物皆有雄壯之氣，表實氣實者，加酒少許佐之。

【備考】若痰帶熱者，先以舟車丸，或導水丸、神芎丸下伐後，以趁痛散服之。

胃 苓 散

撫 順

【功能與主治】止瀉利便，健胃整腸。主脾濕泄瀉，腹痛口渴，嘔吐水瀉，四肢清冷，煩渴思飲，膀胱濕熱，小便癃閉。

【处方】茅朮 根朴 陳皮 甘草 澤瀉 豬苓 云苓 官桂 白朮各五錢

【制法】共為細面。

【劑量及用法】每服二錢，一日二次，白開水送下。

【禁忌】忌食辛辣；孕婦忌服。

一 苓 散

吉 林

【功能與主治】止瀉利尿，調和腸胃，並在腸中有消炎防腐之效。主脾虛胃弱，食慾不振，消化不良，身熱口渴等疾患。

【处方】滑石五分 粉草錢四分 樞砂七分 茅朮二錢一分 紫朴二錢一分 酒芍二錢五分 廣皮二錢一分 澤瀉二錢一分 豬苓三錢五分 貢朮三錢五分 茯苓三錢五分 貢桂四分

【制法】共碾極細末，用細絹羅

篩二、三次。

【劑量及用法】大人病輕服一錢，重者每服二錢，幼童三歲以上者服七分，週歲以上者服三四分，未滿週歲者服二分，引用白糖水送下或白開水皆可調服。

四 苓 散

一、天 津

【功能與主治】健脾止瀉，利水除濕。主腹脹水瀉，小便不通，煩渴嘔吐，不思飲食。

【处方】豬苓 澤瀉 茯苓(去皮) 白朮(數炒)各二兩

【制法】共為細粉，三錢重裝袋。

【劑量及用法】每次服一袋，白開水送下。

二、南京(附：四苓丸)

【功能與主治】清利濕濁，通小便，止泄瀉。

【处方】白茯苓四兩 豬茯苓四兩 澤瀉四兩 白朮四兩

【制法】上藥共研細末。

【劑量及用法】每服五錢，布包煎服。

【備考】四苓丸即用上藥末以沸水泛丸，每錢約做八十粒，每服三錢，開水吞服。

三、蘭 州

【功能與主治】除濕利小便，止腹瀉。主腹脹腹瀉，水腫，小便不通等症。

【处方】豬苓二兩 澤瀉二兩 茯苓二兩 白朮二兩

【制法】共為細末。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

【禁忌】小便多有寒者禁服。

附參考古方

【來源】溫疫論補注。

【处方】茯苓二錢 澤瀉一錢五分 豬苓一錢五分 陳皮一錢

【劑量及用法】取長流水煎盛。

五 苓 散

一、北 京

【功能與主治】利小便，止水瀉。主小便不利，煩渴作瀉。

【处方】茯苓二錢 豬苓二錢

白朮二錢 澤瀉一兩 官桂五錢

【制法】共為細粉。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌食生冷。

二、天 津

【功能與主治】利小便止瀉。主小便不利，發熱、口渴、腹疼腹脹，水瀉不止。

【處方】澤瀉二兩六錢 豬苓 白朮（數炒）各二兩八錢 肉桂（去粗皮）五錢 茯苓（去皮）二兩六錢

【制法】共為細粉，三錢重裝袋。

【劑量及用法】每次服一袋，白開水送下。

三、福 州

【功能與主治】治暑熱煩躁，霍亂泄瀉，小便不利而渴，淋瀝作痛，下部濕熱。

【處方】白朮 豬苓 茯苓各七錢五分 肉桂五錢 澤瀉一兩二錢五分

【制法】共為細末。

【劑量及用法】每服二錢，白湯調下，一日三次。

四、昆 明

【功能與主治】渴欲飲水，小便不利。

【處方】豬苓八兩 茯苓八兩 白朮八兩 澤瀉十兩 桂枝四兩

【制法】研末。

【劑量及用法】每服二錢半，幼童減半。用開水調服。

【禁忌】小便正常者不宜服。

五、西 安

【功能與主治】主治霍亂吐瀉，停飲消渴，小便不利等症。

【處方】豬苓 白朮 茯苓各九分 澤瀉十三分 桂枝六分

【制法】共為細末。

【劑量及用法】每次一方寸之匙約三錢，白開水送服，一日三次，服後飲暖水。

【禁忌】陰虛火盛之消渴症忌服。

六、蘭 州

【功能與主治】利便止瀉，引火歸元。主小便不利，發熱腹痛，口渴

不欲。

【處方】白朮 豬苓各二兩八錢 澤瀉 茯苓各二兩六錢 肉桂五錢

【制法】共為細末。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

【禁忌】實熱症忌服。

七、沈 陽

【功能與主治】利尿，健胃，止瀉，除濕。主小便不利，泄瀉食少，身體發熱，體倦，頭眩口渴。

【處方】豬苓 澤瀉 白朮 茯苓各一兩八錢 桂枝五錢

【制法】共研極細面。

【劑量及用法】每服一錢至二錢，白開水送下。

【禁忌】忌食生冷硬物。

八、吉 林

【功能與主治】止瀉利尿，和中宮，止嘔吐，生津液，止煩渴。主治脾濕作嘔，腹痛口渴，膀胱濕熱，不得化氣，小便不通，点滴不下，臍腹悶痛，津干，煩躁，口渴，思飲不寧。

【處方】白朮 澤瀉 豬苓 茯苓各一兩 官桂五錢

【制法】共研細末，用絹羅篩二、三次至極細。

【劑量及用法】每服一錢五分，七歲至十歲每服一錢，四歲至六歲每服五分，三歲至滿週者服三分，初生至週歲量小兒強弱酌用之。每日早晚各服一次，白開水送下。

九、哈 爾 濱

【功能與主治】止泄利溲，和中止嘔，生津解渴。主脾濕泄瀉，腹痛口渴，霍亂，溲濁中阻，嘔吐水瀉，四肢清冷，煩渴思飲。膀胱濕熱不得化氣，小便澀閉，点滴不下，臍腹悸動，胃熱津干，煩渴思飲。

【處方】同吉林。制法亦同。

【劑量及用法】每服一錢五分，小兒酌減。

【禁忌】孕婦忌服；忌食辛辣。

附參考古方

【來源】金匱要略方論。

【功能與主治】假令瘦人，臍下有悸，吐涎沫而癰眩，此水也。

【處方】澤瀉一兩一分 豬苓（去皮） 茯苓 白朮各三分 桂二

分（去皮）

【制法】上五味，為末。

【劑量及用法】白飲服方寸匕，日三次，多飲暖水，汗出愈。

藿香正氣散

一、福 州

【功能與主治】治外感風寒，內停飲食，頭痛寒熱，或霍亂泄瀉，痞滿嘔逆及四時不正之氣，瘧疾傷寒等症。

【處方】藿香 紫蘇 桔梗 白芷 腹皮各一錢 陳皮 半夏 茯苓 甘草 白朮 川朴各八分

【制法】共為末。

【劑量及用法】水二鍾，姜三片，棗一枚煎八分，熱服取汁。

二、昆明（藿香散）

【功能與主治】時令感冒，食積嘔吐。

【處方】藿香 蘇叶 吳茱 神曲 廣檳榔 茯苓各六兩 蒼朮 陳皮 法夏 厚朴 桔梗各四兩 甘草二兩

【制法】研末。

【劑量及用法】每服二錢半，幼童減半，開水送服。

【禁忌】發痧勿服。

附參考古方

【來源】1. 重刻太平惠民和劑局方。

【功能與主治】治傷寒頭痛，憎寒壯熱，上喘欬嗽，五勞七傷，八般風痰，五般膈氣，心腹冷痛，反胃嘔惡，氣瀉霍亂，臟腑虛鳴，山嵐瘴瘧，遍身虛腫，婦人產後，血氣刺痛，小兒疳傷，並皆治之。

【處方】大腹皮 茯苓（去皮） 白芷 紫蘇各一兩 陳橘皮 苦梗 白朮 厚朴（去粗皮，姜汁制） 半夏麴 甘草（炙）各二兩 藿香（去土）二兩

【制法】上為細末。

【劑量及用法】每服二錢，水一盞，薑三片，棗一枚，煎七分，熱服。如要出汗，衣被蓋，再煎併服。

2. 沈氏尊生書。

【功能與主治】寒毒。

【處方】大腹皮 紫蘇 甘草 桔梗 陳皮 茯苓 白朮 厚朴

半夏 白芷 姜 三 二

六一散

一、北 京

【功能与主治】祛暑渗湿。主暑湿热泻，小便不利。

【处方】滑石六两 甘草一两

【制法】共为细粉。

【剂量及用法】每服三钱，日服二次，温开水送下。

二、天 津

【功能与主治】去热除湿，消胀利水。主中暑身热，嘔吐泄泻，口渴咽干，小便不利。外用可以敷痱子。

【处方】滑石粉六两 甘草粉一两

【制法】以上研匀。

【剂量及用法】每次服三钱，白开水送下。

三、上 海

【功能与主治】暑热口渴，小溲赤热。

【处方】滑石(水飞)六斤 甘草(去皮)一斤

【制法】共研细粉，充分和匀。

【剂量及用法】每次三钱，包煎汤服。

四、南 京

【功能与主治】清热解暑。主暑令烦渴，热泻，小便不利。

【处方】飞滑石六两 生甘草一两

【制法】滑石水飞研细，甘草生晒研为细粉，共乳和匀为度。

【剂量及用法】每服三钱，煎服或以开水泡服代茶。

【备考】附方：

益元散：上方加飞硃砂三分。

鸡苏散：上方加薄荷木二钱。

碧玉散：上方加飞青黛二分。

清元散：六一散一两加红糯米七分。

温元散：上方加干姜木七分。

玉泉散：上方加生石膏末二钱。

天水散：上方加琥珀末三分。

五、武 汉

【功能与主治】暑令烦渴泄泻，

小便不利。

【处方】飞滑石六钱 甘草一钱

【制法】取上药混合碾细，成净粉80~85%即得。

【剂量及用法】日服二次，每服二钱，白开水送下。

六、福 州

【功能与主治】治夏时中暑，热伤元气，上清暑热，下利水道。

【处方】滑石六两 甘草一两

【制法】共研细末。

七、南 昌

【功能与主治】暑热烦渴，小便短赤。

【处方】飞滑石六两 甘草一两

【制法】共研细末。

【剂量及用法】每服一钱五分至二钱，日服一次或二次，开水送下，或泡冷澄清服。

八、沙 市

【功能与主治】治暑湿烦躁泄泻，小便澹痛等症。

【处方】西滑石六两 粉甘草一两

【制法】共研细末，和匀。

【剂量及用法】每次用三钱，白开水泡服。

【禁忌】肾气不固，小便多或滑精者忌服。

【备考】附方：

碧玉散：上方加青黛二钱。

鸡苏散：上方加薄荷木七钱。

益元散：上方加硃砂一钱。

九、西 安

【功能与主治】解热消炎利尿。主治夏季急性肠炎，水样下利；肾脏炎小便困难，体温增高，心烦口渴及尿道发炎疼痛等病症。

【处方】滑石六两 粉草一两

【剂量及用法】每次服二、三钱，一日二、三次，小兒酌减，冷开水或灯心汤吞服。

【禁忌】孕妇忌服。

十、蘭 州

【功能与主治】除湿去热，清理肠胃，主中暑，身热，泄泻，嘔吐，口渴，小便不利。外用可擦痱子。

暑 湿 类

【处方】滑石六两 甘草一两

【制法】共碾细面。

【剂量及用法】每次三钱，开水送下。

【禁忌】阴精不足、脾胃俱虚者忌用。

十一、济 南

【功能与主治】暑令烦渴热泻，小便不利。

【处方】南滑石(水飞过)六两 去皮甘草一两

【制法】共研极匀。

【剂量及用法】每服一钱至三钱，小兒酌减。凉开水冲服。

【禁忌】忌食辛辣、油腻等物。

十二、沈 陽

【功能与主治】利水泻火。主泄泻烦躁，石淋茎痛，小便不通，头晕口渴。

【处方】水飞滑石六两 甘草面一两

【制法】共碾极细面。

【剂量及用法】每服一钱，白开水送下。

【禁忌】忌食酸腥。

十三、呼 和 浩 特

(天水六一散)

【处方】滑石六两 甘草一两

【制法】共为细面。

附参考古方

【来源】伤寒标本心法类萃。(天水散)

【处方】滑石六两 甘草一两

【制法】上为末。

【剂量及用法】水调，或加蜜，或葱豉汤调。

益 元 散

(辰砂益元散)

一、北 京

【功能与主治】清热祛暑，除烦渴，利小便。主伏暑吐泻，口渴多汗，小便不利。

【处方】滑石六两 甘草一两 硃砂一钱

【制法】滑石、甘草共为细粉，硃砂另研兑。

【剂量及用法】每服二錢，日服二次，溫开水送下。

【禁忌】忌辛辣食物。

二、天 津

【功能与主治】去暑清热，止渴除煩。主中暑水瀉，嘔吐惡心，口渴思飲，小便不利，胸中煩躁。

【处方】滑石粉六兩 甘草粉一兩 硃砂面二錢

【制法】共為細粉。

【剂量及用法】每次服一錢，白开水送下。

三、上 海

【功能与主治】口渴煩躁，小溲短赤。

【处方】滑石(水飞)六兩 甘草一兩 硃砂二錢

【制法】共研細粉，充分和勻。

【剂量及用法】每次一至五錢，包煎服湯。

四、武 汉

【功能与主治】暑热煩躁，面赤气粗，小便短赤，吐瀉滯痢。

【处方】飞滑石六兩 甘草一兩 硃砂三錢

【制法】取上药混合碾細，成淨粉90~95%即得。

【剂量及用法】每服二至三錢，开水冲服。

【禁忌】孕妇慎用，或按医嘱。

五、福 州

【功能与主治】治水瀉轉筋霍乱，虛煩不眠，陰陽不分。

【处方】滑石六兩 甘草 辰砂各一兩

【制法】共研細末。

六、南 昌

【功能与主治】清暑热，利小便，安神除煩。

【处方】飞滑石六兩 生甘草四錢 炙甘草六錢 飞硃砂三兩

【制法】共研細末。

【剂量及用法】每服一錢五分至二錢，日服一次或二次，溫开水送下或煎服。

【禁忌】忌食辛辣食物。

七、昆 明

【功能与主治】清暑解热，止渴

利尿。

【处方】滑石十二兩 甘草二兩 辰砂五錢

【制法】研末。

【剂量及用法】每服二錢半，幼童減半，用水冲服。

【禁忌】忌食香燥食物。

八、蘭 州

【功能与主治】去湿清热，止渴除煩。主中暑水瀉，嘔吐惡心，口渴，小便不利，心口煩躁。

【处方】滑石六兩 甘草一兩

【制法】以上均細粉，每七兩加硃砂二錢，研細面，每服三錢。

【剂量及用法】每次服三錢，冷开水送下。

【禁忌】陰精不足，脾胃俱虛，中滿嘔者，諸湿腫滿，脹滿病等，均忌服。

九、大 同

【功能与主治】清暑祛热。主中暑水瀉，小便不利，心热煩躁。

【处方】滑石粉六兩 生草一兩 硃砂二錢

【制法】粉剂。

【服法】每服二錢，开水冲服。

十、济 南

【功能与主治】暑热煩躁，小便不利。

【处方】滑石六兩(水飞过淨) 甘草一兩 硃砂五錢(水飞淨)

【制法】各研細面合勻。

【剂量及用法】每服一錢，小兒酌減，涼开水冲服。

【禁忌】忌食辛辣、油膩等物。

十一、青島(1)

【处方】硃砂一兩 滑石一斤 甘草二兩

【制法】共研細面。

十二、青島(2)

【处方】滑石一斤 甘草 硃砂各一斤

【制法】共研細面。

十三、沈 陽

【功能与主治】清暑，退热，强心。主中暑吐瀉，心煩口渴，狂言妄語，头晕自汗，小便瀉痛，淋痛等症。

【处方】滑石六兩 甘草一兩 辰砂三錢

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】每服二錢，小兒酌減，白开水調下。

十四、撫順、吉林、哈尔滨

【功能与主治】解表行水，生津清燥。主中暑，暑日食生冷，外感風涼，發熱煩躁，口渴思飲，自汗水泄，小溲不利；淋症，热淋膿血，小溲澀滯，尿道痒痛；膀胱内热，小溲点滴，澀閉不下，尿道疼痛。

【处方】飞滑石六兩 粉甘草一兩 硃砂二錢

【制法】共研為細面，絹罗篩过。瓷瓶存貯。

【剂量及用法】每服一錢五分至二錢，小兒酌減，遇岁小兒仅服二、三分，新汲冷水調服。

【禁忌】忌食辛辣。

十五、呼和浩特

【处方】滑石一斤 甘草八錢 硃砂四錢

【制法】共為細面。

附参考古方

【来源】幼科証治准繩。(辰砂六一散)

【功能与主治】治狂言發搐惊悶。

【处方】桂府滑石(水飞过)六兩淨 大甘草(去皮为末)一兩 辰砂(制)二錢

【制法】以上和勻。

【剂量及用法】用防風、荆芥、薄荷、天麻煎湯，候冷調下。

鷄 蘇 散

一、上 海

【功能与主治】散風，祛暑热。

【处方】滑石(飞)六兩 甘草一兩 薄荷六錢

【制法】共研細粉。

【剂量及用法】每次一至五錢，包煎服湯。

二、武 汉

【功能与主治】主伤暑表里俱热，口渴，小便不通，瀉痢，暑瘧。

【处方】六一散六兩 薄荷末一

錢

【制法】取上藥碾細，成淨粉98~99%即得。

【劑量及用法】每服三錢。

三、福州

【功能與主治】治肺熱，煩渴喜飲。

【處方】滑石六兩 甘草一兩 薄荷一兩

【制法】共研為末。

四、吉林

【功能與主治】止渴去暑，清熱利濕。主中暑中喝六腑凝結等症。

【處方】甘草一錢 薄荷一錢 滑石六錢

【制法】共為細面，瓷罇或玻璃瓶存貯。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，白開水送下。

碧玉散

一、上海

【功能與主治】主咽干口渴，小溲短赤。

【處方】滑石(飛)六兩 甘草一兩 青黛三錢五分

【制法】各取細粉，充分研勻。

【劑量及用法】每次四錢，包煎服湯。

二、福州

【功能與主治】治傷暑虛煩口渴。

【處方】滑石六兩 甘草一兩 青黛一兩

【制法】共研細末。

溫六散

上海

【功能與主治】暑月受寒嘔噦。

【處方】滑石(飛)六兩 甘草一兩 丁香一錢

【制法】各取細粉，充分研勻。

【劑量及用法】每服三錢，包煎服湯。

定中散

撫順

【功能與主治】調整胃腸，解熱

利尿。主冒暑感涼，火身痛，惡心嘔吐，暑濕瀉泄，傷食悶脹，發熱惡寒以及水土不服等症。

【方處】益元散五錢 定中丸面一兩 琥珀四錢

【制法】共為兌研為細面。

【劑量及用法】每服一至二錢，開白水送下。

【禁忌】忌食油膩瓜果。

甘露散

沈陽

【功能與主治】健胃解毒，清暑祛濕。主感冒發熱，中暑吐瀉，神識昏憤，傷食腹滿，頭痛嘔噦，肢節痠痛。

【處方】藿香 茯苓 薄荷葉 川朴 桔梗 白芷各五錢 半夏一錢 神曲 香薷 扁豆 紫蘇 陳皮 砂砂 蒼朮 木瓜 山楂 甘草 葛根各二錢 明雄黃六分 大腹皮一錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二錢，小兒酌減，白開水送下。

【禁忌】忌食生冷硬物。

加味玉露散

沈陽

【功能與主治】和胃止嘔，利濕止瀉。主胃腸諸熱，暑濕吐瀉，頭暈目汗，腹痛口渴。

【處方】桂枝錢半 石膏一兩

猪苓 澤瀉各四錢 藿香三錢 砂砂 琥珀 甘草各二錢 滑石八錢 白朮 云苓 寒水石各六錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】成人每服二錢，小兒三分至一錢，開白水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

不換金正氣散

福州

【功能與主治】治脾氣虛弱，寒邪相搏，痰停胸膈，致發寒熱，或作癰疽，或受山嵐瘴氣等毒。

【處方】厚朴(姜制) 藿香 半夏 蒼朮(米泔浸) 陳皮各一錢 炙草五分

【制法】共為末。

【劑量及用法】姜棗水煎服。

附參考古方

【來源】幼科証治准繩。

【功能與主治】治脾胃不和，寒熱往來，臟腑虛熱，霍亂吐瀉。

【處方】厚朴(姜制) 藿香 陳皮 半夏 蒼朮(米泔浸) 甘草(炙)各等分

【劑量及用法】每服二、三錢，姜棗水煎服。

避瘟散

一、北京、濟南、承德

(紅避瘟散)

【功能與主治】芳香辟穢，通竅止痛。主傷風頭痛，鼻塞涕淚，暑令受熱，暈車暈船。

【處方】檀香四十兩六錢 香排草四十八兩 甘松 零陵香 姜黃各四兩八錢 公丁香 白芷 玫瑰花各十一兩二錢 木香九兩六錢 (以上為第一宗)

麝香五分 冰片 薄荷冰各五兩 甘油十兩 硃砂二十四兩

【制法】以第一宗共為細粉，每二十兩兌第二宗收貯勿令洩氣。

【劑量及用法】每服二分，外用聞入鼻竅。

【禁忌】忌食辛辣酒等；孕婦忌用。

二、天津(紅避瘟散)

【功能與主治】清暑散風，通竅止痛。主四時不正，嘔吐惡心，夏令受暑，頭目眩昏，傷風頭痛，暈車暈船。

【處方】香排草三斤 零陵香 甘松各四兩八錢 白芷 公丁香 玫瑰花各十一兩二錢 廣木香九兩六錢 檀香二斤九兩六錢 色姜黃四兩八錢 共為細粉兌入：麝香三錢六分八厘 冰片二斤四兩八錢 薄荷冰二斤四兩八錢 甘油四斤九兩六錢 硃砂面十一斤零六錢四分

【制法】上藥研勻，收貯勿令洩氣，二分重裝盒，一錢重裝瓶。

【劑量及用法】每服一分，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、南京

【功能與主治】芳香辟穢。主中

暑，暈車暈船，頭目昏眩。

【處方】香白芷一兩二錢 佩蘭五分 白蔻仁六錢 飛硃砂一兩五錢 白檀香二錢 麝香一分 梅冰片 降香各五分 薄荷冰一錢 木香 錢二分 公丁香一錢 甘油一兩

【制法】共研細末，乳至極細，以甘油擦勻，用錫盒裝密藏，每盒計裝二分重。

【劑量及用法】每以少許擦于鼻尖，或吸入。

四、武漢(避疫散、避瘟丹)

【功能與主治】主受暑眩暈，嘔吐等症。

【處方】蒼朮八兩 烏藥 羌活 白朮 川連各四兩 細辛 草烏(制) 白芷 香附(制) 山柰 甘草 白芍 防風 肉桂 荊芥 川芎(制) 紫草 麻黃 藜蘆 當歸 土松 干姜 獨活各二兩 麝香三錢半 皂角二兩

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，成淨粉 85~90% 即得。

【劑量及用法】每服二至三錢，溫開水化服。

【禁忌】孕婦忌服。

五、沈陽(1)

【功能與主治】清熱避瘟，通關化濁。主惡寒發熱，頭痛眩暈，身體倦怠，精神不爽，鼻塞流涕，聲重口苦，不思飲食，嘔吐腹痛。

【處方】雄黃 川芎 甘草 荊芥 皂角 藿香 白芷 防風 細辛 陳皮 石菖蒲 廣木香 公丁香 法半夏 桔梗 硃砂 冰片 貫仲各一錢 薄荷 滑石各二錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】外用每次二、三分，吸入鼻內；內服成人每服一錢，白開水送下。小兒酌量增減用之。

六、沈陽(2)

【功能與主治】清瘟解毒，預防瘧疫。主傷風感冒，頭痛身痛，鼻塞噴嚏，一時感冒，風熱斑疹，傷風咳嗽，瘟疫發痧，鼻淵腦熱。

【處方】蒼朮五錢 前胡一錢 藿香二錢 神曲三錢 薄荷一錢 法夏二錢 滑石二錢 皂角一錢 雄黃二錢 姜黃一錢 川芎二錢

木香一錢 香薷一錢 甘草二錢 桔梗二錢 羌活一錢 貫仲二錢 柴胡一錢 熟大黃二錢 荊芥一錢 厚朴一錢 白芷二錢 防風二錢 細辛二錢 枳殼二錢 陳皮二錢 硃砂二錢 公丁香二錢 草果二錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服一、二分吹鼻內，內服每服一錢，姜湯送下。

【禁忌】孕婦忌服。

七、撫順

【處方】檀香一錢 月石一錢 茅朮 錢半 白芷二錢 藿香一錢 木瓜一錢 滑石四錢 薄荷叶一錢半 母丁香一錢 公丁香一錢 桃仁一錢 豆粉五錢 片砂五錢 薄荷水二錢半

【制法】共為細面。

八、吉林(救急避瘟散)

【功能與主治】除瘟解表，上痢消毒。主傷寒感冒，霍亂，紅白痢疾，大便閉塞，小便赤澀，無名腫毒等症。

【處方】皂角二錢四分 硃砂 雄黃各一錢七分 細辛 貫眾各二錢 麻黃 木香 桔梗 白芷 半夏 藿香 薄荷 枯礬 防風 甘草各一錢四分

【制法】共為細面。貯于瓷瓶中勿洩氣。

【劑量及用法】每服一錢，用姜水送下，再吹入鼻孔二、三分更佳，小兒酌減。

九、呼和浩特(紅避瘟散)

【處方】薄荷二兩 辛黃一兩 母丁香二兩 生赭石一錢 葶藶粉四兩(另兌) 綠豆粉四兩(另兌)

【制法】共研細面，裝罐內，埋背陰處，經發酵最佳，每兩細面兌銀珠二錢，人造麝香一錢二分，水片一錢二分，硃砂二錢，四樣研細倒出薄荷水一錢二分研成水，與上列粗細面，套研均極細，再兌蜜甘油二錢。

白避瘟散

一、北京、承德

【功能與主治】清暑散風，通竅解毒。主夏令暑熱，頭目眩暈，嘔吐惡心，飲酒過度，暈車暈船，蠅蟻虫

咬。

【處方】綠豆粉 石膏(生)各八十兩 滑石 白芷各八兩 共為細粉，每六十兩細粉兌入：麝香六分 冰片六兩 薄荷冰五兩 甘油十二兩

【制法】上藥和勻，收貯勿令洩氣。

【劑量及用法】聞服均可，內服二分，涼開水送服。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天津

【功能與主治】清涼解熱。主受暑受熱，頭痛眩暈，嘔吐惡心，暈車暈船。

【處方】綠豆粉五斤 生石膏五斤 滑石八兩 白芷八兩 共為細粉兌入：麝香一錢七分六厘 冰片一斤一兩六錢 薄荷冰十四兩六錢七分 甘油二斤二兩二錢

【制法】以上研勻，收貯勿令洩氣，二分重裝盒，一錢重裝瓶。

【劑量及用法】每次服一分，白開水送下。內服外聞均可。

【禁忌】孕婦忌服。

三、呼和浩特

【處方及制法】葶藶粉 綠豆粉各三斤(裝磁罐埋背陰處經發酵為最佳)，每兩細面兌：人造麝香一錢(研細面) 水片一錢(研細面) 薄荷水一錢(研成水兌研) 蜜甘油二錢 煅月石二錢

雷公散

一、上海

【功能與主治】因受暑而引起泄瀉。

【處方】硫黃(制)五錢 吳茱萸一兩八錢 母丁香一兩一錢 肉桂八錢 麝香四錢

【制法】共研極細粉，瓶裝固封。

【劑量及用法】每次二分，溫開水送服。

【禁忌】孕婦忌用。

二、南京(感應丹)

【功能與主治】主寒邪郁結，驟然腹痛，肢冷脈伏，手足拘攣。

【處方】上足油肉桂(去粗皮) 公丁香 硫黃 吳茱萸 麝香各一分

【制法】共研細末，麝香研細后下，和勻为度，密貯以不走气为佳，最好随配随用。

【剂量及用法】每用少許，納入臍中，上用膏药貼之，再当臍用生姜一片，以艾絨灸之，至腹鳴为度。

三、杭州(救急雷公散)

【功能与主治】治霍乱吐瀉，吊脚諸痧，絞腸腹痛，厥冷昏暈危在頃刻者。

【处方】同上海。

【制法】各取淨粉研勻，密封勿令洩气。

【剂量及用法】每用二分，小兒減半。將此散納臍中，上貼膏药。重則用姜一片，艾火灸五至九壯，尤有捷效。

【禁忌】孕婦忌用。

雷 击 散

一、武汉(雷公救疫丹)

【功能与主治】主暑令痧症，腹痛吐瀉，甚至神識暈迷，痙攣抽搐。

【处方】牙皂三錢半 細辛 硃砂 雄黃各二錢半 薄荷 藿香各三錢 枯矾 白芷各一錢 桔梗 防風 青木香 貫众 陈皮 法半夏 粉甘草各二錢

【制法】取上药混合碾細，成淨粉85~90%即得。

【剂量及用法】用一至二分吹入鼻中，再用五分至一錢，开水冲服。

二、福州

【功能与主治】主羊毛痧，七十二痧症，瘟疫时症，軟脚瘟。

【处方】牙皂 細辛各三錢五分 硃砂 雄黃各二錢五分 苏薄荷 藿香各三錢 枯矾 白芷各一錢 桔梗 防風 木香 貫众 陈皮 法夏柚 生甘草各二錢

【制法】共研細末，貯入磁瓶，蜡封，免洩气，随帶身旁。

【剂量及用法】每用一、二分吹入鼻中，再用一、二錢，姜湯冲服，睡片时，汗出即愈。

三、南昌(救急散)

【功能与主治】主羊毛痧，霍乱吐瀉及其他痧症。

【处方】牙皂 細辛各七錢 水

飞硃砂五錢 水飞雄黃五錢 薄荷 藿香各六錢 枯矾 白芷各二錢 桔梗 防風 广木香 貫众 陈皮 姜制半夏 甘草各四錢

【制法】各药生晒研細末。

【剂量及用法】每用一至二分吹入鼻中，再用一至二錢姜湯或溫开水送服，服后安睡片时。

【禁忌】孕婦慎用。

四、沙 市

【功能与主治】治痧症內閉，解毒通窍，托里發表等症。

【处方】法夏 貫众 枯矾各三錢 北細辛 牙皂 广木香各三錢五分 防風 薄荷 白芷各二錢 明雄二錢五分 粉甘草 广藿香 广陈皮 桔梗各三錢 硃砂二錢五分

【制法】上药除硃砂、明雄、枯矾外，余均生晒(忌火烘)，共研極細末，再加以上三味，磁瓶密貯。

【剂量及用法】每次用一或一分吹入鼻中，以得嚏开窍为度。

【禁忌】体虛不由于实閉者忌服。

五、沈陽(累济散)

【功能与主治】解毒强心。主羊毛痧及七十二痧症，卒然昏倒，不省人事，各种疔瘡，昏暈發厥等症。

【处方】牙皂三錢半 雄黃二錢半 枯矾一錢 防風二錢 陈皮二錢 細辛三錢半 薄荷二錢半 白芷一錢 木香二錢 半夏二錢 硃砂二錢半 藿香二錢半 桔梗二錢 貫众一錢 甘草一錢

【制法】碾細面，貯磁瓶內，用蜡封口，每服一錢，姜湯送下，或吹鼻內取嚏。

【禁忌】忌生冷酸性食物。

六、吉 林

【功能与主治】避瘟解毒。主四时瘟疫，感冒。

【处方】皂角 細辛各二錢四分 明雄一錢七分 藿香叶 薄荷各一錢 枯矾 白芷各七分 桔梗 防風 木香 貫众 广皮 法夏 甘草各一錢四分 硃砂一錢七分

【制法】共为細面，用紙袋包裝或貯于玻璃瓶中。

【剂量及用法】每服一錢四分，

用白开水送下，早晚二次。

【禁忌】孕婦忌服。

麝香救疫散

沈 陽

【功能与主治】消瘟解毒。主瘟疫霍乱，流行时疫，水土不服，伤暑中惡，上吐下瀉，腹痛轉筋，头目暈眩，卒然昏倒。

【处方】麝香 冰片 牛黃各二分 硃砂二錢 牙皂 藿香各一錢五分 半夏 薄荷 广皮 貫众 防風 枯矾 白芷 甘芦各一錢 茅朮五分

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】成人每服一錢，小兒酌減。

【禁忌】忌生冷食物。

救 急 散

沈 陽

【功能与主治】和中健脾，止吐止瀉，利水避穢，止渴。主卒然吐瀉，心腹絞痛，嘔吐惡心，四肢厥冷，口渴心煩，夏月伤暑，腹痛，胃痛等症。

【处方】蒼朮二錢 姜連錢半 厚朴 陈皮 制草 生芍 澤瀉 茯苓 防風 車前 扁豆 佛手 滑石 清夏 寸冬 猪苓各三錢

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】每服一至二錢，日服二至三次，白开水送下。

普 濟 散

昆 明

【功能与主治】主时令感冒，嘔吐瀉痢等症。

【处方】藿香 蒼朮 神麝 茯苓 法夏 厚朴 白朮 桔梗各八兩 前胡 檳榔 陈皮 麦芽 白芷 焦查 扁豆 炒萊菔各六兩 羌活 川芎各三兩 甘草四兩 砂仁七兩

【制法】研末。

【剂量及用法】每服一錢半，幼童減半，开水送下。

【禁忌】阳虛气弱者忌服。

神效济生散

杭 州

【功能与主治】治脾胃受湿，痧

內 科

脹吐瀉，畏寒發熱，胸悶腹痛等症。此散理氣避穢，濟生良方也。

【處方】北細辛 廣藿香各二斤 西香葉 三斤 廣郁金 降香各八兩

【制法】共研細末。

【劑量及用法】每服五分，重症加倍，清茶送下。老幼虛體酌減服。

諸葛行軍散 (武侯行軍散)

一、上海(行軍散)

【功能與主治】受暑不適，人暈胸悶。

【處方】銀硝二分 腰黃八錢 牛黃 冰片 月石(飛) 麝香 珍珠各五錢 姜粉五分

【制法】各取淨粉，共研極細粉，瓶裝固封。

【劑量及用法】每次一至二分，溫開水送服。

【禁忌】孕婦忌服。

【備考】附姜粉制法：

將老姜榨汁澄清，撇去液汁，取沉淀干燥而成。

二、南京

【功能與主治】開竅宣閉。主頭目昏暈，暑熱痧脹。

【處方】西牛黃 麝香 細藤珠各一錢 生薑粉五分 梅片一錢二分 煅銀硝二分 明雄黃三錢

【制法】各藥各取淨粉，共乳極細。

【劑量及用法】每服一分，涼開水調服。

【禁忌】孕婦忌服。

三、武漢

【功能與主治】暑熱痧脹，口瘡喉痛，人目暈眩，不省人事，亦治風熱障礙。

【處方】牛黃 麝香 珍珠 硼砂 冰片各五錢 火硝三分 明雄黃(飛淨)八錢

【制法】取上藥混合研細，成淨粉90~95%即得。

【劑量及用法】每服三至五分，涼開水吞服；或以藥粉少許，聞入鼻內取嚏；目赤翳障，用少許點之。

【禁忌】孕婦慎用，或遵医嘱。

四、廣州

【功能與主治】山嵐瘴氣，暑熱

頭目昏暈。

【處方】牛黃 川麝香 珍珠 梅片 硃砂各五錢 明雄黃八錢 火硝二分 飛金箔二十張

【制法】各研細末，再合研勻，瓷瓶封固。

【劑量及用法】每服三至五分，滾水沖服。

五、福州

【處方】麝香三分 雄黃二錢 牛黃五分 煅月石 川蒲 老片各八分

【制法】共研細末，和為散。

六、杭州

【功能與主治】治霍亂痧脹，吊腳絞腸，暑熱穢惡，山嵐瘴毒，頭目昏暈，不省人事。兼治喉痛口瘡，風熱瘴癘等症。

【處方】西牛黃 梅冰片 飛月石 飛腰黃 麝香各二錢 火硝 珍珠粉各六分 生薑粉五分(小金箔六十張)

【制法】各取淨粉，研細和勻。

【劑量及用法】每服一至二分，涼開水調服；避疫氣吹鼻孔，去瘴癘點眼角，喉痛口瘡，吹塗患處。

【禁忌】孕婦忌服。

七、重慶

【功能與主治】辟疫氣，去風濕障礙，治口瘡喉痛，霍亂痧脹，山嵐瘴癘，及暑熱穢惡諸邪，頭目昏暈，不省人事。

【處方】牛黃 珍珠 梅花片 麝香 硼砂各五錢 雄黃八錢 硝石二分 金箔二十張

【制法】牛黃、麝香、梅花片、珍珠、金箔另乳，余藥研細末，共再乳勻，玻璃瓶裝，每瓶二分，紙盒包裝。

【劑量及用法】二分至五分。

八、吉林、哈爾濱(行軍散，人馬平安散)

【功能與主治】清瘟解毒，降火退熱，興奮精神，強心作用。主治霍亂痧症，吐瀉不止，逆厥轉筋，臍腹絞痛，瘟疫傳染，壯熱神昏，發斑發疹，謔語狂躁，嘔逆煩悶，氣促喘急；疫癘鼠瘡，時溫穢毒，濁氣吸入中毒，四肢厥冷；中暑，卒然昏倒，氣少汗多，煩渴燥熱，頭疼如裂，肺胃火

盛，喉痛口糜，口燥氣臭，風熱上灼，目起障翳，疼痛羞光，視物不清，火眼暴發，翳封睛睛。

【處方】牛黃 麝香 珍珠 梅片 硼砂各五錢 雄黃八錢(水飛) 火硝二分 赤金二十張

【制法】各研細面，再合研勻。貯避光瓶中，密封其口，置于清涼處。

【劑量及用法】內服每次用二分，重症四分，涼開水調下。外用作聞藥，涼水蘸藥點眼，去風熱翳障。

【禁忌】孕婦忌用。忌食腥冷、油膩等物。

行軍散

一、沈陽

【功能與主治】發汗透表，清溫解毒。主感冒頭痛，發熱惡寒，穢濁毒熱，山嵐瘴氣。

【處方】麻黃 綠豆面各一兩

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服一錢，開白涼水送服。

【禁忌】忌食辛酸。

二、撫順

【處方】麻黃八兩 葛 蘇叶 川芎 半夏 白芷各一兩 甘草一兩 豆粉二兩

【制法】共為細面。

白痧散

杭州

【功能與主治】治傷暑受熱，霍亂痧脹，絞腸腹痛，胸悶嘔吐，頭暈鼻塞，瘟疫穢氣，中風昏厥，不省人事。

【處方】生半夏四兩 川貝母 月石各二兩 麝香四錢六分 梅冰片四錢二分 西牛黃二錢 杜蟾酥九錢

【制法】各研細末，和勻，玻璃瓶封固。

【劑量及用法】每服少許，吹入鼻孔，病重吞服一分，涼開水調下。

【禁忌】孕婦忌內服。

人馬平安散

一、大同

【功能與主治】主中暑，霍亂吐

瀉，及感受不正之氣。

【處方】硃砂七錢 雄黃錢半
月石二分 梅片 台麝各三分 蟾酥四分

【制法】共研極細面。

【劑量及用法】外用少許，鼻孔聞之。

二、禹 县

【功能與主治】初期感冒，傷寒頭疼，身疼壯熱，不省人事，中暑霍亂，驟馬急症。

【處方】硃砂五錢 明雄黃 硝石 礞砂各一兩 冰片二錢 麝香一錢 赤金百兩 蟾酥四錢

【制法】共研細面和勻，瓷瓶裝。

【劑量及用法】每服一分，此藥少許吹入鼻孔內取嚏，驟馬用大眼角內，人用涼開水送下。

【禁忌】孕婦忌用。

【備考】有效期一年。

三、青 島(1)

【處方】瓜蒂 半夏 牙皂 白芷 古月 蜈蚣 硃砂各一錢 麝香二分

【制法】共研細面，磁瓶裝貯。

四、青 島(2)

(人馬平安行軍散)

【處方】明雄 硃砂 礞砂 火硝 枯礬 乳香 沒藥 冰片 兒茶 麝香各等分

【制法】共研極細面。

五、呼和浩特

【處方】硃砂八兩 明雄黃一兩 月石五錢 火硝四錢 麝香五分 冰片二錢 赤金一百張

【制法】共研極細面，配時應五月五日午時配合。

人馬云安散

青 島

【處方】枯礬二兩 火硝二兩 雄黃一兩 硃砂三兩 冰片二錢四分 寸香一分

【制法】共研細面，磁瓶裝貯。

万应平安散

杭 州

【功能與主治】治中暑霍亂，痧

脹腹痛或吸穢濁，嘔吐眩暈，胸悶肢冷，不省人事以及疫厥氣厥等症。

【處方】麝香八分 腰黃一錢 飛辰砂二兩 公丁香二錢 飛月石二錢 馬牙硝五分 梅冰片一錢五分 金箔二十張

【制法】各取淨粉，研勻。

【劑量及用法】每服二至三分，涼開水調下，或用少許吹入鼻孔。驅、驟、馬、牛瘟疫，均用此散吹鼻，再以清水蘸藥點眼角。

【禁忌】孕婦忌服。

白平安散

一、天 津

【功能與主治】清涼解熱，去暑避瘟。主夏季受暑，頭目昏暈，嘔吐噁心。

【處方】綠豆粉一斤四兩 煨石膏二錢 滑石一兩 白芷 川芎各一錢 檀香四錢 共為細粉兌入：麝香一錢四分 冰片十一兩 薄荷冰八分

【制法】研細和勻，五分重裝瓶。

【劑量及用法】吃聞均可，酌量取用。

【禁忌】孕婦忌用。

二、蘭 州

【功能與主治】清涼解熱。主夏季炎暑受熱，心煩頭疼，眩暈目昏花等症。

【處方】綠豆粉二兩 生石膏二兩 滑石 白芷各一兩 川芎一錢

【制法】共碾細粉，每半斤細粉兌入：麝香一錢 冰片四兩，研極細裝瓶，每瓶五分。

【劑量與用法】吃聞均可，酌量取用。

【禁忌】脾胃虛寒者忌服。

三、沈陽(白云平安散)

【功能與主治】芳香解穢，避溫祛暑。主鼻竇壅塞，頭暈目痛。

【處方】淨滑石粉五錢 杭白芷一錢 淨綠豆粉 生月石各五兩 薄荷水 梅片各三錢

【制法】共碾極細面，裝瓷罐內，入土中埋三日，以去燥氣，再加梅片四兩，台麝香四分，共研一處。

【劑量及用法】每用少許納入鼻孔中。

四、撫順(平安散)

【處方】石膏二兩 豆粉 明粉各五錢 月石三錢 冰片二分 台麝五厘 薄荷冰五分。

【制法】共為細面。

五、呼和浩特

【處方】團粉二兩 葶藶粉 滑石 石膏各五錢 冰片二分 麝香七厘 薄荷水一分

【制法】共為極細面，大瓶裝一錢，小瓶裝五分。

甘露消毒丹

一、上 海

【功能與主治】時症發熱，胸悶苔膩，口渴溲赤。

【處方】藿香 豆蔻各四兩 石膏蒲六兩 射干四兩 薄荷四兩 綿茵陳十一兩 滑石(飛)十五兩 川貝母五兩 黃芩十兩 連翹四兩 木通五兩

【制法】共研細粉，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二錢，溫開水送服或包煎服湯。遵醫師指示服用。

二、南 京

【功能與主治】主暑濕郁遏，發熱口渴，胸悶腹脹，頭暈咽痛等症。

【處方】飛滑石十五兩 木通五兩 茵陳十一兩 藿香四兩 淡黃芩十兩 射干四兩 石膏蒲六兩 連翹四兩 川貝母五兩 薄荷四兩 白蔻仁四兩 焦神曲四兩

【制法】生晒研為細末，沸水泛丸，每錢約五十粒。

【劑量及用法】每服二錢，一日二次，開水吞服。

三、福 州

【功能與主治】治發熱倦怠，胸悶腹脹，肢酸咽腫，斑疹，身黃，頭暈，口渴，溺赤，便閉，吐瀉，瘡痢，淋濁，瘡瘍。凡暑濕時疫之邪，在氣分，舌苔淡白或膩或干黃者，皆甚效。並治水土不服諸痛。

【處方】同南京。

【制法】共研細末，泉神糊糊為丸，每粒重一錢五分。

四、杭州(普濟解毒丹)

【功能与主治】治暑濕時疫，發熱倦怠，胸悶腹脹，肢痠咽腫，斑疹身黃，頭暈口渴，溺赤便閉以及水土不服等症。

【处方】川貝母 木通各二兩五錢 土藿香 射干各二兩 飛滑石七兩五錢 綿茵陳五兩五錢 淡黃芩五錢 石菖蒲三兩 連翹 薄荷 白豆蔻各二兩

【制法】生晒(忌火)，研為細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服三至四錢，開水送下，一日二次。

五、沙市(長春丹)

【功能与主治】治暑濕穢濁，內郁火痛，頭眩氣滯，腹痛嘔吐瀉泄，小便短赤等症。

【处方】西滑石十五兩 茵陳十一兩 黃芩十兩 石菖蒲六兩 川貝母五兩 木通 射干 廣藿香各四兩 白豆蔻仁一兩五錢 連翹四兩 薄荷冰三兩五錢

【制法】上藥生晒(忌火炒)，研細末，薄荷冰研極細后下，密貯勿泄氣。

【劑量及用法】每次服三分，溫開水下，每日服二次，小兒老人酌減。

【禁忌】體虛者忌服。

六、沈陽

【功能与主治】清瘟解毒，利濕退熱。主流行瘟疫，發熱咳嗽，斑疹不出，時毒發頤，咽喉腫痛，黃疸口渴。

【处方】飛滑石一斤五兩 綿茵陳一斤一兩 黃芩一斤 石菖蒲六兩 川貝 木通各五兩 藿香 射干 連翹 薄荷 白豆蔻各四兩

【制法】共碾極細面，以神曲細面糊為小丸。

【劑量及用法】每服一錢五分，開白水送下。

【禁忌】忌食辛辣厚味。

附參考古方

【來源】匿效秘傳。

【处方】飛滑石十五兩 淡芩十兩 茵陳十一兩 藿香 連翹各四兩 石菖蒲六兩 白蔻 薄荷各四

兩 木通五兩 射干四兩 川貝母五兩

【制法】神曲糊為末。

七、液丹

上海

【功能与主治】時症發熱，痧毒瘡毒。

【处方】滑石(飛)三百兩 鮮藿香 鮮紫蘇 鮮蘿卜 鮮側柏葉 鮮佩蘭 大黃各三十兩 鮮荷葉九十兩

【制法】先將大黃用酒浸洗，晒干研細粉和入飛滑石，用六樣鮮藥打汁，將汁拌入藥粉內，做成小餅狀，俟干收貯。

【劑量及用法】每次一錢，開水化服。或遵醫師指示服用。

八、金丹

一、廣州

【功能与主治】感冒吐瀉。

【处方】川厚朴 砂仁 羌活 赤茯苓各三兩 草果仁一兩五錢 烏藥 防風 薄荷各三兩 藿香三錢 前胡三兩 木香三錢 硃砂三錢 半夏三兩 炒枳殼一兩五錢 香附三錢 陳皮三兩 川芎 白芷各三錢 蘇葉二兩 炙甘草一兩五錢 荳蔻 蒼朮 六曲各二兩

【制法】上藥洗淨切碎，隔水蒸透，晒干研成細粉，加神曲姜汁拌米糊製成大丸，每個重三錢，用蜡壳封固。

【劑量及用法】每次服一丸，淡姜湯送服。

二、重慶

【功能与主治】中風，中寒，中暑及霍亂吐瀉，一切感冒雜症。

【处方】厚朴 砂仁 羌活 赤苓各二兩 草果仁一兩五錢 烏藥 防風各三兩 藿香八錢 薄荷 前胡 廣木香各三兩 枳殼一兩五錢 香附 姜半夏各三錢 橘皮三兩 川芎三錢 白芷 蘇葉各二兩 甘草一兩五錢 白豆蔻 蒼朮 神曲各三兩

【制法】研為細末，用生薑煎水泛丸，硃砂三兩穿衣，紙盒包裝。

【劑量及用法】三錢。

三、濟南

【功能与主治】感冒風寒，頭痛發熱，骨節痠痛等症。

【处方】烏藥 法半夏 陳皮 赤茯苓 川芎 前胡 甘草 木香 砂仁 薄荷葉 豆蔻 防風 白芷 羌活 藿香 厚朴 茅蒼朮 紫蘇葉 枳殼各一兩五錢 草果仁一兩 神曲 硃砂各三錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重二錢，方內硃砂為衣。

【劑量及用法】每服一丸，淡姜湯送下。

四、青島

【处方】羌活 香附 防風 川芎 前胡 白芷 半夏 陳皮 赤苓 砂仁 川朴 烏藥 藿香 蒼朮各三兩 神曲五兩 枳殼三兩 草果一兩 甘草 木香 白蔻各一兩五錢 蘇葉二兩 薄荷二兩

【制法】共為細面，煉蜜為丸，重二錢五分。

五、沈陽

【功能与主治】清瘟解熱，健胃消食。主感冒風寒，頭痛腹痛，噁心麻木，霍亂吐瀉，傷寒發熱，驚癇痢疾，宿食不消，水土不服。

【处方】烏藥 防風 羌活 前胡 白芷 砂仁 半夏(姜制) 藿香 陳皮 蘇葉 茯苓 木香 厚朴 蒼朮 香附 薄荷各三兩 白豆蔻仁 草果仁各三兩 枳殼 制甘草各兩半 川芎二兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重，硃砂衣。

【劑量及用法】每服二錢，弱者一錢，小兒半錢，姜湯送下。

六、撫順

【功能与主治】發汗解熱，調整胃腸。主感冒嘔吐，頭痛身痛，消化不良，嘔吐瀉泄，胸悶腹脹，寒熱如瘧等症。

【处方】羌活 防風 前胡 川芎 香附 砂仁各三兩 川朴 烏藥 蒼朮 神曲 枳殼 草果仁 薄荷 陳皮 甘草各四兩 紫蘇兩半 廣木香四兩 半夏三兩 紫蘇五兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

七、吉林

【功能与主治】驱风散寒，正气解毒。主风寒感冒，中暑中寒，霍乱吐瀉等症。

【处方】厚朴 縮砂仁 羌活 赤茯苓 烏药 防風 藿香 薄荷 前胡 半夏 陈皮 川芎 白芷 紫苏叶 蒼朮(炒焦) 六袖(炒黑)各二兩 草果仁 枳壳(炒焦) 炙甘草各一兩五錢 炙香附 广木香 砂砂各三錢

【制法】共为細末，水泛为丸，砂砂为衣，每丸二錢一分重。蜡紙包。

【剂量及用法】大人每人一丸，病重者兩丸，鮮姜湯为引。七岁至十岁半丸，四岁至六岁一丸分四次服。

八、呼和浩特

【处方】藿香 烏药 赤苓 白芷 厚朴 防風 前胡 川芎 薄荷 苏叶 蒼朮 陈皮 半夏 羌活 麻黄 葛根 草果 枳壳 神曲 甘草 木香 砂仁 白蔻各四兩

【制法】共为細面，蜜丸，二錢五分重，砂砂衣。

救急丹

北 京

【功能与主治】祛暑止嘔，息痛利水。主中暑嘔吐，腹痛水泄。

【处方】藿香 蒼朮各十兩 公丁香 沉香各二兩 五倍子 山慈姑 千金子霜 紅芽大戟 木香各四兩共为細粉兌入，雄黃 朱砂(上衣用)各二兩 麝香 冰片各三錢

【制法】上药和匀，水泛为丸如綠豆大，用方內朱砂加滑石十五兩为衣，闔亮。

【剂量及用法】每服一錢，溫开水送下。

【禁忌】忌食冷物。孕妇忌服。

急救丹

天 津

【功能与主治】避瘴气，解濁穢，

通竅解毒。主感受时邪，中暑中疫，头晕恶心，腹痛嘔吐，四肢厥冷，神昏不語，霍乱吐瀉，絞腸痧症。

【处方】牙皂 藿香各十二兩 茯苓(去皮)一斤 广皮八兩 炒蒼朮 檳榔各十兩 紫朴(姜制) 五加皮各八兩 細辛 百草霜各四兩 灯心炭一斤 鬧羊花八兩 共为細粉 兌入：牛黃二兩四錢 麝香 朱砂面 冰片 明雄黃面各四兩

【制法】共研細粉，四分重裝瓶。

【剂量及用法】每次一服，小兒酌減，白开水送下。外用吹鼻中少許。

【禁忌】孕妇忌服。

救苦丹

一、沈 陽

【功能与主治】止吐瀉，解瘟疫。主时疫瘴气，中暑中毒，霍乱吐瀉，煩悶痧脹，胸腹疼痛，宿食停飲，傷風感冒，痧疹不出，肚腹臥痛，水土不服。

【处方】藿香叶一兩 甘草三錢 滑石二兩 苏叶一兩 半夏五錢 重樓一兩 枳壳一兩 台麝五分 茅蒼朮五錢 青蒿子兩半 陈皮五錢 青皮一兩 明雄黃二錢 川貝母五錢 紫厚朴八錢 神曲八錢

【制法】共碾極細面，水泛为小丸，砂砂为衣，上光，每四丸七分重。

【剂量及用法】大人每服四丸，小兒酌減。姜湯送下。

【禁忌】忌食生冷硬物。

二、撫 順

【功能与主治】和中、化湿、解毒、清暑。主时令感冒，头痛，关节痛，發热畏冷，惡心嘔吐，霉濁穢气，卒然中人，四肢清冷，腹疼攪悶，神昏吐沫，湿濁中阻，大便瀉瀉，不欲飲水，內傷飲食，外感寒冷，体重倦怠。

【处方】藿香一兩 茅朮五錢 苏叶一兩 青蒿一兩五錢 甘草三錢 枳壳一兩 半夏五錢 川朴八錢 雄黃二錢 青皮五錢 神曲八錢 滑石二兩 陈皮五錢 重樓一兩 川貝五錢 麝香一錢

【制法】共为細面，水丸砂砂为衣，每料做六百丸。

【剂量及用法】每服一錢生薑湯

送下。

【禁忌】忌食生冷物品，孕妇忌服。

三、吉林、哈尔滨 (观音救苦丹)

【功能与主治】解表和中，化湿解毒。主治：

(1) 四时感冒，时令感冒，人痛体痛，發热畏冷，泛噁嘔吐。

(2) 山嵐瘴气，霉濁穢气，卒然中人，四肢清冷，嘔吐攪悶，神昏吐沫。

(3) 中湿：湿濁中阻，头痛身重，大便瀉泄。不欲飲水。

(4) 伤食感冒，內傷飲食，外感寒凉，發热畏冷，头痛体痛，嘔吐泄瀉。

【处方】茯苓 木瓜 麦冬 生地 当归各二兩 藿香 菖蒲 茅朮 半夏 腹皮 白矾 陈皮 防風 黃芩 杏仁各一兩 山梔 柴胡 木通 香附 桔梗 澤瀉 远志各八錢 砂仁 川芎 油朴 羌活 独活 青黛 川連 雄黃 甘草 黃柏 神曲 枳壳 广木香 青木香 嫩苏梗 广王各五錢。

【制法】共为細面，煉蜜为一錢四分重丸或三分五厘重丸(后者四粒为一付)。均砂砂为衣。包裝瓷罐存貯。

【剂量及用法】每服一丸或一付。鮮姜湯为引，服后取汗。

【禁忌】忌食生冷物品。

【备考】又方：

川軍 藿香 藜蘆各三兩 明雄 白芷 牙皂各四兩 丹皮 砂砂 元胡各二兩 共碾細面，水泛为丸，如芡实大。每服四丸，姜湯为引。

四、呼和浩特 (除瘟救苦丹)

【处方】砂砂二兩 雄黃 茶叶 綠豆 干姜 麻黄 甘草各四兩

【制法】共为細面，蜜丸重二錢五分。

黄金丹 南 昌

【功能与主治】暑湿腹痛，吐瀉白痢，絞腸痧斑痧。

【处方】川黃連二兩四錢 川貝

(去心)六錢 羌活三錢 車前仁六錢 炒麦芽三錢 黃芩(酒炒)二兩一錢 廣陳皮三錢 藿香叶三錢 車前仁六錢 干姜二兩四錢 砂仁(去壳)三錢 公丁香三錢

【制法】共研細末，用鮮荷葉搗汁去渣，用汁和藥為丸(勿用蜜)，每料分為二百丸，干者每丸約重五分。

【劑量及用法】每服一錢至二錢，每日服二次，小兒視年齡及病情酌減服，開水化服。

【禁忌】忌食魚。

分水丹

禹 县

【功能与主治】暑大受寒，水瀉不止，肚腹作疼，上吐下瀉。

【處方】廣藿香二兩 澤瀉二兩四錢 白扁豆一兩六錢 川厚朴二兩 半夏二兩六錢 香薷草二兩 砂仁 木瓜 紫蘇各二兩四錢 白朮二兩 蒼朮二兩 猪苓 西滑石 肉桂 陳皮 白茯苓 石斛各二兩四錢 甘草三兩 白芷二兩四錢 桔梗一兩六錢

【制法】共為細面，每包八分。

【劑量及用法】每服一包，口服二次，十歲者服半包，姜湯送下，白開水亦可。

【禁忌】孕婦忌用。

【備考】有效期間一年。

灵宝如意丹

一、北京(如意丹)

【功能与主治】散風豁痰，解毒祛暑。主中風不語，痰盛神昏，中暑眩暈，絞腸腹痛，外敷疔毒惡瘡，蠍蟻虫咬。

【處方】白粉霜 血竭 礞砂 天麻各一兩 人參一錢(去蘆) 蟾酥六錢(酒化泛丸用)

共為細粉兌入，麝香 冰片各一錢 雄黃一兩 朱砂二兩(上藥用一兩)

【制法】上藥和勻，用燒酒化方內蟾酥，水泛小丸，朱砂為衣。

【劑量及用法】每服二十粒，日服二次，溫開水送下。外敷用涼茶調敷。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天津(如意丹)

【功能与主治】散風去痰，解毒去暑。主中風不語，痰盛神昏，中暑眩暈，絞腸腹痛，小兒急慢驚風。外敷疔毒惡瘡，蠍蟻虫咬。

【處方】白粉霜 血竭 生礞砂 天麻各一兩 人參(去蘆)一錢 蟾酥六錢(酒化，泛丸用) 共為細粉，兌入，朱砂面一兩 麝香 冰片各一錢 雄黃面一兩

【制法】以上研細和勻，用燒酒一兩一錢，化蟾酥，涼開水泛小丸如芥子大。每斤丸藥用朱砂面一兩五錢上，五分重裝瓶。

【劑量及用法】每服七粒，小兒一至四週服二粒，五、六歲服三粒，七至十歲服四粒。白開水送下。不可多用。

【禁忌】孕婦忌服。

三、南京

【功能与主治】散風解暑豁痰。主小兒痧滯，風熱驚啼，痰壅神昏，成人中暑，腹痛吐瀉。

【處方】同北京。

【制法】各研細末，各取淨粉，乳細和勻，以陳酒泛為小丸，每錢約二百粒，硃砂為衣，密藏。

【劑量及用法】小兒每服五丸至十丸，白開水吞服。

【禁忌】孕婦忌服。

四、杭州

【功能与主治】治中暑眩暈，絞腸腹痛，胸悶飽脹，不省人事，手足厥冷，嘔吐泄瀉，山嵐瘴氣，感受穢濁，中惡頭痛，一切痧氣。並治癰疽疔毒，蛇蠍虫毒等症。

【處方】白粉霜 血竭 飛礞砂 明礞黃 明天麻 飛辰砂(一分为衣) 麝香 梅水片各二錢 吉林人參二錢 蟾酥一兩八錢

【制法】各取淨粉，燒酒泛丸，如芥子大，辰砂為衣。

【劑量及用法】每服七丸。小兒二丸。外症用酒化敷患處。

【禁忌】孕婦忌用。

五、南昌(灵宝丹)

【功能与主治】感冒時邪，頭昏鼻塞，中暑、中寒、中風、中痰，霍亂吐瀉轉筋，紅痧，烏痧，絞腸痧，癰疽

痧，赤白痢疾，不服水土，及七十二種痧症。

【處方】法夏五錢 細辛四兩 貫眾六兩 枯礬一兩 牙皂五錢 薄荷叶四錢 廣陳皮 川羌活各三錢 胆南星五錢 蒼朮四錢 檀香五錢 川芎 白芷 硃砂(水飛)各四錢 降香五錢 荆芥三錢 乳香(去油)五錢 明雄(水飛) 防風 獨活各三錢 蟾酥 桔梗各四錢 訶子肉 薄荷油各五錢 當門子五分

【制法】研細末，以小瓶盛置，每瓶三分，黃蠟封固，勿令洩氣。

【劑量及用法】輕病者每服一分五厘，重病者五分，溫開水送下，並且可以少許吹鼻取嚏。

【禁忌】孕婦忌服。

六、沙市

【功能与主治】治暑濕內伏，穢濁郁結，欲吐不吐，欲泄不泄，胸腹絞痛等症。

【處方】蒼朮三兩六錢 麻黃(去節)二兩 公丁香六錢 明雄 朱砂各二兩六錢 麝香三錢 大黃六兩 粉甘草二兩六錢 蟾酥九錢 天麻二兩六錢

【制法】上藥蒼朮、天麻、麻黃、丁香、大黃、甘草等六味生晒，分別研細末，以冷開水泛為丸。再用蟾酥、麝香、明雄、及朱砂之半研為細末，水泛為丸，再用朱砂之半為衣，如黍米大。

【劑量及用法】小兒一歲服十粒，二歲服十五粒，五歲服二十粒，成人每次服三十粒。均用溫開水下。

【禁忌】孕婦及體弱者忌服。

七、西安

【功能与主治】祛風，通經，鎮痛。主治小兒熱痰，急驚抽搐，及癰疽、疔瘡初起。

【處方】甘草粉五錢 當門子五分 血竭 礞砂 腰黃各五錢 梅片五分 天麻五錢 辰砂三錢 蟾酥二錢 人參一錢

【制法】分別搗研細末，和研勻，燒酒泛丸如粟米大，每五十至一百粒裝一小瓶，固封瓶口。

【劑量及用法】小兒每服十至十五粒，一日一次，姜湯送下，中病即

止。成人患瘡瘍者每次可服三十至五十粒，黃酒送下，飯前服，一日一次。

【禁忌】孕婦勿服。貧血體弱者減量服。

八、蘭州(靈寶如意丸)

【功能與主治】鎮靜止疼，解毒化痰。主中暑眩暈，不省人事，及一切痧氣等。

【處方】茅蒼朮三兩 丁香六兩 麻黃二兩五錢 西大茴二兩 粉甘草二兩五錢 蟾酥九錢 麝香三錢 明雄 朱砂 明天麻各二兩五錢

【制法】共研細末，燒酒化蟾酥為丸，如芥子大，硃砂為衣。

【禁忌】孕婦忌服。

九、禹 縣

【功能與主治】小兒乳積，食積面黃，中暑吐瀉，痧氣腹痛，疔毒惡瘡。

【處方】白粉霜二兩六錢 麝香二錢 血竭二兩二錢 硼砂 明雄黃各四兩八錢 冰片二錢 天麻 朱砂各二兩二錢 蟾酥一兩 芭參 巴豆霜各二兩二錢 葶藶子四兩八錢

【制法】共為細面，水丸，如芥子大。

【劑量及用法】每服四十丸，小兒一歲服十丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

【備考】有效期二年。

十、濟 南

【功能與主治】中暑眩暈，不省人事及一切痧氣等症。

【處方】白粉霜 血竭 硼砂 雄黃 天麻 朱砂各一兩 麝香 冰片 人參各一錢 蟾酥六錢

【制法】各研淨粉，燒酒化蟾酥泛丸，如芥子大，硃砂為衣。

【劑量及用法】每服七丸，小兒二丸，不可多用。

【禁忌】孕婦忌服。

十一、青 島(1)

【處方】血竭二斤 朱砂 銀硃各二斤一兩 雄黃 葶藶子 白粉霜 天麻 硼砂 蟾酥各八斤半 黨參 人參各二十五兩 冰片 麝香各二斤七兩

【制法】共軋細面，水發蟾酥成丸如小米大。

十二、青 島(2)

【處方】血竭 雄黃 天麻 硼砂各八兩 白粉霜四兩 蟾酥二兩 葶藶子八兩 硃砂四兩 冰片五兩 麝香五分

【制法】共為細面，水發蟾酥為丸，如小米大，硃砂為衣。

十三、沈陽(如意丹)

【功能與主治】鎮驚安神，消毒活血。主小兒急驚，停食停乳，夜啼腹痛，吐瀉泄瀉，痘疹斑痧，毒熱內攻，疔毒惡瘡等症。

【處方】白粉霜 血竭 硼砂 雄黃 天麻各一兩 冰片一錢 朱砂一兩 人參一錢 蟾酥六錢 豆霜一錢

【制法】共軋極細面，燒酒化蟾酥泛為小丸。硃砂為衣。

【劑量及用法】每服七丸，小兒二丸，不可多用(大人約服一分，小兒二厘)。

十四、撫 順

【功能與主治】主中暑眩暈，絞腸腹痛，吐瀉交作，四肢厥冷，頭痛眩暈惡心，乍寒乍熱，手足麻痺，胃腸發炎，嘔吐瀉泄，便行膿血，水瀉不止，小兒驚癇，食積乳積，風寒發熱，睡時驚啼，癰疽疔毒，惡瘡潰破，蛇蠍蟲毒。

【處方】制蟾酥 血竭 朱砂各一兩 麝香一錢五分 雄黃一兩 紅人參五錢 冰片一錢五分 硼砂 天麻各一兩

【制法】共為細面，水泛小丸，朱砂為衣。

【劑量及用法】每服七丸，小兒二丸，不可多服。

【禁忌】孕婦勿服。

十五、吉林、哈爾濱 (靈寶丹)

【功能與主治】定喘安驚，散熱去風解毒。主治：

(1) 中暑眩暈，絞腸腹痛，腕悶脹飽，陰陽反錯，不省人事，手足厥冷，惡心吐瀉，山嵐瘴氣，感受邪穢，中惡頭痛，一切痧氣，俱用涼茶送下。

(2) 傷寒三四日，風寒咳嗽，用葱白煎酒熱服，煖蓋取汗。

(3) 中風不語，痰涎神昏者，姜湯送下。

(4) 口眼喎斜，手足麻木者，生姜、桂枝煎湯送下。

(5) 瘧疾，草果、檳榔煎湯送下。

(6) 瘟疹不出，葱鬚湯送下。

(7) 癰症瘋迷，生姜湯送下。

(8) 飢飽勞碌，沙參湯送下。

(9) 癰瘰，淡姜湯送下。

(10) 噎膈、咽喉胸膈疼痛，桔梗、柿蒂煎湯送下。

(11) 惡心嘈雜，砂仁湯送下。

(12) 牙痛，高良姜湯送下，再銜一丸于痛處，其痛立止。

(13) 心胃氣痛，淡姜湯送下。

(14) 心胃蟲痛，九種胃痛，俱用艾、醋煎湯送下。

(15) 氣壅，木香、柿蒂煎湯送下。

(16) 水蠱，葶藶湯送下。

(17) 中酒毒，陳皮湯送下。

(18) 陰寒，白朮湯送下。

(19) 健忘，石菖蒲湯送下。

(20) 尿血，車前湯送下。

(21) 二便不通，生薑湯送下。

(22) 水瀉，車前子湯送下。

(23) 赤痢，紅花湯送下。

(24) 白痢，吳茱萸湯送下。

(25) 噤口痢，石蓮子湯送下。

(26) 偏癱疼痛，小茴香湯送下。

(27) 腿足疼痛，牛膝、木瓜煎湯送下。

(28) 跌仆打傷，昏迷不省，熱酒或童便送下。

(29) 疔癰，噙化一丸。

(30) 癰疽、疔瘡、惡毒初起，用葱白、生姜煎酒熱服取汗，或黃酒化敷患處。

(31) 疔瘡腫爛太甚，口津研化二丸塗之，再用酒服一丸，其效甚捷。

(32) 疔瘡走黃，熱黃酒送下，再以瓷針挑破疔頭，入一、二丸于瘡內，以膏藥貼之。

(33) 大泡瘡、楊梅瘡，初起時用生姜煎酒熱服取汗，次日再服。

(34) 諸瘡潰破，生黃芪、銀花煎湯送下。

(35) 蛇蠍蟲毒，用黃酒化服。

(36) 婦人經閉，用紅花湯送下。

(37) 婦人鬼迷失魂，夢與鬼交，桃仁湯送下。

(38) 子死腹中，白芥子湯送下。

(39) 产后見神見鬼，黑荆芥湯送下。

(40) 产后腹脹，厚朴湯送下。

(41) 小兒食積乳積，風寒驚啼，熱湯送下。

【处方】白粉霜(即鉛粉) 血竭 礞砂 牛黃 天麻 辰砂各一兩 麝香 梅片 人參各一錢 蟾酥 巴豆霜各六錢

【制法】牛黃、麝香、辰砂、梅片另研，余均碾成細面，一處調勻，燒酒化蟾酥泛丸，如芥子大，辰砂為衣。以玻璃瓶或瓷瓶存貯。

【劑量及用法】成人每服七丸，小兒二丸，不可多服。

【禁忌】孕婦忌服。

十六、呼和浩特

【处方】礞砂(后加) 葶藶 天麻 雄黃 白粉霜 蟾酥 血竭各三兩 人參 辰砂 麝香 冰片

【制法】水泛小丸，珠衣。

八宝紅灵丹

一、北 京

【功能与主治】开窍解毒。主瘴气暑毒，嘔吐泄瀉、腹痛轉筋。

【处方】火硝一兩 礞砂六錢 礞石四錢(煅)共為細粉兌入；硃砂一兩 雄黃六錢 冰片三錢 麝香三錢 金箔五十張

【制法】上藥共為細粉和勻。

【劑量及用法】每服二分，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天 津

【功能与主治】避瘟殺菌，去暑解毒。主瘴氣穢濁，中暑中寒，嘔吐噁心，腹痛轉筋，暑邪郁悶，四肢厥冷，絞腸痧症。

【处方】生礞砂六錢 淨火硝一兩 煅金礞石四錢 共為細粉兌入；硃砂面一兩 冰片三錢 麝香三錢 明雄黃面六錢

【制法】以上研細和勻(火硝與雄黃在一起研的時候謹防爆炸)，二分重裝瓶。

【劑量及用法】每次服一瓶，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、上海(紅灵丹)

【功能与主治】因受暑而引起的吐瀉、胸悶、腹痛。

【处方】麝香六錢 硃砂二兩 腰黃一兩二錢 牙硝二兩 青礞石(煅)八錢 冰片六錢 月石(飛)一兩二錢

【制法】各取淨粉，共研細粉，瓶裝封固。

【劑量及用法】每服一分，溫開水送服。

【禁忌】孕婦忌服。

四、南京(紅灵丹)

【功能与主治】七傷暑腹痛，昏暈吐瀉，收冷轉筋。

【处方】明雄黃六錢 冰片三錢 煅西月石六錢 麝香三錢 煅金礞石四錢 金箔五十張 飛硃砂一兩 淨牙硝一兩(后入)

【制法】上藥各取淨末，共合乳勻，牙硝后加。

【劑量及用法】內服每服一分，涼開水送下。小兒酌減。

【禁忌】孕婦忌服。

五、武汉(紅灵丹)

【功能与主治】暑毒下痢，腹痛腹瀉，霍亂痧症，肢厥昏暈，並治喉、鼻、牙、舌諸病，及湯火、金刃諸傷。

【处方】麝香三錢 礞石四錢 飛明雄六錢 硃砂一兩 冰片三錢 火硝一兩 赤金五十張 礞砂六錢

【制法】混合碾細，成淨粉90~95%即得。

【劑量及用法】每服五厘至一分，涼開水送下。外症可搽患處。

【禁忌】孕婦忌服。

六、福 州

【功能与主治】傷風，開竅，鼻塞，頭痛，昏花，發熱，發寒以及感傷，山嵐瘴氣，並一切無名腫毒等症。

【处方】麝香二分 辰砂二兩 雄黃五錢 蟾酥一錢一分 老片二分 開洋花一錢(花) 老羌粉二分 赤金三十張

【制法】共研極細末，為散。

七、杭 州

【功能与主治】解穢避疫，通利

關竅，透達神明。治四時不正之氣，霍亂痧脹轉筋，腹痛或吐或瀉，肢厥脈伏，瘴毒時疫，眼目昏暈等症。並治喉痹牙舌諸病，湯火金刃諸傷。

【处方】原麝香三錢 梅水片四錢 飛辰砂二兩 飛腰黃六錢 馬牙硝一兩 飛月石六錢 青礞石(煅)四錢 金箔五十張

【制法】共研極細末為散。

【劑量及用法】每服一分，重症加倍。小兒減半。涼開水送下。外症皆搽患處。六畜瘟疫咬其眼角。

【禁忌】孕婦忌之。

八、沙 市

【功能与主治】治暑熱穢濁，痧脹時疫，眩暈肢厥，脈伏轉筋等症。並治喉痹牙舌諸症，湯火金刃所傷。

【处方】硃砂 牙硝各一兩 雄黃 礞砂各六錢 礞石四錢 正梅片三錢 麝香三錢 飛金五十張

【制法】上藥研極細末，用瓷瓶或玻璃瓶裝緊，溶蜡封口，勿使藥性揮發。

【劑量及用法】內服每服一分，涼開水送下。外症均搽患處。風熱內閉亦可用此藥吹鼻開竅。

【禁忌】體弱者及孕婦忌服。

九、西 安

【功能与主治】惡心吐瀉，暑毒下痢，頭痛腹痛，湯火受傷等症。

【处方】硃砂一兩 牙硝一兩 礞砂六錢 飛明雄黃六錢 礞石四錢 梅片三錢 當門子三錢 飛真金箔五十張

【制法】上八味分別搗研細末，用小玻璃瓶裝緊，黃蜡封口，每瓶五分。

【劑量及用法】成人每服一分至二分，小兒按年齡酌減，並可將藥末嗅之取嚏，湯火傷用冷水調敷患處，一日可服二次，每隔四小時再服。

【禁忌】孕婦不宜服用。

十、南 昌

【功能与主治】霍亂痧脹，四肢厥冷，脈伏轉筋昏暈，瘴癘時疫，暑毒下痢等症。並治喉痹牙舌諸病，湯火金刃諸傷及治牛羊馬之瘟。

【处方】麝香三錢 煅礞石四錢 飛明雄六錢 硃砂一兩 梅片三錢 火硝一兩 赤金五十張 生礞砂六

【制法】各研極細末，再混合調勻，玻璃瓶裝好，以蜡封口，勿洩氣。（注意：火硝與雄黃萬不能同時合研，若火硝與雄黃同時研必爆燃。）

【劑量及用法】每服一分。小兒視年齡及病情酌減服，用涼開水送下。喉痹才舌，湯火金刃諸症均用少許搽患處。治牛、馬、羊瘟以藥點眼角內。

【禁忌】孕婦忌服。

【功能與主治】治霍亂痧脹，肢厥脈伏，轉筋昏暈，瘧疾時疫，暑毒下痢等症。並治喉痹，牙舌諸病，湯火金刃諸傷。

【處方】硃砂一兩 牙硝一兩 雄黃六錢 礬砂六錢 礬石四錢 梅花冰片三錢 麝香三錢 金箔五十張

【制法】梅片、麝香、金箔另研，余藥共研細末，將麝香、梅片、金箔加入和勻，裝破瓶，每重五分，紙盒包裝。

【劑量及用法】每服一分，小孩減半。

【禁忌】妊娠忌服。

【功能與主治】卒倒，昏絕，一般突然氣絕症。

【處方】硃砂五錢 雄黃三錢 火硝三錢 礬石錢 丹石錢 冰片錢 麝香錢 赤金箔五張 牙皂錢 蟾酥五分

【制法】共為細面，裝瓶封固。

【劑量及用法】以藥面少許，聞于鼻內，取嚏甦生。

【功能與主治】傷風鼻塞，火疼發熱，傷暑吐瀉，筋搐肚疼。

【處方】硃砂二兩 冰片一錢五分 明雄二錢 麝香一錢 礬砂三錢 赤金箔十五張 火硝三錢 蟾酥一錢 芒礬石一錢

【制法】共研細面。

【劑量及用法】每服一分，吹入鼻孔亦可，白開水送下亦可。小兒五歲至十二歲每服五厘。

【禁忌】孕婦忌用。

【備考】有效期二年。

【功能與主治】傷暑腹痛，昏暈吐瀉，肢厥轉筋。

【處方】硃砂一兩 礬砂六錢 麝香三錢 火硝一兩 金礬石四錢（煨） 金箔五十張 雄黃六錢（飛） 冰片二錢

【制法】各為極細粉，再合研勻，瓷瓶密封，熔蜡封口，勿使洩氣，每瓶一錢。

【劑量及用法】每服一分，小兒酌減，涼開水送下。

【禁忌】忌辛辣，油膩等食物；孕婦忌服。

【處方】牙硝五錢 金礬石 火硝各一錢 雄黃三錢 硃砂五錢 冰片一錢 丁香二分 赤金五張

【制法】共研極細面，磁瓶裝貯。

【備考】又方：

硃砂 火硝各一兩 礬砂 雄黃各十兩二錢 礬石八兩 冰片 麝香各二兩 大赤金 145 張 制法同上。

【功能與主治】主傷暑腹痛，昏暈吐瀉，肢厥轉筋。

【處方】硃砂一兩 礬砂六錢 麝香三錢 火硝一兩 金礬石四錢（煨） 雄黃六錢（飛） 冰片一錢

【制法】各為極細粉，再合研勻，瓷瓶密封，熔蜡封固，勿使洩氣。

【劑量及用法】每服一分，小兒酌減，涼開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

【功能與主治】因受暑而引起之暈，胸悶，泄瀉。

【處方】牛黃一兩 芫花五錢 斑蝥三錢 菝葜 桃仁霜 胡椒 甘遂（制） 當歸 禹余糧石各一兩 紫苑八錢 蜈蚣七條 細辛 白芍 葯（炒） 檳榔 巴豆霜 葶藶子 大戟 續隨子霜各一兩 黃柏 肉桂 玄精石 香附（制） 玳瑁 羚羊角 芒硝 牙皂 黃玉金各三兩 桑皮一兩 硃砂四兩 大黃 川烏

（制） 藿香 茅朮（炒） 姜半夏 文蛤（去毛） 黃連 厚朴（制）各三兩 山豆根 公丁香各一兩 冰片 腰黃各一兩五錢 茜草 木香 犀角 黃芩各三兩 毛茛蕈四兩 柴胡二兩 琥珀一兩五錢 麝香二兩 陳皮一兩五錢 金銀花三兩 滑石一兩 茯苓三兩 赤豆四兩 紫蘇 丹參 石菖蒲 川芎 檀香各二兩 鬼箭羽四兩 石龍子三條 干姜 麻黃（去節） 白芷 天麻 升麻 草河車各一兩 降香四兩 紅棗四兩 蒲黃 桔梗各一兩

【制法】除石龍子外，余藥共研細粉，將石龍子三條打碎入粉內，再加糯米糊為塊，每塊潮重七分。

【劑量及用法】每次一塊至塊半，溫開水化服。

【禁忌】孕婦忌服。

【功能與主治】治時行痧疫，霍亂轉筋，嘔吐泄瀉，絞腸腹痛，中暑中痰，不省人事，山嵐瘴氣，爛喉癰疹，胸腹脹滿，肝胃疼痛；小兒疳積癰塊，以及外証無名腫毒等症。此丹避疫解穢，升郁利竅，不傷元氣，故凡夏秋感症，皆可服，舟車遠行，尤宜佩帶。

【處方】西牛黃八錢 當門子一兩五錢 北細辛一兩 金銀香一兩五錢 菝葜一兩 檳榔一兩 西琥珀一兩五錢 白胡椒一兩 梅水片一兩五錢 肉桂心三兩 川黃柏三兩 升麻二兩 川蜈蚣（去頭足）七條 蒲黃二兩 白芍一兩 茅茛蕈四兩 桃仁霜一兩 大黃二兩 飛辰砂一兩 玄精石三兩 柴胡一兩 芫花五錢 紫苑八錢 巴豆霜一兩 制川烏三兩 公丁香一兩 制蘇叶二兩 茅蒼朮 香附 羚羊角各三兩 川芎 丹參 明大蘇各二兩 姜半夏 玳瑁 藿香 朴硝各三兩 草河車 石菖蒲各二兩 制甘遂一兩 廣陳皮一兩五錢 葶藶子一兩 杜赤豆四兩 廣木香 文蛤 蘇合油各三兩 當歸 禹余糧石（煨） 紅毛大戟各一兩 川黃連 猪牙皂 犀角尖 廣郁金 滑石 川厚朴各二兩 千金霜一兩 茜草 黃芩 白茯苓各三兩 白檀香二兩 降香四兩 山豆根一兩 鬼箭羽四兩 麻黃 干姜 桔梗 白芷各二兩

雌黃一兩五錢 大黑枣四兩(去皮核) 活石龍子(尾足全)二條(即蜥蜴,以产于浙江天竺及江南焦山者為最佳) 明腰黃一兩五錢 桑白皮一兩 銀花二兩 斑蝥(去頭足)三十個

【制法】上藥七十四味,逐味稱准分磨,用重絹篩,照方取極細淨末,均要生晒,切勿見火,先將枣肉、石龍子搗爛,以糯米粉為糊,將各味和勻杵極熟,愈熟愈妙,每錠重一錢。干燥后以磁瓶收儲,勿令泄氣。

【劑量及用法】每服一錠,重症加倍。小兒減半。開水化服。

【禁忌】孕婦三四月胎氣不足者忌之。如月足胎元實者,遇此急症,不妨酌服。

三、青 島

【處方】檀香 云香 沉香 白芷 甘松 山柰各等分

四、抚 順

【處方】藿香 茵陳 茯苓皮 使君子各一兩 乳香 川軍各五錢 明雄黃八錢 鬼箭羽 紫蘇 茅朮 滑石 小豆 連翹各一兩

【制法】共為細面,蜜丸二錢重,朱砂衣。

五、沈 陽(1)

(犀角避瘟丹)

【功能與主治】清瘟解毒。主傷寒瘟疫,乍冷乍熱,頭痛發燒,神昏譫語,煩渴嘔嗽,癰疹瘡毒。

【處方】紫草二兩 地丁一兩 銀花兩半 公英一兩 核桃仁五錢(先將以上五味用水煎熬成膏) 生地黃一兩 赤芍一兩 土貝母五錢 通遼角五錢 羚羊角三錢 赤牛黃五錢 珍珠三錢 玄參六錢 桔梗一兩 連翹八錢 牛蒡子六錢 明雄黃六錢 冰片一錢 川黃連五錢 熊胆一錢 台麝五分

【制法】后十六味共研細面,與前五味所熬之膏和勻,煉蜜為丸,二錢重,全衣,蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸,小兒減半,白開水送下。

六、沈 陽(2)

【功能與主治】清熱解毒。主傷寒傷風,憎寒壯熱,頭痛身痛,鼻塞聲重,感冒時疫,發痧、瘟疫、瘧疾,風熱、斑疹。

【處方】茅朮 羌活 獨活 白芷 香附 山柰 甘松 川軍 雄黃各一兩 藿香一錢 霍香五錢 牙皂一錢

【制法】共碾極細面,水泛為小丸,朱砂為衣。

【劑量及用法】大人每服四粒,小兒酌減,白開水送下。

【禁忌】忌食辛辣、葱、蒜。

七、吉林、哈爾濱

【功能與主治】芳香化濁,辛溫解表。主霍亂,濕濁中阻,感冒寒涼,頭痛體痛,嘔吐泄瀉,腹痛攪鬧,形寒畏冷,四肢冰涼。

【處方】牙皂二錢五分 防風二錢 細辛二錢五分 藿香 廣皮 蘇合油 桔梗 薄荷 貫眾 枯礬 白芷各二錢 雄黃二錢五分 清半夏 粉草各二錢 朱砂二錢五分(為衣 麝香五分)

【制法】共碾細面(麝香另研后入),水泛為丸,如黃豆大,朱砂研細為衣。瓷瓶存貯。

【劑量及用法】每服三、四丸,姜湯送下。

【禁忌】忌食腥冷,孕婦忌服。

卧 龍 丹

一、天 津

【功能與主治】通關開竅,排穢避瘟。主中暑中疫,感觸痧氣,胸滿煩躁,外感頭痛,吐腹劇痛,霍亂痧症,上吐下瀉,失竅不通。

【處方】灯心炭二斤八兩 牙皂角十二兩 開羊花十二兩 細辛八兩共為細粉兌入:麝香四兩 冰片四兩 牛黃二兩四錢

【制法】以上研細和勻,二分重裝瓶。

【劑量及用法】每次服半瓶,白開水送下。外用聞鼻中少許。

【禁忌】孕婦忌服。

二、

處方刪

三、南 京

【功能與主治】主中惡,中暑痧脹,卒倒昏迷等閉竅急症。

【處方】蟾酥一錢五分 麝香一錢 細牙皂三錢 冰片一錢 荊芥炭三錢 北細辛二錢 灯草炭一兩 開羊花三錢

【制法】上藥生晒共研細末,各取淨粉,共和勻,乳細為度。

【劑量及用法】每用少許,吹入鼻內取嚏。

四、武 漢

【功能與主治】諸痧中惡,不省人事,霍亂肢厥 瘡瘍虫毒。

【處方】麝香二錢 冰片七錢 開羊花一錢 細辛二錢 牙皂七錢 荊芥炭四兩 灯草炭四兩 蟾酥五錢 鵝不食草八錢

【制法】混合碾細,成淨粉 90~95%即得。

【劑量及用法】少許吹鼻。虫蛇咬傷酒調涂。

【禁忌】孕婦忌服。

五、杭州(痧氣臥龍丹)

【功能與主治】治觸痧中惡,霍亂痧氣,絞腸腹痛,吐瀉不出,暑熱內閉,厥冷暈絕以及諸般猝倒,不省人事。夏秋之交,居家遠出皆宜佩帶。

【處方】灯草炭十兩 蟾酥一兩二錢 開羊花二兩 荊芥穗(炒炭)二兩五錢 猪牙皂一兩五錢 北細辛一兩二錢五分 梅冰片二兩八錢 麝香五錢 飛月石二兩五錢 金箔二百張

【制法】上藥晒研細末,磁瓶貯,緊塞勿令泄氣。

【劑量及用法】每用少許,吹入鼻孔。

【禁忌】孕婦忌之。

六、福 州

【功能與主治】治感傷,山嵐瘴

气，腹痛吐瀉，膈食反胃，水土不服，夏天感冒，冬天感寒以及中風、中痰等症。

【处方】西黃一錢 冰片一錢 麝香一錢 細辛一錢 猪牙皂角三錢 開羊花三錢 蟾酥三錢 灯草灰一兩 金箔五十張

【制法】共研細末，磁瓶收貯。

【劑量及用法】少許吹鼻中。

七、南昌

【功能与主治】諸痧中惡，霍亂五絕，諸般卒倒不省人事。

【处方】麝香三錢 梅片七錢 開羊花八錢 細辛一錢 牙皂七錢 荊芥炭四錢 灯草炭四兩 鵝不食草八錢 蟾酥五錢

【制法】共研極細末，瓷瓶收貯，黃蜡封固。

【劑量及用法】每用少許，吹入鼻中，得嚏則愈，垂危重症，亦可用涼開水調灌一分二厘。

【禁忌】孕婦忌服。

八、沙市

【功能与主治】通竅開關。治諸痧，卒倒不省人事。

【处方】麝香 正梅片各一錢 牙皂三錢 牛黃六分 北細辛 開羊花各二錢 灯草灰一兩 硃砂一錢

【制法】共研細末。

【劑量及用法】每次少許吹鼻。

【禁忌】體虛并熱閉及孕婦等忌用。

九、西安

【功能与主治】通關利竅。主治諸般痧症，頭痛腹痛，卒倒不省人事，危急諸症。

【处方】西牛黃 飛金箔各四分 梅片 荊芥各二錢 當門子五分 硃砂六分 猪牙皂角錢半 灯心炭二錢半

【制法】各搗研極細末，和勻，每五分用小玻璃瓶裝貯，木塞口，黃蜡固封，勿令洩氣。

【劑量及用法】輕症以少許吸入鼻孔使之嚏涕，再以少許放入肚臍眼。重症用涼水調灌一至五分。治癰疽發背，疔瘡及蛇、蝎、蜈蚣咬傷，用酒調塗患處。小兒酌減。

【禁忌】孕婦不宜內服。

十、蘭州

【功能与主治】清熱排穢，開竅，避瘟，醒腦。主外科瘡癤初起，皮膚紅腫痛痒，牙疼、牙疳，用此丹擦患處。並治头疼，腹痛，鼻塞不通，昏迷不醒，中宮中惡，嘔吐眩暈。

【处方】灯心炭四兩 蟾酥二錢 麝香一錢 冰片六錢

【制法】共研極細面，裝瓶，每大瓶裝六分，小瓶裝三分。

【劑量及用法】隨症加減，由一分至二、三分，聞鼻中。

【禁忌】孕婦忌用。

十一、濟南

【功能与主治】痰厥氣悶，時疫痧脹，諸般急症。

【处方】灯心炭四兩 牙皂一兩 細辛五錢 鵝不食草五錢 蟾酥一兩半 開羊花一兩

【制法】共研細面，加牛黃一分，麝香三分，冰片六分，每瓶二分封。

【劑量及用法】每用少許，吹鼻取嚏。

十二、沈陽

【功能与主治】通竅，鎮靜，解毒除穢。主痰厥氣閉，感受時疫，痧脹腹痛，吐瀉抽搐。

【处方】犀角一錢 牛黃一錢 麝香一錢 冰片一錢 灯草灰二兩 蟾酥錢半 開羊花三錢 猪牙皂三錢 細辛一錢

【制法】截竹筒將灯心裝滿，椎結塞口，糠火內煨存性，去竹取灰，用金箔白紙，合群藥共碾極細面，研勻磁瓶收儲。

【劑量及用法】遇急症者，用少許吹入鼻內取嚏。

【備考】劇藥。

十三、撫順

【处方】細辛二錢 月石二錢 台麝八分 牛黃五分 冰片二錢 皂角一錢 火硝一錢 蟾酥一錢 灯心炭八錢 赤金三十張 鵝不食草一錢。

【制法】共為細面。

十四、吉林

【功能与主治】避瘟解毒，消腫

暑 濕 寒

通竅，活血。主諸痧，中惡霍亂，癰疽發背，蛇蠍蜈蚣咬傷等症。

【处方】灯心炭一兩七錢 麻黃一錢 冰片二分四厘 川芎一錢四分 白芷二錢 細辛三錢四分 皂角四錢四分 麝香二分 雄黃一錢 蟾酥六分七厘 薄荷一錢四分

【制法】共為細面，瓷罈存貯。

【劑量及用法】每服一分，用開白水送下或吹鼻孔內。

十五、呼和浩特

【处方】灯心炭四兩 猪牙皂一兩 細辛五錢 鵝不食草五錢 開羊花一兩 蟾酥一錢五分

【制法】共為細面，每兩兌牛黃一分，麝香三分，冰片六分，每瓶裝二分。

武紅靈丹

一、天津

【功能与主治】開竅避瘟，解毒去暑。主火竅不開，暑濕郁悶，中暑昏迷，四肢厥逆。

【处方】煅硼砂六錢 淨火硝一兩 煅金礞石四錢

共為細粉兌入：硃砂面一兩 冰片 麝香各三錢 蟾酥面四錢 明雄黃面六錢

【制法】以上研細和勻（火硝與雄黃在一起研時謹防爆炸），二分重裝瓶。

【劑量及用法】聞鼻中少許。

【禁忌】孕婦忌聞。

二、濟南

【功能与主治】受暑受寒，頭痛腹痛，瘟毒痧氣等症。

【处方】煅礞石四錢 煅硼砂六錢 火硝一兩 雄黃六錢 硃砂一兩 冰片三錢 麝香一錢 蟾酥四錢

【制法】研極細粉，裝瓶，每瓶三分。

【劑量及用法】酌量聞之，或吹鼻取嚏。

【禁忌】孕婦忌用。

痧氣飞龙奪命丹

杭州

【功能与主治】芳香避穢，開竅解毒。治痧脹腹痛，霍亂轉筋，厥冷

脉伏，神昏危急及受溫暑瘴疫，穢惡濕濁，眩暈腹悶，昏迷不語。並治小兒驚癇，口噤反張等症。

【處方】西牛黃二錢 飛辰砂二兩 麝香三錢 飛腰黃一兩 珍珠粉三錢 蟾酥一錢五分 梅冰片四錢 猪牙皂三錢 麻黃(去節)四錢 人中白(漂燬)八錢 飛月石三錢 青黛五錢 飛明礞五錢 銀硝一錢五分 甘草炭一兩 金箔三百張

【制法】各研細粉，研和極勻，裝入磁瓶內封固，勿令洩氣。

【劑量及用法】用時吹鼻取嚏，重症再用涼開水調服一分。

【禁忌】孕婦忌用。

避穢回蘇丹

上 海

【功能與主治】因受暑而引起的頭暈，胸悶，泄瀉。

【處方】銀硝二錢五分 麻黃(去節) 冰片各四錢 蟾酥二錢五分 明礞五錢 硃砂二兩 牛黃二錢 青黛五錢 牙皂 麝香各三錢 腰黃一兩 珍珠三錢 灯草灰一兩 月石(飛)三錢 人中白(燬)八錢

【制法】各取細粉，再混合研勻，瓶裝固封。

【劑量及用法】每次一至二分，開水送服。外用嗅鼻取嚏。

【禁忌】孕婦忌用。

周氏回生丹

一、北京、承德

【功能與主治】祛暑散寒，解毒健胃止痛。主中暑受寒，飲食不化，嘔吐泄瀉，腹中絞痛。

【處方】五倍子二兩 檀香三錢 木香三錢 沉香三錢 公丁香三錢 甘草五錢 千金子霜一兩 山慈姑一兩五錢 紅芽大戟一兩五錢 六神柚五兩 共為細粉兌入：麝香三錢 雄黃三錢 冰片二分 硃砂六錢

【制法】上藥和勻，水泛小丸，硃砂為衣。

【劑量及用法】每服十粒(約重五分)生薑湯或溫開水送下。

【禁忌】忌食生冷油膩，孕婦忌服。

服。

二、天 津

【功能與主治】去暑散寒，解毒健胃、止痛。主中暑受寒，霍亂腹痛，嘔吐泄瀉，嘔吐惡心，絞腸痧症(急性腸炎)。

【處方】五倍子二兩 廣木香三錢 甘草五錢 公丁香三錢 檀香三錢 沉香三錢 茅茨菇一兩五錢 千金子霜一兩 紅大戟(醋制)一兩五錢 共為細粉兌入：冰片三分 硃砂六錢 雄黃面三錢 麝香三錢

【制法】以上研細和勻，用神柚面五兩，打糊為丸。每斤丸約用硃砂面八錢上衣，每服八粒(重六分)裝瓶。

【劑量及用法】每次服一瓶，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、大 同

【功能與主治】霍亂轉筋，肚腹疼痛，吐瀉。

【處方】五倍子一兩 檀香 木香 沉香 丁香 麝香 雄黃精各三錢 甘草五錢 千金子一兩 毛茨菇 大戟各一兩五錢 冰片三分 硃砂六錢

【制法】共軋細面，用神柚三兩打糊為小丸，每粒重五厘，每個蜡皮內裝九粒。

【劑量及用法】每次服九小粒，溫水送服。如欲繼服，可遵醫囑。

【禁忌】孕婦忌服。

四、濟 南

【功能與主治】暑熱痧症，腹痛吐瀉。

【處方】五倍子 六神柚(生)各二兩 毛茨菇一兩五錢 紅芽大戟一兩五錢 千金霜一兩 飛硃砂六錢 粉甘草五錢 飛雄黃三錢 廣木香三錢 檀香三錢 公丁香三錢 菴沉香三錢 麝香三錢 冰片三分

【制法】各研細粉，合兌調勻，瓷瓶收貯，勿洩氣，每瓶重三分。

【劑量及用法】大人每服一瓶，小兒酌減，重者二三服。

【禁忌】辛辣油膩等物，孕婦忌服。

五、青 島

【處方】麝香三錢 山慈姑一兩八錢 六神柚二兩 大盆沉三錢 千金霜一兩 公丁香三錢 川文蛤二兩 硃砂六錢 紅毛大戟一兩五錢 上雄黃三錢 梅片二分 檀香三錢 廣木香三錢 甘草五錢

【制法】共研細面，神柚糊為丸，如黃豆大，硃砂為衣，每付八丸。

六、呼和浩特

【處方】麝香三錢 沉香三錢 倍子二兩 雄黃三錢 木香三錢 甘草五錢 冰片二分 辰砂六錢 千金霜一兩 毛茨菇一兩五錢 檀香三分 大戟一兩五錢 丁香三錢 神柚二兩

【制法】共為細面，神柚糊為丸，如黃豆大，辰砂衣，蜡皮封固。每一蜡皮內裝九粒，重四分。

周氏應效丹

沈 陽

【功能與主治】解瘟疫，消毒鎮靜。主痧症，霍亂吐瀉，絞腸痧，心腹痛。

【處方】麝香三錢 沉香三錢 雄黃三錢 木香三錢 甘草五錢 冰片三分 硃砂六錢 檀香三錢 神柚二兩

【制法】共軋極細面，用面糊為小丸。硃砂為衣。

【劑量及用法】每服八丸，小兒四丸。白開水送下。

【禁忌】忌食生冷、油膩等物。

時令救急丹

一、天 津

【功能與主治】清暑除疫，利濕行水，避穢排濁。主時疫傳染，中暑頭昏，四肢厥冷，身燒頭痛，肚脹腹痛，嘔吐泄瀉，嘔吐惡心。

【處方】藿香葉八兩 香薷四兩 公丁香 沉香 白芷 茅茨菇各一兩 檀香二兩 廣木香一兩五錢 木瓜三兩 生神柚六兩 厚朴(姜制)二兩 伏苓(去皮)四兩 紅大戟(醋制) 千金子霜各一兩 共為細粉兌入：冰片三錢 麝香三錢 三分 牛黃三分 薄荷冰一錢五

分 明雄黃面五錢

【制法】以上研細和勻，涼開水泛小丸。每斤丸藥用滑石粉二兩四錢，硃砂面六錢研勻，用桃膠二錢化水上衣闌亮，一錢重裝瓶。

【劑量及用法】每次服一瓶，小兒酌減，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、沈 陽

【功能與主治】清瘟解毒，鎮靜退熱，調整腸胃。主外感風熱，頭痛氣悶，惡心發燒，腹痛吐瀉，痢疾下墜。

【處方】當門子一兩五錢 丁香五錢五分 沉香五兩 甘草二兩五錢 冰片一兩五錢 神曲十兩 文蛤十兩 砂仁二兩 毛慈菇七兩五錢 檀香 兩五錢

【制法】共碾極細面，水調為小丸，硃砂、滑石為衣。

【劑量及用法】每服十丸，病重者服二十丸，輕者服五丸，小兒減半，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

觀音救急丹

一、上海(感應救急丹)

【功能與主治】因受暑而引起之泄瀉。

【處方】月石(飛)二兩 麝香二錢五分 硃砂六兩 薑撥二錢三分 銀硝四兩 冰片二錢五分 明礬(煅)一兩 腰黃六兩

【制法】各取淨粉，共研極細粉。

【劑量及用法】每次服一分，溫開水化服。遵醫師指示服用。

【禁忌】孕婦忌服。

二、杭 州

【功能與主治】祛濕開結，升清降濁。治四時不正之氣，郁悶成痧，卒然腸腹絞痛，吐瀉交作以及寒熱交爭，夏秋一切急症。

【處方】飛辰砂六兩 飛腰黃六兩 薑撥二錢 梅冰片一錢五分 明礬一兩 飛月石二兩 馬牙硝四兩 當門子二錢五分 金箔二百張

【制法】各研細末，和勻封固。

【劑量及用法】每用二至三厘，點于眼角，再用半分納臍中，用煖臍膏貼之。如重症再服一分，用涼開

水調下。

【禁忌】孕婦忌內服。

急救回生丹

沙 市

【功能與主治】治腸胃發炎，吐瀉轉筋，暑熱暴病，諸般痧症，欲吐不吐，胸腹絞痛，頭目眩暈，咽喉腫痛等症。

【處方】硃砂一兩五錢 粉甘草一兩 三梅片三錢 薄荷冰二錢

【制法】上藥研極細末，用玻璃小瓶嚴密裝緊，勿使藥性揮發。

【劑量及用法】成人量每次服一錢，溫開水下。病重者酌量再服，小兒老人酌減。夏感暑熱穢濁服三、四分。

【禁忌】體弱而無炎症者及孕婦忌服。

霍亂救急丹

呼 和 浩 特

【處方】茯苓 丁香 蘇叶 降香 官桂 半夏 生白朮 廣皮 茅朮 藿香 白芷 細辛 牙皂各二兩 廣木香二兩 青木香二兩 月石四錢 礞石 錢 火硝四錢 共為細面兌：明雄黃四錢 硃砂六錢 冰片二錢 麝香二錢

【制法】共為極細面，水泛小丸，如黃豆大，硃砂二錢，雄黃一錢為衣闌亮

濟生立效丹

沈 陽

【功能與主治】燥濕理脾。主受寒受暑，吐瀉下瀉，頭目眩暈。

【處方】茅蒼朮二兩 丁香六錢 麝香二錢 蟾酥一兩 甘草一兩四錢 明天麻一兩六錢 錦紋大黃六兩 麻黃一兩六錢 明雄二兩六錢 金礞石一兩四錢 梅片三錢 馬牙硝三錢 五寶砂一兩四錢 白黃錢半 益沉香三錢

【制法】共碾極細面，懷山藥四錢，煮漿合酒為小丸。

【劑量及用法】每服二至五分，白開水送下。

【禁忌】慢脾風。

勝 利 丹

沙 市

【功能與主治】除熱解暑，傷酒傷食，胃呆惡心，上吐下瀉，感冒疫毒，胸腹脹痛，車船昏悶，水土不服等症。

【處方】小荷二兩四錢 川厚朴三兩 杜子二兩四錢 砂仁四兩八錢 廣陳皮二兩四錢 粉甘草二十兩 馬檳榔二兩 薄荷冰一兩二錢(后入) 三梅片六錢(后入) 廣藿香二兩四錢 西錦紋二兩

【制法】上藥忌用火炒，研為細末，用糯米漿調和，用木板壓成片烘干。

【劑量及用法】每次服半片或四分之一片，小兒酌減。

【禁忌】孕婦忌服。

和 平 丹

禹 縣

【功能與主治】夏令暑熱，頭暈目眩，嘔吐水瀉，肚腹疼痛，飲食不消。

【處方】砂仁 紫蔻 川厚朴各四兩 公丁香二兩 馬牙檳榔四兩 兒茶 肉桂 薄荷冰各二兩 粉甘草二十兩 梨檳榔四兩 麝香五錢 硃砂十兩 廣藿香 粉葛根各三兩 西滑石十兩 冰糖五兩

【制法】共為細面，水為丸，綠豆大，硃砂五兩為衣。

【劑量及用法】每服十粒，水送嚥化皆可。一歲至三歲服一粒。

【禁忌】孕婦忌用。

【備考】有效期半年。

長 春 丹

武 漢

【功能與主治】暑令頭昏目眩，嘔惡腹痛。

【處方】地栗粉 甘草粉各四十五兩 薄荷冰八兩 檀香粉 降香粉 沉香粉各二兩

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于一百粒，以滑石八兩、硃砂六兩合勻為衣。

【劑量及用法】每服二至五分，

開水送下。

臭 靈 丹

吉 林

【功能与主治】祛瘟疫，散熱解毒。主霍亂時疫。

【处方】人參三錢四分 麝香六錢四分 梅片六錢七分 硃砂三錢四分 蟾酥七分 京墨七分 明雄六錢 鴨蛋(一個晒臭)

【制法】共研細面，再加上糯米，打糊為錠，大者七分重，小者三分五厘重，赤金衣，包裝，瓷罇存貯。

【劑量及用法】每服一錠，黃酒送下。

【禁忌】孕婦忌服。

仁 丹

一、北 京

【功能与主治】芳香開竅，健胃止嘔。主中暑嘔吐，腹痛泄瀉，暈車暈船，水土不服。

【处方】甘草八兩 草豆蔻一兩 木香一兩五錢 檳榔 伏苓 砂仁 橘皮 肉桂 小茴香各一兩 公丁香五錢 青果一兩 薄荷冰九錢 冰片三錢 紅花五錢 麝香一分

【制法】共為細粉，糯米粉四兩糊為小丸，硃砂為衣闌亮或毛銀為衣。

【劑量及用法】每服一、二十粒，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天 津

【功能与主治】清暑開竅，避穢排濁。主中暑嘔吐，煩躁惡心，胸中滿悶，胃脘不開，頭目眩昏，暈車暈船，水土不服。

【处方】廣皮五錢 檀香一兩 砂仁一兩 蔻仁一兩 甘草八兩 川木香三錢 公丁香五錢 藿香叶一兩 兒茶一兩五錢 肉桂(去粗皮)三錢 共為細粉兌入，薄荷冰八錢 冰片二錢

【制法】以上研細和勻，用桃膠二兩化水泛小丸。每斤丸藥用硃砂面一兩五錢上赤闌亮。五分重裝袋，五錢重裝瓶。

【劑量及用法】每次一、二十粒，白開水送下，嚼化亦可。

三、大 同

【功能与主治】消化不良，霍亂嘔吐，口臭舌干，中暑神昏。

【处方】麝香一錢一分 訶子五分五厘 川木香五分五厘 丁香一兩一錢 薄荷冰一兩一錢 人造麝香一兩一錢 高麗參一兩六錢 草蔻一兩一錢 硃砂一兩一錢 冰片一兩一錢 杜楠一兩一錢 青果一錢一分 甘草十七兩七錢 蔻仁一兩一錢

【制法】共為細面，水小丸。

【劑量及用法】成人每次二十粒，小孩酌量。

四、承 德

【功能与主治】中暑嘔吐，煩躁痞滿，暈車暈船，水土不服。

【处方】麝香一錢一分 人造香一兩一錢 桂楠一兩一錢 訶子五分五厘 人參一兩六錢 藏青果一兩一錢 川木香五分五厘 草豆蔻一兩一錢 甘草十七兩七錢 公丁香一兩一錢 硃砂二兩一錢 紫豆蔻一兩一錢 薄荷冰二兩一錢 冰片一兩一錢

【制法】共為細粉，水泛小丸。

【劑量及用法】成人每服二十粒。小兒酌減。

五、呼 和 浩 特(濟 仁 丹)

【处方】粉草十兩(切片) 藿香叶三錢 砂仁一兩(另軋兌) 薄荷一兩 檀香一兩 零零香五錢 葛根五錢 大丁香二兩(另軋面) 蔻仁一兩五錢(另軋兌)

【制法】共為細面，每兩細面兌：薄荷冰四分，人造麝香四分，冰片二分。用硃砂八錢，血竭花三錢上赤闌亮。

無 極 丹

北 京

【功能与主治】清熱祛暑，鎮靜止嘔。主夏令暑熱，暈車暈船，嘔吐惡心。

【处方】甘草六兩 石膏十六兩 滑石十二兩 糯米粉二十四兩 砂仁三錢五分 紫豆蔻仁三錢五分 公丁香三錢五分 肉桂三錢五分 麝香三分 牛黃三分 冰片二兩

薄荷冰二兩五錢 硃砂方內用三兩五錢上赤用七兩五錢

【制法】水泛小丸，硃砂為衣闌亮。

【劑量及用法】每服二十粒，小兒酌減，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

濟 世 丹

禹 縣

【功能与主治】大暈惡心，胃口不開，胸腹膨脹，口臭喉熱，飲食不消，中暑吐瀉。

【处方】西滑石二兩 粉甘草一兩 丁香二錢五分 兒茶五錢 樟腦一錢 紫蔻二錢 砂仁二錢 川木香一錢五分 薄荷冰二分 硃砂二錢 麝香一厘為毫

【制法】共為細面，水丸，如菜蕓子大。

【劑量及用法】每服二十粒，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌用。

【備考】有效期二年。

健 民 丹

禹 縣

【功能与主治】中暑吐瀉，暈車暈船，嘔吐惡心，胃口不開，飲酒過度，小兒風熱，夏令暑熱。

【处方】粉甘草一兩 西滑石一兩 硃砂一錢 紫蔻仁二錢 丁香一錢五分 薄荷冰二分

【制法】共為細面，水丸，滑石、硃砂為衣，如菜蕓子大。

【劑量及用法】每服十五粒或二十粒，白開水送下。一歲服二粒，大者酌加。

【禁忌】寒症忌用。

【備考】有效期二年。

防 疫 丹

一、沙 市

【功能与主治】治夏季暑濕，蘊結頭痛，惡寒發熱，腹鳴嘔吐水瀉等症。

【处方】法夏六兩 廣陳皮一兩 佩蘭叶二兩 粉甘草三兩 蘇叶一兩五錢 蒼朮一兩 白芷二兩 廣藿香四兩 厚朴二兩 神曲四兩

香附四兩 檳榔二兩 砂仁二兩
伏苓六兩 薄荷冰四錢

【制法】共研極細末。

【劑量及用法】每服一錢，溫開水下。輕者日服一次，重者日服二次。小兒乙、酌減。

【禁忌】水份不足、無寒濕纏結者忌服。

二、重 庆

【功能与主治】提神醒腦，寬中解郁，寧神定志，口舌煩渴，惡心嘔吐，昏厥打撲，通利腸胃，生津止渴。

【處方】牛黃六錢 麝香一錢 蟾酥一錢 梅片六錢 大黃一兩 甘肅四兩 細辛七錢五分 硃砂一兩 白朮一兩五錢 薄荷冰四兩

【制法】牛黃、麝香、蟾酥、梅片、薄荷冰、硃砂另乳，余藥共研細末，玻璃瓶裝，每瓶一錢包裝。

【劑量及用法】二分至三分。

方 應 錠

一、北京、承德(1)

【功能与主治】祛暑解毒止血。主中暑中風，吐血衄血，咽喉腫痛及小兒熱症，疔無名腫毒。

【處方】乳香 沒藥 胡黃連 兒茶 香墨各一兩零五十六兩

共為細粉，每五百七十六兩細粉化，麝香一兩六錢 冰片二兩一錢

【制法】上藥和勻，用牛胆汁三百六十兩為錠，每兩約作二百粒，每十六兩十金衣四十張。

【劑量及用法】每服十五粒，日服二次，溫開水送下，小兒每服五粒，三歲以下者酌情遞減。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天 津

【功能与主治】清熱解毒，活血通便。主小兒急熱驚風，中暑大昏，吐血、衄血，咽喉腫痛，口舌生瘡，牙齒疼痛，大便不通，小便赤黃。

【處方】香墨一斤 兒茶 胡連 黃連各八兩

共為細粉兌入：冰片四錢八分 牛黃 麝香各四錢

【制法】以上研細和勻，每一斤藥面兌：牛胆汁八兩為丸，一錢重（約二十粒）裝袋。

【劑量及用法】每次服一袋，遇少小兒服二、三粒，四、五歲酌加，白開水送下。

【禁忌】孕婦及小兒慢脾風者忌服。

三、上 海

【功能与主治】受暑不活，乳蛾。

【處方】乳香(制) 沒藥(制) 方兒茶 墨各十兩 麝香 冰片各二分六厘

【制法】共研細粉，用牛胆汁打糊為錠。

【劑量及用法】每服三至五分，用涼開水送服。

四、南 京

【功能与主治】清熱，鎮驚。主小兒痰熱，驚風抽搐。

【處方】制乳香 制沒藥 胡黃連 方兒茶 京墨各一兩二錢 麝香 冰片各一錢

【制法】共研細末，冰片、麝香另研乳細后加和勻，用牛胆汁略為熬熱不見痕，濾清和藥末做錠。胆汁須酌量和水，以適宜為度。每粒重五兩。一料用金箔一百二十張為衣。密藏。

【劑量及用法】每服二至三粒，一日一次，開水服。

五、武汉(解熱鎮靜錠)

【功能与主治】風熱痰壅，口眼歪斜，牙疳喉痹，霍亂瘧痢，血熱便血，癰瘡腫毒，及疔毒攻心等症。

【處方】陳京墨一兩 兒茶 川黃連 胡黃連各一兩 冰片六分 麝香五分 熊胆二錢 西牛黃五分

【制法】取上藥混合碾細，按淨粉量加米粉50%，用適量水，煮成糊狀，和成為錠，每錢不得少于二十粒。

【劑量及用法】內服每次三至五分，熱湯送下。外用以醋研敷。

【禁忌】孕婦慎服。

六、杭 州

【功能与主治】解毒消腫，利竅止血。治中風，中痰，中暑，中寒，半身不遂，口眼歪斜，喉閉乳蛾牙疳，霍亂瘟疫瘧痢，血熱便血，斑疹傷寒黃病，疔毒內攻。小兒痘症驚風，兼疔外科無名腫毒等症。

【處方】同武漢。

【制法】各取淨粉，用人乳和糊為錠，形如鼠屎，金箔為衣。

【劑量及用法】每服四至六分，小兒減半，開水化服。外症用醋磨敷。

【禁忌】孕婦忌之。

七、南 昌

【功能与主治】喉閉乳蛾，牙疳口瘡，瘟疫發斑，小兒痘症驚風及無名腫毒，便血痔瘡等症。

【處方】同武漢。

【制法】各藥分研為細粉，合勻再用人乳合糊為丸，如梧桐子大，金箔為衣。

【劑量及用法】內症每服五分至一錢，小兒減半，三歲以下酌減服，溫開水化下，外症用醋研敷患處。

【禁忌】孕婦忌服。

八、沙 市

【功能与主治】治中暑喉閉，小兒驚風，疔毒攻心，無名腫毒等症。

【處方】陳香墨二兩 兒茶一兩 川黃連七錢五分 胡黃連一兩 共研細末再兌：牛黃五分 熊胆一錢 麝香五分 正梅片五分 赤金箔一札

【制法】用人乳和糊為丸，(亦可用牛乳代)金箔為衣，如枸杞子大。

【劑量及用法】內症每服四至五粒，小兒服一至二粒，熱湯化下。外症用醋磨敷。

【禁忌】無熱者及孕婦忌服。

九、重 庆

【功能与主治】中風中痰，口眼歪斜，半身不遂瘧痢便血，疔毒攻心，無名腫毒等症。

【處方】京墨 孩兒茶各二兩 胡黃連一兩 冰片六分 麝香 牛黃各五分 熊胆二錢 川黃連一兩

【制法】各取淨粉，人乳汁合丸，金箔為衣，玻璃瓶包裝，每重五分。

【劑量及用法】每服四粒，小孩減半，內用開水磨服，外用酒酸磨服。

【禁忌】孕婦勿服。

十、西 安

【功能与主治】主治小兒驚風，發熱抽搐，以及各種局部性炎症，如

口腔炎，耳下炎，喉炎，扁桃腺炎，牙齦炎，以及皮膚局部炎症。

【处方】胡連 川連 兒茶各一斤 熊胆 麝香 梅片各五錢 古墨斤半

【制法】面糊為錠，形如鼠糞，赤金為衣。

【劑量及用法】一歲小兒每次一、二錠，一天三次，用涼開水化服，外用醋化為膏塗佈。

【備考】病癒後停服，不應作常藥服。

十一、蘭州

【功能與主治】清熱，健胃，通便。主內熱大暈，咽喉腫紅，口舌生瘡，鼻出血牙疼，大便不通。

【处方】香墨一斤 兒茶八兩 胡黃連四兩 黃連二兩 冰片二錢 牛黃三分 麝香三分

【制法】共為細面，牛胆汁為錠。

【劑量及用法】大人每服一錢重，週歲小兒每次服二三粒。

【禁忌】孕婦忌服。

十二、大同

【功能與主治】臟火熾盛，便血吐血衄血，小兒積熱，痢疾，疔毒，瘡癤，夏令服之，可預防熱病。

【处方】乳香 沒藥 胡連 兒茶 香墨各一斤 冰片一兩五 麝香七錢

【制法】共為細末，以牛奶汁為錠，金箔衣，一錢十六粒。

【劑量及用法】成人每次可用十六粒，小兒不滿一歲者一粒，每增一歲加服一粒。

十三、禹縣

【功能與主治】喉閉牙疳，痰火中風，瘟疫傷寒，小兒驚風，血熱溫毒，婦女月經，中暑霍亂，乳蛾等症。

【处方】沉香墨十二兩 兒茶四兩 牛黃 冰片 熊胆 麝香各一錢 黃連 胡黃連各六兩

【制法】共研細面，江米面糊為錠。

【劑量及用法】每服三錠，將錠研開，開水送下。小兒每服一錠。

【禁忌】孕婦忌用，虛弱忌用。

【備考】有效期二年。

十四、濟南(1)

【功能與主治】中暑頭眩，咽喉紅腫，鼻衄口瘡等症。

【处方】乳香 沒藥 胡連 兒茶 碎墨 各等分

【制法】共為細面，每二十六片，兌麝香、冰片各二兩六錢，用牛胆汁為錠，每錠一斤，用大赤金三十張為衣。

【劑量及用法】大人每服五分至一錢，小兒酌減，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

十五、濟南(2)

【功能與主治】急熱驚風，牙疳乳蛾，一切瘡癤，無名腫毒等症。

【处方】同武漢。

【制法】各研淨粉，兌合研勻，再用生乳調合為丸，如梧桐子大，赤金為衣。

【劑量及用法】成人內服每次四、五分，小兒一、二分，白水送下。外敷用好醋研敷患處。

【禁忌】忌食辛辣油膩等物；孕婦忌服。

十六、沈陽(1)

【功能與主治】解毒清熱，降心火。主咽喉腫痛，牙齦腐爛，腹痛痢疾，人便膿血，大暈腦脹，睡臥不安，便血尿血，咳血衄血，斑疹內攻，神昏譫語，打毒腫痛，小兒驚風。

【处方】京墨二兩 兒茶 胡黃連 川黃連各一兩 冰片六分 麝香 牛黃各五分 熊胆二錢

【制法】各取淨粉，再用牛乳合糊為丸，如麥粒狀，金箔為衣。

【劑量及用法】用熱湯化下，內証每服二分五厘至五分，小兒減半，外証如醋研敷。

【禁忌】孕婦忌服。

十七、沈陽(2)

【功能與主治】解毒清熱。主咽喉腫痛，牙齦腐爛，痢疾，頭暈目眩，便血尿血，咳血衄血，斑疹余毒，疔毒腫痛，小兒急驚。

【处方】同武漢。

【制法】各研極細面兌勻，再用糯米面為丸，如麥粒狀。

【劑量及用法】用熱湯化下，內証每服二分五厘至五分，小兒減半。

外症用醋研敷。

【禁忌】孕婦忌服。

十八、撫順(金鼠矢)

【功能與主治】清火解毒，涼血舒風消火。主風火喉痹，喉蛾，牙疳，瘟疫，斑疹傷寒，痘毒驚風，卒然昏倒，四肢拘急，壯熱，神昏譫語，狂躁，衄血，不眠，咳血便血，干嘔煩渴，肝膽濕熱，口臭齕腫，便燥溺澀。

【处方】黑墨二兩 胡連一兩 黃連五錢 熊胆二錢 牛黃一錢 冰片八分 麝香三分 兒茶一兩

【制法】共為細面，熊胆汁為錠金衣。

【劑量及用法】大人每服一錢，小兒隨年齡酌用，白水送下。

【禁忌】忌食辛辣；孕婦忌服。

十九、吉林、哈爾濱 (神效萬應錠，金鼠矢)

【功能與主治】清火解毒，涼血疏風。主治：

(1) 中風：風火交加，卒然昏倒，四肢拘急，口眼歪斜。

(2) 中痰：體肥痰盛，迷塞清竅，氣機阻滯，窒息暈倒，痰鳴漉漉，口角流涎。

(3) 中暑：冒暑勞役，炎日遠行，卒然昏倒，自汗氣短，煩渴思冷，脈虛體熱，火痛休痛，眩暈躁煩。

(4) 喉蛾乳蛾，咽喉腫滿，勢將閉塞，滴水難嚥，疼痛悶亂。

(5) 牙疳：肝胃炎熱，牙齦腐蝕，癰爛痛痒，氣息腥臭。

(6) 瘟疫：瘟疫邪熱，壯熱神昏，譫語煩渴，躁狂嘔吐，衄血不眠，氣促便結。

(7) 附霍亂：濕濁內熱，感受暑淫，發熱畏冷，吐瀉交作，頭痛體痛，攪鬧煩渴。

(8) 赤痢：濕熱凝滯，發為痢疾，滯澀膿血，里急後重，腹痛下墜，泛噦干嘔。

(9) 血熱妄行：晡熱蒸燒，頭暈腦脹，夜寐多驚，心煩意亂或發衄血，咳血，便血，溲血，便秘。

(10) 斑疹：疹沒太速，瘟毒潛伏，遍體發斑，形如云片，顏色青紫，壯熱神昏，煩躁口渴，譫語狂妄。

(11) 傷寒：傷寒傳經，邪入陽明，干嘔煩渴，氣促臭穢，神昏譫語，便結溲澀，壯熱如蒸，苔黃脈實。

(12) 黃疸：肝胆濕熱，遍體橙黃，便結澀絳，脇脘脹痛，泛嘔口渴，頭脹眩暈。

(13) 疔毒攻心：疔毒走黃，毒起攻心，神昏不省，爪甲青暗。

(14) 小兒痘症：痘毒內陷，腐爛腥臭，麻昏體熱，抽搐口噤。

(15) 驚風：痰火素盛，外受驚恐，神散氣亂，發為急驚，壯熱煩渴，痰壅氣促，牙關緊閉，四肢搐搦。

(16) 無名腫毒：堅腫痛癢，發無定處，內服外敷，可以消散。

(17) 腫瘡：內腫生瘡，潰流毒水，久不斂口，痛癢難堪，內服外敷，毒熱可解。

【處方】京墨二兩 兒茶 胡黃連 川連各一兩 冰片 麝香（當門子）各六分 牛黃五分 熊胆二錢

【制法】各研取淨面，再用人乳和糊為丸，如梧桐子大，搓成鼠矢形。大赤金為衣。用油紙包，外用玻璃紙封固。瓷罈存貯。

【劑量及用法】內疔每服四、五分，小兒減半，熱湯化下。外証用醋研敷。

【禁忌】忌食辛辣；孕婦忌服。

二十、承德(2)

【功能與主治】中暑頭眩，咽喉紅腫，鼻衄口瘡，無名腫毒。

【處方】香墨二兩 兒茶 川黃連 胡黃連各一兩 冰片六錢 麝香五分 牛黃五分 熊胆二錢

【制法】各藥均研為淨粉，再同人乳合糊為丸，如鼠屎大，金箔為衣。

【劑量及用法】每服一錢（十五粒），白開水送下。外症用好醋研敷患處。

【禁忌】忌食辛辣油膩等食物；孕婦忌服。

二十一、呼和浩特

【處方】占墨一斤 兒茶一斤四兩 胡黃連二兩 黃連二兩 熊胆二錢五分 冰片一錢

【制法】前上金衣時，每斤再上麝香四分，冰片二錢（共為極細面），先將墨用上乳一斤發用，再將群藥合在一處，手拈為小錠，每斤用赤金四十張為衣。

回陽救急酒

南昌

【功能與主治】陰寒霍亂，吐瀉交作，手足厥冷，轉筋，唇淡面白並治陰寒腹痛。

【處方】公丁香一兩 肉桂一兩 樟腦一兩

【制法】前二味藥研粗末，稀布袋盛裝入有嘴瓷壺，灌入頂上干酒三斤，壺口用布午時浸備用（壺口及嘴封固）。

【劑量及用法】每服十至二十滴，冷開水沖服，（不可太熱沖服）十分鐘未效，再服二十滴，轉筋者可以用酒擦患處。

【禁忌】酒後重不暢者忌服，忌食生冷瓜果。

金銀花露

一、上海

【功能與主治】清熱解毒。

【處方】金銀花八十兩

【制法】用蒸餾法成露四百八十兩。

【劑量及用法】每服二至四兩。

二、武漢

（忍冬花露）

【功能與主治】暑熱煩渴，痧痘癰疔，血痢梅毒，小兒胎毒諸症。

【處方】金銀花二斤

【制法】取金銀花一公斤，按“芳香劑蒸餾法”蒸餾，俟溜液達十六公升時，如不澄明，則濾過一次，使成澄明的溶液，嗅味與金銀花一致，即得。

【劑量及用法】每服一杯，不拘時服，暑熱代茶極妙。

三、重慶

【功能與主治】開胃寬中，養血清火，散暑解毒，止渴稀痘。

【處方】金銀花五斤

【制法】用金銀花裝入蒸餾器內，置爐上微火蒸汽成露，玻璃裝包。

【劑量及用法】不拘。

鮮藿香露

上海

【功能與主治】清涼解暑。

【處方】鮮藿香八十兩

【制法】用蒸餾法成露二百二十兩。

【劑量及用法】每服一至四兩。

六和茶

福州

【功能與主治】調和六氣（即風、寒、暑、濕、燥、火）。

【處方】藿香一兩五錢 川朴一兩 杏仁一兩五錢 半夏一兩 木瓜一兩五錢 赤苓二兩 蒼朮一兩五錢 人參一兩 扁豆二兩 甘草五錢 茶葉四兩 砂仁五錢

【制法】共研粗末。

【劑量及用法】加姜棗煎湯服。

安全片

禹縣

【功能與主治】胸膈滿悶，開胃順氣，火熱上升，心煩口渴。

【處方】川厚朴一錢 砂仁一錢 花粉八錢 白芍五錢 梔子一錢 粉甘草一兩 廣丁香五分 桑皮五錢 煅石膏四錢 藿香五分 廣陳皮五錢 紫菀仁五分 冬花五錢 薄荷冰六分

【制法】共為細面，白砂糖汁為薄片。

【劑量及用法】每服五分，白開水送下，小兒每服二分。

【禁忌】寒症忌服。

【備有】有效期一年。

救急水

重慶

【功能與主治】提神醒腦。主治氣郁，翻胃，暈船，胸悶腹脹等症。

【處方】廣木香 公丁香 大茴香 肉豆蔻各五錢 細辛四錢 廣橘皮五錢 單撥五錢 生大黃一兩五錢 厚朴八錢 牙皂五錢 良姜三錢 蒼朮八錢 藿香六錢 石菖蒲五錢 吳茱萸四錢 安桂三錢 白蔻三錢 干酒五斤

【制法】共研粗末，浸入酒內二十天后，去渣另加樟腦一兩，薄荷冰五分，玻璃包裝。

【劑量及用法】每次用二十滴至

三滴，六、七岁兒童每次用五至十滴，開水冲服。

【禁忌】孕婦忌服。

救急痧藥水

天 津

【功能与主治】强心醒腦，和胃整腸，去暑散寒，解毒鎮痛。主中暑發痧，頭目眩暈，肚熱畏寒，胸悶腹痛，嘔吐下瀉，紅白痢疾，暈車暈船，水土不服，瘡疹虫咬，虫牙作痛。

【处方】藿香六兩 豆蔻二兩 蟾酥四錢 良姜二兩 陈皮二兩 樟腦一兩 大茴香二兩 广木香二兩 薄荷冰五錢 香薷四兩 桂皮四兩 公丁香二兩 細辛二兩 大黃六兩

【制法】除樟腦、薄荷冰、蟾酥外，余藥共軋成粗粉，加入白干酒十斤，浸漬一星期（每天攪拌兩次，攪后蓋嚴），然後壓榨過濾，再將樟腦、薄荷冰放入乳鉢內共研細，再將蟾酥搗碎加入適量白干酒泡，俟溶化后過濾，連同樟腦、薄荷冰兌入前液，使成六千毫升（即十二斤）。每瓶裝六毫升（一錢九分二厘）。

【劑量及用法】輕症每次服半瓶，重症每次服一瓶，兒童酌減，涼開水冲服。

【禁忌】孕婦忌服。

【備考】放置陰涼處，用時將藥水搖勻。

燥 火 類

三 黃 丸

一、上 海

【功能与主治】便秘，目赤，口瘡。

【处方】大黃（煨） 黃芩 黃連 各等分

【制法】共研細粉，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服一錢至三錢，溫開水送服。

【禁忌】孕婦忌服。

二、南 京

【功能与主治】主目赤，頭痛，口舌生瘡，煩躁便秘，小便赤澀，熱癰火瘡等症。

【处方】同上海。

【制法】上藥生晒，共研細末，沸水泛丸，每錢約八十粒。

【劑量及用法】每服一錢至三錢，一日一次或二次，開水吞服。

三、武 漢（清熱三黃丸）

【功能与主治】頭痛目赤，口舌生瘡，煩躁便秘，小便赤澀，瘡癰五痔，肛門腫痛及下膿血等症。

【处方】同上海。

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于二十粒。

【劑量及用法】每服一錢至三錢。

四、濟 南

【功能与主治】口舌生瘡，大便秘結等症。

【处方】同上海。

【制法】共為粗末，黃酒拌蒸晒干，再為細粉，水泛小丸，綠豆大。

【劑量及用法】每服二至三錢，白開水送下。

【禁忌】辛辣油膩等食物。

五、青 島

【处方】大黃 黃芩 黃柏

【制法】共軋細面，水泛小丸。

六、承 德

【功能与主治】口舌生瘡，大便秘結等症。

【处方】同上海。

【制法】共為細粉，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服一錢至三錢，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

七、杭 州（清熱三黃丸）

【功能与主治】治臟腑積熱，目赤頭痛，口舌生瘡，胸膈煩熱，溲赤便秘，瘡癰痔血等症。

【处方】同上海。

【制法】共研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服一錢五分至三錢。小兒減半，清茶或開水送下。

附參考古方

【來源】1. 沈氏尊生書。

【功能与主治】積熱。

【处方】煨大黃 黃芩 黃連 等分

【制法】蜜丸。

【劑量及用法】熱水下下，五十丸。

2. 沈氏尊生書。

【功能与主治】熱中。

【处方】黃連 黃柏 大黃

黃連上清丸

一、北 京

【功能与主治】清熱通便。主眼赤咽痛，口舌生瘡，便秘結。

【处方】黃連 黃芩 黃柏 梔子各八兩 菊花 當歸各四兩 桔梗 葛根 薄荷 玄參 大花粉 川芎各二兩 姜黃（土衣用） 連翹各六兩 大黃十二兩

【制法】共為細粉，水泛小丸，用方內姜黃為衣，或煉蜜為丸，重二錢。

【劑量及用法】每服水丸二錢或蜜丸二丸，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌飲酒食厚味，孕婦忌服。

二、天 津

【功能与主治】消炎解熱，清火散風。主頭昏耳鳴，牙根腫痛，口舌生瘡，咽喉紅腫，暴發火眼，人便燥結，小便赤黃。

【处方】黃連八兩 生梔子四斤 川芎二斤 芥穗四斤 防風二斤 黃芩四斤 連翹（去心）四斤 桔梗四斤 黃柏二斤 生石膏二斤 菊花八斤 薄荷二斤 大黃十六斤 白芷四斤 甘草二斤 復花一斤 牛蒡子四斤

【制法】共為細粉，水丸一涼開水泛小丸，一錢重裝袋，蜜丸一煉蜜為丸三錢重，蠟皮或蠟紙筒封固。

【劑量及用法】水丸，每次服一袋，蜜丸，每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、上海、沙市

【功能与主治】眼赤咽痛，口舌生瘡，大便秘結，小溲熱赤。

【处方】黃連四兩 桔梗一兩 姜黃一兩 黃柏四兩 薄荷一兩 白菊花二兩 山梔子（炒焦）四兩

玄參一兩 天花粉 兩 連翹二兩
大黃(制)八兩 白芷 二兩 葛根
一兩 黃芩四兩 川芎 一兩

【制法】共研細粉，水泛為丸如綠豆大。

【劑量及用法】每服一錢至三錢，溫開水送服。

四、承德

【功能與主治、處方】同上海。

【制法】共研細粉，水泛為丸，姜黃滑石為衣，每兩分作二百粒。

【劑量及用法】日服二次，每次廿粒，溫開水送下。

【禁忌】忌食油膩。

五、南京

【功能與主治】清熱降火。主目赤咽痛、口舌生瘡、唇焦鼻燥、大便秘結。

【處方】同北京。

【制法】上藥共十五味，共研細末，用溫沸水泛丸，每錢約做一百粒。

【劑量及用法】每服二錢至三錢，一日一次，食後開水吞服。

六、武漢

【功能與主治】咽痛眼痛，口舌生瘡，鼻赤鼻衄，大便秘結等症。

【處方】同北京。

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少於三十粒。

【劑量及用法】每服二錢至三錢，開水或白蜜湯送下。

【禁忌】忌食葷膩。

七、福州

【功能與主治】治上焦積熱，眼痛咽痛，口舌生瘡，心膈煩熱，肺火上升，風熱鼻赤等症。

【處方】同北京。

【制法】共研細末，和蜜為丸。

八、杭州

【功能與主治】治內熱蘊積，目赤腫痛，咽痛口瘡，胸膈煩熱，熱升鼻赤，溲赤便秘等症。

【處方】同上海。

【制法】共研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服三錢，清茶或開水送下。

九、南昌

【功能與主治】心膈煩熱，口舌生瘡，咽喉腫痛，牙齒疼痛，暴發火眼，鼻赤，大便秘結。

【處方】同北京。

【制法】共研細末，煉白蜜為丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每日服二次，每服三錢五分，溫開水送下。

十、重慶

【功能與主治】治上焦積熱，眼痛咽痛，口舌生瘡，心膈煩熱，肺火上升，風熱鼻赤等症。

【處方】同北京。

【制法】共研細末，水泛為丸，紙盒包裝。

【劑量及用法】三錢。

十一、西安

【功能與主治】有整理消化，降低血壓，消炎解熱，瀉下之功。主治急性腸胃炎，便秘，血壓過高，頭部充血，五官等部發炎充血各病症。

【處方】黃連八錢 黃芩一兩六錢 黃柏四錢 大黃四錢 山梔一兩六錢 連翹四錢

【制法】共研細粉，涼開水泛成丸如綠豆大。

【劑量及用法】大人一日服二次，每次服二、三錢，小兒按年齡服用，開水送下。

【禁忌】衰弱人或久瀉後所發之五官發炎等症忌服。

十二、蘭州

【功能與主治】消炎解熱。主頭昏腦脹，牙根腫痛，口舌生瘡，咽喉紅腫，耳痛耳鳴，暴發火眼，小便赤黃。

【處方】黃連八錢 人黃二十五兩 薄荷 防風 粉草 川芎 石膏 黃柏各二兩二錢 天花粉一兩六錢 連翹 黃芩 芥穗 荊子 白芷 梔子各六兩四錢 杭菊十二兩八錢

【制法】共研細面，水泛為丸，蜜丸三錢重，蜡皮封固。

十三、大同

【功能與主治】頭目暈眩，口舌生瘡，上焦風熱，大便秘結。

【處方】黃連 大黃各十六斤

菊花八斤 連翹 梔子 芥穗 桔梗 荊子 白芷 黃芩各四斤 薄荷 防風 石膏 黃柏 甘草 川芎各二斤 旋花一斤

【制法】共研細面，水為小丸。

【劑量及用法】每服三錢，茶送下。

【禁忌】孕婦禁忌。

十四、禹縣

【功能與主治】上焦積熱，口舌生瘡，咽喉腫痛，牙齒疼痛，暴發火眼，大便秘結。

【處方】同北京。

【制法】共為細面，水泛丸，如藏子大。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。滿十歲者服一錢。

【禁忌】孕婦忌用，寒症忌用。

【備考】有效期一年。

十五、濟南

【功能與主治】口舌生瘡，咽喉腫痛，牙齒疼痛，暴發火眼，大便秘結。

【處方】大黃 黃芩 赤芍各八兩 生梔子 連翹 當歸 川芎 薄荷 荊芥各五兩 菊花 花粉各四兩 桔梗 元參 甘草 黃連各二兩

【制法】共為細末，水泛丸如小豆大，黃柏四兩為衣。

【劑量及用法】成人每服二錢，小兒酌減，白開水送下。

【禁忌】辛辣刺激等食物。

十六、青島(1)

【處方】黃連半斤 大黃十六斤 菊花八斤 防己 川芎 甘草二斤 黃柏 石膏 薄荷二斤 白芷 連翹 黃芩 枝子 荊穗 蔓荊子 桔梗各四斤 旋復花一斤

【制法】共軋細面，水泛小丸。

十七、青島(2)

【處方】大黃 黃芩 甘草 黃連各一兩 黃柏 赤芍 梔子 連翹 菊花 當歸 川芎 薄荷 荊芥 桔梗 花粉 元參各四兩 石膏五兩

【制法】共為細面，水泛小丸。

十八、青島(3)

【處方】大黃 黃芩 赤芍 生

內 科

地 連翹 菊花 當歸 川芎 薄荷
荷 荊芥 桔梗 花粉 元參各四
兩 黃連 甘草各一兩 黃柏 石
膏各五兩

【制法】共軋細面，水泛為小丸。

十九、沈陽

【功能與主治】清火瀉熱，解毒涼血。主咽喉疼痛，口舌生瘡，胸膈煩熱，目痛鼻赤，牙痛腮腫，食慾不振，大便燥結，小便赤澀。

【處方】同北京。

【制法】共碾極細面，水泛為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】虛弱者忌服。

二十、撫順

【功能與主治】清火生津，辛涼解熱。主郁火上灼，頭暈目眩，火眼暴發，耳鳴鼻干，口瘡唇裂，牙痛腮腫，鼻衄煩熱，舌上喜冷，燥渴貪飲。

【處方】黃連五兩（一方一兩半）薄荷五兩 羌活二兩 歸尾八兩 大黃十兩 荊芥四兩 木賊二兩 桔梗四兩 菊花 生地各五兩 黃柏 防風 黃芩 山梔 連翹各五兩 白芷三兩 梔子三兩 川芎三兩 甘草二兩

【制法】共為細面，水泛小丸，黃連面為衣。

【劑量及用法】每服二錢，茶送下。

【禁忌】忌食辛辣。

二十一、吉林（上清丸）

【功能與主治】生津液，去浮火，解煩渴，除鬱悶，效可清熱，功能解燥。主上焦郁火，頭昏目眩，暴發火眼，耳鳴鼻干，唇破口糜，齒痛腮腫，鼻衄煩熱等症。

【處方】生地 大黃 黃柏 連翹 菊花各八兩 荊芥 黃芩 防風 川芎 赤芍 生石膏 桔梗 薄荷 甘草 黃連各四兩 白芷二兩

【制法】將以上十六味藥，共為細面，水泛為小丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】大人每服二錢一分，日服二次，早晚飯後一小時，用

茶水為引，十一歲至七歲，每服一錢，七歲至四歲每服五分。

【禁忌】忌食辛辣，孕婦忌服。

二十二、哈爾濱

（上清丸）

【功能與主治】清火生津。主上焦火。

【處方】生地 大黃 黃柏 黃芩 連翹各八兩 菊花六兩 荊芥 防風 川芎 赤芍 石膏（半） 桔梗 薄荷 甘草 黃連各四兩 白芷二兩

【制法】共碾為細面，水泛為小丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每服一付（二錢），白開水送下。

【禁忌】忌食辛辣。

【備考】裝入紙袋密封。

二十三、呼和浩特

（附：黃連上清膏）

【處方】大黃 黃芩 赤芍各二斤一兩五 梔子 當歸 連翹 川芎 薄荷 荊芥各一斤四兩 菊花 花粉各一斤一兩四 桔梗 元參各一斤半 黃連 甘草各五兩五

【制法】共為細面，水泛小丸，姜黃衣。

【備考】黃連上清膏照前原方熬，每斤膏加：大黃面四兩 黃連面二兩

上清丸

一、昆明

【功能與主治】清熱消炎。主口燥唇焦，咽喉腫痛。

【處方】兒茶二兩 馬櫛榔二兩 薄荷四兩 月石二兩 烏梅一兩 粉草一兩 洗片一兩

【制法】訶子口豆根煎水為丸。

【劑量及用法】每包分三次用完，噙化或開水送服。

【禁忌】香燥食物。

二、青島

【處方】川芎一斤 連翹 白芷各六斤 防風二斤 大黃十二斤 菊花六斤 荷薄荷一斤 桔梗二斤 黃柏四斤 黃芩一斤 梔子二斤 荊芥一斤

【制法】共軋細面，水泛小丸。

芍菊上清丸

一、北京

【功能與主治】清熱散風止痛。主感冒風寒，鼻塞大痛。

【處方】黃芩一百二十兩 菊花二百四十兩 桔梗 梔子 連翹 防風 蔓荊子 荊芥穗各三十兩 甘草 黃連 羌活 川芎 薄荷各二十兩 藜蘆四兩 白芷八十兩 共十五味，計七百二十四兩。

【制法】共為細粉，水泛小丸，滑石為衣闌亮。

【劑量及用法】每服二錢，體虛者酌減。

二、禹縣

【功能與主治】上焦火盛，偏正頭疼，鼻塞耳鳴，大面發熱。

【處方】生大黃 牛梔子 川芎 防風 桔梗 白菊花 黃芩各六兩 荊芥三兩 滑石四兩 生甘草九兩 薄荷三兩 黃柏九兩

【制法】共為細面，水丸如綠豆大。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】寒症忌用。

【備考】有效期二年。

三、濟南

【功能與主治】上焦風火，頭疼頭暈，目赤鼻塞等症。

【處方】同北京。

【制法】共為細粉，水泛小丸，滑石五斤為衣闌亮。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】辛辣油膩等食物。

四、青島

【處方】大黃 黃芩 菊花 黃柏 桔梗各半斤 薄荷 川芎 滑石各一斤 梔子二斤

【制法】共軋細面，水泛成小丸。

五、呼和浩特

【處方】川芎 黃連 桔梗 防風 荊芥 花粉 細辛 元參各一斤四兩 甘草 歸尾 薄荷 梔子

枳壳各一斤九兩 黃芩二斤八兩
熟軍 連翹 蔓荊子各一斤九兩
菊花一斤四兩 白芷二斤八兩

【制法】共為細面，水泛小丸。

牛黃上清丸

一、北京、承德

【功能與主治】瀉熱消腫，疏風止痛。主頭眩目赤，口燥舌干，齒齦腫痛，耳鳴便秘。

【處方】黃連八兩 大黃二兩五十六兩 連翹 黃芩 荊芥穗 梔子 桔梗 蔓荊子(微炒) 白芷各六十四兩 薄荷 防風 石膏(生) 黃柏 甘草 川芎各二兩 旋復花十六兩 菊花一百二十八兩

共為細粉，每十六兩細粉兌，牛黃五分 冰片三錢

【制法】上藥和勻，煉蜜為丸，重二錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌食辛辣物，孕婦忌服。

二、天津、蘭州

【功能與主治】清火散風，潤便解熱。主入腦昏暈，暴發火眼，口舌生瘡，咽喉腫痛，牙齒疼痛，頭面生瘡，大便燥結，身熱口渴。

【處方】黃連八錢 生石膏四兩 黃芩二兩五錢 薄荷葉一兩五錢 連子心二兩 白芷八錢 桔梗八錢 菊花二兩 川芎八錢 赤芍八錢 當歸二兩五錢 黃柏五錢 芥穗八錢 牛梔子二兩五錢 大黃四兩 甘草五錢 連翹(去心)二兩五錢 以上十七味，共為細粉，每細粉一斤十二兩三錢兌，硃砂面六錢 雄黃面六錢 牛黃一錢 冰片五錢

【制法】以上研細和勻，煉蜜為丸，二錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下(蘭州早晚各服一次)。

【禁忌】孕婦忌服。

三、大同

【功能與主治】入目火熾，口舌生瘡，耳鳴。

【處方】牛黃三錢 黃連八錢 大黃二兩五兩 連翹 黃芩 芥穗 梔子 桔梗 蔓荊子各六兩四錢 生石膏二兩 錢 白芷 薄荷 防

風各六兩四錢 冰片八錢 黃柏 甘草 川芎各二兩二錢 復花一兩六錢 菊花一兩八錢 薄荷冰一兩

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢。

【禁忌】孕婦忌服。

四、濟南

【功能與主治】頭眩耳鳴，口燥舌干，牙疼喉腫，身熱煩渴等症。

【處方】同北京、承德(但冰片二兩四兩，牛黃一兩五錢)。

【制法】除冰片，4黃另研兌其他羣藥為細粉，煉蜜為丸，重二錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】辛辣食物，孕婦忌服。

五、青島

【處方】大黃一兩五 黃芩一兩 黃連一兩 赤芍四兩 黃柏四兩 梔子六兩 連翹四兩 菊花四兩 當歸四兩 川芎四兩 薄荷四兩 荊芥四兩 桔梗四兩 花粉四兩 元參四兩 甘草一兩 石膏五兩 冰片三錢 牛黃六分

【制法】共為細面，蜜丸二錢，蜡皮封固。

六、沈陽

【功能與主治】清熱解毒。主頭痛目赤，牙痛齦腫，舌燥咽干，口瘡腮腫。

【處方】黃連五錢 菊花五錢 麥冬五錢 胆南星四錢 廣角四錢 黃芩四錢 山梔四錢 伏苓三錢 當歸三錢 杭白芍三錢 琥珀三錢 川芎三錢 柴胡三錢 桑皮三錢 龍胆草三錢 黃卷三錢 桔梗三錢 花粉三錢 防風三錢 薄荷葉三錢 天竺黃三錢 法夏一錢 甘草二錢 牛黃一錢五分 麝香一錢 片硃砂三錢 梅片三錢 雄黃三錢

【制法】除牛黃，麝香，片硃砂，梅片，雄黃，琥珀另研外，余則共碾極細末，煉蜜為丸，七分重，小丸三分五厘，蜡皮封固。

【劑量及用法】大人每服一丸，開白水送下，小兒五歲以上者服一小丸，五歲以下服半小丸。

【禁忌】孕婦忌服。

七、撫順

【功能與主治】清涼消炎，解熱鎮驚。主凡溫熱病，傷寒發疹，熱侵內臟，神昏壯熱，譫語煩渴，狂燥不眠，小兒驚癇，卒然抽搐，昏厥癱瘓，角弓反張等。咽喉音啞，咳嗽氣喘，扁桃腺腫痛等症。神經病發狂，哭笑無常，癲呆昏迷，狂亂奔跑，言語錯亂。普通一切熱病，頭痛入暈，吐血衄血，齒膜炎，結膜炎，角膜炎，齒痛等均能治之。

【處方】牛黃一錢五分 沙參三錢 犀角五錢 白朮二錢 琥珀三錢 山芎三錢 柴胡三錢 云苓三錢 元參四錢 白芍三錢 當歸四錢 麝香五分 山梔四錢 花粉三錢 龍胆草三錢 桔梗三錢 防風三錢 冰片二錢五分 黃卷三錢 硃砂三錢 寸冬五錢 甘草三錢 薄荷三錢 雄黃三錢 天竺黃三錢 胆星四錢 法夏三錢

【制法】共為細面，蜜丸，一錢四分或七分重，蜡皮封。

【劑量及用法】大人每服一大丸，小兒每服一小丸，均用白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服，虛寒無火便溏者忌服之。

八、呼和浩特

【處方】生川軍 熟軍各四兩 桑芩 黃柏 生梔 黃連 薄荷 生地各二兩 川芎二兩 苦參三兩 元參二兩 石膏二兩

【制法】共為細面，蜜大丸，重二錢，蜡皮。

犀角上清丸

呼和浩特

【處方】黃連 犀角 苦參 黃柏 花粉 生地 防風 荊芥 牛子 石膏 桔梗 全日 連翹 赤芍 黃芩 薄荷 甘草 菊花 川芎 元參 生梔各三兩

【制法】共為細面，水泛小丸，青黛衣。

滋陰甘露丸

濟南

【功能與主治】虛火上焰，口爛

腫痛，吐血衄血，口瘡等症。

【处方】生地二十兩 熟地二十兩 天冬十二兩 枇杷叶一斤 石斛一斤 酒黃芩十兩 枳壳八兩 茵陳六兩 元參二兩 甘草六兩 麥冬十二兩

【制法】共為細末，煉蜜為丸，梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】辛辣油膩、動火之物。

生津丸

沈 陽

【功能與主治】生津止渴斂汗。主胸中煩熱，唇燥舌干，咽喉腫痛，口渴自汗。

【处方】白糖 烏梅 薄荷 柿霜 礬砂各一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸五分重。

【劑量及用法】每服一丸或二丸，口內含化。

附參考古方

【來源】沈氏尊生書。

【功能與主治】發渴。

【处方】白糖 烏梅 薄荷 柿霜 礬砂

【制法】蜜丸。

【劑量及用法】噙化。

梔子金花丸

一、北 京

【功能與主治】瀉熱潤燥，生津止渴。主頭暈目眩，鼻干出血，牙痛咽腫，口舌生瘡。

【处方】梔子 黃芩 大黃各二百八十八兩 黃柏 天花粉各一百四十四兩 知母九十六兩 黃連十二兩

共七味 一千二百六十兩

【制法】共為細粉，水泛小丸。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌辛辣食物，孕婦忌服。

二、天 津

【功能與主治】清肺降火，消炎解熱。主入唇身熱，口舌生瘡，暴發火眼，牙齒疼痛，耳鳴鼻出血，咽喉

腫痛。

【处方】黃芩三斤 牛梔子 大黃各一斤十二兩 黃柏 花粉各十九兩 知母十兩 黃連一兩二錢 銀花一兩

【制法】水丸 一涼開水泛小丸，二錢重裝袋。蜜丸——煉蜜為丸二錢重，蜡皮或紙筒封固。

【劑量及用法】水丸每次服一袋，蜜丸每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、南昌（黃連解毒丸）

【功能與主治】火熱病症。狂燥心煩，口燥咽干，火熱干嘔，錯語不眠，吐血衄血，熱盛發斑。

【处方】梔子 黃連 黃柏各一兩 黃芩五錢

【制法】共研細末，水泛為丸如綠豆大。

【劑量及用法】每日服二次至三次，每服一錢至二錢，白開水送下。

【禁忌】非火熱實症不可應用。

【備考】非經醫師處方不得使用。

四、昆 明

【功能與主治】急性目痛，渴飲煩燥，人便秘結，口唇潰瘍。

【处方】黃連 黃柏各四兩 黃芩 梔子 酒軍 銀花 枳梗 薄荷各十六兩 甘草八兩

【制法】水磨為丸。

【劑量及用法】每服二錢半，幼童減半，開水送服。

【禁忌】體質衰弱者忌服。

五、濟 南

【功能與主治】肺胃實熱，牙齒腫痛，暴發火眼，煩燥便秘。

【处方】梔子（炒） 大黃 黃連（炒） 黃芩各一兩 黃芩五錢

【制法】共為細粉，水泛為丸如綠豆大。

【劑量及用法】每服二至三錢，白開水送下。

【禁忌】辛辣油膩等食物。

六、沈陽（金花丸）

【功能與主治】清火解毒。主煩燥心熱，口渴咽干，嘔吐呃逆，夜間失眠，耳道疼痛，暴發火眼。

【处方】同南昌。

【制法】共碾極細面，水泛小丸。

【劑量及用法】每服二錢，空心白開水送下。

【禁忌】辛辣油膩。

七、承 德

【功能與主治】肺胃實熱，牙齒腫痛，暴發火眼，煩燥便秘。

【处方】同天津。

【制法】共為細粉，水泛小丸。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，白開水送下。

八、呼和浩特

（附：梔子金花膏）

【处方】大黃十斤 黃連五斤 黃柏 黃芩 生地各六斤半

【制法】共為細面，水泛小丸。

【備考】梔子金花膏照前方熬，每斤蜜膏再加：大黃面四兩 黃連面 蘇梔子面各二兩

附參考古方

【來源】1. 雜病証治類方（大金花丸）。

【功能與主治】虛勞

【处方】黃蘗 黃芩 黃連 山梔各一兩

【制法】上為細末，水丸小豆大。

【劑量及用法】每服一百丸，溫水下，日二、三服。

2. 素問病機氣宜保命集。

【功能與主治】大便秘，米谷完出，驚悸，瀉血淋瀝，欬血衄血，白頭痛稍熱肺痿後，服金花丸。

【处方】黃連 黃柏 黃芩 山梔各一兩

【制法】上為細末，滴水為丸如小豆大。

【劑量及用法】每服一百丸，溫水下，日二、三服。

清 火 丸

昆 明

【功能與主治】清熱解毒

【处方】桔梗 連翹各十六兩 甘草 梔子各八兩 薄荷六兩 黃芩 竹葉各四兩

【制法】研末為丸。

【劑量及用法】每服一丸，水磨每服一錢半，幼童減半，開水送服。

【禁忌】體弱感寒勿服。

凉膈丸

一、济南

【功能与主治】治五臟火，六經積熱，煩躁作渴，口舌生瘡，牙齒作痛，暴發火眼，酒毒滯熱，痰火壅盛等症。

【处方】梔子 連翹 薄荷 竹叶 黃芩 甘草 大黃 芒硝各半斤 木通 花粉 元參 麥冬各四兩

【制法】共為細粉，水泛為小丸。

【劑量及用法】每服三錢，蜜湯送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、吉林、哈爾濱

(涼膈丹)

【功能与主治】降火清熱，瘧病，胃火。

(一) 瘧病：表里實熱，中焦燥實，煩躁多渴，頭昏目赤，吐血衄血，頭腫結硬。大小便秘，壯熱發斑，譫語狂妄。

(二) 胃火：臟腑積熱，口舌生瘡，口臭自促，唇焦咽燥，二便秘結，牙痛口澀。

【处方】川大黃(酒浸)二兩 芒硝一兩 連翹(去心)一兩 子條芩(酒炒)一兩 炙甘草六錢 梔子仁八錢(炒) 薄荷叶七錢 竹叶二錢 (一方加生石膏二兩)

【制法】共研為細面，煉蜜為二錢重丸。除零售包裝外，用玻璃瓶貯存。

【劑量及用法】每服一丸，重症二丸，小兒減半。

【禁忌】人便溏泄，四肢清冷，內無實熱者忌服，忌食辛辣。

清火涼膈丸

一、青島

【处方】桔梗 連翹 黃芩 梔子 防風 升麻 葛根 白芍各二兩 薄荷 荆芥 炙草 石膏各三兩 黃連 熟軍各一兩 黃柏 元參 生地 花粉各二兩

【制法】共軋細面，水泛小丸。

二、呼和浩特

【处方】黃連 防風 酒芩 桔梗 薄荷 連翹 梔子 升麻 杭

芍 甘葛 甘肅 荆芥 熟軍各六兩 黃柏 花粉 生地 白芷各十兩二錢 石膏一斤二兩 元參六兩

【制法】共為細面，水泛小丸。

高麗清心丸(高麗丸)

一、吉林

【功能与主治】去火清熱，安神定志。邪火沖心。

【处方】野軍 生石膏 甘草 滑石各六錢七分 硃砂二錢 牛黃七分 黃芩一兩 黃連 寒水石各三錢四分 梅片七分

【制法】將以上藥品共為細面，制為丸劑，大丸一錢四分重，小丸七分重，入赤金為衣，將制成之丸劑用油白紙包成四稜形，包裝或放于瓷罐中保存。

【劑量及用法】每服一大丸，用白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、撫順

【功能与主治】苦寒，消炎緩瀉。主頭痛齒痛，齒膜腫痛，齒齦腫痛，唇焦口臭，暴發火眼，結膜腫痛，吐血鼻衄，頭熱眩暈，便秘尿赤，鼻干耳鳴，以及小兒疹後毒熱不淨，牙疳等症。

【处方】寒水石 生石膏 黃芩 甘草 知母 黃柏 滑石 大黃 山梔各一兩 黃連 硃砂 雄黃各五錢 川牛黃各一錢

【制法】共為細面，蜜丸一錢四分重，蜡皮封。

【劑量及用法】大人每服一丸，小兒酌量用之，白水送下。

【禁忌】孕婦忌服，忌食辛辣等物。

清胃丸

沈陽

【功能与主治】清胃腸實熱，通二便秘結。主頭痛目暈，牙痛齦痛，牙宣伏衄，鼻中衄血，暴發火眼，便秘溺赤，腹滿喉痛，口唇焦裂。

【处方】野軍二兩四錢 黃芩八錢 丑四錢 胆星二錢 滑石八錢 檳榔三錢 白芷二錢 川芎二錢 木通二錢 芒硝三錢

【制法】共軋細面，煉蜜為丸二錢重。

燥 火 類

【劑量及用法】每服一丸，茶水送下。

牛黃清胃丸

撫順

【功能与主治】清胃瀉熱。主胃熱火盛，牙疼唇破，齒膜腫痛，齒齦炎腫，頭痛目赤，舌干口臭，暴發火眼，便秘溺赤，衄血吐血，煩渴喜冷等症。

【处方】川軍二兩五錢 黃芩一兩五錢 白芷八錢 二丑二兩 干北一兩 生石膏一兩五錢 胆星五錢 木通八錢 羌活五錢 冰片一兩 南紅花五錢 牛黃五分

【制法】共為細面，蜜丸二錢重，蜡皮封。

【劑量及用法】每服一丸，白水送下，早晚兩次。

【禁忌】孕婦忌服，忌食辛辣酒類。

清胃黃連丸

一、北京

【功能与主治】清胃解熱，消腫止痛。主口燥舌干，咽喉腫痛，齒齦腐爛。

【处方】黃連 丹皮 連翹 生地 石膏(生) 天花粉 桔梗 知母 赤芍 玄參各八十兩 梔子 黃芩 黃柏各二百兩 甘草四十兩 共十四味計一千四百四十兩

【制法】共為細粉，水泛小丸，滑石為衣圓亮。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌辛辣食物，孕婦忌服。

二、天津

【功能与主治】消炎退熱，清胃降火。主口燥舌干，牙齒疼痛，牙根出血，腮頰腫痛，口臭咽痛，舌苔黃厚，飲食無味。

【处方】黃連 生石膏 花粉 知母 連翹(去心) 生地 桔梗 元參(去蘆) 赤芍 丹皮各五斤 甘草二斤八兩 黃芩 生梔子 黃柏各十二斤八兩 共十四味九十斤

【制法】共為細粉，水丸一涼開水泛小丸，二錢重裝袋。蜜丸——煉蜜為丸，二錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】水丸——每次服一袋。蜜丸——每次服一丸，白开水送下。

三、蘭 州

【功能与主治】消炎退热，健胃止渴。主口燥舌干，牙齿疼痛，牙龈出血，口臭，腮颊肿痛咽痛，舌苔黄厚，饮食无味等症。

【处方】同天津。

【制法】以上共轧细粉，水打小丸或蜜丸三钱。

【剂量及用法】每次服用三钱重，开水送下。

四、大 同

【功能与主治】心胃火熾，口舌生疮，牙痛，咽喉痛。

【处方】黄连 丹皮 连翘 生地 生石膏 花粉 桔梗 知母 赤芍 元参各五斤 栀子 黄芩 黄柏各二斤半 甘草四十两

【制法】共轧细面，水为小丸。

【剂量及用法】每服三钱，白开水送下。

五、济南、承德

【功能与主治】口舌生疮，牙疼唇裂。

【处方】同天津。

【制法】共为细粉，水泛为丸绿豆大。

【剂量及用法】每服二钱，白开水送下。

【禁忌】辛辣油腻等食物

六、青島、呼和浩特

(附：清胃黄连膏)

【处方】陈皮 厚朴 香附 黄芩 栀子 枳实各半斤 半夏 枳壳各六两 苍朮 山楂各五两 黄连四两 甘草三两 砂仁 木香各一两

【制法】共轧细面，水泛小丸。

【备考】清胃黄连膏照前方熬，每斤蜜膏再兑：黄连面二两 生栀子面二两。

七、吉林、哈尔滨

(清胃丸)

【功能与主治】清胃泻热。胃热火盛，牙痛唇焦，口糜舌腐，齿龈溃烂，口流涎涎，烦渴喜冷，气息穢臭，

头痛目赤，便秘便结。

【处方】连翘 栀子 野军 朴硝 川芎 黄芩 薄荷 知母 生石膏 丹参 生地 防风 陈皮 甘草各一两 黄连 黄柏各五钱

【制法】将以上药品共碾细面，水泛为小丸如梧桐子大，即成此品，貯于瓷罐中。

【剂量及用法】每服二钱，空腹白开水送服。

【禁忌】忌食辛辣，孕妇勿服。

清 宁 丸

一、北 京

【功能与主治】清理胃腸，瀉热潤燥。主停滯飲食，腹肋膨脹，头晕口苦，大便秘結。

【处方】大黄一千九百二十兩(用黄酒九百六十兩蒸熟) 牛乳一百六十兩 綠豆 黑豆 厚朴 車前草 香附 麦芽 白朮 桑叶 側柏叶 橘皮 半夏各八十兩 桃树枝十六兩

【制法】以上十二味共熬湯，去渣取汁和牛乳約一千二百八十兩，將前蒸的大黃再入罐內，用汁子蒸一晝夜，晒干，共为細粉，煉蜜为小丸。

【剂量及用法】每服二钱，温开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

二、天 津

【功能与主治】清理腸胃，瀉热潤便。主飲食停滯，腹肋膨脹，头昏耳鳴，口燥舌干，咽喉不利，兩目紅赤，牙齒疼痛，大便秘結，小便赤黄。

【处方】大黄十斤 黄酒五斤 赤豆 大麦 黑豆 槐条 桑条 黄芩 車前草各一斤 厚朴(姜制) 陈皮 白朮(麸炒) 法半夏 香附(醋制)各八兩

【制法】以上药除大黄黄酒外，其余十一味共熬透去渣滓淨，再將大黃砸成小块，用黄酒药汁拌勻，共裝罐內(或用不生鏽的桶)連續蒸黑为度，倒出晒干，碾成細粉，煉蜜为丸三钱重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

三、上海(青麟丸)

【功能与主治】目赤便秘，小溲热赤。

【处方】大黄二十斤 牡丹皮 地骨皮 澤瀉 薄荷 赤茯苓 川石斛 黄柏 側柏 玄参 連翘 木通 当归 知母 車前子 猪苓 陈皮 生地 川芎 薤白 青鹽 韭菜各八兩 鮮藕 甘蔗各一斤

【制法】先將大黃用米泔水浸透，切開晒干，用鮮藕甘蔗打汁拌蒸，再將余药煎汁拌蒸，至黑为度，然后晒干研細粉，用黄酒和水泛丸如绿豆大。

【剂量及用法】每服一钱半至三钱，温开水送服。

【禁忌】刺激性食物

四、南 京

(青麟丸、延寿丹)

【功能与主治】主实热为病之口瘡目赤，心煩，飽脹，大小便秘及热刺尿血等症。

【处方】西大黃十斤

【制法】第一次制法：將大黃切碎，置木甑內蒸至透熟，取出晒干。

第二次制法：將鮮藕汁一斤，甘蔗汁二斤，韭菜汁四兩，將熟大黃放入拌勻浸透，俟汁完全浸干后，再放入木甑內作第二次蒸制，約蒸至4小时，取出晒干。

第三次制法：以下列二十一种藥品，煎成汁，再以熟大黃放入浸透，俟吸完后，作第三次蒸制，置木甑內再蒸四小时，取出晒干。

藥品：

牡丹皮 地骨皮 澤瀉 薄荷 茯苓 黄柏 連翘 川石斛 側柏叶 木通 当归 知母 生地 黑元参 車前子 猪苓 甘草 人貝母 苡仁米各一两 青鹽三钱

第四次制法：將蒸透之熟大黃，用黄酒二斤再浸透，作第四次蒸制，再蒸約四小时后，取出晒干，研为細末。

第五次制法：用蜜水搓为小丸，每钱約一百二十粒。

【剂量及用法】每服一至二钱，一日二次，食前开水吞服。

【备考】服后小便黄赤，不必疑忌。

五、福州 (十五制清宁丸)

【功能与主治】治五臟湿毒火毒热毒，痢疾初起，里急后重，水腫臃脹，胸脘飽悶，吐血齒血，溺血便血，遺精白濁，舌上生瘡，隨症引服俱从大便所出。

【处方及制法】錦紋大黃拾斤 第一次無灰酒 第二次綠豆汁 第三次麦芽汁 第四次料豆汁 第五次槐叶汁 第六次桑叶汁 第七次桃叶汁 第八次車前汁 第九次川朴汁 第十次廣皮汁 第十一次半夏汁 第十二次苧朮汁 第十三次香附汁 第十四次黃芩汁 第十五次側柏汁

每次俱用側柏叶墊底，蒸透晒干研末，和入乳、童便、雪梨、藕汁泛丸。

六、杭州(二十四制清宁丸、青麟丸)

【功能与主治】治臟腑積熱，濕熱穢毒，眼目赤腫，熱郁頭痛，咽痛牙痛，口鼻熱瘡，食積腹痛，濕熱黃疸，痢疾初起，里急后重，淋濁澀痛，瘡腫熱毒，以及婦人經水不調，產後瘀血作痛等症。

【处方】錦紋大黃(酒拌蒸三日晒干) 鮮桑叶 鮮側柏叶 鮮桃叶 鮮槐叶

【制法】以木鮮叶墊底蒸透取出晒干，每大黃一斤后藥各用七錢。一次用藕汁拌蒸晒干。二次用甘蔗汁拌蒸晒干。三次用赤苓湯。四次用澤瀉湯。五次用豬苓湯。六次用鮮車前子湯。七次用川黃柏湯。八次用川朴湯。九次用炒白朮湯。十次用薄荷湯。十一次用米仁湯。十二次用當歸湯。十三次用韭菜。十四次用牡丹皮湯。十五次用木通湯。十六次用川石斛湯。十七次用連翹湯。十八次用陳皮湯。十九次用半夏湯。二十次用川草薢湯。二十一次用地骨皮湯拌蒸晒干。二十二次用元參湯拌蒸晒干。二十三次用知母湯。二十四次用甘草湯。

以上均拌蒸透，晒干研為細末，用黃牛乳梨汁陳酒和蜜水泛丸。

【劑量及用法】每服二至三錢，小兒減半，開水送下。

七、南昌

【功能与主治】赤白下痢，傷寒熱結便秘及癰疽積聚，留飲宿食等症。

【处方】西莊大黃(酒浸)適量

【制法】九蒸九晒研末，生蜜水為丸如綠豆大。

【劑量及用法】每服一至三錢，日服一至二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦慎用。

八、沙市

【功能与主治】治風熱上壅，頭痛眩暈，齒齦腫脹，咽腫喉痛，口舌糜爛，便秘溺赤等症。

【处方】大黃(生)一斤 薄荷叶 木五錢

【制法】先將大黃切片，加酒煮爛晒干，同薄荷叶共碾為末，水泛為丸，再用蜜炒。

【劑量及用法】成人量每次服二三錢，空腹溫開水下，每日服二次，小兒老人酌減。

【禁忌】體弱而無炎症者忌服。

九、重慶(青麟丸)

【功能与主治】去五臟濕熱穢毒，並治白痢。

【处方】大黃五十斤

【制法】以米泔水浸濕，切片晒干，酒一斤浸一夜，用鮮側柏叶鋪底，蒸二鐘取出晒干，再用：綠豆一斤 黑豆一斤 麦芽一斤 槐花一斤 桑叶一斤 桃叶一斤 柳叶一斤 車前草一斤 小茴香一斤 橘皮八兩 薄荷八兩 共同蒸水，加干酒十斤浸透，用鮮側柏叶鋪底蒸二鐘，使甘銀花八兩 蘇叶八兩 白朮八兩 艾叶八兩 法半夏八兩 厚朴八兩 黃芩八兩 香附八兩 砂仁八兩 甘草八兩 澤瀉八兩 豬苓八兩 共同熬汁，加白酒十斤浸透，用鮮側柏叶鋪底蒸兩鐘晒干，煉蜜加牛乳二兩和陳酒為丸，紙盒包裝。

【劑量及用法】二錢至三錢。

十、昆明

【功能与主治】大小便不利，吐血鼻衄。

【处方】大黃十斤 柏叶二斤 荷叶五十个 車前草六斤 藕汁三

斤

【制法】水疊為丸

【劑量及用法】每服一錢半，幼童減半，開水送下。

【禁忌】體弱失血者忌服。

十一、蘭州

【功能与主治】健胃潤腸利便。主大便秘結，小便赤黃，腹滿疼痛，唇干口渴，眼睛發紅。

【处方】大黃十斤

【制法】用大麥 黑豆 槐條 桑條 車前各一斤 川朴 陳皮 白朮 法夏 香附各八兩 黃芩一斤 黃酒三斤 煎藥熬汁三次，用黃酒加藥汁拌大黃三次，蒸三次，以蒸黑為度，再軋細面，蜜作小丸或大丸。

【劑量及用法】每次服用二錢重，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

十二、大同

【功能与主治】清三焦積熱，通便秘，清肺利胃。

【处方】大黃一百斤 綠豆三斤 厚朴一斤 車前子一斤 麦芽一斤 桑叶一斤 半夏半斤 黑豆一斤 香附一斤 白朮一斤 陳皮一斤

【制法】先將大黃研細面放鍋內，用黃酒十斤兌水，以微火煮一天，晒干軋面，其次將以上十味藥煮汁約五斤，再將大黃面拌入鍋內，再煮一天，俟水尽取出，晒干軋面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服三錢，茶水送下。

【禁忌】孕婦禁服。

十三、禹縣

【功能与主治】腸胃積熱，頭目不清，大便燥結，小便赤黃。

【处方】西大黃十斤(黃酒浸九蒸九晒)

【制法】六碾細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢，開水送下，小兒五歲服一錢。

【禁忌】孕婦忌用，虛弱忌用。

【備考】有效期一年。

十四、濟南(青麟丸)

【功能与主治】腸胃積滯，頭目眩暈，齒齦腫痛，大便燥結。

【处方】西大黄生五十斤(研細)

【制法】用黃酒五十斤，九浸九蒸九晒為細面，加適量煉蜜為丸如綠豆大，或杵搗成棒，切片浸服亦可。

【劑量及用法】成人每服一錢至二錢，白開水送下。

【禁忌】辛辣刺激等食物，孕婦忌服。

十五、沈陽

【功能與主治】通便利尿，清火瀉熱。主大痛牙痛，暴發火眼，口瘡潰爛，耳聾耳鳴，吐血衄血，牙疳口臭，胸悶不食，小便赤澀，熱淋作痛。

【處方及制法】用野錦紋軍十斤切厚片，按下法制：

一次用木通一斤熬水泡之。二次用綠豆半斤熬水泡之。三次用大麥半斤熬水泡之。四次用合豆半斤熬水泡之。五次用香附一斤熬水泡之。六次用川朴一斤熬水泡之。七次用炒車前一斤熬水泡之。八次用槐樞桑葉各八兩熬水泡之。九次用廣皮半斤夏各八兩熬水泡之。十次用白朮黃芩各八兩熬水泡之。十一次用姜汁牛乳童便各一碗攪均泡之。十二次用藕節八兩熬水泡之。十三次用無灰酒四斤拌均泡之。

晒干後，共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下，一日二次。

【禁忌】五辛烟酒，孕婦忌服。

十六、撫順

【功能與主治】利便利尿，清火解毒。肝火火盛，頭暈目眩，耳鳴目赤，火眼暴發，鼻干唇裂，口臭齒痛，齦腫舌燥，喉痛咽干，腸胃內熱，便結閉塞，面發酒刺，納少思飲，膀胱內熱，小便不利，少腹脹痛，尿不成泡，濕熱淫毒，潛連膀胱，發為淋濁，尿道疼痛，濃汁稠穢，腸內便血，入腸積熱，先血後便。

【處方】川軍十斤(第一次用木通一斤，二次用綠豆二斤，三次用大麥一斤，四次用黑豆三斤，五次用香附一斤，六次用川朴一斤，七次用車前一斤，八次用陳皮半夏各五兩，九次用白朮黃芩各五兩，

十次用姜汁三碗，十一次用藕節五兩)。

【制法】以上俱熬汁泡晒，九蒸九晒，共為細面蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服二錢，一日兩次，白開水送下。

【禁忌】辛辣。

十七、吉林

(秘制清寧丸、二十四制清寧丸、十五制清寧丸、九制清寧丸)

【功能與主治】利便利尿，清火解毒。肝火便秘，小便不利，腸風便血等症。

【處方】錦紋川大黃十斤

【制法】將大黃去毛，先用淘米泔水浸半日，取出切片晒干，再入陳黃酒內浸一日，取出晒大半干。

第一次用大甌一口，取鮮側柏葉蓋敷面上，蒸一炷香，取出晒干。

第二次用綠豆三升熬濃汁拌大黃，仍用柏葉鋪蓋，(以後每日均用柏葉鋪蓋)蒸一炷香晒干。

第三次用大麥三升，熬濃汁拌大黃如前蒸晒。

第四次用黑豆二升，熬濃汁拌大黃如前蒸晒。

第五次用槐米一斤，熬濃汁拌大黃如前蒸晒。

第六次用桑葉一斤，熬濃汁拌大黃如前蒸晒。

第七次用桃葉一斤，煎濃汁拌大黃如前蒸晒。

第八次用車前葉一斤，煎汁拌大黃蒸晒。

第九次用厚朴八兩，煎汁拌大黃蒸晒。

第十次用陳皮八兩，煎汁拌大黃蒸晒。

第十一次用半夏八兩，煎汁拌大黃蒸晒。

第十二次用白朮八兩，煎汁拌大黃如前蒸晒。

第十三次用香附八兩，煎汁拌大黃蒸晒。

第十四次用黃芩一斤，煎汁拌大黃如前蒸晒。

第十五次用黃酒三斤，拌蒸如前三炷香時，取出晒干，碾為細面，煉蜜為極小丸如高粱米大，玻璃瓶或磁罐貯存。

【劑量及用法】每服二錢，病重

者日服二次。

【禁忌】忌食辛辣。

十八、哈爾濱

(秘制清寧丸、二十四制清寧丸、十五制清寧丸、九制清寧丸)

【功能與主治】利便利尿，清火解毒。肝火，肝火火盛，頭暈目眩，耳鳴目赤，火眼暴發，鼻干唇裂，口臭齒痛，齦腫舌燥，喉痛咽干，便秘，腸胃內熱，便結閉塞，氣臭煩躁，口苦咽干，面發酒刺，納少思飲，小便不利，膀胱內熱，小便不利，少腹脹痛，尿不成泡，淋症，濕熱淫毒，潛蓄膀胱發為淋濁，尿道疼痛，膿汁稠穢，腸風便血，大腸積熱，絡脈受傷，先血後便，症名近血。主肝火，便秘，小便不利，淋症，腸風便血。

【處方】同吉林，制法亦同。

【劑量及用法】每服二錢，病重者日服二次。

【禁忌】忌食辛辣

十九、呼和浩特

(加料清寧丸)

【處方】當歸一兩二錢 川芎連翹 生石膏 菊花各八錢 白芷六錢 九參 生地 黃芩各二兩 薄荷五錢 黃柏五錢 生梔 花粉甘草各五錢 川軍八兩 黃連四錢 酒軍二兩

【制法】共為細面，蜜丸重二錢，蜡皮。

附參考古方

【來源】銀海指南。

【功能與主治】治一切熱病

【處方和制法】大黃十斤(須錦紋者，切作小塊如棋子大)

用好酒十斤，先將泔水浸大黃，浸透，以側柏葉鋪甌，入大黃蒸過晒干，以酒浸之，再蒸晒收干。另用：桑葉 桃葉 槐葉 大麥 黑豆 菉豆各一斤

每味煎汁蒸收，每蒸一次，仍用側柏葉鋪甌蒸過晒干，再蒸再晒，制後再用：

半夏 厚朴 陳皮 白朮 香附 車前各一斤

每味煎汁，蒸收如上法，蒸過晒干，再用好酒十斤制透，煉為梧子大丸。

【剂量及用法】每服一二錢，或为散亦可。

九制大黄丸 (清宁丸)

一、武 汉

【功能与主治】腹痛下痢，大便秘结，癰疽积聚，宿食留飲。

【处方】大黄一斤九蒸九晒

【制法】取上药进行干燥，混合碾细，照淨粉量加煉蜜50~52%，並黃酒八錢达成小丸，每錢不得少于五十粒。

【剂量及用法】每服二錢至三錢。

【禁忌】孕妇忌服。

二、青 島

【处方】大黄二斤 当归 生地 白芍各半斤 赤芍六兩 川芎 麻仁 郁李仁 柏子仁各四兩 紅花八兩

【制法】共研細面，照方泡制，先將当归、紅花取汁浸大黄，再加羣药，煉蜜为小丸。

三、承 德

【功能与主治】滋陰降火，通腸利便。

【处方】熟軍 北苣藤子各十一斤四兩 菟絲子 枳壳 板榔 澤瀉 杜仲 怀牛膝各九斤六兩 山藥 防風 独活各五斤十兩

【制法】上十一味共軋細面，煉蜜为小丸。(大丸三錢重)

【剂量及用法】每服一丸，十岁至五岁小孩，体弱者，每次服半丸，五岁以下小孩酌减，温开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

四、呼和浩特

【处方】九軍一斤

【制法】用黃酒九蒸九晒，細面，蜜小小丸。

牛黃解毒丸

一、北 京

【功能与主治】清熱解毒。头暈目赤，咽干咳嗽，風火牙痛，大便秘結。

【处方】防風三錢 鈎藤五錢

金銀花一兩 赤芍五錢 生石膏一兩 麦冬三錢 黃連五錢 連翹一兩 桔梗四錢 黃芩五錢 黃柏五錢 甘草三錢 大黃一兩 梔子五錢 当归尾五錢

計十五味共为細粉，每八兩八錢細粉兌：牛黃一錢 雄黃五錢 硃砂一兩 冰片五錢 薄荷冰一錢 麝香五分

【制法】上药和勻，煉蜜为丸，重一錢，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，日服二次，温开水送下。

【禁忌】忌食油腥厚味，孕妇忌服。

二、天 津

【功能与主治】消炎退热，解毒去火。主咽喉腫痛，牙疼耳痛，头痛眩暈，口鼻生瘡，暴發火眼，大便不通。

【处方及制法】桔梗二兩 黃芩二兩 甘草一兩 大黃四兩 生石膏四兩 以上五味共为細粉，每細粉十四兩兌：硃砂面一兩 雄黃面一兩 牛黃一錢 冰片五錢

【制法】以上研細和勻，煉蜜为丸一錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

三、南 京

【功能与主治】主上焦風热为病，如溫毒發腫，头痛，目赤，牙疼，鼻衄，小兒口瘡等症。

【处方】金銀花一兩四錢 薄荷八錢 連翹二兩四錢 荆芥八錢 川黃連一兩四錢 川芎八錢 淡黃芩一兩六錢 白芷一兩 生大黃一兩六錢 防風六錢 菊花一兩六錢 蔓荊子六錢 黃柏一兩六錢 冰片八錢 山梔一兩二錢 西牛黃二錢四分 桔梗一兩二錢 明雄黃二錢四分 生石膏一兩二錢 硃砂一兩二錢 晚蚕砂一兩二錢 甘草八錢

【制法】上药二十二味，共研細末，細料另乳細，后加和勻，煉蜜为丸，每粒重一錢，蜡壳封固。

【剂量及用法】成人每服一丸或二丸，小兒減半，开水化服。

【禁忌】忌食魚腥，孕妇忌服。

四、蘭 州

【功能与主治】消炎退内热，解毒鎮惊。主咽喉腫痛，牙痛耳痛，头痛暈眩，口鼻生瘡，暴發火眼，大便不通。

【处方】大黃二兩 殭蚕三錢 連翹五錢 全虫二錢 土貝三錢 川烏三錢 土苓五錢 归尾五錢 乳香五錢 沒药五錢 槐花五錢 草烏五錢 新蛇三錢 黃連三錢 白芷三錢 木鼈子五錢 元明粉三錢 丁香六錢 牛黃五分 梅片五錢 粉草五錢 硃砂五錢 明雄一兩 麝香二分

【制法】共研細末，蜜大丸一錢重，蜡皮封固。

【剂量及用法】大人每服一丸，小孩三个月以內服五分之一，六個月以內服四分之一。

【禁忌】孕妇勿服。

五、大 同

【功能与主治】清毒火，解瘟热。

【处方】山藥十兩 花粉二兩 薄荷二兩 黃芩二兩 川軍二兩 丁香六錢 雄黃三兩 牛黃四分 硃砂二兩 冰片錢 薄荷冰二錢

【制法】共为細面，煉蜜为壹錢丸，赤金箔十二开金衣，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，白水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

六、濟 南(1)

【功能与主治】溫毒內热，头目眩暈，牙疼咽痛，大便干燥。

【处方】青翹一斤半 生石膏十一兩 薄荷八兩 金銀花一斤半 桔梗八兩 黃連一斤 梔子十二兩 荆子六兩 口苓一斤 复花十二兩 防風六兩 黃柏一斤 白芷十兩 大黃一斤 芥穗八兩

【制法】共为細粉，每药粉八斤兌：牛黃二兩 冰片八兩 硃砂十一兩六錢 雄黃二兩四錢 和勻，煉蜜为丸，重一錢，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，日服三次，温开水送下。

【禁忌】忌食油腥，孕妇忌服。

七、濟 南(2)

【功能与主治】溫毒內热，头目

眩暈、牙痛咽痛，大便干燥。

【处方】連翹一斤半 生石膏十二兩 薄荷八兩 金銀花一斤半 桔梗十二兩 川芎八兩 菊花一斤 晚蚕砂十二兩 甘草八兩 黃連一斤 梔子十二兩 蔓荊子六兩 黃芩一斤 旋復花十二兩 防風六兩 黃柏一斤 白芷十兩 大黃一斤 荊芥穗八兩

【制法】共為細粉，每藥粉八斤兌，牛黃二兩四錢 冰片八兩 硃砂十一兩六錢 雄黃二兩四錢 和勻，煉蜜為丸，重一錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服三次，溫開水送下

【禁忌】辛辣油膩等食物。

八、濟南(3)

【功能與主治】一般瘡癤，喉痛牙痛。

【处方】牛黃三錢 甘草一兩 銀花一兩 草河車五錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重一錢。

【劑量及用法】大人每服一丸，小兒酌減，白開水送下，病重者日再服。

【禁忌】辛辣刺激等食物，孕婦忌服。

九、沈陽

【功能與主治】清涼興奮，消炎止痛。主流行感冒，頭痛身痛，發熱惡寒，咳嗽嘔吐，驚悸抽搐，頭暈目眩，咽喉腫痛，喉痹目赤，中暑暈倒及熱性病之心臟衰弱。

【处方】桔梗 連翹 山梔 野軍各二錢 冬冬五錢 雙花 兩蓮子心 玉金各三錢 花粉四錢 元芩三錢 粉草二兩 茯苓五錢 天麻 鉤藤 川連 白芷 菊花 蘆根各二錢 杏仁五錢 生石膏 雄黃 硃砂各三錢 冰片一兩 薄荷冰一錢

【制法】除冰片 雄黃 薄荷冰另研外，余者碾極細面，煉蜜為丸七分重，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，溫白水送下。

【禁忌】辛燥油膩

十、撫順(1)

【处方】牛黃三分 玉金一兩

清夏五錢 元連一兩 元芩一兩 元柄一兩 桔梗五錢 山梔一兩 雄黃一兩 血珀一兩 片砂一兩 薄荷冰二錢。

【制法】共為細面，蜜丸二錢大，蜡皮封。

十一、撫順(2)

【功能與主治】清涼消炎，解毒退熱。上喉頭炎，口瘡 牙疳，齒齦炎，中耳炎，鼻炎，結膜炎，神經性頭痛，扁桃腺炎，痘疹疹毒，黃水瘡及毒火諸症，均能治之。

【处方】牛黃一分 連翹一兩五錢（一方作三錢） 胆星五錢 黃芩五錢 甘草一兩 雙花一兩五錢 薄荷三錢 山梔五錢 黃連五錢 硃砂四錢 冰片七分 雄黃四錢 重樓五錢

【制法】共為細面，蜜丸七分，蜡皮封。

【劑量及用法】大人每服一丸，小兒三歲至一歲每服四分之一，白水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

十二、承德

【功能與主治】溫毒內熱，頭暈目眩，牙痛咽痛，大便干燥。

【处方】牛黃一錢 黃芩 桔梗各三斤 防風 甘草各一斤半 鉤藤 肉桂各四兩 山藥 白芍 雄黃各一斤 大黃二斤 硃砂 冰片 薄荷腦各二兩 麝香五分

【制法】以上十六味共軋細面，煉蜜為丸一錢重，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】忌食油腥厚味，孕婦忌服。

十三、呼和浩特

【处方】山藥八兩 丁香五錢 薄荷 甘草各一兩 苦參 硃砂各五錢 雄黃一兩 麝香 牛黃各一錢 冰片二錢 薄荷冰一錢

【制法】共為細面，蜜大丸，加料重一錢半，單料重一錢，均半金衣，蜡皮。

【參考】加料者細料加倍，

附參考古方

【來源】幼科証治准繩

【功能與主治】治胎毒瘡癤，及一切瘡瘍。

【处方】牛黃一錢 甘草 金銀花各一兩 草河車五錢

【制法】以上為末，煉蜜丸。

【劑量及用法】量兒服。

加味犀角丸

一、青島

【处方】生地 犀角 荊芥 防風 大力子 當歸 桔梗 連翹 梔子 黃芩 赤芍 薄荷 花粉 黃柏 苦參 元參各二兩 甘草一兩五錢

【制法】共研軋細末，水泛小丸。

二、呼和浩特

【处方】犀角 連翹 荊芥 桔梗 生地 大力子 梔子各二兩 赤芍 花粉 黃芩 元參 黃柏 黃連 全歸 薄荷各一兩 甘草三兩 防風一兩

【制法】共為細面，水泛小丸。

瀉青丸

一、西安

【功能與主治】主治肝熱不能安臥，多驚善怒，目赤腫痛及小兒急驚抽搐之瀉熱劑。

【处方】龍胆草 山梔 酒蒸大黃 川芎 當歸 羌活 防風各等分

【制法】上七味共搗杵羅過，研細末水泛為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】成人每次服二十至三十粒，竹葉煎湯送服，一日二次，飯前服用，小兒按年齡酌減。

【禁忌】小兒慢驚，及成人素感虛寒者慎服。

二、沈陽(1)

【功能與主治】清熱鎮驚，瀉肝火。主多驚多怒，不能安臥，兩目上視，角弓反張，腹痛抽搐，大便不通，腸風下血等症。

【处方】當歸 龍胆草 川芎 梔子仁 大黃 羌活 防風各二兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，竹葉

煎湯，用砂糖送下。

【禁忌】五辛發物，孕婦忌服。

三、沈陽(2)

【功能與主治】清熱疏風鎮驚。主清心平肝，疏風涼血，小兒急驚抽搐，痰火瘰癧，發熱等症。

【處方】川羌活 川芎 梔仁 龍胆草 當歸 防風各一兩 錦紋軍五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重，青黛為衣。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】辛腥食物，孕婦忌服。

附參考古方

【來源】1. 錢氏小兒藥証直訣。

【功能與主治】肝熱搐搦，脈洪實。

【處方】當歸(去蘆頭切焙秤) 龍腦(焙秤) 川芎 山梔子仁 川大黃(濕紙裹) 羌活 防風(去蘆頭焙秤)

【制法】上件等份為末，煉蜜和丸雞頭大。

【劑量及用法】每服半丸至一丸，竹葉湯同沙糖溫水化下。

2. 春脚集。

【功能與主治】清心平肝，疏風涼血，凡小兒作熱不退，將成風搐或已成風搐，但服此丸其應如响，真是幼科截風定搐之第一良方也。

【處方】川羌活一兩 正川芎一兩 黑梔仁一兩 龍胆草一兩 全當歸一兩 北防風一兩 錦庄黃五錢

【制法】上藥合一处，以火烘燥，研細末，煉蜜為丸，青黛為衣，如大豆大。

【劑量及用法】每二丸，茶清化下。

龍胆瀉肝丸

一、北京、承德、濟南

【功能與主治】清熱利尿。主耳痛耳鳴，脇痛口苦，小便赤澀。

【處方】龍胆草六兩 梔子 黃芩 車前子各三兩 生地 澤瀉 柴胡各六兩 甘草 木通 當歸各三兩 共十味，計四十二兩。

【制法】共為細粉，水泛小丸，滑

石為衣闌亮。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌辛辣食物，孕婦忌服。

二、天津

【功能與主治】瀉肝膽濕熱，通便利水。主耳痛耳鳴，耳腫耳聾，脇痛口苦，頭暈頭疼，大便燥結，小便赤黃。

【處方】龍胆草(酒炒)四兩 生地 炒梔子 木通各二兩 澤瀉四兩 甘草 車前子(鹽炒) 當歸尾(酒炒)各二兩 柴胡四兩 黃芩(酒炒)二兩 共十味一斤十兩。

【制法】共為細粉，涼開水泛小丸二錢重，裝袋。

【劑量及用法】每次服一袋，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、上海

【功能與主治】目赤，便秘，溲赤。

【處方】龍胆草(酒炒) 柴胡 澤瀉各五兩 木通 當歸尾(酒洗) 黃芩(酒炒) 車前子(炒) 甘草 生地(酒炒) 山梔子(炒)各二兩五錢

【制法】共研細粉，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服三錢，溫開水送服。

【禁忌】辛辣刺激性食物。

四、南京

【功能與主治】清熱利尿。主口苦脇痛，目赤耳鳴，小便赤澀。

【處方】龍胆草 柴胡 建澤瀉各一兩 生地黃 當歸尾 焦梔子 車前子 淡黃芩 木通 粉甘草各五錢

【制法】上藥十味，共研細末，用溫沸水泛丸，每錢約做八十粒。

【劑量及用法】每服二錢至三錢，一日一次，開水吞服。

五、武漢

【功能與主治】脇痛口苦，目赤耳聾，小便不利，白濁溲血。

【處方】同南京(龍胆草、當歸尾酒炒)。

【制法】取上藥進行干燥，混合

碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于二十粒。

【劑量及用法】每服三錢，溫開水送下。

六、福州

【功能與主治】治肝經濕熱，脇痛口苦，耳聾耳腫，白濁便血等症。

【處方】胆草(酒炒)二兩 梔子(酒炒)一兩 黃芩(酒炒)一兩五錢 生地(酒炒)三兩 柴胡一兩五錢 車前一兩 澤瀉二兩 木通一兩五錢 當歸一兩五錢 甘草五錢

【制法】共為細末，煉蜜為丸。

七、蘭州

【功能與主治】瀉肝胆之熱，清腸胃，利便助消化。

【處方】龍胆草二兩 梔子二兩 胡連一兩六錢 木通二兩 澤瀉三兩 熟軍一兩六錢 甘草二兩 車前子三兩 當歸二兩 生地三兩 柴胡一兩五錢

【制法】以上共軋細面，水打小丸。

【劑量及用法】每次服三錢重，白開水送下，每日早晚服一次。

【禁忌】孕婦忌服。

八、沈陽

【功能與主治】清熱平肝，消腫明目。主脇痛口苦，耳腫耳聾，筋骨萎軟，白帶淋濁，便血溺血，濕熱腹痛，小便澀滯，頭暈目眩等症。

【處方】同南京。

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】五辛。

九、撫順

【功能與主治】清熱，消炎，利尿。主肝火上逆，眩暈，偏正頭痛，耳流膿血，婦人子宮濕熱，以致陰痒及尿道炎，膀胱炎，小便赤澀，尿濁不清等症。

【處方】龍胆草二兩 黃芩 山梔 澤瀉 柴胡各十兩 車前子 木通各五兩 生地 當歸 甘草各二兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重(一方三錢重)。

【劑量及用法】每服一丸，白開

水送下。

【禁忌】辛辣 酉类。

附参考古方

【来源】蘭室秘藏。

【功能与主治】治陰部时复热痒及臊臭。

【处方】柴胡梢 澤瀉已上各一錢 車前子 木通已上各五分 生地黄 当归梢 草龙胆已上各二分

【制法及用法】上剉如麻豆大，都作一服，水三盞煎至一盞，去粗，空心稍热服，便以美膳压之。

【备考】此药柴胡入肝为引，用澤瀉車前子木通淡渗之味，利小便，亦除臊气，是名在下者引而竭之，生地黄草龙胆之苦寒瀉酒湿热，更兼車前子之润以撤肝中邪气，肝主血，用当归以滋肝中血不足也。

当归龙薈丸

一、北 京

【功能与主治】瀉热通便。主头眩目眩，耳痛耳聾，咽膈不利，大便秘结。

【处方】龙胆草 当归 梔子 黄連 黄柏 黄芩各一兩 人黄 蘆薈各五錢 木香一錢五分

以上九味共为細粉，每七兩一錢五分細粉兌：麝香五分

【制法】上药和匀，水泛小丸，每十六兩小丸用青黛六錢滑石三兩为衣闔亮。

【剂量及用法】每服二錢，日服二次，温开水送下。

【禁忌】忌辛辣食物，孕妇忌服。

二、天 津

【功能与主治】清肝膽实热，瀉火通便。主耳聾耳鳴，耳內生瘡，肝火熾旺，胃腸湿热，头眩牙痛，耳目不清，大便燥结，

【处方与制法】当归(酒炒) 龙胆草(酒炒) 炒梔子 炒黄連 炒黄柏 炒黄芩各一兩 大黄(酒炒) 青黛 蘆薈各五錢 广木香二錢五分 以上十味，共为細粉，每細粉七兩七錢五分兌：麝香五分 以上研細和匀，煉蜜为丸二錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

三、上 海

【功能与主治】煩热便秘，头晕目眩。

【处方】同天津。

【制法】麝香另研，余药共研細粉，以麝香粉和入拌匀，煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服一錢至三錢，温开水送服。

【禁忌】孕妇忌服。

四、南 京

【功能与主治】主头晕耳鳴，惊悸煩躁，便秘溲澀，脇肋作疼，陰囊腫脹。

【处方】西当归一兩(酒洗焙) 蘆薈五錢 炒黄柏一兩 飞青黛五錢 炒大黄各五錢(酒浸) 龙胆草(酒洗炒焦) 炒淡黄芩 梔子仁各一兩(炒焦) 广木香二錢五分(另研不見火) 麝香五分(另研不見火) 炒黄連一兩

【制法】上药十一味共研細末，加煉白蜜为小丸，每錢約做一百粒。

【剂量及用法】每服一錢至二錢，一日一次，开水吞服。

【禁忌】孕妇忌服。

五、武 汉

【功能与主治】头目眩眩，耳痛耳鳴，神志躁狂，大便秘结，小便澀澀，或胸脇作痛，陰囊腫大。

【处方】当归(酒洗) 龙胆草(酒洗) 梔子(炒黑) 黄連(酒炒) 黄柏(酒炒) 黄芩(酒炒)各一兩 人黄(酒浸) 青黛(水飞) 蘆薈各五錢 木香二錢半 麝香五分。

【制法】取上药进行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜60—62%，迭成小丸，每錢不得少于二十五粒。

【剂量及用法】每服一錢至三錢，用淡姜湯送下。

【禁忌】孕妇忌服或遵医嘱。

六、福 州

【功能与主治】治肝經实火，大便秘结，小便澀澀，或胸脇作痛，陰囊腫脹，凡肝經实火皆宜用之。

【处方】当归 龙胆草 梔子仁 黄連 黄柏 黄芩各一兩 蘆薈 大黄 青黛各五錢 木香二錢半

麝香五分另研

【制法】上为末，神糊丸桐子大。

【剂量及用法】每服二、三十丸，姜湯、白湯任下。

七、杭 州

【功能与主治】治肝經实热，头晕目眩，耳聾耳鳴，神志不宁，惊悸搖擗，脇腹作痛，溲赤便秘，兼治盜汗等症。

【处方】全当归 龙胆草 川黄柏 焦山梔 川黄連 黄芩 蘆薈各一兩 大黄五錢 青黛 麝香五錢 广木香二錢五分

【制法】共研細末，神糊为丸。

【剂量及用法】每服一至二錢，开水送下。

八、沙 市

【功能与主治】治肝經实火，头晕目眩，耳聾耳鳴，神志不宁，夜不安眠，惊悸搖擗，躁扰狂越，大便秘结，小便澀澀，或胸脇作痛，腦炎充血等症。

【处方】当归 龙胆草 炒梔子 黄連 黄柏 黄芩各一兩 西人黄 蘆薈 麝香 青黛各五錢 广木香二錢五分

【制法】上药十一味研細末，蜜丸。

【剂量及用法】成人量每次服二錢，每日服二次，温开水下。

【禁忌】体虛無热者忌服，孕妇忌服。

九、蘭 州

【功能与主治】退热利便。主胃腸湿热，習慣性便秘，耳內生瘡，耳鳴耳聾，头眩牙痛，肝火熾旺，头面腫疼，耳目不清等症。

【处方】同沙市。

【制法】以上共軋細面，煉蜜为丸二錢重，蜡皮精制，小水丸一錢五分。

【剂量及用法】內服每一次服二錢重，或一丸二錢重，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

十、大 同

【功能与主治】瀉肝胆火，脇痛脹滿，热郁耳聾。

【处方】当归 胆草 梔子 黄

以 黃連 黃柏各二兩 熟軍 蘆薈各一兩 廣木香九錢 麝香一錢 青黛一錢

【制法】共研細面，水泛為丸，青黛為衣。

【劑量及用法】早晚每服二錢，香片茶送下。

【禁忌】孕婦忌服。

十一、濟南

【功能與主治】大眩脇痛，耳痛耳鳴，大便秘結。

【處方】全當歸(酒洗焙) 龍胆草(酒洗炒焦) 梔子仁(炒) 川黃連(炒) 黃柏(炒) 黃芩各一兩(炒) 大黃(酒浸炒) 蘆薈 麝香(另研) 青黛各五錢(水飛為衣) 廣木香二錢五分

【制法】共為細末，水泛為丸，如黍米大。

【劑量及用法】成人每服一錢至二錢，白開水送下。

【禁忌】辛辣刺激等食物，孕婦忌服。

十二、青島

【處方】當歸 生地各十二兩 胆草半斤 黃連四兩 黃芩 黃柏各半斤 生軍四兩 木香六兩 蘆薈四兩 柴胡三兩 麝香一錢

【制法】共軋細面，水小丸，青黛為衣。

十三、沈陽

【功能與主治】瀉肝火，去實熱。主大暈目眩，耳鳴耳聾，耳痛流水，胸膈痞塞，咽喉不利，大便秘結。

【處方】當歸 龍胆草 山梔 黃連 黃芩 蘆薈 青黛 大黃 黃柏各五錢 木香二錢 麝香五分(一方無黃芩、黃柏)

【制法】共研極細面，水泛為丸。

【劑量及用法】每服一錢五分，白開水送下。

十四、撫順

【功能與主治】清火緩瀉。主肝火上升，大暈目眩，耳聾耳鳴，心煩不寧，煩燥發狂，咽喉不利，大便秘結，小便赤澀等症。

【處方】當歸六兩 黃柏 黃芩各四兩 麝香五分 蘆薈 胆草 山梔 黃連 廣木香 生軍各二兩

【制法】共為細面，水泛小丸。

【劑量及用法】每服一錢，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服，忌辛辣酒類等物。

十五、承德

【功能與主治】頭眩脇痛，耳痛耳鳴，大便秘結。

【處方】同北京。

【制法】除麝香另研外，其它群藥為細粉，水泛小丸，青黛滑石各半為衣，每兩分作二百粒。

【劑量及用法】每服二十粒，日服三次，溫開水送下。

【禁忌】辛辣之物，孕婦忌服。

十六、呼和浩特

【處方】當歸 薄荷 梔子 黃柏 黃芩 川連各二斤 蘆薈一斤半 麝香一兩五 生軍一斤半

【制法】共為細面，水泛小小丸，青黛為衣。

【備考】加料龍薈丸照前方每斤粗面再加：羚羊四錢 麝香四分 冰片二錢 薄荷二錢 青黛四錢 蜜丸一錢重，蜡皮封固。

十七、南昌(當歸蘆薈丸)

【功能與主治】肝經實熱，大暈目眩，耳聾耳鳴，神志不寧，驚悸搖擲，躁狂狂越，咽喉不利，大便秘結，小便澀滯，或胸脇作痛，陰囊腫脹。

【處方】黃柏(炒) 炒梔子 龍胆草(酒洗炒焦) 炒黃芩 當歸(酒洗)各一兩 麝香(另研)五分 川連(酒炒)一錢 廣木香一錢五分 青黛(水飛) 蘆薈 大黃(酒浸炒)各五錢

【制法】共研細末，后入麝香，煉蜜為丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每服一錢五分至二錢，生薑湯或溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服，勿食辛辣食物。

【備考】非經醫師處方不可使用。

十八、重慶(當歸蘆薈丸)

【功能與主治】治肝經實火，大暈目眩，耳聾耳鳴，神志不寧，驚悸搖擲，躁狂狂越，咽喉不利，大便秘結，小便澀滯，或胸脇作痛，陰囊腫

脹盜汗等症。

【處方】同沙市。

【制法】除麝香青黛另乳，蘆薈與蜂蜜煎化外，余藥共研細末與前藥和勻，煉蜜為丸，每重三錢，蜡壳封固。

【劑量及用法】一丸。

【禁忌】虛火不能服。

十九、西安(當歸蘆薈丸)

【功能與主治】主治肝胆之火，大暈目眩，驚悸躁狂，耳鳴耳聾，腸胃燥澀，血壓高等症。

【處方】全當歸(酒洗) 龍胆草(酒洗) 川黃柏(炒) 黃連(炒) 黃芩(炒) 黑山梔各一兩 大黃(酒浸) 麝香 青黛(水飛) 蘆薈各五錢 木香二錢

【制法】細木蜜丸

【劑量及用法】每服二錢，姜湯送下。

【禁忌】腸胃虛寒者及孕婦忌服。

二十、哈爾濱

(當歸蘆薈丸)

【功能與主治】清火。主肝胆痰火。

【處方】同天津。

【制法】麝香另研，余均碾為細面，一處調勻，神龜打糊為小丸，如梧桐子大，青黛為衣。(一作煉蜜為丸，如小豆大。)

【劑量及用法】每服二錢，淡姜湯送下，與防風通聖丸相間服尤妙。

【禁忌】忌食辛辣發熱諸物，孕婦勿服。

【備考】每二錢為一付，裝入印制之紙袋內密封之。

附參考古方

【來源】1.丹溪心法。

【功能與主治】治內有濕熱，兩脇痛。

【處方】卓龍胆 當歸 大梔子 黃連 黃芩各一兩 大黃 蘆薈半兩 木香一錢半 黃柏一兩 麝香半錢

【制法】上十味為末，面糊丸。

【劑量及用法】先以琥珀膏貼痛處，却以生薑汁吞此丸，痛甚者須炒，令熱服。

【備考】一方：加柴胡 川芎各

半兩。又方：加青黛半兩，蜜丸，治脇痛，補丸降肝火。

2. 沈氏尊生書。

【功能与主治】耳聾

【处方】当归 龙胆草 蘆薈 甘草 計菊花 黃芩 荆芥 生地 赤芍

【备考】有痰加姜制半夏。

琥珀茯苓丸

一、北 京

【功能与主治】通閉利尿止痛。主小便淋瀝，渾濁如膏，尿道刺痛。

【处方】琥珀二兩 土茯苓四兩 赤茯苓三兩 黃柏三兩 海金沙三兩 澤瀉二兩 甘草二兩 烏藥三兩 丹皮二兩 半夏三兩 車前子五兩 大黃五兩 滑石五兩 木通二兩

共十四味，計四十八兩。

【制法】共為細粉，水泛小丸，滑石為衣，曬亮。

【劑量及用法】每服二錢，溫開水送下。

【禁忌】忌辛辣動火食物，孕婦忌服。

二、沈 陽

【功能与主治】清熱利尿。主膀胱積熱，小便赤黃，癃閉不通，溺痛淋漓。

【处方】琥珀 滑石 黃柏 赤茯苓 知母 海蛤粉 木通 當歸 扁蓄 豬苓各一兩 木香五錢

【制法】共碾極細面，水泛為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，白水送下。

【禁忌】辛熱食物。

附參考古方

【來源】雜病証治類方

【功能与主治】治膀胱經積熱，以致小便癃閉淋漓。

【处方】琥珀（另研） 赤茯苓（去皮） 滑石（桂府者另研） 知母（去毛） 黃蘗（去粗皮） 蛤粉（另研） 川木通（去皮） 當歸 澤瀉各二兩 人參 赤芍藥 山梔仁 黃連（去鬚） 大黃（蒸） 黃芩（去腐） 白朮 瞿麥 扁蓄 豬苓各一兩 木香半兩

【制法】上為細末，入另研藥研勻，滴水和丸如桐子大。

【劑量及用法】每服四十丸，清晨用溫白湯送下。

涼 膈 散

一、上 海

【功能与主治】膈熱煩躁，頭昏目赤，便秘。

【处方】大黃（酒浸）二兩 甘草（炙）六錢 薄荷七錢 山梔子仁（炒）八錢 黃芩（酒炒）連翹 芒硝各一兩

【制法】除芒硝外，余藥共研細粉，再和入芒硝粉，充分和勻。

【劑量及用法】每次三錢，溫開水調服，或包煎服湯。

二、杭 州

【功能与主治】治溫病實熱，內熱上盛，唇焦煩躁，咽干目赤，熱盛發斑，二便閉結，口瘡齒血，小兒驚熱等症。

【处方】連翹四兩 大黃（酒浸）玄明粉 生甘草各二兩 炒山梔 黃芩（酒炒） 薄荷各一兩

【制法】共研細末為度。

【劑量及用法】每服二至四錢，開水送下。

三、濟 南

【功能与主治】治三焦火盛，口舌生瘡，咽喉腫疼，牙齒脹疼，暴發火眼，熱嗽痰突，酒毒積熱，大便秘結，小便赤黃等症。

【处方】連翹四兩 酒大黃 芒硝 甘草各一兩 炒山梔 黃芩（酒炒） 薄荷各一兩

【制法】以上七味共研細粉，瓶收。

【劑量及用法】每服三錢，蜜水調服，小兒酌減。

【禁忌】孕婦忌服。

四、青 島

【处方】梔子 連翹 薄荷 黃芩各八兩 甘草六兩 生軍二兩 皮硝三兩

【制法】共軋細面。

五、呼 和 浩 特

（清火涼膈散）

【处方】大黃 梔子 連翹 石

膏 防風 桔梗 薄荷 黃連 黃柏 花粉 元參 生地 赤芍 銀花 甘草各等分

【制法】共為細面。

附參考古方

【來源】太平惠民和劑局方。

【功能与主治】治大人小兒腑藏積熱，煩躁多渴，面熱頭昏，唇焦咽燥，舌腫喉閉，目赤鼻衄，頰頰結硬，口舌生瘡，痰涎不利，涕唾稠粘，睡臥不寧，謔語狂妄，腸胃燥澀，便秘秘結，一切風熱，並宜服之。

【处方】川大黃 朴硝 甘草（盪）各一兩 連翹二斤半 梔子仁 黃芩 薄荷（葉，去土）各十兩

【制法】上粗末。

【劑量及用法】每服二錢，水一盞，入竹葉七片，蜜少許，煎七分，食后溫服。

【備考】小兒可服半錢，更隨步數加減，得利下住服。

清 胃 散

沈 陽

【功能与主治】清熱止痛。主胃熱牙痛，牙齦腫痛出血，口臭唇裂，津枯液短，一切熱症。

【处方】黃芩 黃連 生地 丹皮 升麻 生石膏各四兩

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服一錢，白開水送下。

【禁忌】辣腥刺激食物。

附參考古方

【來源】脾胃論。

【功能与主治】治因服補胃熱藥而致上下牙痛不可忍，牽引頭腦滿熱發大痛，此足陽明別絡入腦也，高寒惡熱，此陽明經中熱盛而作也。

【处方】真生地黃 當歸身各二分 牡丹皮半錢 黃連 揀淨六分（如黃連不好更加二分，如夏月倍之，大抵黃連臨時增減無定） 升麻一錢

【制法用法】上為細末，都作一服，水一盞半，煎至七分去渣，放冷服之。

金釵石斛膏

南 京

【功能与主治】滋潤清火，養腎

平肝。半因肝火所致之头痛牙痛，口苦咽干，烦躁失眠等症。

【处方】千金釵石斛二斤

【制法】金釵不易出汁，必須多煮，時間宜長，用清水煎煮三次成濃汁，去渣濾清，加白蜜三斤收膏。

【劑量及用法】每服二錢，開水和服。

清火貴金膏

呼和浩特

【处方】生地一斤 条芩 川芎 黃柏各一斤 生梔半斤 黃連三兩 當歸二斤 白芍一斤半 生石膏(打碎)半斤 菊花一斤 竹茹(要粉) 茯苓 半夏各半斤 砂仁四兩(搗碎)

【制法】共熬膏，每六兩兌紅蜜十兩。

犀 羚 丹

一、天津、蘭州

【功能与主治】退熱消炎，清腸胃利便。主大牙痛，口舌生瘡，暴發火眼，咽喉腫痛，大便不通，煩躁口渴。

【处方及制法】黃連一兩 黃芩 生梔子 黃柏各二兩 生地 大黃 甘草 元參(去蘆)各一兩 胆草五錢 川芎 元明粉各八錢 以上十一味共為細粉，每細粉十二兩一錢兌，冰片五錢 犀角粉 羚羊粉各五分 以上研細和勻，煉蜜為丸二錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、承 德

【功能与主治】牙疼咽喉痛，暴發火眼，大便秘結等症。

【处方】川黃連 黃芩 大黃 元參 生地 甘草各一兩 梔子 黃柏各二兩 龍胆草 冰片各五錢 川芎 玄明粉各八錢 犀角 羚羊角各五分

【制法】共為細粉，煉蜜為丸重一錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

痰 嗽 类

金水六君丸

一、上 海

【功能与主治】肺虛喘咳，痰多氣急。

【处方】甘草(炙)一兩 陳皮一兩五錢 茯苓 姜半夏 當歸各二兩 熟地 兩

【制法】共研細粉，用生薑一兩，紅棗二兩，煎湯泛丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服三錢，溫開水送服。

【禁忌】忌食生冷。

二、武 漢

【功能与主治】肺虛，咳嗽日久，胸滿痰多。

【处方】西黨參二兩 云茯苓二兩 熟地黃三兩 全當歸二兩 炙甘草一兩 焦白朮二兩 廣陳皮一兩半 法半夏二兩

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于三十粒。

【劑量及用法】每服二錢至三錢。

三、福 州

【功能与主治】治肺腎虛寒，水泛為痰或年近陰虛，氣血不足，外受風寒，咳嗽喘急，多痰喘急等症。

【处方】當歸二錢 熟地三五錢 陳皮一錢半 半夏 茯苓各二錢 炙草一錢

【制法】共為細末，煉蜜為丸(或加生薑煎湯送下)。

四、杭 州

【功能与主治】治肺腎兩虛，痰飲內停或年近陰虛，氣血不足，咳嗽喘急，痰多喘急，等症。

【处方】同武漢，惟熟地用四兩。

【制法】共研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服三至四錢，開水送下。

附參考古方

【來源】景岳全書。金水六君煎

【功能与主治】治肺腎虛寒，水泛為痰，或年近陰虛，氣血不足，外受風寒，咳嗽喘急，多痰喘急等証甚

效。

【处方】當歸二錢 熟地三五錢 陳皮一錢半 半夏 茯苓各二錢 炙甘草一錢。

【制法】水二盅，生薑三、五、七片，煎七、八分。

【劑量及用法】食遠溫服。

【備考】如大便不實而多濕者，去當歸加山藥；如痰盛氣滯胸膈不快者，加白芥子七、八分；如陰寒盛而嗽不愈者，加細辛五、七分；如兼長邪寒熱者，加柴胡一、二錢。

養陰清肺丸

一、天 津

【功能与主治】清熱潤肺，止咳化痰。主陰虛咳嗽，口渴咽干，失音聲啞，痰中帶血，咽喉腫痛。

【处方】生地五兩 元參(去蘆)四兩 浙貝母二兩 薄荷一兩 錢麥冬三兩 丹皮 牛白芍各二兩 甘草一兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，開水送下。

二、蘭 州

(附：養陰清肺膏)

【功能与主治】解熱潤肺化痰。主咳嗽音啞，咽喉腫痛，吐血，鼻出血。

【处方】同天津，惟薄荷用一兩二錢五分。

【制法】共研細面，蜜丸三錢重。

【劑量及用法】每次服一丸，膏每次服一兩，開水送下。

【備考】如熬膏每清膏一斤加蜜二斤。

三、濟 南

【功能与主治】陰虛喉腫，咽痛，咳嗽。

【处方】大生地一兩 麥門冬六錢(去心) 杭白芍 川貝母(去心) 牡丹皮各四錢 薄荷二錢五分 玄參八錢 生甘草二錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重一錢。

【劑量及用法】每服一丸，開水送下。

【禁忌】忌食辛辣油膩等物。

百合固金丸

一、杭 州

【功能与主治】滋陰补肺。治陰虛肺傷，咳嗽咽痛，痰中帶血，頭眩耳鳴，午後潮熱，口干溼赤等症。

【处方】山百合 川貝母 當歸 各一兩 大生地 二兩 桔梗 八錢 白芍 一兩 大熟地 二兩 生甘草 一兩 麥冬 一兩五錢 元參 八錢

【制法】共研細末，將二地搗爛和蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢，飯前開水送下。

二、濟 南

【功能与主治】肺傷咽痛，咳嗽痰血。

【处方】同杭州。

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

【禁忌】忌食生冷、辛辣、油膩等物。

三、沈 陽

【功能与主治】补肺清火，化痰鎮咳。主咽干喉痛，咳嗽失音，痰中帶血，喘嗽氣短，骨蒸發熱，盜汗不眠，潮熱自汗，久患咳嗽等症。

【处方】百合 白芍 當歸 川貝 甘草 生地 各一兩 熟地 二兩 麥冬 一兩五錢 玄參 桔梗 各八錢

【制法】共為細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，早晚二次，空心白開水送下。

【禁忌】忌食腥冷、五辛、烟酒。

四、撫 順

【功能与主治】养肺，宁嗽，止血。主肺病咳嗽，痰中帶血，午後癆熱，骨蒸盜汗，干嗽無痰，喘嗽音啞等症。

【处方】百合 生、熟地 各一兩 元參 兩半 骨皮 一兩 川貝 八錢 兜鈴 兩半 當歸 紫苑 白芍 各兩半 沙參 寸冬 桔梗 炙草 各一兩

【制法】共為細面，蜜丸一錢重。

【劑量及用法】每服一丸，食前

白開水送下，每日二至三次。

【禁忌】忌食辛辣等物。

五、吉林、哈尔滨

(固金丸)

【功能与主治】清肺宁嗽，定喘止血。主治肺癆咳嗽，氣喘盜汗，咳嗽痰血。

【处方】同杭州。

【制法】共碾細面，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢。白開水空心送下，每日三次。

【禁忌】忌食辛辣等物。

壯士固金丸

哈 尔 濱

【功能与主治】滋补脾肺。主脾肺虛癆，胸膈滿悶，宿食不消，四肢虛軟，胃痛泄瀉，咳嗽氣促，動則喘急，痰涎壅盛，晝熱畏寒，自汗盜汗。

【处方】黨參 砂仁 白芍 各二兩 茯苓 桔梗 廣皮 各四兩 炙黃芪 三兩 蓮肉 五味子 薏米 玄參 各一兩 山藥(炒) 八兩 川貝 紫苑 各一兩半 兜鈴 百合 各一兩 寸冬 二兩 清夏 一兩 當歸 款冬 各四兩 炙草 三兩

【制法】共碾細面，煉蜜為丸，如梧桐子大。多壇存貯。

【劑量及用法】每服二錢。開水送下，日二、三服。

【禁忌】忌食辛辣。

玉露养肺丸

大 同

【功能与主治】胸膈不清，咳嗽痰喘，遠年近日咳嗽。

【处方】枳實 桔梗 麥冬 桑皮 各一斤 焦榔 法夏 酒芩 茯苓 於朮 陳皮 川貝 冬花 厚朴 各十二兩 沉香 三兩

【制法】煉蜜為丸，每重二錢。

【劑量及用法】每次服三錢，開水送下。

补虛止嗽丸

大 同

【功能与主治】中氣虛弱，日久咳嗽。

【处方】黨參 一兩 白朮 四兩 云苓 當歸 各二兩 廣皮 二兩 半夏 二兩 炙芪 四兩 炙升麻 柴胡 各五錢 麥冬 五味子 各一兩 炙百合 炙冬花 各二兩 白芥子 一兩 炙草 二兩

【制法】共研細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每次服二錢，開水送下。

洋参保肺丸

一、蘭 州

【功能与主治】潤肺止咳。主肺虛咳嗽，氣喘咳嗽，及老年體虛咳嗽，痰中帶血等症。

【处方】生地 酒地 元參 百合 白芍 杏仁 冬花 桔梗 粉草 各二兩 川貝 寸冬 當歸 各三兩 荷梗 真膠 各一兩 西洋參 三兩

【制法】共為細末，蜜大丸二錢重，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，開水送下。

二、大 同

【功能与主治】助元氣，祛痰理氣，主肺虛久喘。

【处方】白朮 黨參 各四兩 云茯苓 二兩 陳皮 厚朴 各四兩 橘紅 二兩 冬花 二兩 寸冬 三兩 天冬 二兩 紫苑 三兩 洋參 一兩四錢 知母 杏仁 各二兩 百合 六兩 麻黃 牛草 各二兩

【制法】共軋細面，煉蜜為丸，硃衣蜡皮。

【劑量及用法】每次服三錢，開水送下。

三、承 德

【功能与主治】元氣不足，氣虧體弱，肺經不清，痰喘咳嗽，勞碌過度，晝夜坐臥不寧。

【处方】西洋參 一兩 生石膏 杏仁(去皮尖) 廣皮 麻黃 炙甘草 米壳 各四兩 木香 五味子(炙) 砂仁 枳壳 各二兩

【制法】共軋細面，煉蜜為丸，重二錢五分，金衣，蜡壳封固。

【劑量及用法】大人每服一丸，早晚各服一次，白開水送下。

【備考】其中米壳一味可不用。

蛤蚧养肺丸

蘭 州

【功能与主治】补虚润肺，止咳化痰。主癆伤咳嗽，精神衰弱，四肢疲倦，肺癆肺炎等症。

【处方】蓬肉八錢 前胡 花粉各八錢 戈半夏(炙)二錢 条参八錢 白芨一兩 瓜仁六錢 天冬寸冬 貝母各八錢 白前 桔梗 賴氏紅 杏仁 桑皮各六錢 苏子四錢 白芥子 萊菔子各六錢 云苓八錢 山藥八錢 薏仁 扁豆各八錢 百合 生芪 党参各一兩 生草六錢 蛤蚧一对

【制法】共轧細粉，煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服一錢，每日早晚各服一次，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

蛤蚧定喘丸

天 津

【功能与主治】滋陰清肺，止咳定喘。主虛勞，久嗽，年老哮喘，气短作燒，季节举發，胸滿郁悶，自汗盜汗，不思飲食。

【处方】生熟地二兩 生紫苑三兩 麻黄一兩八錢 鱉甲(醋制) 黄芩 甘草 麦冬各二兩 黄連一兩二錢 百合三兩 炒苏子 生石膏各一兩 杏仁(去皮炒)二兩 煅石膏一兩 蛤蚧(用尾)一对

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，二錢重，每斤丸药用硃砂面三錢上衣，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，白开水送下。

养肺止咳丸

禹 县

【功能与主治】气血双亏，發热自汗，肺气喘急，咳嗽痰涎。

【处方】辽沙参 姜半夏 陈皮各一兩 人熟地三兩 川厚朴一兩 知母二兩 辽五味一兩 白茯苓一兩五錢 炙冬花一兩 炙杷叶二兩 生百合三兩 川貝母 地骨皮 麦冬各一兩

【制法】共为細面，煉蜜为丸，每

丸二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下。

【禁忌】風寒咳嗽忌用。

【备考】有效期一年。

潤肺鉄笛丸

福 州

【功能与主治】治三焦有热，肺火上炎，咳嗽声啞，口燥咽干，陰虛劳热，及語言过多以致失音等症。

【处方】叭嚨杏 胡桃各四兩 白芨 柿霜各一兩 冰糖十兩

【制法】共研为丸，每粒一錢五分。

参苏理肺丸

一、天 津

【功能与主治】散風解热，止咳化痰。主四时感冒，風寒咳嗽，头疼無汗，鼻塞声重，畏風怕寒，鼻流清涕，四肢無力。

【处方】人參(去蘆)二兩 紫苏叶四兩 浙貝母 葛根各二兩 前胡四兩 厚朴(姜制)一兩 橘紅四兩 花粉 杏仁(去皮炒)各二兩 桔梗一兩 法半夏四兩 黄芩二兩

【制法】共为細粉，凉开水泛小丸，一錢重裝袋。

【剂量及用法】每次服一袋，白开水送下。

二、武汉(参苏丸)

【功能与主治】虛人感冒，發热咳嗽，火痛嘔吐，鼻流清涕。

【处方】党参二兩 甘草(炙) 枳壳 陈皮 木香 姜半夏各二兩 苏叶 前胡各二兩 桔梗二兩 葛根 茯苓各二兩

【制法】取上药进行干燥，混合碾細，以姜、棗各一兩煎水送成小丸，每錢不得少于三十粒。

【剂量及用法】每服一錢至三錢，开水吞下。

三、南 昌

【功能与主治】風寒咳嗽，痰白涕清，或兼寒热，身体較弱者。

【处方】党参 苏梗叶 姜半夏各二兩 广陈皮 赤茯苓 炙甘草 苦桔梗各二兩 枳壳(麸炒) 前胡

痰 嗽 类

各二兩 广木香二兩 葛根三兩

【制法】共研細木，生薑、紅棗各六兩煎湯泛丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每服二錢，开水送下，病重者每日服二次；小兒視年齡及病情酌減。待煎水澄清服。

【禁忌】热咳及陰虛咳嗽忌服，並勿食酸辣油膩食物。

四、沙 市

【功能与主治】治感冒風寒，头痛惡風，咳嗽稀痰，呼吸不利等症。

【处方】北沙参四兩 桑白皮二兩 前胡四兩 枳壳一兩 法半夏 广陈皮 茯苓各四兩 粉甘草一兩 苏叶一兩 杏仁四兩 桔梗一兩

【制法】共研細木，用生薑二兩煎湯去渣，以湯汁泛为丸。

【剂量及用法】成人量每次服二錢，每日服三次，小兒老人酌減。

【禁忌】气管發炎及尤血者忌服。

五、重 庆

【功能与主治】治感冒風寒，头痛發热，惡寒惡風，煩悶，皖悶嘔吐，咳嗽气逆，产后感冒等症。

【处方】沙参 苏叶 干葛 前胡 法半夏 茯苓各七兩五錢 枳壳 橘皮 甘草 桔梗各五兩

【制法】共研細木，用生薑二兩、大棗一兩，煎水泛丸，紙盒包裝。

【剂量及用法】一錢至一錢。

六、昆 明

【功能与主治】咳嗽痰多，咽喉疼痛。

【处方】前胡 苏叶 粉葛 法夏 茯苓各二兩 广木香一兩 广皮 枳壳各一兩 桔梗一兩五錢 沙参 甘草各一兩

【制法】研木，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服一丸，水吞每服二錢半，幼童減半，用开水早晚各服一次。

【禁忌】久咳不宜服。

七、西 安

【功能与主治】主治外感風寒，發热头痛，眩暈心煩，咳嗽泄瀉，肢倦体重等症。

【处方】北沙参 紫苏 葛根 白前各一錢 姜半夏一錢半 茯苓

三錢 陈皮(去白) 蘇枳壳各一錢
桔梗八分 广木香五分 杏仁 貝
母各五錢

【制法】搗細末，煉蜜為丸，每丸
重二錢。

【劑量及用法】成人每服一丸，
一日三次或二次，飯前姜、棗湯送下
或化服，小兒按年齡遞減。

【禁忌】食后忌風。

八、蘭 州

【功能與主治】流行性感冒咳嗽。
主身體衰弱之感冒咳嗽，發熱
頭痛，鼻流清涕。

【處方】紫蘇葉四兩半 枳壳
前胡 半夏 广皮 桔梗 云苓
葛根 木香各二兩 甘草一兩半
瓜蒌三兩 黨參二兩

【制法】共為細面，煉蜜為丸，每
丸重三錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服二丸，白開
水送下。

九、大 同

【功能與主治】內傷外感咳嗽之
症。

【處方】葛根 前胡 半夏 黨
參 茯苓各五斤 木香一斤四兩
蘇葉十斤 炒枳壳 桔梗各五斤
甘草一斤半 陈皮五斤

【制法】共為細面，姜、棗湯打小
丸。

【劑量及用法】每次服三錢，梨
湯送下。

十、禹 縣

【功能與主治】風寒咳嗽，發熱
憎寒，鼻塞聲重，頭痛無汗。

【處方】南沙參十二兩 蘇葉六
兩 陈皮 半夏 茯苓各九兩 前
胡十二兩 桔梗九兩 葛根六兩
广木香二兩 枳壳 甘草各六兩
杏仁四兩

【制法】共碾細面，水為丸。

【劑量及用法】每服二錢，小兒
每服一錢，姜三片煎湯送下，開水亦
可。

【禁忌】熱症忌用。

【備考】有效期二年。

十一、濟 南

【功能與主治】虛性感冒咳嗽，
發熱頭痛，鼻流清涕。

【處方】黨參 甘草 枳壳 陈
皮 木香 姜半夏 紫蘇葉 前胡
桔梗各二兩 葛根 茯苓各三兩

【制法】共為細粉，水泛為小丸。

【劑量及用法】每次三錢，白開
水送下。

十二、青 島

【處方】蘇葉一斤 沙參 陈皮
前胡 桔梗 干葛 枳壳 半夏
茯苓各半斤 木香四兩 甘草二兩

【制法】共軋面，水泛小丸。

十三、沈陽(1)

【功能與主治】疏風散寒，理肺
定喘，止咳化痰。主外感風寒，內傷
發熱，頭痛無汗，鼻塞聲重，咳嗽喘
息。

【處方】紫蘇葉一斤二兩 前胡
橘皮 防風 枳壳 款冬花 姜夏
人參 炒萊菔子 炒杏仁 白茯苓
知母 甘草各四兩

【制法】共碾極細面，水泛為小
丸。

【劑量及用法】每服二錢，姜湯
送下。

【禁忌】忌食生冷油膩。

十四、沈陽(2)

【功能與主治】解表清熱化痰。
主傷風咳嗽，鼻塞聲重，肺熱痰喘，
痰壅胸悶，感冒頭痛，發熱惡寒。

【處方】人參二兩 紫蘇三兩
枳壳二兩 粉葛四兩 甘草一兩
桔梗六兩 陈皮二兩 前胡四兩
茯苓 半夏各三兩

【制法】共碾極細面，水泛為小
丸。

【劑量及用法】每服二錢，白開
水送下。

【禁忌】忌食生冷油膩。

十五、撫順(理肺丸)

【功能與主治】解表寧嗽，定肺
化痰。主感冒咳嗽，鼻塞流涕，發熱
惡寒，頭痛體痛，痰飲喘滿交冬即
發，聲粗音啞。

【處方】白參 广木香 紫蘇
陈皮 枳壳 半夏 甘草 茯苓
前胡 桔梗各六兩

【制法】共為細面，水泛小丸。

【劑量及用法】每服二錢，姜水
送下。

【禁忌】忌食油膩，孕婦勿服。

【備考】一方多葛根六兩。

十六、吉林、哈爾濱

(理肺丸)

【功能與主治】解表寧嗽，宣肺
化痰。主感冒咳嗽，痰飲喘嗽，交冬
即發，倚息難臥。

【處方】前胡 蘇葉 半夏各四
兩 桔梗 枳壳 陈皮各二兩 黨
參 茯苓各二兩 葛根一兩半 黃
芩二兩 木香 甘草各八錢

【制法】共碾細面，水泛為丸，如
梧桐子大，裝袋或貯于瓷罇。

【劑量及用法】每服二錢(一
付)，姜湯為引。

【禁忌】忌食油膩，孕婦忌服。

十七、呼 和 浩 特

【處方】人參 蘇葉 前胡 陈
皮 枳壳 茯苓 甘草 桔梗各十
兩二錢 半夏八兩 木香 甘草各
四兩

【制法】共為細面，水泛小丸。

通宜理肺丸

一、北 京

【功能與主治】解熱止嗽。主外
感咳嗽，發熱惡寒，頭痛無汗，四肢
痠懶。

【處方】紫蘇葉一百四十兩
橘皮 前胡 黃芩 桔梗 麻黃
枳壳 茯苓各九十六兩 半夏(制)
甘草 杏仁各七十二兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重
二錢。

【劑量及用法】每服二丸，日服
二次，溫開水送下。

二、天津、蘭州

【功能與主治】發汗解表，清肺
化痰。主治因感冒風寒引起之咳嗽
氣喘，發燒頭痛，鼻塞不通，遍身作
疼。

【處方】蘇葉一斤 麻黃六兩
生石膏二兩 甘草二斤 枳壳(麸
炒)八兩 杏仁(去皮炒) 桔梗
制半夏各六兩 冬花二兩 葛根四
兩 前胡十二兩 生桑皮八兩 广
皮四兩 浙貝母二兩 白合四兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，三
錢重，蜡皮或蜡衣筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，白开水送下。

【禁忌】肺虚者忌服(兰州)。

三、济南

【功能与主治】感冒咳嗽，鼻涕清涕。

【处方】同北京(小二十倍)。

【制法】共为细末，炼蜜为丸，三钱重。

【剂量及用法】成人每服二丸，白开水送下。

【禁忌】忌食辛辣油腻等物。

四、青岛

【处方】枳壳 桔梗 柴胡 葛根各一兩 陈皮二兩 苏叶 麻黄各一兩 半夏二兩 甘草 貝母各一兩 杏仁二兩 桑皮二兩

【制法】共轧细末，炼蜜为丸重三钱。

五、沈阳

【功能与主治】解热清肺，止咳定喘。主外感内伤咳嗽喘息。

【处方】陈皮 前胡 桔梗 黄芩 茯苓 枳壳各一斤 半夏 甘草 杏仁各七兩五钱

【制法】共碾细面，炼蜜为丸，二钱重。

【剂量及用法】每日早晚服用，每服一丸，白开水送下。

【禁忌】忌食酸辣等物。

六、承德

【功能与主治】感冒咳嗽，鼻涕清涕。

【处方】同北京。

【制法】共为细粉，水泛为丸，滑石为衣，每兩分作二百粒。亦可炼蜜为丸三钱重。

【剂量及用法】日服二次，每服二十粒，温开水送下。

【禁忌】忌受风寒。

七、呼和浩特

【处方】人参二斤半 前胡 半夏 葛根 茯苓各七斤半 木香一斤十四兩 苏叶十五斤 桔梗 枳壳各七斤半 甘草三斤十二兩 陈皮七斤半 麻黄三斤十二兩

【制法】共为细面，蜜丸三钱重。

杏苏二陈丸

一、上海

【功能与主治】伤风咳嗽。

【处方】陈皮二兩 甘草(炙)一兩 苏子(炒)二兩 姜半夏四兩 茯苓 杏仁霜各二兩

【制法】共研细粉，用生姜二兩煎汤泛丸，如绿豆大。

【剂量及用法】每服三钱，温开水送服。

二、南京

【功能与主治】主感冒，咳嗽痰多。

【处方】苦杏仁一兩(去皮尖) 姜半夏二兩 陈皮 白茯苓各一兩 炙甘草五钱 苏子 苏梗各一兩

【制法】共研细末，沸水泛丸。每钱约八十粒。

【剂量及用法】每服三钱，一日一次，开水吞服。

【禁忌】孕妇忌服。

苏子降气丸

南京

【功能与主治】降气化痰。主气逆痰壅，咳嗽喘急，胸膈噎塞。

【处方】炒紫苏子 广陈皮 制半夏 炙甘草 前胡各一钱 西当归七分 制厚朴一钱 上沉香七分

【制法】共研细末，用鲜生姜三片大枣三枚煎汤泛丸，每钱约做一百粒。

【剂量及用法】每服一钱至二钱，一日二次，空腹时开水吞服。

保肺丸

济南

【功能与主治】四时感冒，伤寒发热，咳嗽日久，痰盛气促等症。

【处方】人参三钱 苏叶五兩 前胡 广陈皮 枳壳 茯苓 桔梗各二兩四钱 广木香三钱 葛根 半夏 甘草各二兩四钱 紫苑 麻黄各二兩 薄荷二兩 薄荷霜三分

【制法】共为细粉，炼蜜为丸，重三钱。

【剂量及用法】大人每服一丸，小兒減半。感冒咳嗽姜湯送下，久

咳梨湯送下。

【禁忌】忌葷腥油腻等食物。

疎風宁嗽丸

南京

【功能与主治】止嗽化痰。主感冒初起，咳嗽，鼻塞。

【处方】桔梗 白茯苓 炒枳壳 紫苏 姜半夏各一兩二钱 麻黄一兩(去节) 广陈皮一兩二钱 杏仁一兩(去皮尖) 前胡一兩二钱 桑白皮一兩 甘葛根一兩二钱 甘草四钱

【制法】共研细末，用鲜生姜五钱 葱白十根煎汤泛丸，每钱约做八十粒。

【剂量及用法】春夏季每服一钱五分至二钱，秋冬季每服二至三钱，一日二次，开水吞服。

青菓止嗽丸

一、禹县

【功能与主治】风寒咳嗽，痰涎壅盛，肺经燥热。

【处方】青菓 枇杷叶 冬花 百合 貝母 黄芩各一兩 知母一兩五钱 杏仁一兩 麻黄五钱 法半夏一兩

【制法】共为细面，炼蜜为丸，每丸重二钱。

【剂量及用法】每服一丸，小兒每次服半丸，开水送下。

【禁忌】虚弱忌用。

【备考】有效期二年。

二、济南(止嗽清菓丸)

【功能与主治】咳嗽痰喘，肺热。

【处方】冬花(蜜制)一斤 白莱仁二斤八兩 川貝六兩 清半夏一斤 甘草六兩 兜鈴四兩 生石膏六兩 杏仁(去皮尖炒)三兩 百合八兩 黄芩一斤 麻黄(蜜制)二斤 桑皮(蜜制)一斤 西青菓十兩

【制法】共为细粉，蜜丸，重一钱五分，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸至二丸，早晚白开水送下。

清肺化痰丸

昆明

【功能与主治】伤风咳嗽，痰多

作喘。

【处方】法夏二兩 南星一兩
陈皮 枳壳 杏仁 薏仁 黄芩
茯苓 桔梗各二兩 貝母 萊菔
蘇子 甘草 麻黃 冬花各一兩

【制法】研末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服一丸。水送下。每服二錢半，幼童減半。早晚各服一次，開水送下。

【備考】對肺結核無效。

清肺止嗽丸

沈 陽

【功能與主治】順氣化痰，清肺散風。主外感風寒，咳嗽聲重，頭暈鼻塞，發熱惡寒，胸膈滿悶，喉干痰壅。

【处方】紫蘇葉 橘紅 前胡
桔梗 葛根 茯苓各五錢 寸冬
瓜蒌仁 厚朴 甘草 枳壳 川貝
母各四錢 麻黃 炒杏仁各三錢

【制法】共碾極細面，蜜丸，三錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空心開水送下。

【禁忌】忌食發物油膩。

立效丸

吉 林

【功能與主治】清痰理氣，止咳定喘。主一切風寒咳嗽，急氣帶痰，痰中帶血等症。

【处方】桑皮 清夏 川芎 紫蘇各六錢七分 白芨四錢 橘紅 薏仁各六錢七分 杏仁一兩零七分 麻黃一兩二錢四分 甘草一兩零七分 米壳(半生半制)三兩三錢四分

【制法】共為細末，煉蜜為丸，每丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，開水送下。

百花丸

一、天津(百花定喘丸)

【功能與主治】疏風解熱，止咳定喘。主咳嗽痰喘，日夜不息，不能安眠，呼吸困難，胸滿不暢，咽干口渴。

【处方】冬花二兩 川皮 陈皮各四兩 黃芩 桔梗 天冬 生紫

苑 麥冬 杏仁(去皮炒)各四兩
北沙參二兩 麻黃 花粉 前胡
薄荷各四兩 生石膏二兩 百合四兩 生五味子二兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，開水送下。

二、杭州(加味百花丸)

【功能與主治】治七情內傷，酒色無節，虛熱上炎，咳嗽喘急，口干舌啞，痰中帶血，陰虛肺傷，午后潮熱等症。

【处方】山百合(蒸焙)四兩 款冬花 白部 紫苑各四兩 烏梅肉二兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸，潮重一錢一分。

【劑量及用法】食后臨臥細嚼一丸，開水送下。

【禁忌】禁房事，忌食發物熱物。

三、吉林、哈爾濱

(止嗽百花丸)

【功能與主治】清肺熱，鎮咳嗽。主治咳嗽，痰黃氣臭，痰中帶血，自汗盜汗，骨蒸發熱及早期肺病。

【处方】阿膠 花粉 桔梗 款冬 知母 白部 黃芩 丹皮 杏仁 茯苓各一兩 桑皮二兩 山藥 寸冬 紫苑 生地 百合 川貝 玄參 天冬各兩半 甘草五錢

【制法】共碾細面，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，開水送下。(哈爾濱日服二、三次)

【禁忌】忌食辛辣。

清肺抑火丸

一、北 京

【功能與主治】清熱鎮咳通便。主治咳嗽痰盛，咽喉疼痛，口干便秘。

【处方】黃芩二百二十四兩 黃柏 前胡各六十四兩 梔子 桔梗 天花粉各一百二十八兩 知母 苦參各九十六兩 大黃一百九十二兩 貝母一百四十四兩

【制法】共為細粉，水泛小丸，滑石為衣闌亮。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌食厚味，孕婦忌服。

二、天 津

【功能與主治】清肺止咳，降火生津。主肺熱咳嗽，痰涎壅盛，咽喉腫痛，口鼻生瘡，牙齒疼痛，牙根出血，大便干燥，小便赤黃。

【处方】同北京，惟少貝母一味。

【制法】共為細粉，涼開水泛小丸，三錢重裝袋，或煉蜜為丸，三錢重。蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】水丸每次服一袋；蜜丸每次服一丸，開水送下。

【禁忌】外感風寒咳嗽及孕婦忌服。

三、蘭州(附：清肺抑火膏)

【功能與主治】清熱降火，止咳生津。主實熱咳嗽，咽喉腫痛，口舌生瘡，大便干燥，以及鼻出血，牙齒疼痛。

【处方】同北京，惟少貝母一味。

【制法】共研細面，水打小丸。

【劑量及用法】每次服三錢，開水送下。

【禁忌】外感風寒咳嗽忌服。

【備考】煎膏汁，每斤兌蜜二斤。

四、大同(清肺抑火化痰丸)

【功能與主治】瀉肺熱，祛痰。治血熱火熾。

【处方】同北京。

【制法】共軋細面，水泛小丸。

【劑量及用法】每服三錢，梨湯送下。

【禁忌】孕婦忌服。

五、濟 南

【功能與主治】實熱咳嗽，口舌生瘡，大便秘結。

【处方】同北京，惟梔子用姜汁炒。劑量及用法、禁忌，皆同。

六、青 島

(清肺抑火化痰丸)

【处方】黃芩三斤 前胡 知母各半斤 桔梗二斤 大黃一斤 梔子 花粉各二斤 黃柏一斤 桑葉二斤 菊花二斤

【制法】共軋面，水泛小丸。

七、沈陽

【功能与主治】清肺化痰，鎮咳上嗽。主头目眩暈，口舌生瘡，咳嗽咽痛，痰涎壅盛鼻塞不通，肺热痰血。

【处方】天花粉 黄芩 玄参 桔梗 半夏 橘紅各一斤 前胡 浙貝母 枇杷叶 茯苓 熟地黄 牛蒡 白菊花 薄荷 知母各八兩 粉甘草六兩

【制法】共碾極細面，水泛为小丸。

【剂量及用法】每服二錢，开水送下。

【禁忌】肺虛寒者忌服。

八、撫順

(清咽抑火丸)

【功能与主治】清肺宁嗽，降火化痰。主肺部生癰，咳吐膿血，腥臭气穢，喘急胸痛，肺热稠痰，鼻干口燥，音啞咽痛。

【处方】陈皮 茯苓 黄芩 海石 防風各二兩 川貝二兩 桑皮三兩 枳梗 花粉各二兩 知母 黄柏 酒軍 前胡 白附子 枳实 当归 半夏各三兩 甘草 赤芍 山梔 升麻各二兩

【制法】共为細面，水泛小丸。

【剂量及用法】每服二錢，一日二次，开水送下。

【禁忌】忌食辛辣；孕妇忌服。

【备考】一方多神糖四兩。

九、吉林、哈尔滨

(抑火丸、清咽抑火丸)

【功能与主治】清咽宁肺，消炎退热。主肺部生癰，火咳，吐痰帶血，腥臭气穢，喘急胸痛，寒热往来，喘息难臥。热踞肺絡，煅煉稠痰，咳嗽气喘，口燥咽痛。

【处方】連翹二錢 黄芩 梔子各二錢 薄荷錢半 防風二錢 桔梗四錢 黄連 黄柏 知母 玄参 牛蒡子 川軍 元明粉各二錢

【制法】共碾細面，煉蜜为丸，每丸重一錢。

【剂量及用法】每服一丸，开水送下。

【禁忌】忌食辛辣；孕妇忌服。

十、承德

【功能与主治】同济南，处方亦同。

【制法】共为細粉，水泛小丸，每兩分二百粒，滑石为衣，闌亮。

【剂量及用法】日服二次，每服二十粒，温升水送下。

【禁忌】忌食厚味。

十一、呼和浩特

(附：清肺抑火膏)

【处方】半夏 陈皮 桔梗 赤芍各八斤 枳壳 蕤仁各四斤二兩 黄連 黄芩 梔子 浙貝 苏子 桑皮 杏仁 皮硝各三斤 熟軍六斤 木香一斤十二兩 海石六斤 甘草一斤

【制法】共为細面，水泛小丸。

【备考】抑火膏照前方熬膏，每斤蜜膏兌入黃面四兩，元明粉二兩。

定喘丸

一、北京(定喘固金丸)

【功能与主治】疏解外感，止嗽定喘。主外感咳嗽，憎寒發热，喘急胸滿，鼻塞声重。

【处方】生石膏 杏仁 麻黄 橘皮 甘草各十六兩 五味子 細辛 干薑各四兩

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，重二錢。

【剂量及用法】每服一丸，日服二次，温升水送下。

【禁忌】忌油腻食物。

二、南京

【功能与主治】定喘，平气。主咳嗽哮喘，胸滿气逆，喉中痰鳴。

【处方】白菓(去壳炒黃)二十一粒 麻黄 炙桑白皮 款冬花各二錢 苦杏仁一錢五分 制半夏二錢 炒黄芩一錢五分 黑苏子二錢 甘草一錢

【制法】共研細末，沸水泛丸，每錢約做一百粒。

【剂量及用法】每服一錢至二錢，一日二次，开水吞服。

三、蘭州

【功能与主治】止嗽化痰。主治日夜咳嗽，不能安眠。

痰 嗽 类

【处方】丽参五錢 炙桑皮 炙麻黄各一兩 杏仁二兩 寸冬 广皮 茯苓各一兩 苏子 知母 貝母各一兩半 半夏 前胡 栝蕤仁 防風 酒苓 萊菔子各一兩 生草七錢 天冬二兩 橘紅五錢 芥子一兩

【制法】共为細面，蜜大丸，三錢重。

【剂量及用法】每服一丸，生姜湯送下。

四、大同(定喘固金丸)

【功能与主治】邪热伤肺，上嗽定喘。

【处方】炙米壳三錢 麻黄二錢 生石膏一兩 炒杏仁五錢 炙甘草三錢

【制法】共研为末，煉蜜为丸，三錢重。

【剂量及用法】每服一錢。

五、濟南

【功能与主治】老年久嗽痰多，哮喘不宁。

【处方】阿膠二斤(蛤粉炒) 茯苓 白朮各十兩 紫苏梗 白芥子 紫苏子各十二兩 紫苏叶十兩 桑白皮 川貝母各十五兩 白合九兩 杏仁(去皮尖) 广陈皮各一斤二兩 萊菔子二兩 天冬 紫苑 款冬花 何首烏各四兩 知母(酒洗) 半夏(制) 当归(酒洗)各六兩 麦冬八兩 生地三兩 黄蓍一斤 龙涎香三錢六分

【制法】共为細粉，煉蜜加梨膏汁为丸重一錢，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一錢，开水送下。

六、青島

【处方】胆星 苏子 半夏各五兩 竹黄 大黃 檳榔 浙貝 花粉 白芥子 桔梗各二兩半 葶藶子 海浮石 甘草各一兩半

【制法】共軋面，蜜丸重一錢。

七、沈陽(定喘止咳丸)

【功能与主治】清肺定喘，利气化痰。主咳嗽痰多，气逆不舒，兩脇脹滿，胸膈刺痛，喘息抬肩，不得安臥。

【处方】桔梗 橘紅 前胡 葶

藤各五錢 白朮一兩 制麻黃 冬花 姜夏各五錢 桑皮 蘇子各一錢 杏仁五錢 黃芩四錢 石膏一兩 甘草一錢

【制法】共研極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，開水送下。

【禁忌】忌食辛辣咸物。

八、承 德

【功能與主治】同濟南，處方亦同，僅少龍涎香一味。

【制法】共為細粉，煉蜜為丸重一錢，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一錢，白梨煎湯送下。

九、呼 和 浩 特

(定喘固金丸)

【處方】生石膏 麻黃 杏仁 廣皮 藥壳 甘草各一斤 五味子 砂仁各八兩

【制法】共為細面，每斤兌長春面二錢，蜜入丸，重一錢。

定 金 丸

沈 陽

【功能與主治】清肺化痰，止咳定喘。主久咳痰壅，氣促喘息，多年痰喘，胸膈滿悶，四肢倦怠，食少便秘，咽干喉痛，不得安臥。

【處方】薄荷四兩 桑皮 天冬 麥冬 炙杷叶 訶子 橘紅 阿膠 紫苑 冬花各一兩五錢 杏仁 茯苓 元明粉 枳梗各一兩 馬兜鈴 五味子各七錢五分 礞砂 冰片各五錢 瓜蒌一兩

【制法】共研極細面，竹瀝制汁白蜜煎膏為丸，一錢重。

【劑量及用法】每服一丸，開水送下，臨睡時噙化，亦可。

【禁忌】忌咸食發物。

附參考古方

【來源】惠直堂經驗方。

【功能及主治】清肺止咳，定喘化痰。

【處方】薄荷四兩 桑皮 天冬(去心) 麥冬(去心) 知母(去皮毛) 白朮 川貝 枳霜各二兩 枇杷叶(去毛、蜜炙) 訶子肉 橘

紅 阿膠 紫苑 冬花各一兩五錢 杏仁霜 茯苓 玄明粉 鉛霜 桔梗各一兩 馬兜鈴 五味子各七錢五分 礞砂五錢 真冰片一錢 瓜蒌仁 瓜蒌皮、穰各一兩

【制法】上為末，竹瀝、梨汁、蜜煎膏為丸，彈子大，可噙化。

保 金 丸

一、上 海

【功能與主治】主咳嗽哮喘。

【處方】麻黃(去節) 米醋 牛梨汁 葶藶汁 藕汁 生薑汁 蘿蔔汁各六兩 川貝母 茯苓 姜半夏 白朮(炒焦) 冰糖各四兩 韭菜六兩

【制法】將麻黃用米醋，生梨汁、藕汁、葶藶汁、生薑汁、蘿蔔汁、韭菜汁，依次拌蒸晒干，再用黃酒拌炒，再入各藥，共研細粉，用冰糖四兩烱化，和蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服一錢，溫開水送服。

二、杭 州

【功能與主治】治痰氣結胸，咳嗽喘急，痰壅哮喘，坐臥不安等症。

【處方】同上海，制法亦同。

【劑量及用法】每服一至二錢，淡鹽湯送下。

清金止嗽化痰丸

一、天 津

【功能與主治】清肺熱散風，止咳化痰。主肺熱咳嗽，痰涎壅盛，胸膈急，聲嘶聲重。

【處方】生薑仁一兩 桔梗二兩 麥冬一兩五錢 枳殼(麸炒) 制半夏 前胡各一兩 元參(去蘆)一兩 薄荷叶一兩 川貝八錢 蘇叶 黃連 杏仁(去皮炒) 銀花各一兩 橘紅一兩二錢 川芎一兩 黃芩二兩 熟軍一兩五錢 當歸 甘草各一兩 生翹(去心)一兩五錢

【制法】共為細粉，用生桑皮二兩、知母二兩熬水泛小丸，每斤丸約用硃砂五錢，滑石粉二兩四錢，研勻，衣閃亮，二錢重裝袋。

【劑量及用法】每次服一袋，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、濟 南

【功能與主治】主哮喘痰多，咳嗽便秘。

【處方】同天津，制法亦同。

【劑量及用法】日服二次，每服二錢，開水送下。

【禁忌】風寒咳嗽禁用。

三、青 島

(清金止嗽化痰丸)

【處方】茯苓 陳皮 半夏 桔梗 前胡 蘇子 養梗 杏仁 枳實 甘草 干葛 浙貝 木香各一兩

【制法】共研面，水泛小丸。

四、呼 和 浩 特

【處方】茯苓 半夏 桔梗 葛根 前胡 蘇子 陳皮各三斤 貝母 杏仁 枳實各一斤半 人參 木香各六兩 甘草十二兩

【制法】共為細面，水泛為小丸。

雞 鳴 丸

一、沙 市

【功能與主治】治氣管發炎，咳嗽氣促，哮喘痰多，睡眠不寧等症。

【處方】知母 杏仁 阿膠珠各一兩 葶藶子五錢 紫苑(炙)一兩 粉甘草五錢 法半夏一兩 北五味 桔梗各五錢 廣陳皮 全紫蘇 大門冬 罌粟壳(炙) 復花(炙) 川貝母 黨參各一兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服一錢，溫開水下。每日服一次，小兒老人酌減。

【禁忌】肺弱咳嗽而無痰喘者忌服。

二、沈陽(鷄鳴保肺丸)

【功能與主治】鎮咳定喘，補肺化痰。主咳嗽痰喘，日輕夜重，感受風寒，飢飽勞役，冷熱不勻，飲食過量，肺胃兩傷，久咳聲啞，夜間盜汗，食慾不振。

【處方】知母 貝母 旋復花 杏仁 阿膠 米芾 葶藶 款冬花各一兩 馬兜鈴五錢 甘草 清夏各一兩 麻黃一錢 五味子 廣陳皮 桔梗 紫苑 大門冬 北沙參

各一兩

【制法】共碾細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，開水送下，如惡寒時姜湯送下。

【禁忌】生冷菓瓜煙酒肉腥等。

三、撫順(鷄鳴保肺丸)

【功能與主治】化痰，定喘，鎮咳。主風寒咳嗽，發熱惡寒，咳嗽痰稠，喘息遇寒即發，氣短不能睡眠。

【處方】阿膠 知母 冬花 五味各四兩 炙草 陳皮 紫苑 麻黃各一兩 杏仁 葶藶 清夏各三錢 兜鈴一兩 桔梗 復花各五錢

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每日早、晚服一次，姜水送下。

【禁忌】忌食油膩辛辣等物。

四、吉林、哈爾濱 (鷄鳴保肺丸)

【功能與主治】宣肺化痰，寧嗽定喘。

【處方】阿膠 知母 款冬 五味各四兩 兜鈴 甘草 陳皮 紫苑 麻黃 半夏 杏仁 葶藶各二兩 茯苓 復花各一兩 桔梗五兩

【制法】共為細面，將復花熬汁，合蜜為丸，每重二錢一分。

【劑量及用法】早晚各服一丸，開水調下。

【禁忌】忌食腥辣。

五、吉林、哈爾濱 (鷄鳴定喘丸)

【功能與主治】宣肺化痰定喘。主治風寒咳嗽，發熱惡寒，頭痛體痛，咳嗽痰稠，以及肺經寒濕，痰飲喘嗽，發冬即發，喘咳難臥。

【處方】知母 阿膠 冬花 五味各四兩 兜鈴 麻黃 復花 陳皮 炙草各一兩 桔梗 人參各五錢 葶藶 杏仁 半夏各三錢

【制法】共為細面，煉蜜成丸，每丸二錢一分重。

【劑量及用法】每服一丸，早晚各服一次，用開水調服。

【禁忌】忌食辛辣膩物。

郝氏養肺丸

大 同

【功能與主治】咳嗽，肺氣不降。

【處方】粟壳一兩五錢 五味子一兩五錢 姜半夏二錢 廣陳皮一錢五分 生石膏 广木香各一錢 糖瓜散 麻黃各二錢五分 酒黃芩二錢 冬花 粉甘草各二錢五分 百合三錢

【制法】共碾細面，煉蜜為丸，每重二錢。

【劑量及用法】每次服一丸，開水送下。

解肌安嗽丸

濟 南

【功能與主治】感冒風寒，鼻流清涕，頭痛身熱，咳嗽多痰。

【處方】紫蘇叶 桔梗各三兩 前胡 杏仁各二兩 枳壳 廣皮 黃芩 防風 荆芥 大浙貝 葛根各兩半 牛蒡子一兩 薄荷二兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸，重一錢。

【劑量及用法】每服一丸，開水送下。

【禁忌】忌食辛辣油膩等物。

寧 嗽 丸

一、上 海

【功能與主治】主咳嗽痰多。

【處方】茯苓二兩 杏仁(去皮尖) 桑皮各一兩五錢 姜半夏 川貝二兩 橘紅 谷芽(炒)各一兩 黑蘇子二兩 薄荷一兩五錢 甘草五錢 川石斛 桔梗各二兩

【制法】除川石斛、谷芽外余藥共研細粉，以川石斛、谷芽二味煎湯泛丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二錢，溫開水送服。

二、杭 州

【功能與主治】止咳寧嗽。主咳嗽痰多，身熱咽痛。

【處方】同上海。

【制法】共研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服二錢，開水送下。

太平丸(寧嗽太平丸)

一、沙市(五更太平丸)

【功能與主治】治氣管發炎，下咳咽痛，或咳嗽膠痰，喘促不臥等症。

【處方】薄荷叶一兩 白部(酒洗) 麥冬 天冬各二兩 粉甘草 桔梗各一兩 桑皮 枇杷叶(去毛炙) 川貝母 紫苑(炙) 橘紅(炙) 冬花(炙) 北沙參 玄參各二兩 五味一兩 柿霜(后入)二兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，每日二次，溫開水送下，小兒老人酌減。

【禁忌】體質虛寒，咳嗽稀痰而無炎症者忌服。

二、西 安

【功能與主治】主治肺萎咳嗽，痰中帶血，骨蒸潮熱。

【處方】天門冬 麥門冬 款冬花 知母各二錢 杏仁一錢半 生地黃 熟地黃 川黃連 當歸 阿膠各一錢半 蛤粉(炒) 炒蒲黃 京墨 桔梗 薄荷各一錢 麝香二分 貝母二錢

【制法】上藥除麝香外其餘共研細末，羅后，加入麝香再研勻，煉蜜為丸如川椒大。

【劑量及用法】每服二至三錢，早晚用溫開水化服，緩緩嚥下。小兒按年齡遞減。

【禁忌】忌辛辣刺激性食物，大便秘結者不宜服用。

三、蘭州(太平養肺丸)

【功能與主治】潤肺化痰，疏通氣管。主氣管發炎，哮喘肺虛，肺萎痰中帶血，胸膈脹滿等症。

【處方】酒制熟地 牛地 天冬 麥冬 當歸 杏仁 川貝 冬花 阿膠各一兩 桔梗 蒲黃 京墨各五錢 白部一兩 訶子肉七錢 梅片二錢 麝香二分

【制法】共研細末，蜜丸二錢重，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，早晚各一次，白開水送下。

四、沈陽

【功能与主治】理肺鎮咳，化痰清火。主虛弱咳嗽，喉痒咽干，咳嗽吐血，胸熱脹痛，痰壅氣喘，夜不得臥。

【处方】知母 川貝母 款冬花 紫苑 寸冬 百合 苏子 当归 沙參 陈皮 阿膠 天冬 白芍 元參各一兩

【制法】共碾細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，開水送下。

【禁忌】忌食辛辣油膩生冷。

五、撫順

【功能与主治】清肺寧嗽止血。主肺結核初期，肺熱傷津，咳嗽氣喘，燥咳口干。久嗽傷肺，痰中咯血，音啞聲嘶。

【处方】知母 川貝 寸冬各六兩 百合四兩 苏子二兩 当归 冬花各六兩 紫苑八兩 生地六兩 元參 白芍各四兩 天冬六兩 沙參 陈皮各四兩 桑皮 阿膠各六兩 制百部四兩 杏仁 桔梗各六兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，每日二次，開水送下。

【禁忌】辛辣油膩等物。

六、吉林

【功能与主治】清肺金，寧嗽喘，止吐衄，定喘哮。主肺熱咳嗽，痰中帶血，舌干口燥，俯臥不寧，久嗽音啞，胸脇作痛。

【处方】川貝 阿膠 五味 当归 白芍各一兩 天冬 桑皮 寸冬 茯苓 前胡各二兩 百合三兩 冬花二兩 紫苑 桔梗各兩半

【制法】共為細末，用細絹羅篩之極細為度，煉蜜為丸，每丸二錢一分重。

【劑量及用法】大人每服一丸，一日三次。八至六歲每服半丸，五至三歲一丸分三次服，三至一歲一丸分八次服。白開水送下。

七、哈爾濱

【功能与主治】清肺寧嗽，止血定喘。主肺熱喘嗽，肺熱咳血。

【处方】同吉林，制法亦同。

【劑量及用法】每服一丸，日二、三次，白開水調下。

【禁忌】忌食辛辣膩物。

八、呼和浩特

【处方】天冬 寸冬 知母 杏仁 葛花 桑皮各十兩二錢 川貝 一兩 百部 黃連 阿膠 薄荷 桔梗 当归各十兩二錢 蒲黃六兩 京墨四兩

【制法】共為細面，蜜大丸，重二錢五分。

附參考古方

【來源】沈氏尊生書。

【功能与主治】專治虛癆久嗽肺萎。

【处方】天冬 麥冬 知母 貝母 款冬花 杏仁各二兩 当归 生地 熟地 阿膠各一兩半 蒲黃 京墨 桔梗 薄荷各一兩 白蜜四兩 麝香一錢。

【制法】用銀石器先煉白蜜，再下諸藥末攪勻，再上火，入麝末熬數沸作丸，彈子大。

【劑量及用法】每日二服，食後細嚼一丸薄荷湯緩緩送下，次噙一丸。按盛先用飴糖拌消化丸吞下，却噙此丸，仰臥使藥入肺竅，則肺清潤，其嗽退除，七日病痊。

寧嗽化痰丸

一、天津、蘭州

【功能与主治】上嗽化痰，清熱定喘。主多年咳嗽，老病痰喘，咽干口渴，胸悶氣短，痰中帶血。

【处方】生桑皮 生紫苑各十兩 橘紅 麥冬各八兩 川貝 桔梗各五兩 白部四兩 冬花 元參(去蘆) 炒苏子 甘草各二兩 生地十兩 前胡 百合各八兩 生梔子 半夏 糊(麩炒)各五兩 当归 知母各五兩 大冬 復花 杏仁(去皮炒) 黃芩各二兩 花粉 五味子各五兩 (蘭州多生阿膠四兩)

【制法】共為細粉，煉蜜為丸二錢五分重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，開水送下。

【禁忌】外感咳嗽忌服。

二、沙市

【功能与主治】治感冒風寒，咳嗽痰多，或咳嗽稀痰，氣逆喘促等症。

【处方】法夏 广陈皮各二兩 桔梗 粉甘草各一兩 苏子二兩 薄荷叶一兩 炙桑皮 鮮石斛 川貝母 杏仁泥 茯苓各二兩 谷芽(炒)一兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服三錢，溫開水下，日服二次，小兒老人酌減。

【禁忌】水份不足、干咳無痰者忌服。

三、呼和浩特

【处方】川貝母 冬花各一斤四兩 桑皮二斤半 杏仁 阿膠 五味各十兩 天冬 酒苓 半夏各十兩半 甘草五兩

【制法】共為細面，蜜大丸，重三錢。

二母寧嗽丸

一、北京、承德

【功能与主治】清熱化痰上嗽。主咳嗽痰盛，氣促胸滿。

【处方】石膏(生)二兩 知母 貝母各一兩五錢 梔子 黃芩各一兩二錢 瓜蒌子 茯苓 桑皮 橘皮各一兩 枳實七錢 甘草 五味子各二錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重二錢。

【劑量及用法】每服二丸，日服二次，姜湯或溫開水送下。

【禁忌】忌食辛辣之物。

二、天津(二母安嗽丸)

【功能与主治】清肺化痰，止嗽定喘。主虛勞久嗽，春秋發，咳嗽痰喘，骨蒸潮熱，音啞聲重，口燥舌干，痰涎壅盛。

【处方】冬花十八斤 浙貝母三斤 生紫苑 百合各六斤 生米壳十二斤 知母 元參(去蘆) 麥冬 杏仁(去皮炒)各六斤

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸。白開水送下。

三、武 汉

【功能与主治】咳嗽日久，痰盛气促。

【处方】川贝母 知母各八兩

【制法】上药干燥，混合碾细，照净粉量加炼蜜30~40%，迭成小丸，每钱不得少于二十五粒。

【剂量及用法】每服一钱，日服二次，温开水吞服。

四、昆明(二母丸)

【功能与主治】肺热咳嗽，痰中帶血。

【处方】贝母十六兩 知母四兩 酒軍十六兩 黄芩八兩 前胡四兩 花粉 桔梗各八兩 杏仁 桑皮各四兩

【制法】研末，水迭为丸，每重二钱半。

【剂量及用法】每服一丸，幼童減半，开水送服。

【禁忌】伤風咳嗽和水飲咳嗽忌服。

五、西 安

【功能及主治】主治气虛，津液枯燥，貧血，咳嗽，胸中隱痛，耳鳴，体倦諸症。

【处方】知母 貝母 天冬各五錢 生地 熟地各八錢 山茱肉 三錢 丹皮二錢 山藥五錢 阿膠珠八錢 澤瀉錢半 紫苑三錢 冬花五錢 五味子二錢 茯苓三錢 油肉桂一錢五分 砂仁一錢

【制法】上搗細末，煉蜜为丸，每重二钱用蜡皮包裹。

【剂量及用法】每服一至二丸，早晚各服一次，温开水送下。

【禁忌】痰飲咳嗽、風寒咳嗽、大便稀溏者不宜服用。

六、蘭 州

【功能与主治】止嗽化痰，清热定喘。主肺虛气弱，咳嗽痰喘，口干舌燥，痰中帶血。

【处方】同大津。制法、剂量及用法亦同。

七、大 同

【功能与主治】肺气不清，三焦邪热，痰涎壅塞。

【处方】浙贝母 知母 天門冬

云苓 广皮各二兩 五味子一兩 半夏 冬花 桑白皮 桔梗 大花粉各二兩 前胡 紫苏 杏仁各一兩 麦冬二兩 地骨皮 薏仁各一兩

【制法】共为細面，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每次服二钱，梨湯送下。

八、禹 县

【功能与主治】清肺宁嗽，化痰定喘，肺勞咳嗽，痰中帶血。

【处方】知母 川貝各八兩 天冬 冬花 玄參 紫苑 橘紅 黄芩 前胡 花粉各四兩 麦冬 桔梗各六兩 百部 云茯苓各二兩 丹皮 桑皮各二兩 炙甘草一兩

【制法】共为細面，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服二钱，开水送下。

【禁忌】寒嗽忌用。

【备考】有效期二年。

九、濟 南

【功能与主治】咳嗽日久，痰盛气促。

【处方】川貝母(去心) 知母各二兩 黄芩(酒炒)二兩 橘紅一兩 五錢 桑白皮二兩 瓜蒌 生石膏各二兩 炒梔子二兩 赤芍一兩 五味子 枳实 甘草各五錢

【制法】共为細末，煉蜜为丸，重二钱。

【剂量及用法】每服二丸，小兒酌減，开水送下。

【禁忌】忌辛辣油膩等食物；外感風寒咳嗽忌用。

十、青 島

【处方】款冬花 薄荷各二兩 知母 貝母各三兩 米壳四兩 桔梗 桑皮各二兩 紫苑二兩 茯苓四兩 天冬 麦冬各二兩 生地 陈皮 半夏 当归各四兩 白芍二兩

【制法】共为面，蜜丸，重二钱。

十一、沈 陽

【功能与主治】化痰鎮咳，定喘止嗽。主咳嗽痰喘，声啞喉痛，痰中帶血，骨蒸潮熱，鼻孔生瘡，肺痿肺癰，吐痰腥臭，胸肋隱痛。

【处方】知母 川貝 天冬 瓜

痰 嗽 类

薏仁 生地各二兩 白菓 茯苓 杏仁 沙参 白部 生药各二兩 半夏五錢 甘草一兩 麦冬二兩

【制法】共碾細面，煉蜜为丸，二钱重。

【剂量及用法】每服一丸，开水送下。

【禁忌】忌食辣物烟酒。

十二、撫 順

【处方】知母 貝母 寸冬 天冬 元參 冬花 炙草 阿膠 桔梗 百合 紫苏 归尾 白部各八錢 白芍五錢 熟地二兩

【制法】共为細面，蜜丸，二钱重。

十三、哈爾濱(二母丸)

【功能与主治】清肺宁嗽，定喘止血。主肺熱喘嗽，痰稠色黃，咳嗽气喘，口燥舌干，日久肺癆，痰中帶血，胸肋疼痛，骨蒸發熱。

【处方】知母 川貝 梔子 黄芩 桑皮 茯苓 薏仁 陈皮各二兩 枳实 五味各一兩半 甘草一兩

【制法】共为細面，煉蜜为丸，二钱一分重。

【剂量及用法】每服一丸，日二，三次，开水調下。

【禁忌】忌食辛辣油膩。

十四、呼 和 浩 特

【处方】石膏 貝母 知母各四斤四兩 梔子 黄芩各六斤 桑皮 赤芍 薏仁 陈皮各五斤 枳实三斤半 甘草一斤 五味子十兩 一錢

【制法】共为細面，蜜丸，重三钱。

止嗽化痰丸

一、北 京

【功能与主治】潤肺化痰止嗽。主咳嗽痰盛，喘促不安。

【处方】知母 杏仁 玄參 麦冬 紫苑 百合各九十六兩 貝母四十八兩 款冬花一百四十四兩 米壳九十六兩

【制法】共为細粉，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服三钱，日服二次，温开水送下。

【禁忌】忌食辛辣油膩；孕妇忌

服。

二、承 德

【功能与主治】痰喘咳嗽。

【处方】知母 杏仁 玄参 麦冬 紫苑 百合各六斤 川贝 苏子 瓜蒌 法半夏各一斤 款冬花九斤

【制法】共为细粉，水泛为丸，滑石为衣，每丸二百粒。

【剂量及用法】日服二次，每服二十丸，温开水送下

【禁忌】忌食油腻。

止嗽定喘丸

沈 陽

【功能与主治】止嗽定喘。主風寒咳嗽，胸膈肋痛，惡寒發熱，痰咳不爽，痰飲稀涎，气促喘悶，夜不能臥，喉如水鷄聲，逢冷犯嗽，經年不愈。

【处方】生芍一兩 甘草八錢 橘紅二兩 清夏 生石膏 白前 麻黃各一兩 干姜五錢 前胡二兩 炒杏仁 五味子 海浮石各一兩 桂枝八錢 紫苑一兩 生牡蠣二兩

【制法】共碾細面，煉蜜为丸，二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下。

【禁忌】忌食辣腥生冷。

蔓 嗽 丸

沈 陽

【功能与主治】鎮逆降气，理肺治咳。主小兒連声咳嗽不止，甚則嘔吐涎沫，乳食(古名驚驚咳，西医为百日咳)。

【处方】牛蒡子 葶藶子 旋复花 山楂肉各二錢 青蒿 紫苏各二錢

【制法】共碾細面，煉蜜为丸，七分重。

【剂量及用法】每服一丸，开水送下。

【禁忌】五辛、油腻。

止 咳 丸

一、武 汉

【功能与主治】咳嗽头痛，气逆

痰壅，及因感冒引起的咳嗽。

【处方】桔梗二兩 枇杷叶一兩 甘草六兩 苏子 荆芥各一兩 枳壳八錢 茯苓 陈皮各一兩 馬兜鈴八錢 法半夏 前胡各一兩 杏仁八錢

【制法】上药干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜170~190%，和成大丸，每丸重一錢。

【剂量及用法】每服三錢，日服二次。

二、南 昌

【功能与主治】咳嗽气促，痰多胸悶。

【处方】桔梗(炒) 荆芥 紫苑 蒸白部 蒸白前各二斤 生甘草(炒)二兩 广陈皮(水洗去白)一斤

【制法】共为細木，水泛为丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每服二錢，开水化下，小兒視年齡及病情酌減服。

【禁忌】魚蝦烟酒糯米勿食。

三、承 德

【功能与主治】咳嗽痰多，气促不安。

【处方】同武汉，制法亦同。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下。

立止咳嗽丸

济 南

【功能与主治】久嗽痰喘。

【处方】麻黃 杏仁各五錢 桔梗八錢 蜜仁四錢 丹皮二錢 杭芍四錢 黃芩三錢 黃連二錢 梔子 花粉各三錢 茯苓五錢 清夏二錢 沙參四錢 橘紅二錢 川貝 五味子 甘草各二錢 米壳一兩

【制法】共为細木，煉蜜为丸，每重一錢五分。

【剂量及用法】每服二丸，小兒一丸，开水送下。

【禁忌】辛辣油腻。

止咳定喘丸

济 南

【功能与主治】男妇癆病，傷風

痰喘，胸悶咳嗽，晝夜不臥。

【处方】杏仁 麻黃 石膏 苏子 川朴 广皮 甘草 米壳各三錢 松蘿茶一兩

【制法】共为細木，水泛为丸。

【剂量及用法】每服三錢，开水送下。

【禁忌】辛辣油腻。

止咳化痰丸

一、重 庆

【功能与主治】順气止咳，化痰定喘。

【处方】橘皮 枯矾各四兩 胆南星 沉香各二兩 淡豆豉 川貝母 砂仁各四兩 法半夏七兩五錢 苏子 广木香 大竹黃各二兩 青礞石一兩 葶藶七兩五錢 秋石一兩。

【制法】沉香、川貝母另研胆南星、秋石化水，余药共研細木加入沉香、川貝母煉蜜和胆南星、秋石汁和丸紙盒包裝。

【剂量及用法】每服二錢至三錢。

【禁忌】風寒感冒咳嗽忌服。

二、济 南

【功能与主治】能清利咽喉，化痰涎，保肺金，定喘急，降有余之火。主治痰喘咳嗽。

【处方】大門冬 麦門冬 黃芩 半夏各六兩 款冬花 川貝母各八錢 桑白皮一斤 生阿膠 制杏仁 五味子各四兩 甘草二兩

【制法】共为細木，煉蜜为丸，每丸重一錢五分。

【剂量及用法】每服一丸，早晚各服一次，清茶或开水送下。

噤化止咳丸

禹 县

【功能与主治】肺經燥热，乾咳無痰，久咳陰虛，火熱等症。

【处方】川貝母 冬花 花粉 陈香元各二兩 訶子 薄荷各一兩 天冬 麦冬 紫苑各二兩 玄參 桔梗 甘草各一兩 正五味 烏梅肉各五錢 柿餅四兩 梨汁 蘿蔔汁各一碗 飴糖二兩 玄明粉五錢 姜汁三錢

【制法】先將川貝、冬花、花粉、香元、訶子、薄荷共研細面，再將余藥煎熬成膏，和藥為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每次用五粒，每用一粒嚥化。小兒每次用二粒，開水調化送下。

【禁忌】寒咳忌用。

【備考】有效期二年。

半 貝 丸

一、上 海

【功能與主治】咳嗽多痰。

【處方】川貝母六兩 生半夏（漂淨）四兩

【制法】共研細粉，用生薑一兩，煎湯泛丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服一至三錢，溫開水送下。

二、南 京

【功能與主治】止咳化痰。

【處方】同上海。

【制法】生半夏必須漂透，減輕麻性，曬，與川貝共研細末，以鮮生薑汁泛丸，每錢約三百粒。

【劑量及用法】每服一錢，開水吞服。

【禁忌】孕婦忌服。

三、杭 州

【功能與主治】治風痰暑濕各種瘧疾，咳嗽多痰，飲食無味，兼治癰癤瘰癧等症。

【處方】同上海，制法亦同。

【劑量及用法】每服一錢五分至三錢，淡姜湯送下。

四、重 慶

【功能與主治】治風痰暑濕瘧疾，咳嗽多痰，飲食無味，兼治癰癤瘰癧等症。

【處方】精制法半夏四兩 川貝母六兩

【制法】共研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】一錢至三錢，姜湯送下。

惜 紅 丸

吉 林

【功能與主治】清痰止咳定痛。

主治咳血嗽痰，咽喉腫痛等症。

【處方】姜蜜一兩三錢四分 烏梅肉二十一個

【制法】共為細末，用醋糊為小丸。

【劑量及用法】每服一錢，用醋水送下。

射干麻黃丸

南 昌

【功能與主治】咳喘喉中水雞聲。

【處方】射干三錢 麻黃 生薑各四錢 細辛 紫苑 冬花各二錢 大棗七枚 半夏五錢 五味子三錢

【制法】研木水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每日服二次，每服三錢，小兒視年齡及病情酌減，開水煎稍澄清服。

【備考】非經醫師處方不得使用。

二 陳 丸

一、北 京

【功能與主治】祛濕消痰，強心安胃。主痰飲咳嗽，作嘔胸滿，心悸不安。

【處方】半夏（姜制） 橘皮各五兩 茯苓二兩 甘草一兩五錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重二錢。

【劑量及用法】每服二丸，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天 津

【功能與主治】去濕消痰，健胃強心。主濕痰咳嗽，嘔吐惡心，頭目眩暈，胸腹脹滿，心悸不安。

【處方】姜制半夏二兩 甘草五錢 廣陳皮 茯苓（去皮）各一兩

【制法】共為細粉，每料用生薑一兩取汁，和涼開水泛小丸，三錢重裝袋。

【劑量及用法】每次服一袋，白開水送下。

三、上 海

【功能與主治】咳嗽脹滿，脾胃不和。

【處方】同天津。

【制法】共研細粉，用生薑一兩煎湯泛丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服一錢五分至三錢，溫開水送服。

【禁忌】油膩厚味。

四、南 京

【功能與主治】主痰飲，咳嗽，脹滿，嘔吐，惡心，頭眩，心悸等症。

【處方】同天津。

【制法】共研細末，用生薑煎湯泛丸，每錢約八十粒。

【劑量及用法】每服二至三錢，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

五、武 漢

【功能與主治】痰飲咳嗽，胸滿嘔吐。

【處方】半夏（姜制）五兩 炙甘草一兩 廣陳皮五兩 茯苓二兩

【制法】上藥干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于三十粒。

【劑量及用法】每服三錢，熱湯送下。

六、福 州

【功能與主治】治痰飲嘔惡，風寒咳嗽，或頭眩心悸，或中脘不快，或因午冷，或飲酒過多，脾胃不和等症。

【處方】陳皮 半夏（制）各二錢 茯苓二錢 炙草一錢

【制法】共研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】用姜、棗湯送。

七、杭州（除痰二陳丸）

【功能與主治】治脾胃不和，痰飲為病，咳嗽脹滿，嘔吐食少，頭眩心悸，等症。

【處方】同天津，分量加倍。

【制法】共研細末，姜汁和水泛丸。

【劑量及用法】每服三錢，開水送下。

八、大 同

【功能與主治】去濕順氣。主治痰飲，頭暈目眩。

【處方】半夏 橘紅 茯苓 桔

梗 枳实 甘草各等量

【制法】水泛小丸。

【剂量及用法】每服二錢。

九、济 南

【功能与主治】痰飲咳嗽，胸滿嘔吐。

【处方】陈皮一兩 法半夏二兩 茯苓一兩 炙甘草五錢

【制法】共为細粉，姜、枣煎湯水泛为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢。

十、青 島

【处方】陈皮 半夏 茯苓 甘草 南星 蒼朮 葛根 神曲 麦芽 黃連 竹茹 杏仁 花粉 梔子

【制法】共研面，水泛丸。

十一、呼和浩特

(古方二陈丸)

【处方】陈皮 半夏 茯苓各八兩 甘草二兩

【制法】共为細面，水泛小丸。

橘 紅 丸

一、北 京

【功能与主治】化痰止咳。主咳嗽气促，痰盛胸滿。

【处方】化橘紅二十四兩 貝母 茯苓 麦冬 杏仁 生石膏 瓜蒌皮 橘皮 生地各十六兩 桔梗 紫苑 半夏 紫苏子各十二兩 甘草 款冬花各八兩

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，重二錢，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服二丸，日服二次，溫开水送下。

【禁忌】慎風寒；忌食油膩。孕妇慎服。

二、天津(橘紅化痰丸)

【功能与主治】扶虛止咳，化痰定喘。主虛熱咳嗽，气促喘急，痰涎壅盛，胸悶作滿。

【处方】糯米壳 甘草 川貝母 白矾各一斤八兩 淨金灯 杏仁(去皮炒)各一斤 七爪橘紅 生五味子各一斤八兩

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，開水送下。

三、蘭州(橘紅化痰丸)

【功能与主治】止咳化痰。主咳嗽气喘，嘔吐痰涎，胸部作痛，实熱胸滿。

【处方】橘紅 生草 川貝各三兩五 烏兜芩四兩 杏仁五兩 白矾 五味子各三兩五錢 清夏二兩五錢 紫苑一兩五錢

【制法】蜜大丸二錢重，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服二錢，開水送下。

【禁忌】忌生冷及刺激性食物。

四、大 同

【功能与主治】化痰止咳，順氣息喘。

【处方】化橘紅 川貝母 茯苓 麦冬 杏仁 生石膏 薏仁 陈皮 米壳 生地各一斤 桔梗 紫苑 制半夏 苏子各十二兩 炙草 冬花各八兩

【制法】共軋細面，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服三錢，開水送下。

五、济 南

【功能与主治】化痰止咳，降气寬中。

【处方】同北京，制法亦同。

【剂量及用法】每服一丸，開水送下。

【禁忌】忌食辛辣等物。

清氣化痰丸

一、上 海

【功能与主治】化痰定喘。

【处方】姜半夏 胆星各二兩五錢 栝蒌仁霜 杏仁(去皮尖) 茯苓 枳实(麸炒) 黃芩(酒炒) 橘紅各一兩

【制法】共研細粉，生姜二兩打汁和水泛丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每服二錢，溫開水送服。

二、南 京

【功能与主治】清熱，化痰。主熱痰上扰，胸膈痞悶，气逆，痰多。

【处方】同上海。

【制法】共研細末，以鮮生姜汁和沸水泛丸，每錢約做八十粒。

【剂量及用法】每服二錢，開水和服。

三、武 汉

【功能与主治】咳嗽胸悶，食少煩躁，气逆痰多。

【处方】同上海，仅橘紅作陈皮。

【制法】上药干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于三十粒。

【剂量及用法】每服一至二錢。

四、福 州

【功能与主治】順气快脾，化痰消食。治膏粱厚味之人，胸滿痰盛，內多积熱郁結者服之有效。

【处方】半夏 兩星 白矾 皂角 姜各四兩 陈皮 青皮 苏子 萊菔子(炒) 杏仁 葛根 神曲 麦芽(炒) 山楂 香附各二兩

【制法】以白矾、皂角、干姜用清清水五碗煎取一碗，次入半夏、兩星浸兩日，再煮，至半夏、兩星無白点为度，晒干，与余药共研末，蒸餅为丸。

五、杭 州

【功能与主治】舒肺順气，消食化痰，鎮咳定喘，健胃進食，主痰熱上壅，胸膈痞悶，咳嗽气喘，飲食少思等症。

【处方】同上海，仅杏仁作杏仁霜。制法亦同。

【剂量及用法】每服二錢，用清茶送下。咳嗽者用梨湯下，胸膈不利者用淡姜湯下。

【禁忌】忌食油、麵、生冷、椒、酒、熱物。

六、南 昌

【功能与主治】風熱咳嗽痰涎多，或黃白相間，气喘胸滿。

【处方】同上海，仅分量加倍。

【制法】共研末，以姜汁一兩，淡竹瀝二兩，糊丸如綠豆大。

【剂量及用法】每服二至三錢，開水送下。

【禁忌】風寒咳嗽，干咳無痰者不宜；忌食酸、辣、油膩食物。

七、重 庆

【功能与主治】清肺健脾，顺气宽胸，消食化痰，宁嗽定喘开胃。

【处方】半夏 胆南星各一兩 五錢 橘紅 枳实 杏仁 桔梗 茯苓 伏苓各十兩

【制法】共研細末，水泛为丸。

【剂量及用法】每服一錢。

【禁忌】脾胃虛弱者不可服。

八、蘭 州

【功能与主治】开胃顺气，降热除痰。主咳嗽痰喘，胸脇脹滿，消化不良，咽喉腫痛。

【处方】海浮石一斤 白朮一斤 陈皮六斤 蔓仁二斤 南星一斤 貝母一斤 茯苓二斤 黃連一斤 半夏四斤 百部六斤 东楂 香附各四斤 元參一斤 熟軍二斤 萊菔子一斤 枳实四斤 蘇子 黃芩各六斤 青黛一斤

【制法】共研細面，水泛小丸。

【剂量及用法】每服三錢，开水送下。

【禁忌】外感咳嗽忌服。

九、大 同

【功能与主治】清肺气，化痰涎。

【处方】南星 半夏 青皮 枳实 陈皮 枳壳 白朮 茯苓 蘇子 白芥子 萊菔子 香附 蔓仁 桔梗 杏仁 黃芩 神曲 麦芽 山楂各五錢 生草一兩

【制法】水丸，菟豆大。

【剂量及用法】每服二錢。

十、濟 南

【功能与主治】清肺止咳，化痰定喘，开胃宽中。

【处方】同蘭州，惟百部用二斤。制法、剂量及用法亦同。

【禁忌】孕妇禁服。

十一、呼和浩特

【处方】南星 半夏各二斤 神曲 麦芽各一斤 陈皮 枳实 白朮 茯苓 蘇子 萊菔子 香附 山楂 白朮 青皮 蔓仁 甘草 黃連各八兩 西芩十兩

【制法】共研細面，水泛小丸，青黛衣。

附参考古方

【来源】沈氏尊生書。

【功能与主治】热痰。

【处方】半夏二兩 陈皮 赤苓各一兩 黃芩 連翹 山梔 桔梗 甘草各一兩 薄荷 荆芥各五錢

【制法】姜汁糊丸。

【剂量及用法】姜湯下五十丸。

【备考】此方乃二陈湯合凉膈散也。

清火化痰丸

呼和浩特

【处方】半夏 陈皮 桔梗 赤苓各六錢 枳壳 蔓仁各四錢五分 黃連三錢 黃芩 梔子 貝母 蘇子 桑皮 杏仁 皮硝各三錢 熟軍六錢 木香三錢 海石六錢 紫朴 甘草 沉香各三錢

【制法】共研細面，蜜丸，重二錢，半金衣，蜡皮封固。

顺气消食化痰丸

一、上海、武汉

(消食化痰丸)

【功能与主治】胸膈脹悶，咳嗽痰多。

【处方】姜半夏 胆星各十六兩 青皮(炒) 山楂(炒焦) 六神曲(炒焦) 橘紅 蘿蔔子(炒) 麦芽(炒) 杏仁(去皮尖炒) 黑蘇子(炒) 葛根 香附(制)各一兩

【制法】共研細粉，用生薑八兩打汁和水泛丸，如綠豆大。(武汉用生薑、水送为小丸)

【剂量及用法】每服三錢，溫开水送服。

二、南 京

【功能与主治】化痰消食。

【处方】同上海，惟姜半夏及胆星均仅用一兩。

【制法】共研細末，以鮮生薑汁和沸水泛丸，每錢約做八十粒。

【剂量及用法】每服一錢，开水吞服。

三、福 州

【功能与主治】治消食生痰，胸

悶腹脹，肺經不順，以至咳嗽漸成損症。

【处方】半夏(姜制) 胆星各一斤 陈皮去白 青皮 蘇子 沉香(水炒) 萊菔子 生薑 麦芽(炒) 神曲(炒) 山楂(炒) 葛根 杏仁(炒去皮尖) 香附(醋炒)各一兩

【制法】共研細末，姜汁和水泛为丸。

化 痰 丸

大 同

【功能与主治】寬胸化痰止嗽。

【处方】知母四錢 杏仁三錢 桔梗五錢 莢朮四錢 葶藶三錢 冬化四錢 旋復花一兩 姜半夏三錢 炙草 橘紅 兜鈴各一兩 五味子四錢 麻黃一兩 人參五錢

【制法】共研細面为丸。

【剂量及用法】每服一錢，开水送服。

竹瀝达痰丸

一、上 海

【功能与主治】痰多喘急。

【处方】大黃(制) 黃芩(酒炒) 陈皮各二兩 煅硝 青礞石(同煅)各一兩 沉香五錢 姜半夏二兩

【制法】共研細粉，以竹瀝八兩，生薑汁二兩，和水泛丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每服二錢，溫开水送服。

【禁忌】孕妇忌服。

二、福 州

【功能与主治】治痰火上升，喘急昏迷，如癡如狂、惊厥厥逆，以及老幼因痰多而变生之症。

【处方】人黃 橘紅 黃芩 半夏各二兩 礞石一兩 甘草一兩 沉香五錢

【制法】共研細末，竹瀝、姜汁泛丸。

三、杭 州

【功能与主治】治痰热上壅，喘急昏迷，煩悶癡狂，不省人事，厥逆惊痛，一切痰迷变幻諸症。

【处方】制人黃 黃芩 橘紅各二兩 真沉香五錢 姜半夏一兩五錢 粉甘草 青礞石(入火硝三錢同煅金色取淨)各一兩

【制法】共研細末，用竹瀝八兩，

和姜汁一杯泛丸，礞石粉为衣。

【剂量及用法】每服二至三錢，开水送下。

四、吉林、哈尔滨

(化痰丸、竹瀝化痰丸、达痰丸)

【功能与主治】豁降頑痰，清火順气，止咳嗽。主風痰癱瘓，暈倒抽搐，痰鳴漉漉，呼吸急促；並主頑痰膠結，痰火癩狂奔走叫罵，哭笑無定。

【处方】橘紅 竹瀝 半夏 青礞石 明粉 甘草 沉香各五錢 酒軍 黃芩各八錢

【制法】先將青礞石用焰硝五錢同入一瓦罐內，鹽泥封口，煅至石色如金为度。取出和其它藥品共研为細面，再用竹瀝、新姜汁水泛为小丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢，飯前空心服之，开水送下。

【禁忌】忌食辛辣生冷；孕妇忌服。

附参考古方

【来源】沈氏尊生書。

【功能与主治】痰核。

【处方】大黃 黃芩各八兩 沉香五錢 人參 白朮 茯苓 陈皮 甘草 半夏各三兩 礞石 焰硝(煅过)一兩

【制法】以竹瀝姜汁和如稀糊，磁器內晒干，又研細，又以竹瀝姜汁和晒，共三次，再研，仍以竹瀝姜汁和丸。

【剂量及用法】每服百丸，米湯下。

【禁忌】孕妇忌用。

竹瀝化痰丸

一、重 庆

【功能与主治】化痰平喘，止咳理肺。

【处方】天冬 枳实 麦冬 云苓 沙參各三兩 瓜蒌子(霜) 川貝母 桔梗 橘皮 苏叶各二兩 竹茹四兩 薄荷 甘草 杜枝各二兩

【制法】共研細末，煉蜜为丸，每重三錢，蜡壳封固。

【剂量及用法】每服一丸，临臥时开水下。

二、蘭 州

【功能与主治】止咳化痰，开胃利便。主实痰胸满胃脘痛，呃逆作嘔，大便不通等症。

【处方】海石一斤 白朮二斤 陈皮六斤 薏仁二斤 南星三斤 茯苓二斤 黃連一斤 半夏四斤 白部二斤 南楂 香附各四斤 元參一斤 熟軍三斤 萊菔子二斤 枳实四斤 苏子七斤 黃芩 杏仁 貝母各一斤

【制法】共研細末，以竹瀝水打小丸。

【剂量及用法】每服二錢，开水送下。

【禁忌】外感和虛熱咳嗽症忌服。

三、青 島

【处方】同蘭州，惟苏子分量用六斤。

【制法】共軋面，水泛小丸。

四、沈 陽

【功能与主治】清热利湿，順气化痰。主咳嗽喘息，胸膈痞悶，痰涎壅塞，咽喉不利，胸脇攻痛，喘不能臥，痰气上攻，漉漉作声。

【处方】橘紅一斤 枳壳 黃芩各八兩 白芥子 六神柚 川貝母 白茯苓 半甘草各四兩 天花粉五兩 竹瀝四兩

【制法】共軋極細面，加竹瀝少許，水泛为小丸。

【剂量及用法】每服二錢，空心开水送下。

【禁忌】五辛油膩。

五、撫 順

【处方】竹瀝一兩 川貝二兩 白朮 桔梗 香附 瓜蒌 天冬各四兩 海石 花粉 神麵 枳壳 寸冬 杏仁 連翹 苏子各三兩 白芥四兩 胆星二兩 青黛一兩

【制法】共为細面，竹瀝姜汁各二兩，水泛小丸。

六、呼和浩特

【处方】陈皮 法夏 茯苓 白朮 酒川軍 黃芩各一斤十四兩 甘草一斤 礞石十兩 沉香半斤

【制法】共为細面，水泛小丸。

礞石滾痰丸

一、北 京

【功能与主治】峻下頑痰。主頑痰壅盛，胸膈阻塞。

【处方】青礞石(煅)二兩 沉香 熟大黃 黃芩各八兩

【制法】共为細粉，水泛小丸，金礞石为衣。

【剂量及用法】每服一錢五分，日服二次，溫开水送下。

【禁忌】体虛者及孕妇忌服。

二、天 津

【功能与主治】降頑痰，开郁通便。主湿痰热痰，頑痰壅盛，胸膈阻塞，郁悶肋痛，咳嗽痰喘，大便燥結。

【处方】黃芩 大黃(酒炒)各八兩 沉香五錢 煅金礞石一兩

【制法】共为細粉，凉开水泛小丸，每斤丸药用煅金礞石面二兩、桃膠二錢化水上衣，一錢重裝袋。

【剂量及用法】每次服一袋，开水送下。

【禁忌】孕妇及体弱者勿服。

三、上 海

【功能与主治】痰喘痰塞。

【处方】大黃(制)八兩 銀硝二兩 黃芩八兩 沉香一兩 青礞石二兩

【制法】先將青礞石和銀硝同煅成金色，和余药共研細粉，再用生姜八兩打汁，和水泛丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每服一錢至三錢，食前溫开水送服。

【禁忌】油膩厚味，孕妇忌服。

四、南 京

(沉香滾痰丸)

【功能与主治】瀉火導痰。主实热頑痰，發狂便結，咳嗽哮喘，胸膈滿悶。

【处方】青礞石二兩(搗碎，用焰硝一兩同入罐內，以鹽泥封固，晒干后放在炭火上煅煉，煅至石色如金黃色为止，取出研細水飞。) 上沉香五錢(不見火生研) 生大黃 生淡黃芩各八兩

【制法】上药四味，如法炮制后，共研細末，用沸水泛丸，每錢約做一百粒。

【剂量及用法】每服一至三錢，开水吞服。

【禁忌】孕妇忌服。

五、武汉

【功能与主治】实热頑痰，發狂便結，咳嗽哮喘，胸腹滿悶。

【处方】熟大黃 黃芩各八兩 沉香五錢(另研) 青礞石一兩(用火硝二兩入瓦罐內，赤石脂封固煨過水飛淨)

【制法】取上藥进行干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于五十粒。

【剂量及用法】每服一錢至三錢，食后空腹熱湯送下。

【禁忌】孕妇及虛寒者忌服。

六、广州(沉香滾痰丸、滾痰丸)

【功能与主治】积热腹痛，口舌生瘡。

【处方】同天津，分量加倍。

【制法】研成粉末，以水为丸。

【剂量及用法】用开水送服，每服三錢。

七、福州(隱居滾痰丸)

【功能与主治】治一切食积濕熱等痰窠囊老痰。

【处方】同天津。

【制法】上为細末，滴水为丸，桐子大。

【剂量及用法】每服三、五十丸，量人強弱加減。

【备考】一方礞石只用五錢，加白藥煎五錢，乃能收斂周身痰涎聚于一处，然后利下，所以甚效。

八、杭州

【功能与主治】治实热頑痰，留积胸脘，咳嗽哮喘，咽喉不利，头目眩暈，昏迷癲狂，一切痰迷怪症。此为治痰峻剂。

【处方】大黃(酒制) 黃芩各十六兩 貢沉香一兩 青礞石(用火硝六錢同入瓦罐鹽泥封固煨如金色为度，水飞取淨末)二兩

【制法】共研細末，生姜汁和水泛丸，礞石为衣。

【剂量及用法】每服一至三錢。淡姜湯或开水送下。服后平臥在

床，令藥徐徐而下，半日不可飲食行动，待藥气漸下，除逐痰滯惡物，然后行动方能中病。

【禁忌】体虛者及孕妇忌服。

九、南昌

【功能与主治】实热頑痰。

【处方】青礞石(同焰硝一兩入瓦罐鹽泥封固，煨至黃色如金为度，水飞淨)二兩 大黃(酒蒸少頃翻过再蒸少頃即取)不可太过 黃芩(酒炒)各八兩 沉香(另研)一兩

【制法】研末，水泛为丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每服一至三錢，每日服一次或二次，食后兩小时用溫开水送下，服后安臥二至四小时。

【备考】非經医师处方不得使用。

十、沙市

【功能与主治】治实热頑痰，能迅扫宿垢，积滯，狂癲等症。

【处方】青礞石一兩 沉香五錢 大黃 黃芩各八兩

【制法】將礞石研碎，用火硝一兩同入瓦罐鹽泥封固，晒干火煨，石色如金为度，研細末和諸藥用冷开水泛为丸。

【剂量及用法】每服一錢至一錢五分，日服一次，溫开水下。

【禁忌】体虛無痰熱者忌服，孕妇忌服。

十一、重庆

【功能与主治】治濕熱老痰，結核異症。

【处方】青礞石 沉香 百藥煎各五錢 大黃 黃芩各八兩

【制法】青礞石用硝石一兩入沙罐內煨，同余藥共研細末，水泛为丸，紙盒包裝。

【剂量及用法】每服二至三錢。

【禁忌】虛寒者及孕妇忌服。

十二、昆明(礞石丸)

【功能与主治】实热咳嗽痰多。

【处方】煨金礞石二兩 大黃八兩 沉香七錢 黃芩八兩

【制法】水磨为丸。

【剂量及用法】每服一錢半，幼童減半，开水送服。

【禁忌】水飲咳嗽不宜服用。

十三、西安

【功能与主治】主实热老痰，咳嗽哮喘，痰火發狂，咽喉不利。

【处方】礞石(焰硝煨过，埋地七日用)一兩 沉香(忌火)五錢 大黃(酒蒸) 黃芩各八兩

【制法】共搗細末，罗过用冷开水为丸如川椒大。

【剂量及用法】成人每日三次，每次五分至一錢，飯前用生薑湯送下，小兒按年齡遞減。服后仰臥令藥在胸膈之間，除逐上焦痰滯，不宜飲水行动。

【禁忌】虛寒及大便稀溏者及孕妇不宜服用。

【备考】一方加元胡粉一兩，硃砂为衣，治同。

十四、蘭州

【功能与主治】健胃化痰止渴。主順气化痰，咽喉疼痛，咳嗽痰喘，热痰实痰老痰，胸腹滿悶，口苦舌干，大便秘結，实症宜用。

【处方】生黃芩 生大黃各八兩 上沉香五錢 礞石一兩(焰硝煨过埋地下七日)

【制法】共研細末，水泛小丸，礞石为衣。

【剂量及用法】每次服一、二錢，开水送下。

【禁忌】孕妇及虛寒者忌服。

十五、大同

【功能与主治】痰涎壅塞，止嗽降痰。

【处方】熟軍六兩 黃芩八兩 礞石(煨) 海石(煨)各一兩 沉香五錢

【制法】共軋細面，水泛为丸，礞石为衣。

【剂量及用法】早晚每服二錢，开水送下。

【禁忌】孕妇禁忌。

十六、禹县

【功能与主治】实热老痰，痰热咳嗽，眼目赤腫，眩暈癲癇。

【处方】同天津。

【制法】共碾为細面，水送为丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每服一錢，开水送下，仰臥二小时，不可行动。

【禁忌】孕妇忌用。

【备考】有效期二年。

十七、济南

【功能与主治】实热顽痰，咳嗽哮喘，胸腹满闷，大便秘结。

【处方】金礞石一斤（留半斤为衣）酒黄芩二斤 广木香四两 酒大黄二斤 益沉香三两（另研）

【制法】共为细末，水泛丸，礞石为衣，如绿豆大。

【剂量及用法】每服一钱，每日二次，开水送下。

【禁忌】忌食辛辣油腻等物；虚寒者及孕妇忌服。

十八、沈阳

【功能与主治】化痰上嗽，镇静神经。主风痰癰痰，卒然昏倒，痰涎凝固，稠结如胶，痰鸣哮喘，喘息难卧，痰火癫狂，哭笑无常，奔走叫骂，语无伦次。治热痰老痰实痰甚效。

【处方】同兰州。

【制法】共碾极细面，水泛小丸。

【剂量及用法】量人大小酌用一或二钱，白开水送下。

【禁忌】虚寒者忌服。

十九、抚顺（滚痰丸）

【功能与主治】镇静清痰降火。主风痰，痰火内炼，风邪外袭，卒然晕倒或发抽搐，痰声漉漉呼吸急促，声如拽锯，痰涎如胶，糊塞气道，咳吐不出，力嚥不下，痰火交煎，发为癫狂，意志不清，奔走叫骂，哭笑不定，语无伦次。

【处方】制川军 黄芩 沉香 胆星 金礞石各等分

【制法】共为细面，水泛小丸，礞石为衣。

【剂量及用法】每服二钱，姜汤送下。

【禁忌】孕妇忌服。

【备考】一方无胆星有百药煎。

二十、吉林、哈尔滨

【功能与主治】豁降顽痰，清火顺气。主风痰癰痰，顽痰胶结，痰火癫狂。

【处方】同沙市，制法亦同。

【剂量及用法】每服二钱，淡姜汤为引，体虚者酌减之。

【禁忌】孕妇及虚寒者忌服；忌

食生冷。

二十一、承德

【功能与主治】实热顽痰，咳嗽哮喘，胸腹满闷，大便秘结。

【处方】大黄十八斤 沉香一斤八两 黄芩 前胡 天花粉各十五斤

【制法】共轧细面，水泛小丸，煨金礞石为衣。

【剂量及用法】每服二十粒，日服二次，温开水送下。

【禁忌】虚寒者及孕妇忌服。

二十二、呼和浩特

【处方】熟军 酒芩各十三斤半 沉香十二两

【制法】共为细面，水泛小丸，礞石为衣。

滌痰丸

天津

【功能与主治】清热化痰，开痰化痞。主痰火痰结，气急痰喘，湿热咳嗽，喘满胸闷，痰涎壅盛，大便秘结。

【处方】大黄五斤 炒黑丑 黄芩各一斤八两

【制法】共为细粉，水泛小丸，每斤丸药用百草霜一两，煨金礞石粉二两、桃胶二钱化水上衣，二钱重。

【剂量及用法】每次服二钱，开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

小陷胸丸

上海

【功能与主治】胸膈烦热，痰多脘痞。

【处方】姜半夏 全栝蒌各二两 黄连一两

【制法】共研细粉，水泛为丸，如绿豆大。

【剂量及用法】每服一钱，开水送服。

己椒藶黄丸

南昌

【功能与主治】腹满，口舌干燥，肠间有水气。

【处方】防己 椒目 苦葶藶

大黄各一两

【制法】研末，水泛为丸，如绿豆大。

【剂量及用法】每日服三次（隔四小时服一次），每服一钱至二钱，空腹白开水送下。非经医师处方不得服用。

皂荚丸

南昌

【功能与主治】咳嗽气促，时吐浊痰，但坐不得眠。

【处方】皂荚（刮去皮酥炙）八两

【制法】研末蜜丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服三分，早、午、晚各服一次，每服用大枣五个劈开，浓煎送下。非经医师处方不得使用。

霜雪定喘丸

昆明

【功能与主治】润燥除痰。主久咳不止，痰壅喘急。

【处方】贝母八两 广陈皮二两 柿霜四两 京半夏六两 楚荷一两 檀香二两 冰糖八两

【制法】研末，冰糖熬水为丸（或水叠为丸）。

【剂量及用法】每服一丸（水叠每服二钱半）开水送下，早晚各服一次。

【禁忌】伤风咳嗽不宜服。

哮喘丸

杭州

【功能与主治】治风痰水饮，冷哮诸病，时而气喘，时而痰绝，咳嗽痰喘，一切哮喘之症。

【处方】生南星 生半夏 生川乌（以上三味水漂七日晒干） 生甘草各四两

【制法】共研细末，生姜汁泛丸。

【剂量及用法】每服一至二钱，小兒减半，用淡姜汤或开水送下。

冷哮丸

沈阳

【功能与主治】保肺散寒，化痰定喘。主背脊受寒即发哮喘，顽痰结

聚，胸膈痞滿，呼吸窘迫，不得安臥。

【處方】麻黃 牛川烏 川椒 生白朮 牙皂 半夏 陳胆星 杏仁 生草各一兩 細辛五錢 紫苑 冬花各二兩

【制法】共碾極細面，薑汁調神曲面打糊為小丸。

【劑量及用法】每服一至二錢開水送下。

【禁忌】忌食五辛發物。

附參考古方

【來源】張氏醫通。

【功能與主治】治背受寒氣，遇冷即發喘嗽，頑痰結聚，胸膈痞滿，倚息不得臥。

【處方】麻黃(泡) 川烏(生) 細辛 蜀椒 白朮(生) 牙皂(去皮弦子，酥炙) 半夏 陳胆星 杏仁(去雙仁者連皮尖用) 甘草(生) 各一兩 紫苑茸 款冬花各二兩

【制法】上為細末，薑汁調神曲末打糊為丸。

【劑量及用法】每遇發時，臨臥生薑湯服一錢，瀉者一錢；更以三建膏貼肺俞穴中。服後吐頑痰，胸膈自寬，服此數日以後以補脾藥調之，候發如前再服。

【禁忌】氣虛少食，及痰中見血，營氣受傷者禁用。

清肺散

一、沈陽

【功能與主治】清肺化痰，散風解表。主感冒風寒，憎寒壯熱，咽干聲啞，咳嗽痰多，氣滯喘促，胸中悶熱，咯痰不出，口干舌燥。

【處方】麻黃一錢五分 麥冬 桔梗各二錢 知母 荊芥 花粉各一錢 訶子 菖蒲各八分

【制法】共碾極細末。

【劑量及用法】小兒每服二、三分，成人每服一錢。開水送下，或竹瀝、薑汁煎水送下。

【禁忌】魚類。

二、吉林(牛黃清肺散)

【功能與主治】清熱止咳，補肺虛。主損肺熱咳嗽，吐痰，哮喘，咯血，吐血各症。

【處方】川軍二兩 牛黃二分七厘 石膏三錢四分 黃芩一兩 滑

石 明雄各一錢七分 礞石三錢四分 硃砂一錢四分 明粉一錢七分

【制法】共為細面，用絹羅篩二、三次至極細。遮光磨口瓶存貯。

【劑量及用法】每服七分，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

大清肺散

撫順

【功能與主治】定喘鎮咳。主風寒咳嗽，感冒咳嗽，氣管支炎，咳嗽喘息等症。

【處方】甘草二兩 米壳 麻黃各二兩 川貝 生石膏各二兩 硃砂一兩 杏仁二兩

【制法】共為細面。

【劑量及用法】每服一錢四分，姜水送下。

【禁忌】油膩辛辣等物。

清金散

吉林

【功能與主治】理肺清痰，止咳解表。主肺熱喘嗽，吐痰吐血，外感傷風等症。

【處方】陈皮三錢四分 清夏二錢四分 川貝 花粉 桔梗 蘇叶 黃芩 寸冬 甘草各三錢四分

【制法】共為細面，用絹羅篩極細為度。貯于磨口瓶中。

【劑量及用法】每服二錢，小兒一錢。大人白水送下，小兒白糖水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

必效散

沈陽

【功能與主治】消腫退熱，定喘止喘。主咳嗽喘急，身熱喘息，急驚抽搐，四肢厥逆，胸高氣促，昏絕流涎，肺疳嘶啞，一切外痔。

【處方】真熊胆三錢 梅片六錢 孩兒茶一錢 廣礞砂四錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】用溫水研化，以鷄羽毛蘸藥，抹前胸、肺尖部，經過十分鐘，再度塗抹，每次用五分至一錢。

痰 嗽 類

黛蛤散

一、上海

【功能與主治】清化痰熱。

【處方】煅蛤壳六兩 青黛六錢

【制法】分別研細粉，充分和勻。

【劑量及用法】每服三至五錢，包煎服湯。

二、南京

【功能與主治】清熱止血。主咳血吐血。

【處方】煅蛤壳一兩 飛青黛五分

【制法】共研細末。

【劑量及用法】煎服。

桑麻散

沈陽

【功能與主治】清痰止咳定喘，主風寒咳嗽，喘息吐痰，胸脇攻痛，枝氣管喘息等症。

【處方】麻黃一斤 杏仁五兩 甘草二兩 桔梗四兩 陈皮 半夏各二兩 桑白皮四兩

【制法】將麻黃水煎兩次，留汁去渣，再熬為膏，干燥為粉末，加入各藥面中。

【劑量及用法】每服一至二錢，日二服或三服。

咳嗽散

重慶

【功能與主治】散寒止咳。

【處方】蘇子二兩 枇杷叶三兩 杜耳風 五皮半各二兩 鹿啣草 蛇啣草 瓜子草各三兩 銅錢草 肺筋草 淫羊藿各二兩 川黃連三兩

【制法】共為細末。

【劑量及用法】每日三次，每次一至二錢，用姜湯水服。

止嗽散

沈陽

【功能與主治】散風清肺，止咳化痰。主風寒傷肺，咳嗽不已，痰咯不出，胸膈氣滯，頭暈倦怠，咽干鼻塞。

【處方】桔梗 荊芥 紫苑 百

部 白前各八兩 甘草二兩 陈皮四兩

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二錢，開水送下。初感風寒者，生薑湯調服。

【禁忌】魚類。

琥珀清金散

沈 陽

【功能与主治】止咳化痰，清肺降逆。主咳嗽日久，時吐痰涎，胸逆氣滯倦怠，小便不利。

【處方】血琥珀 川貝母 茯苓 百合 法夏 大冬各一錢 京知母五錢 石膏六錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】成人每服一錢，小兒每服一分，開水送下。

【禁忌】辛辣發物。

瀉白散

沈 陽

【功能与主治】瀉肺定喘。主治肺癰，咳嗽喘急，肋肋疼痛，胸滿氣促，肺經蘊熱，肺火咳嗽，久嗽喘息等症。

【處方】桑白皮一錢 地骨皮 甘草 貝母 紫苑 桔梗 白芍各五分 瓜蒌仁一錢半

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服一至二錢，開水送下。

肺癰再補散

沈 陽

【功能与主治】清痰益肺，芳香化濁。主肺癰吐膿血，呼吸時有臭味，咳嗽喘促，胸肋隱痛等症。

【處方】大連珠二粒 冰片二錢半 台麝香一分半 象皮 硃砂 生白芍 川貝母 清半夏 白芨 乳香各二錢 生薑二錢

【制法】共碾極細面，最後兌入台麝、冰片。

【劑量及用法】每服二錢，開水送下。

定喘散

沈 陽

【功能与主治】清肺定喘，除痰

解熱。主肺熱喘急，口干痰盛，夜不得臥，胸高氣促，張口抬肩，面赤身熱，屬丁熱性喘息等症。

【處方】枯黃芩 橘紅 枇杷葉 各五錢 青黛 蘇子 甘草各二錢 胆南星五錢 川貝母 花粉 桑皮 杏仁 前胡 款冬花各七錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服一錢，薑湯水送服。

【禁忌】肺寒喘嗽及氣虛人禁用。

沉香散

沈 陽

【功能与主治】消水止痛，鎮咳祛痰。主咳嗽氣逆，肋肋刺痛，呼吸氣促，肋部蓄水，背寒胸滿，大便泄瀉，小便不利，腹脹肢腫，夜不能臥，痰飲濕盛，脾不行水，遍身浮腫。

【處方】鵝內金二兩 大蘇沉一兩 海蛤粉 海浮石各五錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每飯前服二錢，黃酒沖服。服後二小時微汗為宜。

【禁忌】忌煙酒腥辣。

萊菔散

沈 陽

【功能与主治】消食化痰，止咳定喘。主老年痰喘，冬令即發，或氣滯嘔吐，胸膈飽悶，少年咳嗽而兼胃病之实证亦可用之。

【處方】炒萊菔 豆腐皮各五兩 川貝母三錢 冰糖 白糖各二兩半 白菓仁三錢

【制法】將萊菔了、豆腐皮、川貝母、白菓仁四味用沙鍋焙干為細面，過絹羅，再將冰糖研細同白糖入藥料勻。

【劑量及用法】早晚每服二錢。開水送下。

【禁忌】咸物五辛。

通宣理肺膏

天津、蘭州

【功能与主治】發汗解表，清肺化痰。主感冒風寒咳嗽，氣喘，發燒，鼻塞不通，週身作痛。

【處方】蘇葉一斤 麻黃六兩

枳殼(麩炒)八兩 甘草二斤 牛石膏二兩 杏仁(去皮炒) 桔梗 制半夏各六兩 冬花二兩 葛根四兩 前胡十二兩 生桑皮八兩 廣皮四兩 浙貝母二兩 百合四兩

【制法】熬汁去渣過濾，將汁煉至滴毛大紙上背面不陰為標準，收清膏。每一斤清膏，兌蜜二斤收膏裝瓶。

【劑量及用法】每次服一兩，開水沖服。

百花膏

一、武漢(潤肺百花膏)

【功能与主治】咳嗽喘急，痰中帶血，津少咽干，虛煩潮熱。

【處方】百合(蒸、焙) 款冬花各五斤

【制法】加水六倍，煮沸二小時，照例三次，每次取汁過濾去渣，將濾液濃縮至二十五斤，加白蜜十斤，熬成膏七斤十二兩即得。

【劑量及用法】每服二錢，日服二至三次，開水沖服。

二、呼和浩特(神效百花膏)

【處方】百合 冬花各四兩 五味二兩 丹皮 麥冬 前胡 桔梗 紫苑 花粉 防皮各四兩 烏藥一兩 元參 沙參 杏仁 川貝 柿霜各二兩

【制法】共為細面，蜜大丸，重二錢五分。

附參考古方

【來源】濟生方。

【功能与主治】治咳嗽不已，或痰中有血。

【處方】款冬花 百合蒸焙。

【制法】上等分為細末，煉蜜為丸，如龍眼大。

【劑量及用法】每服一丸，食後臨臥，細嚼薑湯嚥下，嚥化尤佳。

清金止嗽膏

沈 陽

【功能及主治】清肺潤燥。主肺熱咳嗽，肺痿肺燥，干咳哈咳，失音失血，咽喉腫痛，喘咳聲啞，痰咳不爽，呼吸迫促。

【处方】紅梨汁 白梨汁 蘿蔔汁 白蜂蜜各二兩 杏仁 川貝母各二兩

【制法】砂鍋內炭火熬膏，磁罐收貯。

【劑量及用法】每服二錢，溫開水沖服。

【禁忌】咸辣刺激性物。

清肺抑火膏

一、天津

【功能与主治】清肺止咳，降火生津。主肺熱咳嗽，痰涎壅盛，咽喉腫痛，口鼻生瘡，牙齒疼痛，牙根出血，大便干燥，小便赤黃。

【处方】黃芩十四斤 黃柏四斤 花粉 生梔各八斤 前胡四斤 桔梗八斤 大黃十二斤 苦參 知母各六斤

【制法】熬汁去渣，將汁煉至滴毛頭紙上，背面不陰為標準，收清膏。每清膏一斤兌蜜二斤收膏裝瓶。

【劑量及用法】每服一兩，升水沖服。

【禁忌】外感風寒咳嗽，及孕婦忌服。

二、大同

【功能与主治】瀉肺火，清熱止咳。

【处方】大黃十六兩 黃芩十兩 花粉 桔梗 生梔子各六兩 苦參八兩 知母四兩 前胡 黃柏各二兩

【制法】熬汁煉膏藥二斤十四兩再加蜂蜜二斤十四兩。

【劑量及用法】每服三錢，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

養陰清肺膏

一、北京、濟南

【功能与主治】清熱潤肺。主咽喉腫痛，咳嗽音啞。（濟南主陰虛咳嗽）

【处方】生地一兩 麥冬六錢 白芍 貝母 丹皮各四錢 薄荷二錢五分 玄參八錢 甘草二錢

【制法】共熬成膏，以不陰紙為度，每兩兌蜂蜜一兩。

【劑量及用法】每服五錢，日服二次，開水調化送下。

【禁忌】忌食一切油膩，孕婦忌服。

二、天津

【功能与主治】清熱潤肺，止咳化痰。主陰虛咳嗽，口渴咽干，失音啞，痰中帶血，咽喉腫痛。

【处方】同北京，分量為其五倍。

【制法】熬汁去渣，將汁煉至滴毛頭紙上，背面不陰為標準，收清膏。每清膏一斤兌蜜二斤收膏裝瓶。

【劑量及用法】每服一兩，開水沖服。

三、武漢（清肺膏）

【功能与主治】咽喉疼痛，內熱咳嗽。

【处方】同北京。

【制法】加水六倍，煮沸四小時，照例三次；每次過濾，取液合併濃縮至一斤，加冰糖四兩，使成膏五兩即得。

【劑量及用法】同北京。

四、西安

【功能与主治】主肺胃燥熱，潮熱喉頭發炎，痒痛咳嗽，咽喉色紫或爛，吐血等症。

【处方】同北京，分量為其十倍，仅丹皮用三兩。

【制法】生地、玄參、麥冬先用清水煎汁，再入白芍、薄荷等煎至五分，再入梨花蜜二斤文火熬成稠糊。

【劑量及用法】如有兼症者可變通引煎湯調服，胸下脹悶用神曲、焦楂各二錢，大便燥結用大黃二錢，小便短赤用木通一錢，澤瀉、知母各二錢，燥渴者用天冬、馬兜鈴各二錢，面赤身熱舌苔色黃者用連翹二錢、銀花三錢。每服三錢，一日二次，小兒按年齡遞減。

五、大同

【功能与主治】止咳，清熱。治咽喉腫痛。

【处方】生地一百兩 白芍四十兩 元參八十兩 丹皮 川貝各四十兩 麥冬十兩 薄荷 甘草各二十兩

【制法】熬汁煉膏，每斤兌白蜜二斤。

【劑量及用法】每次三錢，開水

送下。

潤肺膏 沙市

【功能与主治】治肺虛，氣管發炎，咽嚕干咳或咳嗽膠痰等症。

【处方】沙參 麥冬 天冬 花粉各一斤 川貝（研細後調入）四兩 枇杷叶（去毛） 甜杏仁各一斤 橘餅八兩 核桃米 冰糖各一斤（研細後下）

【制法】上藥煮取濃汁去渣，再加入川貝末、冰糖末，以白蜜十二斤收成膏。

【劑量及用法】成人量每服五錢，用開水沖服每日二次。小兒酌減。

【禁忌】痰多而大便滑瀉者忌服。

二冬膏

一、北京

【功能与主治】潤肺止咳，生津止渴。主咳嗽音啞，煩渴咽痛。

【处方】天冬 麥冬各二百二十兩

【制法】共熬汁收膏，以不陰紙為度，每十六兩膏汁兌蜂蜜十六兩。

【劑量及用法】每服五錢，日服二次，開水調化送下。

【禁忌】忌食厚味。

二、天津

【功能与主治】潤肺止咳，生津止渴。主虛熱咳嗽，煩渴咽疼，失音，痰中帶血。

【处方】同北京，分量為其十分之一。

【制法】熬汁去渣過濾，將汁煉至滴毛頭紙上，背面不陰為標準，收清膏。每清膏一斤兌蜜二斤收膏裝瓶。

【劑量及用法】每次服一兩，開水沖服。

【禁忌】風寒咳嗽忌服。

三、上海

【功能与主治】肺熱干咳。

【处方】同北京。

【制法】煎汁三次，榨淨，將各次所煎藥汁澄清過濾，蒸發成濃汁，加白蜜一百六十兩收膏。成膏四百兩。

【剂量及用法】每次半羹匙，开水冲服。

【禁忌】虛而便滑者忌服。

四、南 京

【功能与主治】滋养肺胃，潤燥清热。

【处方】同北京，分量为其二十分之一。

【制法】熬汁去渣濾清，加白蜜一斤，收熬成膏。

【剂量及用法】每服二錢，一日兩次，开水調服。

【禁忌】消化不良，便溏者忌服。

五、杭州(天麦二冬膏)

【功能与主治】清痰潤肺，生脉清心。主肺胃燥热，咳嗽痰喘，咽痛咳血，虛損潮热等症。

【处方】同北京。

【制法】濃煎取汁，加白蜜八斤，文火成膏。

【剂量及用法】每服三至五錢。不拘时，开水冲服。

六、沙 市

【功能与主治】潤肺化痰。治肺胃燥热，气管發炎，咳嗽咽嗆等症。

【处方】同北京，分量为其四分之一。

【制法】煮取濃汁去渣，加煉淨白蜜拾斤熬膏。

【剂量及用法】每次服一湯匙，溫开水冲服，每日服二、三次。

【禁忌】咳嗽稀痰而大便滑瀉者忌服。

七、重庆(貝母二冬膏)

【功能与主治】消痰潤肺，生津清心。治肺胃燥热，痰涎咳嗽。

【处方】川貝母一兩 天門冬 麦門冬 冰糖各一斤

【制法】川貝母另研末，天門冬、麦門冬煎汁，加冰糖熬膏或冷入川貝母面，攪勻玻璃瓶包裝。

【剂量及用法】一匙。

八、西 安

【功能与主治】滋潤肺胃。主治貧血，胃出血，咳嗽咯血，耳鳴等症。

【处方】同北京，分量各用一斤半。

【制法】水煎去渣熬汁，加入川貝母面四兩和入梨花蜜二斤，再文火熬至如稀糊成膏。

【剂量及用法】每日服一、二次，每次服一、二調羹，飯前用溫开水和服，小兒酌減。

【禁忌】痰飲咳嗽及大便稀溏者忌服。

九、大 同

【功能与主治】肺气不肅，痰喘咳嗽。

【处方】麦冬 天冬 知母 川貝母(研面另入)各四兩

【制法】將麦冬、天冬、知母煎三次再入川貝母面、白蜜為膏。

【剂量及用法】每服一錢，开水化服。

十、济 南

【功能与主治】潤肺清热，止咳化痰。

【处方】麦冬八兩 天冬 知母各四兩

【制法】熬汁去渣，兌蜜二斤收膏，再入川貝母粉四兩攪勻。

【剂量及用法】每服五錢，日服二次，开水冲服。

【禁忌】外感咳嗽禁用。

十一、青 島

【处方】天冬 麦冬 貝母各四兩

【制法】先將二冬熬汁，再加貝母面對蜜成膏。

十二、沈陽(貝母二冬膏)

【功能与主治】清涼潤肺。主久咳喘息，夜不得臥，失音聲啞，咳痰吐血，肺臟干萎，胸膈拘攣，咽喉腫痛，發燒潮熱。

【处方】天冬 麦冬 川貝 知母 生地 百合各二兩

【制法】水熬去渣，加白蜜十兩，共熬成膏。

【剂量及用法】每日頻服，大人二錢小兒酌減。

十三、呼和浩特

【处方】寸冬一斤 天冬四兩 花粉 桔梗各五斤

【制法】熬水，加蜜成膏，每斤蜜再加川貝母粉二兩。

附参考古方

【来源】張氏医通。

【功能与主治】治肺胃燥热，痰涎咳嗽。

【处方】天門冬(去心) 麦門冬(去心)等分。

【制法】上二味，熬膏煉白蜜收。

【剂量及用法】不时嚙熱嚙之。

琼 玉 膏

一、上 海

【功能与主治】虛癆干咳。

【处方】鮮生地一千二百八十兩 茯苓二百四十兩 党参一百二十兩 沉香 琥珀各四兩

【制法】先將鮮生地、茯苓、党参煎汁三次，榨淨，將各次所煎藥汁澄清過濾，蒸發成濃汁。再加入沉香、琥珀，用白蜜四百八十兩收膏，成膏五百八十兩。

【剂量及用法】每次一羹匙，开水化服。

二、南 京

【功能与主治】滋陰潤肺。主虛癆久嗽，潮熱咳血。

【处方】大生地黃四斤 白茯苓十二兩 紅沙參六兩(另研細末和入)白蜜二斤

【制法】將生地黃洗淨與茯苓共同煎熬三次，去渣取汁，濃清濃縮，加入白蜜成膏，再將沙參另研細末和入攪勻為度。

【剂量及用法】每服四錢，一日一次或二次，早晚開水和服。

【備考】另有琥珀沉香各五錢，如服者需要，按膏滋每一兩六錢，加琥珀末、沉香末各一分，臨時和入。

三、武 汉

【功能与主治】虛損勞傷，煩熱干咳。

【处方】生地四斤(搗絞取汁) 白茯苓十二兩 党参六兩 白蜜二斤

【制法】第一次加水六倍，煮沸四小時；第二次將殘渣加水六倍煮沸三小時；第三次加水五倍煮沸二小時，過濾取汁，濃縮至五斤，加白蜜二斤，使成膏三斤二兩即得。

【剂量及用法】每服一湯匙，開

水化服。

四、福州

【功能与主治】治肺枯干咳，虚劳。为滋金培水，养液生津之要药也。

【处方及制法】鲜生地四斤，取汁一斤同白蜜二升熬沸，用絹濾过，將茯苓十二兩，人参二兩各研末入前汁和匀，以磁瓶用紙十数层加箬叶封瓶口。入砂鍋內以長流水淹瓶頸，桑柴火煮三晝夜，取瓦換紙紮口，以蜡封固，懸井中一日取起，仍煮半日湯調服。

五、杭州(臘仙琼玉膏)

【功能与主治】治陰亏肺热，虛損干咳，咽痛痰血，腸中隱痛，潮熱盜汗，津液枯涸等症。滋陰潤肺，安神降氣。

【处方】同上海，分量为其二十分之一。

【制法】先將前三味濃煎取汁，加入白蜜，文火煎煉成膏，再將琥珀、沉香研粉，攪入和匀。

【剂量及用法】每服三至五錢，不拘時，開水沖服。

六、南昌

【功能与主治】虛勞肺枯干咳。

【处方】鮮地黃四斤 吉林人參二兩 茯苓十二兩 白蜜二斤

【制法】以鮮生地四斤同白蜜熬沸用絹濾过，將茯苓、人參研末入煎汁和匀裝入磁瓶，用棉紙十数层加箬叶封瓶口，入砂鍋內，以河水注于砂鍋內齊瓶頸，用柴火（禁用煤炭）隔水蒸煮二十四小时。

【剂量及用法】開水沖服一湯匙，每日二、三次。

【禁忌】感冒風寒及痰多而清稀者勿服，並忌食辛辣烟酒。

七、呼和浩特

【处方】生地一斤 茯苓八兩

【制法】先將生地茯苓熬成膏，加入茯苓面、人參面各一兩 再加蜜收膏。

附参考古方

【来源】張氏医通。

【功能与主治】虛勞干嗽，喉中血腥，腸中隱痛。

【处方】鮮地黃四十兩 人參（另为末） 白茯苓（另为末）各十兩 沉香（另研） 琥珀（另研）各半兩

【制法】先以地黃熬膏，点紙上不滲，入人參、茯苓末，並入糖晶二十兩，攪匀溶化，离火，再入琥珀、沉香和匀，磁罐收藏。

【剂量及用法】清晨、午前溫酒服数匙，粥湯亦可。

玉竹膏

南京

【功能与主治】滋陰潤肺，寧心除煩。

【处方】肥玉竹五斤

【制法】清水煎熬三次去渣取汁，濃清濃縮，加冰糖五斤收膏。

【剂量及用法】每服二錢，一日一次，開水或淡鹽湯吞服。

玄霜膏

沈陽

【功能与主治】滋潤肺臟，清利气道。主治虛勞肺痿，咳嗽便秘，吐血咯痰，肺熱哮喘，咽干舌裂，喉頭炎症，口粘膜炎。

【处方】烏梅汁 紅梨汁 蘿蔔汁 柿霜 甘蔗糖 白蜜 鮮薑汁 各四兩 白茯苓 款冬花 天冬各二兩

【制法】前七味熬膏攪合后二味，磁器收貯。

【剂量及用法】每服二錢，徐徐嚥化。

玄霜紫雪膏

沈陽

【功能与主治】滋潤肺燥，清熱止血，滋陰養肺，清胃熱。主治吐血咳嗽，肺痿干咳，便秘便血，赤淋濁血。

【处方】雪梨汁二斤 生藕汁 生地汁各一斤 天冬（煎汁） 生萊菔汁各五兩 鮮茅根汁一斤

【制法】濾去渣取汁慢火熬煎，加白蜜五兩，飴糖柿霜各四兩，薑汁半杯熬煎成膏。

【剂量及用法】每服二匙，日服二次。

【禁忌】五辛發物。

痰 嗽 類

梨膏

一、北京

【功能与主治】潤肺利咽，生津止嗽。主咳嗽口干，失音氣促。

【处方】秋梨三千二百兩 麦冬百合貝母各二百兩 款冬花二十四兩 冰糖六百四十兩

【制法】共熬汁收膏，以不陰紙为度，每十六兩膏汁兌蜂蜜十六兩。

【剂量及用法】每服五錢，日服二次，開水調化送下。

二、天津

【功能与主治】止嗽化痰，生津止渴。主咳嗽痰喘，痰中帶血，咽干口渴，聲重音嘶。

【处方】秋梨一百斤 蘿蔔一斤 鮮藕二斤 鮮姜八兩 浙貝母 麦冬各一斤

【制法】熬汁濾去渣，將汁滴至毛頭紙上，背面不陰为标准，收清膏。每清膏一斤兌蜜二斤、冰糖一斤收膏裝瓶。

【剂量及用法】每服一兩，開水沖服。

三、上海(雪梨膏)

【功能与主治】咳嗽燥喘，咽喉干燥。

【处方】雪梨一千六百兩

【制法】刨絲去心核，煎汁三次榨淨，將各次煎汁澄清過濾，蒸發成濃汁，加冰糖四百八十兩收膏，成膏六百四十兩。

【剂量及用法】每服一羹匙，開水化服。

【禁忌】便瀉者勿服。

四、南京(雪梨膏)

【功能与主治】清肺熱，潤燥止渴。主干咳久咳，咯血痰血等症。

【处方】鮮梨一百斤

【制法】去核熬汁，濾去渣，收成清膏。每清膏一斤加冰糖二斤八兩收膏。

【剂量及用法】每服三、五錢，開水和服。

五、武汉(雪梨膏)

【功能与主治】咳嗽失音，煩渴咽干。

【处方】雪梨一百斤 冰糖三十斤

【制法】去核，刨絲，加水六倍，煮沸四小时，照例二次。每次過濾，合併濃縮至六十斤，加冰糖三十斤，使成膏四十一斤半即得。

【剂量及用法】每服三錢，日服三次，开水冲服。

六、南昌(雪梨膏)

【功能与主治】除胸中热痰，解丹石酒毒，利大小腸。主治热咳燥咳。

【处方】雪梨六十只

【制法】取梨汁二十杯，入冰糖一斤收膏。

【剂量及用法】每服五錢，开水冲服。

【禁忌】肺寒咳嗽，脾虛泄瀉，腹痛冷积，寒痰痰飲，产后胃冷嘔吐，均不宜服。

七、沙市(雪梨膏)

【功能与主治】潤肺降火，利大腸，主治热痰。

【处方】雪梨子十斤 白蜂蜜一斤

【制法】用白蜜收成膏。

【剂量及用法】每服一大湯匙，开水冲服。

【禁忌】体虛便溏者忌服。

八、重庆(雪梨膏)

【功能与主治】凉心潤肺，止咳消痰，潤喉降火，清燥消風，醒脾解毒，利大小便，治煩热咳嗽。

【处方】雪梨一百斤 冰糖二十五斤

【制法】去皮核煎汁去渣用冰糖收膏玻璃盛裝。

【剂量及用法】一匙。

九、西安(雪梨膏)

【功能与主治】肺燥咳嗽，胃出血，口干唇燥，久嗽不止。

【处方】雪梨六十个 生地 茅根 鮮藕 鮮蘿蔔 鮮麦冬取汁二十匙

【制法】煎煉和入梨花蜜一斤，飴糖八兩 生姜汁半杯再熬为稀糊則成膏。

【剂量及用法】每日服一、二次，每次一調羹含嚥緩緩嚥下，小兒減

半，用溫开水少許溶和服之。

【禁忌】風寒咳嗽，久瀉稀溏者不宜服用。

十、蘭州(雪梨膏)

【功能与主治】止咳化痰生津。主咳嗽痰喘，咯血口渴。

【处方】秋梨一百斤 白糖四十斤 蘿蔔 藕汁各一斤 鮮姜半斤 貝母 麦冬各一斤 生地半斤 茅根一斤

【制法】熬膏，每清汁一斤兌蜜二斤。

【剂量及用法】每服五錢，开水冲服。

【禁忌】風寒外感咳嗽忌服。

十一、禹县(止咳雪梨膏)

【功能与主治】清熱潤肺，止咳消痰。

【处方】白梨三十斤 白蘿蔔二斤 冰糖二兩 藕二斤 鮮姜二兩 蜂蜜四兩

【制法】先將梨、蘿蔔、姜、藕等共搗汁，熬去渣，加蜂蜜冰糖即成。

【剂量及用法】每服五錢，溫开水送下，小兒每服一錢。

【禁忌】肺虛下瀉忌用。

【備考】有效期一年。

十二、濟南

【功能与主治】咳嗽痰喘，咯血口渴。

【处方】秋梨(洗淨)三十斤 鮮藕(洗淨)二斤 大蘿蔔(洗淨)一斤 鮮生薑四兩 將四味共搗如泥取汁 鮮生地 鮮茅根各四兩 麦冬二兩

【制法】以上各藥切碎，共同用水煎熬去渣后，另兌白蜜等量，收膏后再入柿霜四兩攪勻为度。

【剂量及用法】每次一兩，开水化服。

【禁忌】辛辣油膩等物。

十三、青島

【处方】(一)梨二十四斤 川貝母一斤半 每斤加蜜十五斤 冰糖十斤 收膏

(二)秋梨五十斤 蜜收膏

十四、大同(法制梨膏)

【功能与主治】寬胸快膈，潤燥

生津，降痰涎，解酒毒。

【处方】梨兒六十个 藕根三段 生地 鮮蘿蔔 麦冬各一兩

【制法】共熬去渣入白蜜一斤，飴糖、柿霜各八兩，姜汁半碗，共熬成膏。

【剂量及用法】每服一錢，开水送下。

十五、青島(法制梨膏)

【处方】秋梨 鮮藕各八兩 柿霜一兩

【制法】共熬，入蜜收膏。

十六、呼和浩特(法制梨膏)

【处方】秋梨五十个 鮮藕一斤 鮮薑(兌汁)四兩

【制法】水熬汁，加蜜收膏。

枇杷膏

南 京

【功能与主治】清熱潤肺。主咳嗽，干嘔氣逆，咽痛音啞，及痰中帶血等症。

【处方】鮮枇杷一百斤

【制法】將枇杷去核熬汁，濾去渣，收成清膏。每清膏一斤加冰糖二斤八兩收膏。

【剂量及服法】每服三、五錢，开水和服。

枇杷叶膏

一、天津(枇杷膏)

【功能与主治】清熱，化痰，止咳。主虛熱咳嗽，氣逆喘促，咽腫聲啞，口燥舌干，痰中帶血。

【处方】鮮枇杷叶(去毛)五斤 川貝五兩 蓮子(去心)十兩 麦冬紅棗各十兩 天冬五兩 生地 元參(去節)各十兩

【制法】熬汁去渣，將汁煉至滴毛頭紙上，背面不陰為標準，收清膏。每清膏一斤兌蜜二斤，收膏裝瓶。

【剂量及用法】每服一兩，开水冲服。

二、上 海

【功能与主治】肺熱干咳。

【处方】枇杷叶一千六百兩

【制法】煎汁二次，榨淨澄清过滤，蒸發成濃汁，加水糖六百四十兩收膏，成膏七百零四兩。

【剂量及用法】每次半匙，开水冲服。

三、南 京

【功能与主治】主肺热久咳，顿咳，下气平喘。

【处方】干枇杷叶十斤

【制法】洗淨放入清水内煎汁，去渣滤清(滤前需于过筛筛上，加用絲棉过滤，勿使有毛流入)。加冰糖五斤收膏。

【剂量及用法】每服一錢，开水冲服。

四、武 汉

【功能与主治】咳嗽痰喘，嘔逆口渴。

【处方】枇杷叶一斤(去毛)

【制法】取枇杷叶照量加水十倍，至潤透后，入鍋内煮沸四小时，过滤取汁，置另器中将滤渣再加水七倍半，煮沸二小时，过滤去渣，取滤汁与前汁合并入鍋内，濃縮到二斤，加水糖一斤，使成膏一斤二兩即得。

【剂量及用法】每服一兩，开水冲服。

五、南 昌

【功能与主治】咳嗽痰喘，嘔逆口渴。

【处方】枇杷叶(刷去毛)一百斤 冰糖 蜜糖各十五斤

【制法】收膏。

【剂量及用法】每服二錢至五錢，开水冲服。

【禁忌】寒咳者忌服。

六、沙 市

【功能与主治】主咳潤肺。治肺热久嗽，气管發炎，頓咳便秘等症。

【处方】鮮枇杷叶一百斤(如無鮮者以干枇杷叶四十斤代之)

【制法】刷去毛切碎，以淨鍋煮取濃汁去渣，加煉淨白蜜二十斤制膏。

【剂量及用法】成人量每服一湯匙，用溫开水冲服，每日服二、三次，小兒酌減。

【禁忌】體質虛寒，咳嗽稀痰而

大便滑瀉者忌服。

七、重 庆

【功能与主治】潤肺止咳，下气降火，消痰止嗽。

【处方】枇杷叶一斤 蜂糖八兩

【制法】先用枇杷叶煎汁用紙濾过，后用蜂蜜收煉成膏，玻璃瓶包裝。

【剂量及用法】一匙。

八、济南(枇杷膏)

【功能与主治】咳嗽痰喘，嘔逆口渴。

【处方】枇杷叶二十斤

【制法】枇杷叶熬汁成膏，每汁一斤兌蜜二斤。

【剂量及用法】每服五錢，开水冲服。

【禁忌】風寒外感，咳嗽忌服。

九、沈 陽(枇杷膏)

【功能与主治】潤肺健胃。主伤劳虛損，咳嗽吐血，胸脇疼痛，肺痿肺热，喘哮喘干，肺热唇焦，食慾不振，便秘嘔噦。

【处方】鮮枇杷叶(去毛)六十斤 大紅梨(去皮心切成小片)二个 白蜂蜜半茶盅 紅人梨(去核)八兩 鮮蓮子四兩

【制法】將枇杷叶、梨、棗、蓮肉，用水煎汁去渣，再入蜜微火慢熬成膏。

【剂量及用法】每服二錢，溫水冲服。

【禁忌】泄瀉便溏者忌服。

西 瓜 膏

天 津

【功能与主治】清熱化痰止咳，生津止渴。主咳嗽多痰，痰中帶血，口燥咽干，胃熱作嘔。

【处方】西瓜二个(不得少于三十斤) 瓜皮二兩 生石膏 制半夏 炒苏子 百合各一兩 杏仁(去皮炒) 阿膠各五錢 甘草一兩 生五味子二錢

【制法】熬汁去渣过滤，將汁煉至滴毛入紙上，背面不陰为标准，收膏，每斤膏一斤兌蜜二斤收膏裝瓶。

【剂量及用法】每服一兩，开水冲服。

【禁忌】風寒外感咳嗽忌服。

紫蔻桂灵丹

撫 順

【功能与主治】化痰潤肺，宁嗽。主感冒咳嗽，肺热痰燥，支气管炎，咳嗽喘息，痰稠气短，不能臥倒，傷風鼻流清涕等症。

【处方】麻黄 杏仁 生石膏各二兩 米壳四兩 核桃一兩 陈皮二兩 紫蔻一兩

【制法】共为細面，蜜丸一錢四分重。

【剂量及用法】每服一丸，姜水、开水送下均可。

【禁忌】油膩辛辣之物。

清痰止嗽丹

一、沈 陽(1)

【功能与主治】清肺化痰，定喘止嗽。主外感咳嗽，鼻流清涕，內火咳嗽，咽干口燥，內伤咳嗽，痰中帶血。

【处方】制麻黄 杏仁 生石膏 制甘草 寸冬 化橘紅 瓜蒌穰 沙参 云茯苓 清半夏 枳壳 桔梗 制枇杷叶 川貝母 元芩各二錢 百合六錢 生地黃 制白部 苏叶 前胡各二錢 久咳成勞加龙骨 牡蠣各二錢 自汗者加信用之。

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸，二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，开水送下。早晚服之。

二、沈 陽(2)

【功能与主治】清痰鎮咳止嗽。主勞嗽咳嗽，吐血唾血，肺痿肺癰，多年咳嗽，痰喘气短，失音声啞。

【处方】清半夏八錢 紫苏叶六錢 川貝母八錢 麦冬兩半 七爪橘紅一兩 天冬八錢 蜜冬花兩半 白前一兩二錢 黃芩 白果仁各八錢 甜杏仁兩半 枇杷叶六錢 百合兩半 海浮石 葛根各八錢 蜜龙沙六錢 西当归兩半

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸，二錢重。赤金箔为衣。

【剂量及用法】每服一丸，薑湯送下。

【禁忌】辣性食物。

养肺止嗽丹

沈 陽

【功能与主治】化痰止咳，养肺补气。主新久咳嗽，痰中帶血，癆伤咳嗽，骨蒸潮热，痰喘气短，身瘦食少，倦怠乏力，虛癆盜汗。

【处方】白合六兩 生地一兩 紫苑四兩 川貝五兩 白朮 兜鈴 天冬各四兩 五味子二兩 枳壳 萊菔各二兩 木香 麻黃(炙) 白芍各三兩 杏仁 甘草各四兩 草薢二兩 蘇子二兩 薏仁五兩 元參 陈皮各二兩 當歸五兩 京知母四兩 熟地三兩 阿膠珠八兩 冬花 麥冬各二兩 橘紅四兩 烏藥二兩 桔梗二兩 桑皮四兩 檳榔二兩 朴四兩 蘇叶二兩 粟壳十兩 黃芩二兩 茯苓三兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，小兒半丸，開水送下。

【禁忌】咸辣食物。

清華潤肺丹

沈 陽

【功能与主治】鎮咳祛痰，止咳。主肺癰肺痿，痰飲喘息，咳嗽吐血，痰中帶血，兩肋刺疼，津液不足，呼吸迫促，發熱惡寒，痰稠不爽，四肢疲乏，胸脇作痛。

【处方】沙參 茯苓 麥冬 天冬 知母 杏仁 白前 花粉 薏仁 白朮 洋參 生地 川貝 杷叶 清夏 骨皮 薄荷 桑皮 生石膏以上各一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，開水送下。

【禁忌】辣物發物。

止嗽金丹

沈 陽

【功能与主治】清肺化痰。主肺熱咳嗽，喘急多痰，五心煩熱，肺癰肺痿。

【处方】貝母 知母 桔梗各三錢 杏仁四錢 烏梅 五味 花粉

清夏 冬花 白朮仁各三錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，開水送下。

【禁忌】辣物。

化痰金丹

沈 陽

【功能与主治】潤肺止咳，清熱化痰。主肺熱發熱，咳嗽多痰，咽喉干痒，痰中帶血。

【处方】薏仁 胆南星 清夏 枳壳 西皮 元參 花粉 橘紅 防皮 大黃 沉香 海浮石各等分

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，開水送下。

【禁忌】咸涼食物。

清燥救肺丹

沈 陽

【功能与主治】清燥鎮咳，祛痰止咳。主咳嗽痰喘，肺痿吐血，肋痛氣短，口臭極腥，五心煩熱，呼吸迫促，咳痰不爽。

【处方】人參三錢 枇杷叶 桑叶 麥冬各一兩 杏仁 生石膏各五錢 阿膠二錢 黑芝蔴五錢 甘草三錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，開水送下。

【備考】虛者加入人參二錢。

止嗽保金丹

大 同

【功能与主治】肺虛久嗽，老年咳嗽。

【处方】白朮 黨參各四兩 云母二兩 厚朴四兩 冬花 甘草各二兩 川貝一兩 陈皮二兩 白合八兩 杏仁 法夏 檳榔各二兩 黃芩二兩 五味二兩 共軋細面 天冬 麥冬各二兩 麻黃 紫苑 米壳各二兩 知母 桑皮各二兩

【制法】以天冬等七味熬汁，拌入前藥面，晒干共軋細面，水泛小

丸，滑石為衣。

【劑量及用法】每服二錢，開水送下。

哮喘金丹

沈 陽

【功能与主治】治各種哮喘，老人久嗽，喘臥不寧，痰中帶血，肺癰肺痿。

【处方】松花粉五錢 川貝四錢 橘紅五錢 瓜蒌八錢 炙麻黃三錢 京知母 海石 杏仁 米壳各五錢 寸冬八錢 白朮仁一兩 五味子三錢 牛石膏五錢 檳榔 烏梅肉各四錢 枳壳八錢 竹茹五錢 蘇叶三錢 訶子肉五錢 前胡四錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】成人每服一丸，開水送下。

【禁忌】辛辣之物。

健體固本藥酒

(福壽藥酒)

蘭 州

【功能与主治】主男婦痰喘，咳嗽氣急，兩脅膨脹，心口、腰腿痛，女人經水不調，肚腹脹滿，肚腹寒冷等症。

【处方】當歸二斤 川芎八兩 白芍四兩 酒地四兩 黨參六兩 白朮四兩 廣皮八兩 佛手一斤 紅花八兩 桃仁四兩 元胡四兩 吳萸四兩 丁香二兩 紫薤二兩 良姜四兩 檀香二兩 香附八兩 小茴香四兩 川牛膝八兩 杜仲四兩 續斷四兩 秦艽四兩 狐活四兩 北細辛二兩 麻黃六兩 寄生四兩 虎骨四兩 枸杞四兩 大云四兩 玉竹八兩 遠志四兩 棗仁四兩 天冬四兩 麥冬四兩 杏仁四兩 五味子四兩 廣木香二兩 藿香四兩 台烏四兩 白芷四兩 乳香四兩 沒藥四兩 川朴八兩 加皮八兩 官桂四兩 花椒二兩 甘草四兩 砂仁四兩 木瓜四兩

【制法】共為粗末，用白燒酒一百零四斤、蜂蜜八十斤、開水五十六斤熬藥，每料分作八料，藥二斤、燒酒十三斤、蜂蜜拾斤、開水七斤。

【劑量及用法】每日早晚溫服，

成人每次五錢。

【禁忌】孕婦忌服；忌食生冷。

寒涼咳嗽酒

重 慶

【功能与主治】去風散寒。

【处方】全蘇四兩 杏仁 瓜蒌 浙貝 半夏各一兩 陳皮二兩 茯苓 干姜各一兩 細辛 五味子各五錢 枳殼一兩 百部 白前 桔梗各一兩 薏仁五錢 桑皮 枇杷葉各一兩 粉草五錢

【制法】用干酒十斤泡十日後即成，如藥分量重者則酒量酌加。

【劑量及用法】每日二次，每次一至二兩。

法制肺露

杭 州

【功能与主治】潤肺消炎治吐血鼻衄，干咳無痰，肺癆喘逆等症。

【处方】孩兒參二錢 北沙參三錢 炙冬花一錢五分 天冬 麥冬各二錢 地骨皮 桑皮(蜜炙)各一錢五分 代蛤散三錢 阿膠珠 絲瓜絡 川貝母各二錢 馬兜鈴(蜜炙) 葶藶子(蜜炙)各一錢 肥知母一錢五分 冬瓜子 生玉竹 白茯苓各三錢 粉丹皮一錢五分 百合二錢 芦根二兩 枇杷葉(蜜炙)四兩 雄豬肺(去心血，灌白淨)一具

【制法】各藥共研細末，以半數灌入肺內，半數撒在肺上，蒸露。

【劑量及用法】每服一至二兩，隔水燉溫，日服二、三次。

枇杷葉露

上 海

【功能与主治】咳喘無痰。

【处方】枇杷葉八十兩

【制法】去毛洗淨，用蒸溜方法，成露四百兩。

【劑量及用法】每服二至四兩。

地骨皮露

上 海

【功能与主治】休虛骨蒸，肺熱干咳之輔助飲料。

【处方】地骨皮八十兩

【制法】用蒸溜方法，成露四百兩。

【劑量及用法】每次服二至四兩。

百果仙膠

吉 林

【功能与主治】添精補髓，清肺益氣，祛痰止咳，補諸虛損。主喀痰咳嗽。

【处方】核桃仁二斤一兩四錢 真鹿膠三斤二兩 榛子仁二斤一兩四錢 松子仁 瓜子仁各五兩二錢四分 貢冰糖八斤五兩四錢 黃酒二斤一兩四錢

【制法】共熬成膠，每塊一斤重。

【劑量及用法】每服一錢，早晚二次，開水送下。

【備考】應置于清涼之處。

半 夏 曲

一、上 海

【功能与主治】咳嗽痰涌，痰多作惡。

【处方】生半夏(漂淨)一百六十兩

【制法】研細粉，用麥粉拌和成曲。

【劑量及用法】每次一錢，包煎服湯。

二、

处方附

三、濟 南

【功能与主治】咳嗽痰多，停食作嘔。

痰 嗽 類

【处方】白面三斤 苦杏仁六兩 鮮辣蓼草八兩 半夏(姜制)一斤 赤小豆六兩 鮮青蒿八兩 鮮蒼耳草八兩

【制法】以鮮草三味，煎水和成曲。

四、抚 順

【处方】白面四十斤 半夏五斤 杏仁二斤

【制法】共為粗面，用青蒿、蒼耳子、蓼芽，煎水和面成糰，麻葉包裹。

竹 瀝 曲

上 海

【功能与主治】痰涎上逆，喘不得臥，氣急咳嗽。

【处方】生半夏(漂淨)八十兩 白芥子二十六兩七錢

【制法】共研細粉，用竹瀝三十兩拌和，加糊成曲。

【劑量及用法】每次三錢，包煎服湯。

沉 香 曲

一、南 京

【功能与主治】疏表化滯。主胸脘脹悶，腹疼，嘔吐吞酸等症。

【处方】上沉香二兩 烏藥四兩 廣木香二兩 前胡四兩 柴胡一兩 廣皮四兩 川厚朴一兩 桔梗四兩 黃郁金一兩 檳榔四兩 白豆蔻一兩 白芷四兩 西砂仁一兩 谷芽 枳殼各四兩 藿香三兩 麥芽四兩 檀香三兩 青皮四兩 降香三兩 防風四兩 川羌活三兩 葛根四兩 甘草一兩五錢

【制法】上藥生晒共研細末，加面糊作成小塊。每塊約重五分。

【劑量及用法】每服兩塊至四塊，煎水服。

二、南 昌

【功能与主治】肝胃氣滯，胸悶脘脹腹痛，嘔吐吞酸。

【处方】同南京。

【制法】生晒研末，糊作塊。

【剂量及用法】每服八分至一錢五分。

三、重 庆

【功能与主治】疏表化滯，舒肝和胃。

【处方】同南京。

【制法】生晒共研粗末，麵糊成塊晒干。瓦器貯藏备用。

【剂量及用法】一錢。

霞 天 麴

福 州

【功能与主治】治沉痾痼疾，消痰飲，健脾胃。

【处方及制法】法半夏为末，黄牛胆汁煉为麴。入草窠七日，待生黃衣，忌掛通風处。陈久者佳。

叭达杏仁粉

福 州

【功能与主治】潤肺化痰，清金降火。

【处方】甜杏四兩 白冰十六兩

【制法】研和为粉。

【剂量及用法】开水冲粘，可以当茶点服用。

肺 宁 药 片

北京、承德

【功能与主治】潤肺鎮咳，化痰止咳。主咳嗽痰盛，咯血咽痛。

【处方】羚羊角二錢(另兌) 生地八錢 麦冬 鮮石斛 竹茹 知母各四錢 瓜蒌仁八錢 以上六味熬膏。

飴糖 黃芩 郁金 菊花(炭) 丹皮 貝母 生石膏 茅根炭各四錢 白芍八錢

【制法】共为細粉，將膏兌入攪勻，陰干再軋細粉，以水成渣碾餅。

【剂量及用法】每服三片至五片，早晚空心服，溫开水送下。

【禁忌】忌食辛辣及油膩。

竹 瀝 水

天 津

【功能与主治】清肺热化痰。主

痰热咳嗽，湿热头眩。

【处方】鮮竹子六十斤

【制法】將青竹子裝在大罈子內，地下座一小罈，兩口复合相对。然后用谷壳火燒大罈子，須連續燒五、六天，以竹子成炭为止。罈內竹子發热后，流水于小罈中即成竹瀝水。

【剂量及用法】每次服二錢。

【禁忌】虛寒咳嗽忌服。

法 制 陈 皮

一、南 京

【功能与主治】生津健胃，理气化痰。

【处方】陈皮一斤

【制法】以水泡淡，用滾开水冲淋数次，至陈皮之味不苦为度。另用甘草二兩，烏梅肉一兩煎成濃汁，將陈皮浸入汁內，拌勻晒至半干，再用下藥：

白沙參 川貝母 西青盐 粉甘草各五錢共研細末，拌于陈皮之上晒干(勿做成丸)。

【剂量及用法】随意嚼服，或遵医囑。

二、南 昌

【功能与主治】老年体弱之咳嗽、气逆、口渴等症。

【处方】广陈皮八兩 党参 甘草各二兩 青盐一兩五錢 川貝母(研末)七錢五分

【制法】先取广陈皮、党参、甘草同煮一日，去党参、甘草，留广陈皮，加川貝母末、青盐攪勻再用慢火煮一晝夜，以干为度。

【剂量及用法】每日服二至四錢，分作数次，不拘時間，随意嚼服。

清 肺 宁

济 南

【功能与主治】咳嗽多痰

【处方】貝母 杏仁 茯苓各一斤 桔梗 甘草 五味子 橘紅各半斤

【制法】水丸，滑石一斤为衣。

【剂量及用法】每服一錢，开水送下。

气 滯 积 聚 类

木 香 順 气 丸

一、北 京

【功能与主治】理气健胃。主气滯不舒，胸膈痞悶，腹胁脹滿，大便溇瀉。

【处方】木香 草豆蔻 益智仁 蒼朮各三兩 茯苓 澤瀉 青皮 吳茱萸 干姜 半夏各二兩 升麻 柴胡各一兩 当归五兩 厚朴四兩 橘皮二兩

【制法】共为細粉，水泛小丸。

【剂量及用法】每服三錢，日服二次，溫开水送下。

【禁忌】忌气惱厚味，孕妇忌服。

二、天 津

【功能与主治】順气止痛，健胃化食。主胸膈疼痛，兩胁脹滿，郁悶煩躁，消化不良，停食停水，肚腹疼痛。

【处方】广皮六斤 青皮(醋炒)三斤 烏药 山楂各六斤 大黄三斤 三稜(醋制)一斤八兩 桔梗三斤 甘松十二兩 莪朮(醋制)一斤八兩 厚朴(姜制) 檳榔 枳实(麸炒) 枳壳(麸炒)各六斤 广木香三斤 肉桂(去粗皮)十二兩 香附(醋制) 黃芩各六斤 吳萸(甘草水制)十二兩 炒黑白芷一斤

【制法】共为細粉，水丸——凉开水泛小丸，三錢重裝袋；蜜丸——煉蜜为丸三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】水丸每次服一袋；蜜丸每次服一丸，白开水送下。

【禁忌】孕妇及体弱者忌服。

三、上 海

【功能与主治】气食交阻，胸腹飽脹，大便秘結。

【处方】木香 枳壳(麸炒) 香附(制) 檳榔 陈皮 蒼朮(米泔水浸炒) 厚朴(制) 春砂仁 青皮(醋炒)各一兩 甘草(炙)五錢

【制法】共研細粉，用生姜二兩煎湯泛丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每服三錢，溫开水送服。

四、南 京

【功能与主治】主气滞不畅，胸膈痞闷，腹胀作疼。

【处方】同北京。

【制法】共研细末沸水泛丸，每钱约八十粒。

【剂量及用法】每服二至三钱，开水吞服。

五、武 汉

【功能与主治】胸膈痞闷，胸胁胀痛，气滞便秘。

【处方】同北京。

【制法】取上药进行干燥，混合碾细，用净水送成小丸，每钱不得少于三十粒。

【剂量及用法】每服三钱，日二次至三次。

【禁忌】孕妇忌服。或遵医嘱。

六、福 州

【功能与主治】调中顺气，治阴阳失调，气不宣通，胸膈痞闷，腹胀满，大便不利。

【处方】、【制法】同北京，分量为其十分之一。

七、杭 州

【功能与主治】运气散郁，化食消胀。主治气郁不舒，胸膈痞闷，腹胀满，食积嘔吐等症。

【处方】、【制法】同上海。

【剂量及用法】每服二至三钱，开水送下。

八、南 昌

【功能与主治】胸膈痞闷，腹胀满，大便不畅。

【处方】同北京。

【制法】共研细面，酒泛为丸，如绿豆大。

【剂量及用法】每服三钱，开水送下。

【禁忌】勿食不易消化食物。

【备考】非经医师处方勿服用。

九、沙 市

【功能与主治】治寒湿壅滞，胸膈痞闷，腹胀满等症。

【处方】同北京。

【制法】诸药研细末，冷开水泛为丸。

【剂量及用法】每次服二钱，每日服二次，老人小孩酌减。

【禁忌】体虚、脾胃发热者及孕妇忌服。

十、昆 明

【功能与主治】消化不良，腹胀打嗝。

【处方】广木香 草蔻 苍朮各十二两 厚朴十六两 青皮 陈皮 法夏 吴茱 香附 干姜 茯苓 泽瀉各八两 升麻 柴胡各四两 秦归二十两 台乌 檳榔 草果各四两 益智仁十二两

【制法】水叠为丸。

【剂量及用法】每服二钱半，幼童减半，用开水服。

【禁忌】病后体弱、腹满忌服。

十一、西 安

【功能与主治】主胸膈痞闷，胸胁胀痛，大便不通，单腹胀及大小便不利等症。

【处方】同北京。

【制法】酒泛为丸。

【剂量及用法】每服二钱至三钱，热汤送下。

【禁忌】热性病及孕妇忌服。

十二、蘭 州

【功能与主治】顺气止痛，健胃化食。主胸膈疼痛，两胁膨胀，郁闷烦躁，肚腹疼痛，消化不良，停食停水。

【处方】广木香二两 泽瀉二两 升麻一两 草豆蔻二两 青皮二两 红柴胡一两 益智仁二两 吴茱二两 当归五两 苍朮一两 干姜二两 厚朴四两 茯苓二两 半夏二两 陈皮二两

【制法】共为细面，水打小丸。

【剂量及用法】每服三钱，白开水送下。

【禁忌】孕妇及体弱者勿服。

十三、大 同

【功能与主治】升积聚，降宿食，通大便，宽胸膈，消胀满。

【处方】陈皮 乌药 枳实 山楂 檳榔 川朴 枳壳 香附 黄芩各六斤 青皮 黑丑 大黃 桔梗 木香各三斤 三棱 莪朮 官桂各一斤半 甘松 吴茱各十二两

【制法】共研细面，水为小丸。

【剂量及用法】每次服二钱。

十四、禹 县

【功能与主治】一切气郁，肚腹疼痛，胸膈恶心，气逆气滞。

【处方】同上海。

【制法】共为细面，水泛为丸。

【剂量及用法】每服二钱，白开水送下。

【禁忌】孕妇及小兒忌用。

【备考】有效期限二年。

十五、济 南

【功能与主治】胸膈痞闷，腹胁胀满。

【处方】香附子二斤(生一半，醋浸一半) 乌药一斤 广皮一斤 莱菔子(炒) 炒枳壳 茯苓 广木香 炒神曲 炒山楂 炒麦芽各一斤 檳榔 青皮 甘草各十二两

【制法】共为细末，水泛为丸。

【剂量及用法】每服一钱至二钱，白开水送下。

【禁忌】生冷油腻辛辣等物。孕妇忌服。

十六、撫 順

【功能与主治】健胃助消化。主饮食伤胃，消化不良，胃脘疼痛，嘔逆吐酸，积聚痞块，肠胃疝痛，暴怒气滞，呃逆不舒，嘈杂胀闷，腹痛拒按等症。

【处方】广木香二两 陈皮六两 香附 苍朮各一斤 干姜六两 甘草二两 乌药六两 白朮四两 神曲一斤 砂仁二两 茯苓一两 枳壳二两 川朴 桔梗各六两

【制法】共为细面，水泛小丸。

【剂量及用法】每服二钱，食前白水送下。

【禁忌】孕妇忌服。忌食生冷硬物。

十七、吉林、哈尔滨

(顺气丸、木香丸)

【功能与主治】平肝顺气，健脾消积。主肝瘀气滞，消化不良，积聚痞块。肝瘀气滞之症，因暴怒伤肝而肝气横逆，症见胸脘胀闷，咯气气促；消化不良之症，由于食伤脾胃，不能消化，以致胃脘疼痛，嘔逆泛酸，腹如雷鸣，辗转下气，积聚痞块。

即气、血、痰、食、茶、果、酒积，日久結成痞塊癥瘕，脹痛拒按。

【处方】香附 木香 山楂各四兩 枳榔 陈皮 麦芽各三兩 烏藥 青皮 棧 萊菔 砂仁 枳壳各二兩

【制法】共碾为細面，水泛为小丸，如梧桐子大。每二錢一付，装入印就之紙袋內封之。

【剂量及用法】每服一付（二錢），空腹白水服。

【禁忌】孕妇勿服。忌食辛辣生冷。

十八、承德

【功能与主治】胸膈痞悶，腹脇脹痛。

【处方】广木香 炒草豆蔻 益智仁 蒼朮各二兩 干姜 茯苓 陈皮 澤瀉 芍药 吳茱萸（浸泡）炙半夏各二兩 当归五兩 厚朴四兩

【制法】共为細粉，水泛为丸，滑石为衣，闔亮。每兩分做二百粒。

【剂量及用法】每次服二十粒，日服二次，溫开水送下。

【禁忌】忌气惱及厚味。

十九、呼和浩特

【处方】香附 烏藥 枳壳 陈皮 山楂 神柚 麦芽 萊菔 青皮 枳榔各二斤八兩 木香 砂仁各一斤

【制法】水泛小丸。

附参考古方

【来源】沈氏尊生書：杂病源流犀燭。

【功能与主治】气滯。

【处方】木香 香附 枳榔 青皮 陈皮 厚朴 蒼朮 枳壳 甘草 砂仁

檳榔順气丸

一、沈陽(1)

【功能与主治】消食順气。主胃脘脹悶，停食停水，胸腹脹飽，吞酸腹痛，紅白痢疾，里急后重等症。

【处方】木香一兩 大黃 当归各二兩 枳壳 香附各一兩 牽牛一兩 棧 枳榔 陈皮 黃芩 青皮 黃柏 枳壳各一兩

【制法】共碾極細面，水泛小丸。

【剂量及用法】每服二錢，白开水送下。

【禁忌】忌生冷硬物。孕妇忌服。

二、沈陽(檳榔丸)(2)

【功能与主治】消积滯，去病脹，利人便，止瀉痢。主胃腸积滯，痞滿結痛，大便不通，泄瀉痢疾，里急后重，食积蓄水等症。

【处方】木香 枳榔 青皮 陈皮 枳壳 黃柏 黃連 棧 莪朮各五錢 大黃一兩 黑牽牛 香附各二兩

【制法】共碾極細面，芒消水泛为小丸。

【剂量及用法】每服二錢，姜湯送下。

【禁忌】忌生冷粘性食物。孕妇忌服。

三、撫順

【功能与主治】瀉下，調胃整腸。主治五積六聚，因气血痰食郁滯成塊，以致胃痛脹悶，堅硬拒按，二便閉結，飲食不下，腸炎，由于濕熱凝滯，食物腐敗，以致腸炎，里急后重，便行赤白，結胸，因气滯不舒發为結胸，呃逆不休，胸肋脹痛。

【处方】广木香 枳榔 枳壳 青皮 棧 莪朮 黃芩 当归 黃柏各一斤 黑丑 大黃各四斤 陈皮一斤 香附四斤

【制法】共为細面，水泛小丸。

【剂量及用法】每服一錢至二錢，姜水或白水送下均可。

【禁忌】孕妇忌服。忌食生冷硬物，油膩等。

四、哈爾濱(木香檳榔丸)

【功能与主治】消积化聚，導滯順气。主积聚，痢疾，結胸。

【处方】香附 川軍 黃柏各八兩 黑丑六兩 木香 枳榔 莪朮 青皮 当归 黃芩 陈皮 枳壳 黃連 棧 朴消各二兩

【制法】共碾为細面，水泛为小丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服一付（二錢），白水空腹服。

【禁忌】忌食腥冷辛辣。孕妇忌服。

服。

附参考古方

【来源】杂病証治类方

【功能与主治】消宿食，破滯气。

【处方】枳榔三錢 木香 人参各二錢 陈皮五錢 甘草一錢

【制法】上为末，蒸餅丸。

【剂量及用法】每服二、三十丸，食前白湯下。

开胸順气丸

一、北京、承德

【功能与主治】消食逐水，調气化滯。主食积气聚，膨脹痞滿。

【处方】木香 五灵脂 橘皮各八十兩 黑牽牛 大黃各一百六十兩 豬牙皂 黃芩 莪朮 棧各四十兩 香附一百二十兩（醋炒）

【制法】共为細粉，水泛小丸，滑石为衣闔亮。

【剂量及用法】每服二錢，日服二次，溫开水送下。

【禁忌】年老气虛者及孕妇忌服。

二、天津

【功能与主治】开胸順气，健胃消食。主胸腹脹滿，消化不良，嘔吐惡心，停食蓄水，紅白痢疾。

【处方】枳榔 广木香 山楂 神柚（麸炒） 炒麦芽 厚朴（姜制） 枳实（麸炒）各一斤 烏藥 青皮（醋炒） 熟軍各一斤八兩 甘草八兩 炒萊菔子一斤八兩

【制法】共为細粉，水丸——涼开水泛小丸，二錢重裝袋；蜜丸——煉蜜为丸二錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】水丸——每次服一袋；蜜丸——每次服一丸，白开水送下。

【禁忌】孕妇及气虛者忌服。

三、蘭州

【功能与主治】开胸，順气，健胃，消食。主胸腹脹滿，消化不良，嘔吐惡心，停食蓄水，痢疾膨脹。

【处方】同天津。

【制法】以上六研細面，水打小丸。

【剂量及用法】每次服二钱，白开水送下。

【禁忌】孕妇和气虚人勿服。

四、大同

【功能与主治】停食宿水，食积胀满。

【处方】木香 五灵脂 陈皮各五斤 黑丑 大黄各十斤 牙皂 黄芩 滑石 莪朮 三棱各二斤半 香附一斤半

【制法】共为细面，为水丸。

【剂量及用法】每服二钱。

五、济南

【功能与主治】停食停水，胸腹胀痛。

【处方】同北京，惟多滑石二斤八两。

【制法】共为细粉，水泛小丸，如绿豆大，滑石为衣（方内者）闪亮。

【剂量及用法】每服一钱，日服二次，温开水送下。

【禁忌】年老体弱者忌服。

六、沈阳

【功能与主治】健胃消食，攻结破结，壅滞肠胃。主肝气不舒，胸腹胀闷，噎膈暖气，反胃吞酸，胸间刺痛，停水停食，消化不良，腹中疼痛。

【处方】槟榔 木香 山楂 神曲 麦芽 厚朴 枳实各四两 莱菔 乌药 青皮 大黄各五两 牵牛八两 甘草二钱

【制法】共碾极细面，炼蜜为丸，二钱重。

【剂量及用法】每服一丸，姜水送下。

【禁忌】忌生冷。

七、呼和浩特

【处方】木香七斤半 香附十五斤 草蔻 莪朮各七斤一两 槟榔十五斤 枳壳 青皮 神曲 川朴各七斤半 黑丑十五斤 甘草三斤十二两 白芍五斤

【制法】水泛小丸。

消食顺气丸

抚 顺

【功能与主治】温性，健胃缓瀉。主消化不良，五积六聚，凝积成块，

脘腹胀痛，食噎气塞，嘔逆吐酸，二便闭结，腹痛下坠，里急后重，气滞不舒等症。

【处方】薏仁 广木香 槟榔 广砂仁 香附各一两 川军三两 二丑六两 枳实十两 牙皂五钱 枳壳一两

【制法】共为细面，蜜丸二钱重。

【剂量及用法】每服一钱至二钱，开白水送下。

【禁忌】孕妇忌服。忌食生冷硬物。

流 气 丸

沈 陽

【功能与主治】散寒通滞，行气健胃。主胸膈闷满，饮食不下，气滞作痛，遍身浮肿，气郁痰喘，小便不利，瘡毒气肿。

【处方】人参 焦朮 茯苓 炙甘草 清夏 广皮 丁香 沉香各二钱 木香 肉桂各一钱 香附四钱 白芷 紫苏 草果仁 青皮 大黄各二钱 枳壳 厚朴各二钱 槟榔 莪朮 麦冬 木瓜 木通 白蔻仁各一钱

【制法】共碾极细面，炼蜜为丸二钱重。

【剂量及用法】每服一丸，姜汤送下。

【禁忌】生冷硬物。

流气导滞丸

沈 陽

【功能与主治】疏通气血，消导滞塞，宣经活络，开郁破结。主寒郁气滞，腹部作胀，胸满气塞，不思饮食，噎膈反胃，食后腹痛，吞酸嘈杂，宿食不消。

【处方】人参 白朮 茯苓 制甘草 清夏 紫丁皮 白芷 盆沉香 草果仁 紫苏 青皮 大黄 槟榔 莪朮 麦冬各七钱 木瓜 木通 大腹皮 陈皮 枳壳各一两 木香五钱 香附二两四钱 肉桂三钱五分 厚朴一两四钱

【制法】共碾极细面，炼蜜为丸二钱重。

【剂量及用法】每服一丸，早晚白开水送下。

【禁忌】生冷粘腻。孕妇忌服。

理 气 丸

一、抚 顺

【处方】白朮六两 白芍三两八钱 陈皮六两 半夏一两二钱 当归六两 山楂一两八钱 神曲二两半 枳实一两 桔梗一两半 香附一两八钱 木香五钱 炙草一两

【制法】共为细面水泛小丸。

二、吉林(理气舒肝丸)

【功能与主治】舒肝理气，开痰导滞。主治男女之气滞肝郁，小兒疳积。

【处方】薏仁二两六钱七分 砂仁 草果仁各一两二钱四分 木香 三棱各六钱七分 槟榔一两 鸡内金 盆沉各一两三钱四分 甘草 枳壳 山楂 姜夏 白朮 乌药各六钱七分 川军 二丑各二两 神曲 公丁香 黄朴 黄桂各一两 莪朮六钱七分 青皮 陈皮各一两

【制法】将以上药品共为细面，水泛小丸如黄豆大，硃砂为衣。可用瓷坛存贮以免风干。

【剂量及用法】每服二丸。

【禁忌】孕妇忌服。

寬胸利膈丸

一、济 南

【功能与主治】胸膈痞闷，宿食不消，气滞作疼。

【处方】香附 槟榔 枳壳各九两 青皮 杏仁 蒼朮 大黄 乌药 莪朮 郁金各八两 木香 藿香各四两

【制法】共为细粉，水泛小丸，绿豆大。

【剂量及用法】每服二钱，日服二次，温开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

二、沈 陽

【功能与主治】消痞除胀，开郁顺气。主气郁不舒，胸膈阻塞，停水蓄食，嘔逆腹痛，虫积水积，腸炎痢疾。

【处方】大黄 槟榔各四两 木香 茅朮 陈皮 厚朴 草果仁 藿香 砂仁 神曲 枳壳 甘草

山楂 麦芽 桔梗 青皮 莱菔子
各二兩

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，早晚飯后，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

三、撫 順

【功能与主治】健胃，助消化。主胃病胃痛，消化不良，胸脘膨脹，嘈杂吞酸，宿食不消，便秘腹脹等。

【处方】广木香 砂仁 蒼朮 厚朴 草蔻 青皮 神曲 麦芽 山楂 防風 萊菔 枳壳 檳榔 甘草 陈皮 桔梗 藿香 草果仁 各五錢 炙軍一兩

【制法】共为細面，蜜丸二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，早晚二次，姜水送下。

【禁忌】忌食生冷硬物。孕妇忌服。

四、吉林(利膈丸)

【功能与主治】开痰順气，消食化痰。主肝痰胃热，發为結胸，胸脘疼痛，咯气食少；肝气横逆，閉塞于胸，胸胁串疼，气促息急；溫蘊脾肺，痰如蛋清，漉漉有声，气喘咳嗽。食积結滯，中脘脹硬，大便閉塞，嘈杂吞酸。

【处方】制野軍 檳榔 萊菔各四兩 木香 茅朮 陈皮 厚朴 果仁 枳壳 砂仁 山楂 神曲 麦芽 桔梗 青皮 藿香 甘草各二兩

【制法】碾为細面，煉蜜为丸，每丸重二錢一分。

【剂量及用法】每服一丸，早晚各一次。

【禁忌】忌食辛辣、油膩物。孕妇忌服。

五、哈尔滨(利膈丸)

【功能与主治】开痰順气，消食化痰。主結胸胸痹，痰飲食积。

【处方】、【剂量及用法】、【禁忌】同吉林。

【制法】共碾为細面，煉蜜为二錢一分重丸。瓷坛存貯，以免風干。

附参考古方

【来源】沈氏尊生書：杂病源流犀燭

【功能与主治】陰盛。

【处方】木香 檳榔各七錢半 大黃 厚朴各二兩 人參 当归 藿香 甘草 枳实各一兩

【制法】水丸。

开胸利气丸

禹 县

【功能与主治】胸膈滿悶，食积腹脹，气滯作痛，大便燥結。

【处方】广木香四錢 陈皮二兩 沉香 黃連各四錢 枳壳一兩二錢 砂仁一兩二錢 香附一兩二錢 法半夏 烏藥 五灵脂各一兩 萊菔子一兩二錢 三棱 莪朮 青皮 厚朴 穿山甲各一兩 白豆 檳榔 玄胡各二兩 大黃一斤 黑白丑二兩

【制法】共为細面，水泛为丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每服二錢，白开水送下。

【禁忌】孕妇及身体虛弱者忌用。

【备考】有效期二年。

黃連利气丸

禹 县

【功能与主治】腸胃积热，咽喉腫痛，口燥舌干，大便秘結，小便赤黃。

【处方】黑白丑六斤 大黃二斤 陈皮一斤半 元胡索 檳榔 川芎各一斤半 黃連半斤 木通一斤半 香附 枳壳各一斤 广木香 甘草各半斤 木瓜一斤

【制法】共为細面，水丸，如小綠豆大。

【剂量及用法】每服一錢，开水送下，十岁每服五分。

【禁忌】孕妇忌用。

【备考】有效期二年。

五味檳榔丸

一、天 津

【功能与主治】順气开胃化痰。

主消化不良，嘔吐酸水，嘈杂惡心，膨悶脹飽。

【处方】檳榔 棗檳榔 薏仁各一斤 食盐五錢 砂仁二兩 公丁香五錢 鮮姜一兩 馬牙檳榔(去皮)一兩

【制法】檳榔、棗檳榔、馬牙檳榔、食盐軋細粉，薏仁、砂仁、公丁香軋粗面，鮮姜切粗末，共和一处拌勻，用江米面十六兩蒸糊为丸，干重二分。

【剂量及用法】每次服五粒，白开水送下，或含化。

二、蘭 州

【功能与主治】止疼，下气，暖胃。主胃脘寒疼肉食停积。

【处方】棗檳榔一斤 丁香一兩 薏仁六兩 砂仁八兩 大青盐五錢

【制法】共研細末，米糊为丸，五分重。

【剂量及用法】每服四丸，日服二次，白开水送下。

三、济 南

【功能与主治】膨悶脹飽，嘈杂吞酸。

【处方】、【剂量及用法】同天津。

【制法】共为細粉，江米糊为丸，重二分。

【禁忌】孕妇忌服。

四、青 島

【处方】盐炒檳榔三兩 棗檳榔五兩 豆蔻米二兩 砂仁米二兩 干姜一兩 青盐三錢 陈皮一兩

【制法】共軋粗渣，每斤加江米面四兩作餅，水煮和勻为丸。

五、沈 陽

【功能与主治】健胃理腸，順气化积。主消积滯，导水化痰，胸悶腹脹，嘔吐嘈杂，胃酸疼痛。

【处方】薏仁五兩 猴檳榔 檳榔各十兩 人參一錢 陈皮二兩 棗檳榔十兩 厚朴六兩 青果三兩 干朮二兩 烏梅六兩五錢 神曲五錢 食盐一兩五錢

【制法】共碾極細面，糯米面四兩，鮮姜切碎一兩打糊为錠重三分。

【剂量及用法】每日早晚随时嚼化一二錠。

【禁忌】生冷面食。

六、呼和浩特

【处方】五味子三錢 板榔八兩 蔻仁二兩 丁香三錢 砂仁 广皮各二兩 干姜 白矾各二錢 食盐六錢 官桂五錢 棗檳榔八兩 黑丑五錢

【制法】江米糊为餅。

英明普救丸

沈 陽

【功能与主治】化积开郁，解毒避疫。主胃脘疼痛，脹滿結滯，食物不消，时行疫毒。

【处方】明雄黃 郁金各五錢 巴豆霜四錢 乳香 沒藥 陈皮 木香 皂角各一錢五分 胆南星 白豆蔻各二錢 牛黃 麝香 琥珀各二分

【制法】共碾極細面，江米面醋糊为丸，一厘重硃砂为衣。

【剂量及用法】每服四小丸，小兒減半。

英神普救丸

一、天 津

【功能与主治】調胃通便，清热鎮惊，化痰。主停食停水，积聚痞塊，腹大青筋，面黃肌瘦，作冷作燒，內熱痰盛。

【处方】郁金五錢 蔻仁二錢 胆星二錢 制乳香 制沒藥 陈皮 广木香 牙皂各一錢五分 以上八味，共为細粉，每細粉一兩七錢五分兌：

琥珀面 4 黃各二分 淨巴豆霜四錢 麝香二分 明雄黃五錢

【制法】以上研細和勻，每兩藥面，用白面三錢，和醋打糊为小丸，干重二厘。每斤丸药用硃砂面四錢上衣。

【剂量及用法】一岁以上每次服五粒，一岁以内酌減。开水化服。

二、沈陽(普救丸)

【功能与主治】化积开郁，解毒除穢。主胃脘疼痛，脹滿結滯，食物不消，大便燥結。

【处方】明雄黃 郁金各五錢 巴豆霜四錢 乳香一錢五分 牛黃二分 沒藥一錢五分 琥珀二分 陈皮 木香各一錢五分 麝香二分 炙牙皂一錢五分 胆星 紫葢各二錢

【制法】共碾細末，江米面醋糊为丸，綠豆大，硃砂为衣。

【剂量及用法】大人每服十丸(一分重)。

【禁忌】孕妇忌服。

三、撫 順

【功能与主治】解毒，鎮痛，瀉下。主腹痛嘔吐，感冒霍乱，痧症惡瘡，赤白痢疾，小兒惊風等症。

【处方】、【制法】、【剂量及用法】、【禁忌】同沈阳。仅紫葢用三錢。

太乙無名丸

济 南

【功能与主治】胃腸积聚，脇腹脹滿，停食停水，大便不通。

【处方】三棱 莪朮 归尾 赤芍 元胡 檳榔 五灵脂 干漆 广木香 干姜各二兩 神曲四兩 莱菔子(炒) 芒硝各四兩 吳萸一兩 黑丑(炒)半斤 山楂 牛膝各二兩 紅柚半斤 枳实 枳壳(炒)各二兩 紫菀砂五錢 大黃五斤(西洗) 大腹皮二兩(熬水)

【制法】醋二斤和水为丸，綠豆大。

【剂量及用法】每服五分至一錢，小兒酌減。

【禁忌】辛辣油膩等物；孕妇及体虛胃弱者忌服。

黑 虎 丸

大 同

【功能与主治】食慾不振，冷熱不和。

【处方】三棱一兩 大黃一兩五錢 干漆五錢 巴豆霜一錢

【制法】共研細面，醋糊为丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每服三錢。

【禁忌】心臟衰弱者禁用。

平 安 丸

一、北 京

【功能与主治】健胃止痛，理气止嘔。主胃脘疼痛，胸膈脹滿，气逆不舒，嘔吐嘈杂。

【处方】沉香 公丁香 檀香 紫豆蔻 紅豆蔻 肉豆蔻 草豆蔻 人參(去蘆) 丁朮 黃芩 熟地 当归 白芍 川芎 茅蒼朮各一兩 厚朴二兩 橘皮一兩 甘草五

共为細粉，每十八兩五錢細粉兌：

麝香二錢 冰片四錢 雄黃 硃砂各五錢

【制法】上藥和勻，煉蜜为丸，重二錢。蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，日服二次，溫开水送下。

【禁忌】忌憂郁及食厚味。孕妇忌服。

二、蘭 州

【功能与主治】散气止痛。主男女一切心胃气疼。

【处方】丁香四兩 枳皮四兩 神曲四兩 枳实四兩 草果四兩 木香二兩 云苓二兩 元胡二兩 山楂二兩 砂仁二兩 蔻仁二兩 母丁香四兩 香附子四兩 王金三兩 沉香一兩

【制法】共研細末，蜜为大丸三錢重，硃砂为衣，蜡皮封固。

【剂量及用法】每日二次，每次一丸，开水送下。

三、大 同

【功能与主治】气痛，脇痛，虫痛，胃痛。

【处方】丁香 檳榔 白朮 神曲 香附 青皮 草果 枳实 白蔻 茯苓 木香各十五兩 陈皮 元胡各十兩 山楂十六兩 母丁香 肉果各十兩 砂仁十五兩 沉香二十兩 麦芽十五兩

【制法】共为細面，煉蜜为丸三錢重，蜡皮。

【剂量及用法】每服三錢。

四、济 南

【功能与主治】胃口疼痛，胸膈

脹滿，噎膈反胃，氣逆不舒等症。

【處方】公丁香 廣陳皮 神曲 枳實 草果 木香 茯苓 山查 元胡 砂仁 益沉香 麥芽 肉果 白朮 檳榔 青皮 香附 薏仁 母丁香各十兩

【制法】共軋細面，煉蜜為丸，重二錢。蜡皮封固。

【劑量及用法】每次一丸，白開水送下。

【禁忌】忌氣惱生冷食物。

五、沈陽

【功能與主治】健胃消積。主胃部疼痛，胸膈脹滿，噎膈反胃，氣逆不舒。

【處方】陳皮 神曲 炒枳殼 草果 木香 茯苓 延胡 砂仁 沉香 麥芽 肉蔻 白朮各一兩 青皮 香附 薏仁各二兩

【制法】共軋極細面，煉蜜為丸，重一錢五分。蜡皮封固。

【劑量及用法】每服二丸，白開水送下。早晚服。

【禁忌】忌生冷硬物。

丁香爛飯丸

杭州

【功能與主治】治脾胃虛弱，冷食傷中，積滯不化，胸腹疼痛。並治心胃氣痛等症。

【處方】公丁香 蓬莖朮 京三稜 廣木香各一兩 甘松 益智仁 春砂仁各二兩 制香附五兩 廣陳皮三兩 炙甘草二兩

【制法】共研細末，米糊為丸或水泛丸。

【劑量及用法】每服二至三錢。開水送下。

丁沉透膈丸

昆明

【功能與主治】消化不良，腹部脹痛。

【處方】公丁香 廣木香 沉香各二兩 白朮八兩 香附 砂仁 黨參各四兩 草蔻 麥芽各二兩 陳皮三兩 豆蔻二兩 厚朴五兩 藿香三兩 青皮二兩 法夏四兩 甘草二兩 神曲四兩 草果二兩 茯苓四兩

【制法】水營為丸。

【劑量及用法】每服二錢半，幼童減半。用開水吞服。

【禁忌】休虛弱者忌服。

丁香核桃丸

一、沈陽

【功能與主治】開郁順氣，祛寒化積，消食除痞。主胸膈疼痛，兩肋脹滿，嘔吐噎膈，噯氣吞酸，大便秘結。

【處方】丁香 木香 粉草 川芎 砂仁 草果 當歸 白蔻各一兩 莪朮 烏藥 檳榔 枳實 肉桂 青皮 神曲 大黃 陳皮 白朮 三稜 半夏 山楂肉各二兩 厚朴三兩

【制法】共軋細面，蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】忌生冷；孕婦忌服。

【備考】此方仿襲雲林丁香丸脫化而成，僅少豆蔻、皂角、葶藶、沒藥等。

二、撫順

【功能與主治】健胃助消化。主胃病胃痛，消化不良，心腹脹痛，噯氣不舒，嘈雜吞酸，呃逆氣滯，以及食積、水積、寒積、氣積，起久無定忽聚忽散等症。

【處方】廣木香 莪朮 烏藥 檳榔 枳殼各二兩 川芎 桂楠 丁香各一兩 青皮二兩 甘草一兩 當歸 川朴 神曲各二兩 草果 砂仁各一兩 大黃 陳皮 白朮 三稜 清夏 山楂各二兩 薏仁 二丑各一兩 萊菔二兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每次一丸，早晚二次，姜水送下。

【禁忌】生冷硬物，孕婦勿服。

【備考】另有一方木香為一兩。

沉香化氣丸

一、上海

【功能與主治】積滯阻郁，腸胃不暢。

【處方】陳皮 砂仁各二兩 莪

朮 廣藿香各四兩 沉香一兩 甘草二兩 六神曲(炒焦) 麥芽(炒)各四兩 香附(制) 木香各二兩

【制法】共研細粉，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服一錢至三錢，溫開水送服。

【禁忌】孕婦忌服。

二、南京(沉香順氣丸)

【功能與主治】主胸腹痞滿，疼痛吐酸等症。

【處方】上沉香五錢(另研為衣) 西砂仁一兩(另研為衣) 牛甘草一兩 蓬莖朮二兩 制香附一兩 焦麥芽二兩 廣木香一兩(另研為衣) 廣藿香二兩 廣陳皮一兩(另研為衣) 焦神曲二兩

【制法】上藥除另研外，余藥生晒，共研細末，沸水泛丸，每錢約八十粒。以沉香、木香、陳皮、砂仁四味另研細末為衣。

【劑量及用法】每服二錢，一日二次，開水吞服。

【禁忌】孕婦忌服。

三、武漢

【功能與主治】胸腹痞脹，食積氣滯，嘔逆腹痛。

【處方】同南京。

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于三十粒。

【劑量及用法】每服一錢至二錢，開水送下。

【禁忌】孕婦慎服。

四、杭州

【功能與主治】治諸郁積滯，氣不宣通，痰飲留蓄，喘促吐酸，胸腹脹痛，面目浮腫等症。

【處方】沉香一兩 廣陳皮二兩 炒麥芽二兩 粉甘草 春砂仁各二兩 廣藿香二兩 制香附二兩 蓬莖朮 六神曲(炒焦)各二兩 廣木香二兩

【制法】共研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服二錢。開水送下。

五、重慶

【功能與主治】治胸腹留飲，喘促吐酸，痞塞疼痛。

【處方】同南京。

【制法】沉香另研，余藥共研細

末，用姜汁、竹瀝泛丸，紙盒包裝。

【劑量及用法】大人每服一錢至二錢，小孩六分。

六、禹 县

【功能与主治】气滯积聚，痞气疼痛，停滯吐酸。

【处方】同南京。

【制法】共为細面，水为丸。

【劑量及用法】每服二錢，白开水送下。

【禁忌】孕妇、小兒及虛弱者忌用。

【備考】有效期二年。

附參考古方

【来源】杂病証治类方

【功能与主治】專攻赤白青黃等色痢疾，諸般腹痛，飲食傷積、酉積、痰積、血積、跌仆損傷，五積六聚，胸膈气逆痞塞，胃中積熱，中滿腹脹，瘧疾茶癖，及中諸毒惡气傷寒，大便不通，下后遺積未盡，感時疫气瘴气，並諸惡腫瘡瘍腫毒，及食諸般牛畜等物中毒，不問婦人、男人、小兒並皆治之。

【处方】大黃(錦紋者) 黃芩(条实者)各一兩 人參(官揀者，去蘆) 白朮(去蘆，肥者)各二錢 沉香(上好角沉水者，另为末)四錢

【制法】上將前四味剉碎，用雷竹瀝七浸七曝，候干为極細末，和沉香末再研勻，用竹瀝入姜汁少許为丸，如綠豆大，硃砂为衣，晒干不見火。

【劑量及用法】每服一錢，淡姜湯送下。小兒六分。

沉香化滯丸

一、北 京

【功能与主治】健胃理气化滯。主食物停滯不化，胸膈脹滿，嘈雜吐酸。

【处方】沉香六錢 厚朴 白朮 半夏 橘皮 木香 砂仁 檳榔 藿香各一兩二錢 枳實二兩 大黃 黃芩 山楂(炒焦)各一兩五錢

【制法】共为細粉，水泛小丸，滑石为衣闌亮。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次。溫开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

二、天 津

【功能与主治】健胃消食，順气化滯。主胸中脹滿，消化不良，气逆不舒，疝气痞積，腹脹肚痛。

【处方】炒黑丑二斤 大黃十五斤 莪朮(醋制)五斤 砂仁八兩 沉香一斤 陳皮五斤 枳實(麸炒)二斤 香附(醋制)五斤 枳殼(麸炒)五斤 五靈脂(醋炒)二斤 山查五斤 廣木香二斤 厚朴(姜制)五斤 三稜(醋制)二斤 青皮(醋炒)二斤。

【制法】共为細粉，涼开水泛小丸。一錢重，裝袋。

【劑量及用法】每次服一袋，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

三、上 海

【功能与主治】食滯气積，胸腹脹滿。

【处方】同北京。

【制法】共研細粉，水泛为丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服一錢至二錢，溫开水送服或包煎湯服。

四、杭州(沉香降气丸)

【功能与主治】通順气血。主治痰飲气滯，胸脘痞悶，喘促噫气，婦人經水不調，小腹疼痛等症。

【处方】制香附十二兩 貢沉香 春砂仁各一兩五錢 粉甘草二兩

【制法】共研細末，水泛为丸。

【劑量及用法】每服二錢。开水或淡姜湯或淡鹽湯送下。

五、西 安

【功能与主治】主治肝胃不和，食滯不化，胸腹悶痛，一切气塊等症。

【处方】同北京。

【制法】煉蜜为丸。

【劑量及用法】每服二、三錢，开水送下。

【禁忌】身体衰弱及腸胃虛寒者禁忌。孕妇服用須遵医嘱。

六、蘭 州

【功能与主治】健胃消食，順气化滯。主胸中脹滿，消化不良，气逆不舒，疝气痞積，腹脹肚痛。

气 滯 积 聚 类

【处方】、【禁忌】同天津，惟炒黑丑用二丑。

【制法】共为細面，水泛为小丸。

【劑量及用法】每服三錢，白开水送下。

七、大 同

【功能与主治】順气寬郁，破積聚，通便秘，降宿食。

【处方】黑丑 枳實 灵脂各四十八兩 山楂 枳殼 陳皮 香附 厚朴 莪朮各八十兩 砂仁八兩 三稜 廣木香 青皮各一十二兩 大黃十五斤 沉香一斤 萊菔子一斤

【制法】共为細面，为水小丸。

【劑量及用法】每服二錢。

八、禹 县

【功能与主治】肝胃不和，食滯不化，胸腹悶痛，一切气塊。

【处方】沉香六兩 川厚朴 白朮 法半夏 砂仁 廣陳皮 檳榔 廣木香各十二兩 黃芩十五兩 廣藿香十二兩 山查 大黃各十五兩 枳實三十兩

【制法】共为細面，水泛为丸。

【劑量及用法】每二錢，白开水送下。

【禁忌】孕妇及小兒忌用。

【備考】有效期二年。

九、濟 南

【功能与主治】食滯不消，胸腹悶痛，一切气塊等症。

【处方】沉香 木香 檳榔 枳實 萊菔子 陳皮 山查(炒) 三稜 莪朮 青皮各一兩 大黃 香附 黑丑(半生半熟) 白丑 五靈脂各二兩

【制法】共为細粉，水泛小丸，綠豆大。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次。

【禁忌】孕妇忌服。

十、撫 順

【功能与主治】輕瀉，調胃整腸。主消化不良，胃痛便秘，腹痛拒按，心腹膨悶，噯气吐酸，呃逆不舒，下痢赤白，里急后重，食噎气塞。

【处方】海沉香二兩五錢 廣木香二兩 檳榔四兩 枳實 陳皮 文朮各十二兩 牙皂四兩 香附十

二兩 萊菔四兩 制軍 川朴 黃芩 歸尾各二兩 生地 廣砂仁各三兩 藿香五兩 炙草一兩

【制法】共為細面，水泛小丸。

【劑量及用法】每服一錢至二錢，食前白開水服。

【禁忌】孕婦、身體衰弱及便滑泄者禁服。

十一、吉林、哈爾濱 (化滯丸)

【功能與主治】消積化聚，導滯順氣。主治 1. 積聚——五積六聚，氣血痰食，凝結成塊，或聚或散，脘腹脹疼，堅硬拒按，食噎氣塞，咯氣發酸，二便秘結，飲食不下。2. 痢疾——濕熱凝滯，腹痛下墜，里急後重，痢下赤白。3. 結胸——肝痰氣滯，胃脘內熱，發為結胸。

【處方】大黃 香附 靈脂 檳榔各四兩 厚朴二兩 枳殼二兩 莪朮 青皮 萊菔各二兩 麥芽四兩 山楂 三稜 沉香 木香 陳皮各二兩 砂仁 白蘞各一兩 黑丑四兩

【制法】共碾細面，用水泛為小丸。如梧桐子大。除包裝保存，用磁罇或遮光瓶裝，勿使風干為要。

【劑量及用法】每服二錢（一付），空腹食前，白水或姜水送下。

【禁忌】忌生冷辛辣等物。孕婦忌服。

十二、承德

【功能與主治】主食滯不化，氣逆不舒，胸膈脹滿，嘈雜吞酸。

【處方】同北京。

【制法】共為細粉，水泛為丸，滑石為衣，闔亮，每兩分作二百粒。

【劑量及用法】每服二十粒。日服二次，溫開水送下。

十三、呼和浩特

【處方】沉香（加料另兌） 木香各一斤半 萊菔子二斤四兩 大黃四斤半 枳實 陳皮 山楂 三稜 莪朮 牙皂 青皮 香附 神曲各三斤

【制法】共為細面，水泛小丸。

【備考】加料每斤原料面，加沉香面六錢 枳實一兩 蜜為大丸一錢五分，蜡皮封固。

沉香順氣丸

沙 市

【功能與主治】治寒濕氣滯，胸

痞腹痛，嘔吐清水，氣逆喘促等症。

【處方】陳佛手二兩 炒枳實 白蘞仁各一兩 青皮 廣陳皮各三兩 西砂仁一兩 沉香二錢 廣木香 粉甘草各一兩

【制法】共研細末，用冷開水泛為丸，以蘞仁、砂仁、沉香、廣木香四味為衣。

【劑量及用法】每服二錢，每日服二次溫開水下，老人酌減。

【禁忌】孕婦、體虛及肺胃發炎者忌服。

沉香消積丸

沈 陽

【功能與主治】消食化痰，行水除脹。主食積氣滯，腹脹水腫，單腹膨脹，大便秘結，胃脘作痛，噎膈吐酸，四肢水腫。

【處方】沉香二兩 二丑一斤 靈脂 牙皂 大黃 香附各八兩

【制法】共碾極細面，醋泛為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

沉香消化丸

呼 和 浩 特

【處方】沉香 茯苓 陳皮 甘草 南星各半斤 枯礬二兩 礞石四兩 黃芩 神曲 枳實 薄荷 牙皂各六兩

【制法】共為細面，水泛小丸。

沉香爛積丸

重 慶

【功能與主治】治飲食不節，氣血凝結臟腑，因而腹痛，或包或塊，或疝痛，或茶積、酒積、肉積、食積、冷積、痞積、乳積等症。

【處方】沉香一兩 制鱉甲 牽牛子各三兩 雷丸一兩五錢 萊菔子二兩 香薷一兩五錢 制大黃三兩 使君子一兩五錢 神曲四兩 蒼朮一兩五錢 查肉四兩 枳實 砂仁 麥芽 蓬朮 三稜 厚朴各三兩 廣木香一兩五錢 香附 草果 檳榔各二兩 巴豆霜二錢 阿魏五錢 硃砂二兩

【制法】除阿魏煎水，巴豆霜臨

時下，硃砂穿衣外，余藥共研細末，阿魏水泛丸，硃砂穿衣。

【劑量及用法】每服二錢，小兒減半，空腹白開水下。

【禁忌】體虛者及孕婦不能服。

沉香至寶丸

重 慶

【功能與主治】消食化積，開胸利膈，治胸腹腰脇脹痛，反胃噎膈，噯氣吞酸，食積氣積，醉飽等症。

【處方】沉香三兩 蒙桂二兩 二七一兩 香附 厚朴 蘞仁 檳榔 山楂各三兩 枳殼 牙皂各二兩 小茴一兩 蒼朮 廣木香 吳茱萸 萊菔子 藿香 梔子各二兩 砂仁二兩 大茴一兩 檀香木 大黃 蓬朮 玄胡索 蘇木 牽牛子 廣橘皮 公丁香 茵陳 郁金 降香 三稜 云苓 良姜 乳香 沒藥 巴豆霜各二兩 雄黃二兩 冰片五錢 薄荷水八錢 麝香六分

【制法】除雄黃穿衣，冰片、薄荷水、麝香另乳外，余藥共研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服十粒，白開水下。

【禁忌】孕婦及體虛者忌服。

開郁老蔻丸

一、沈 陽

【功能與主治】開郁順氣，寬胸利膈，消食健脾，潤燥止痛。主氣滯不舒，胸膈脹滿，飲食停留，胃脘作痛，大便燥結，消化不良。

【處方】紫蔻四錢 貢桂六錢 丁香二錢 當月二錢 山楂 白朮 炙軍各四錢 烏藥三錢 甘草 青皮各二錢 萊菔四錢 陳皮三錢 木香五分 砂仁二錢 莪朮四錢 半夏三錢 三稜四錢 枳殼 草果仁各三錢 檳榔四錢 川芎二錢 神曲四錢 沉香一錢五分

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸白開水送下。

二、吉林（老蔻丸）

【功能與主治】溫寒順氣，消食化濕，通導利便。主脾寒泄瀉——脾

經寒濕，水谷不化，腹疼泄瀉，腸鳴腹冷；肝郁氣滯——暴怒傷肝，肝氣橫逆，胸膈脹悶，咯氣納少；寒疝寒氣走竅，上冲胃脘，下牽舉丸，疼痛欲絕；胃寒嘔吐——胃寒不運，食不消化，朝食暮吐。

【處方】老蔻四兩 貢杜六兩 丁香二兩 當歸二兩 半夏 陳皮各三兩 萊菔四兩 木香二兩 油朴 青皮各四兩 二丑六兩 砂仁二兩 莪朮 三稜各四兩 甘草二兩 枳殼 草果各二兩 檳榔四兩 烏藥三兩 川芎二兩 神曲 山楂 白朮 熟軍各四兩

【制法】共研為細面，煉蜜為丸，每丸二錢一分重。貯瓷瓶內，以免風干失效。

【劑量及用法】每服一丸。本品為治肝胃之要藥，每服一、四丸即收特效，服後緩瀉，胸即暢快。

【禁忌】忌食辛辣。

三、哈爾濱(老蔻丸)

【功能與主治】溫寒順氣，消食化濕。主脾寒泄瀉，胃寒嘔吐，肝郁氣滯，寒疝。

【處方】老蔻四兩 貢杜六兩 丁香二兩 當歸二兩 山楂 白朮 熟軍各四兩 烏藥三兩 甘草二兩 青皮 陳皮各二兩 萊菔四兩 木香二兩 油朴四兩 二丑六兩 砂仁二兩 莪朮四兩 半夏三兩 三稜四兩 枳殼 草果各二兩 檳榔四兩 川芎二兩 神曲四兩

【制法】共為細面，煉蜜為丸，二錢一分重。棉紙包裹，蜡皮封。

【劑量及用法】每服一丸，白水調服。

【禁忌】忌食腥辣。

豆蔻舒肝丸

沈陽

【功能與主治】化食通結，舒郁消積。主怒氣傷肝，氣不舒暢，胸膈脹痛，氣滯氣郁，胸膈痞塞，噯氣吞酸，消化不良。

【處方】豆蔻一兩 白芍 枳實 青皮各八錢 香附五錢 木香一兩 沉香七錢 三稜 莪朮各五錢 厚朴七錢 檳榔五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】生冷油膩。孕婦忌服。

紫蔻丸

撫順

【功能與主治】健胃助消化。主胃弱，食慾不振，食後悶滿，噯氣不舒，顏面黃瘦。或暴飲暴食，呃逆脘悶，惡心嘔吐，嘈雜吞酸，消化不良，氣滯胃痛。

【處方】紅人參二兩 陳皮五錢 云苓一兩 丁香一錢 蘇合一兩五錢 紫蔻 本色沉香各五錢 焦楂三兩 萊菔子 草蔻各一兩 廣木香五錢 香附二兩 藿香五錢 榔片一兩 廣砂仁五錢 神曲 麦芽 枳殼各一兩 甘草五錢 官桂三錢 良姜五錢 青皮一兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。蜡皮封。

【劑量及用法】每服一丸，每日早晚兩次，姜湯送下。

【禁忌】孕婦忌服。忌食生冷硬物。

蔻沉消導丸

(蔻沉百消丸)

沈陽

【功能與主治】理脾健胃，消食降逆。主舒肝調氣，消食除脹，郁氣上逆，食物不消，脹飽不舒，痞塊作痛等症。

【處方】大黃 青皮 陳皮各二兩 川芎 廣砂仁 神曲 靈脂 枳殼 油朴 焦山梔各一兩 香附四兩 紫蔻 蘇沉各一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重，赤金為衣。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】生冷油膩。孕婦忌服。

開郁順氣丸

沈陽

【功能與主治】開郁養血，消食順氣，和胃健脾。主胸膈脹滿，兩脇攻痛，飲食不消，胃脘脹痛，癥瘕痞塊，腸痛腸腫，紅白痢疾。

【處方】柴胡二兩 青皮一兩五

氣滯積聚類

錢 榔片 香附各一兩 木香 枳殼 酒芍 山梔 黃芩 姜夏 川芎 神曲 紫朴 砂仁 廣皮 蒼朮 烏藥 茯苓 蘇沉 當歸 甘草各五錢 桔梗八錢 萊菔三錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，早晚空心白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

紫朴開郁丸

沈陽

【功能與主治】舒肝健胃，理氣解郁，寬中散滿，消食順氣，調經。主心胃疼，肚子疼，打飽咯，吐酸水，肝氣橫逆，胃不消化，膨悶脹飽，兩脇攻痛，食前腹痛，食後胃痛，飲食不消，胃弱不食，胸腹串痛，噯咯反胃，氣裏食積，胃連腹痛。

【處方】檳榔一兩 蔻仁 香附各五錢 廣木香二錢五分 草蔻仁 琥珀 蒼朮各五錢 焦三仙一兩五錢 枳殼二錢五分 廣陳皮 厚朴 桔梗 藿香 青皮 砂仁 炙甘草各五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

朴沉化郁丸

天津

【功能與主治】舒氣化痰，開胃消食。主胸腹脹滿，消化不良，嘔吐惡心，停食停水，氣滯悶郁，胃脘刺痛。

【處方】廣木香 蔻仁 砂仁 青皮(醋炒) 南柴胡 沉香 元胡(醋制) 甘草 公丁香 檀香各七錢 香附(醋制)三兩 厚朴(姜制)一兩五錢 枳殼(麸炒)一兩 片姜黃二錢 廣皮二兩 莪朮(醋制)五錢 良姜五錢 肉桂(去粗皮)三錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，三錢重。蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

木香檳榔丸

一、北京、承德

【功能与主治】調气化滯，利水通便。主停食停水，气滯不舒，胸腹痞滿，二便不利。

【处方】木香 檳榔 枳壳 青皮 橘皮 莪朮各一兩 黃柏 香附(醋炒) 人黃各二兩 黑牽牛四兩 黃連一兩(用吳茱萸五分煎水制)

【制法】共為細粉，芒硝二錢，水化泛小丸，滑石為衣曬亮。

【劑量及用法】每服一錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】老人氣弱及孕婦忌服。

二、天津、蘭州

【功能与主治】舒氣消滯，清理腸胃。主氣滯不舒，胸腹痞滿，停食停水，二便不利，紅白痢疾。

【处方】大黃四兩 炒黑丑 黃芩各二兩 廣木香 檳榔 青皮(醋炒) 當歸 枳壳(麸炒) 陳皮 黃連 香附(醋炒) 黃柏 莪朮(醋制) 三稜(醋制)各一兩

【制法】共為細粉，涼開水泛小丸，三錢重裝袋。

【劑量及用法】每次服一袋，白開水送下。

【禁忌】孕婦及氣虛者勿服。

三、上海

【功能与主治】胸腹痞滿，二便滯滯。

【处方】木香 橘紅各一兩 香附(醋炒制)二兩 青皮(醋炒)一兩 黑丑四兩 檳榔 黃連(吳茱萸炒)各一兩 大黃(酒蒸) 元明粉各三兩 莪朮(煨) 枳壳(麸炒) 三稜各一兩 黃柏(酒炒)三兩

【制法】共研細粉，用元明粉化水泛丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二錢至三錢，溫開水送服。

【禁忌】孕婦忌服。

四、南京

【功能与主治】主積滯痞滿，二便不利，初期痢疾里急后重。

【处方】大黃三兩(另研為衣) 青皮一兩 牽牛四兩(炒透) 香附

三兩 檳榔 廣木香(另研為衣)各一兩 黃柏三兩 黃芩 炒枳壳各一兩 芒硝(水化泛丸)四兩 當歸 黃連(吳茱萸炒，另研為衣) 陳皮(另研為衣) 三稜 蓬朮(醋炒)各一兩

【制法】共研細末，以芒硝化水泛丸，將木香、黃連、陳皮、大黃四味另細末為衣，每錢約一百粒。

【劑量及用法】每服一錢，身體強壯者用二錢，飯後白開水吞服。

【禁忌】孕婦忌服。

五、武漢

【功能与主治】積聚痞滿，二便滯滯。

【处方】木香 檳榔 枳壳(麸炒) 陳皮(去白醋炒) 陳皮(去白，炒) 三稜 莪朮(煨) 黃連(吳茱萸炒)各一兩 黃柏(去粗皮，酒炒) 香附(醋炒) 大黃(酒蒸)各三兩 牽牛子(炒)四兩 朴消一兩。

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少於三十粒。

【劑量及用法】每服一錢至三錢，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

六、福州

【功能与主治】治實積，疎導三焦，快氣化痰，消食寬中。

【处方】木香 檳榔 青皮(醋炒) 陳皮 枳壳(炒) 黃柏(酒炒) 川連(吳茱萸炒) 三稜 莪朮(並醋煮)各五錢 人黃(酒浸)一兩 香附 牽牛各二兩

【制法】共研細末，芒硝水泛丸。

七、杭州

【功能与主治】運氣化痰，消食治痢。主積滯不化，胸腹痞滿，二便不暢或實積泄瀉，腹痛下痢，里急后重等症。

【处方】廣木香 檳榔 枳壳 橘紅 三稜 莪朮 川黃連各二兩 川黃柏 制香附 大黃各六兩 黑白丹各四兩 小青皮二兩

【制法】共研細末，用元明粉泡水洗丸。

【劑量及用法】每服三錢。淡姜

湯送下。

八、南昌

【功能与主治】一切積滯，胸脇腹脇痞滿，大小便不通及紅白痢疾。

【处方】木香 花檳榔 醋青皮 炒枳壳 黃連(吳茱萸水炒) 蓬朮(醋炒) 陳皮(去白，炒)各二兩 香附(醋炒或酒炒) 黃柏(酒炒) 大黃(酒蒸)各三兩 黑牽牛四兩

【制法】共研細末，朴硝二兩泡水洗丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每日服二次，每服一錢至一錢五分，空腹時生薑湯送下。

【備考】非經醫師處方不得使用。

九、沙市

【功能与主治】化濕熱積滯，治赤白痢疾，里急后重，氣滯不通等症。

【处方】黃連 黃柏 大黃各十兩 三稜 莪朮 廣木香 檳榔各五兩 香附十兩 青皮 川厚朴 枳壳各五兩 二丑十兩 廣陳皮五兩

【制法】共研細末(廣木香除外)，用冷開水泛為丸，另將廣木香研末為衣。

【劑量及用法】成人量每次服二錢，每日服二次，溫開水下；小孩老人酌減。

【禁忌】孕婦及體虛者忌服。

十、重慶

【功能与主治】治一切氣滯，心胸腹脇痞滿，二便滯滯。

【处方】同北京。

【制法】共研細末，另用芒硝二兩泡水洗丸，紙盒包裝。

【劑量及用法】二錢至四錢。

十一、西安

【功能与主治】胸腹積滯，痞滿結痛，大小便不通或瀉泄下痢，里急后重，食癥實積等症。

【处方】同福州。

【制法】水泛為丸。

【劑量及用法】每次三錢，一日二次，姜湯送服。

【禁忌】孕婦及腸胃虛寒者忌

服。

十二、大同

【功能与主治】导滞清肺。主便秘、痢疾。

【处方】大黄 檳榔 黄柏 青皮各二十兩 厚朴 三稜 神麴 当归 香附各十六兩 枳壳 莪朮 黄芩 木香各三十二兩 砂仁四兩 陈皮 山楂各四十八兩 黑丑六十四兩

【制法】共轧細面，水为小丸。

【剂量及用法】每服二錢。

十三、禹县

【功能与主治】气滞不通，胸腹胀痛，二便澹滯，紅白下痢。

【处方】同北京，惟黑牽牛用黑白丑。

【制法】共为細面，小酌水和丸。

【剂量及用法】每服二錢，白开水送下。十五岁服一錢。

【禁忌】孕妇忌用。

【备考】有效期三年。

十四、济南

【功能与主治】积聚痞满，二便澹滯。

【处方】木香 檳榔 枳壳(麸炒) 青皮(醋炒) 陈皮 莪朮(醋煮) 黄連(吳茱炒)各一兩 黄柏(去粗皮酒炒) 香附(醋炒) 人黄(酒蒸)各二兩 牽牛四兩(黑白各半)

【制法】共为細末，朴硝三兩泡水和丸，如綠豆大，松打。

【剂量及用法】每服一錢至二錢，白开水送。

【禁忌】生冷油腻辛辣等物。孕妇及脾胃虛弱者忌服。

十五、呼和浩特

【处方】木香 檳榔 枳壳 青皮 三稜 莪朮 条芩 当归各二斤 香附 大黄 黑丑各四斤 黄柏二斤

【制法】共为細面，水泛小丸。

附参考古方

【来源】1. 衛生宝鑑。

【功能与主治】疏导三焦，宽胸膈，破痰逐飲，快气消食，通潤大

腸。

【处方】木香 檳榔 杏仁(去皮尖，麸炒) 枳壳(麸炒) 青皮(去白)各一兩 半夏 皂角(去皮，酥炙) 郁李仁(去皮)各二兩

【制法】上八味为末，别用皂角四兩，用漿水一碗揉揉熬膏，更入熟蜜少許，丸如桐子大。

【剂量及用法】每服五十九，温淡生姜湯送下，食后服。

2. 沈氏尊生書：杂病源流犀燭。

【功能与主治】食积。

【处方】木香 檳榔 白朮 枳实 防皮 香附

枳实导滞丸

一、上海

【功能与主治】脾胃湿热，食不运化，积滯泄瀉。

【处方】大黄煨二兩 黄芩(酒炒)一兩五錢 茯苓九錢 白朮(炒)九錢 黄連(姜汁炒)一兩五錢 澤瀉(炒)六錢 枳实(炒)六錢 神麴(炒焦)各一兩五錢

【制法】共研細粉，水泛为丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每服三錢，温开水送服。

二、南京

【功能与主治】消滯。主湿热郁結，食滯不化，胸膈痞悶，腹脹硬痛，便秘尿赤。

【处方】生大黄一兩(另研为衣) 酒炒黄芩二錢 炒枳实五錢 白茯苓二錢 六神曲五錢 姜汁炒黄連(另研为衣) 炒白朮 炒澤瀉各三錢

【制法】上药除另研外，余药共研細末，用沸水泛丸，每錢約做一百粒，以大黄、黄連另研之末为衣。

【剂量及用法】每服二錢至三錢，一日一次，空腹时用开水吞服，小兒減半。

三、武汉

【功能与主治】胸膈腹痛，积滯泄瀉。

【处方】枳实(麸炒) 白朮(土炒)各五錢 黄芩 黄連(姜汁炒)各三錢 澤瀉二錢 陈麴(炒)五錢 西大黄(煨)一兩

气滞积聚类

【制法】取上药进行干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于三十粒。

【剂量及用法】每服三錢，开水送下。

【禁忌】孕妇慎用。或遵医嘱。

四、杭州

【功能与主治】治湿热内阻，脾胃受困，食不运化，胸膈腹痛，积滯泄瀉，下痢后重等症。

【处方】、【制法】 【剂量及用法】同上海。

附参考古方

【来源】内外伤辨(东垣十書)。

【功能与主治】伤湿热之物，不得施化而作痞满，悶乱不安。

【处方】大黄一兩 枳实(麸炒，去穢) 神麴(炒)各五錢 茯苓(去皮) 黄芩(去腐) 黄連(揀淨) 白朮各三錢 澤瀉二錢

【制法】上件为細末，湯浸蒸餅为丸，如梧子大。

【剂量及用法】每服五十九至七十九，温开水送下，食远，量虛实加減服之。

木香分气丸

一、天津

【功能与主治】順气化痰。主閃暖岔气，膨悶腹飽，胃痛气悶，消化不良。

【处方】广木香一兩五錢 莪朮(醋制)二兩 枳实(麸炒) 公丁香 黑郁金各一兩 香薷一兩五錢 檀香一兩 豆蔻二兩 广皮 藿香 甘草 甘松各一兩五錢 砂仁二兩

【制法】共为細粉，凉开水泛小丸。三錢重裝袋。

【剂量及用法】每次服一袋，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

二、沈阳

【功能与主治】健胃消脹。主脾胃虛弱，胸膈痞悶，心腹脹滿，兩脇膨脹，嘈杂干嘔，飲食不化等症。

【处方】木香 檳榔 青皮 莪朮 干姜 当归 姜黃 延胡索 白朮 枳壳 京三稜 赤茯苓 陈皮 肉豆蔻 丁香 蔻仁各等分

【制法】共碾極細面，水泛为小

丸。

【劑量及用法】每服二錢，姜湯送下。

【禁忌】忌食、馬齒莧。

三、撫 順

【處方】木香 檀香 公丁 廣皮 檳榔各一兩半 香附 片姜 甘松各二兩 青皮二兩 藿香 山楂各六兩 文朮二兩 枳殼二兩 炙草一兩半 砂仁二兩。

【制法】共為細面，水泛小丸。

四、哈 爾 濱

【功能與主治】順氣溫胃，平肝化滯。主胃脘痛及肝氣鬱滯。如胃脘中寒，食不消化，噎氣，嘈雜脹悶，泛酸酸苦，食少體倦。或暴怒傷肝，肝氣橫逆，胸脇痛脹，臍腹串痛。

【處方】茅朮二兩 青皮 莪朮 砂仁 木香 丁香各八錢 陳皮三錢 藿香 厚朴 甘松各二錢 薏仁六錢

【制法】共碾為細面，水泛為小丸，如梧桐子大。每二錢為一付，裝入印制之紙袋內。

【劑量及用法】每服一付（二錢），空腹白開水服。

【禁忌】忌食辛辣生冷。

五、呼 和 浩 特

【處方】丁香十兩二錢 木香一斤 枳實二斤 檀香 甘草各一斤 陳皮 砂仁 青皮 川厚朴各二斤 甘松 莪朮各二斤半 焦楂 藿香各二斤

【制法】用薏仁作母，水泛小丸。

中滿分消丸

一、上 海

【功能與主治】中滿熱脹，二便不利。

【處方】黨參一錢 枳實（炒）五錢 茯苓二錢 黃連（姜汁炒）九錢 白朮（炒）一錢 厚朴（制）一兩 干姜二錢 豬苓一錢 澤瀉一錢 甘草（炙）一錢 黃芩（炒）五錢 麥冬五錢

【制法】共研細粉，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二錢，溫開水送服。

二、杭 州

【功能與主治】祛濕消脹。主

濕熱不化，中滿不運，氣、水、血臌，各種臌脹之症。

【處方】制川朴三兩 枳實 炒黃連 炒黃芩 姜半夏 廣陳皮 炒知母各一兩五錢 澤瀉一兩 茯苓 砂仁 干姜各六錢 片姜黃 黨參 炒冬朮 炙甘草 豬苓各三錢

【制法】共研細末，生薑汁和米糊為丸。

【劑量及用法】每服二至三錢。早晚用燈芯湯送下。

【禁忌】忌食面、鹽。

三、大 同

【功能與主治】脹滿腹膨，小便不通。

【處方】白朮 澤瀉 厚朴 赤苓 白朮 豬苓 陳皮 蒼朮 枳殼 青皮 黃芩各四斤 干姜 黃連 廣木香各一斤

【制法】共為細面，水泛小丸。

【劑量及用法】每服二錢。

四、濟 南

【功能與主治】氣滯停水，胸腹脹悶。

【處方】、【制法】、【劑量及用法】詳前。

附參考古方

1. 蘭室秘藏。

【功能與主治】中滿熱脹，臌脹，氣脹，水脹（非寒脹類）。

【處方】白朮 人參 炙甘草 豬苓（去黑皮） 姜黃各一錢 白茯苓（去皮） 干生薑 砂仁各二錢 澤瀉 橘皮各三錢 知母（炒）四錢 黃芩（去腐炒，夏用）一兩二錢 黃連（淨炒） 半夏（湯洗七次） 枳實（炒）各五錢 厚朴（姜制）一兩

【制法】上除茯苓、澤瀉、生薑外，共為極細末，入上三味和勻，湯浸餅為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服一百丸，焙熱白湯下，食遠服，臌病人大小加減。

2. 幼科證治存綱。

【功能與主治】腹脹。

【處方】黃連 枳實 厚朴各五錢 姜黃 姜黃 豬苓 砂仁 澤瀉 茯苓各三分 白朮 白朮各一分 干姜四分 黃芩一兩二錢 甘

草一分

【制法】上為細末，蒸餅為丸，如黍米大。

【劑量及用法】每服三十丸，溫酒送下。

雞肫化滯丸

沈 陽

【功能與主治】殺虫健胃，消痞化食。主開胃健脾，消滯寬中，化積殺虫，小兒五疳瘦弱，過食油膩生冷，停滯不化或吐或瀉或疼或脹，癥積腹疼等症。

【處方】炒白朮 陳皮 上翹各四兩 茯苓 枳殼 枯梗 香附 炒神曲 京三稜 莪朮各二兩 炒麥芽 厚朴 炙甘草 雞內金各二兩

【制法】共碾極細面，水泛為小丸。

【劑量及用法】每服一錢，白開水送下。

【禁忌】腥冷硬物。

化食三消丸

沙 市

【功能與主治】治飲食停滯，胸膈痞滿，噯氣吞酸，腹脹便秘等症。

【處方】炒麥芽 炒六神各十斤 山楂炭 制香附各五斤 黑白土二斤 粉甘草一斤

【制法】共研細末，以冷開水疊為丸。

【劑量及用法】成人量每次服三錢，空腹溫開水下，每日服二次；小兒老人酌減。

消痞化積丸

沈 陽

【功能與主治】通腸胃，助消化，消痞脹。主小兒疳積，乳食停滯，瀉痢頻繁，肚腹脹痛，嘔逆不食，面黃肌瘦等症。

【處方】枳實 姜黃 人參 白朮 麥芽 半夏 紫朴 云茯苓各三兩 炙甘草 干姜各二兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸七分重。

【劑量及用法】每服一丸，一日二次，開水送下。

【禁忌】生冷硬物。

百顺丸

武汉

【功能与主治】饮食积聚，人便不通。

【处方】大黄 牙皂各一兩

【制法】取上药进行干燥，混合碾细，照净粉量加生蜜45—50%，送成小丸，每钱不得少于二十五粒。

【剂量及用法】每服一钱至二钱。

【禁忌】孕妇忌服。

百消丸

一、兰州

【功能与主治】消积消胀利水，肉积食积，水积气积，及消化不良等症。

【处方】二丑二斤 五灵脂八兩 香附子 大黄各一斤半

【制法】共研细末，水打小丸。

【剂量及用法】每服三钱，开水送下。每日二次。

二、禹县

【功能与主治】消食消痰，消痞消积。主治饮食过度，不能运化，嘔吐嘈杂胸膈胀满。

【处方】大黃 五靈脂 醋香附 炒黑白丑各一斤 醋三稜 檳榔 醋莪朮 牙皂各八兩 炒山查 炒神曲各四兩 甘草五兩 炒麦芽 炒枳实 川厚朴各四兩

【制法】共为细面，水丸。

【剂量及用法】每服二钱，开水送下。十岁每服一钱。

【禁忌】虚弱及孕妇忌用。

【备考】有效期二年。

朴瀉丸

禹县

【功能与主治】肉积食积，胸膈胀满，寒积块积，积滞作疼。

【处方】醋香附二十兩 丁香三兩 菖参 广木香各二兩 檳榔十兩 甘草二兩 醋青皮 巴豆霜各五兩 陈皮 青礞石各四兩 西大黃十兩 制鹽礞石一兩

【制法】小丸，礞石为衣，如梧桐

子大。

【剂量及用法】每服五粒，白开水送下。小兒二岁服二粒。

【禁忌】孕妇、久病虚弱及老人忌用。

【备考】有效期間一年。

瀉积丸

禹县

【功能与主治】食积寒积，气血积聚，积滞腹疼，大便闭结。

【处方】陈皮三錢 丁香 三稜 蓬莪朮 葶藶子 川芎 沒药各二錢 广木香三錢 巴豆霜四錢 牙皂一錢

【制法】共碾为细面，水送丸，如绿豆大。

【剂量及用法】每服十五丸，凉开水送下，一岁至三岁服三丸，四岁至六岁服六丸。

【禁忌】孕妇及虚弱者忌用。

【备考】有效期間一年。

爛积丸

一、北京

【功能与主治】消积化滞杀虫。主食物积聚，胸满腹痛。

【处方】三稜 檳榔各四十八兩 青皮 莪朮各九十六兩 橘皮 枳实 山楂(炒)各一百四十四兩 黑牽牛(炒) 大黃各一百四十兩

【制法】共为细粉，水泛小丸，红麴为衣(每十六兩小丸上红麴二兩)。

【剂量及用法】每服二钱，小兒減半，日服二次，温开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

二、天津

【功能与主治】清理腸胃，消积化滞。主停食停水，消化不良，胸膈胀满，肚腹疼痛，恶心倒饱，大便不通，以及食积奶积，疳积痞积。

【处方】大黃 炒三丑 三稜(醋制) 枳实(麸炒) 莪朮(醋制)各一斤

【制法】共为细粉，凉开水泛小丸，每斤丸药用红麴面二兩上衣，三钱重装袋。

【剂量及用法】每次服一袋，小兒酌減，白开水送下。

【禁忌】孕妇及体虚者勿服。

三、兰州

【功能与主治】清理腸胃，消积化滞。主消化不良，胸膈胀满，肚腹疼痛，恶心倒饱，大便不通。

【处方】生軍 二丑 三稜 枳实 莪朮 山楂 神曲各一斤

【制法】共研细面，水泛小丸，红麴为衣。

【剂量及用法】每次二钱，小兒減半，白开水送下。

【禁忌】孕妇及虚症忌服。

四、大同

【功能与主治】消积健脾。

【处方】二丑八兩 檳榔 大黃 三稜 莪朮 五灵脂 枳实 厚朴 麦芽 山楂 神曲 干姜各三兩 广木香五錢

【制法】水泛小丸。

【剂量及用法】每服二钱。

五、禹县

【功能与主治】諸般积聚，食积不消，胸满腹胀，大便燥结。

【处方】大黃 黑白丑 熟大黃 檳榔 青皮 三稜 莪朮 甘草 山楂 麦芽 神曲 黑梔子 白朮 当归各半斤

【制法】共碾细面，水泛为丸，红麴为衣。

【剂量及用法】每服二钱，白开水送下，十岁每服一钱。

【禁忌】虚弱症及孕妇忌用。

【备考】有效期二年。

六、沈阳

【功能与主治】消食化积。主胸膈胀满，心腹疼痛，嘔吐吞酸，兩脇攻痛，癥瘕积聚，停水蓄水等症。

【处方】生大黃 熟大黃 京三稜 蓬莪朮 六神曲 山楂片各二錢 黑牽牛八兩

【制法】共碾極細面，水泛小丸，红麴粉为衣。

【剂量及用法】每服二钱，空心时白开水送下。

【禁忌】孕妇及身体衰弱者忌服。

七、撫順(六聚爛积丸)

【功能与主治】消积，化聚，攻

下。主五积六聚，气血痰食，凝积成块，脘腹胀痛，坚硬拒按，食噎气塞，噎气吐酸，二便闭结，饮食不下。

【处方】炙军一斤 牛军八两 山楂 枳实各四两 莪朮 三稜各二斤 神曲四两 二丑八两

【制法】共为细面，水泛小丸。

【剂量及用法】每服二钱，白水送下。

【禁忌】虚寒者及孕妇勿服，忌食生冷硬物。

八、吉林(六积丸、六聚烂积丸)

【功能与主治】消食化滞，攻泄宿积，利大便，开脾郁。主五积六聚，胸中痞痛，胃痛腹胀，食噎气塞，咯气吞酸，胃积嘈杂等症。

【处方】二丑 三稜 莪朮 大黄 檳榔各二两六钱七分

【制法】共为极细面，水泛为小丸，如梧桐子大，红曲为衣。

【剂量及用法】每服二钱，每日服二次，早晚空心服之；七岁至十二岁，每服一钱；四岁至六岁，每服五分；遇岁至三岁者，每服三分，开白水送下。

九、哈尔滨(神效烂积丸、六聚烂积丸)

【功能与主治】消积散聚，攻泻宿滞。主五积六聚，气血痰食，凝积成块，或聚或散，脘腹胀痛，坚硬拒按，食噎气塞，咯气吞酸，二便闭结，饮食不下。

【处方】同吉林，分量各用四两。

【制法】共碾为细面，水泛小丸，如梧桐子大。红曲为衣。

【剂量及用法】每服一付(二钱)，空腹白水服。

【禁忌】虚寒之人及孕妇禁服。忌食辛辣生冷。

【备考】每二钱为一付，装入印制之纸袋内封之。

十、承德

【功能与主治】一切积滞，胸腹胀满。

【处方】同北京。

【制法】共为细粉，水泛小丸，红曲、滑石各半为衣，闾亮。每两分做二百粒。

【剂量及用法】每服二十粒，日服二次，温开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

诚修消滞丸

呼和浩特

【处方】归尾 陈皮 枳实 生栀子 川朴各六两 藿香 元胡 牛军 神曲 三稜各三两 莪朮六两 茜芩 熟军各二两 麦芽 枳壳 砂仁各六两 木香一两 香附六两 豆蔻一两五钱 沉香一两 炙草二两

【制法】共为细面，水泛小丸。

五香丸

一、南京

【功能与主治】主痰积食积，气瘕痞聚攻疼及痢疾初起。

【处方】五灵脂 制香附各一斤 黑丑白丑(炒研取净头木)各二两

【制法】上药以一半用微火炒熟，一半生用，共研细末，醋煮米糊为丸，每钱约二十粒。

【剂量及用法】每服一钱，临卧时姜汤送下，小儿减半。

【禁忌】孕妇忌服，虚人慎用。

二、武汉

【功能与主治】食积痞满疼痛，胸腹膨胀。亦治痢疾初起。

【处方】五灵脂 制香附各一斤(去毛) 黑丑木(生熟各半) 白丑末(生熟各半)各二两

【制法】取上药进行干燥，混合碾细，用淨水送成小丸，每钱不得少于二十粒。

【剂量及用法】每服二钱至三钱，日服二、三次，小儿减半。姜汤送下。

【禁忌】孕妇忌用。

三、南昌

【功能与主治】食积，痰积，气滞，血滞，痞闷胀满叠胀及癫狂等症。

【处方】、【制法】、【禁忌】同南京。

【剂量及用法】每服一钱，姜汤送下，早晨及就床各服一次。小儿视年龄及病情酌减服。非经医师处

方不得使用。

四、西安

【功能与主治】主胃脘疼痛，伤食积水，气血凝滞，大便闭结等症。

【处方】香附二斤 二丑四斤 五灵脂二斤

【制法】共为细末，醋糊小丸。

【剂量及用法】每服三钱，开水送下；小儿酌减。

【禁忌】体质虚弱及孕妇勿服。

五、禹县

【功能与主治】胸腹胀满，食积痰积，气血痞块，积滞瀉痢。

【处方】同南京，分量减半。

【制法】共为细面，醋水为丸。

【剂量及用法】每服一钱，姜汤送下。

【禁忌】孕妇及体弱忌用。

【备考】有效期二年。

六、济南

【功能与主治】气滞胀满，积聚疼痛。

【处方】制香附十六两 五灵脂六两 牵牛四两

【制法】共为细粉，水泛为丸，如绿豆大。

【剂量及用法】每服一钱，姜汤送下。

【禁忌】体弱者及孕妇忌服。

七、沈阳(五香百消丸)

【功能与主治】消痞胀，通大便。主腹中积滞，疼痛胀满，饮食不消，二便燥结。

【处方】五灵脂 香附 牵牛各二两

【制法】共碾极细面，神曲糊为小丸。

【剂量及用法】每服一钱，白水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

八、吉林(五香百消丸)

【功能与主治】消积，开郁，利便。主痰积食积气瘕，胸膈作胀，痞聚攻疼，痢疾脾寒等症。

【处方】香附五两四钱 黑丑一两二钱四分 灵脂二两七分 白丑一两三钱四分

【制法】共研細面，水泛为小丸。除包裝外，磁罐盛之，以免潮湿、腐蝕。

【剂量及用法】每服二錢，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

九、呼和浩特

【处方】生香附 炒香附 生灵脂 炒灵脂各八兩 黑丑 神曲各四兩

【制法】共为細面，水泛小丸。

【备考】生香附 炒香附 生灵脂 炒灵脂或用各半量。

万应山楂丸

呼 和 浩 特

【处方】生药 山楂 黑丑各十五斤 黄芩 滑石各七斤半

【制法】水泛小丸。

山楂内消丸

一、天 津

【功能与主治】开胃化滞消食。主倒饱吐酸，胸满气胀，痞块癥瘕，大便燥结。

【处方】山楂 炒麦芽 五灵脂(醋炒)各二兩 陈皮 香附(醋制)各四兩 制半夏 青皮(醋炒) 厚朴(姜制)各二兩 砂仁一兩五錢 莪朮(醋制) 三稜(醋制)各一兩 炒莱菔子一兩

【制法】共为細粉，凉开水泛小丸，三錢重，裝袋。

【剂量与用法】每次服一袋，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

二、蘭 州

【功能与主治】开胃消食化痰。主倒饱吐酸，胸满气胀，肚腹疼痛，痞块癥瘕，大便不通。

【处方】神曲 麦芽 灵脂各二兩 陈皮 香附各四兩 莱菔子 半夏 青皮 厚朴各二兩 三稜 莪朮各一兩 砂仁一兩半 山楂三兩

【制法】共为細面，水打小丸。

【剂量及用法】每服三錢，白开水送下。

【禁忌】孕妇勿服。

三、济 南

【功能与主治】食水停滯，胸悶腹痛，积聚痞塊，大便秘結。

【处方】同天津。

【制法】共为細粉，水泛为丸。

【剂量及用法】每服三錢，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

四、沈 陽

【功能与主治】補助腸胃消化。主食积气滯痰滯，胃痛嘔吐，水臌气臌，常服有效。

【处方】炒山楂三兩 广皮 醋香附各二兩 炒枳实 姜半夏 檳榔 厚朴 炒莱菔 六神曲各一兩 砂仁八兩 京三稜五錢 炒麦芽三兩

【制法】共碾極細面，水泛小丸。

【剂量及用法】每服二錢，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

五、撫 順

【处方】山楂一斤 陈皮 麦芽 枳实各八兩 蒼朮 炙草各一斤 川朴一兩 六神八兩。

【制法】共为細面，水泛小丸。

六、吉林(内消丸)

【功能与主治】消食化积，除胀去满，健胃扶脾，增进飲食。主气积痰积，食积茶积，脾虚胃弱，胸中胀满，消化不良，反胃恶心等症。

【处方】楂片 麦芽 灵脂各三兩 香附 陈皮各二兩 神曲 青皮 莱菔 厚朴 半夏 檳榔 枳实各一兩 砂仁八錢 三稜五錢

【制法】共研細木，水泛为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】大人每服二錢一分，空腹心服之，白开水送下。十四岁至十五岁，每服錢半；十岁至十五岁，每服七分。

七、哈尔滨(内消丸)

【功能与主治】消食化积。主消化不良，脾胃失运，食积不化，胸脘胀满，脾腹膨胀，嘈杂噁心，滞泄痢疾，以及食积茶积，酒积果积，痰积气积，痞块中攻，微背疼痛等症。

【处方】同吉林。

气 滯 积 聚 类

【制法】共碾为細面，水泛为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服一付(二錢)白开水空腹服。

【禁忌】忌食生冷，孕妇忌服。

【备考】每二錢为一付，裝入印制紙袋內封之。

山 楂 丸

一、北京(大山楂丸)

【功能与主治】健胃消导。主消化不良，胸膈满悶。

【处方】山楂二百二十兩 麦芽 六神曲各四十八兩 白糖一百九十二兩

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，重二錢。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

二、昆 明

【功能与主治】飲食停滯，噯气吞酸。

【处方】焦查八兩 厚朴 广陈皮各二兩 枳实六兩 麦芽 神曲 法夏 香附 蒼朮各二兩 檳榔二兩 澤瀉二兩 甘草二兩 茯苓二兩 黄芩二兩 草果 萊菔子各二兩

【制法】水營为丸。

【剂量及用法】每服二錢半，幼童減半。用开水服。

【禁忌】久瀉忌服。

三、西 安

【功能与主治】能助消化，增加胃內酵素。主治肉积、食积、腹脹痛等症。

【处方】山楂肉适量

【制法】蜜制为丸。

【剂量及用法】每次一至三錢开水送下。

【禁忌】孕妇及腸胃衰弱人忌用。

四、蘭州(大山楂丸)

【功能与主治】消化不良。食积、肉积等症。

【处方】东山楂一斤

【制法】研極細面，煉蜜为丸，每丸重二錢。

【剂量及用法】开水送下，每服

內 科
一丸。

五、大同

【功能与主治】健脾消食和胃。

【处方】山楂六斤四兩 山藥六兩 糯米 芡實 神曲 麦芽各四兩 薏米六兩 糯米二斤 白糖五斤

【制法】共研細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】早晚每服二錢開水送下。

六、禹 县

【功能与主治】消食消積，潤腸清火，主飲食不化，胃疼嘔吐。

【处方】川厚朴四兩 白芍六兩 陳皮八兩 萊菔子 山楂各十二兩 麥芽六兩 連翹 砂仁各四兩 神曲六兩 生大黃十二兩 枳殼六兩 半夏四兩 白茯苓六兩

【制法】水為丸。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下，小兒每服一錢。

【禁忌】虛弱症及孕婦忌用。

【備考】有效期二年。

七、濟 南

【功能与主治】消化不良，胸膈滿悶。

【处方】山楂三百二十兩 麥芽四十八兩 六神曲四十八兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重三錢。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

八、沈陽(大山楂丸)

【功能与主治】消食健胃，利水止瀉。主開郁理氣，消酒化食，一切積聚痞塊，嘔吐惡心，噎膈反胃。

【处方】山楂肉一斤 生芡實 生山藥各四兩 茯苓 麥芽各二兩

【制法】共碾極細面，加蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，開水送下。

【禁忌】生冷硬物。

九、吉林(大山楂丸)

【功能与主治】舒暢肝氣，健胃強脾，消食利氣，化滯除濕。主胃虛脾虛，胸悶不食，嘈雜惡心，四肢困倦，氣逆不舒，兒童發育不全，身體

消瘦無力。

【处方】山楂五兩二錢四分 苡米 糯米 山藥各二兩六錢七分 白糖十二斤 茯苓 蓮肉各一兩三錢四分。

【制法】共為細末，煉蜜同白糖調合為丸，每丸二錢一分重，用蠟紙包之。

【劑量及用法】大人每服二丸，八歲至十五歲每服一丸，十五歲至三歲，每服半丸，白開水下，每日服二次，早晚空心用之。

十、哈爾濱(大山楂丸)

【功能与主治】健脾胃，助消化，主脾胃虛弱，食積不消，完谷不化，膨悶腹飽，嘈雜噁心，食後困倦，消化不良。

【处方】山楂八兩 薏米 糯米 山藥(炒)各四兩 白糖一斤 茯苓二兩 蓮肉(炒)各二兩

【制法】共碾細面，煉蜜為丸二錢一分重。

【劑量及用法】每服一丸，早午晚各服一次。

【禁忌】生冷油膩辛辣物品均不可食。

【備考】瓷罇存貯。

十一、承 德

【功能与主治】飲食積滯，胸腹脹滿，大便不通。

【处方】、【制法】、【劑量及用法】同北京。

十二、呼 和 浩 特

(大山楂丸)

【处方】山楂一斤 神曲 麥芽各半斤

【制法】加白糖二兩，蜜丸二錢五分重。

四 消 丸

一、北 京

【功能与主治】消積理氣，行水止痛。主氣滯停水，胃脘作痛。

【处方】香附(醋炒) 五靈脂 豬牙皂 黑白牽牛(炒)各二兩

【制法】共為細粉，水泛小丸。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天 津 (檳榔四消丸)

【功能与主治】清理腸胃，化滯消食，利水消脹。主胸腹脹滿，不思飲食，倒飽嘈雜，嘔吐酸水，停食停水，消化不良。

【处方】大黃 炒黑丑各八斤 檳榔 香附(醋制) 五靈脂(醋炒)各四斤 牙皂一斤

【制法】共為細粉，水丸——涼開水泛小丸，三錢重裝袋；蜜丸——煉蜜為丸，三錢重，蠟皮或蠟紙筒封固。

【劑量及用法】水丸每次服一袋；蜜丸每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦及氣虛者忌服。

三、武 漢

【功能与主治】胸腹脹滿，便秘痰阻，咽喉腫痛，風虫牙痛及風癰諸症。

【处方】同北京。

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用淨水迭成小丸，每錢不得少于三十粒。

【劑量及用法】每服二錢至四錢。

【禁忌】孕婦忌服。

四、蘭州(檳榔四消丸)

【功能与主治】清理腸胃之積滯，消食，止痛，有杀虫之作用。主胸腹脹滿，不思飲食，倒飽嘈雜，嘔逆吐酸，酒食過量而引起之消化不良，腹中虫等症。

【处方】同天津。

【制法】共研細末，水打小丸。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】孕婦和氣虛人忌服。

五、大同(調中四消丸)

【功能与主治】胸膈滿悶，調中健脾。

【处方】蒼朮 神曲 香附 山楂 白朮 枳殼 陳皮 半夏各四兩 川大黃二兩二錢 萊菔子 麥芽各四兩 檳榔二兩二錢

【制法】共為細面，水泛為小丸。

【劑量及用法】每服二錢。

六、禹 县

【功能与主治】消酒，消气，消痰，消食。

【处方】生大黄一斤 黑白丑二斤 五灵脂二斤 香附二斤

【制法】共为细面，水泛为丸。

【剂量及用法】每服二钱，白开水送下，十岁小兒一钱。

【禁忌】孕妇忌用。

【备考】有效期二年。

七、济 南

【功能与主治】胸膈满闷，食滞痰多，胃脘疼痛，大便秘结。

【处方】酒大黄十二两 黑丑（半生半炒） 香附（醋炒） 白丑（半生半炒） 檳榔 五灵脂各八两 牙皂（炒）二两

【制法】共为细粉，醋泛为小丸，绿豆大。

【剂量及用法】每服五分至一钱，白开水送。

【禁忌】生冷油腻辛辣等物。孕妇並体弱及有外感者均忌服。

八、沈陽（調中四消丸）

【功能与主治】消食理气，調和胃腸。主积滞脹满，停食腹痛。

【处方】香附 灵脂 黑牵牛 白牵牛各一斤 牙皂四两

【制法】共碾極細面，水泛为小丸。

【剂量及用法】每服二钱，姜湯送下。

【禁忌】生冷油腻。

九、撫順（調中四消丸）

【功能与主治】瀉下，調整胃腸。主食积停滯，胃痛脘悶，噯气不舒，大便秘结，吞酸嘈杂，心胃脹痛，气滞呃逆，食入作噎。

【处方】香附四斤 二丑十六斤 灵脂四斤 大黄八斤 牙皂二斤 檳榔二斤

【制法】共为细面，朴硝水泛小丸。

【剂量及用法】每服一钱至二钱，白开水送下。

【禁忌】忌食生冷粘硬之物。孕妇忌服。

十、吉林（調中四消丸）

【功能与主治】消食开郁順气，通大便，瀉积滯。主食积气聚，心腹膨脹，胃脘疼痛，大便秘结等症。

【处方】二丑各八两 野軍六两 香附 灵脂各四两 牙皂 檳榔各二两

【制法】共碾細面，水泛为小丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每日早晚空心服，每服二钱，白水送下。十二岁至十六岁每服一钱四分，七岁至十一岁可服七分。

【禁忌】服后忌食生冷。孕妇忌用。

【备考】除包裝外，磁坛貯之，勿使風干。

十一、哈尔滨（調中四消丸）

【功能与主治】消食順气。主食积气聚。

【处方】二丑各八两 野軍六两 香附 灵脂各四两 牙皂 檳榔各二两

【制法】共碾为細面，水泛为小丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服一付（二钱），白水送下。

【禁忌】忌食生冷。孕妇勿服。

十二、承 德（調中四消丸）

【处方】大黄十二斤八两 黄芩 枳实 檳榔 青皮 萊菔子 枳壳各二斤八两 黑丑 莪朮各五斤 陈皮 山楂各十斤 梔子七斤八两 香附（醋炒）六斤四两

【制法】共为細面，水泛小丸。

十三、呼和浩特

【处方】黑丑 白丑 灵脂 香附 熟軍各二斤 牙皂（另）六两五钱

【制法】水泛小丸。

左 金 丸

一、北 京

【功能与主治】健胃解郁止痛。主兩脇疼痛及胃脘刺痛，多發急怒。

【处方】黃連六兩 吳茱萸一兩（鹽水泡炒）

【制法】共为細粉，水泛小丸。

【剂量及用法】每服二钱，日服二次，溫开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

二、天 津（二味左金丸）

【功能与主治】清热健胃，解郁止痛。主肝郁不舒，兩脇疼痛，胃脘刺痛，嘔吐酸水。

【处方】黃連六斤 吳萸（甘草水制）一斤

【制法】共为細粉，凉开水泛小丸，三钱重裝袋。

【剂量及用法】每次服一袋，白开水送下。

三、上 海

【功能与主治】嘈杂，泛酸，嘔噎，脘痛。

【处方】同北京。

【制法】共研細粉，水泛为丸，如高粱粟子大。

【剂量及用法】每服五分至一钱半，溫开水送服。

【禁忌】忌生冷食物。

四、南 京

【功能与主治】主肝旺火盛，气逆脇疼，腹疼，吞酸，嘔吐，痢疾等症。

【处方】同北京。

【制法】上药共研細末，（酌留黃連末为衣）水泛丸，每钱約二百粒。

【剂量及用法】每服五分至一钱，开水吞服。

五、武 汉

【功能与主治】胸脇作痛，吞酸嘔吐。

【处方】川黃連六兩（姜汁炒） 吳茱萸一兩（鹽水泡）

【制法】取上药进行干燥，混合碾細，用淨水滴水成小丸，每钱不得少于八十粒。

【剂量及用法】每服二十粒，日服二次。溫开水送下。

六、福 州

【功能与主治】治肝火脇肋刺

痛,或發寒熱,或頭目作痛,一切肝火等症。

【處方】黃連六兩(炒) 吳茱萸一兩(湯包焙干用)

【制法】上為末,用白朮、陳皮煎湯泛為丸。

七、杭 州 (茱連左金丸)

【功能與主治】治肝熱燥盛,左脇作痛,吞酸嘔吐,筋疝痞結及噤口痢,飲食入口即吐等症。

【處方】黃連六兩 吳茱萸(鹽水泡)一兩

【制法】共研細末,水泛為丸。

【劑量及用法】每服一至二錢,開水送下。

八、南 昌

【功能與主治】左脇疼痛,吞酸嘔吐,腹痛下痢赤白,及筋疝痞結。

【處方】同北京。

【制法】共研細面,水泛為丸,如綠豆大。

【劑量及用法】每服錢半至二錢,日服三次,溫開水送下,小兒視年齡及病情酌情減服。

九、沙 市

【功能與主治】治肝火燥盛,左脇作痛,胃酸過多,吞酸嘔吐等症。

【處方】同北京。

【制法】上藥研細末,以冷開水泛為丸。

【劑量及用法】每次服一錢五分,溫開水下,每日服三次。

【禁忌】體虛無熱者忌服。

十、重 慶

【功能與主治】治肝火燥盛,左脇作痛,吞酸嘔吐,筋疝痞結,一切肝火之症。並治霍亂轉筋,火邪內熾及噤口痢。

【處方】同北京。

【制法】共研細末,水泛為丸。紙盒包裝。

【劑量及用法】三錢。

十一、西 安

【功能與主治】治肝火旺盛,胸脇作痛,吞酸嘔吐,筋疝痞結等症。

【處方】同北京。

【制法】蜜制為丸。

【劑量及用法】每服一錢至二錢,白開水送下。

十二、蘭 州

【功能與主治】清熱開胃止痛。主憂鬱思慮,消化不良,嘔吐倒飽,胸脇脹滿,肚腹疼痛。

【處方】吳萸一斤 黃連一斤

【制法】以上共研細面,水打為丸。

【劑量及用法】每服三錢,白開水送下。

十三、大 同

【功能與主治】氣滯痢疾。

【處方】姜汁炒川連六兩 鹽水炒吳萸六兩

【制法】共為細面,小米湯打丸。

【劑量及用法】每服三錢,開水送下。

十四、濟 南

【功能與主治】胸脇作痛,嘔吐吞酸。

【處方】同武漢。

【制法】共為細末,水泛為丸。

【劑量及用法】每服五分至一錢,白開水送。

【禁忌】辛辣油膩等物。

十五、沈 陽

【功能與主治】除疝清痞。主嘔吐吞酸,疝氣攻痛,脇痛悶滿,胸膈痞塞。

【處方】、【制法】同北京。

【劑量及用法】每服一錢至二錢,白開水送下。

【禁忌】辛辣食品。

十六、吉林(左金丹)

【功能與主治】平肝火,除疝消痞。主肝火燥盛,吞酸嘔吐,寒火疝氣,脇痛痞結等症。

【處方】姜黃連四兩 吳茱萸六錢七分

【制法】共研為細末,煉蜜為小丸。貯存于磁盆內以免風干。

【劑量及用法】每服二錢,白開水送下。

附參考古方

【來源】丹溪心法(回令丸)。

【功能與主治】治肝火。

【處方】黃連六兩(一本作芩) 吳茱萸一兩或半兩

【制法】上為末,水丸或蒸餅丸。

【劑量及用法】白湯下五十丸。

加味左金丸

一、濟 南

【功能與主治】胸腹脹滿,嘔惡吞酸。

【處方】黃連 吳萸各一兩 郁金 柴胡 青皮各二兩 香附三兩 白芍四兩

【制法】共為細粉,水泛小丸。

【劑量及用法】每服三錢,白開水送下。

二、呼和浩特

【處方】黃連三斤十二兩 吳萸十兩 柴胡 青皮 郁金各一斤四兩 香附一斤十四兩 枳實二斤半

【制法】水泛小丸。

越 鞠 丸

一、上 海

【功能與主治】胸悶吞酸,脘腹脹痛。

【處方】香附(醋炒) 白梔子(炒焦) 蒼朮(米泔水浸炒) 六神曲(炒焦) 川芎各二兩

【制法】共研細粉,水泛為丸,如綠豆大。

【劑量及用法】每服一錢,溫水送服。

【禁忌】生冷食物。

二、南 京

【功能與主治】健胃消食。主胸悶腹脹,吞酸嘔吐,食食交阻,食慾不振。

【處方】制香附 川芎各一兩 炒山梔子一兩五錢 焦六神曲一兩五錢 炒茅蒼各二兩

【制法】共研細末,沸水泛丸,每錢約做八十粒。

【劑量及用法】每服二錢至三錢,一日二次,食後開水吞服。

三、武 漢

【功能與主治】胸悶脘痛,嘔逆吐酸,腹痛腹脹及六郁為病。

【處方】香附二兩(醋炒) 蒼朮

二兩(米泔水浸) 川芎二兩 陈柚一兩(炒) 梔子一兩半(姜汁炒)

【制法】取上药进行干燥,混合碾细,用淨水送成小丸,每錢不得少于三十粒。

【剂量及用法】每服三錢,开水送下。

四、福州

【功能与主治】治六郁,胸膈痞满或吞酸嘔吐,飲食不和等症。

【处方】川芎 蒼朮 神麴 香附 梔子各等分

【制法】共研細末,水泛为丸。

五、杭州(丹溪越鞠丸)

【功能与主治】治痰、湿、食、热、气、血諸郁。飲食不消,胸膈痞悶,吞酸嘔吐,腹脹作痛以及妇人諸郁,月經不調等症。

【处方】制香附四兩 茅山朮(米泔水浸炒)四兩 六神麴(炒焦)四兩 山梔子(姜汁炒黑)四兩 川芎四兩

【制法】共研細末,水泛为丸。

【剂量及用法】每服三錢。开水送下。

六、南昌

【功能与主治】浮、痰、食、火、气、血諸郁所致脘腹脹痛,吞酸吐瀉,帶下。

【处方】香附(童便浸)二兩 蒼朮(米泔水浸一宿去粗皮藤油炒)二兩 神麴(炒香)一兩五錢 山梔子(姜汁炒黑)一兩五錢 川芎(童便浸)二兩 半夏一兩

【制法】共研細末,水泛为丸,如綠豆大。

【剂量及用法】日服二次,每服二至三錢,空腹开水送下。

七、沙市

【功能与主治】治六郁(气、血、痰、火、食、热),胸膈痞悶,胃痛,食滯不化等症。

【处方】香附(醋炒) 蒼朮(米泔水浸炒) 神麴(炒) 梔子(炒) 川芎各等份

【制法】上药水泛为丸。

【剂量及用法】成人量每次服二錢,每日服一次,温开水下。

【禁忌】体虚而無积滯者忌服。

八、重庆

【功能与主治】治一切湿痰、气、血諸郁,牙痛口瘡,胸悶脘痛,腹脹腹痛,吞酸,腿痠,黃疸,女性經病帶下、产後中風,小兒食滯。

【处方】香附二兩 蒼朮二兩 川芎二兩 山梔子一兩五錢 神麴一兩五錢 山楂一兩五錢 麦芽一兩五錢

【制法】共研細末,水泛为丸。紙盒包裝。

【剂量及用法】三錢至五錢。

【禁忌】陰虛火旺者不能服。

九、西安

【功能与主治】主治胸悶脘滿,脇痛腹脹作痛,吐酸消化不良,婦女經病帶下,小兒食滯等症。

【处方】同上海,分量各用五錢。

【制法】面糊为丸。

【剂量及用法】每次用量三錢至五錢,开水送下。小兒酌減。

【禁忌】衰弱及热性病忌服。

十、大同

【功能与主治】郁滯凝結。

【处方】醋炒香附米一兩六錢 炒茅朮一兩六錢 川芎一兩六錢 神麴一兩六錢 梔子一兩六錢 山楂二兩

【制法】水泛小丸。

【剂量及用法】每服三錢,开水送下。

十一、济南

【功能与主治】六郁为病,飲食不消,胸膈痞悶,噯气,嘔吐吞酸。

【处方】、【制法】、【剂量及用法】同沙市。

十二、沈阳

【功能与主治】宣通發表。主胸滿脇脹,吞酸嘈雜,食物不化,脘悶不舒,肝氣凝滯,胃腹作痛。

【处方】同福州,分量用各四兩。

【制法】共碾極細面,水泛为小丸。

【剂量及用法】每服二錢,白开水送下。

【禁忌】生冷油膩。

十三、吉林、哈尔滨

【功能与主治】开郁順气。主治六郁。

【处方】同福州,分量用各一斤。

【制法】共碾为細面,麵糊为丸,如梧桐子大。除包裝外用磁坛貯存之。

【剂量及用法】每服二錢,早晚午三次白水服。

【禁忌】忌食生冷粘硬之物。

十四、呼和浩特

【处方】香附 蒼朮 梔子各半斤 神麴 橘紅各六兩 白朮 黄芩 山楂各半斤

【制法】共为細面,水泛小丸。

附参考古方

【来源】丹溪心法(芎朮丸)。

【功能与主治】解諸郁。

【处方】蒼朮 香附 撫芎 神麴 梔子各等分

【制法】上为末,水丸,如綠豆大。

越鞠保和丸

一、天津

【功能与主治】舒气解郁,开胃消食。主胸滿气滯,腹脹腹痛,嘔吐嘈雜,不思飲食,憂慮郁悶,消化不良。

【处方】炒蒼朮五兩 山楂十兩連翅(去心) 黄芩各二兩五錢 陈皮 神麴(麸炒)各五兩 广木香 黃連各二兩五錢 香附(醋制) 当归各五兩 生梔子二兩五錢 枳实(麸炒)七兩五錢 制半夏 川芎各五兩 白朮(麸炒)十五兩 茯苓(去皮)五兩 炒萊菔子八兩

【制法】共为細粉,凉开水泛小丸。三錢重裝袋。

【剂量及用法】每次服一袋,白开水送下。

二、济南

【功能与主治】食积痰飲,胸脇脹滿,嘈雜吞酸。

【处方】蒼朮(米泔浸) 川芎 神麴 香附(醋炒) 陈皮 法半夏 当归(酒洗) 茯苓各五斤 枳实七斤八兩 萊菔子 連翅 木香 黄芩 梔子 黃連(姜汁炒)各二斤八

兩 山楂十斤 白朮十五斤

【制法】共為細粉，水泛為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

三、沈陽

【功能與主治】清脹去痞，除痛止嘔。主憂思忿怒，飲食不下，嘔吐吞酸，胸膈脹滿，郁結煩悶。

【處方】香附四兩 蒼朮 山楂肉各三兩 川芎 炒神曲 炒梔子 炒麦芽各二兩 茯苓 清半夏各一兩 廣皮 炒萊菔 連翹 黃連各五錢

【制法】共碾極細面，水泛為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】生冷硬物。

四、撫順

【處方】香附 焦梔 神曲 川芎各八兩 茅朮十二兩 半夏 萊菔 山楂 神曲 麦芽 陳皮各四兩

【制法】共為細面水泛小丸。

五、呼和浩特

【處方】陳皮 蒼朮 厚朴各三斤 枳殼 砂仁 山楂 神曲 法夏 郁金各一斤八兩 梔子一斤二兩 甘草六兩 青皮二斤四兩 香附三斤 萊菔子三斤四兩 川芎一斤八兩

【制法】共為細面，水泛小丸。

附參考古方

【來源】沈氏尊生書：雜病源流犀燭。

【功能與主治】諸郁，此方能開郁行氣，消積散熱。

【處方】白朮三兩 山楂二兩 蒼朮 川芎 神曲 香附 陳皮 半夏 枳實 茯苓 酒黃連 酒當歸各一兩 山梔 萊菔子 連翹 木香各五錢

【制法】姜汁化蒸餅丸。

良附丸

一、上海

【功能與主治】胸膈滿痛，得暖便輕，嘔吐清水。

【處方】良姜四錢 當歸三兩

沉香一兩 木香 青皮(炒)各三兩 干姜二兩 香附(制)四兩

【制法】共研細粉，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服一錢至一錢半，溫開水送服。

二、南京

【功能與主治】主寒凝氣滯，胃脘嘔吐。

【處方】高良姜二兩 醋炒生香附四兩

【制法】共研細末，以沸水泛為丸，每錢約十粒。

【劑量及用法】每服二錢，一日二次，食后開水吞服。

三、武漢

【功能與主治】寒凝氣滯，胃脘作痛。

【處方】高良姜二兩(酒炒) 香附二兩(醋炒)

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用酒和成小丸，每錢不得少於二十粒。

【劑量及用法】每服五分至一錢半，溫開水吞服。

四、杭州

(止痛良附丸)

【功能與主治】溫散寒邪，調氣止痛。主治胸脘氣滯，寒食停積，胃脘脹痛，日久不癒之症。

【處方】高良姜(酒炒) 制香附各八兩

【制法】共研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服一錢五分至二錢。米飲湯或開水送下。

五、濟南

【功能與主治】氣滯胃脘久痛。

【處方】同武漢。

【制法】共為細末，水泛小丸。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

【禁忌】生冷。

涼金丸(涼水金丹)

吉林

【功能與主治】消積調胃，止痛除濕。心腹氣痛，胃脘口痛，脾濕壅腫。停食停水等症。

【處方】沉香 皂角 豆霜 木

香 丁香 三稜 葶藶 乳香 莪朮各六錢七分。

【制法】共為細面，用棗肉制成丸劑，除包裝外用玻璃瓶貯之。

【劑量及用法】每服十五丸，用白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

六、郁丸

濟南

【功能與主治】胃脘疼痛，膨悶脹飽，吐酸便秘。

【處方】廣皮 神曲各六兩 莪朮九兩 牙皂三兩 木香一兩五錢 黃連七錢五分 板櫚四兩四錢 甘草七錢五分 川芎六兩 三稜一兩五錢 青皮三兩 麦芽六兩 薑香二兩 大黃六兩 砂仁三兩 香附 黑丑各六兩

【制法】共研細末，水泛小丸。

【劑量及用法】每服三錢，白水送下。

【禁忌】忌食冷食物。孕婦忌服。

十香止痛丸

一、天津

【功能與主治】舒氣解郁，散寒止痛。主氣滯胃寒，兩脇脹滿，胸胃刺痛，肚腹隱痛。

【處方】香附(醋制)八兩 元胡(醋制) 五靈脂(醋炒) 烏藥 香櫟 厚朴(姜制)各四兩 生蒲黃 制乳香 檀香 降香 廣木香各二兩 沉香 零陵香 香排草 砂仁 公丁香各五錢 熟軍四兩 良姜三錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，二錢重，蠟皮或紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、武漢(台草八香丸)

【功能與主治】胃腸痼痛，氣滯脹痛，及嘔吐不食等症。

【處方】木香二兩 香附一兩 丁香五錢 藿香一兩半 沉香二兩 檀香一兩 乳香三兩 台烏一兩 降香一兩 甘草一兩

【制法】取上藥進行干燥，混合，

碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于二十粒。

【剂量及用法】每服一錢及二錢。

三、南昌

【功能与主治】寒凝气滞，脘腹脹痛。

【处方】澤瀉 烏藥 陈皮 制香附 小茴香 公丁香 广木香 沉香 猪牙皂(炙烟尽) 荔枝核各一兩

【制法】共研細末，煉蜜为丸，每丸重二錢，蜡壳封固。

【剂量及用法】每丸分二次服用，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

四、重庆(十香丸)

【功能与主治】治气滞寒滞，胃脘胸腹疼痛，嘔吐吞酸等症。

【处方】同南昌，分量各五錢。

【制法】共研細末，煉蜜为丸，每丸重三錢，蜡封固。

五、承德(十香丸)

【功能与主治】胃疼(俗称心口疼)肚子疼，妇女行經疼，过食生冷，气郁不舒，兩脇疼，腹脹腸鳴，虫积。

【处方】砂仁十六兩 广木香八兩 枳殼十六兩 梭羅子十六兩 丁香五兩 良姜十兩 灵脂(醋炒) 鵝枳实各十六兩 肉桂五兩 元胡(醋炙)十六兩 鶴虱四兩 沉香二兩

【制法】共为細粉，水泛小丸，滑石为衣。每袋重一錢五分。

【剂量及用法】临疼时每服一袋，重者二袋，用溫沸水送下。十岁以下者每袋分三次。服藥后多飲开水一、二杯，速效。

【禁忌】孕妇忌服。勿食生冷，勿受寒凉。凡患伤寒瘟疫，煩躁目赤，小便赤少，大便秘結，热結作痛，胃腸潰瘍，均忌服。

舒肝丸

一、北京

【功能与主治】解郁止痛健胃。主兩脇脹滿，胃脘刺痛，嘔逆嘈杂，噯气吞酸。

【处方】厚朴 枳实 柴胡 川

芎 沉香 橘皮各十六兩 片姜黃六兩 甘草十二兩 砂仁 香附(醋炒) 丹皮 玄胡索 紫豆蔻 白芍 木香各十六兩

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，重二錢，硃砂为衣，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，溫开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

二、天津

【功能与主治】舒气开胃，除煩止痛，助消化，消积滯。主肝郁气滞，兩脇刺痛，飲食無味，消化不良，嘔吐酸水，倒飽嘈杂，週身串痛。

【处方】生白芍一兩四錢 片姜黃一兩一錢 薏仁 厚朴(姜制)各五錢 枳壳(麸炒) 元胡(醋制)各九錢 茯苓(去皮)一兩 陈皮 广木香 砂仁各七錢 沉香九錢 川楝子(酒蒸)一兩五錢

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，二錢重。蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量与用法】每次服一丸，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

三、南昌、承德

【功能与主治】胸滿脇脹，胃脘刺痛，倒飽嘈杂，噯气吞酸。

【处方】川楝子十五兩 片姜黃 枳壳 元胡(醋炒) 茯苓 沉香各十兩 厚朴 紫薏仁各六兩 木香 陈皮 砂仁各八兩 白芍十二兩(酒炒)

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，二錢重，硃砂为衣，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服二丸，日服二次，溫开水送下。

【禁忌】急怒气郁。

四、西安

【功能与主治】主治兩脇脹滿，肝胃刺痛。

【处方】金鈴子十五兩 枳壳 茯苓 沉香 姜黃 元胡各十兩 木香 陈皮 砂仁各八兩 厚朴 薏仁各六兩 白芍十二兩

【制法】蜜制为丸。

【剂量及用法】每服二錢至三錢。

【禁忌】热性病及水份缺乏者忌服。

五、蘭州

【功能与主治】舒气开胃，除煩止痛，助消化，消积滯。主胸中煩悶，兩脇刺痛，飲食不消，嘔吐酸水，呃逆郁悶，週身串痛等症。

【处方】砂仁一斤 广木香半斤 元胡一斤 香附一斤半 粉丹皮一斤 白芍一斤半 儿朴 柴胡 广皮各一斤 甘草半斤 枳壳 青皮各一斤 片姜黃六兩 沉香 薏仁各五兩 佛手六兩 香橼半斤 檀香四兩

【制法】共研細面，蜜为大丸三錢重。

【剂量及用法】每次服一丸，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

六、大同

【功能与主治】平肝順气，主兩脇刺痛。

【处方】金鈴子 枳壳 广木香 厚朴 广皮 砂仁 茯苓各四兩 薏仁一兩 白芍 沉香 元胡各二兩

【制法】共为細面，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服二錢。

七、濟南

【功能与主治】同南昌。处方、制法亦同。

【剂量及用法】每服一丸，日服二次，溫开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。忌急怒气郁及腥冷食物。

八、沈陽(王府舒肝丸)

【功能与主治】舒肝理气，健胃止痛。主胸膈痞塞，脇痛脹滿，胃酸过多，嘔吐酸逆，肝胃气痛，呃逆不止，食慾不振，膨悶脹飽，打咯吐酸，蚊虫攻痛。

【处方】香附一兩五錢 茯苓 广皮各七錢五分 厚朴 枳壳 青皮 台烏藥 元胡各五錢 焦楂一兩 白朮五錢 沉香 砂仁 粉草各二錢五分 檳榔 神曲各一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸二錢重。

【剂量及用法】每服一丸。每日二次，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

九、撫順(王府舒肝丸)

【功能与主治】温性，健胃助消化。主消化不良，呃逆不舒，嘈杂吞酸，胸脘胀疼，胃痛嘔吐，食积痞塊等。

【处方】薏仁二兩 枳壳八錢 川朴一兩 砂仁八錢 香附五錢 三仙一兩六錢 广木香五錢 陈皮青皮各八錢 柴胡一錢

【制法】共为細面，蜜丸二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，姜水送下，早晚二次。

【禁忌】孕妇忌服。忌食生冷硬物。

十、吉林、哈尔滨(加料舒肝丸、王府舒肺丸)

【功能与主治】平肝順气。主肝瘀气滯。

【处方】香附四兩 当归一兩 枳实 醋柴胡各八錢 沉香五錢 毛橘一兩 川芎八錢 郁金五錢 醋青皮一兩 琥珀 木香各五錢 元胡八錢 油桂 老蔻 紅花各五錢 油朴一兩 烏药 白芍 枳壳各八錢 塊苓一兩

【制法】共碾为細面，煉蜜为丸二錢一分重，硃砂为衣。棉紙包裹蜡皮封。

【剂量及用法】每服一丸，白水調下。

【禁忌】忌食腥冷。

舒肝解郁丸

沈 陽

【功能与主治】强脾胃散郁結，开郁舒气，消食止痛。主宿食不消，吞酸嘈嘔，呃逆嘔噎，胸悶不舒，胃脘脹痛，兩脇攻痛等症。

【处方】薏仁二兩 紫朴八錢 广木香四錢 香附六錢 焦三仙三兩 五爪橘一兩 广砂八錢 清夏一兩 沉香五錢 白芍一兩 甘草五錢 白朮一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸，二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下，日服一次。

【禁忌】孕妇忌服。

平肝順气丸

大 同

【功能与主治】胸膈膨悶，不思飲食。

【处方】黃連(姜炒)一兩 吳萸(炒) 神麴(炒)各一兩 麦芽七錢 山查一兩 木香三錢 香附三兩 川芎二兩 广皮(去白)三兩 白朮四兩 枳实二兩 梔子(炒) 萊菔子各一兩 半夏一兩五 云苓一兩 砂仁(炒)四錢 干姜(炒)一兩 青皮(炒)六錢 竹茹一兩 炙草四錢

【制法】共为細面，煉蜜为丸。

【剂量及用法】早晚每服二錢，开水送下。

舒肝調气丸

天 津

【功能与主治】舒气开郁，健胃消食。主兩脇脹滿，胸中煩悶，嘔吐惡心，气逆不順，倒飽嘈杂，消化不良，大便燥結。

【处方】陈皮 元胡(醋制) 黑郁金 菖蒲 五灵脂(醋炒)各一斤 枳实(麸炒)一斤 莖朮(醋制)一斤 胆草二斤 丹皮一斤 郁李仁八兩 厚朴花九兩 炒黑丑八兩 生白芍一斤 炒白朮八兩 片姜黃十二兩 香附(醋制) 厚朴(姜制)各三斤 广木香一斤八兩 沉香八兩 薏仁一斤八兩 青皮(醋炒)二斤 炒萊菔子四兩

【制法】共为細粉，凉开水泛小丸，每斤丸药用桃膠二錢化水，滑石三兩为衣。二錢重裝袋。

【剂量及用法】每次服一袋，白开水送下。

【禁忌】孕妇及虛弱者忌服。

舒肝和胃丸

濟 南

【功能与主治】惡心嘔吐，嘈杂吐酸，胸脇脹滿。

【处方】半夏 陈皮 甘草 白芍 烏药 郁金 青皮 根朴 草薢 神麴 枳壳 当归 檳榔各三錢 砂仁 柴胡 瀉叶各二錢 焦查一兩

【制法】共为細末，水泛为丸。

【剂量及用法】每服二錢。

【禁忌】孕妇忌服。

快胃舒肝丸

一、北 京

【功能与主治】健胃舒郁止痛。主兩脇膨脹，胃脘刺痛，痞滿嘈杂，嘔吐吞酸。

【处方】片姜黃一兩六錢 木香二兩四錢 青皮四兩 烏药三兩二錢 香附四兩(醋炒) 川芎二兩二錢 白芍四兩 砂仁二兩二錢 当归四兩 厚朴十六兩 枳壳四兩 紫豆薏仁一兩二錢 橘皮 柴胡 玄胡索各四兩 沉香三兩

【制法】共为細粉，水泛小丸，滑石十三兩，硃砂三兩为衣關亮。

【剂量及用法】每服二錢，日服二次。溫开水送下。

【禁忌】忌急怒。孕妇忌服。

二、大 同

【功能与主治】胸膈膨悶，飲食不進，肝郁不舒，惡心嘔吐。

【处方】香附六兩 杭芍六兩 川朴四兩 甘草四兩 砂仁四兩 枳壳四兩 广皮四兩 广木香四兩 川芎四兩 丹皮四兩 蘇沉香一兩二錢 老蔻仁一兩二錢 硃砂二錢 胆草二兩 滑石十兩

【制法】共为細面，水泛为丸，硃砂滑石为衣。

【剂量及用法】早晚各服一錢，白水送下。飯后服。

腸胃舒郁丸

沈 陽

【功能与主治】能促进胃腸消化蠕動机能。主胸膈脹滿，吞酸吞酸，四肢倦怠，兩脇作痛，飲食無味，腸胃虛弱，一般郁結。

【处方】香附 茯苓 陈皮 炙甘草 川芎 炒山梔各一兩 炒蒼朮 砂仁 半夏各五錢

【制法】共碾極細面，醋糊为小丸。

【剂量及用法】每服二錢，姜水送下。

【禁忌】生冷硬物。

琥珀利气丸

一、吉林(利气丸)

【功能与主治】平肝理气，消食导下。主硬块隆起，脐腹坚硬，疼痛跳动，痛有定处，脘腹气串，起伏不定，疼痛异常，忽聚忽散。

【处方】琥珀 木瓜各二两 黄柏四两 青皮二两 香附四两 酒芩六两 陈皮二两 二丑四两 果仁一两 川军六两 莪朮二两 郁李一两

【制法】共碾细面，炼蜜为丸，每丸二钱一分重。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下，重者日服二次，不可多服。

【禁忌】孕妇忌服。忌食辛辣。

二、哈尔滨

【功能与主治】消积化聚，通瘀破癥。主五积六聚，七癥八瘕。

【处方】琥珀 木瓜各二两 黄柏四两 青皮二两 香附四两 酒芩六两 陈皮二两 二丑四两 果仁一两 川军六两 莪朮二两 郁李一两

【制法】共碾为细面，炼蜜为丸，二钱一分重。瓷坛存贮，以免风干。

【剂量及用法】每服一丸，白开水调下，重症日服二次。此药有峻泄之力，不可久服。

【禁忌】孕妇忌服。禁食辛辣。

袪衣宽中丸

大同

【功能与主治】舒气安神。

【处方】二丑一兩二錢 川人黃四錢 焦梔子 蒼朮 香附 萊菔子各二兩 炒干姜 青皮 砂仁各一兩 木香五錢 上根朴一兩 陈皮二兩 官桂 枳實各一兩 炙草二錢五分

【制法】水泛为丸。

【剂量及用法】每服二钱。

四制棟实丸

呼和浩特

【处方】葫蘆巴 棟子二斤二兩 四錢 青木香一斤十四兩 橘核二斤八兩 巴戟一斤十四兩 吳萸一

斤十四兩 青皮 茴香 柴胡 木通各一斤十四兩 川烏一斤

【制法】共为细面，水泛小丸。

消滞止痛丸

禹县

【功能与主治】胃脘疼痛，飲食不消，惡食吐酸，胸膈脹滿，肚腹疼痛。

【处方】公丁香 广木香 紫蔻仁 京三稜 蓬莪朮 炒白朮 葶藶子 牙皂角 明沒药 肉桂 干姜 穿山甲 巴豆霜 川厚朴 玄胡 吳茱萸 五灵脂 酒大黃各二兩

【制法】共为细面，醋水为丸，如梧桐子大，硃砂为衣。

【剂量及用法】每服十粒，早晨温开水送下。三岁每服一丸。

【禁忌】虚弱者及孕妇忌用。

【备考】有效期间一年。

經驗止痛丸

禹县

【功能与主治】过食生冷，胃脘疼痛，胸膈脹滿，气滞寒痰。

【处方】广木香四兩 胡椒 全蝎 巴豆霜各二兩 寒食面四兩

【制法】共为细面，醋糊为丸，如梧桐子大，硃砂为衣。

【剂量及用法】每服一丸，冷开水送下。

【禁忌】孕妇忌用。热症忌用。

【备考】有效期间六个月。

九气拈痛丸

一、北京

【功能与主治】理气止痛。主胃脘疼痛，兩脇脹痛。

【处方】香附(醋炒) 五灵脂 玄胡索各一百六十兩 良姜 甘草 木香各四十兩 黃郁金 橘皮 枳榔各八十兩 莪朮二百二十兩

【制法】共为细粉，水泛小丸。

【剂量及用法】每服二钱，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

二、天津

【功能与主治】顺气止痛。主胃脘疼痛，兩脇脹滿，消化不良，嘔吐酸水，倒飽嘈杂，积聚痞塊。

气滞积聚类

【处方】五灵脂(醋炒) 当归 莪朮(醋制) 枳榔 陈皮 香附(醋制) 甘草 广木香各五兩 良姜 青皮(醋炒)各八兩 黑郁金 元胡(醋制) 姜炭各四兩

【制法】共为细粉，凉开水泛小丸，一钱重装袋。

【剂量及用法】每次服一袋，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

三、杭州(九气心痛丸)

【功能与主治】治各种心胃气痛，肋肋脹痛，食积气滞，痰湿郁结，妇人血瘀气痛，尤为特效。

【处方】五灵脂(醋炒) 二兩 高良姜四錢 广木香二錢 石菖蒲二兩 小青皮四錢 公丁香二錢 延胡索(醋炒)四錢

【制法】共研细末，陈酒和水泛丸。

【剂量及用法】每服二钱。温酒或开水送下。

【备考】如痛甚，不可即时飲食，食恐痛也。

四、大同

【功能与主治】理气止痛。

【处方】五灵脂四兩 莪朮四兩 香附四兩 当归二兩 郁金二兩 元胡二兩 白芍二兩 三稜二兩 良姜二兩 官桂二兩 广木香一兩 乳香一兩 沒药一兩 甘草一兩 丁香五錢

【制法】共为细面，炼蜜为丸。

【剂量及用法】每服二钱。

【禁忌】孕妇禁忌。

五、济南

【功能与主治】气滞痞满，胸胁作痛。

【处方】广木香二兩 生白芍三兩 枳榔十二兩 青皮十二兩 广皮十二兩 枳实十二兩 莪朮十二兩 神曲十二兩 郁金十二兩 三稜六兩 台烏药六兩 莪朮六兩 香附(醋炒)一斤半 甘草四兩 良姜六兩

【制法】共为细末，水泛为丸，綠豆大(松打)。

【剂量及用法】每服一钱，日服二次，姜汤送下。

【禁忌】忌生冷油腻等物，孕妇

及气虚体弱者忌服。

六、沈 陽

【功能与主治】鎮痛开郁，疏通停滯。主腹痛胃气痛，胁肋脹痛，不思飲食，食积气滯各种气痛。

【处方】广木香二錢 牛芎三錢 檳榔一斤 青皮一斤 广皮一斤 枳实一斤 莪朮一斤 神柚一斤 郁金一斤 三稜六兩 烏藥六兩 草薹六兩 良姜六兩 香附米一斤 五兩 甘草四兩

【制法】共碾極細面，水泛为小丸。

【剂量及用法】每服二錢，姜水送下；如急性胃痛用黄酒送下。

七、撫 順

【处方】灵脂 文朮 全归 檳榔 香附各五兩 枳壳二兩 郁金 元胡 片姜 木香 炙草 草果各二兩 青皮四兩 陈皮五兩 良姜四兩

【制法】共为細面水泛小丸。

八、承 德

【功能与主治】寒食食积，积聚痞塊，胃脘作痛，血塊气塊。

【处方】广木香八兩 当归一斤 四兩 陈皮 莪朮 五灵脂各八兩 檳榔一斤四兩 良姜 青皮各一斤 制香附一斤四兩 玄胡 姜黃 郁金各八兩 甘草四兩

【制法】共碾細面，水泛为丸。

【剂量及用法】每服二錢，开水送下。

【禁忌】虛弱热症及孕妇忌用。

【备考】有效期間二年。

九、呼和浩特

【处方】灵脂 莪朮 当归 檳榔 香附 陈皮 甘草各一斤十四兩 元胡 姜黃各十二兩 郁金十兩二錢 良姜 青皮各一斤半 木香十五兩

【制法】水泛小丸。

定 痛 丸

禹 县

【功能与主治】积聚痞气，胃脘寒疼，时疼时止，兩肋脹滿，作酸倒飽，嘔吐惡心。

【处方】广木香 檳榔各二兩二錢 玄胡 兩六錢 枳壳二兩四錢 枳实 柴胡各三兩二錢 肉桂二兩四錢 厚朴二兩二錢 蒼朮二兩二錢 白芍 川芎各二兩四錢 当归二兩二錢 香附四兩 广丁香一兩六錢 砂仁二兩二錢 良姜二兩四錢 陈皮二兩二錢

【制法】共碾为細面，水送为丸，如菟子大。

【剂量及用法】每服一包（每包十五粒），每日二次。滿十岁者服半包。白开水送下。

【禁忌】孕妇忌用。热疼忌用。

【备考】有效期間一年。

除 痛 丸

沈 陽

【功能与主治】通气止痛，鎮靜神經。主肝气逆滿，兩肋脹痛，胃脘脹痛，諸疝腫痛，胸膈束痛，妇人經痛，腰腿疼痛，吐血肋痛。

【处方】蓋沉 青皮各二錢 萊菔根五錢 台烏四錢 木香五錢 儿楝子 香櫞 油朴各二錢 当归 香附各一兩 油桂二錢 十开薤一兩 明沒藥七錢 紫苏 白檀香各二錢 砂仁四錢 內金五錢 苏合油一錢

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸。二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下。

【禁忌】辣腥刺激食物。

肚 痛 丸

重 庆

【功能与主治】治心胃气痛，肚痛，积聚痛，寒食痛等症。

【处方】橘皮三兩 草薹二兩 公丁香一兩五錢 白豆蔻二兩 广木香一兩五錢 石菖蒲 良姜各三兩 胡椒 肉桂各二兩 養香四兩 枳壳三兩 厚朴二兩 白芍二兩 茯苓四兩 楂肉二兩 青蒿二兩 谷芽一兩 硃砂四兩

【制法】除硃砂穿衣外，余药共研細末，水泛为丸。

【剂量及用法】每服一粒，小孩減半，白酒化服，白开水亦可。

【禁忌】气虛不能服。

丁香破气丸(破气丸、丁香破气化积丸)

吉林、哈尔滨

【功能与主治】消积化聚，通暢破痞。主五积，七癥，硬塊隆起，臍腹坚硬，疼痛跳动，痛有定所；六聚，八瘕，脘腹攻串，起伏無定，疼痛異常，忽聚忽散。

【处方】黑丑 白丑各三兩 檳榔 神柚 炙軍 三稜 莪朮 厚朴 萊菔 肉桂 山查 白朮各四兩 枳壳 青皮 陈皮 半夏 烏藥 果仁 当归各二兩 川芎 白薤 砂仁 甘草 木香各二兩 丁香一兩

【制法】共碾为細面，煉蜜为丸二錢一分重。瓷罐存貯。

【剂量及用法】每服一丸，早晚各服一次。

【禁忌】孕妇忌服。

黃連磨积丸

沈 陽

【功能与主治】破結磨堅，行气活血，消除积痞。主一切痰飲、痰积、痰聚，肋下悶倦，食思減退，吐逆惡心，眩暈怔忡，时作时止。

【处方】黃連一兩(內五錢与吳茱萸同炒，余五錢与益智仁同炒，去一味不用，仅用黃連) 梔子 青皮 川芎 蒼朮 桃仁 白芥子各五錢 香附 莪朮 山楂肉 萊菔子 白朮各一兩 三稜一兩五錢

【制法】共碾極細面，用姜湯泛为小丸。

【剂量及用法】每服二錢，白开水送下。

【禁忌】忌辣物。孕妇忌服。

附参考古方

【来源】医便(珍本医書集成)。

【功能与主治】治一切痰飲痰积，积聚拂郁，肋下悶倦，懶惰，飲食不消，或吐逆惡心，眩暈怔忡，时作时止，用之如神。

【处方】黃連一兩(內五錢与吳茱萸同炒，五錢益智仁同炒，去一味不用，止用黃連) 梔子(炒去壳) 青皮(去囊) 川芎 蒼朮(米酒浸七日) 桃仁(去皮尖) 白芥子(酒浸炒)各五錢 香附子(童便浸炒) 莪朮(酒浸炒) 山楂肉 萊菔子

(炒研) 白朮各一兩 三稜(用西安者佳)一兩五錢

【制法】上為細末，量用湯浸，蒸餅為丸，梧桐子大。

【劑量及用法】每服五、七十丸，茶湯、白湯任下，未丸時先杵千余下。

金鈎釣積丸

一、沈陽

【功能與主治】攻癥破瘕，消散積聚。主積聚癥瘕堅硬疼痛，腹中脹悶，飲食不消，四肢倦怠，面色萎黃，時痛時止，或聚或散，按之跳動。

【處方】巴豆霜二錢 五色礞砂乳香 沒藥 阿魏各二錢五分 硃砂 冰片各一錢

【制法】除硃砂、冰片另研外，余共碾極細面，用川心蜡為小丸。

【劑量及用法】壯者每服二、三粒，弱者二粒，早晚白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、撫順

【處方】乳香 沒藥 阿魏 礞砂各五錢 片砂四錢 冰片四錢 豆霜六錢 炒輕粉六錢。

【制法】共為細面，化白蜡二兩為小丸，硃砂衣。

化積丸

一、武漢(化痞丸)

【功能與主治】諸積內痛，痞滿成塊。

【處方】三稜 莪朮 阿魏 海浮石 蘇木 雄黃 瓦楞子(煨) 五靈脂 香附各五錢

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于二十粒。

【劑量及用法】每服一錢至二錢，日服二次。

【禁忌】孕婦忌服。

二、沙市(龟鳖化痞丸)

【功能與主治】寒濕氣結，癥瘕積聚，痞塊，脾臟腫大等症。

【處方】青皮一兩 公丁香 礞砂各五錢 龟板(醋炒)八錢 檳榔一兩 广木香五錢 莪朮(醋炒)一兩 牙皂五錢 阿魏(醋化)六錢

鱉甲(醋炒)八錢 枳實(麩炒)一兩 甘草五錢 广陈皮 枳殼(麩炒)

三稜(醋炒)各一兩 二丑一兩五錢

【制法】共研細末以姜汁麵糊為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】成人量每次服二錢，以姜湯送下，小兒老人減半。

【禁忌】孕婦、貧血及無痞塊者忌服。並忌豬肉、南瓜、甲魚、馬齒莧、生冷等物。

三、大同

【功能與主治】積聚痞塊。

【處方】二丑四兩 三稜一兩 莪朮一兩 檳榔一兩 茵陳一兩 牙皂一兩 枳殼一兩 大黃一兩 木香一兩

【制法】共為細面，水滴為丸。

【劑量及用法】早晚每服二錢，開水送下。

消積保中丸

蘭州

【功能與主治】消積保中。主治痞塊。

【處方】陈皮 半夏 云苓 香附 萊菔子 當歸 白朮 姜連 梔子 桃仁 神曲 白芥子 青皮 砂仁 玉片 莪朮 三稜 麦芽 川芎 广木香 紅花 干漆(炒) 阿魏各五錢

【制法】共為細末，姜汁、黃酒及開水打小丸。

【劑量及用法】食后白開水送下。

阿魏丸

一、上海

【功能與主治】癥瘕積聚。

【處方】胡黃連二錢五分 瓜蒌仁五錢 蘿蔔子(炒)一兩 食鹽二錢五分 生南星(漂淨)一兩 連翹五錢 生半夏(漂淨)一兩 象貝母 阿魏(醋浸)各五錢 山查(炒焦) 六神曲(炒焦) 麦芽(炒) 黃連各一兩 石礞二錢五分

【制法】共研細粉，用生姜四兩打汁，芒硝二錢五分化水泛丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服一錢至二錢，溫開水送服。遵醫師指示服用。

二、杭州(消痞阿魏丸)

【功能與主治】治食積痰血諸種積聚，腹有痞塊，體實脹滿等症。

【處方】阿魏(醋浸)五錢 六神曲一兩 瓜蒌仁五錢 山楂 黃連各一兩 風化消二錢五分 南星(皂夾水浸) 蘿蔔子各一兩 石礞二錢五分 半夏(皂夾水浸)一兩 連翹五錢 胡黃連二錢五分 炒麦芽一兩 浙貝母五錢 食鹽二錢五分

【制法】共研細末，生姜四兩搗汁，阿魏和米糊為丸。

【劑量及用法】每服二錢，開水送下。服后頻食胡桃肉，則痞結消散。

【禁忌】體虛忌之。

三、重慶

【功能與主治】治癥瘕積聚痞塊。

【處方】阿魏五錢 山楂 制南星 法半夏 麦芽 神曲 黃連 萊菔子各一兩 連翹 浙貝 枳實 白芥子各二錢五分

【制法】阿魏煎湯，風化硝、白石礞水化，余藥研末，用阿魏汁風化硝、白石礞水加姜汁泛丸。紙盒包裝。

【劑量及用法】成人二錢，小孩五分。

【禁忌】體虛人不能服。

四、西安(阿魏化痞丸)

【功能與主治】主治五疳蚘虫，腹大青筋，心腹脹痛，脾胃不和，喜食茶、米、泥土等物諸症。

【處方】阿魏四兩 使君子一兩 川連三兩 胡連二兩 伏苓四兩 青皮三兩 焦黃一兩 枳實二兩 三稜 文朮各五錢 六神曲三錢 皂礞一斤

【制法】共研細末，羅過煉蜜為丸，如綠豆大，外掛糖衣，每包三十粒。用玻璃紙包，外用厚紙封套。

【劑量及用法】每次服二十至三十粒，飯前用白糖水服，一日二次。

【禁忌】勿食生冷油膩物。

五、禹縣(阿魏化痞丸)

【功能與主治】男女小兒食積肉

积,酒积,疳积,水积痰积,一切痞块。

【处方】**虫积**五錢 胡黃連一錢五分 山查 半夏 麦芽各一兩 阿魏五錢 萊服子一錢五分 牙皂二錢五分 南星 神曲各一兩 藜仁 浙貝母各五錢 川黃連一兩 芒硝一錢五分

【制法】共为細面,用姜汁和水为丸。

【剂量及用法】每服一錢,小兒一岁至二岁每服二分,四岁至八岁每服四分。白开水送下。

【禁忌】孕妇及虛弱者忌用。

【备考】有效期間二年。

六、呼吸和浩特

【处方】**神曲** 黄芩 桔梗 香附各四兩 莪朮 三稜 半夏各三兩 熟軍 紅花 赤芍各二兩 木香一兩 阿魏三兩 甘草二兩

【制法】共为細面,水泛小丸。

附参考古方

【来源】沈氏尊生書:杂病源流犀燭。

【功能与主治】治癰积。

【处方】**阿魏**(酒浸化) 肉桂 蓬朮 麦芽 神曲 藜子 青皮 白朮 干姜各五錢

神应百消丸

呼吸和浩特

【处方】**礞砂** 阿魏 大黃 礞石 肉桂 木香 青皮 元胡 灵脂 茴香 山甲 蛤粉 乳香 沒药 石菖蒲 皂刺 牙皂 干漆 檳榔 陈皮 枳壳 三稜 莪朮 丁香 良姜 甘遂(炙) 芫花(炙) 大戟(炙)各二兩五錢 雄黃 豆霜各一兩五錢 当归 吳茱萸各二兩五錢

【制法】水泛小丸。

沉香百消丸

一、沈陽

【功能与主治】消癰化积,消食,順气解酒,行水散痞,除脹止痛。主癰积成塊,癰积攻痛,久成膨脹,腹大坚硬。

【处方】**醋香附** 五灵脂各五兩 黑白牽牛一斤 沉香五錢

【制法】共碾極細面,醋糊为小丸。

【剂量及用法】每服二錢,姜湯送下。

【禁忌】妊娠忌服。

二、撫順

【功能与主治】調胃消积。主飲食过量,消化不良,嘔吐嘈杂,胸膈脹滿,酒食积聚。

【处方】**香附**(生炙各半)八兩 灵脂四兩 三丑各二兩 沉香一兩

【制法】共为細面。水泛小丸。

【剂量及用法】每服二錢,白水送下。

【禁忌】忌食生冷硬物。孕妇忌服。

杀虫丸

一、濟南

【功能与主治】一切虫积腹痛,面黃肌瘦。

【处方】**鶴虱** 雷丸各二兩 檳榔一兩 苦楝皮二錢 蕪荑一兩 使君子肉四兩

【制法】共为細粉,煉蜜为丸,重一錢蜡皮封。

【剂量及用法】每服二丸,小兒酌減,白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

二、沈陽(杀虫化积丸)

【功能与主治】杀虫消滯,健胃止痢。主虫积痞病,肚大腹痛,嘔吐清水,唇紫黑。

【处方】**使君子肉** 黑白牽牛 檳榔各五錢 蕪荑 雷丸 烏梅肉 木香各一錢

【制法】共碾極細面,以白砂糖水泛为小丸。

【剂量及用法】每服二錢,白开水送下。

【禁忌】服藥后二、三小时内不食。

三、撫順

【处方】**黑丑** 雷丸 君子各一兩 榔片 楝皮各二兩 樞子一兩 木香 雄黃 半夏各五錢 鉛炭 川軍各一兩 鶴虱五錢。

【制法】共为細面,蜜丸三錢大。

附参考古方

【来源】1.良朋彙集(追虫利积丸)。

【处方】**使君子肉** 牽牛各一兩 檳榔五錢 蕪荑仁 雷丸 烏梅肉 木香各一錢

【制法】共为細末,以白沙糖为丸,如芡实大。

【剂量及用法】每服一丸,滾水送下。

2. 沈氏尊生書:杂病源流犀燭。

【功能与主治】虫痛。

【处方】**鶴虱** 雷丸 蕪荑 檳榔 烏梅 苦楝根 使君子肉

化虫丸

一、北京、承德

【功能与主治】杀虫消积。主虫积腹痛,面黃消瘦。

【处方】**木香** 檳榔 使君子仁 大黃 黑牽牛(炒)各八十兩 雷丸 枯矾 蕪荑 蘆薈各二十四兩

【制法】共为細粉,煉蜜为丸,重一錢。

【剂量及用法】每服一丸,日服二次 溫开水送下。小兒每服半丸,三岁以下者酌情遞減。

【禁忌】孕妇忌服。

二、天津

【功能与主治】杀虫,消积,利便。主腸中寄生蟯虫或寸白虫,肚腹时时脹痛,营养不足,面色萎黃。

【处方】**鶴虱** 元明粉各四兩 大黃 雷丸 檳榔 苦楝皮 蕪荑 炒黑丑 君子肉各二兩

【制法】共为細粉,凉开水泛小丸。三錢重裝袋。

【剂量及用法】每次服一袋,小兒酌減。白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

三、南京

【功能与主治】杀虫消积。主虫积腹痛,面黃消瘦。

【处方】**炒鶴虱**(去土) 炒銀粉 檳榔 苦楝根皮各一兩 枯矾二錢五分

【制法】共研細末,用花椒二錢煎湯泛丸,每錢約做一百粒。

【剂量及用法】成人每服三錢,

小兒每服二分至一錢，用糯米湯加麻油數滴，空腹時和服或吞服。

四、南昌

【功能與主治】腸胃諸虫。

【處方】鶴虱 胡粉(炒) 苦楝根(東行未出土者) 檳榔各一兩 燕窩 使君子各五錢 枯礬二錢二分

【制法】研為細面，煮面糊為丸。

【劑量及用法】一歲兒每服五分，成人每服三錢，根據年齡酌情增減服之。米湯吞服或化服，痛時用川椒湯化服。

【禁忌】辛熱及不易消化食物。

五、蘭州

【功能與主治】消積化虫利便。主腸胃生虫，嘔吐惡心，大便腹痛。

【處方】同天津，惟炒黑丑用二兩。

【制法】共研細末，水打小丸。

【劑量及用法】每服三錢，小兒減半。白開水送下。

六、大同

【功能與主治】小兒諸般虫病，面黃肌瘦，胃脘作痛。

【處方】鶴虱 胡椒 苦楝皮 使君子 燕窩 雷丸 檳榔各二兩 雄黃一兩

【制法】水泛成小丸。

【劑量及用法】成人每次服五分，小兒酌減。白砂糖水送下。

七、禹縣

【功能與主治】治諸虫積，肚腹常熱，嘔吐清涎，胃脘疼痛。

【處方】鶴虱 大黃各一兩 白胡椒二錢 檳榔一兩 雷丸 貫眾 使君子 苦楝根皮各五錢

【制法】共為細末，水丸，小米大。

【劑量及用法】每服八厘，米湯送下。五歲以上服二厘。

【禁忌】孕婦及非虫積忌用。

【備考】有效期二年。

八、沈陽

【功能與主治】杀虫止痛。主諸般虫積，嘔吐清涎，唇色花白，腹部發熱，餓而腹痛，得食痛止，喜食生

米泥土。

【處方】鶴虱 檳榔 苦楝根皮 胡粉各一兩 枯礬二錢五分 燕窩五錢 使君子一兩

【制法】共碾極細面，面糊為小丸。

【劑量及用法】小兒每服三丸，大人十丸。白糖開水送下，清米湯亦可。痛時用川椒湯送下。

附參考古方

【來源】1.重刊太平惠民和劑局方。

【功能與主治】治小兒疾病多有諸虫，或因臟腑虛弱而動，或因食甘肥而動，其動則腹中疼痛，發作腫聚，往來上下，痛無休止亦攻心痛，叫哭合眼，仰身扑手，心神悶亂，嘔涎涎沫，或吐清水，四肢羸困，面色青黃，飲食雖進，不午肌肉，或寒或熱，沉沉嘿嘿，不知病之去處，其虫不疔，則子母相生，無有休止，長一尺，則能害人。

【處方】鶴虱(去土) 苦楝根(去浮皮) 檳榔 胡粉(炒)各五十兩 白礬(飛枯)十二兩半

【制法】上為末，以麵糊為圓如麻子大。

【劑量及用法】一歲兒服五圓，溫漿水入生麻油一兩點，調勻下之，溫米飲下亦得，不拘時候。其虫細小者，皆化為水，大者自下。

2. 雜病証治類方。

【功能與主治】治諸虫。

【處方】鶴虱(去土) 檳榔 苦楝根 胡粉(炒)各一兩 白礬(枯)二錢半

【制法】上為末，米糊為丸，如桐子大。

【劑量及用法】一歲五丸，量人大小加減丸數。溫漿水入生麻油三、四點打勻送下，清米湯亦可，不拘時。其虫細小者皆化為水，大者自下。

五 花 丸

撫 順

【處方】黨參一兩 檳榔二兩 參朮六兩 阿魏 蘆薈 文蛤 川朴各二兩 麥芽 神曲 山楂 香附各四兩 一稜 炙草各二兩 白朮六兩 胡連四兩 木香 青黛各

氣 滯 積 聚 癥

二兩 白芍 君子各四兩。

【制法】共為細面，水泛小丸。

橘 核 丸

一、上海(濟生橘核丸)

【功能與主治】疝氣偏墜，舉丸脹痛。

【處方】海藻 海帶各二兩 厚朴(制) 枳實(炒)各五錢 橘核(炒)二兩 木通 延胡索(酒炒) 木香 肉桂各五錢 昆布 川楝子肉(炒) 桃仁(去皮尖炒)各二兩

【制法】共研細粉，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二錢，溫開水送服。

二、武 漢

【功能與主治】小腸疝氣，偏墜脹痛。

【處方】炒橘核 海藻(洗) 昆布(洗) 桃仁(麩炒) 海帶(鹽水炒) 川楝子肉(炒)各一兩 厚朴(制) 木通 枳實(麩炒) 延胡索(酒炒) 桂心 木香各五錢

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于三十粒。

【劑量及用法】每服二錢至四錢，空腹時溫酒或鹽湯送下。

三、福州(濟生橘核丸)

【功能與主治】治癰疽，小腸疝氣，舉丸偏墜，小腹寒冷，上下走痛。

【處方】同上海

【制法】共研細末，酒糊為丸。

【劑量及用法】鹽湯或酒下。

四、南 昌

【功能與主治】癰疽，舉丸腫脹或堅硬如石，痛引臍腹，其則腎囊腫脹成瘡，時出黃水，或成癰潰爛。

【處方】木香 延胡索(酒炒) 木通各五錢 川楝子肉(炒) 昆布(洗) 炒橘核各二兩 桂心 枳實(麩炒) 厚朴各五錢 桃仁(麩炒) 海藻(洗) 海帶(洗)各二兩

【制法】共研細末，酒泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二至三錢，黃酒或鹽湯送下，早晚飯前各服一次。

五、沙 市

【功能与主治】治寒疝舉丸腫脹，偏有大小或坚硬如石，痛引臍腹等症。

【处方】橘核 海藻 昆布 桃仁 川棟子各二兩 厚朴一兩 木通二兩 枳實五錢 玄胡索一兩 中安桂 广木香各五錢

【制法】共研細末，冷开水叠为丸。

【剂量及用法】成人量每次服三錢，淡鹽湯(或兌酒少許)送下。每日服二次，小兒老人酌減。

【禁忌】腎臟炎及舉丸發炎者忌服。

六、沈陽(橘核疝气丸)

【功能与主治】除疝去寒，止痛消腫。主舉丸腫痛，小腸疝气，偏墜疼痛，寒冷腹痛。

【处方】金鈴子四兩 茴香二兩 烏藥 元胡 肉桂 葫蘆巴 炮姜 吳茱萸 良姜 橘核各一兩五錢 广木香 川軍各一兩

【制法】共碾細面，水泛小丸。

【剂量及用法】每服二錢，淡鹽水送下。

【禁忌】生冷。

七、撫順(橘核疝气丸)

【功能与主治】暖寒，順气，鎮疝。主寒疝腹痛，舉丸腫大等症。

【处方】橘核 川棟子 良姜 黃連 杜楠 元胡各一兩 广木香 木通各五錢 炮姜 茴香 青皮各一兩 昆布 海藻 桃仁 川朴 枳實各五錢

【制法】共為細面，水泛小丸。

【剂量及用法】每服二錢，淡鹽湯送下。

【禁忌】忌食生冷。勿与甘草同用。

八、吉林、哈尔滨

(神效橘核丸、橘核疝气丸)

【功能与主治】溫寒順气。主疝气，小腸下墜，串入腎囊，脹痛重墜，不敢喘息。

【处方】同南昌。

【制法】共為細面，用水泛為小丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢，用淡

鹽水或溫酒送下。

【禁忌】忌生冷。反甘草不可同服。

附參考古方

【来源】1. 濟世方。

【功能与主治】治癰疽，卵核腫脹，偏有大小，或坚硬如石，或引臍腹絞痛，腐囊腫脹或成瘡毒，輕則時出黃水，甚則成癰潰爛。

【处方】橘核(炒) 海藻(洗) 昆布(洗) 海帶(洗) 川棟子(去肉炒) 桃仁(麩炒)各一兩 厚朴(去皮，炒) 木通 枳實(麩炒) 延胡索(炒去皮) 桂心(不見火) 木香(不見火)各半兩。

【制法】共為細末，酒糊為丸，如桐子大。

【剂量及用法】每服七十丸，空心鹽酒、鹽湯任下。

【備考】虛寒甚者，加炮川烏一兩；堅脹久不消者，加硃砂二錢醋煮，旋入。永樂鈴方多海帶。

2. 笔花匠鏡。

【功能与主治】通治七疝。

【处方】橘核(鹽酒炒)二錢 小茴香 川棟子 桃仁 香附(醋炒) 山查各一兩 木香 紅花各五錢

【制法】以神麵二兩，打糊為丸。

茴香橘核丸

一、北京、承德

【功能与主治】散寒止痛。主偏墜疝气，坚硬疼痛。

【处方】小茴香 橘核 檳榔 香附(醋炒) 青皮 玄胡索 昆布 大茴香各四兩 川棟子 荔枝核各八兩 骨脂 枳殼 穿山甲 木香 乳香各二兩 肉桂 桃仁各一兩

【制法】共為細粉，水泛小丸。

【剂量及用法】每服二錢，日服二次，生薑淡鹽湯或溫開水送下。

【禁忌】忌食生冷。

二、天 津

【功能与主治】消腫散寒，順气止痛。主气疝腎寒，小腸疝气，偏墜疼痛，坚硬不消，日漸脹大。

【处方】小茴香(鹽炒) 橘核(鹽炒) 荔枝核 川棟子(酒蒸) 烏藥 海藻 昆布 桃仁(去皮)各

四兩 厚朴(姜制) 木通 枳殼(麩炒) 元胡(醋制) 广木香各一兩 草撥五錢 肉桂(去粗皮) 吳萸(甘草水制)各一兩

【制法】共為細粉，小丸一涼開水泛小丸，二錢重裝袋，蜜丸一煉蜜為丸，二錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】水丸——每次服一袋；蜜丸——每次服一丸，白開水送下。

三、南京(疝气丸、橘核丸)

【功能与主治】止疝鎮痛。主小腸疝气，偏墜脹疼。

【处方】西當歸 上桂心 焦白朮 品蘆巴各二兩 鹽水炒小茴香一兩 制香附二兩 广木香五錢 淡吳萸 柴胡 酒炒元胡索各一兩 炒青皮 鹽水炒橘核 川棟子肉 淡海藻 炒白芍 淡昆布 西黃芪各二兩 粉甘草一兩

【制法】共研細末，沸水泛丸，每錢約做八十粒。

【剂量及用法】每服二錢，一日三次，每隔四小時服一次。淡鹽水吞服。

四、杭 州

【功能与主治】治各种疝气，舉丸腫脹偏墜，坚硬如石，痛引臍腹，陰囊腫大或生瘡出水，成癰潰爛。凡寒濕疝症，遇寒即發，日久不癒者俱可服之。

【处方】小茴香(酒炒)八錢 橘核(炒) 海藻(洗) 昆布(洗) 海帶(洗) 桃仁 川棟子(炒)各二兩 制川朴 木通 枳實(麩炒) 延胡索 肉桂 广木香各五錢

【制法】共研細末，酒和水泛丸。

【剂量及用法】每服二錢。空腹時溫酒或淡鹽湯送下。

五、沙市(茴香疝气丸)

【功能与主治】治疝气，舉丸腫痛，偏有大小，痛引臍腹等症。

【处方】小茴香二兩 橘核 川棟子各四兩 青鹽五錢 荔枝核二兩 台烏 當歸各二兩 中安桂四錢 粉甘草五錢 广木香一兩 吳萸五錢

【制法】共研極細末，用冷開水

叠为丸。

【剂量及用法】成人量每次服二或三錢，空腹溫開水下，每日服三次。小兒老人酌減。

【禁忌】腎臟炎及睪丸發炎者忌服。

六、西安

【功能与主治】主治各种疝痛，並能除濕利尿。

【处方】同杭州，惟茴香用二兩。

【制法】煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服二錢至三錢，早晚飯前服，黃酒送下。

【禁忌】热性及腸胃等症忌服。

七、蘭州

【功能与主治】消腫散寒，順氣止痛。主小腸疝氣，偏墜疼痛，小腹有突出物堅硬不消。

【处方】茴香 橘核 荔枝核 川楝 烏藥 海藻 昆布 桃仁 各四兩 川朴 木通 枳實 元胡 肉桂 木香 各一兩 草薢五錢 吳萸一兩

【制法】共研細末，水打为小丸。

【剂量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

八、大同

【功能与主治】疝氣，下元寒。

【处方】小茴 橘核 檳榔 香附 青皮 各二斤半 荔枝核五斤 故紙 莖朮 糖球子 木香 乳香 各一斤四兩 元胡 昆布 全蠍 大茴 各二斤半 川楝五斤 蘆巴子二斤半

【制法】共为細面，水为丸。

九、濟南

【功能与主治】小腸疝氣，偏墜腹痛。

【处方】小茴香 荔枝核 橘核 烏藥 海藻 昆布 海帶 川楝肉 各八兩 桃仁 青皮 厚朴 木通 枳實 元胡 各六兩 桂心 木香 各四兩 草薢六兩

【制法】共为末，水泛丸。

【剂量及用法】每服二、三錢，白開水或黃酒送下。

【禁忌】生冷油膩辛辣等物。

十、沈陽

【功能与主治】調氣和血，止痛消腫。主少腹疝氣，睪丸疼痛，偏墜引痛，寒氣腫痛。

【处方】橘核 小茴香 各二兩 川楝子 桃仁 香附 山楂 各一兩 广木香 紅花 各五錢 神曲 三兩

【制法】共碾極細面，神曲糊为丸，一分重。

【剂量及用法】每服二錢，黃酒送下。

【禁忌】生冷刺激物。

十一、呼和浩特

【处方】茴香 荔枝核 橘核 烏藥 海藻 昆布 海帶 楝子 桃仁 川朴 木通 枳實 元胡 肉桂 木香 草薢 各等分

【制法】共为細面，水泛小丸。

一二層茴香丸

濟南

【功能与主治】延年近日各种疝氣。

1. 一層茴香丸

【处方】大茴香五錢（同鹽五錢炒黃后，共称准一兩）川楝子（盐炒）一兩 沙參一兩 广木香一兩

【制法】共研細粉，煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服三錢，日服二次或三次，空心溫酒或鹽湯送下，服完接服第二层，不可間断。

【禁忌】过勞，气惱，寒涼。

2. 二層茴香丸

照前方再加萆薢一兩，檳榔五錢，共五兩五錢，依前方作丸，服法如前，若未愈接服第二层，不可間断。

3. 三層茴香丸

照前一層，再加云苓四兩，炮附子一兩，与前共八兩，共重十兩五錢，制法服法如前。若遲延不痊癒，盡量服第三层，虽三十年之沉痾，亦可消散。

良方三層茴香丸

福州

【功能与主治】治腎与膀胱俱虛，邪气搏結不散，遂成寒疝，臍腹疼痛，陰丸偏大，腎囊壅腫有妨行

步，或搔痒不止，时出黃水，浸成瘡瘍，或長怪肉，或外腎腫脹，冷硬如石，日以漸大，須溫導阳气，漸退寒邪，補虛消疝，緩養腎經，凡一切小腸氣寒疝之疾，久新不过三料。

第一料

【处方与制法】舶上茴香（用鹽半兩同炒焦黃和盐秤用一兩，連下共重四兩）川楝子（炮去核）沙參（洗）木香 各一兩

上为細末，米糊丸，桐子大。

【剂量及用法】每服三十丸，空心溫湯或鹽湯送，日二服，小病一料可安，病深者一料才尽，便可用第二料。

第二料

【处方与制法】如前方加萆薢一兩 檳榔五錢 上六味共重五兩半，依前糊丸。

【剂量及用法】服如前若未愈再服第三料。

第三料

【处方与制法】如前方加白茯苓（佳者）四兩 附子（炮去皮臍或五錢或一兩）

上八味共重十兩五錢。

【剂量及用法】服如前，漸加至四五十丸，小腸氣頻發及三十年者，或人如栲栳者，皆可消散神效。

胡蘆巴丸

一、天津（理疝丸）

【功能与主治】散寒止痛。主小腹痛滿，上下牽痛，睪丸堅硬，偏墜寒疝。

【处方】蘆巴子八兩 木通四兩 川楝子（酒蒸）八兩 柴胡四兩 川芎三兩 吳萸（甘草水制）五兩 小茴香（盐炒）广木香各二兩 巴戟肉（甘草水制）五兩 橘核（盐炒）荔枝核各二兩 元胡（醋制）沉香制川烏 肉桂（去粗皮）各一兩

【制法】共为細粉，涼開水泛小丸，二錢重裝袋。

【剂量及用法】每次服一袋，白開水送下。

二、上海

【功能与主治】疝氣偏墜，睪丸脹痛。

【处方】胡蘆巴（炒）八兩 小茴香（盐炒）六兩 吳萸（洗炒）五兩

川楝子(炒)九兩 川烏(制)二兩
黑丑五兩 巴戟肉(炒)二兩

【制法】共研細粉，酒糊為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，食前淡鹽湯送服。憑區外方購用。

三、杭州(理疝胡蘆巴丸)

【功能與主治】治一切疝氣，偏墜陰腫，舉丸堅硬，痛不可忍，繞腹攻刺，嘔吐悶亂等症。常服益腎散寒，疝氣自消。

【處方】胡蘆巴(炒)八兩 吳茱萸(甘草湯泡)五兩 巴戟肉(炒)三兩 小茴香(鹽水炒)六兩 川楝子(去皮核炒)八兩 制川烏二兩

【制法】共研細末，酒煮面糊為丸。

【劑量及用法】壯年每服二錢，小兒每服八分。空腹時溫酒或茴香煎湯送下。

附參考古方

【來源】重刻太平惠民和劑局方。

【功能與主治】治大人小兒小腸氣，蟠腸氣，奔豚氣，疝氣，偏墜陰腫，小腹有形如卵，上下来去痛不可忍，或絞結透臍攻刺，嘔惡悶亂，並皆治之。

【處方】胡蘆巴(炒)一斤 茴香(淘淨炒)十二兩 吳茱萸(湯洗七次炒)十兩 大巴戟(去心炒)川烏(炮去皮)各六兩 川楝子(炒)一斤二兩

【制法】上為末，酒煮麪糊為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服十五丸，空心溫酒下。小兒茴香湯下五丸。

疝氣丸

濟 南

【功能與主治】寒疝，氣疝。

【處方】川楝子四兩 木香二兩 吳茱萸一兩(炒) 小茴香二兩(炒)

【制法】共為細粉，黃酒打糊為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服三錢，黃酒送下。

【禁忌】忌生冷食物。

木香金鈴丸

一、大 同

【功能與主治】腎陰虧損，下元寒冷，小腸疝氣偏墜。

【處方】木香 金鈴子 沙參各二兩 大茴 食鹽各一兩五錢 萆薢二兩 茯苓四兩 檳榔一兩一錢 附子一兩

【制法】共軋細面，水為小丸。

【劑量及用法】每服二錢。

二、沈 陽

【功能與主治】順氣祛寒，鎮痛除疝。主肝氣腎寒，小腸串氣，小腹硬痛，陰囊結腫，舉丸如冰，疼痛難止，左右偏墜。

【處方】木香 乳香 沒藥 熟附子 鹽茴香 金鈴子 元胡索 党參 青全蠍各一兩

【制法】共碾極細面，酒糊為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，空腹姜水送下。

【禁忌】生冷。

回 春 丸

沈 陽

【功能與主治】舒肝順氣，溫中散寒。主小腹串痛，下焦寒脹，寒疝氣痛，腸中冷痛，舉丸脹大，重墜腫痛，肝兩脇疼痛。

【處方】茯苓 白朮 山楂 大茴香 吳茱萸 荔枝核各一兩 枳實八分 橘核二兩

【制法】共碾極細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空腹姜水送下。

【禁忌】生冷硬物。

附參考古方

【來源】認春精方(珍本醫書集成)

【功能及主治】治疝如神。

【處方】茯苓 白朮 山楂(炒) 大茴香 吳茱萸各一兩 荔枝核(炒)一兩 枳實八分 橘子核(炒)二兩

【制法】上為細末，煉蜜丸，每丸一錢五分重。

【劑量及用法】空心每細嚼一丸，姜湯送下。

三 和 散

沈 陽

【功能與主治】宣通氣滯，除脹化郁。主心腹痞悶，脇肋腫脹，風氣壅滯，手足腫痛。

【處方】檳榔 木香 陳皮 川芎 白朮各二錢 腹皮 川羌 紫蘇 宣木瓜 沉香各一兩 炙甘草五分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二錢，開白水送下。

【禁忌】不消化之食物。

附參考古方

【來源】重刻太平惠民和劑局方。

【功能與主治】治五臟不調，三焦不和，心腹痞悶，脇肋腫脹，風氣壅滯，肢節煩疼，頭面虛浮，手足微腫，腸胃燥澀，大便秘難，雖年高氣弱，並可服之。又治背痛脇痛，有妨飲食，及脚氣上攻，胸腹滿悶，大便不通。

【處方】檳榔(麩裏煨熟，去麩) 甘草(炙) 木香 陳皮(去白) 芎藭 白朮各三分 大腹皮(炙，焦黃) 羌活(去蘆頭) 紫蘇(用葉，去粗梗) 宣州木瓜(薄切焙干) 沉香各一兩

【制法】上為粗末。

【劑量及用法】每服二大錢，水一盞，煎至六分，去滓溫服，不計時候。

木香調氣散

沙 市

【功能與主治】治寒濕氣滯，脘脹腹痛等症。

【處方】廣木香二錢 廣藿香五錢 炙甘草二錢 公丁香一錢 砂仁二錢 白蔻仁一錢五分 白檀香 制香附 佛手片各二錢

【制法】共研極細末。

【劑量及用法】成人量每次服二錢，溫開水送下。如兼感冒風寒者，用蘇葉二錢，生薑一錢煎湯調服。

【禁忌】因胃炎而氣滯腹痛者忌服。

五香散

昆明

【功能与主治】健胃助消化。主气逆腹痛。

【处方】丁香六錢 乳香八錢 香附 台烏 青皮 良姜各一兩 吳萸 陈皮 檳榔各八錢 華撥六錢 畢澄茄五錢 桂心 元胡 郁金各六錢

【制法】研末。

【剂量及用法】每服二錢半，幼童減半。用开水送下。

【禁忌】炎症腹痛不宜服用。

嘉禾散（谷神散）

福州

【功能与主治】治脾胃不和，胸膈痞悶，气逆生痰，不进飲食，五膈五噎。

【处方】茯苓 砂仁 薏米（炒） 枇杷叶（去毛姜炙） 桑白皮（炒） 沉香（磨汁） 五味子 白豆蔻 炙甘草 丁香 人參 白朮各五分 木香（磨汁） 青皮 陈皮 杜仲（姜汁炒） 谷芽（炒） 藿香 腹皮（洗） 石斛（酒炒） 半夏（炒） 神曲（炒） 随風子各三分 檳榔二分

【制法】共研粗末。

【剂量及用法】加生姜三片，棗二枚煎服。

清咽散

沈陽

【功能与主治】化痰开郁降濁。主喉中有物，咳之不出，嚥之不下，妇人患者居多，俗名梅核气，症重者日久延及噴門，即成嘔吐噎膈等症。

【处方】半夏一兩 橘紅五錢 大黃五錢 茯苓二錢五分 苏叶二錢五分 元明粉二錢五分 殭蚕 桔梗 連翹 訶子肉 杏仁 甘草各二錢五分

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】每服少許，置舌上干嚥之（食后臨臥时为佳）。

胡椒散（胡椒灵脂散）

吉林

【功能与主治】化滯消痰，止嘔

和胃，通便瀉下之品。主男女老少心腹气痛，嘔吐酸水，兩脇脹悶，嘈杂痞悶，食水停滯等症。

【处方】广木香 明雄 紅花 巴豆霜 白胡椒各四分 枳壳二錢 公丁香四分 生灵脂四錢

【制法】共为細末，紙包用遮光磨口瓶貯之。

【剂量及用法】每服六分。开水送下。

【禁忌】孕妇忌用。

消脹寬膨散

福州

【功能与主治】專治气脹气膨，小兒疳積腹大，妇人胸痞脘痛等症。

【处方】活蝦蟆十个

【制法】將腹皮剖开用五灵脂、砂仁各半，研末填滿腹中以酒搗黄土包裹，炭上煨燥研末。

益欢散

杭州

【功能与主治】治气郁臌脹，胸腹脹滿，气急难臥，二便不暢，神倦肢瘦，吐腹單脹，無論新久皆可服之。

【处方】大蟾蜍一只

【制法】用春砂仁塞滿腹中，黄泥封固，炭火煨紅，冷透出火毒去泥，研細末为度。

【剂量及用法】每服一至二錢。温酒或米飲湯送下。

檳榔消痞散

沈陽

【功能与主治】通腸胃，化宿食，破必結，杀虫导积。主小兒食积奶积，虫积水积，一切积聚，飲食不思，腹痛膨脹，肚大青筋，四肢瘦弱。

【处方】檳榔炭二兩 雞內金一兩 麥实四兩 焦山楂二兩半 使君子肉一兩半

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】小兒五岁以內者每服一、三分，五岁以上者每服五分至一錢，开水送下。

六分散

呼和浩特

【功能与主治】專治胃脘痛。

【处方】白胡椒 沉香 檀香 丁香各二錢 干姜 母丁香 降香各三錢 麝香一分 巴豆霜五分 肉桂二分 吳萸 木香各三錢

【制法】共为細面。

【剂量及用法】每服六分，干用，忌水半点钟为要。

定痛五香散

杭州

【功能与主治】治气滯血瘀，寒湿停飲，胸脇脹滿，各种肝胃气痛等症。

【处方】广木香 广郁金 延胡索 制香附 水紅花子各二兩 猪牙皂（炒黑）一兩

【制法】共研細末。

【剂量及用法】每服一錢五分至二錢。温酒或开水送下。

磨积散

济南

【功能与主治】男妇老幼五积六聚，痞积成塊，小兒虫积、食积、乳积及一切停滯。

【处方】三稜 莪朮各二兩 檳榔四兩 山楂片二兩 雞內金 紅袖 君子仁各五錢 巴豆霜八錢

【制法】共为細面。

【剂量及用法】每付八分。空心紅糖水送下，开水亦可。

【禁忌】宜少量服。孕妇忌服。

化积散

济南

【功能与主治】男妇五积六聚，癥瘕痞癰，小兒乳积食积虫积，积聚痞塊。

【处方】檳榔十斤 三稜 莪朮各五斤

【制法】共为細面，每斤加巴豆霜一兩六錢。

【剂量及用法】每付一錢，紅糖水送下，小兒酌減。

【禁忌】孕妇忌服。

化痞散

撫順

【功能与主治】健胃整腸驅虫。

主胃腸不調，消化不良，痞滿脹痛，腹大青筋，肌瘦發熱，腹大頸細，虫積食積，腹痛惡心，寐而驚啼或成疳疾等症。

【處方】二仙九錢 使君子仁 山藥 扁豆 白朮 黨參 茯苓 燕蕒 芡實 鷄內金各二錢 黃連 清半夏 陳皮 厚朴 胡黃連 硃砂各二錢

【制法】共為細粉，每服一錢。

【劑量及用法】小兒週歲以上者服一分至二分，余者量兒大小酌用之。

【禁忌】胃腸衰弱，無熱久泄者忌服之。

杀 虫 散

一、大 同

【功能與主治】蛔虫。

【處方】苦楝皮三錢 雷丸五錢 君子仁四錢 鶴虱三錢 柿霜二兩 板榔三錢。

【制法】共為細面。

【劑量及用法】成人每服一包，白糖水化服。

二、沈 陽

【功能與主治】杀虫除積，主男婦小兒，一切虫積，五疳羸瘦，肚大青筋，善饑善食，喜食泥土，腹痛時作時止，食積腹脹等症。

【處方】苦楝皮一兩 雷丸二兩 樞子一兩 牽牛一兩 使君子一兩 燕蕒一兩 大黃一兩 蘆薈一兩 鶴虱一兩

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】成人每服一錢，白水送下，十二歲以下者減量服之。

【禁忌】孕婦忌服。

三、吉林、哈爾濱

【功能與主治】杀虫(蛔虫)。

【處方】錫灰 楝皮各一兩 陳皮 板榔各五錢 雷丸 鶴虱 半夏 樞子 君子各三錢

【制法】將以上藥品，共研為極細面，絹羅篩過(篩二、三次以極細為度)。用玻璃瓶貯存。

【劑量及用法】週歲小兒每服一分，三歲以下每服二分，三歲以上每服三分，成人每服一錢。白水調服。

【禁忌】忌食腥辣。孕婦勿服。

四、呼和浩特

【處方】板榔 雷丸 二丑 使君子肉各等分

【制法】共細面。

化 虫 散

一、沈 陽

【功能與主治】驅虫消積，健脾止痛。主虫積食積，腹脹腹痛，肚大青筋，面黃肌瘦，喜食泥土，一般虫症。

【處方】板榔 雷丸 熟大黃各二錢 使君子 黑白丑各三錢 廣木香二錢 樞子肉四錢 苦楝根皮二錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】大人每服二錢，小兒五分，早晨空心，白糖水調服。

【禁忌】孕婦忌服。

二、撫 順

【處方】雷丸五錢 使君子三錢 樞子 板榔各一兩半。

【制法】共為細面。

蟲 症 散

呼 和 浩 特

【處方】木香 板榔 黑丑 白丑 大戟(醋炙) 芫花(醋炙) 商陸(醋炙) 牙皂 木通 澤瀉 甘遂(醋炙)各等分

【制法】共為細面，瓶裝四錢，亦可糊為小丸。

【劑量及用法】燒酒送下。

牡丹五籌散

沈 陽

【功能與主治】活血驅風，消腫止痛，主癰疽腫痛，睪丸下墜，時行腫大，行步艱難，牽引小腹疼痛。

【處方】牡丹皮 防風 黃柏 桂枝各一錢 桃仁二錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服一分，週歲以下小兒服半分，以米湯或乳汁送下。

附參考古方

【來源】外台秘要。

【功能與主治】疔癰疽，陰囊偏

大，百氣上下脹大行走腫大，服此良驗方。

【處方】牡丹皮 防風 黃蘗(炙) 桂心各一分 (桃仁去皮尖研)二分

【制法】上搗為散。

【劑量及用法】以酒服一升，二十日愈，少小癰疽最良；小兒以乳汁和，如一大豆与之。

【禁忌】胡葵。

疝 氣 散

沈 陽

【功能與主治】暖腎疝氣。主小腹脹滿，小腸疝氣，牽引腰痛，外腎松懈，睪丸墜痛。

【處方】吳萸 枳殼 焦山梔 炒山楂 荔枝核各等分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】涼物。

沉茄止疝散

沈 陽

【功能與主治】祛小腸疝氣，主寒疝腹痛，四肢厥冷，嘔吐出汗，面色蒼白。

【處方】大茴沉 茄子 吳萸各九錢 桂楠三錢 元胡九錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】大人每服二錢，小兒每服一、三分，淡鹽湯送下。

【禁忌】涼及生冷食品。

阿魏化痞膏

一、北 京

【功能與主治】化痞消積，杀虫止痛。主腹中積聚痞塊，胸脇脹滿，肚腹疼痛，以及婦女瘕瘕血塊。

【處方】大蒜 香附 大黃 川烏(生) 三棱 當歸 莪朮 穿山甲(生) 白芷 使君子 厚朴 蓖麻子 木鱉子 草烏(生) 蜈蚣 胡黃連各二兩

【制法】用香油二白四十兩炸枯去渣，煉至滴水成珠，入黃丹一百兩攪勻成膏，另兌。

乳香 沒藥 蘆薈 血竭各一兩二錢 阿魏八兩 樟腦 雄黃 官

桂各六兩

共为細粉，每十六兩膏油兌藥粉五錢，攪勻攤貼。

【劑量及用法】微火化開貼胸口或臍上。

【禁忌】忌油膩。孕婦忌貼。

二、天 津

【功能与主治】消積化痞，消脹止痛。主腹中積聚痞塊，胸脇脹滿，肚腹疼痛，及婦女瘰癧血塊，寒積食滯。

【處方】生香附 枳榔 生三稜 生莪朮 燕蕒 生青皮 大黃 牛山甲 生元胡 巴豆 干姜 使君子 生南星 生萊菔子各三兩

【制法】用香油十五斤，炸枯去渣濾淨，煉至滴水成珠，再入牽丹九十兩攪勻成膏。每膏藥油十五斤兌：

阿魏面四兩五錢 沉香面 硫黃面各七錢五分 輕粉面一兩五錢 雄黃面 蘆薈面 廣木香面 公丁香面各七錢五分

攪勻，每大張淨油六錢，中張淨油四錢，小張淨油二錢。

【劑量及用法】貼肚腹上。

【禁忌】孕婦忌貼。

三、西 安

【功能与主治】化痞積。

【處方】當歸尾 紅花 金銀花 三稜 白芥子 蓬莪朮 葫蘆巴 昆布 生地 桃仁 亂頭髮 大黃 熟地 鱉甲 川山甲各一兩 海藻 兩火尖 阿魏 蓖麻子 川烏頭 巴豆仁 黃連 天南星 漏蘆 大貝母 半夏 川草薢 大戟 胡黃連 甘遂 鳳仙子 芫花 海浮石 阿膠 威靈仙 枳榔 姜蚕 全蠍 瓜蒌 血竭 乳香(去油)各三錢 土木鱉 番木鱉 獨蒜各三十個 蜈蚣三十條 水紅花子四兩 鮮商陸八兩 活鱔魚(重半斤者)一尾 麻油三斤 黃丹(飛晒炒)一斤八兩 麝香一錢

【制法】用麻油熬成膏，惟乳香、沒藥、麝香、血竭、阿魏五味另研收貯。煎攤時摻膏藥上。

四、蘭 州

【功能与主治】消積化痞，殺虫止痛。主腹中積聚痞塊，腸寄生虫，胸脇脹滿，肚腹疼痛，以及婦女瘰

癧，血塊積聚。

【處方】同天津，分量各用二兩。

【制法】香油十斤、章丹五十兩熬膏。

【劑量及用法】將此膏溶化，貼在肚臍上。

【禁忌】孕婦勿貼。

五、禹 縣

【功能与主治】小兒痞疾，婦女瘰癧血塊，大人積聚，肚腹膨脹疼痛等症。

【處方】三稜 蓬莪朮 大黃 穿山甲 白芷 木鱉 大麻子 牙皂 巴豆 梔子 黃連 胡黃連各二兩 蘆薈 入竹黃 血竭 兒茶 輕粉各一兩 蜈蚣十五條 阿魏四兩 乳香 沒藥各二兩 麝香二錢 冰片四錢 香油十斤 黃丹五斤

【制法】煎枯去渣，再熬至滴水成珠，外加穿山甲、蘆薈、天竹黃、血竭、兒茶、輕粉、蜈蚣、阿魏、乳香、沒藥、麝香、冰片。

【劑量及用法】將膏藥煖開，貼痞塊上。

【禁忌】孕婦忌用。

【備考】有效期二年。

六、濟 南

【功能与主治】主小兒積聚，腹中痞塊，胸脇脹滿。

【處方】巴豆 燕蕒 吳茱萸各一兩 大黃 大戟 枳榔 胡連各一兩五錢 甘遂 芫花 千金子(熟碎) 鷄內金 三稜 莪朮 秦艽 鱉甲 穿山甲 草豆蔻 萊菔子 白朮各二兩

【制法】用香油七斤 泡三日，熬枯去渣再熬至滴水成珠，加官粉三斤八兩收成膏，再加阿魏一兩、乳香五錢、沒藥五錢、肉桂五錢、丁香五錢、木香二錢五分共為細粉，將膏離火攪溫兌入，再攪勻收膏。

【劑量及用法】每張三至五錢，貼臍上。

【禁忌】忌食生冷油膩等物。

七、撫順(化痞膏)

【處方】甲魚一個 三稜 莪朮 川芎 全歸各一兩 黃丹三十兩 香油三斤。

【制法】后入乳香、沒藥、阿魏各五錢成膏，每張加麝香二分。

八、呼和浩特

【處方】大黃 千金子 生山甲 生三稜 甘遂 秦艽 草薢 莪朮 芫花 炙鱉甲 內金 萊菔 白花菜子各四兩 大戟 枳榔各一兩五錢 胡連 燕蕒 吳茱萸各一兩

【制法】用香油七斤熬至滴水成珠，加官粉二斤十兩成膏臨攤時兌阿魏一兩 木香二錢五分 乳香 丁香 肉桂各五錢 共為細面，每斤膏兌五錢。

消 痞 膏

武 漢

【功能与主治】積聚痞塊，肚腹脹痛。

【處方】川芎活 紅花各二兩 穿山甲六錢 陀僧十二兩 麻油三斤

【制法】以麻油三斤泡五日後，置火上熬至藥枯，去渣濾盡，再熬至滴水成珠，加陀僧十二兩收膏。轉置鉢中貯，浸水數日，塗于紅布上。小張五錢，大張一兩。

【劑量及用法】視患處大小，选取適用者，貼于患處。

【禁忌】孕婦忌用。

消痞狗皮膏

一、南 京

【功能与主治】主痞塊血塊，瘰癧積聚，腹脹疼痛等症。

【處方】獨蒜大 牛乳烏 京三稜 生地 木鱉子各一兩 胡黃連二錢 白附子 生草烏 莪朮 赤芍 蓖麻子 生穿山甲 生大黃 梔子 川黃柏各一兩 川黃連六錢 西當歸一兩 蜈蚣虫十四個 官桂一兩 大蜈蚣一條 香白芷一兩

【制法】用麻油五斤浸泡一宿，炸至枯黑，去渣濾清，熬至滴水成珠時，用黃丹(炒透)三十三兩收膏，臨用時，將后藥七味研末，和入攪勻。阿魏 樟腦 雄黃各二兩 血竭 蘆薈各七錢二分 制乳香 制沒藥各四錢 用狗皮攤成膏藥。

【劑量及用法】貼于患處。

二、福 州

【功能与主治】治一切痰氣痞

塊，癥瘕血塊聚積，腹脹疼痛等症。

【處方】三稜 蓬莪朮 苡米仁 山梔 秦艽各一兩五錢 川連四錢 大黃 當歸各九錢 山甲四十片 全蠍四十個 木鱉二十個 巴豆十粒

【制法】上用麻油四斤煎枯去渣，后下黃丹一斤半，收膏加入：

阿魏 阿膠 蘆薈各一錢 麝香 乳香 沒藥各二錢 研末調入膏中，攤狗皮上。

【劑量及用法】用時將膏在熱茶壺上烘至煖烘貼患處，以手心搖白轉，無不效驗。

【禁忌】百日內禁忌酒色氣惱，勞心勞力，諸般發物，貼後能作寒熱，肚痛下穢，其疾即癒。

三、杭州

【功能與主治】治肝郁氣結，痞塊血塊，癥瘕聚積，腹脹疼痛等症。能舒肝通氣，散結消塊。

【處方】透骨草 京三稜 大黃 萊菔子 穿山甲 水紅花子各二兩 蜈蚣一兩五錢 全當歸 大蒜頭 杏仁 莪朮 木鱉子各二兩 全蠍一兩五錢

【制法】用麻油十五斤，熬枯去渣，煎至滴水成珠。再加章丹六十兩、阿膠二兩收膏。臨攤時每淨藥肉一斤再加：

麝香四分 蘆薈 制乳香 制沒藥各二錢 阿魏一兩 梅冰片五分 各研細粉，同藥肉攪勻，攤于狗皮上。用時將膏在滾水茶壺上烘熱烘熔，貼于患處。再用暖手揉白全轉，能作寒熱，腹痛下穢，其疾自愈。

【禁忌】百日內忌酒色、氣惱、勞役、發物。

四、西安

【功能與主治】主治腹中痞塊，癥瘕聚積，寒氣凝結之腹痛腹瀉，消化不良等症。

【處方】一、阿魏一兩 肉桂 公丁香各五錢 木香四錢 乳香 沒藥各六錢 麝香一錢

二、乃應膏藥（即乃寶珍膏之方劑而不加細料者）一斤半

【制法】將一項各藥研極細，再將二項之藥膏以水蒸汽溶化摻入第一項藥末和勻，攤于狗皮之上。

【劑量及用法】將膏藥在開水壺

上蒸化揭開，敷于患處。

【禁忌】孕婦忌用。

化 癖 膏

禹 縣

【功能與主治】男婦寒積食積，氣血痞塊，腹脹發熱。

【處方】大黃 白芷 三稜 莪朮 木鱉各二兩 蜈蚣十二條 山甲二兩 巴豆三十個 全蠍十二個 人參子 黃連 胡黃連各二兩 血竭一兩 蘆薈一兩 輕粉一兩 阿魏二兩 草薺五兩 麝香一錢 冰片一錢 香油十斤 黃丹五斤四兩

【制法】熬枯去渣，入黃丹熬成膏，再入血竭 蘆薈 輕粉 阿魏 草薺 冰片 麝香。

【劑量及用法】成人一大張，小孩一小張。攤在布上貼之。

【禁忌】孕婦忌用。

【備考】有效期一年。

麝香化痞膏

沙 市

【功能與主治】專治癥瘕聚積，痞滿腹脹等症。

【處方】生地 南星 川芎 草烏 陳皮 莪朮 海風藤 赤芍 獨活 山柰 蒼朮 香附 桂皮 柴胡 烏藥 桃仁 蘇木 麻黃 大黃 當歸 枳殼 荆芥 羌活 防風 三稜 續斷 甘松 牙皂 首烏 川烏 五加皮 白芷 威靈仙，劉寄奴 良姜 連翹各二錢

【制法】用麻油四斤熬枯去渣，下淨血余一兩溶化再下黃丹二十兩，熬成膏再將阿魏一兩中安桂 公丁香各五錢 麝香一錢 廣木香四錢 乳香（去油）沒藥各六錢 冰片五錢 共研細末，將藥末攪入，攤于狗皮上。

【劑量及用法】用時須將此膏在溫處烘熱，張開貼患處，再用熱毛巾揉腹部多時，能下穢物，其患可愈。

二 龍 膏

一、北 京

【功能與主治】化痞消積。主積聚痞塊，面色萎黃。

【處方】甲魚 鮮鳧菜各十六兩

三稜 莪朮各一兩

【制法】用香油二斤四兩，炸枯去渣，煉至滴水成珠，入黃丹一百兩成膏。乳香 沒藥各五兩 麝香四錢 肉桂 沉香各九錢 共為細粉，每十六兩膏油兌藥粉五錢。

【劑量及用法】微火化入貼臍上。

【禁忌】孕婦忌貼。

二、天 津

【功能與主治】活血散瘀，消積化痞。主腹內積聚痞塊，肚腹脹痛，面黃肌瘦，消化不良。

【處方】活甲魚（每個不得小于一斤）兩個 鳧菜二斤 生三稜 莪朮各八兩

【制法】以上藥料用香油十五斤，炸枯去渣濾淨，煉至滴水成珠，加入章丹九十兩攪勻成膏。每膏藥油十五斤兌：

乳香面 沒藥面各二兩 麝香四分 攪勻。每大張淨油六錢，中張四錢，小張二錢。

【劑量與用法】貼肚腹。

【禁忌】孕婦忌貼。

三、呼和浩特

（異授二龍膏）

【處方】活甲魚五個 鮮鳧菜五斤 三稜 莪朮各四兩

【制法】用香油十六斤，熬一匙許，再將鳧菜熬枯去渣滴水成珠，加黃丹成膏。再兌下列細料：乳香 沒藥各五兩 冰片一錢 麝香一錢 研細面，每斤膏兌五錢。

水 蓬 膏

天 津

【功能與主治】消脹利水，活血化瘀。主胸腹积水，脹滿疼痛，聚積痞塊，四肢浮腫，小便不利。

【處方】水蓬花 大黃 當歸尾 生三稜 生莪朮 生山甲 秦艽 牛蒡花 蘆薈 牛大戟各五錢

【制法】用香油十五斤，炸枯去渣濾淨，煉至滴水成珠，再入樟丹九十兩攪勻成膏。每膏藥油十五斤兌：

血竭面 肉桂面各五錢 攪勻。大張淨油八錢，小張淨油五錢。

【劑量與用法】貼肚腹。

【禁忌】孕妇忌贴。

八宝瑞生丹

一、沈 陽

【功能与主治】开郁健胃。主心胃疼痛，胀闷腹饱，吞酸嘔吐，消化不良，气逆不舒，胸胁攻痛。

【处方】当归二兩六錢 茯苓 苹果各一兩一錢五分 元胡二兩六錢 干姜一兩五錢 草豆蔻二兩半 良姜二兩二錢五分 郁金 肉桂各一兩半 山楂二兩六錢 香附二兩 神曲二兩五錢 紫蔻 炙甘草各一兩

【制法】共碾細面，煉蜜为丸。二錢重。蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下，姜湯亦可。

【禁忌】生冷。

二、撫 順

【功能与主治】温脾健胃。主胃弱消化不良，胃痛嘈杂，吞酸嘔吐，食积气积水积，胸痞脹滿，便溏寒疝等症。

【处方】当归 元胡各二兩六錢 郁金一兩五錢 香附 茯苓各二兩六錢 苹果二兩二錢五分 桂楠一兩五錢 山楂二兩六錢 炙草一兩五錢 干姜一兩五錢 神曲二兩二錢五分 紫蔻 良姜各二兩五錢

【制法】共为細面，蜜丸二錢重。蜡皮封。

【剂量及用法】每服一丸，生姜水送下，早晚二次服之。

【禁忌】孕妇及患胃炎者忌服。

三、吉林、哈尔滨 (瑞生丹)

【功能和主治】温寒消食，理气化湿。主寒伤脾胃，不能运化，胸脘脹滿，中脘疼痛，嘈杂泛酸，朝食暮吐，食积，积食伤脾，脾胃虛弱，不思飲食，食后困倦，消化不良，脘痛唐泄，气积，暴气停食，脘脹气促，食入作噎。水积，脾不宣湿，水停胃脘，漉漉有声，胸膈痞滿；寒疝，疝气攻串，遊痛無定，腎囊脹痛。

【处方】当归二兩六錢 茯苓 苹果各一兩一錢 元胡二兩六錢 干姜 郁金各一兩半 草蔻 良姜各二兩一錢 肉桂一兩半 山楂

香附各二兩六錢 神曲二兩二錢 炙草一兩五錢

【制法】共为細面，煉蜜为丸二錢一分重，大赤金衣。

【剂量及用法】黄酒为引，或白水亦可，每服一丸，早晚服二次。

【禁忌】孕妇忌服。

平肝舒絡丹

北 京

【功能与主治】疏郁理气，健胃止痛。主肝郁气滞，飲食不消，倒飽嘈杂，兩脇刺痛，四肢抽搐。

【处方】人参(去蘆) 熟地 乳香 沒药 橘皮 香附 厚朴 玄胡索 茯苓 檀香 龟版(炙) 羌活 防風 紫豆蔻仁 枳壳 砂仁 藿香 木香 烏药 黃連 白朮 何首烏 白芨 威灵仙 佛手 木瓜 鉤藤 殭蚕 柴胡 細辛 白芷 桑寄生 牛膝各三錢 沉香一兩 青皮 天竺黃 肉桂 川芎 公丁香各二錢 胆南星五錢

共为細粉，每十二兩四錢細粉兌。

冰片二錢 硃砂一兩 羚羊角一錢

【制法】上药和匀，煉蜜为丸，重二錢，全箔为滿衣，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，日服二次，温开水送下。

舒 郁 丹

北 京

【功能与主治】理气止痛，健胃化滯。主兩脇刺痛，膨悶腹飽，食慾不振，呃逆吞酸。

【处方】香附二兩 厚朴一兩 白芍五錢 枳壳一兩 橘皮四兩 川芎 青皮各五錢 片姜黃 青皮各一兩 柴胡 橘核 山楂各五錢 玄胡索一兩 檳榔 六神麴 川棟子各五錢 人黃三錢 甘草二錢 麦芽五錢 当归二兩 赭石一兩(煅) 沉香二錢 砂仁五錢 紫豆蔻仁三錢 木香五錢 硃砂一錢

【制法】共为細粉，水泛小丸，滑石为衣闔亮。

【剂量及用法】每服二錢，日服二次，温开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

沉香舒郁丹

天 津

【功能与主治】舒气开胃，化郁止痛。主胸腹脹滿，胃部疼痛，嘔吐酸水，消化不良，食慾不振，郁悶煩惱。

【处方】广木香十二兩 青皮(醋炒)四兩 厚朴(姜制) 广皮各十兩 枳壳(麸炒)七兩 甘草二兩 香附(醋制) 元胡(醋制)各四兩 片姜黃二兩 南柴胡四兩 薏仁八兩 沉香十兩 砂仁八兩

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，二錢重。蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，白开水送下。

【禁忌】孕妇及体虛者勿服。

沉香化气丹

沈 陽

【功能与主治】調气化滯，健胃整腸。治胸膈脹滿，胃腸疼痛，食积不消，嘈杂嘔吐，气郁不舒。

【处方】香附子一斤(炒六兩內生四兩) 官桂五錢 黑丑(头末)八兩 蒼朮四兩 砂仁一兩 青皮 陈皮各五兩 白豆蔻一兩 山藥 枳壳各二兩 半夏一兩 三稜二兩 厚朴一兩 苹果一兩半 紫苏 莢 朮各二兩 茯苓一兩 沉香七錢五分 木香一兩 山楂(炒)二兩 干姜 良姜 天南星各一兩 人參五錢 檳榔一兩 石菖蒲二兩 神曲一兩

【制法】共碾極細面，醋糊为小丸。

【剂量及用法】每服二錢，姜湯送下。

【禁忌】中气虛弱者及孕妇忌服。

附参考古方

【来源】增补寿世保元。

【功能与主治】脾胃不和，过食生冷油腻，面粉湿面，停滯不化，胸膈滿悶，嘔逆惡心，腹脇膨脹，心脾疼痛，憎寒壯熱，或面上四肢浮腫，甚至臟腑悶澀，上气喘急，睡臥不安，俱是有因气所伤，寒氣、咽氣、膈

气、滯气、痞气、癖气塊，一切气並治用此。

【处方】香附子一斤(炒，內四兩生用) 黑牽牛、天木八兩 蒼朮米泔浸炒四兩 青皮(去穢炒) 陈皮各五兩 山藥 枳壳(麸炒) 枳實(麸炒)各二兩 厚朴(姜汁炒)一兩 三稜(煨) 莪朮(煨) 紫蘇各二兩 木香一兩 沉香七錢五分 丁香三兩 丁皮二錢二分 官桂五錢 干姜 砂仁 良姜各一兩 草果(去壳)一兩五錢 白豆蔻(去壳) 南星(炮) 半夏(炮)各一兩 人參五錢 白茯苓(去皮) 檳榔各一兩 石菖蒲二兩 蘿蔔子(炒)一兩 神曲(炒) 山楂(去子)各二兩。

【制法】上為細末，醋糊為丸，如梧子大。

【劑量及用法】每服五十丸，臨臥淡姜湯送下。

勝臍疝氣空心鹽湯下。如要大便通利，漸加至百丸，仍看老幼盛衰增減丸數。

【禁忌】孕婦不宜服。

【備考】藥性溫平，不損元氣。常服三五丸疏風順氣，和胃健脾，消酒化食，寬中快膈，消磨痞塊。

沉香四寶丹

北 京

【功能与主治】健胃舒郁化滯。主氣聚不舒，痞滿腹脹，嘔逆嘈雜。

【处方】沉香二兩 砂仁一兩五錢 木香 川芎各一兩 枳壳四兩 厚朴二兩 柴胡 公丁香各一兩 青皮八兩 香附四兩(制) 紫豆蔻仁一兩五錢 山楂六兩 橘皮四兩 片姜黃一兩 黑郁金 佛手 玄胡索各二兩 白芍四兩 藿香 甘草各一兩 黑白牽牛五兩(焦) 冰片二兩

【制法】共為細粉，水泛小丸，硃砂滑石各半為衣圖亮。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

肝胃至寶丹

北 京

【功能与主治】舒郁順氣，健胃化滯。主胸脇痞悶，氣滯不舒，嘔逆

脹滿，嘔逆吐酸。

【处方】萊菔子二兩 香附一兩(制) 甘草二錢 橘皮 焦三稜 厚朴各一兩 枳壳八錢 川芎三錢 莪朮一兩 白芍八錢 砂仁六錢 木香五錢 丹皮八錢 檳榔一兩 片姜黃五錢 青皮五錢 枳實六錢 沉香 丁香各三錢 紫豆蔻仁 旋復花各五錢 赭石一兩(煨)

【制法】共為細粉，水泛小丸。每十六兩小丸，用硃砂三錢二分、滑石二兩一錢和勻為衣圖亮。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次。溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

解郁四寶丹

呼 和 浩 特

【处方】砂仁 木香 片姜黃 醋柴胡各八兩 枳壳 紫厚朴 郁金各一斤 沉香八兩 廣皮 青皮 香附各二斤 山楂二斤八兩 甘草四兩 薏仁(另)十二兩 紅花八兩 硃砂 桃仁各四兩

【制法】共為細面，蜜大丸二錢重。半金衣，蜡皮封固。

華山碑記丹

一、沈 陽

【功能与主治】利尿消腫，化積消食。主胸脇水氣痛滿，氣脹水脹，癥瘕腸覃，停飲作喘，濕毒脚氣。

【处方】三稜 靈脂 甘遂 葶藶 牙皂 青皮 神曲 烏梅 陈皮 枳壳 木香 豆豉 大黃 芫花 巴豆霜 紅牙大戟 干白榴各一兩。

【制法】共碾極細面，醋糊為小丸。

【劑量及用法】每服十五丸或十二丸。開水送下。藥性劇烈，用之宜慎。

【禁忌】孕婦忌服。

二、撫順(碑記丹)

【处方】石榴 大戟 芫花 甘遂 豆豉 杏仁 靈脂 葶藶 牙皂各四兩 三稜一兩 大黃 豆霜各四兩。

【制法】共為細面，醋糊小丸。

三、吉林(碑記丹)

【功能与主治】舒肝理氣，去積導下。主心口疼痛，傷酒傷食等症。

【处方】石榴 陈皮 三稜 豆霜 靈脂 大戟(制) 芫花 甘遂(制) 葶藶 桃仁 豆豉 川軍 皂角 烏梅 枳壳 青皮 木香 麥芽 神曲各六錢七分。

【制法】共為細面，用醋糊為小丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服十五丸，早晚二次，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

消寒止痛丹

禹 縣

【功能与主治】胃脘寒痛，氣滯不舒，食積腹痛，飲食過度，噯心倒飽，內傷生冷，寒氣串疼，癰疾膨脹。

【处方】廣陳皮一兩 廣木香四兩 白胡椒 全蠍 巴豆霜各二兩 寒食面四兩

【制法】共為細面，醋為丸，綠豆大。

【劑量及用法】每服五粒，冷開水送下，三至一歲用二粒。

【禁忌】孕婦及虛弱症忌用。

【備考】有效期間二年。

白 虎 丹

禹 縣

【功能与主治】過食生冷，飲食積滯，胃脘寒痛，風寒痢疾。

【处方】大黃二兩二錢 陈皮 青皮各八錢 丁香 廣木香 檳榔各四錢 黨參 巴豆霜 姜各一兩六錢 黃芩二兩

【制法】共為細面，水泛為丸。

【劑量及用法】每服四分，溫開水送下。五歲至八歲一分五厘，九歲至十二歲服二分。

【禁忌】孕婦及虛弱患者忌用。

【備考】有效期間二年。

涼 水 金 丹

一、沈 陽

【功能与主治】調氣除脹，化積去滯。主氣滯膨脹，喘滿難臥，傷食反胃，九種胃痛，寒熱痞疾，二便不

通。

【处方】川芎 公丁香各二兩
白矾一錢二分 木香一錢 巴豆霜
四錢 葶藶三錢二分 沉香二錢
牙皂一錢二分

【制法】共碾細面，棗肉為小丸。

【劑量及用法】壯年每服十丸，
弱者減半，小兒酌量服之。

【禁忌】虛瀉者及孕婦勿服。

【備考】葶藶劇烈。

二、撫順

【处方】木香 丁香 乳香 皂
角各五錢 豆霜三錢四分 沉香五
錢 川芎一兩半 葶藶五錢 白矾
錢半

【制法】共為細面，棗肉和蜜為
小丸。

三、呼和浩特

【处方】天麻 干姜 麻黃 綠
豆粉 生草各二兩 硃砂 雄黃
甘草各八兩 細辛 兩

【制法】共為細面，蜜丸重二錢
五分。金衣。

遇仙丹

一、濟南

【功能與主治】氣滯癰瘕，去虫
消積，痰涎壅盛，反胃吐酸。

【处方】黑丑十二斤 牙皂十二
兩 檳榔一斤四兩 枳殼三斤 茵
陳十二兩 大黃一斤八兩 木香二
斤八兩 牛皮二斤 三稜 莪朮各
一斤八兩

【制法】共研細面，水泛小丸。

【劑量及用法】每服三錢，白開
水送下。

【禁忌】腥冷食物。孕婦忌服。

二、沈陽(預先丹)

【功能與主治】消積化滯，舒氣
通結。主氣積血積，食積虫積，寒火
凝滯，心胃痛疼，消化不良，習慣便
秘，氣膨水膨，胸腹滿脹等症。

【处方】黑牽牛 三稜各四兩
大黃二兩 檳榔四兩 莪朮二兩
木香五錢

【制法】共碾細面，用大皂角子
二兩打碎，煎濃湯去滓，和面打糊為
小丸。

【劑量及用法】每服一錢，體弱

者與十歲以下小兒減半。五更時以
茶湯送下，便通積去再飲稀粥以助
胃氣。

【禁忌】孕婦忌服。

三、撫順

【处方】二丑二、四兩 三稜
莪朮各十二兩 牙皂 大黃各六兩
檳榔 茵陳各八兩。

【制法】共為細面，水泛小丸。

四、吉林、哈爾濱

【功能與主治】殺虫，攻癰，降
痰。

(一)虫積：虫潛腸內，腹痛結
塊，起伏無定，肢厥面蒼，形體消瘦，
食多不化。

(二)癰積：食積成癰，脘腹脹
痛，嘔噎吞酸，咯氣嘈雜。

(三)痰積：痰積肺臟，咳吐不
出，后背冰冷，冒眩氣促。

【处方】黑丑 檳榔各四兩 三
稜 莪朮(醋炙)各一兩 野軍二兩
木香五錢

【制法】共碾細面，用大皂角(云
子)打碎煎濃湯煮麵糊為小丸，如梧
桐子大。

【劑量及用法】每服五十丸，五
更時以茶服。如未瀉再飲溫茶助之，
取盡虫積惡物。以白米粥補之。

【禁忌】孕婦勿服。忌食辛辣腥
冷。

五、呼和浩特

(鷄鳴遇仙丹)

【处方】黑丑 檳榔 莪朮 三
稜 茵陳 白朮各一斤 干姜八兩

【制法】用牙皂水泛小丸。

五、癰丹

承德

【功能與主治】瘀血腹疼，癰瘕
痞塊。

【处方】歸尾 赤芍 干漆 元
胡各一錢七分 三稜 莪朮 五靈
脂各一錢四分 檳榔 干姜 木香
各六錢七分 山楂 紅麵各二兩七
錢四分 枳殼 枳實 腹皮 吳萸
各一錢四分 牛膝六錢七分 黑白
牽牛二兩七錢 六神曲三錢四分
芒硝六錢七分 礞砂三錢四分 大
黃二兩七錢

氣滯積聚類

【制法】共為細粉，用陳醋打面
糊為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，開水
送下。

【禁忌】孕婦忌服。

麝香化積丹

沈陽

【功能與主治】消積聚，化癰瘕，
通經開郁，止痛健脾。主五積六聚，
七癰八瘕，諸般痞塊，各種積滯，肚
腹疼痛，胸膈膨脹，飲食減少，面黃
肌瘦，血枯經閉，一切癰積等症。

【处方】紅豆蔻二錢 三稜二錢
厚朴 砂仁各二錢 莪朮三錢 公
丁香 元胡 香附各二錢 沉香
木香各一錢 冰片五分 麝香三分
紅花 桃仁各二錢 歸尾 五靈脂
各二錢

【制法】共碾細面，煉蜜為丸。
二錢重。

【劑量及用法】每服一丸。飯後
開水送下。

【禁忌】生冷食物，妊娠勿服。

消積丹

濟南

【功能與主治】食水積聚，痞滿
成塊。

【处方】蒼朮 山楂片各二兩
香附一兩 五靈脂五錢 紅花一錢
三稜 莪朮各二兩 檳榔一兩五錢
鷄內金五錢 君子仁二錢 巴豆霜
七錢

【制法】共為細粉，水泛為丸，如
綠豆大，楮石一兩為衣。

【劑量及用法】每次服七分，小
兒酌減，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

消食化積丹

濟南

【功能與主治】消化不良，蛔虫
腹痛。

【处方】鷄內金五錢 炒三仙一
兩 使君子仁三錢 蓮子肉四錢
海螵蛸三錢 檳榔 茯苓各四錢 胆
南星三錢 巴豆霜五分 白朮二錢

【制法】共為細粉，兌硃砂二錢，
冰片三分，煉蜜為丸，重一錢，蜡皮

封固。

【剂量及用法】每服一丸，十岁以上者，二丸。开水送下。

【禁忌】生冷、油腻等食物。

疝气灵丹

沈 陽

【功能与主治】止痛，消腫，散寒。主小腹膨脹，气壅攻痛，舉丸腫大，單墜疼甚。

【处方】荔枝核 桔核 茴香各三錢 沉香一錢 木香 肉桂 烏藥 故紙各二錢 白朮三錢

【制法】共碾細面，煉蜜為丸。二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，飯後一時，白開水送下。

【禁忌】寒涼。

蕩疝丹

沈 陽

【功能与主治】散寒止痛。主各种疝症，小腹抽痛，舉丸冰冷，寒氣攻冲，偏墜腫痛，腎囊潮濕。

【处方】炒川楝子 炒茴香 故紙各五錢 黑牽牛二錢 青皮 陳皮各二錢 莪朮四錢 木香四錢

【制法】共碾極細面，酒打糊為小丸。

【剂量及用法】每服二錢，溫酒送下。

【禁忌】生冷。

附參考古方

【来源】儒門事親。

【处方】川楝子(炒) 茴香(炒) 破故紙(炒)各半兩 黑牽牛二錢 青皮 陳皮各二錢 廣莪朮 木香各四錢

【制法】共為細末，用好酒打麵糊為丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】空心食前，溫酒下三丸。

紅茅葯酒

一、撫 順

【处方】母丁香二錢 佛手三錢 肉桂四錢 良姜錢半 肉蔻三錢 砂仁二錢 紅蔻 桂枝 白蔻各三錢 草蔻二錢 白芷二錢 紅麴五

兩。

二、吉 林

【功能与主治】舒肝理氣，祛寒和胃。主胃寒胸腹痛嘔逆，氣逆不順，膨脹等症。

【处方】公丁香 白豆蔻各二錢 砂仁三錢四分 良姜 零陵香 紅豆蔻各二錢 白芷三錢四分 當歸一兩 木香七分 肉豆蔻二錢 陳皮六錢七分 枸杞三錢四分 檀香七分 草豆蔻二錢 佛手三錢四分 杜枝三錢 沉香一錢四分 肉桂六錢七分 山藥二錢 紅麴五兩四錢

【制法】用布袋裝好，浸于燒酒內(十斤六兩七錢)煮數沸，再將蜂蜜(一斤二兩)冰糖(八斤五兩四錢)入酒內即成。

【剂量及用法】每服一錢，燙熱喝下。

沉香順氣酒

重 慶

【功能与主治】理氣止痛。

【处方】柑子根 青藤香各二兩 臭牡丹根四兩 茴香根 硃砂連各二兩 岩乳香一兩 鷄血藤根 苦菊頭各二兩 土沉香二兩 吳萸根 丁香根 梔子根各二兩 通死根二兩 臭草根二兩 胡皂柑四兩 觀音蓮二兩

【制法】每方用白干酒十斤，泡十日後即成。

【剂量及用法】每日一次，每次一至二兩，按病者輕重增減之。

佛手酒

一、撫 順

【处方】佛手六錢 木瓜 青皮 五加皮 枳殼各三錢

【制法】酒泡之。

二、吉林(佛手露)

【功能与主治】寬胸解郁，悅脾舒肝。主氣膈煩熱，骨蒸，消化不良。

【处方】佛手四兩 五加皮一兩 木瓜四錢 梔子五錢 良姜 砂仁各三錢 木香 公丁香各二錢 當歸六錢 陳皮五錢 青皮四錢 肉桂三錢 白酒二十斤 冰糖五斤

【制法】裝入絹袋內，浸入酒中，文火煮之。濾清後，入冰糖即成。

【剂量及用法】每日早、午、晚各服三至五杯。

【禁忌】孕婦忌服。

三、哈爾濱

(佛手露酒、佛手露)

【功能与主治】寬胸解郁疏氣，開胃進食，悅脾舒肝。主氣逆胸膈，煩熱骨蒸。

【处方】佛手四兩 五加皮一兩 木瓜四錢 山梔五錢 良姜 砂仁各三錢 木香 公丁香各二錢 當歸六錢 廣皮五錢 青皮四錢 肉桂三錢 白酒二十斤 冰糖三斤

【制法】盛生絹袋內，浸酒中，文火煎之，濾清入冰糖。玻璃瓶裝，或瓷壇存貯之。

【剂量及用法】每日晨、午，各溫服二、五杯。

【禁忌】孕婦忌服。

狀元紅酒

一、撫 順

【处方】當歸二錢 木香五分 白蔻三錢 川朴二錢 陳皮三錢 青皮二錢 公丁香五分 山梔 藿香各三錢 砂仁二錢 紅麴一兩

【制法】酒泡之。

二、哈爾濱(狀元紅)

【功能与主治】健脾胃化寒滯，順氣開胃散寒，消食寬胸膈，去脹滿。主肝寒脾寒。

【处方】當歸五錢 紅麴 砂仁各一兩 廣皮 青皮各五錢 丁香 白蔻 山梔 麥芽 枳殼各三錢 藿香三錢 厚朴二錢 木香一錢 白酒三十斤 冰糖二斤

【制法】置布袋內浸酒中，文火煮一柱香時，再入冰糖。

【剂量及用法】每飲二、三杯。早晚二次。

【禁忌】孕婦忌服。

玫瑰花露(玫瑰露)

哈 爾 濱

【功能与主治】平肝養胃，和營，

悦脾宽胸，和血活血，散郁进食。治肝气，胃痛，脘痛，郁结，九种心疼。主调和肝脾。

【处方】鲜桂花(或玫瑰花尤佳)七斤 白酒三十斤 冰糖四斤

【制法】将花浸酒中，冰糖同时入，浸月余，已见火，玻璃瓶装，或瓷坛存貯之。

【剂量及用法】每饮一、二杯，或三、四杯均可。

木 瓜 麴

福 州

【功能与主治】此麴善能斂肺健脾，伐肝和胃，开郁导滞。

【处方】木瓜四两 沉香 辰砂各一钱

【制法】共研末，面粉糊为麴。

七 香 餅

上 海

【功能与主治】过食冷物所致之胃痛，嘔噦吞酸。

【处方】砂仁二钱 益智仁(炒)六钱 公丁香 兩一钱 甘松八钱 生香附一兩二钱 莪朮 陈皮各二钱

【制法】共研细粉，麵糊为小餅。

【剂量及用法】每次一钱至二钱，包煎服湯。

五 香 粉

武 汉

【功能与主治】胃脘脹悶，飲食积滞。亦可在烹調中作矯味用。

【处方】广人苘二兩 公丁香二钱 小茴香一兩 儿花椒五钱 肉桂皮二兩

【制法】取上药混合碾細，成淨粉85-90%即得。

【剂量及用法】每服三至五分。

消 食 飯 灰

(五香飯灰)

上 海

【功能与主治】消化不良。

【处方】木香 枳实(炒) 黑白丑 砂仁各二兩 六神麴(炒焦)六兩 山楂(炒焦)四兩 檳榔 青皮

(炒) 雞內金(炙)各二兩 麦芽(炒)四兩 陈皮二兩 飯鍋巴(炒焦)八十兩

【制法】共研細粉。

【剂量及用法】每服一羹匙，溫开水送服，或用糖拌服。

制 金 柑

上 海

【功能与主治】痞滿气滞作痛。

【处方】鮮金柑一百六十兩 生香附一兩 佛手 烏药 姜半夏 百药煎各五钱 甘草 訶子各二钱 烏梅肉一钱 青鹽 沉香 木香各二钱 川楝子(炒)五钱 桔梗二钱 豆蔻一兩 肉桂二钱 砂仁五钱 公丁香一钱

【制法】將鮮金柑用水洗淨蒸熟晒干，再将生香附、佛手、烏药、姜半夏、訶子、甘草、訶子、烏梅肉、青鹽、川楝子、桔梗煎汁拌入，最后將木香、丁香、沉香、豆蔻、肉桂、砂仁研細粉拌入，低温烘干。

【剂量及用法】每次一枚，煎湯服。

一 塊 气

一、沈 陽

【功能与主治】消食化积，理气散郁。主治气滞食积，噎塞痞滿，胸胁刺痛，癥瘕积聚。

【处方】青皮一兩 郁金二钱 萊菔子五钱 三稜一兩 枳实二钱 檳榔五钱 莪朮一兩 陈皮 黃連各五钱 麦芽三钱 香附五钱 皂角一钱五分 白牽牛二钱 神麴五钱 百草霜二钱五分

【制法】共碾細面，面粉为小丸。

【剂量及用法】每服一钱至二钱，姜湯或黃酒送下。

【禁忌】孕妇勿服。忌生冷硬物。

二、撫 順

【处方】杏仁 莪朮 川椒 青皮 官桂 胡椒 良姜 干姜 川芎 陈皮 黑丑各一兩 巴豆霜四錢

【制法】共为細面，神麴糊为小丸。

附参考古方

【来源】杂病証治类方(一塊气丸)。

【处方】官桂 玄胡索 蓬莪朮(炮) 姜黄 砂仁 枳实 枳壳 黑牽牛(取头末) 檳榔 大黃(醋煮) 雷丸 使君子(取肉) 白豆蔻 丁香各半兩 芫花(酒浸炒) 香附子(醋浸) 京三稜(炮) 陈皮(去白) 胡椒各一兩 糖迷 青皮各一兩半 川烏(酒浸炒)二钱半 錫灰 大麦芽(用江子炒熟，去江子)各四兩 蘿蔔子(用江子炒煮，去江子) 江子(去油)各一兩 沉香 木香各四钱 皂角(去皮醋浸炒)半斤

【制法】上为末，酒糊丸，如梧子大。

【剂量及用法】每服五、七丸。

【禁忌】孕妇不可服，忌一切热物。

神 仙 一 塊 气

吉 林

【功能与主治】理气消痞，导滞定痛，泄下。主心胃寒痛，停食不消，积聚痞塊。

【处方】青皮 陈皮 莪朮 香附(制) 三稜各六钱七分 黑丑 六神麴 萊菔子 黃連 郁金 麦芽 檳榔各二钱四分 枳壳二钱 牙皂 巴豆霜各一钱七分

【制法】共为細面，用陈醋打面粉，丸如小豆大。貯于瓷坛中。

【剂量及用法】每服十五丸。用白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

附参考古方

【来源】增补寿世保元。

【功能与主治】諸气食积及噎膈痞滿，胸胁刺痛，癥瘕疝气並治。

【处方】青皮 陈皮 三稜 莪朮 香附(童便炒)各一兩 神曲 春非 蘿蔔子 百丑(头末) 檳榔 郁金 黃連各五钱 枳实二钱 皂角 百草霜各二钱半

【制法】上为細末，面粉为丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每服三、五十丸，視疾上下为食之先后，热酒姜湯任

一把抓

一、禹 县

【功能与主治】过食生冷，飲食积滯，胃脘疼痛，風寒痼疾。

【处方】党参一斤四兩 黄芩一斤十四兩 广木香一斤 大黄三斤二兩 山查一斤十四兩 干姜五斤 檳榔一斤十四兩 陈皮五斤 香附三斤 丁香一斤 巴豆霜三斤

【制法】共碾細面，水为丸，紅袖为衣。

【剂量及用法】每服四分，溫开水送下。五岁至八岁服一分五厘，九岁至十二岁服二分。

【禁忌】孕妇及虛弱症忌用。

【备考】有效期間二年。

二、济 南

【功能与主治】停食停飲，消化不良，大便不通，腹內脹滿，胸滿腹痛。

【处方】代赭石半斤 儿朴一斤 黄芩 黑白丑各二斤 番瀉叶 皮硝 山查 白芍各一斤 巴豆霜四兩

【制法】共研細面，水泛为丸，如綠豆大，代赭石为衣，每服二分。每包一分。

【剂量及用法】空腹服用，开水送下。

【禁忌】孕妇及小兒忌服。

舒 气 通

济 南

【功能与主治】膨悶脹飽，气逆不順，嘔吐酸水，兩脇攻疼，胃脘結聚。

【处方】人黄三斤 檳榔半斤 青皮四兩 木香半斤 炒萊菔子四兩 炒黑丑六斤 灵脂米二斤 茅朮四兩 儿朴 陈皮各半斤 炒香附二斤 炒神曲一斤 儿芍四兩 炒麦芽半斤 山查二斤 三稜 莪朮 枳实 枳壳各半斤

【制法】共为細面，水丸，綠豆大。

【剂量及用法】每服一錢五分，开水送下。

【禁忌】忌食生冷硬物，孕妇忌

服。

舒 肝 灵

大 同

【功能与主治】兩脇作脹，噯气吞酸胃痛，食慾不振，精神不爽。

【处方】当归 杭芍 香附 柴胡 儿朴 丹皮 川芎 木香各十二兩 小枳实十二兩 广皮 片姜黄 元胡各十二兩 砂仁十五兩 焦三仙二十五兩 焦榔二十二兩 丁香十兩 烏药十二兩 青皮二十二兩 豆蔻木 建耨各十二兩 苏打粉四十兩 沉香十二兩 炙草一兩

【制法】共为細面，水泛为丸。每一百粒一錢五分，紅袖、滑石为衣。

【剂量及用法】每服二錢。

治寸白虫方

撫 順

【功能与主治】杀虫。主寸白虫，肛門作痒。

【处方】冰片二分 雄黄五分 川椒一錢 蛇床子 苦参 鹤虱各一錢 甘石五分

【制法】共为細面，煉蜜为錠，每錠一錢重。

【剂量及用法】每晚睡前，將錠納入肛門中。

胃 腸 病 类

平 胃 丸

一、南 京

【功能与主治】健胃。主消化不良，脹滿吐瀉。

【处方】茅蒼朮(米泔水漂)八兩 川厚朴五兩 广陈皮 炙甘草各一兩

【制法】共研細末，用鮮生姜四兩，小紅棗四兩，煎湯泛丸，每錢約七十粒。

【剂量及用法】每服二錢，一日二次，开水吞服。

二、武 汉

【功能与主治】胃部脹痛，不思飲食，噯心嘔吐，噯气吞酸，瀉泄嘔痞及面黃肌瘦。

【处方】蒼朮(洗米水漂去皮，炒)八兩 厚朴(去皮姜汁炒)陈皮

各五兩 甘草一兩

【制法】上药干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于三十粒。

【剂量及用法】每服二至四錢，空腹时开水吞服，每日三次。

三、福州(原方平胃丸)

【功能与主治】除濕散滿驅瘴气。

【处方】蒼朮(泔浸)二兩 厚朴姜汁炒 陈皮(去白) 甘草(炙)各一兩

【制法】共研細末，加姜棗煎湯泛丸。

四、杭州(治湿平胃丸)

【功能与主治】調气健胃，消痰去湿。治湿滯脾胃，不能运化，痰飲痞悶，胸腹脹痛，噯气吞酸，嘔吐泄瀉，体倦困睡，以及山嵐瘴气，不服水土等症。

【处方】川厚朴(姜汁制) 广陈皮各四兩 茅朮(米泔水浸炒)八兩 炙甘草三兩

【制法】共研細末，用生姜大棗煎湯泛丸。

【剂量及用法】每服二至四錢，开水送下。

五、南 昌

【功能与主治】食慾不振，脘腹脹痛，噯心反胃，噯气吞酸。

【处方】厚朴(姜汁炒)五兩 蒼朮(米泔水浸)八兩 陈皮一兩 炙甘草三兩

【制法】共研細末，生姜 兩煎湯泛丸如綠豆大。

【剂量及用法】每服二至三錢，溫开水送下。

【禁忌】生冷油膩物。

六、济 南

【功能与主治】食慾不振，胃腹脹疼，反胃噯心等症。

【处方】蒼朮(米泔浸)八錢 陈皮一兩 厚朴(姜汁炒)五兩 甘草二兩

【制法】共为細末，神曲八兩糊丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每服一錢，开水送下，每日二次。

【禁忌】生冷油膩等物。

健脾平胃丸

呼和浩特

【处方】蒼朮 茯苓 白朮 神
曲各四兩 扁豆 廣皮 川厚朴
麥芽各二兩 砂仁 木香各二兩
山藥四兩 山楂三兩 炙甘草二兩
建糖四兩

【制法】水泛小丸。

香砂平胃丸

一、上海

【功能与主治】湿滯脾胃，胸腹
脹滿，噯心反胃。

【处方】厚朴(制) 陳皮 香附
(制)各四兩 茅朮(炒)五兩 甘草
(炙) 砂仁各二兩

【制法】共研細粉，水泛為丸如
綠豆大。

【劑量及用法】每服二錢，溫開
水送服。

【禁忌】忌食生冷。

二、南京

【功能与主治】健胃。主消化不
良，脹滿嘔吐，胃酸過多。

【处方】茅朮(米泔水浸)二兩
川厚朴 廣陳皮 生甘草各一兩
廣木香 西砂仁各五錢

【制法】除香砂另研外，余藥共
研細末，以沸水泛丸，每錢約做八十
粒，以香砂另研為衣。

【劑量及用法】每服一錢，一日
三次，食後開水吞服。

三、武漢

【功能与主治】寒熱嘔吐，胸腹
疼痛，食積痞悶。

【处方】炒蒼朮一兩 厚朴 陳
皮 砂仁 炙甘草 廣木香各一兩

【制法】上藥干燥，混合碾細，用
淨水送成小丸，每錢不得少于二十
粒。

【劑量及用法】每服一錢至二
錢，開水送下。

四、福州

【功能与主治】治脾胃停濕，痰
飲痞隔，宿食不消，滿悶嘔瀉，內傷
生冷，吞酸等症。

【处方】同南京，仅厚朴用姜汁

炒。

【制法】共為細末，水泛為丸。

五、杭州

【功能与主治】利氣解郁，健胃
祛濕。治濕滯脾胃，宿食不消，生冷
停積，胸腹脹滿，飲食不思，嘔吐泄
瀉等症。

【处方】、【制法】同上海。

【劑量及用法】每服三錢，開水
送下。

六、蘭州

【功能与主治】寬胸利膈，除濕
暖胃。主消化不良，胸腹悶脹。

【处方】蒼朮 陳皮 川朴各四
兩 甘草 廣木香各一兩五錢 砂
仁二兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸一
錢重。

【劑量及用法】每服三錢，日服
二次，開水送下。

七、大同

【功能与主治】飲食無味，倒飽
嘈雜，胸痛不利，嘔吐酸水。

【处方】山藥 厚朴 蒼朮 陳
皮 山楂 炙甘草 香附 白朮 麥
芽 神曲各三兩 砂仁五錢

【制法】水泛為小丸。

【劑量及用法】每服三錢。

八、呼和浩特

【处方】木香 砂仁 甘草 蒼
朮 陳皮 川厚朴各三斤

【制法】共為細面，水泛小丸。

四君子丸

一、上海

【功能与主治】氣短食少，神倦
便溏。

【处方】黨參二兩 甘草(炙)一
兩 茯苓二兩 白朮(炒)二兩

【制法】共研細粉，水泛為丸如
綠豆大。

【劑量及用法】每服三錢，溫開
水送服。

【禁忌】生冷食物。

二、南京

【功能与主治】主體虛氣短，食
少瀉瀉。

【处方】潞黨參三兩 炒白朮二
兩 白茯苓一兩五錢 炙甘草一兩

【制法】上藥共研細末，用生薑
一錢，小紅棗十枚，煎湯沸水泛丸，
每錢約八十粒。

【劑量及用法】每服三錢，一日
二次，開水吞服。

三、武漢

【功能与主治】胃氣虛弱，飲食
不思，四肢乏力，嘔瀉吐逆。

【处方】黨參二兩 白茯苓二兩
白朮二兩 甘草一兩

【制法】取上藥進行干燥，混合
碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少
于三十粒。

【劑量及用法】每服三錢，用溫
開水吞服。

四、廣州

【功能与主治】消化不良，食慾
減退。

【处方】黨參一兩 白朮一兩
茯苓一兩 甘草二錢

【制法】將上列各藥洗淨切碎，
隔水蒸透，晒干研成細末，拌蜜糖成
小丸。

五、福州

【功能与主治】治脾胃虛弱，飲
食少思，或大便不實，體瘦面黃，或
胸膈虛痞，吞酸痰嗽，或脾胃虛弱，
善患瘡癤等症。

【处方】人參 白朮 茯苓各二
兩 炙甘草一兩

【制法】共為末，加生薑、紅棗煎
湯泛丸。

六、杭州(補陽四君子丸)

【功能与主治】調補脾胃。治脾
胃虛弱，面色萎黃，飲食不思，嘔吐
泄瀉，聲微肢倦，中氣不足等症。

【处方】潞黨參 白茯苓各二兩
炙甘草一兩 炒冬朮 紅棗各二兩
生薑一兩

【制法】共研細末，姜、棗煎湯泛
丸。

【劑量及用法】每服三至四錢，
開水送下。

附參考古方

【來源】重刻太平惠民和劑局方
(四君子湯)。

【功能与主治】治榮衛氣虛，胸膈怯弱，心腹脹滿，全不思食，腸鳴泄瀉，嘔噦吐逆。

【处方】人參（去蘆） 茯苓（去皮） 甘草（炙） 白朮各等分

【制法】上為末。

【劑量及用法】每服二錢，水一盞煎七分，通口服，不拘時，鹽少許，白湯點服。常服溫和脾胃，進益飲食，辟寒邪瘴霧氣。

六君子丸

一、上海

【功能与主治】食少痰多，腹脹便溏。

【处方】黨參二兩 茯苓二兩 姜半夏二兩 白朮一兩 甘草（炙）一兩 白朮（炒）二兩

【制法】共研細粉，用生薑二兩，紅棗四兩，煎湯泛丸如綠豆大。

【劑量及用法】每服三錢，溫開水送服。

【禁忌】忌食生冷。

二、南京

【功能与主治】主脾胃虛弱，消化不良，腹脹便溏。

【处方】潞黨參二兩 白朮二兩 茯苓二兩 制半夏二兩 炙甘草一兩 廣陳皮一兩

【制法】上藥共研細末，用薑棗煎湯泛丸，每錢約八十粒。

【劑量及用法】每服二錢，一日三次，開水吞服。

三、武漢

【功能与主治】消化不良，胸膈胃脹，大便溏泄。

【处方】黨參二錢 白朮一錢 茯苓二錢 制半夏二錢 陳皮一錢 炙甘草一錢

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用淨水造成小丸，每錢不得少于三十粒。

【劑量及用法】每服三錢，飯后用姜棗湯或開水送下，日服二次。

四、廣州

【功能与主治】消化不良，食慾不振，痰多咳嗽。

【处方】黨參八分 白朮八分 陳皮五分 牛半夏二分 甘草二分

【制法】將上列各藥洗淨切碎，隔水蒸透，晒干研成細末，拌蜜糖為小丸。

五、福州

【功能与主治】治脾胃虛弱，飲食少思，或久患瘧痢，或飲食難化，或嘔吐吞酸，或咳嗽喘促等症。

【处方】人參 白朮 茯苓各二兩 炙甘草一兩 陳皮 半夏各一兩五錢

【制法】共為細末，水泛為丸。（凡六君方均加姜棗湯泛丸）

六、杭州（益氣六君丸）

【功能与主治】健脾胃，化濕痰。治脾胃虛弱，食少難消，欬嗽痰多，面黃肌瘦，胸滿腹脹，大便溏泄等症。

【处方】潞黨參 白茯苓 制半夏 炮冬朮各二兩 炙甘草 陳皮各一兩

【制法】共研細末，用生薑、紅棗煎湯泛丸。

【劑量及用法】每服三至四錢，開水送下。

七、南昌

【功能与主治】脾胃虛弱，胸膈痞滿，氣虛有痰，脾虛腹脹，大便溏瀉。

【处方】黨參二兩 白朮二兩 茯苓二兩 炙甘草一兩 廣陳皮一兩 法半夏（制）二兩

【制法】共研細末，生薑、紅棗各二兩，煎湯泛丸如綠豆大。

【劑量及用法】每服三錢，開水送下，每日服二次。

【禁忌】有外感者忌服，勿食生冷及不易消化食物。

附參考古方

【來源】景岳全書（六君子湯）。

【功能与主治】脾胃虛弱，飲食少思，或久患瘧痢，或飲食難化，或嘔吐吞酸，或咳嗽喘促，若虛火等証須加炮薑，其功尤速。

【处方】人參 白朮 茯苓各二錢 炙甘草一錢 陳皮 半夏各一錢五分

【劑量及用法】加薑棗水煎服，或加粳米百粒。

香砂六君丸 （香砂六君子丸）

一、北京

【功能与主治】健胃祛痰。主飲食減少，胸滿痰多，吞酸作嘔。

【处方】人參 茯苓 半夏 白朮各二兩 甘草 橘皮各一兩 木香 砂仁各八錢

【制法】共為細粉，生薑幾分，紅棗一錢八分煎湯泛小丸。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌食油膩厚味。

二、天津、蘭州

【功能与主治】助氣，健胃，化痰。主腸胃衰弱，消化不良，胸滿嘔吐，胃痛腸痛，腸鳴瀉肚。

【处方】黨參 白朮 茯苓 陳皮 半夏各二兩 甘草一兩五 砂仁八錢 木香五錢

【制法】共研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服二錢，每日二次，開水送下。

三、上海

【功能与主治】痰濕內阻，脾胃不和，腸鳴泄瀉。

【处方】同北京。

【制法】共研細粉，用紅棗二兩、生薑一兩煎湯泛丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服三錢，溫開水送服。

四、南京

【功能与主治】健胃化痰。主氣虛多痰，食慾不振，嘔吐脹滿。

【处方】同北京。

【制法】共研細末，用姜、棗煎湯泛丸，每錢約做八十粒。

【劑量及用法】每服一錢五分，一日三次，食後開水吞服。

【禁忌】胃熱者忌用。

五、武漢

【功能与主治】消化不良，胸膈滿悶，嘔噦腹痛，腸鳴泄瀉等症。

【处方】同北京。

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用生薑一兩煎水送成小丸，每錢不得少于三十粒。

【劑量及用法】每服四十粒，日服二次，溫開水送下。

六、福州

【功能与主治】治中虛氣滯，中濕痰飲，食不運化，嘔惡脹滿，胃脘疼痛，腹痛泄瀉等症。

【處方】同北京。

【制法】共研細末，姜、棗湯泛為丸。

七、杭州

【功能与主治】治脾胃虛弱，中虛氣滯，痰飲內停，胸中脹滿，食不運化，嘔吐腹痛，腸鳴泄瀉等症。

【處方】同北京。

【制法】共研細末，用生姜、紅棗煎湯泛丸。

【劑量及用法】每服三至四錢，用開水送下。

八、南昌

【功能与主治】虛寒胃痛，胃脘滿悶，嘔噦泄瀉，痰飲氣滯等症。

【處方】同北京。

【制法】共研細末，生姜、紅棗各二兩煎湯泛丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服三錢，開水送下，每日二次。

【禁忌】生冷食物及不易消化食物。

九、重慶

【功能与主治】中虛氣滯，痰濕內阻，胸中滿悶，食不運化，嘔噦腹痛，腸鳴泄瀉等症。

【處方】同北京。

【制法】共研細末，水泛為丸，紙盒包裝。

【劑量及用法】三錢。

十、昆明

【功能与主治】主脾胃不足，吞酸作嘔，飲食乏味。

【處方】黨參 白朮 茯苓各二兩 法夏一兩 陳皮 砂仁各八錢 甘草 木香各七錢

【制法】研末，水疊為丸。

【劑量及用法】每服二錢半，幼童減半，用開水早晚各服一次。

【禁忌】感冒忌服。

十一、濟南

【功能与主治】脾虛氣滯，痰飲不化，嘔吐脹滿，胃脘疼痛，腸鳴泄瀉等症。

【處方】同北京。

【制法】共為細粉，水泛為丸，綠豆大。

【劑量及用法】每服三錢，開水或姜湯送下。

【禁忌】生冷油膩等食物。

歸芍六君丸

一、上海

【功能与主治】胃脘飽脹，飲食乏味。

【處方】黨參 冬朮(炒) 茯苓各二兩 甘草(炙)一兩 當歸 姜半夏各二兩 陳皮一兩 白芍藥(炒)一兩

【制法】共研細粉，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服三錢，溫開水送服。

二、南京

【功能与主治】主肝脾不和，脘腹脹疼，食少體倦，嘔吐痰水。

【處方】同上海。

【制法】共研細末，以鮮生姜二兩、人參二兩煎濃湯加煉白蜜為丸，每錢約做二十粒。

【劑量及用法】每服一錢，一日三次，開水吞服。

三、福州

【功能与主治】能補氣血，治脾胃虛弱，飲食不思，脘腹脹痛，嘔吐痰水，氣郁困倦。

【處方】同上海。

【制法】共研細末，水泛為丸。

四、杭州

【功能与主治】治氣血不足，脾胃虛弱，飲食不思，脘腹脹痛，嘔吐痰水，氣郁神倦等症。

【處方】同上海。

【制法】共研細末，用生姜、大棗煎湯泛丸。

【劑量及用法】每服三至四錢，開水送下。

柴芍六君丸

福州

【功能与主治】治治厥陰，脾胃虛寒，飲食少進，水谷不化，嘔吐吞酸，便溏泄瀉，肚腹疼痛。

【處方】前香砂六君丸方加 柴胡 白芍各一兩五錢

和中理脾丸

一、北京

【功能与主治】健胃助消化。食物不消，胸悶干噯，倒飽嘈雜。

【處方】白朮四十八兩 茯苓 香附(醋制) 蒼朮 厚朴 六神麴(炒) 山楂(炒) 枳殼 麥芽(炒) 蜜香 萊菔子各三十二兩 砂仁 黨參 半夏各十六兩 橘皮六十四兩 甘草 木香 紫豆蔻仁各八兩

【制法】共為細粉，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服三錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌食生冷及油面厚味。

二、濟南

【功能与主治】干嘔吞酸，胸悶脹飽，食物不消。

【處方】同北京，僅紫蔻作白蔻。

【制法】共軋細面，煉蜜為丸，重二錢。

【劑量及用法】每次一丸至二丸，開水送下。

【禁忌】生冷食物。

三、呼和浩特

【處方】陳皮 茯苓 白朮 砂仁 川朴 山藥 扁豆 薏米 杭芍 枳實各十二兩 猪苓 香附 神曲 麥芽 木香 蒼朮 澤瀉 山楂 甘草各六兩

【制法】共為細面，蜜人丸，二錢重。

快脾溫胃丸

大同

【功能与主治】胃脘疼痛，胸膈膨悶，食不知味，倒飽嘈雜，兩脇脹滿，噯氣吞酸。

【處方】川黃連四錢 吳茱萸三錢 焦三仙一兩 廣木各二錢 川芎一兩 炒香附一兩五錢 陳皮 白朮各二兩 枳實一兩 焦梔子五錢 萊菔子八錢 半夏 砂仁各五

錢 干姜一兩 青皮四錢 竹茹
蒼朮 草薢 草果仁 各五錢 炙草
八錢 茯苓五錢

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢，姜湯送下。

【禁忌】忌食生冷；忌發怒氣。

扶脾丸

沈 陽

【功能与主治】胃脘脹痛，腸寒泄瀉消化不良，氣逆打嗝，嘔吐吞酸，面黃肌瘦，午後潮熱，倦怠少食，精神衰弱。

【處方】白朮 茯苓 陳皮 半夏 炙草 訶子皮 烏梅肉 各三錢 紅豆蔻 丁香 藿香 各一錢 肉桂五分 麥芽 神曲 各四錢

【制法】共碾極細面，飯為小丸。

【劑量及用法】每服一錢四分，空心開水送下。

附參考古方

【來源】蘭室秘藏。

【功能与主治】治脾胃虛寒，腹中痛，瀉瀉無度，飲食不化。

【處方】干姜 肉桂 各五分 干姜 藿香 紅豆蔻 各一錢 白朮 茯苓 橘皮 半夏 訶子皮 炙甘草 烏梅肉 各二錢 大麥蘖(炒) 神曲(炒) 各四錢

【制法】上為細末，荷葉燒飯為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服五十丸，食前白湯送下。

紫蔻助脾丸

沈 陽

【功能与主治】健胃整腸，消食止瀉。主健胃消食，利濕調氣，慢性胃腸病，嘔吐泄瀉等症。

【處方】紫蔻二錢 焦山楂二兩 山藥一兩 炒麥芽 神曲 各一兩五錢 茯苓 扁豆 各五錢 苡米 蓮肉 各一兩 枳殼 清夏 橘紅 各五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，開水送下，小兒酌減。

【禁忌】忌生冷食物；孕婦忌服。

養脾進食丸

沈 陽

【功能与主治】整腸健胃，止瀉增食。主胃腸衰弱，飲食減少，倦怠無力，面色蒼白，腹痛脹滿，腸滑瀉痢。

【處方】人參 白朮 白茯苓 陳皮 半夏 厚朴 蒼朮 各二兩 甘草 砂仁 各一兩五錢 炒神曲 炒麥芽 各二兩五錢 木香五錢

【制法】共碾極細面，面糊為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，開水送下。

【禁忌】生冷硬物。

清胃保安丸

濟 南

【功能与主治】停食脹滿，消化不良。

【處方】白朮 神曲 廣陳皮 麥芽 茯苓 甘草 砂仁 枳殼 青皮 枳實 厚朴 枳實 各一斤十四兩 南棗七斤八兩 白酒麵三斤十二兩

【制法】共碾細面，煉蜜為丸，重一錢。

【劑量及用法】每服一丸，不滿週歲小兒減半，或三分之一，開水送下。

黃連清胃丸

一、沈 陽

【功能与主治】瀉熱解毒，清胃通便。主口燥舌干，兩腮癰腫，牙肉疼痛，齒根潰爛，口流涎涎，煩渴飲冷，氣急臭穢，頭痛目赤，尿澀便秘。

【處方】炒山梔 連翹 大黃 黃芩 生石膏 丹皮 薄荷 各二兩 知母二兩 朴硝 荊芥 生地 黃連 升麻 防風 當歸尾 甘草 白芷 赤芍 元參 花粉 各一兩

【制法】共碾極細面，朴硝煎水泛為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，開水送下。

【禁忌】忌食五辛葷腥；孕婦忌服。

二、撫 順

【處方】黃連一兩 黃芩 山梔 丹皮 各二兩 生地 升麻 各一兩 大黃 連翹 各二兩 荊芥 防風 各一兩 知母二兩 歸尾 朴硝 各一兩 石膏 甘草 薄荷 各二兩

【制法】共為細面，水泛小丸。

快胃丸

撫 順

【功能与主治】健胃化痰，殺下。胃病脹滿，胃疼，食積氣積虫積，噎膈轉食，吐酸呃逆。

【處方】枳殼 陳皮 神曲 靈脂 元胡 生芍 蘆薈 榔片 香附 川朴 各半斤 巴豆霜二錢 狗寶五分

【制法】共為細面，水滾小丸。

【劑量及用法】每服四分，開水送下，早晚服。

【禁忌】忌食生冷硬物；孕婦勿服。

健胃丸

沈 陽

【功能与主治】健胃消食，理氣除寒。主胸膈脹滿，兩脇刺痛，胃脘劇痛，嘔噦吞酸，消化不良，腹痛肢痠，中氣不足，二便不調，瀉痢后重，神疲氣短。

【處方】香附二兩 良姜一兩 白合二兩 香櫞一兩 木香二兩 黃桂一兩 白豆蔻 廣砂仁 各一兩 黃連一兩 內金炭二兩 萊菔炭二兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，開水送下。

【禁忌】辣腥生冷硬物。

枳朮丸

一、上 海

【功能与主治】食慾不振，胸悶腹脹。

【處方】白朮(炒)六兩 枳實(麸炒)三兩

【制法】共研細粉，水泛為丸，如

綠豆大。

【劑量及用法】每服二錢，溫開水送服。

二、武 漢

【功能与主治】脾虛食積，痰壅痞脹。

【處方】同上海，分量为其三分之一。

【制法】上藥干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于三十粒。

【劑量及用法】每服二錢，每日三次。

三、福 州

【功能与主治】消食强胃。主治痞積。久服令人胃氣强實。

【處方】枳實(去穢面炒)一兩 白朮(面炒)二兩

【制法】共為末，荷葉裹燒飯為丸，桐子大。

【劑量及用法】每服五十丸，白朮湯下。

四、杭州(二味枳朮丸)

【功能与主治】消痞祛痰，健脾進食，乃一補一消之法。主治脾胃濕困，食不運化，氣滯痰聚，胸腹脹悶等症。

【處方】同上海，分量为其三分之一。

【制法】共研細末，荷葉包陳米煎湯泛丸。

【劑量及用法】每服二至三錢，開水送下。

香砂枳朮丸

一、北 京

【功能与主治】健胃消食。主氣滯停食，胸膈脹滿。

【處方】橘皮九十六兩 砂仁六神麴 麦芽各二十四兩 香附一百四十四兩 枳實 白朮各二百四十兩 山楂 枳殼各四十八兩 木香十二兩

【制法】共為細粉，水泛小丸。

【劑量及用法】每服二錢，開水送下。

二、天 津

【功能与主治】健胃消食。主胃

腸消化力衰弱，停食停水，胸腹脹滿疼痛，不思飲食，吐逆泄瀉。

【處方】同北京，分量为其十六分之一，惟木香加倍為一兩五錢。

【制法】共為細粉，涼開水泛小丸，一錢重裝袋。

【劑量及用法】每次服一袋，開水送下。

三、上 海

【功能与主治】胸膈脹滿，食少便澀。

【處方】白朮(炒)一兩 木香 砂仁 枳殼(炒)各一兩

【制法】共研細粉，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服三錢，溫開水送服。

【禁忌】忌食生冷。

四、南京(加味枳朮丸)

【功能与主治】健脾開胃。主氣滯痰滯食滯，胸膈脹滿，消化不良等症。

【處方】炒白朮一兩 炒枳實一兩 廣木香(另研為衣) 西砂仁(另研為衣) 廣陳皮(另研為衣) 制半夏各五錢

【制法】除香、砂、陳皮外，共研細末，用荷葉包陳米煎水泛丸，每錢約做八十粒，以香砂陳皮另研為衣。

【劑量及用法】每服二錢，一日二次，空腹用開水吞服。

五、福 州

【功能与主治】破滯氣，消宿食，開胃進食。

【處方】木香 砂仁各五錢 枳實(麴炒) 白朮(米泔浸)各一兩

【制法】共研細末，水泛為丸。

六、蘭 州

【功能与主治】健胃消食。主胃腸消化力衰弱，停食，胸腹脹滿疼痛，不思飲食等症。

【處方】白朮十二兩 枳實 香附 神麴 麦芽 山楂 云苓 川厚朴 萊菔子 蒼朮各四兩 廣木香二兩 砂仁 陳皮各四兩 炙甘草二兩

【制法】共為細面，水泛小丸。

【劑量及用法】每服二錢，開水送下。

七、濟 南

【功能与主治】胸膈脹滿，食少便澀。

【處方】廣木香 砂仁各一兩 焦白朮三兩 炒枳實一兩

【制法】共為細粉，荷葉包陳米煎水泛丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服三錢，開水送下。

八、青 島

【處方】陳皮六斤 砂仁一斤半 香附九斤 麦芽斤半 枳殼一斤 木香十二兩

【制法】共研面，水泛小丸。

九、沈 陽

【功能与主治】理氣暖胃。主胸膈脹滿，氣滯不舒，食滯痰滯，嘈雜嘔吐，飲食少進，腸鳴腹痛。

【處方】同濟南。

【制法】共碾極細面，水泛為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，熱湯送下。

【禁忌】忌食生冷硬物；孕婦忌服。

十、撫順、承德

【功能与主治】健脾消化。主胸膈脹滿，氣滯停食，嘔吐 噯心，消化不良，飲食少進。

【處方】白朮 枳實 香附 麦芽 云苓 蒼朮各五兩 廣木香四兩 甘草二兩 陳皮 山楂各五兩 神麴 砂仁各四兩 萊菔子五兩

【制法】共為細面，水泛小丸。

【劑量及用法】每服二錢，一日二次，早晚服，姜水送下。

【禁忌】忌食生冷，硬物；孕婦忌服。

十一、呼和浩特

【處方】枳實 白朮 麦芽 山楂 香附 茯苓 陳皮 蒼朮各一斤 半夏 神麴各二斤四兩 砂仁一斤半 萊菔子 甘草 木香各十二兩

【制法】水泛小丸。

橘半枳朮丸

上 海

【功能与主治】痰多作恶，得食飽悶。

【处方】陈皮五錢 白朮(炒)二兩 姜半夏五錢 枳实(炒)一兩

【制法】共研細粉，水泛为丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每服三錢，温开水送服。

附参考古方

【来源】張氏医通。

【功能与主治】痰食兼併不化。

【处方】枳实一兩 白朮二兩 橘皮 半夏各半兩

【制法】荷叶裹米燒飯为丸。

【剂量及用法】米湯下七、八十丸。

香砂养胃丸

一、北 京

【功能与主治】健胃散寒止嘔。主不思飲食，嘔吐酸水，胃脘滿悶，四肢倦怠。

【处方】香附(醋制) 砂仁各四十兩 白朮一百二十兩 茯苓 厚朴 枳壳 藿香 半夏各四十兩 橘皮 甘草 紫豆蔻仁 木香各二十兩 生姜四兩 大棗十六兩

【制法】共为細粉，用方内生姜、大棗煎湯泛小丸。

【剂量及用法】每服三錢，日服二次，温开水送下。

【禁忌】忌食生冷油膩。

二、天津、蘭州

【功能与主治】健胃消食，舒气止痛。主胃腸衰弱，消化不良，胸膈膨悶，腹脘嘔吐，腸鳴泄瀉。

【处方】炒蒼朮 陈皮 香附(醋制)各五兩 广木香二兩 神曲(數炒)二兩 甘草一兩二錢 藿香 茯苓(去皮)各五兩 白朮(數炒)七兩五錢 蔻仁 厚朴(姜制)各三兩 半夏(數炒)二兩五錢 砂仁二兩 炒麦芽一兩 党参(去蘆)八兩五錢

【制法】共为細粉，凉开水泛小丸，二錢重裝袋。

【剂量及用法】每服一袋，日服

二次，开水送下。

三、西 安

【功能与主治】主治脾胃虛弱，中虛气滯，痰湿內阻，胸膈滿悶，运化不健，嘔惡，腹痛腸鳴，泄瀉等症。

【处方】人参 茯苓 白朮 炙甘草 陈皮各二兩 木香 砂仁各八錢

【制法】蜜制为丸。

【剂量及用法】每服三錢，每日二至三次，飯前开水送服。

【禁忌】热性病忌服。

四、大 同

【功能与主治】脾虛胃弱，飲食少进，气郁不通，郁悶不舒。

【处方】砂仁 半夏 蒼朮 白豆蔻 藿香各一兩 焦朮 茯苓 山楂 厚朴 麦芽 神曲 陈皮各四兩 广木香一兩 香附四兩 炙草一兩 党参四兩

【制法】紅棗煎湯泛小丸。

【剂量及用法】每服一錢。

五、濟 南

【功能与主治】气逆嘔吐，胸悶痞滿，消化不良。

【处方】广木香五兩 广砂仁八兩 党参七兩 土炒白朮十兩 茯苓 香附 炒蒼朮 广皮各八兩 蔻仁七兩 姜厚朴八兩 炙甘草二兩

【制法】共为細末，生姜三兩、大棗三十枚，煎湯为丸，小豆大。

【剂量及用法】每服一錢，日三次，小兒酌減，开水送下。

【禁忌】忌食辛辣油膩生冷等物，孕妇忌服。

六、青 島

【处方】白朮七斤半 茯苓 香附各五斤 砂仁二斤半 蒼朮 厚朴各五斤 陈皮十斤 甘草二十兩 木香一斤四兩 南棗 神曲 麦芽 枳壳 萝卜子 藿香各五斤 半夏 党参各二斤半

【制法】共軋細面，水泛小丸。

七、沈 陽

【功能与主治】养胃理气。主脾胃虛弱，不思飲食，口不知味，胸腹痞悶，气郁不舒，胃脘脹痛，嘔吐痰

水，面色萎黃等症。

【处方】揀人参七兩 炒白朮一斤 白茯苓 香附 广砂仁 蒼朮 厚朴 广皮各八兩 白蔻仁七兩 广木香五兩 炙草二兩

【制法】共碾極細面，以生姜、大棗煎湯泛为小丸。

【剂量及用法】每服二錢，开水送下。

【禁忌】生冷硬物。

八、撫 順

【功能与主治】健胃助消化。主胃弱消化不良，嘈杂吞酸，嘔吐胃痛等症。

【处方】陈皮 香附 白朮 神曲 麦芽 半夏 蒼朮 焦梔 川朴 山楂 桔梗各十二兩 广木香 炙甘草各八兩 草蔻 川芎各十兩 枳实十二兩 砂仁四兩 藿香十兩

【制法】共为細面，水泛小丸。

【剂量及用法】每服一錢至二錢，食前姜水送下。

【禁忌】忌食生冷硬物。

【备考】一方川芎用一斤。

九、哈尔滨(养胃丸)

【功能与主治】健脾消食。主脾胃虛弱，消化不良，食入膨悶，泛嘔咯气，嘈杂吞酸。

【处方】桔梗 半夏 茯苓 梔子 枳实 厚朴 茅朮 山楂各六兩 砂仁 木香 炙草各四兩 香附 广皮 白朮 神曲 川芎 麦芽各八兩 藿香五兩

【制法】共碾为細面，水泛为小丸，如梧桐子大，裝袋。

【剂量及用法】每服一付(二錢)，空腹开水服。

【禁忌】忌食生冷，孕妇忌服。

十、承 德

【功能与主治】气逆嘔吐，胸悶痞滿，消化不良。

【处方】同北京。

【制法】共为細粉，水泛小丸，滑石为衣圓亮，每兩分作二百粒。

【剂量及用法】每服二十粒，日服二次，温开水送下。

【禁忌】忌食生冷油膩。

十一、呼和浩特

【处方】陈皮 香附 白朮 神

糲 麦芽 法夏 茯苓 枳实 梔子 山楂 黄芩各一斤半 甘草 黄连 木香 砂仁各一斤 藿香 川芎各一斤四兩

【制法】蜜大丸二錢重，蜡皮封固。

附参考古方

【来源】沈氏尊生書。

【功能与主治】胸痞。

【处方】白朮 陈皮 茯苓 半夏各一錢 香附 砂仁 木香 枳实 薤白 厚朴 藿香各七分 甘草三分 姜汁 棗二枚

香砂助胃丸

沈 陽

【功能与主治】健胃止瀉，暖胃理气。主小兒中風虛弱，脾胃失調，因寒作嘔，瀉痢吐乳，面黃肌瘦，慢脾風症。

【处方】人參五錢 白豆蔻 砂仁各四十粒 白茯苓五錢 干山藥一兩 肉豆蔻四个 公丁香一錢 白朮五錢 炙甘草一錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為小丸。

【剂量及用法】二岁以上者每服二分，三岁以上者每服五分，余者类推。开水送下。

【禁忌】生冷。

枳实消痞丸

一、上 海

【功能与主治】神倦食少，胸痞腹飽。

【处方】枳实(炒)五兩 麦芽(炒)二兩 黄连五兩 厚朴(制)四兩 干姜 甘草(炙)各二兩 白朮(炒)三兩 茯苓二兩 党参 半夏(炒)各二兩

【制法】共研細粉，水泛為丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每服三錢，溫開水送服。

二、武汉(失笑丸)

【功能与主治】胸腹痞滿，痰多欲嘔，食少倦怠。

【处方】同上海，分量为其十分之一。

【制法】取上药进行干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于二十粒。

【剂量及用法】每服三錢，溫開水送下。

三、福 州

【功能与主治】治心下虛痞，惡食懶倦，右关脉弦。

【处方】枳实(麵炒) 黄连(姜汁炒)各五錢 川朴(姜汁炒)四錢 半夏 麦芽(炒) 人參 白朮(土炒) 茯苓各三錢 甘草(炙) 干姜 錢

【制法】共為細末，蒸餅糊丸。

附参考古方

【来源】蘭室秘藏(失笑丸)

【功能与主治】升胃進飲食。治右关脉弦，心下虛痞，惡食，懶倦。

【处方】干姜一錢 炙甘草 麦蘖麵 白茯苓 白朮各二錢 半夏 人參各三錢 厚朴(炙)四錢 枳实 黄连各五錢

【制法】上為細末，湯浸，蒸餅為丸，梧桐子大。

【剂量及用法】每服五、七十丸，白湯下，食遠服。

烏头赤石脂丸

沈 陽

【功能与主治】暖胃溫腸，祛寒止痛。主胃腸受寒涼刺激，凝滯作痛。

【处方】烏头一分 蜀椒 干姜各一兩 附子五錢 赤石脂一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸。一錢重。

【剂量及用法】每服一丸，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

附参考古方

【来源】金匱要略方論。(赤石脂丸)

【功能与主治】心痛徹背，背精徹心。

【处方】蜀椒一兩(一法二分) 烏头(炒)一分 附子(炒)半兩(一法一分) 干姜一兩(一法一分) 赤石脂一兩(一法一分)

【制法】上為末，蜜丸，如桐子

大。

【剂量及用法】先食，服一丸，日三服。

四 神 丸

一、北 京

【功能与主治】散寒暖腹，溫胃止瀉。主五更泄瀉，腰痠腹痛。

【处方】肉豆蔻二兩 补骨脂四兩 五味子二兩 吳茱萸一兩

【制法】共為細粉，生薑四兩，紅棗百枚煎湯泛小丸。

【剂量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌寒冷食物。

二、天 津

【功能与主治】消食健胃，止瀉散寒。主因胃腸機能衰弱而致瀉肚，食物不能充分消化，腸鳴肚脹，五更瀉，經年不愈以致面黃身體瘦弱。

【处方】故紙(鹽炒)四兩 干姜一兩 肉豆蔻(滑石煨) 五味子(酒蒸) 棗肉各二兩 吳茱萸(甘草水制)一兩

【制法】共為細粉，水泛小丸，三錢重裝袋。

【剂量及用法】每次服一袋，開水送下。

【禁忌】生冷油膩食物。

三、上 海

【功能与主治】大便溏薄，黎明泄瀉。

【处方】肉果(煨)二兩 补骨脂(酒浸炒)四兩 五味子(炒)二兩 吳茱萸(鹽水炮炒)一兩

【制法】共研細粉，將紅棗十五兩，生薑八兩同煮爛，紅棗去皮核打糊為丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服一錢，米湯送服。

【禁忌】生冷食物。

四、南 京

【功能与主治】主脾腎虛寒，五更泄瀉，腰痠肢冷等症。

【处方】同上海。

【制法】共研細末，用鮮生薑八兩，小紅棗一百枚，同煮爛，去姜及棗皮核，以芡泥酌加煉蜜搗和為丸，每錢約二十粒。

【剂量及用法】每服二錢，食前空腹时米湯或盐湯吞服。

五、武 汉

【功能与主治】五更泄瀉，不思飲食，久痢虛痛，腰酸肢冷。

【处方】肉豆蔻(面煨，炒)二兩 补骨脂(酒浸，炒)四兩 吳茱萸(盐湯泡，炒)一兩 五味子(炒)二兩 生姜一兩 紅棗二兩

【制法】取上药四味进行干燥，混合碾細，照淨粉量將姜、棗煮成濃汁，加煉蜜 35~45%，混合迭成小丸，每錢不得少于二十五粒。

【剂量及用法】每服二錢至四錢，空腹开水或米湯送下。

六、福 州

【功能与主治】治腎虛脾瀉，大便不實，飲食不思，水谷不化，下元虛冷，五更泄瀉等症。

【处方】破故紙(酒浸炒)四兩 吳茱萸(盐湯炒)一兩 肉豆蔻(麵裹煨) 五味子(炒)各二兩

【制法】共为末，用紅棗、生姜同煎，棗爛去姜，搗棗肉为丸。

【剂量及用法】每临臥服盐湯下。

七、杭 州

【功能与主治】治脾腎虛寒，五更泄瀉，肢冷腰痛，不思飲食，久痢久瀉，腹中虛痛等症。有补腎固精，溫胃健腸之效。

【处方】煨肉果四兩 补骨脂(酒浸炒)八兩 吳茱萸(盐湯炒)二兩 五味子(炒)四兩 生姜一斤 大紅棗二百枚

【制法】共研細末，姜棗煮熟，去皮核打爛和药为丸。

【剂量及用法】每服二錢，米飲湯或淡盐湯送下。

八、南昌、济南

【功能与主治】脾腎虛寒，五更泄瀉，不思飲食，或久瀉虛痛，腰痠肢冷等症。

【处方】补骨脂(酒浸炒)四兩 吳茱萸(盐湯泡炒)一兩 肉豆蔻(麵裹炒)二兩 五味子(炒)二兩

【制法】共研細末，用生姜八兩、紅棗(百枚)十五兩切片同水煮熟，去姜取棗肉搗和为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢，临臥盐湯送下。

【禁忌】忌食生冷、油膩等物。

【备考】非經医师处方不得使用。

九、沙 市

【功能与主治】治脾腎兩亏，五更泄瀉。

【处方】黑故脂(酒浸一宿炒)四兩 吳茱萸(盐湯泡)一兩 肉豆蔻(面裹煨) 北五味(炒)各二兩

【制法】研細末，另用大棗百枚，生姜八兩切片同煮，棗爛去姜取棗肉搗爛为丸。

【剂量及用法】每服二錢，临臥时淡盐水下。

【禁忌】瀉泄非因脾腎虛寒者忌服。

十、西安、禹县

【功能与主治】煖胃固精补腎。主治脾腎虛，五更泄瀉，久痢腹痛，腰痠肢冷，食慾不进等症。

【处方】煨肉果二兩 吳茱萸(盐湯炒)一兩 破故紙(酒浸炒)四兩 五味子(煨)三兩 生姜四兩 大棗四十九枚

【制法】共为細面，棗肉为丸(禹县姜棗同煮，搗爛为丸)。

【剂量及用法】每服二錢，淡盐湯或米飲送下。

【禁忌】內热者忌服。

【备考】禹县有效期二年。

十一、蘭 州

【功能与主治】消食健胃，止瀉散寒。主治胃腸機能衰弱，瀉肚食物不能充分消化，腸鳴肚脹，五更泄瀉，經年不愈，以致身黃体瘦等症。

【处方】肉蔻(煨去油)二兩 破故紙(酒浸)四兩 五味子三兩 吳茱萸(盐湯泡) 干姜各一兩 棗仁(去核)四兩

【制法】共为細末，水打为丸。

【剂量及用法】每服二錢，临臥时开水送下，小兒酌減。

【禁忌】实热及急性腸胃炎忌服。

十二、大 同

【功能与主治】脾胃虛弱，大便不實，飲食不思。

【处方】同南昌。

【制法】共軋細面，大棗肉为小丸。

【剂量及用法】每服二錢，开水送下。

十三、青 島

【处方】同南昌。

【制法】棗肉为丸，姜引。

十四、沈 陽

【功能与主治】健胃止瀉。主脾腎虛弱，五更泄瀉，腹痛腸鳴，身体衰弱，經久作瀉，腸滑虛脫。

【处方】破故紙 五味子各四兩 肉豆蔻二兩 吳茱萸一兩

【制法】共碾極細面，棗肉、姜汁为小丸。

【剂量及用法】每服二錢，临睡时以淡盐湯送下。

【禁忌】魚肉生冷硬物。

十五、撫順(止瀉四神丸)

【功能与主治】溫性，健胃整腸。主胃腸虛寒，水谷不化，腸鳴腹痛，四肢清冷，久瀉不止，倦怠無力，五更作瀉等症。

【处方】白朮四兩 芡实二兩 茯苓四兩 故紙三兩 五味子四兩 肉蔻二兩半 吳茱萸二兩 炙甘草 訶子各二兩

【制法】共为細面，棗肉为丸。

【剂量及用法】每服一錢四分，早晚二次，食前姜水送下。

【禁忌】忌食生冷油膩等物。

十六、吉林、哈尔滨

(止瀉四神丸、神效四神丸、故紙四神丸)

【功能与主治】溫寒补腎止泄。主治脾腎虛寒，水谷不化，腸不能整，五更腎瀉，腹疼腸鳴，四肢清冷，腰痠体軟，倦怠無力。

【处方】破故紙(酒浸炒)四兩 吳茱萸(鹽水炒)一兩 肉豆蔻(麵裹煨) 五味子(炒)各二兩 大棗百枚 鮮薑八兩

【制法】將大棗、鮮薑同煎，俟棗爛去皮核，去薑皮等物搗爛，合前药面为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】临睡时用淡鹽湯送下，每服二錢，十三岁至十六岁服一錢二分，六岁至十二岁服七分。

【禁忌】服后忌食生冷，黏膩物品。

十七、承德

【功能与主治】散寒暖腹，溫胃止瀉。主五更泄瀉、腰痠腹痛。

【处方】肉豆蔻二兩 补骨脂四兩 五味子二兩 吳茱萸 兩 紅棗(去核)四兩

【制法】共为細粉，生薑四兩、紅棗百枚，煎湯泛小丸。

【剂量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌寒冷食物。

附参考古方

【来源】杂病証治类方。

【功能与主治】治脾胃虛弱，大便不實，飲食不思，或泄瀉腹痛等症。

【处方】肉豆蔻二兩 补骨脂四兩 五味子二兩 吳茱萸(浸炒)一兩

【制法】上为末，生薑八兩，紅棗一百枚煮熟，取棗肉和末，丸如桐子大。

【剂量及用法】每服五、七十丸，空心或食前白湯送下。

太倉丸

一、濟南

【功能与主治】脾胃虛弱，翻胃嘔吐，痞悶噯气。

【处方】公丁香 砂仁 白蔻各一兩 陈倉米四兩

【制法】共为細末，生薑汁为丸，梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢。

二、青島

【处方】蔻仁三十兩 砂仁三斤一兩二 蒼朮(去油)三十斤

【制法】共研面，水泛成丸。

三、沈陽

【功能与主治】和脾胃，舒气逆。主脾胃虛弱，不進飲食，反胃嘔吐，膨悶飽脹。

【处方】白豆蔻 縮砂仁各二兩 丁香一兩 陈倉米二兩(炒赤)

【制法】共碾極細面，姜汁泛为小丸。

【剂量及用法】每服六、七十丸，淡姜湯送下。

【禁忌】生冷硬物。

四、呼和浩特

【处方】陈倉米十斤 砂仁二斤半 蒼朮一斤十四兩 白蔻仁十兩

【制法】水泛小丸。

附参考古方

【来源】女科証治准繩。

【功能与主治】治脾胃虛弱，不進飲食，反胃嘔吐。

【处方】白豆蔻 縮砂仁各二兩 丁香一兩 陈倉米(用黃土炒，米赤，去土不用)一升

【制法】上为細末，姜汁泛丸，梧子大。

【剂量及用法】每服六、七十丸，食后淡姜湯下。

二姜丸

一、沈陽(止痛二姜丸)

【功能与主治】健胃祛寒，止痛化郁。主胃脘疼痛，腹滿脹痛，寒郁凝結，小腹疝痛。

【处方】良姜三兩 干姜 乳香各一兩五錢 沒藥 細辛各七錢五分 枳實 延胡各二錢 灵脂一兩 炒白朮一錢 丁香五錢 白豆蔻一兩

【制法】共碾極細面，用神曲糊为小丸。

【剂量及用法】每服二錢，開水送下，病重者日再服。

【禁忌】粘硬生冷之物。

二、撫順

【处方】良姜 干姜各四兩 乳香 沒藥各二兩 細辛一兩 枳實 元胡各二兩 公丁五錢 灵脂一兩五錢 白朮一兩六錢 白蔻一兩。

【制法】共为細面，神曲面为小丸。

加味二陈丸

沈陽

【功能与主治】開胃調气，降逆止嘔。主胃弱嘔噦，打嗝吞酸，飲食不消，痞悶脹飽，胸脇攻痛，食積氣滯，消化不良，噎膈反胃。

【处方】半夏二兩 茯苓二兩 廣皮一兩 粉甘草 生赭石 竹茹各五錢 旋復花二兩 白朮一兩 丁香 柿蒂 佩蘭叶 藿香各五錢 板榔片七錢 枳實五錢 萊菔子七錢 砂仁五錢

【制法】共为極細面，蜜丸二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，一日三次，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

舒泰丸

一、沈陽

【功能与主治】開郁順气，化滯消脹。主肝郁气逆，脾胃虛弱，噯气不舒，吞酸嘈雜，脇肋攻痛，牽及肩背，全身作痛，胃脘悶脹，不進飲食等症。

【处方】紫蘇 藿香梗 桔梗各八錢 白芍 紫蔻仁 紫朴 廣皮 青皮 茅蒼朮 板榔各五錢 柴胡 川芎 廣木香 粉甘草各三錢 魚三仙一兩二錢

【制法】共碾極細面，蜜丸二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，姜水送下。

【禁忌】辛辣，孕婦忌服。

二、撫順

【功能与主治】健胃助消化。主暴飲暴食，消化不良，嘈雜吞酸，惡心嘔吐，水土不服，食慾不振，脹悶胃痛，噯气不舒等症。

【处方】同沈陽，多沉香五錢，三仙用十二兩。制法亦同。

【剂量及用法】每服一丸，每日早晚二次，姜水送下。

【禁忌】孕婦忌服；忌食生冷等物。

沉香交泰丸

沈陽

【功能与主治】化痞消食，開郁止痛。主膈下痞悶，胃中積滯，嘔吐腹痛，停食停水。

【处方】沉香 橘紅 白朮各三錢 厚朴五錢 吳萸 枳實 茯苓 當歸 青皮 木香 澤瀉各二錢 大黃一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，溫湯送下。

【禁忌】孕婦忌服。

附參考古方

【來源】丹病証治類方。

【處方】沉香 橘紅 白朮各三錢 厚朴(姜制)五錢 吳茱萸(湯泡) 枳實(麩炒) 青皮(去白) 木香 白茯苓 澤瀉 當歸各二錢 人黃(酒浸)一兩

【制法】共為細末，湯浸蒸餅為丸，桐子大。

【劑量及用法】每服五十丸加至七、八十丸，溫湯下，微利為度。

三物備急丸

一、上海(金匱備急丸)

【功能與主治】食停腸胃，腹脹氣急，中惡厥逆。

【處方】巴豆霜一兩 大黃 干姜各二兩

【制法】共研細粉，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】憑醫師處方購用。

【禁忌】孕婦忌服。

二、武漢

【功能與主治】寒積食滯，脹滿氣急，劇烈腹痛。

【處方】巴豆(去油) 干姜(去皮) 煨大黃各一兩

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜45~50%，造成小丸，每錢不得少于二十五粒。

【劑量及用法】每服三分至五分，開水、米湯或溫酒送下。

【禁忌】休弱者及孕婦忌用。

三、福州(備急丸)

【功能與主治】治胃中停滯寒冷之物，心腹作痛如錐及脹滿下氣，並卒暴病，中惡寒忤，口噤卒死皆治之。

【處方】巴豆霜 大黃 干姜粉

【制法】共研末和勻，煉蜜為丸，石臼內杵千余下如泥，丸如小豆大。

【劑量及用法】夜臥時溫水下一丸，氣實者加一、二丸，如卒病，不計

時候服，如卒死口噤，即斡口折齒灌之。

【禁忌】孕婦忌服。

四、杭州(金匱備急丸)

【功能與主治】治食停腸胃，冷熱不調，腹脹氣急，痛滿難忍，中惡客忤，卒暴口噤等症。

【處方】同上海。

【制法】共研細末，煉蜜為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服四至八分，米飲湯或開水送下。

五、南昌

【功能與主治】冷積便秘，突發脘腹劇痛，面青口噤者。

【處方】巴豆霜(去淨油)一兩 大黃二兩 干姜二兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服一分，溫開水送下。服后四小時，大便未下，再服一分，以便通為度。若口噤者將丸化開，灌服，若服后泄瀉不止，食冷粥或冷開水止之。

【禁忌】非實症及孕婦忌服。

【備考】非經醫師處方不得使用。

附參考古方

【來源】金匱要略方論。

【功能與主治】上心腹諸卒暴百病，若中惡客忤，心腹脹滿，卒痛如錐刺，氣急口噤，停屍卒死者。

【處方】大黃 干姜 巴豆(去皮去殼外研如脂)各一兩

【制法】上藥各須精新，先搗大黃、干姜為末，研巴豆內中，令治一千杵，用為散，蜜和丸亦佳，密器中貯之莫令歇。

【劑量及用法】以緩水若酒服大豆許三四丸。或不下，捧頭起灌令下咽，須臾當差。如未差，更與二丸，當腹中鳴，即吐下便差。若口噤，亦須折齒灌之。為散用亦可，先和或汁，乃傾口中，令從齒間得入，不為驗。

百補增力丸

一、北京

【功能與主治】健胃消導，益氣

養血。主身體虛弱，過勞咯血，精神疲倦，食慾不振。

【處方】六神曲 橘皮各十六兩 白芍二兩 麦芽四兩 蒼朮八兩 谷芽四兩 山楂八兩 枳殼 半夏各四兩 川芎二兩 厚朴 香附(醋炒)各四兩 茯苓四兩三錢 甘草四兩 鹿角霜 澤瀉 人參(去蘆)各三錢 大黃炭四錢 棕板炭一兩 山藥四兩 川附片二錢 荷葉三十二兩 梔子 側柏炭各三錢 山茱萸四錢 當歸 大小蘗各五錢 茅根 丹皮 白朮各四錢 肉桂三錢 茜草四錢 紫河車 黃耆 黃芩各四兩 黨參二兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重一錢五分。

【劑量及用法】每服一丸或二丸，溫開水送下。

【禁忌】勞碌氣惱。

二、天津(增力丸)

【功能與主治】強壯健胃，宣導消食。主膨悶脹飽，噯氣吞酸，耳鳴腹瀉，四肢無力，精神疲乏，食慾不振。

【處方】神曲(麩炒) 炒麦芽 白朮(麩炒)各四兩 厚朴(姜制)二兩 枳實(麩炒)四兩 茯苓(去皮)制半夏 橘紅 陳皮 黨參(去蘆)各二兩 當歸 生地 生白芍 柏杞子各一兩 黃柏五錢 山茱萸(酒制)一兩 黃連五錢 生山藥 澤瀉各一兩 廣木香三錢 扁豆(去皮炒)五錢 炙甘草(麩炒) 甘草各五錢 遠志肉(甘草水制)一兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

三、蘭州(增力丸)

【功能與主治】強壯，健胃，為消導藥。主膨悶脹飽，噯氣吐酸，耳鳴腹瀉，四肢無力等症。

【處方】神曲 麦芽 山楂 蒼朮 陳皮 白朮 厚朴各八兩 黨參一兩

【制法】共為細面，煉蜜為丸，每丸重二錢。

【劑量及用法】每服二丸，開水送下。

四、青島(百補增力丹)

【處方】當歸 白朮各二兩 自然銅一兩 川續斷二兩 茯苓四兩 白芍 土龍 牛夕各二兩 生地三兩 黨參 馬錢子各二兩 神麴 菟絲子 麥芽各四兩 芡實 杜仲各二兩 陳皮四兩 黃芪二兩 甘草一兩。

【制法】共軋細面，蜜丸二錢大。

五、呼和浩特

【處方】焦蠟三斤 山楂 麥芽 焦蒼朮 川朴 陳皮 焦青皮 焦枳實各一斤

【制法】每斤面，兌馬錢面三錢，飴糖合蜜為大丸，重一錢五分。

葛花解酲丸

一、杭州

【功能與主治】治飲酒過度，濕熱傷中，嘔吐泄瀉，頭痛心煩，胸脘痞塞，小便不利等症。解積酲，固中氣，使濕從下行，則宿酒消矣。

【處方】豬黨參 炒冬朮 廣陳皮各四錢 葛花一兩 六神曲 淡干姜 豬苓各二錢 茯苓四錢 澤瀉三錢 豆蔻一兩 廣木香一錢 春砂仁一兩 小青皮四錢

【制法】共研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服二至三錢，開水送下。

二、青島

【處方】青皮 葛花 陳皮 豬苓 人參各一兩 豆蔻 砂仁 木香各四兩 澤瀉 云苓 神麴 白朮各半斤 干姜四兩

【制法】共研面，水泛小丸。

三、呼和浩特

【處方】黨參一斤 砂仁 木香各八兩 白蔻四兩 干姜十兩二錢 青皮 陳皮 葛花 澤瀉 豬苓各一斤 白朮 茯苓 神麴各半斤

【制法】共為細面，水泛小丸。

溫白丸

一、沈陽

【功能與主治】消宿食，調腸胃。主腹中積塊，反胃噎膈，胃腹脹痛，

大便秘結，嘔吐氣逆。

【處方】川烏二兩五錢 紫苑 菖蒲 柴胡 厚朴 桔梗 皂角 吳茱萸 茯苓 干姜 巴豆霜 黃連 人參 肉桂 川椒各一兩五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，三分五厘重。

【劑量及用法】每服一丸至二丸，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、撫順

【處方】川烏五錢 紫苑一兩 柴胡 川朴各一錢 洋參一兩 肉桂 吳茱萸 干姜 伏神 桔梗 干姜 皂角 川椒 巴豆霜各一錢 山參 菖蒲各五錢

【制法】共為細面，蜜丸三錢入。

附參考古方

【來源】太平惠民和劑局方。

【功能與主治】治心腹積聚，久癥癖塊，大如杯碗，黃疸宿食，朝起嘔吐，又滿上氣，時時腹脹，心下堅結，上米搶心，傍攻兩脇，十種水氣，八種痞塞，翻胃吐逆，飲食噎食，五種淋疾，九種心痛，積年食不消化，或癆疾連年不瘥，及疔一切諸風，身體頑痹，不知痛癢，或半身不遂，或眉髮墮落，及疔七十二種風，三十六種通尸疰忤，及癰癤，或婦人諸疾，斷續不牛，帶下淋瀝，五邪失心，愁憂思慮，意思不樂，飲食無味，月水不調，及腹中一切諸氣，有似懷孕，連年累月，羸瘦困弊，或歌或笑，如鬼所使，但服此藥，無不除愈。

【處方】川烏頭(炮，去皮臍)二兩半 紫苑(去苗葉皮土) 菖蒲 柴胡(去蘆頭) 厚朴(去粗皮，生姜制) 桔梗 皂莢(去皮子，炒) 吳茱萸(用湯洗七次，焙炒) 茯苓(去蘆皮) 干姜(炮) 巴豆(去心皮膜，出油炒研) 黃連(去鬚) 人參(去蘆頭) 肉桂(去粗皮) 蜀椒(去目及閉口者，微炒出汗)各半兩

【制法】上為細末，入巴豆，令勻，煉蜜為丸如桐子大。

【劑量及用法】每服三丸，姜湯下，食前臥服。漸漸加至五丸、七丸。

硃砂萬應丸

一、大同

【功能與主治】開積降食，瀉大腸。

【處方】巴豆霜二兩 硃砂五錢 寒食面一兩五錢 郁金一兩

【制法】共研細面，糊為小丸如黃米大。

【劑量及用法】每次服五丸，開水化服。

二、沈陽

【功能與主治】通調脾胃，消滯化滯。主飲食停滯，腹脹痛滿，大便秘結，食滯胃腸。

【處方】野大黃 干姜 寒食面各一兩 巴豆霜一兩

【制法】共碾極細面，向糊為小丸，每丸一分五厘重。

【劑量及用法】每服三丸，開水送下。若中惡口噤者，則用黃酒送下。

【禁忌】生冷油膩，孕婦忌服。

三、撫順(硃砂萬應丸)

【功能與主治】溫降寒積，瀉下。主寒積腹痛凝聚，臍腹絞結，疼痛拒按，堅硬結塊，酒毒傷胃，停食停水，胸膈疼痛。

【處方】川軍 干姜各四兩 巴豆霜一兩

【制法】共為細面，糊小丸，硃砂衣。

【劑量及用法】每服十粒，空腹開水送下。

【禁忌】忌食辛辣、生冷硬物，孕婦忌服。

四、吉林、哈爾濱

(萬應丸、硃砂萬應丸)

【功能與主治】溫降寒積。主治寒積腹痛，寒食凝聚，臍腹絞結，疼痛拒按，堅硬結塊，胃脘寒痛，酒毒傷胃，停食，胸膈疼痛，咯氣嘔逆。

【處方】大黃 巴豆霜 廣郁金 滴乳香各五錢 明雄黃 硃砂各二錢半

【制法】硃砂、雄黃各自另研，余藥共為細面，一處調勻，陳醋打糊為丸，如小豆粒大。

【劑量及用法】每服十粒，空腹

內 科

开水服。

【禁忌】忌食辛辣生冷等。

附参考古方

【来源】增补万病回春。(神仙万应丸)

【功能与主治】治小兒乳食生冷所伤，發熱肚腹諸症。

【处方】硃砂(明透鏡面者佳) 巴豆(去壳并心膜) 寒食麵(于清明前一日名寒食，用白麵不拘多少，好酒和面一塊，包細干麵在內，蒸熟听用)

【制法】以上各五錢，先將硃砂研細，次入巴豆，又研細，却將寒食麵去包皮，取內細麵，用好酒打成糕，蒸熟入藥內，乃又司研百余下为丸，如黍米大。

【剂量及用法】每服三五丸，看人大小加減。

【备考】用各随症，用引于后：感冒風寒發熱，姜、葱煎湯下出汗。傷飲食生冷茶下。心痛，艾、醋湯下。腹痛，淡姜湯下。霍亂吐瀉，姜湯下。赤痢，清茶下。白痢，姜湯下。赤白痢疾，姜、茶湯下。瘧疾作寒，冷水下。諸虫作痛，苦楝根皮湯下。小便不通，灯心湯下。積聚發熱，茶清下。大便閉結，茶清下。急慢驚風，薄荷湯下。咳嗽痰喘，姜湯下。

黑 虎 丸

蘭 州

【功能与主治】消積塊，利水通便，泄安熱，蕩滌腸胃積滯。

【处方】川軍五錢 巴豆霜二錢 干姜 郁李仁各五錢

【制法】共为細面，面糊为丸，以雄黃、蛋清为衣。

【禁忌】气血双虛、胃寒及孕婦产后均忌服。

陸氏潤字丸

一、福 州

【功能与主治】善治濕熱，食積胸滿，腹痛便閉，及夏秋赤白痢等症。

【处方】錦紋大黃二兩 枳實法夏 檳榔 花粉 楂肉 廣皮 蒼朮 前胡各二錢五分

【制法】共研細末，水泛为丸。

二、杭 州

【功能与主治】清熱導滯，調氣潤腸。治濕熱食積，胸滿不食，腹痛便閉，赤白痢疾等症。

【处方】同福州，惟大黃用酒制，蒼朮作炒冬朮。

【制法】共研細末，生姜汁和神曲打糊为丸。

【剂量及用法】每服二至三錢，开水送下。

沉香紫蔻丸

沈 陽

【功能与主治】消食健胃，开郁止痛。主腹滿胃痛，消化不良，嘔吐打咯，食慾不振，膨悶脹飽，反胃吐酸。

【处方】紫蔻一錢 草蔻三錢 萊菔子五錢 廣木香三錢 消九錢 沉香 大黃 炒枳實 檳榔 青皮 廣皮 厚朴 廣砂 柴胡內金各四錢

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，开水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

虎 肚 丸

一、杭州(神效虎肚丸)

【功能与主治】健脾和胃，溫中消痰。治反胃噎膈，嘔吐吞酸，飲食少進，不服水土等症。

【处方】虎肚一具 炒茅朮二兩 紅芽大戟四兩 川朴十五兩 炙甘草二兩 蟾酥一兩 陳皮五兩

【制法】置黃砂缸內，用炭火燉半焦，研为細末，酒糊为丸，如綠豆大，每斤丸药用金箔七十張洒为衣。

【剂量及用法】每服五分，小兒三分，姜湯送下。

二、沈 陽

【功能与主治】健胃寬胸利膈，增進消化機能。主翻胃噎膈，嘔吐吞酸，食慾不振，日漸消瘦或不服水土，胃腸障礙。

【处方】虎肚洗淨焙干 厚朴制甘草 廣皮各一兩 蒼朮二兩

【制法】共碾極細面，水泛为小

丸。

【剂量及用法】每服五分或三分，姜湯送下。

【禁忌】生冷食物。

消脹止痛丸

濟 南

【功能与主治】消化不良，嘔吐呃逆，肝气不舒，胸膈悶。

【处方与制法】川連二斤 吳萸十二兩(以上二味同泡一晝夜炒用) 二丑(微炒) 香附(酒醋各二斤泡一晝夜晒干) 各四斤 木香一斤半 砂仁二斤 萊菔子(微炒)四斤半 郁金 枳實(炒) 烏藥各二斤半 紫蔻仁 蘇梗 廣皮 赤苓各一斤半 神曲三斤 藜朮 山楂各一斤半 草蔻一斤 薑梗 三稜(醋炒) 莪朮(醋炒)各一斤半 蘇子一斤 紅蔻 柴胡(醋炒)各十二兩 青皮(醋炒)三斤 竹茹 白朮(炒焦) 川朴各二斤 丹參一斤半 薄荷二斤半 瓜蒌三斤 桃仁一斤半 靈脂(炒)二斤半 草菓仁(煨)十二兩 共为細面，用醋兌水各半，打丸，並以下方为衣：滑石二斤半 檀香一斤 杭芍二斤(炒) 花粉二斤 檳榔一斤半 降香二斤 元胡一斤半 清夏二斤 澤瀉一斤半 赭石十二兩 以上共为細面，打于外皮为衣。

【剂量及用法】每次服二十粒(重八分)，病重者服四十粒，小兒服十粒，白水送下。

【禁忌】忌食生冷堅硬辛辣油膩等物；孕婦忌服。

心胃止痛丸

沈 陽

【功能与主治】調氣溫中，消積止痛。主胃腸疼痛，腸疼脹滿，泄瀉不止，吐食吞酸，食慾不振，消化不良。

【处方】五靈脂 元胡索 莪朮 烏朮 良姜各一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸，二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，溫水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

烏龍丸

一、上海

【功能与主治】膈腕气滯，脾胃虛弱泄瀉。

【处方】九香虫(炒)一兩五錢 車前子(炒) 陈皮 於朮(炒)各四錢 枳 仲(炒)八錢

【制法】共研細粉，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服一錢至一錢五分，溫開水送服。

二、杭州(舒肝烏龍丸)

【功能与主治】健脾舒肝，調氣止痛。治肝胃氣滯，郁結不散，胸腹疼痛，四肢厥冷，腰脇痠疼，脾虛泄瀉等症。

【处方】同上海，分量加倍。制法亦同。

【劑量及用法】每服二至三錢，淡鹽湯送下。

寬中丸

武 漢

【功能与主治】氣滯胸痞，噎塞，胃寒作痛。

【处方】广陈皮四兩 焦白朮二兩 广木香四錢 香附二兩 白豆蔻 縮砂仁各四錢 青皮 枳櫚各一兩 半夏 茯苓各二兩 厚朴 甘草各一兩 生姜二兩

【制法】上藥(除生姜外)干燥，混合碾細，用生姜煎水送成小丸，每錢不得少于三十粒。

【劑量及用法】每服二至三錢。

調胃健中丸

天 津

【功能与主治】健胃解郁，溫中消食。主脾胃不和，中滿脇脹，胃口疼痛，嘔吐酸水，倒飽嘈雜，腹脹腹痛，停食積水，消化不良。

【处方】人參(去蘆)一兩 白朮(麩炒)八錢 白豆蔻 良姜各六錢 郁李仁一兩 草薢仁(姜炒)六錢 枳櫚一兩 厚朴(姜制)八錢 甘草五錢 制半夏 茯苓(去皮) 藿香 叶 神曲(麩炒)各五錢 炒麦芽 炒萊菔子各八錢

【制法】共為細粉，涼開水泛小丸，一錢重裝袋。

【劑量及用法】每次服一袋，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

資生丸

一、上海

【功能与主治】健脾開胃，消食和中。

【处方】党參 白朮(炒)各二兩 怀山藥一兩五錢 薏苡米二兩 芡實(炒) 麦芽(炒) 茯苓各一兩五錢 山楂(炒焦) 六神曲(炒焦)各二兩 甘草(炙) 藿香各五錢 蓮子一兩 澤瀉(炒) 黃連(姜汁炒)各二錢五分 桔梗五錢 豆蔻仁二錢五分 白扁豆(炒)一兩 橘紅二兩

【制法】共研細粉，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服三錢，溫開水送服。

【禁忌】忌食生冷。

二、武 漢

【功能与主治】脾胃虛弱，食滯便溏，或妊娠嘔吐。

【处方】同上海。

【制法】上藥干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于三十粒。

【劑量及用法】同上海。

三、杭州(健脾資生丸)

【功能与主治】健脾開胃，消食止瀉，調和臟腑，滋養營衛。治脾胃虛弱，食不運化，胸脘飽滿，面黃肌瘦，大便溏泄，以及婦人妊娠嘔吐，小兒疳積，神疲便溏等症。

【处方】潞党參一兩 炒白扁豆一兩五錢 豆蔻仁八錢 川黃連(姜汁炒)四錢 炒冬朮三兩 蓮子肉 六神曲 白茯苓 广桔紅各二兩 山楂肉(蒸) 炙甘草 芡實各一兩五錢 广藿香一兩 炒麦芽 怀山藥各二兩 春砂仁一兩五錢 桔梗一兩 炒薏苡米一兩五錢

【制法】共研細末，煉蜜為丸，或水泛丸。

【劑量及用法】每服二至三錢，米飲湯或開水下，婦人淡姜湯送下。

四、沙 市

【功能与主治】此丸健脾開胃，消食止瀉及婦女妊娠下月，脾虛嘔吐等症。

【处方】土炒白朮 米炒党參 炒苡仁各三兩 茯苓二兩 蒸熟山楂肉一兩五錢 姜汁炒黃連八錢 广陈皮 炒神曲各二兩 白蔻仁 砂仁各八錢 藿香 叶 桔梗 炙甘草各一兩 炒扁豆 炒蓮米 炒山藥 炒芡實各二兩 麦芽一兩五錢

【制法】研細末蜜丸。

【劑量及用法】成人量每服二、三錢，溫開水下，每日服二次。

【禁忌】貧血有熱，津液不足者忌服。

五、沈陽(資生健脾丸)

【功能与主治】健脾開胃，消食止瀉。主脾胃虛弱，飲食無味，嘔吐腹滿，食后困倦，面黃肌瘦，胸膈不舒，精神萎縮。凡消化不良所起之疾患，均能治之。

【处方】白朮 人參 薏仁各三兩 茯苓一兩五錢 山楂肉 橘紅 炒神曲各二兩 黃連 白蔻仁 澤瀉各二錢五分 藿香 桔梗 白扁豆 炙甘草各五錢 山藥 蓮子肉各一兩 炒麦芽 芡實各一兩五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸一錢重。

【劑量及用法】每服一丸，姜湯送下。

【禁忌】生冷硬物。

六、撫順(資生健脾丸)

【功能与主治】健胃，整腸，止瀉。主胃腸衰弱，消化不良，大便溏泄，嘈雜吞酸，不思飲食，面黃肌瘦。病后調養，用以開胃。

【处方】白參 谷芽 桔梗 紫薏 白朮 薏米 陈皮 山楂 神曲 云苓 山藥 扁豆 芡實 澤瀉 炙甘草各四兩 姜連 藿香 蓮肉各二兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，開水、姜水送服均可。

【禁忌】生冷油膩之物。

白朮丸

青島

【处方】党参二兩 山藥四兩 建耨二兩 白朮二兩 茯苓 薏米各四兩 陈皮八兩 扁豆四兩 砂仁二兩 桔梗四兩 甘草二兩 三仙八兩

【制法】共研極細面為丸。

大健脾丸

大同

【功能与主治】快胃健脾。

【处方】党参四兩 白朮 茯苓各三兩 当归一兩 炒山藥 炒蓮子肉 扁豆 炒干姜各四兩 附子一兩五錢 陈皮 炙草各二兩 薏米四兩 厚朴二兩 木通一兩

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

【剂量及用法】每服三錢，開水送下。

小健脾丸

武漢

【功能与主治】身體衰弱，面黃肌瘦，飲食無味，久瀉不止。

【处方】党参八兩 陈耨 扁豆各五兩 谷芽六兩 砂仁 甘草各三兩 茯苓 枳壳各四兩 山楂五兩 广陈皮四兩 白朮(焦)六兩 桔梗四兩 建耨 山藥各六兩 生薑二兩 紅棗四兩

【制法】上藥干燥，混合碾細，用淨水送成小丸。每錢不得少于四十粒。

【剂量及用法】每服三錢，日服三次，開水吞服。

人參健脾丸

一、北京

【功能与主治】健胃強心。主身體瘦弱，失眠健忘，不思飲食，時常作瀉。

【处方】人參(去蘆) 遠志 砂仁各八十兩 木香四十兩 茯苓 酸棗仁(炒) 当归 橘皮各一百六十兩 黃耆 山藥各三百二十兩 白朮四百八十兩

【制法】共為細粉，煉蜜為小丸。

【剂量及用法】每服三錢，日服二次，溫開水送下。

二、天津

【功能与主治】強壯身體，健脾開胃消食。主身體衰弱，消化不良，面色萎黃，精神倦怠，胸腹脹滿，腸鳴瀉肚。

【处方】广木香三兩 甘草二兩 当归 青皮(醋炒)各四兩 枳壳(麸炒)二兩 广皮 砂仁 神耨(麸炒) 扁豆(去皮炒) 炒麥芽 芡實(麸炒)各四兩 蓮子(去心)六兩 白朮(麸炒) 山楂各四兩 人參(去蘆)二兩 薏米(麸炒)八兩 生山藥六兩 茯苓(去皮)二兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，開水送下。

三、上海(健脾丸)

【功能与主治】脾虛氣弱，食不消化。

【处方】党参 陈皮各二兩 山楂(炒焦)一兩五錢 白朮(炒) 麥芽(炒)各二兩 枳壳(炒) 六神耨(炒焦)各二兩

【制法】共研細粉，水泛為丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每服三錢，溫開水送服。

【禁忌】忌食生冷。

四、南京(健脾丸)

【功能与主治】主胃腸衰弱，食滯便溏。

【处方】潞党参二兩四錢 砂仁 白茯苓 炒苡仁各一兩六錢 炒於朮二兩二錢 炙甘草一兩六錢 怀山藥二兩四錢 广陈皮一兩六錢 川連(姜汁炒)四錢 焦六耨一兩六錢 蓮子肉(去蕊) 焦查肉 白扁豆各二兩四錢

【制法】共研細末，用鮮生薑一兩 小紅棗三十枚煎湯泛丸，每錢約做八十粒。

【剂量及用法】每次用量二錢至三錢，一日二次，早晚開水吞服。

【備考】本方由參苓白朮丸、資生健脾丸、資生丸、人參健脾丸、黃連資生丸合併而成。

五、武漢(健脾丸)

【功能与主治】脾胃虛弱，不思飲食，腹痛腹泄，嘔吐心煩等症。

【处方】炒白朮二兩半 木香(研) 黃連(酒炒) 甘草各七錢半 白茯苓二兩 党参一兩半 陈耨 砂仁 陈皮 麥芽 山楂 山藥 肉豆蔻(面裹煨熟，去油)各一兩。

【制法】上藥干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于三十粒。

【剂量及用法】每服三錢，米湯下，空腹時服，小兒酌減。

六、福州(健脾丸)

【功能与主治】健脾益氣，強中消谷，除濕寬胸，補虛消痞。主治脾虛氣弱，飲食不消。

【处方】人參 白朮(土炒)二兩 陈皮 麥芽(炒)二兩 山楂(去核)一兩五錢 枳實三兩

【制法】共研細末，神耨糊丸。

【剂量及用法】米湯飲下。

七、沙市

【功能与主治】治脾虛氣弱，食慾不振，飲食不易消化等症。

【处方】土炒白朮二兩五錢 广木香 黃連各七錢五分 茯苓二兩 北條參二兩 六神耨 山楂 麥芽 砂仁 广陈皮 怀山藥 苡仁各一兩

【制法】共研細末，冷開水泛丸如綠豆大。

【剂量及用法】每次服二錢，空腹開水送下，每日服一次。

【禁忌】體弱腹脹者勿服。

八、西安

【功能与主治】主治消化機能衰弱，面黃肌瘦，精神倦怠。

【处方】同北京，制法亦同。

【剂量及用法】每服二錢至三錢，開水送下。

【禁忌】神經興奮及熱性病忌服。

九、蘭州

【功能与主治】健胃消食。主身體衰弱，消化不良，面色萎黃，精神倦怠，胸腹脹滿，腸鳴腹瀉。

【处方】同天津。

【制法】共研細面，蜜小丸。

【劑量及用法】每服三錢，日服兩次，開水送下。

十、大同

【功能與主治】氣虛胃寒，飲食不進。

【處方】人參三兩 白朮 薏米各四兩 廣皮 山藥 神麴 云苓各二兩 砂仁五錢 扁豆 蓮子 麥芽各二兩 山楂三兩 白糯米 桔梗各一兩 澤瀉五錢 芡實二兩 炙草五錢

【制法】共軋細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服三錢，開水送下。

十一、禹縣(健脾丸)

【功能與主治】脾虛氣弱，飲食不化，久瀉久痢，倒飽翻胃。

【處方】同福州。

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢，開水送下。

【禁忌】寒症忌用。

【備考】有效期間一年。

十二、濟南

【功能與主治】身體衰弱，面黃肌瘦，飲食無味，久瀉不止。

【處方】同福州。

【制法】上為細末，神麴六兩糊丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】成人每服一錢，日三服，開水送下。

【禁忌】辛辣生冷油膩等物；孕婦忌服。

十三、青島

【處方】黨參八兩 神麴 赤苓 麥芽 扁豆 山藥各一斤 陳皮三斤 砂仁四兩 白朮 黃芪各一斤 甘草半斤 薏米一斤 遠志四兩

【制法】共軋麵，蜜丸，如桐子大。

【備考】一方同北京。

十四、沈陽

【功能與主治】健脾。主消化不良，噯泄腹痛，嘈雜吞酸，不思飲食，面黃肌瘦，四肢倦怠，營養失調。

【處方】炒白朮一斤 人參 白茯苓 廣皮各一斤 枳殼 姜黃連

炒神麴 炒麥芽各八兩 吳萸 廣木香各二兩 當歸六兩 青皮 白薏各四兩

【制法】共碾成細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，開水送下。

【禁忌】生冷硬物。

十五、撫順

【功能與主治】健胃整腸，強壯。主胃腸衰弱，消化不良，便瀉腹痛，嘈雜吞酸，食慾不振，四肢倦怠，面黃肌瘦等症。病后服之能調養正氣，開胃進食。

【處方】白參二兩 枳殼 香附 白朮 川朴 云苓 扁豆 山藥 山楂 陳皮各二兩 神麴四兩 芡實 蓮肉各二兩 麥芽四兩 砂仁 薏米各二兩 青皮 炙草 薑香各二兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，一日二次，開水、開水均可送服。

【禁忌】生冷粘膩之物。

十六、吉林、哈爾濱(健脾丸)

【功能與主治】健脾胃，補虛弱。主治消化不良，大便瀉泄，臍腹疼痛，嘈雜吞酸，不思飲食，四肢酸軟，面黃肌瘦。

【處方】枳實 香附 神麴 麥芽 厚朴各五兩 茯苓 白朮 蓮肉 廣皮 當歸 白芍 山藥 山楂各二兩 人參 砂仁各二兩 炙草一兩

【制法】共為細面，煉蜜為丸，二錢一分重。

【劑量及用法】每服一丸，每日二、三次，開水送下。

【禁忌】生冷粘膩。

十七、承德

【功能與主治】身體虛弱，面黃肌瘦，飲食無味，久瀉不止。

【處方】同福州。

【制法】共為細粉，六神麴糊為小丸。(大丸三錢重)

【劑量及用法】成人每服一錢，日服三次，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

十八、呼和浩特(1)

【處方】人參 茯苓 白朮 廣皮 當歸 杭芍 山藥 山楂 枳實 香附 神麴 麥芽 川朴各八兩 蓮子 甘草 砂仁各四兩

【制法】蜜大丸，重二錢五分。

十九、呼和浩特(2)

(加料健脾丸)

【處方】照人參健脾丸方，川朴用紫朴 加薏仁二兩 遠志 棗仁各四兩

【制法】共為末，蜜大丸，重二錢，蜡皮。

附參考古方

【來源】雜病証治類方。(健脾丸)

【功能與主治】治脾胃不和，飲食勞倦。

【處方】白朮(炒)二兩半 白茯苓(去皮)二兩 人參一兩五錢 神麴(炒) 陳皮 砂仁 麥芽(炒，取麴) 山楂(取肉) 山藥 肉豆蔻(麩裏煨熟，紙包搥去油)各一兩 木香(另研) 黃連(酒炒) 甘草各七錢半

【制法】上為細末，蒸餅為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服五十丸，空心，早、晚各一次。陳米湯下。

調中健脾丸

沈陽

【功能與主治】調胃健脾，化積，行水。主脾胃虛弱，飲食少思，嘈雜嘔逆，肚腹脹滿，氣逆不舒，胸部悶塞，單腹鼓脹，四肢浮腫，腸鳴泄瀉。

【處方】五加皮 蒼朮 人參 黃芪 茯苓各二錢 陳皮 半夏 香附 山楂肉 黃連各二錢五分 萊菔子 草豆蔻 澤瀉 紫蘇各一錢五分 沉香六分

【制法】共碾極細面，米糊為小丸。

【劑量及用法】每服一錢，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

附參考古方

【來源】沈氏尊生書。

【功能與主治】健脾化溼，行水

寬脹。主單腹脹。

【處方】五加皮 蒼朮 人參 黃芪 茯苓各二錢 陳皮 半夏 香附 白朮 枳實 薏仁各二錢 吳萸 白芍 黃連各二錢半 萊菔子 草薢仁 澤瀉 蘇子各一錢半 沉香 六分

【制法】用瓜蒌一個挖一孔，入川椒二錢、礬二錢，外用紙糊，鹽泥封固，晒干，火煨，去泥，并藥共為末。荷葉、大腹皮煎湯，打黃米粉糊丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服百丸，湯下，日三服。

理氣健脾丸

一、大同

【功能與主治】舒氣健脾。

【處方】炒白朮六兩 陳皮二兩 半夏 茯苓各三兩 當歸六兩 枳實 白芍各一兩五錢 山楂一兩 香附二兩 神曲二兩五錢 炙甘草二兩 廣木香五錢 山藥三兩 蓮肉一兩 黃連五錢

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服三錢，開水送下。

二、沈陽

【功能與主治】舒肝理氣，消食健脾。主食慾減退，嘔吐泄瀉，胸中痞滿，腹作脹痛，噎膈反胃，大便不爽，下利頻數，肌肉消瘦。

【處方】香附 陳皮 黃連 炙甘草各二兩 炒白朮 當歸各六兩 茯苓二兩 半夏三兩二錢 枳實 桔梗各一兩五錢 神曲二兩五錢 山楂一兩八錢 木香五錢

【制法】共碾極細面，大米煮糊為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，空心開水送下。

【禁忌】忌食生冷硬物，孕婦忌服。

三、呼和浩特

【處方】當歸 白朮 茯苓各三斤 陳皮 神曲 香附 枳實 山楂各一斤半 半夏一斤十二兩 木香十兩 七草六兩 桔梗一斤半

【制法】共為細面，水泛為丸。

開胃健脾丸

一、重慶

【功能與主治】專治脾胃虛弱，飲食不思，食物無味，胸滿腹脹，嘔吐惡心，食後返脹，泄痢不止等症。

【處方】粉沙參三兩 青皮 甘草各二兩 茯苓 澤瀉各三兩 枳實二兩 法夏 廣木香 白朮各三兩 砂仁二兩 神曲四兩 炮干姜五錢 猪苓三兩 草薢仁 麦芽 橘皮各一兩

【制法】共為細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】三至四錢。

二、昆明

【功能與主治】脾胃虛弱，食慾不振。

【處方】黨參 茯苓各六兩 廣陳皮三兩 法夏四兩 白朮八兩 砂仁一兩 廣木香六錢 甘草 建蓮各四兩 大棗六兩 甘姜二兩 桔梗三兩 淮毛條五兩

【制法】研末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服一丸（水丸每服三錢），幼童減半，用開水早晚各服一次。

【禁忌】感冒忌服。

三、蘭州

【功能與主治】開胃健脾，寬中理氣。主消化不良，胸膈脹滿，行郁止痛。

【處方】廣皮 白朮 神曲 麦芽 半夏 香附各一斤半 厚朴一斤 蒼朮 云苓 澤瀉 砂仁 薏米 枳實各十二兩 炙甘草六兩

【制法】共為細面，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

四、青島

【處方】白朮 山楂 廣皮 薏米 麦芽 山藥 白芍 砂仁 果 木香 甘草

【制法】共為細面，水小丸。

五、呼和浩特

【處方】白朮 薏米 山楂 神曲 陳皮 麦芽各二斤 甘草 蓮肉 木香各半斤 山藥 杭芍 砂

仁各一斤

【制法】共為細面，水泛小丸。

參苓白朮丸

一、北京（附：參苓白朮散）

【功能與主治】健胃止瀉。主食慾不振，倦怠無力，胸腹脹滿，嘔吐泄瀉。

【處方】白扁豆二十四兩 人參 茯苓 白朮 甘草 山藥各十二兩 蓮子十二兩 桔梗 砂仁 薏苡仁各十六兩

【制法】共為細粉，水泛小丸。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，姜湯或溫開水送下。

【備考】參苓白朮散即上藥共為細粉。服法同上。

二、天津

【功能與主治】助氣健胃止瀉。主身體衰弱，消化不良，胸滿膨脹，大便溏泄，精神疲乏，不思飲食。

【處方】甘草十一兩 桔梗六兩 茯苓（去皮） 陳皮 生山藥 白朮（麩炒）各十一兩 砂仁 蓮子（去心）各六兩 扁豆（去皮炒）八兩 薏米（麩炒）六兩 黨參（去節）十一兩

【制法】共為細粉，水泛小丸，三錢重裝袋。

【劑量及用法】每次服一袋，開水送下。

三、上海

【功能與主治】消化不良，神疲肢軟，納食不香，大便溏薄。

【處方】黨參三兩 於朮（炒）四兩 茯苓 甘草（炙）各二兩 懷山藥（炒）二兩 砂仁（炒） 薏苡仁各二兩 扁豆（姜汁炒） 石蓮子肉（炒）各二兩 桔梗（炒黃）二兩

【制法】共研細粉，用生薑二兩、紅棗二兩煎湯泛丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二錢，溫開水送服。

四、福州

【功能與主治】治脾胃虛弱，飲食不消，或吐或瀉。

【處方】人參 白朮（土炒） 茯苓 甘草（炙） 山藥（炒） 扁豆（炒） 薏米（炒） 蓮肉（炒去心） 陳皮 砂仁 桔梗各一兩

【制法】共研細末，棗湯泛丸。

五、杭 州

【功能与主治】治脾胃虛弱，病后元虛，食少神倦，消化不良，或吐或瀉，胸腹虛脹，形瘦色萎，久痢久瀉等症。

【处方】潞党参 怀山药各六兩 枯梗(炒黃)四兩 炒冬朮八兩 白扁豆(炒)六兩 广陈皮 白茯苓 薏苡仁(炒) 春砂仁 炙甘草各四兩 蓮子肉六兩

【制法】共研細末，用生姜、大棗煎湯泛丸。

【剂量及用法】每服三錢，米飲湯或開水送下。

六、南 昌

【功能与主治】脾胃虛弱，不思飲食，精神疲倦，大便泄瀉，及癰疽潰后，食慾不振。

【处方】党参二十四兩 白茯苓十四兩 於朮(土炒)二十二兩 炒山药(去黑皮) 湖蓮肉(炒)去心 白扁豆(去皮姜汁浸)各二十四兩 桔梗(炒黃) 砂仁 薏仁(炒) 炙甘草各十六兩

【制法】共研細末，泛為丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每日服二次，每次五錢，溫開水送下。

七、濟 南

【功能与主治】久瀉脾虛，消化不良，面黃肌瘦，神疲乏力等症。

【处方】人參 白朮(土炒) 茯苓 甘草(炙) 山药(炒)各一兩六錢 白扁豆(炒)一兩二錢 薏仁(炒) 蓮肉(炒去心)各八錢 陈皮一兩六錢 砂仁 桔梗各八錢

【制法】共為細末，用生姜五錢，大棗一兩煎湯泛丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每服三錢，開水送下。

【禁忌】忌生冷油膩等食物。

八、青 島

【处方】人參二兩 白朮 陈皮 香附各半斤 半夏六兩 云苓 山药 扁豆各半斤 枯梗 黃連 遠志 菖蒲各四兩 當歸半斤 甘草四兩

【制法】共舂面，水泛小丸。

九、呼和浩特

【处方】党参三兩 白朮六兩 蓮子 陈皮 半夏 香附 茯苓 山药 扁豆 當歸各半斤 川連 砂仁 遠志 菖蒲 桔梗 甘草各四兩

【制法】水泛小丸。

吳 茱 萸 丸

杭 州

【功能与主治】治腸胃不調，陰寒下痢，胸滿腹痛，飲食不化，倦怠嗜臥，以及心胃氣痛等症。

【处方】吳茱萸一兩五錢 六神曲(炒焦)五兩 炒冬朮四兩 肉桂 炮姜各一兩五錢 川花椒(去目炒)一兩

【制法】共研細末，米糊為丸。

【剂量及用法】每服二錢，開水送下。

久 瀉 丸

昆 明

【功能与主治】五更泄瀉，腹痛肢冷。

【处方】骨脂八兩 五味四兩 吳茱萸一兩 肉蔻霜八兩

【制法】水燉為丸。

【剂量及用法】每服二錢半，幼童減半，用開水吞服。

【禁忌】赤白痢忌服。

泄 瀉 丸

大 同

【功能与主治】健脾止瀉固腸。

【处方】五味子三錢 白茯苓 胡蘆巴 白朮各五錢 黑杜仲二錢五分 野黨參二錢 補骨脂五錢 冬瓜子二錢 广砂仁四錢 龙眼肉 熟地榆各二錢 枸杞子三錢

【制法】共研細面為丸。

【剂量及用法】每服三錢，開水沖服。

瓜 蘆 瞿 麥 丸

沈 陽

【功能与主治】利水除濕。主固腸胃，止瀉痢，強腰膝，治虛損，利小便，補脾腎。

【处方】薯蕷 茯苓各三兩 瓜蘆根二兩 附子二錢 瞿麥一兩

【制法】共碾極細面，蜜丸二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

附參考古方

【来源】金匱要略方論。

【功能与主治】小便不利者，有水氣，其人苦渴。

【处方】栝蘆根二兩 茯苓 薯蕷各三兩 附子一枚(炮) 瞿麥一兩

【制法】上為末，煉蜜丸，梧子大。

【剂量及用法】飲服三丸，日三服，不知增至七八丸，以小便利，腹中溫為知。

瀉痢固腸丸

一、北 京

【功能与主治】健胃固腸。主久瀉久痢。

【处方】白朮 白芍 茯苓各六十兩 橘皮四十兩 米壳一百六十兩 党參十兩 訶子肉 肉果 甘草各二十兩

【制法】共為細粉，水泛小丸。

【剂量及用法】每服二錢，姜湯或開水送下，小兒酌減。

二、天 津

【功能与主治】調胃化濕，益氣固腸。主脾胃虛弱，久痢脫肛，腹脹腹痛，肢體疲乏。

【处方】同北京，分量為其十分之一。

【制法】共為細粉，水泛小丸，二錢重裝袋。

【剂量及用法】每服一袋，開水送下。

【禁忌】忌生冷油膩食物。

三、南京(固腸丸)

【功能与主治】收斂。主瀉泄下痢，日久不止。

【处方】炒白朮二兩 煨龍骨一兩 訶子肉二兩 阿膠珠 西黨參 炮干姜 广木香 煨赤石脂 煨肉果各一兩 制附子五錢

【制法】共研細末，加米糊為丸，

每錢計約三十粒。

【劑量及用法】每服二至三錢，一日一次，米湯吞服。

四、大同

【功能與主治】冷熱不調，赤白下痢，泄瀉不止，腹痛腸鳴。

【處方】肉蔻 大香各四兩 赤石脂六兩 干姜 厚朴各四兩 老倉米八兩 砂仁四兩

【制法】水泛成丸。

【劑量及用法】每服三錢，米湯送下。

五、濟南

【功能與主治】脾胃虛弱，常患瀉痢，或久痢不癒。

【處方】龙骨 附子(炮) 白朮 丁香 良姜 赤石脂 白豆蔻 砂仁各五兩 木香二兩

【制法】共為細粉，水泛小丸，綠豆大。

【劑量及用法】每服二錢，開水送下。

【備考】有醫師處方方可使用。

六、沈陽(固腸丸)

【功能與主治】胃腸虛弱，泄瀉脫肛，消化不良，寒濕腹痛，經久瀉痢，飲食減少。

【處方】人參 蒼朮 茯苓 木香 訶子肉 烏梅肉 肉豆蔻 米壳各一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服二十粒，米湯送下。

【禁忌】生冷硬物。

七、呼和浩特

【處方】肉果 木香 故紙 砂仁 厚朴各等分

【制法】水泛小丸。

附參考古方

【來源】1. 女科証治准繩。

【功能與主治】治泄瀉。

【處方】人參(去蘆) 蒼朮(米泔浸一宿) 茯苓 木香(不見火) 訶子肉(煨) 烏梅肉 肉豆蔻(麵裹煨) 嬰粟壳(去蒂鬚)

【制法】上各等份為末，麵糊丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服四十丸，米飲下。

2. 沈氏尊生書。

【功能與主治】滑泄。

【處方】龙骨 附子 訶子 枯礬 丁香 石脂 良姜 薏仁 砂仁 木香

【制法】糊丸。

止瀉胃苓丸

一、撫順

【功能與主治】和胃健脾，利濕止瀉。主氣滯寒郁，反胃嘔吐，脾虛胃弱，腹痛泄瀉，臌脹水瀉，小便不利，久瀉不止，精神不振，濕浸中焦，四肢浮腫。

【處方】杜楠 赤苓各二兩 白朮四兩 蒼朮 陳皮各二兩 炙草四兩 澤瀉 豬苓 川朴各二兩 木通四兩

【制法】共為細面，水泛小丸。

【劑量及用法】每服二錢，一日二次，姜水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、呼和浩特

【處方】黨參六兩 白朮 茯苓 黃連 陳皮 蒼朮 杭芍 豬苓 澤瀉 厚朴 藿香 訶子各一斤二兩 官桂一斤 甘草一斤十四兩

【制法】共為細末，水泛小丸。

香砂胃苓丸

南 京

【功能與主治】除濕健胃。主嘔吐泄瀉，浮腫，小便不利。

【處方】豬茯苓一兩 茅蒼朮一兩五錢 甘草一兩 炒白朮一兩五錢 澤瀉一兩 川厚朴一兩五錢 官桂五錢 廣陳皮一兩五錢 廣木香五錢 白茯苓一兩五錢 西砂仁五錢

【制法】上藥除香砂外，余藥共研細末，用姜、棗煎湯泛丸，每錢約做八十粒，以香砂另研為衣。

【劑量及用法】每服二錢，一日二次，開水吞服。

肉豆蔻丸

沈 陽

【功能與主治】健脾胃，固腸，去

積熱，消疳毒。主疳疾變痢，不吃乳食，津枯液短，面色萎黃，滑腸泄瀉。

【處方】肉豆蔻二錢 木香一兩 人參 訶子肉 硃砂各五錢 麝香五分

【制法】除硃砂、麝香另研外，余則共碾細面，白糯米飯和為小丸。

【劑量及用法】每服五粒至十粒。

【禁忌】生冷硬物。

理 中 丸

一、上 海

【功能與主治】胃寒嘔噦，納食不化。

【處方】黨參 甘草(炙) 白朮(炒焦)各三兩 干姜二兩

【制法】共研細粉，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服一錢半，溫開水送服。

二、南 京

【功能與主治】健胃。主脾胃虛冷，飲食不香，嘔吐便溏，畏冷神倦。

【處方】潞黨參 炒白朮各三兩 炙甘草 炮干姜各二兩

【制法】共研細末，用沸水泛丸，每錢約做八十粒。

【劑量及用法】每服一錢五分至二錢，一日二次，空腹時開水吞服。

三、武 漢

【功能與主治】嘔吐泄瀉，胸痹胸痞，四肢逆冷，腹痛不食。

【處方】黨參 炙甘草 焦白朮 干姜各三兩

【制法】小丸——取上藥進行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜50—53%，迭成小丸，每錢不得少于二十五粒。

大丸——如法得淨粉后，加煉蜜110—120%，和成大丸，每丸重為二錢。

【劑量及用法】成人每服二錢，日二服，夜一服。小兒酌減。

四、福 州

(仲景理中丸、人參理中丸)

【功能與主治】治太陰病、自利不渴、陰寒腹痛、短氣咳嗽、霍亂嘔吐、飲食難化、胸膈噎塞，或瘧疾、瘧

氣、瘟疫，中氣虛損、久不能愈，或中虛生痰等症。

【處方】同武漢。黨參用人參。

【制法】右藥搗篩為末，蜜丸雞子黃大。

【劑量及用法】以沸湯數合和一丸，研碎溫服之，日三、四服，夜二服，腹中未熱，益至三、四丸；然不及湯，法以四物，依數，且用水八升煮，取三升，去滓，溫一升，日三服。

五、杭州

【功能與主治】治脾胃虛寒，不能運化，嘔吐泄瀉，不思飲食，肢冷腹痛、胸痞痰多，傷寒自利不渴等症。

【處方】同南京。

【制法】共研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服三錢，開水送下。

六、南昌

【功能與主治】寒溼腹滿，吐瀉不渴，時腹自痛。

【處方】同武漢。分量各等分。

【制法】研末，和煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二至三錢，小兒視年齡及病情酌情減服。

【禁忌】勿食生冷、油膩食物。

七、沙市

【功能與主治】治脾胃虛寒，消化不良、胸痞腹痛，食少畏寒等症。

【處方】同上海。

【制法】上藥研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每次服二錢，溫開水下，每日服二次。

【禁忌】體熱者忌服。

附參考古方

【來源】金匱玉函經。

【處方】人參 甘草(炙) 白朮 干姜各二兩。

【制法】上四味，搗篩為末，蜜和丸，如鷄黃大。

【劑量及用法】以沸湯數合，和一丸，研碎溫服之，日三服，夜二服；腹中未熱，益至三、四丸。

附子理中丸

一、北京

【功能與主治】健胃散寒。主中

寒腹痛，嘔吐泄瀉，手足厥冷。

【處方】人參 白朮 甘草各二兩 干姜 川附片各二兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重二錢。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，姜湯送下。

【禁忌】忌食生冷食物；孕婦忌服。

二、天津

【功能與主治】除寒健胃，止瀉止痛。主腸胃衰弱，消化不良，因寒嘔吐泄瀉，寒涼肚腹疼痛，大便溏瀉。

【處方】人參(去蘆)一兩 白朮(數炒)一兩 制附子一兩 干姜一兩 甘草一兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、上海

【功能與主治】胃寒嘔噦，納食不化。

【處方】黨參 甘草(炙) 附子(炮云反制) 白朮(炒)各二兩五錢 炮姜二兩

【制法】共研細粉，水泛為丸如綠豆大。

【劑量及用法】每服一錢五分，溫開水送服。

四、南京

【功能與主治】主脾腎虛寒，嘔吐泄瀉，腹疼肢冷，不思飲食。

【處方】制附子一兩 潞黨參 炮干姜各二兩 炙甘草二兩 炒白朮二兩

【制法】上藥共研細末，用沸水泛丸，每錢約做八十粒。

【劑量及用法】每服一錢，一日二次，空腹時開水吞服。

五、福州

【功能與主治】治脾胃虛寒，飲食不化，四肢厥冷，腸鳴腹痛，霍亂轉筋，體冷微汗，嘔吐泄瀉，一切沉寒痼冷等症。

【處方】人參 白朮 干姜 炙甘草各二兩 制附子一兩

【制法】共為細末，煉蜜為丸。

六、杭州

【功能與主治】同福州。處方亦同，惟人參用黨參。

【制法】共研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服二至三錢，開水送下。

七、南昌

【功能與主治】腸胃虛寒，四肢厥冷，嘔吐腹痛，腸鳴便瀉。

【處方】同福州，人參用黨參。

【制法】共研細末，煉蜜為丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每服一錢，開水送下。

【備考】非經此方處方不得使用。

八、沙市

【功能與主治】同福州。

【處方】附塊一兩 干姜 黨參 焦白朮 炙甘草各二兩

【制法】諸藥研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服二錢，溫開水下，日服二次。

【禁忌】體熱者忌服。

九、重慶

【功能與主治】同福州。處方亦同，惟人參改用黨參。

【制法】共研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】一丸。

十、西安

【功能與主治】主治下焦虛寒，腹痛身痛，四肢拘急，嘔吐泄瀉，脈沉細者。

【處方】同福州。

【制法】蜜制為丸。

【劑量及用法】每服一至三錢，開水送下。

【禁忌】實熱者忌服；孕婦未遵醫囑不可服用。

十一、蘭州

【功能與主治】除寒健胃，止瀉上疼。主腸胃衰弱，消化不良，嘔吐泄瀉，肚子冷疼。

【處方】黨參 白朮各二兩 附子 干姜 制甘草各一兩

【制法】共研細面，蜜大丸，每丸

一錢重。

【剂量及用法】每天早晚各服一丸，白开水送下。

十二、大同

【功能与主治】脾胃衰弱，气虚下寒，寒湿，少腹寒痛。

【处方】白朮二斤半 干姜一兩二錢 附子半斤 党参四兩 甘草四兩

【制法】共轧細面，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服三錢，小兒似脾風症按小兒大小酌减服之，或遵古囑。

【禁忌】孕妇忌服。

十三、禹县

【功能与主治】中脘寒疼，手足厥冷，脐腹冷疼，胃停寒痰，脾胃虚寒，不思飲食。

【处方】党参 白朮 附子 炮姜 甘草各一兩

【制法】共为細面，煉蜜为丸，每丸重二錢。

【剂量及用法】每服一丸，重症每服二丸，不拘時間淡姜湯送下，白开水亦可。

【禁忌】孕妇忌用；热症忌用；小兒不用。

【备考】有效期間一年。

十四、济南

【功能与主治】腸胃虛寒，四肢逆冷，嘔吐腹痛，腸鳴泄瀉。

【处方】同福州，人參用党参。

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，重三錢。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下。

【禁忌】忌食生冷食物；孕妇忌服。

十五、青島

【处方】党参一斤 甘草 附子各四兩 干姜 白朮各一斤

【制法】共轧細麵，煉蜜为丸，重二錢五分。

【备考】一方党参改用当归。

十六、沈陽

【功能与主治】健脾溫中，整腸止瀉。主中寒腹痛，腸鳴泄瀉，下痢嘔吐，吐谷清，四肢厥冷，寒凝腹

痛。

【处方】人參一兩 附子五錢 干姜一兩 炙甘草一兩 白朮二兩

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸，一錢重。

【剂量及用法】每服一丸，白水送下。

【禁忌】忌冷硬物。

十七、撫順

【功能与主治】溫性，調整胃腸。主中寒腹痛，吐瀉交作，四肢厥逆，胃腸虛弱，久瀉不止，食谷不化，五更泄瀉，腸鳴腹痛等症。

【处方】附子 吳茱萸 桂楠 陈皮各一兩 川朴兩半 白朮 炙甘草 党参各二兩

【制法】共为細面，蜜丸二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，姜湯水送下，食前服。

【禁忌】忌食生冷黏硬等物。

【备考】一方蜜丸二錢重。

十八、吉林、哈尔滨 (理中丸)

【功能与主治】溫寒止瀉，解嘔定痛。主治：

(1) 霍乱：寒湿中阻，吐瀉交作，四肢厥冷，揮霍絞亂，气息奄奄，勢瀕危亡。

(2) 中寒：脾胃中寒，食谷不化，漉泄腹痛，泛嘔滿悶。

(3) 腎虛：五更腎泄，命門火衰，食入于胃，無火煎熬，難以熟腐，腹痛腰痠，腸鳴下氣。

【处方】同福州。

【制法】共碾細面，煉蜜为丸，二錢一分重。瓷罐存貯或蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，白水或姜湯水調，食前服。

【禁忌】忌食生冷黏硬食物。

十九、承德

【功能与主治】主腸胃虛寒，四肢逆冷，嘔吐腹痛，腹鳴泄瀉。

【处方】同福州。

【制法】共为細粉，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服一錢至三錢，白开水送下。

【禁忌】有实热者忌用；孕妇須經医生处方。

二十、呼和浩特

【处方】人參二斤 白朮九斤

干姜九斤 炙甘草三斤 附子六斤

【制法】共为細面，蜜丸二錢。

附参考古方

【来源】太平惠民和剂方。

【功能与主治】治脾胃冷弱，心腹絞痛，嘔吐泄利，霍乱轉筋，体冷微汗，手足厥冷，心下逆滿，腹中雷鳴，嘔噦不上，飲食不进及一切沉寒痼冷，並皆治之。

【处方】人參(去蘆) 附子(炮，去皮臍) 干姜(炮) 白朮(炙) 各二兩

【制法】上为末，煉蜜和丸，每一兩分作十丸。

【剂量及用法】每服一丸，以水一盞化破，頓至七分，空心食前稍熱服。

肉桂理中丸

福州

【功能与主治】治陰寒腹痛，霍乱嘔吐，停食嘔噦等症。

【处方】理中丸加肉桂一兩。

桂附理中丸

(附桂理中丸)

一、武汉

【功能与主治】腹痛泄瀉，四肢厥冷，惡寒倦臥，嘔吐腸鳴。

【处方】党参 黑附子各十兩 肉桂二兩 白朮 炮干姜 炙甘草各十兩

【制法】小丸——取上药进行干燥，混合碾細，照淨粉量，加煉蜜50—52%，迭成小丸，每錢不得少于二十五粒。

大丸——如法得淨粉后，加煉蜜110—120%，合成大丸，每丸重三錢。

【剂量及用法】每服二至三錢。

【禁忌】孕妇慎用，或遵古囑。

二、广州

【功能与主治】主胃腸虛弱之腹痛泄瀉。

【处方】党参五分 干姜 白朮 甘草各一錢 附子八分 肉桂一分

【制法】洗淨切碎，隔水蒸透，晒干研成細末，拌蜜糖为大丸，每丸重一錢五分，蜡壳封固。

【剂量及用法】开水送服。

三、福州

【功能与主治】治陰陽不和，脾腎俱寒，嘔吐泄瀉，傷寒直中太陰。

【处方】理中丸加 肉桂一兩 附子二兩

四、昆明

【功能与主治】飲食減少，腸鳴腹痛，嘔吐泄瀉等症。

【处方】黨參 甘姜 於朮 天雄 甘草各三兩 肉桂一兩

【制法】研末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服一丸，水吞，每服二錢半，早晚各服一次，開水送下。

【禁忌】感冒及熱症不宜服。

參桂理中丸

一、大同

【功能与主治】受寒腹痛。

【处方】人參一兩 白朮三兩 川附子二兩 干姜三兩 炙草 肉桂各一兩

【制法】共為細面，煉蜜為三錢丸，硃砂為衣，蠟皮封固。

【劑量及用法】每服三錢。

【禁忌】孕婦忌服。

二、呼和浩特

（附：丁蔻理中丸）

【处方】人參六錢 白朮 干姜各二兩 甘草 附子各一兩六錢 肉桂八錢 烏藥 吳萸各一兩 蒼朮八錢 木香四錢 茯苓二兩 五味四錢 砂仁八錢 香附一兩 厚樸一兩二錢

【制法】共為細面，蜜大丸，重二錢，蠟皮封固。

【備考】丁蔻理中丸，照前方每料再加丁香四錢，蔻仁六錢，蜜大丸，重二錢，蠟皮封固。

參茸理中丸

福州

【功能与主治】治腎虛精竭，命門火衰，以致脾痛胃弱，痰多腹脹或停飲嘔噎諸症。

【处方】理中丸加 鹿茸二兩

丁蔻理中丸

一、福州

【功能与主治】治虛寒自利，腹痛便溏，脈沉無力，四肢厥冷，霍亂吐瀉，遍身拘急，痰嗽結胸。

【处方】理中丸加 丁香一兩 蔻仁一兩

二、南昌

【功能与主治】脾胃虛寒，胸膈滿悶，腹脇脹痛。

【处方】黨參 焦朮 炙甘草 干姜各三兩 白豆蔻 公丁香各一兩

【制法】共研細面，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二至三錢，日服二次，開水送下。

【禁忌】勿食生冷油膩食品。

香砂理中丸

福州

【功能与主治】治脾胃冷弱，陰陽虧損，腹痛吐瀉，反胃噎膈，及寒痹等症。

【处方】理中丸加 木香二兩 砂仁一兩

雞清丸

沈陽

【功能与主治】理脾厚腸，和胃止瀉。主濕熱凝滯，紅白痢疾，滯下不爽，日夜無度。

【处方】廣木香二兩 黃連二兩 五錢 肉豆蔻七個

【制法】共碾極細面，面糊為小丸。

【劑量及用法】每服一錢，空心米湯送下。

【禁忌】魚肉涼粘硬辣食物。

茵陳五疸丸

一、北京、天津

（茵陳五苓丸）

【功能与主治】清熱利濕通小便。主陽性黃疸，兩眼、身、面皆黃。

【处方】茵陳八兩 赤茯苓 蒼朮 黃芩 澤瀉 厚樸 白朮 豬苓 山楂各四兩 甘草三兩 橘皮

六神麴 枳椇子各二兩

【制法】共為細粉，另用茵陳八兩熬水，泛小丸，滑石為衣，曬乾。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水送下。

二、蘭州

【功能与主治】利濕清熱。主黃疸濕熱，臉黃浮腫，小便短赤。

【处方】茵陳四斤 蒼朮 制香附 神曲各一斤 川柏 豬苓 木通 防風 防己 羌活 柴胡 藁本 梔子 皂莢各半斤

【制法】共軋細粉，用茵陳熬水，制成小丸。

【劑量及用法】大人每次二錢，白開水送下。

【禁忌】脾胃虛寒者忌服用。

伐木丸

一、上海

【功能与主治】胸腹脹滿，面色萎黃。

【处方】茅朮（炒）二斤 六神麴四兩 綠矾（醋燉紅）一斤

【制法】共研細粉，以米醋和糊為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服一錢，米湯送服。

二、福州

【功能与主治】專治濕熱積滯，土為木侮，黃胖腫脹，勢欲成癰及食積瘧痢等症。

【处方】茅朮（米泔水浸晒干）一斤 皂莢（醋燉）八兩 加酒一兩 麩皮一兩

【制法】拌炒為末，神麴糊丸。

【劑量及用法】每服三錢，開水送下。

三丰伐木丸

杭州

【功能与主治】治濕熱郁結，氣滯不行，黃胖腫脹，狀如土色之症。

【处方】茅朮四兩 皂莢（醋燉）二兩 六神麴五錢

【制法】共研細末，醋調米糊打丸。

【劑量及用法】每服二至三錢，陳醋或米湯送下。

大溫中丸

一、上海

【功能与主治】湿熱積滯，黃胖腹膨，肢腫，飲食不思，小溲不利。

【处方】陈皮一兩五錢 青皮(炒)二兩 蒼朮(米泔水浸)二兩五錢 白朮(炒)一兩五錢 厚朴(制)二兩五錢 苦參一兩五錢 甘草一兩 香附(制) 針砂(醋煨三次)各八兩 山楂(醋炒) 白芍藥(炒)各二兩五錢 茯苓一兩五錢

【制法】煨針砂另研細粉，余藥共研細粉，充分混合，醋糊為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，米湯送下。

【禁忌】油膩生硬，難于消化之食物。

二、福州

【功能与主治】治脾虛，濕熱內阻，氣化不行，腹膨肢腫，黃胖水腫，飲食減少等症。

【处方】厚朴(姜制) 蒼朮(泔水浸)各五兩 白朮 廣皮各二兩 白芍五兩 甘草二兩 茯苓二兩 苦參春夏二兩，秋冬一兩 青皮六兩 香附(制童便浸春夏一宿秋冬三宿)一斤 山楂五兩 針砂(炒紅醋煨三次)一斤

【制法】共研末，神麴粉同醋和為丸。

附參考古方

【來源】丹溪心法。

【功能与主治】治食積與黃腫，又可借為制肝燥脾之用。

【处方】陈皮 蒼朮 厚朴 三稜 蓬朮 青皮各五兩 香附一斤 甘草一兩 針砂(醋炒紅)二兩。

【制法】上為末，醋糊丸。

【劑量及用法】空心姜鹽湯下，午後飯食，可酒下。

【禁忌】忌犬肉菓菜。

【備考】脾虛者，以參、朮、芍藥、陈皮、甘草作湯使。

小溫中丸

一、上海

【功能与主治】主黃胖腹脹，內

熱，小溲不清。

【处方】甘草二錢 姜半夏一兩 香附(制) 針砂(醋煨三次)各一兩五錢 黃連(炒) 苦參(炒)各五錢 白朮(炒)二兩 茯苓 六神麴(炒焦) 陳皮各一兩

【制法】煨針砂另研細粉，余藥共研細粉，和勻，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服四錢，包煎服湯。

【禁忌】食鹽。

二、南京

【功能与主治】主腹脹食少，面黃，足腫，小便不清。

【处方】同上海。苦參用五兩。

【制法】共研細末，用溫沸水泛為丸，每錢約做一百粒。

【劑量及用法】每服二錢至三錢，一日一次至二次，開水吞服。

三、福州

【功能与主治】治脾虛肝旺，中焦滿悶，濕熱蘊蒸，腹脹如臌，食不運化。服之小便通利即效。

【处方】茯苓 半夏 陳皮各二兩 甘草一兩 針砂 香附各二兩 黃連一兩 神麴二兩 白朮四兩 苦參一兩。

【制法】共為細末，醋、水、神麴糊為丸。

【劑量及用法】每服二錢，陳皮湯下，虛者入參湯下。

【禁忌】忌食鹹味。

四、杭州

【功能与主治】治脾虛肝旺，食不運化，腹脹內熱，黃胖足腫，食少口淡，小便不清等症。

【处方】同上海。甘草用五錢。

【制法】共研細末，醋、水各一杯，和神麴糊為丸。

【劑量及用法】每服二錢，白朮、陳皮、生薑湯送下。

【禁忌】忌鹽。

五、南昌

【功能与主治】腹實黃胖，脚腫，食少口淡，或腹脹內熱，小便不清。虽有積聚，不可下者宜之。

【处方】白朮四兩 法半夏 川朴 茯苓 廣陳皮 六神各二兩

香附(晒干不可煨炒)三兩 甘草六錢 苦參(炒) 川黃連(炒) 山楂各一兩 針砂(醋炒)二兩

【制法】研末，米醋、姜汁各一盞，和水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】忌食鹽。

【備考】非經醫師處方不得使用。

附參考古方

【來源】1.丹溪心法(1)

【功能与主治】治腹實，黃胖足腫，食少口淡，或腹脹內熱，小便不清，脾虛肝旺，不能健運，虽有積聚，不可下者。

【处方】青皮一兩 香附四兩(便浸) 蒼朮二兩 半夏二兩 白朮半兩 陳皮一兩 苦參半兩 黃連一兩(姜汁炒) 針砂二兩(醋炒)。

【制法】右為末，糊為丸。

2.丹溪心法(2)

【功能与主治】治疸，又能去食積。

【处方】蒼朮 川芎 香附 神麴 針砂(醋炒紅)。

【備考】春加芎，夏加苦參或黃連，冬加吳茱萸或干姜。

絳礪丸

一、上海、南昌

【功能与主治】黃病腹脹，面浮足腫。

【处方】厚朴(制) 陳皮各一兩 甘草五錢 茅朮(炒) 綠礪(醋煨透成絳色)各二兩

【制法】共研細粉，用紅棗四兩煎湯，加糊為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服一錢至二錢，溫開水送服。

【禁忌】忌食茶麪；孕婦忌服。

二、杭州(黃病絳礪丸)

【功能与主治】治濕熱黃胖，脫力勞傷，腹脹腸紅，食積痞塊，腿足浮腫，小便不利等症。

【处方】皂礪六兩(煨透) 川厚朴 炒茅朮各二兩 廣陳皮二兩 生甘草一兩

【制法】共研細末，加大棗肉搗

爛和丸。

【劑量及用法】每服三錢，米飲湯或開水送下。

保和丸

一、北京

【功能與主治】助消化，利胸膈，健胃腸，止泄瀉。主噯氣吞酸，嘔吐泄瀉，胸膈痞滿，不思飲食。

【處方】山楂 六神麴 半夏(制) 茯苓各一兩 橘皮 連翹 萊菔子各一兩 白朮五兩 香附(醋制) 枳實各一兩 蒼朮 厚朴各三兩 黃芩 黃連各一兩

【制法】共為細粉，水泛小丸，滑石為衣圓亮。

【劑量及用法】每服三錢，日服二次。溫開水送下。

【禁忌】忌飲酒及食肉麵。

二、上海

【功能與主治】噯酸不飢，食少飽悶，便唐不暢。

【處方】六神麴(炒焦)一兩 山楂(炒焦)二兩 枯紅 姜半夏各一兩 蘿蔔子(炒)五錢 茯苓 麥芽(炒)各一兩 連翹五錢

【制法】共研細粉，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服三錢，溫開水送服。

三、南京

【功能與主治】健胃消食。主食積不化，胸膈噯氣，嘔吐吞酸，腹痛泄瀉。

【處方】同上海，僅山楂少一兩。

【制法】共研細末，以沸水泛丸，每錢約做八十粒。

【劑量及用法】每服二錢至三錢，一日一次，開水吞服。小兒減半。

四、武漢

【功能與主治】消化不良，胸膈痞滿，噯氣吞酸，泄瀉腹痛。

【處方】同上海，僅山楂少一兩用姜汁泡，橘紅作陳皮。

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于三十粒。

【劑量及用法】每服二錢至三錢，開水送下。

五、廣州

【功能與主治】消化不良，胸膈痞滿，噯氣吞酸，泄瀉腹痛。

【處方】山楂肉二兩(姜汁泡) 姜制半夏 橘紅(炒) 神麴 麥芽(炒去毛) 白茯苓 連翹壳各一兩 萊菔子(炒)三錢 黃連(姜汁炒)五錢

【制法】依法炮制焙干，切碎共研細末，水泛成糊，制丸如梧桐子大。

【劑量及用法】清開水送下，每次服二至三錢。

六、福州

(丹溪保和丸)

【功能與主治】治飲食酒積停滯，胸膈痞滿腹脹。

【處方】神麴(炒) 陳皮 半夏 茯苓各一兩 山楂肉(蒸晒)三兩 連翹 萊菔子(炒)各五錢

【制法】上為末，粥丸，綠豆大。

【備考】一方有炒麥芽一兩、黃連五錢。

七、杭州

(消食保和丸)

【功能與主治】治酒食停積，痰飲胸滿，吞酸噯氣，泄瀉腹痛，痞滿發熱。小兒食積等症。

【處方】炒山楂三兩 姜半夏 陳皮 六神麴各一兩 萊菔子五錢 茯苓一兩 連翹五錢

【制法】共研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服三錢，開水送下。

八、南昌

【功能與主治】食積，酒積，胸膈痞滿，噯氣吞酸，泄瀉腹痛。

【處方】同上海，僅山楂少一兩用姜汁泡，橘紅作陳皮。

【制法】共研細末，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二至三錢，清茶或溫開水送下。小兒視年齡及病情，酌減服用。

九、沙市

【功能與主治】治食積痰飲酒積，胸膈脹滿，噯氣吞酸，瀉泄腹痛痢疾等症。

【處方】法半夏一兩五錢 茯苓

一兩 廣陳皮 一兩五錢 焦山楂二兩 神麴 一兩五錢 麥芽二兩 連翹 炒萊菔子各一兩 制香附 一兩五錢

【制法】共研細末，用冷開水疊為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每次服三錢，溫開水下。

【禁忌】體虛及孕婦均忌服。

十、重慶

【功能與主治】治食積酒積痰飲，胸膈痞滿，噯氣吞酸，泄瀉腹痛及瘡痢。

【處方】同廣州，僅連翹壳和萊菔子各用五錢。

【制法】共為細末，水泛為丸。

【劑量及用法】二至三錢。

十一、西安

(加味保和丸)

【功能與主治】主治消化不良，慢性消化性痢疾及急性慢性腸炎(便秘，便瘡，似膿非痢)。

【處方】炒白朮一斤四兩 廣皮 半夏 茯苓 山楂各一斤 炒麥芽 炒川朴 炒香附 炒萊菔子各十二兩 枳實 黃芩各四兩 連翹半斤 姜連四兩 炒神麴一斤

【制法】煮姜湯，滴水為小丸。

【劑量及用法】每服一、二錢，一天二、三次，小兒酌減。服藥後應臥床休息，不可使腹部受涼。

十二、濟南

【功能與主治】過飽傷食，消化不良。

【處方】山楂三兩 炒神麴 炒麥芽 茯苓 姜半夏各一兩 陳皮 萊菔子(炒) 枳殼(炒)各五錢

【制法】共為細末，水泛為丸，如椒目大。

【劑量及用法】空心開水送下，每服二錢，日二服。

【禁忌】辛辣油膩生冷等物，孕婦忌服。

十三、青島

(加味保和丸)

【處方】白朮 神麴 萊菔子 廣皮 連翹 香附 云苓 山楂 川朴 黃芩 麥芽 枳實各半斤 半夏六兩 川連二兩 甘草半斤

【制法】共研細面，水泛為小丸。

十四、沈陽 (丹溪保和丸)

【功能與主治】健胃固腸化積。
主食積酒積，肉積麵積，發為痞脹，
噯氣嘔吐，呃逆打嗝，消化不良，腹
痛不食，四肢倦怠。

【處方】同廣州，僅連翹羌和萊
菔子各用七錢。

【制法】共碾成極細面，水泛為
小丸。

【劑量及用法】每服二錢，開水
送下。

【禁忌】生冷粘食。

十五、呼和浩特 (加味保和丸)

【處方】白朮二斤 陳皮 法夏
茯苓 黃連 山楂 神麴各一斤十
四兩 川朴 香附 萊菔子 連翹
麦芽各一斤四兩 枳實 黃芩各
十兩

【制法】共為細面，水泛小丸。

附參考古方

【來源】丹溪心法。

【功能與主治】治一切食積。

【處方】山楂六兩 神麴二兩
半夏 茯苓各三兩 陳皮 連翹
蘿蔔子各一兩

【制法】上為末，炊餅丸如梧子
大。

【劑量及用法】每服七、八十丸，
食前白湯下。

山楂化滯丸

大同

【功能與主治】消食化滯。

【處方】山楂八兩 神麴 麦芽
各二兩 砂蓮子一兩五錢 薏米
炒扁豆 芡實各二兩 鍋渣一兩五
錢 赤糖另用

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服三錢，開水
送下。

蜜制山楂丸

禹 縣

【功能與主治】食積肉積，消化
不良，胸膈脹滿。

【處方】東山楂二斤 神麴 麦

芽各四兩

【制法】共為細面，煉蜜為丸，二
錢重。

【劑量及用法】每服二丸，小兒
服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌用。

【備考】有效期間一年。

芍藥丸

沈 陽

【功能與主治】除消化器障礙，
整腸一病。主赤痢疾，人便膿血，
腹痛腸鳴，里急后重。

【處方】白朮二兩 當歸 黃連
黃芩各五錢 木香 炙甘草 板榔
片各一錢 桃仁五粒 肉桂五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸
二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，一日
兩次，開水送下。

【禁忌】生冷常服忌蟹肉，中
氣虛弱者及孕婦忌服。

戊己丸

一、上 海

【功能與主治】嘔吐下痢。

【處方】黃連(炒) 白芍藥(吳
茱萸四兩(炒))各四兩

【制法】共研細粉，水泛為丸，如
高粱粟子大。

【劑量及用法】每服五分至一錢
半，溫開水送服。

二、南 京

【功能與主治】主脾胃不和，吞
酸嘈雜，嘔吐腹疼，下痢等症。

【處方】黃連 淡吳萸 白芍
各二兩

【制法】共研細末，以沸水泛為
小丸，每錢約二百粒。

【劑量及用法】每服五分至一
錢，開水吞服。

三、杭 州

【功能與主治】健脾和肝，調氣
舒郁。主脾胃受濕，氣滯腹痛，赤白
下痢，腸鳴泄瀉，食不消化，及肝胃
氣郁，吞酸嘔吐等症。

【處方】黃連六兩 吳茱萸一
兩 炒白芍二兩

【制法】共研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服一至二錢，
米飲或開水送下。

附參考古方

【來源】太平惠民和劑局方。

【功能與主治】治脾受濕氣，泄
利不止，米谷不化，臍腹刺痛。小
兒有疳氣下痢，亦能治之。

【處方】吳茱萸(去梗，炒) 黃
連(去鬚) 白芍藥各五兩

【制法】上為細末，面糊為丸，如
梧子大。

【劑量及用法】每服二十丸，濃
煎米飲下，日服。

痢疾丸

一、禹 縣

【功能與主治】小腹疼痛，里急
后重，紅白痢疾。

【處方】吳茱萸一兩五錢 廣木
香十兩 黑地榆二十兩 川黃連十
兩 白芍 當歸各二十兩 烏梅肉
十兩 白頭翁二十兩 金銀花十五
兩 黑山檳二十兩 川厚朴 板榔
各二十兩

【制法】共為細面，水丸，如梧子
大。

【劑量及用法】每服一包，開水
送下，小兒每服二粒。

【禁忌】寒症忌用。

【備考】有效期間一年。

二、沈 陽

【功能與主治】調氣和血，化滯
消脹。主赤白痢疾，腹痛重墜，消化
不良，胃腸停滯等症。

【處方】當歸 小赤芍各六兩
枳殼 板榔 萊菔各二兩 甘草一
錢

【制法】共碾極細面，水泛為小
丸。

【劑量及用法】每服一錢，小兒
酌減，開水送下。

治痢丸(治痢神效丸)

吉 林

【功能與主治】止痢清腸，瀉里
解熱，瀉下化滯。主紅白痢疾，里急
后重，身熱腹痛，凝滯瘀積等症。

【處方】川連 川軍各一兩 生
芍八錢 木香五錢四分 茅朮六錢

七分 檳榔 地榆各一錢四分 桃仁六錢七分 黃芩一兩 枳殼五錢四分 紫朴六錢七分 青皮五錢七分 焦楂四錢 麥芽五錢四分 當歸一錢四分 紅花二錢

【制法】共為細面，水泛為小丸。

【劑量及用法】每服三錢，小兒五歲以下減半，空心用開水送下。

止痢丸

大同

【功能與主治】瀉痢。

【處方】生黃芪 熟黃芪 生大黃 熟大黃各一兩

【制法】共為細面為丸。

【劑量及用法】每日開水送服一丸。

止血痢疾丸

大同

【功能與主治】熱結腸中，止痢止血。

【處方】鴉胆子(去皮油)十兩 桂元肉二十兩

【制法】共為細面，膠水為丸，綠豆大。

【劑量及用法】每服一錢，用膠囊裝服，開水送下。

紅痢疾丸

撫順

【處方】黃栢 黃連 秦皮 杏仁各三錢 酒芩四錢 山梔 歸尾 地榆炭 焦檳榔 赤芍各三錢 芥炭二錢 生草一錢 香櫞一錢 白頭翁五錢 茄楠香二錢。

【制法】共為細面，蜜丸，二錢重。

紅白痢疾丸

南昌

【功能與主治】紅白痢疾腹痛，里急後重。

【處方】木香(煨)四兩八錢 黃芩二兩 甘草四兩 白芍三兩 黃連(用吳茱萸十兩泡水洗炒再去萸)二十兩

【制法】共研細末，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每日服二次，每服一至二錢，溫開水送下。

【禁忌】勿食生冷葷腥。

香連丸

一、北京

【功能與主治】清導化痢。主下痢赤白，腹痛下墜。

【處方】木香四兩八錢八分 黃連(用吳茱萸十兩煎湯制)二十兩

【制法】共為細粉，用醋二兩加水泛小丸。

【劑量及用法】每服一錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌食生冷油膩。

二、天津

【功能與主治】殺菌消炎，化滯止痛。主赤痢白痢，腹中凝痛，大便內雜有膿血，里急後重。

【處方】廣木香一斤 黃連(吳茱萸水炒)四斤

【制法】共為細粉，涼開水泛小丸，一錢重裝袋。

【劑量及用法】每服一袋，紅糖炭煎水送下，開水亦可。

【禁忌】生冷油膩食物。

三、上海

【功能與主治】下痢赤白，白多于赤。

【處方】黃連(姜汁炒)十四兩 木香(煨)三兩五錢

【制法】共研細粉，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服一錢至一錢半，食前溫開水送服。遵醫師指示服用。

四、武漢

【功能與主治】赤白痢疾，里急後重。

【處方】廣木香五錢 黃連二兩

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用淨水迭成小丸，每錢不得少于八十粒。

【劑量及用法】每服二十粒，日服二次，溫開水送下。

五、福州(局方香連丸)

【功能與主治】治熱瀉痢疾，赤血膿血，濕熱侵脾，里急後重。

【處方】黃連(淨十兩切如豆粒，用淨吳茱萸五兩，二味用熱水拌和入磁罐內，置熱湯中燉一日，同炒，至黃連紫黃色為度，去茱萸不用。)木香(每制淨黃連一兩用木香一錢半)

【制法】上為末，醋泛為丸，桐子大。

【劑量及用法】每服七十丸，食前空心米飲下。

六、杭州(直指香連丸)

【功能與主治】健腸祛濕，治痢消食。治濕熱內滯，腸胃不潔，腹痛便泄，下痢赤白，里急後重，日久不止等症。

【處方】川黃連四兩(吳茱萸一兩煎湯同炒去吳茱萸不用) 廣木香一兩

【制法】共研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服一至二錢，米飲湯或開水送下。

七、南昌

【功能與主治】下痢赤白腹痛，里急後重。

【處方】廣木香(煨)五兩 黃連(姜汁拌炒)二十兩

【制法】共研細末，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每日服二次，每次服一錢至二錢，開水送下。小兒視年齡及病情酌量減服。

【禁忌】生冷、辛辣、油膩食物。

八、沙市

【功能與主治】治赤白痢疾，腹痛里急後重。

【處方】廣木香五兩 川黃連十兩

【制法】研細末，冷開水泛為丸。

【劑量及用法】成人量每服二錢，食前溫開水下，每日服二次。小兒老人酌減。

【禁忌】忌油膩及不易消化之食物。

九、重慶

【功能與主治】治下痢赤白，白多于赤者。

【處方】廣木香五兩 黃連二十兩

【制法】黃連用吳茱萸四兩 同炒，去吳茱萸，取廣木香與黃連同研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服一至二錢。

十、西安

【功能與主治】健胃整腸，止痛。治泄瀉痢疾等腸胃病。

【處方】川黃連（吳茱萸二兩同炒去之）四兩 廣木香（不見火）一兩

【制法】水泛為丸。

【劑量及用法】每服一錢，米飲送下。

十一、蘭州

【功能與主治】殺菌消炎，化滯止痛。主赤痢白痢，發燒腹疼，大便雜有膿血，里急後重。

【處方】廣木香一斤 黃連一斤

【制法】共為細末，水泛為小丸。

【劑量及用法】每服一錢，每日三次，開水送下。

十二、禹縣

【功能與主治】紅白痢疾，里急後重。

【處方】廣木香五兩 吳茱萸水炒黃連二兩

【制法】共為細面，水泛丸如小米大。

【劑量及用法】每服一錢，開水送下。

【禁忌】寒症忌用。

【備考】有效期間二年。

十三、濟南

【功能與主治】赤白下痢，里急後重。

【處方】同南昌，分量为其十分之一。

【制法】共為細末，水泛為丸，粟米大。

【劑量及用法】空腹開水送下，每服一錢，小兒酌減。

【禁忌】辛辣油膩生冷等物。

十四、青島（二味香連丸）

【處方】黃連二十兩（以吳茱萸十兩水拌浸一宿同炒去吳茱萸不用）木香五兩

【制法】共為細面，醋水泛小丸。

十五、沈陽、撫順

【功能與主治】健胃固腸，消炎止痛。主赤白痢疾，里急後重，腹痛下墜，痢如魚腦或如爛肉，不思飲食。

【處方】同蘭州，分量各用一兩。制法亦同。

【劑量及用法】每服一至二錢，開水送下。

【禁忌】蟹肉生冷油膩。

附參考古方

【來源】太平惠民和劑局方（大香連丸）。

【功能與主治】治丈夫婦人腸胃虛弱，冷熱不調，泄瀉煩渴，米穀不化，腹脹腸鳴，胸膈痞悶，肋肋脹滿，或下痢膿血，里急後重，夜起頻併，不思飲食，或小便不利，肢體倦怠，漸即瘦弱。

【處方】木香四兩八錢八分 黃連（去蘆鬚二十兩，用吳茱萸十兩，同炒令赤，去茱萸不用）

【制法】上為細末，醋糊為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二十丸。飯後吞下，空心食前，日進二、三服。

加味香連丸

一、南京（香連丸）

【功能與主治】清濕熱，推積滯。主紅白痢疾，腹疼脹滿，里急後重。

【處方】川黃連十二兩 廣木香四兩 白芍藥二兩 元胡索四兩 淡吳茱萸五錢

【制法】共研細末，用沸水泛為小丸，黃連另研為衣，每錢約做二百粒。

【劑量及用法】每服五分至一錢，一日一次，開水吞服。

二、昆明（香連丸）

【功能與主治】赤白痢疾，里急後重。

【處方】廣木香 甘草 陳皮 檳榔 澤瀉各四兩 黃連 蒼朮各八兩 枳殼 厚朴各六兩 吳茱萸四兩 杭芍八兩 茯苓六兩

【制法】水磨為丸。

【劑量及用法】每服二錢半，幼童減半，用開水吞服。

【禁忌】胃弱泄瀉不宜服用。

三、大同（香連丸）

【功能與主治】濕熱下痢，里急後重。

【處方】土炒黃連八錢 煨廣木香五錢 川芎 茯苓各一兩五錢 白芍四兩 車前子二兩 當歸八兩 枳殼二兩 川朴 蒼朮各二兩 吳茱萸一兩 木通 土炒黃芩 焦地榆各一兩 檳榔二兩

【制法】共研細面，水泛成小丸。

【劑量及用法】大人服一錢。

四、濟南

【功能與主治】紅白痢疾，腹痛後重。

【處方】黃連六兩 木香四兩 檳榔二兩 枳殼四兩 吳茱萸二兩 黃芩 厚朴各四兩 黃柏二兩 白芍四兩 元胡 當歸各二兩 甘草一兩

【制法】共為細粉，水泛為小丸。

【劑量及用法】每服一錢，空腹開水送下。

【禁忌】忌生冷油膩等食物。

五、青島（香連丸）

【處方】黃連四兩 檳榔一斤 甘草半斤 木香二兩 枳殼 白芍 歸尾各半斤 黃芩一斤

【制法】共研細面，水泛小丸，如小米大。

六、撫順、承德

（香連丸，附：香連散）

【功能與主治】消炎整腸。主腸炎腹痛，里急後重，膿便血便，或如魚腦，或如爛肉，日行數十次。

【處方】黃連 廣木香 川朴 檳榔 白芍 枳殼各一兩

【制法】共為細面，水泛小丸。

【劑量及用法】每服一錢，每日兩次，開水送下。

【禁忌】忌食瓜果生冷油膩等物。

【備考】香連散即上藥粉劑，供小兒用，每次一分至三分，酌量服用，開水送下。

七、呼和浩特（香連丸）

【處方】黃連（另為衣用） 枳殼

白芍各二斤 檳榔 厚朴 陈皮
木香各十兩 石蓮 一斤八兩

【制法】水泛小丸，黃連為衣。

【備考】一方多訛計一斤，蜜大丸一錢重，蜡皮封固。

附參考古方

【來源】沈氏尊生書。

【功能與主治】腸澼。

【處方】黃連 炙吳萸各二兩
木香一錢 煨白朮一錢 乳香
沒藥各錢一分

【制法】水泛小丸，梅肉，搗丸。

【劑量及用法】每三十丸，甘草湯下。

香連化滯丸

一、北京、濟南

【功能與主治】化滯消積。主小
痢腹痛，里急后重。

【處方】木香 黃連各二兩 青
皮 橘皮 厚朴 枳實 黃芩各二
兩五錢 當歸 白芍各五兩 滑石
甘草 檳榔各二兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重
二錢。

【劑量及用法】每服一丸，日服
二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天津

【功能與主治】清腸熱，化食滯，
殺菌止痢。主紅白痢疾，里急后重，
腸熱便膿便血，食物停滯不消，作脹
作痛。

【處方】同北京。

【制法】共為細粉，水丸——京
開水泛小丸二錢重，裝袋，蜜丸——
煉蜜為丸，二錢重，蜡皮或蜡紙筒
封固。

【劑量及用法】水丸每次服一
袋，蜜丸每次服一丸，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服，及生冷油膩
食物。

三、蘭州

【功能與主治】清腸熱，化食滯。
主里急后重，腸熱泄痢，大便雜有膿
血，食物停滯不消，作脹作痛。

【處方】當歸 白芍各一兩 黃
連 兩 黃芩 黃柏 枳殼 檳榔
各一兩 大黃 一兩 滑石 一兩 甘
草 三錢 木香 一兩

【制法】共為細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服二錢，開水
送下。

【禁忌】虛寒氣弱，及孕婦忌
服。

四、沈陽

【功能與主治】清熱整腸，化滯
止痢。主濕熱凝滯，赤白痢疾，腹痛
下重，里急后重，小兒積滯，消化不
良。

【處方】木香 黃連各一兩 清
夏 陳皮 厚朴 枳實 黃芩各二
兩五錢 當歸 白芍各五兩 滑石
粉 檳榔 甘草各二兩

【制法】共碾極細面，水泛為小
丸。

【劑量及用法】每服二錢，開水
送下。

【禁忌】生冷硬物，油膩辛辣。

五、哈爾濱

（止痢香連丸、香連丸）

【功能與主治】化濕清熱，導滯
安胎。主赤白痢疾，濕熱凝滯，發為
痢疾，痢下赤白，或如魚腦，或如爛
肉，如膿如血，腹痛下重，里急后重。
妊娠痢疾頗宜。

【處方】廣木香 黃連（吳萸
炒）均青皮 廣陳皮 紫油朴 江
枳實 子芩各一兩 全當歸 炒
白芍各二兩 飛滑石 炙甘草 檳
榔片各一兩

【制法】共碾為細面，水泛為小
丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服一付（二
錢），空服開水服。

【禁忌】孕婦忌服生冷食物。

附參考古方

【來源】沈氏尊生書。

【功能與主治】妊娠下痢赤白。

【處方】青皮 陳皮 厚朴 枳
實 黃芩 黃連 當歸 白芍 滑
石 木香 甘草 檳榔。

【備考】此方力頗大，臨用時
酌量虛人用之。

暖臍丸

沈陽

【功能與主治】祛寒鎮痛。主虛
寒腹痛，痢疾，泄瀉嘔噦，四肢寒厥。

【處方】母丁香二錢 去皮木鼈
子一枚 台麝香五厘

【制法】先將丁香、木鼈子碾成
極細面，再和麝香研勻，姜糊為小
丸，硃砂為衣。

【劑量及用法】用一丸研面，納
入臍中，用煖臍膏貼臍上，熱水帶熨
之。

駐車丸

一、南京

【功能與主治】久痢。

【處方】炒川黃連二兩 西砂一
兩五錢 炮干姜一兩 阿膠（蛤
粉炒珠）一兩五錢

【制法】共研細末，用煉蜜為丸，
每錢約做二十粒。

【劑量及用法】每服一錢，一日
二次，空腹時開水吞服。

二、福州

【功能與主治】治陰虛發熱，下
痢膿血及休息痢等症。

【處方】同南京，分量为其十
倍。

【制法】共研為末，阿膠燉化為
丸（內阿膠以醋四升，熬成膏煉丸）。

三、杭州

【功能與主治】治陰虛發熱，下
痢膿血，久痢腹痛，休息痢疾。

【處方】同南京，分量加倍。

【制法】研為細末，以醋烱膠和
丸。

【劑量及用法】每服二至三錢，
一日三次，食前米飲湯送下。

附參考古方

【來源】備急千金要方。

【功能與主治】治大冷洞痢腸
滑，下重如魚腦，日夜無度，腹
痛不可堪忍者。

【處方】黃連六兩 芍藥二兩
當歸 阿膠各二兩

【制法】上四味末之，以大酢八
合烱膠和之，併手丸如人豆許，干
之。

【劑量及用法】大人飲服三十
丸，小兒自日以減三丸，暮年者五
丸，余以意加減。日三服。

烏 梅 丸

一、上海(烏梅安胃丸)

【功能与主治】治蛔虫。

【处方】当归 花椒(炒)各四兩 干姜 兩 細辛六兩 黃連十六兩 党参 附子(炮去皮制) 黃柏 桂枝各六兩

【制法】共研細粉，用烏梅肉九兩，醋浸一夜，煮爛打和加煉蜜為丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服一錢至二錢，溫開水送服。

【禁忌】香燥生冷食物。

二、天 津

【功能与主治】健胃杀虫，化滯止痛。主寒熱食積，煩悶腹脹，能驅蛔虫，嘔吐腹疼，日久痢疾。

【处方】炮姜十兩 細辛 制附子 人參(去節) 黃柏 肉桂(去粗皮)各六兩 川椒(微炒)四兩 稻米十二兩 當歸四兩 黃連一斤 烏梅肉十五兩(用醋十兩泡一夜)

【制法】先將烏梅肉和稻米蒸熟，再和羣藥一起晒干，共為細粉。涼開水泛小丸，裝袋，每重二錢。

【剂量及用法】每次服一袋，小兒酌減，開水送下。

三、南京(烏梅安胃丸)

【功能与主治】主虫疼，四肢厥冷，吐虫，久痢。

【处方】烏梅一斤 制附子六兩 川黃連一斤 潞党参六兩 淡干姜十兩 黃柏 細辛各六兩 西當歸四兩 肉桂六兩 川花椒(炒去汗)四兩

【制法】將烏梅去核取肉，以酒浸一宿，蒸熟搗爛如泥，和余藥先另研為細末，加煉蜜為小丸，每錢約做二十粒。

【剂量及用法】每服一錢，開水吞服。忌食須遵醫囑。

四、武 汉

【功能与主治】久瀉久痢，腹痛吐蛔。

【处方】烏梅十五兩 細辛 桂枝 党参 黃柏各六兩 干姜十兩 黃連一斤 蜀椒 當歸各四兩 烏

附片六兩

【制法】上藥干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜60—62% 迭成小丸，每錢不得少于二十五粒。

【剂量及用法】每服二至四錢，每日六次。

五、广 州

【功能与主治】腹痛嘔吐洩瀉。

【处方】黃柏十二兩 干姜一斤 四兩 附子十二兩 烏梅六兩 只當歸半斤 細辛 党参各十二兩 黃連一斤 川椒半斤

【制法】各藥分別制炭，蒸熟煉蜜為小丸。

【剂量及用法】每日四錢，小兒二錢。白滾水送用。

六、福州(仲景烏梅丸)

【功能与主治】治胃寒吐衄，衄厥等症，肝木剋土，飢不欲食及肝脾疼痛。

【处方】烏梅肉二十個 人參(用羊參) 黃柏 細辛 附子(炮) 桂枝各六錢 黃連(炒)一兩六錢 干姜一兩 當歸酒浸 川椒(去目及閉口者，炒去汗)各四錢

【制法】上研末，先將烏梅肉用苦酒蒸爛，搗膏加煉蜜為丸(時方用苦酒泛為丸)。

七、杭州(仲景安胃丸、烏梅安胃丸)

【功能与主治】治胃逆吐衄，胸腹疼痛，四肢厥冷，嘔吐不食，脇肋脹滿，久痢不止等症。

【处方】烏梅二百枚 細辛六兩 干姜十兩 黃連十六兩 當歸四兩 制附子六兩 川椒(炒出汗)四兩 桂枝 党参 黃柏各六兩

【制法】共研細末，將烏梅去核，醋浸一夜蒸透搗爛，和前藥加煉蜜為丸。

【剂量及用法】每服一錢五分至二錢，開水或開水送下。

【禁忌】生冷滑物臭食等。

八、南 昌

【功能与主治】厥陰寒熱錯雜，手足厥冷，心下疼痛，消渴。並治吐衄久痢。

【处方】同福州，洋參用党参。

【制法】共研細末，以醋浸烏梅

一宿，去核蒸熟，搗成泥和藥，水泛為丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每日服三次，每次一錢至二錢，飯前開水送下。非經醫師處方不得使用。

【禁忌】生冷滑物。

九、沙 市

【功能与主治】治衄厥吐衄久痢嘔逆等症。

【处方】同杭州，惟桂枝用中安桂。

【制法】先將烏梅醋浸一宿，去核蒸熟搗爛，和諸藥末加煉蜜為丸。

【剂量及用法】成人量每服二錢，日服二次，溫開水下。

【禁忌】胃炎吐衄及痢疾初起均忌服。

十、重 庆

【功能与主治】治衄厥，吐衄，久痢。

【处方】同杭州。

【制法】烏梅酒浸去核余藥共研細末，煉蜜和丸。

【剂量及用法】一至二錢。

【禁忌】生冷，滑物，臭食等。

十一、昆 明

【功能与主治】腹痛吐蛔，消渴手冷，久瀉不止，乳房發炎。

【处方】烏梅(去核)百個 細辛六錢 干姜一兩 黃連一兩六錢 桂枝六錢 紅花椒(炒) 當歸各四錢 天雄 黃柏 洋參各六錢

【制法】研末，煉蜜為丸，蜡壳。

【剂量及用法】每服一丸，幼童減半，用開水調服。

【禁忌】普通泄瀉與赤痢不宜服。

十二、西 安

【功能与主治】傷寒病之腸出血，吐衄，腸機能衰弱之久痢，休息痢等。

【处方】同福州。

【制法】蜜制為丸。

【剂量及用法】每服一錢，日三次，可加至二錢。小兒酌減。

【禁忌】忌食生冷及滑腸之物。

十三、蘭州(1)

【功能与主治】健胃，殺腸寄生

虫,及阿米巴原虫。主胃酸不足,胃疼,得食則嘔吐,慢性痢疾,便膿血,間有使純白色冰狀物者。

【处方】烏梅五兩 花椒四錢 桂枝六錢 當歸四錢 北細辛 黨參各六錢 干姜一兩 附片 黃柏 黃連各六錢

【制法】共為細末,煉蜜為小丸。

【劑量及用法】重者每日三次,輕者二次,開水送下。

【禁忌】忌生冷油膩,刺激性食物。

十四、蘭州(2) (杀虫烏梅丸)

【功能與主治】杀虫,清理腸胃。主痢疾蛔虫,嘔吐腹痛。

【处方】烏梅四兩 細辛六兩 當歸 干姜 川連 附子各一兩 花椒四兩 元桂六錢 黨參五錢 黃柏二錢

【制法】共為細面,水泛小丸。

【劑量及用法】每服二錢,開水送下。

十五、大同 (烏梅安蛔丸)

【功能與主治】安蛔化積,肚腹疼痛。

【处方】烏梅 黨參 當歸各二錢 川連二錢 川楝一錢半 細辛八分 紅川椒 干姜各二錢 桂枝 附子各一錢五分

【制法】陳醋一盅蜜小丸。

【劑量及用法】每服三錢。

十六、濟南

【功能與主治】腹痛吐蛔,久瀉久痢。

【处方】同杭州。

【制法】共為細粉,煉蜜為丸,梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢,開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

附參考古方

【來源】金匱要略方論。

【功能與主治】蛔厥。

【处方】烏梅三百枚 細辛六兩 干姜十兩 黃連一斤 當歸四兩 附子六兩(炮) 川椒四兩(去汗) 桂枝 人參 黃蘗各六兩

【制法】上十味,異搗篩,合治之;以苦酒漬烏梅一宿,去核。蒸之五升米下,飯熟,搗成泥,和藥令相得,內臼中,與蜜杵二千下,丸如梧子大。

【劑量及用法】先食,飲服十丸,三服。稍加至二十丸。

【禁忌】禁生冷滑臭等食。

麻仁滋脾丸 (脾約麻仁丸)

一、北京、大同

【功能與主治】健胃潤腸。主大便秘結。

【处方】麻仁 白芍 枳殼 大黃各十二兩 厚朴 杏仁各十六兩

【制法】共為細粉,煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服三錢,日服二次,溫開水送下,空腹服。

【禁忌】孕婦勿服。

二、天津

【功能與主治】滋潤大腸,健胃通便。主腸胃燥結,大便不通,胸腹脹滿。及產後,病后腸液不足的便秘。

【处方】火麻仁八兩 枳實(熬炒)四兩 生白芍三兩 當歸八兩 熟軍一斤 厚朴(姜制) 郁李仁 杏仁(去皮炒)各四兩

【制法】共為細粉,煉蜜為丸三錢重,蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量與用法】每服一丸,開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、上海(麻仁丸)

【功能與主治】小溲短赤,大便秘結。

【处方】大黃(制) 厚朴(制) 杏仁(去皮尖) 火麻仁各四兩 白芍藥(炒)三兩 枳實(炒)二兩

【制法】共研細粉,煉蜜為丸,如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢,空腹時溫開水送服。

【禁忌】氣虛年老者及孕婦忌服。

四、南京(麻仁丸)

【功能與主治】緩下劑。主腸液

枯燥,大便秘結,小便赤熱等症。

【处方】西大黃(蒸焙)一斤 炒枳實 白芍各八兩 火麻仁一兩 制厚朴 苦杏仁(炮制一晝夜去皮尖研作脂)各五兩

【制法】共研細末,煉白蜜為丸,每錢約做二十粒。

【劑量及用法】每服二錢至三錢,一日一次,空腹時開水吞服。

五、武漢(麻仁丸)

【功能與主治】腸液枯澀,大便秘結。

【处方】麻仁(去壳)二兩 白芍 枳實(面炒)各五錢 錦紋大黃 厚朴(姜汁炒) 苦杏仁(去皮尖)各一兩

【制法】小丸——上藥干燥,混合碾細,照淨粉量加煉蜜40—42%,迭成小丸,每錢不得少于二十五粒。

大丸——加煉蜜80—90%和成大丸,每丸重三錢。

【劑量及用法】每服一至五錢,日服二次。

六、福州

【功能與主治】潤燥通幽。治胃火乘脾,約束津液,熱甚氣實,腸燥秘結,溲數便難之症。

【处方】麻仁十二兩 杏仁六兩 白芍(炒)八兩 川朴 枳實(熬炒)各八兩 制軍十六兩

【制法】共為細末,煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服三錢。開水送下。

【備考】一方麻仁五兩、白芍四兩,余同。

麻仁熬晒,去壳另研,川朴(炙)、杏仁(去皮尖)熬研作脂。

七、杭州

【功能與主治】治熱病液耗,腸胃燥結,大便不通,小便赤熱,老年血虧,津枯便艱等症。

【处方】生大黃二兩 火麻仁四兩 制川朴 酒白芍各三兩 苦杏仁四兩 炒枳實二兩

【制法】共研細末,煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二至三錢,開水送下。

八、沙市(脾約丸)

【功能與主治】治津液不足,腸

燥便秘或汗多而亡津液，小便頻數，大便艱澀等症。

【处方】白芍二兩 火麻仁六兩 枳實 川厚朴各三兩 杏仁六兩 西大黃八兩

【制法】上藥研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服三錢，空服溫開水下，每日服二次，小兒老人酌減。

【禁忌】體弱而大便澀滯者忌服。

九、重慶(麻仁丸)

【功能與主治】治脾約。

【处方】火麻仁八兩 白芍 枳實各四兩 大黃八兩 厚朴 杏仁各四兩

【制法】共研細末，煉蜜和丸，紙盒包裝。

【劑量及用法】二錢至二錢半。

十、西 安

【功能與主治】主胸腹脹滿，大便秘結。

【处方】白芍 枳殼各半斤 熟軍 厚朴 火麻仁 杏仁各一斤

【制法】細末，蜜丸。

【劑量及用法】每服二至三錢，飯前開水送下。

十一、蘭州(加味麻仁丸)

【功能與主治】滋潤大腸，健胃通便。主腸胃燥結，大便不通，胸腹脹滿等症。

【处方】火麻仁八兩 枳實四兩 白芍二兩 當歸八兩 熟軍一斤 川朴 郁李仁 杏仁各四兩

【制法】共研細末，蜜小丸。

【劑量及用法】每服三錢，開水送下。

【禁忌】產婦，孕婦，老年人忌用。

十二、濟南(麻仁丸)

【功能與主治】津液不足，大便秘結。

【处方】同武漢，分量為其十六倍。

【制法】上為末，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服一至二錢，每日一次，開水送下。

【禁忌】忌食辛辣油膩等物，體弱而大便澀滯者忌服。

十三、青 島

【处方】厚朴 麻仁 大黃各八兩 杏仁四兩 白芍 枳實各二兩

【制法】共軋細面，蜜丸如梧桐子大。

十四、沈 陽

【功能與主治】潤腸通便，清熱消積。主胃腸燥結，便秘不通，傷寒熱病，胃腸實熱，頭痛目眩，脾郁胃熱。

【处方】大黃一斤 火麻仁 炒枳實 厚朴 炒杏仁 白芍各五兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，開水送下。

【禁忌】五辛發物。孕婦忌服。

十五、撫 順

【处方】麻仁 厚朴 制軍 枳實 杏仁各四兩 生芍 明粉各二兩

【制法】共為細面，蜜丸三錢大。

十六、呼和浩特

【处方】杭芍六斤 川朴十二斤 枳實六斤 薏仁(另兌)一斤半 杏仁(另兌)十二兩

【制法】共為細面，蜜小丸。

附參考古方

【來源】金匱要略方論(麻子仁丸)。

【功能與主治】大便堅，其脾為約。

【处方】麻子仁二升 芍藥半斤 枳實 大黃各一斤 厚朴一尺 杏仁一升。

【制法】上六味末之，煉蜜和丸，梧桐子大。

【劑量及用法】飲服十丸，日三服，以知為度。

潤 便 丸

蘭 州

【功能與主治】清熱通便。主大便秘不通，消化不良，食慾不振。

【处方】川軍八兩 熊胆二錢 牛黃四分

【劑量及用法】每服十粒，計八分重。

【禁忌】孕婦忌服。

潤 腸 丸

一、上 海

【功能與主治】大便燥澀。

【处方】生大黃(綠矾水浸濕紙裹煨) 當歸尾 羌活各五錢 火麻仁 桃仁(去皮尖)各一兩

【制法】先將火麻仁、桃仁研細，余藥共研細粉，和勻，加煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二至三錢，飯前溫開水送服。

【禁忌】孕婦及虛弱者勿服。

二、杭 州

【功能與主治】潤燥和血，疎風清熱。主腸胃積熱，風熱血結，腸燥便秘，不思飲食等症。

【处方】同上海。

【制法】研為細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二至五錢，食前用開水送下。

三、西 安

【功能與主治】主大腸風火便秘。

【处方】同上海，分量加倍。

【制法】細末，蜜丸。

【劑量及用法】每次三錢，飯前開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

四、濟 南

【功能與主治】腸燥便秘。

【处方】阿膠四斤十二兩 杏仁二斤五兩 防風四斤十一兩 當歸二斤五兩 羌活十五兩 熟軍 廣陳皮各二斤五兩 郁李仁十五兩 火麻仁二斤五兩 荆芥十五兩 枳殼二斤五兩 秦艽十五兩

【制法】共研細面，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服三錢，開水送下。

【禁忌】辛辣食物。

五、青 島

【处方】當歸 生地 桃仁 枳

壳 麻仁各一斤

【制法】共為細末，煉蜜為小丸。

六、沈陽

【功能与主治】生津潤燥，通調腸胃。主胃腸結熱，烟酒中毒，津液枯燥，大便不通，食慾不振，赤白痢疾。

【处方】同上。

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空心開水送下。

七、吉林

【功能与主治】寬腸潤燥，消導下。諸般燥結腸炎，血滯血虛各症。

【处方】当归二斤一兩四錢 川軍五兩二錢四分 生地一斤六錢七分 黃芩 火麻仁 枳壳 郁李仁各一斤零六錢四分

【制法】共為細面，煉蜜為丸，如梧桐子大。裝入磁瓶或玻璃瓶中保存。

【劑量及用法】每服二錢，用開水送下。

【禁忌】辛辣發熱等物。

附參考古方

【來源】1 脾胃論。

【功能与主治】飲食勞倦，大便秘澀，或干燥閉塞不通，全不思食，乃風結血結皆能閉塞也。潤燥和血疏風自然通利也。

【处方】大黃(去皮) 当归稍 羌活各五錢 桃仁(湯浸，去皮尖)一兩 麻子仁(去皮取仁)一兩二錢五分

【制法】上除麻仁另研如泥外，搗羅為細末，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服五十丸，空心用白湯送下。

2. 沈氏尊生書。

【功能与主治】養血潤腸。主血燥熱。

【处方】白 生地 枳壳 桃仁 麻仁等分

【制法】亨丸。

【備考】此方酌加大黃、黃芩亦可。

五仁潤腸丸

一、天津

【功能与主治】潤腸通便。主大腸燥熱，便秘腹脹，食少，消化不良。

【处方】生地四兩 桃仁(去皮) 火麻仁各一兩 郁李仁 三錢 栝子仁五錢 茯苓(酒蒸)一兩 廣皮四兩 熟軍 当归各一兩 松子仁三錢

【制法】以上除五仁外共為細粉，再將五仁中合一處，煉蜜為丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每服一丸，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、沈陽(五仁丸)

【功能与主治】滋燥潤腸。主治氣血虛弱的便秘，津枯液少的燥結。能通幽門閉塞，排洩大腸積滯。

【处方】桃仁 炒杏仁各一兩 栝子仁五錢 松子仁一錢五分 郁李仁一錢 陳皮四兩

【制法】共搗如泥，陳皮面調和為小丸。

【劑量及用法】每次五分至一錢，米湯飲。

活血潤腸丸

呼和浩特

【处方】全归 杏仁 生地 枳壳 麻仁各半斤

【制法】共細面，蜜小丸。

附參考古方

【來源】雜病証治類方。

【功能与主治】治大便秘血，時常燥結。

【处方】当归稍(煨)各一兩 麻子仁二兩半 桃仁(研如泥)二兩 皂角仁(存性去皮秤一兩其性得濕則滑，滑則燥結自除)

【制法】上除桃仁、麻仁，另研如泥外，為極細末，煉蜜為丸，如桐子大。

【劑量及用法】每服五十丸白湯下，二、三服後須以蘇子、麻子粥每日早晚食之，大便日久再不燥結。余藥以磁器盛之，紙密封，勿使見

風。

衛生潤腸丸

沈陽

【功能与主治】助消化，潤燥通腸。主大便秘結，隔食反胃，咽腫舌焦，頭昏目赤，食慾不振，消化不良。

【处方】川羌活 当归 大黃各五錢 麻仁 桃仁各一兩 皂角子 防風 秦艽各五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空腹白開水下。

更衣丸

一、北京

【功能与主治】潤腸通便。主老人或久病後，腸液缺乏致便秘腹痛。

【处方】蘆薈一兩四錢 硃砂一兩。

【制法】共為細粉，燒酒和面粉打糊為小丸。

【劑量及用法】每服五分，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天津、蘭州

【功能与主治】潤腸通便。主習慣性便秘，大便秘結，或數日不通而引起腹部脹痛，頭暈胸悶。

【处方】同北京，分量減半。

【制法】研細和勻，白酒為小丸，一錢重裝袋。

【劑量及用法】每次服一袋，米湯水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、上海

【功能与主治】潤腸熱，通大便。

【处方】同北京，分量为其五倍。

【制法】研細粉和勻，加高糧酒少許為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服五分至一錢五分，溫開水送服。

【禁忌】孕婦忌服。

四、南京

【功能与主治】生津液不足，腸燥便秘。

【处方】蘆薈七錢 飛硃砂五錢
麥冬七錢(因賦形故加麥冬)

【制法】以蘆薈用酒烱化和硃砂及麥冬末為丸，硃砂不再另外為衣，每錢約做 $\frac{1}{2}$ 粒。

【劑量及用法】每服一至二錢，開水吞服。

【禁忌】孕婦忌服。

五、武 漢

【功能與主治】津液不足，大便秘結。

【处方】同北京，分量為其五倍。

【制法】上藥過行十燥，混合碾細，用酒和成小丸，每錢不得少於二十粒。

【劑量及用法】每服五分至一錢，溫開水沖服。

【禁忌】孕婦及脾虛作瀉者均慎服。

六、福 州

【功能與主治】治水火不安，中干便秘。

【处方】硃砂五錢 蘆薈八錢

【制法】研末，高粱酒調為丸。

七、杭 州

【功能與主治】治熱病液耗，腸胃燥結，肝熱內熾，大便不通之症。奏效甚捷。

【处方】同北京，分量減半。

【制法】用燒酒化蘆薈為丸。

【劑量及用法】每服一錢至一錢五分，米飲湯或開水送下。

八、沙 市

【功能與主治】治肝火內熾，津液不足，腸胃干燥，大便不通等症。

【处方】同北京，分量為其五倍。

【制法】共研細末，滴酒為丸。

【劑量及用法】每服一錢五分，溫開水下。

【禁忌】孕婦、體虛貧血、腸胃無熱以及患痔瘡者忌服。

九、重 慶

【功能與主治】治津液不足，腸胃干燥，大便不通。

【处方】同北京，分量減半。

【制法】共為細面，白酒少許和丸。

【劑量及用法】一錢五分。

附參考古方

【來源】肘方歌括。

【功能與主治】陰病津枯腸秘結，交通水火妙通玄。

【处方】硃砂(研如飛面)五錢
蘆薈(研細)七錢

【制法】上為末，滴酒和丸。

【劑量及用法】每服一錢，好酒送下。

半 硫 丸

一、上 海

【功能與主治】腸痹便秘。

【处方】硫黃(制) 生半夏(漂淨)各二兩

【制法】硫黃研細粉，再加漂淨半夏粉和勻，用生薑四兩打汁和面粉打糊為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服五分至一錢，食前溫開水送服，遵醫師指示服用。

【禁忌】孕婦忌服。

二、南 京

【功能與主治】主老年陽虛之大便秘結。

【处方】姜制半夏二兩 硫黃(用豆腐煮)二兩

【制法】共研極細末，用鮮生薑汁泛丸，每錢約二百粒。

【劑量及用法】每服五分至一錢。

【禁忌】孕婦忌服。

三、福州(局方半硫丸)

【功能與主治】治老年冷秘，虛秘及痿痺冷氣。

【处方】半夏(湯洗七次焙干為末) 硫黃(明淨者研細用柳木槌子殺過)等分

【制法】研末，以生薑汁打糊丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服五、七十丸，用無灰酒或生薑湯送下。

四、杭州(通幽半硫丸)

【功能與主治】治老人血燥，冷秘虛秘，不得人使，及痿痺冷氣，陽虛畏寒。此丸功能緩利便。

【处方】生半夏(水洗漂七次淨晒干)二兩 硫黃(明淨者研細用猪大腸加豆腐水同煮透)二兩

【制法】共研細末，用生薑自然汁和米糊打丸。

【劑量及用法】每服一錢五分至三錢，溫酒或米飲湯或淡姜湯送下。

五、南 昌

【功能與主治】痿痺冷氣，大便秘結虛秘。

【处方】半夏(湯洗七次焙干)三兩 昇華硫二兩

【制法】共研細末，用生薑自然汁和水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服五分至一錢，空腹時用好甜酒或米飲生薑湯送下。

【備考】非經醫師處方不得使用。

六、沙 市

【功能與主治】治虛寒便秘，去腸胃中寒濕積聚等症。

【处方】法半夏九兩 硫黃六兩

【制法】用豆腐數塊合硫黃放鍋內，加水煮好，去豆腐晒干，同半夏共研極細末，生薑二兩煎湯泛丸如粟米大。

【劑量及用法】每次服十五丸至二、三十丸，空腹米湯下。

【禁忌】水亏火盛者及非虛寒體質者忌服。

七、重 慶

【功能與主治】治痿痺冷氣，冷秘虛秘。

【处方】姜制半夏二兩 硫黃二兩

【制法】研為細末，用生薑自然汁合蒸餅和丸，紙盒包裝。

【劑量及用法】大人二至三錢，小孩五分至一錢。

附參考古方

【來源】太平惠民和劑局方。

【功能與主治】除積冷，暖元氣，溫脾胃，進飲食。治心腹一切痿痺冷氣，及年高風秘冷秘，或泄瀉等症。

【处方】硫黃(明淨好者研令極細，用柳木槌子殺過) 半夏(湯洗七次，焙干為末)

【制法】上等分，以生薑自然汁同熬，入干蒸餅末，攪和勻，入臼內

杵数白下，圆如梧桐子大。

【剂量及用法】每服空心温酒，或生姜汤下，十五圆至二十圆，妇人醋汤下。

参苓白朮散

一、沙市

【功能与主治】治脾胃虚弱，饮食不消，食少便溏等症。

【处方】党参 土炒白朮 茯苓 淮山药 莲米 炒扁豆各一兩 桔梗五錢 炙甘草 砂仁各五錢 炒苡仁一兩 广陈皮五錢

【制法】共研極細末。

【剂量及用法】每服三錢，用米湯或温开水調服，每日服二次。老人小兒酌減。

【禁忌】血虛有熱，津液不足者忌服。

二、昆明

【功能与主治】健胃除濕。主嘔吐久瀉。

【处方】党参 一兩八錢 淮山药 扁豆 蓮子各一兩五錢 薏仁米一兩 白朮二兩 广皮 砂仁各一兩 茯苓 一兩五錢 甘草 一兩

【制法】研末。

【剂量及用法】每服二錢半，用开水早晚各服一次。

【禁忌】大便秘結忌服。

三、西安

【功能与主治】腸胃衰弱，消化不良，慢性吐瀉，精神疲困。

【处方】人參 土炒白朮 茯苓 炒山药 炙甘草 广陈皮 炒扁豆各一兩二錢 砂薏仁 炒蓮肉（去心） 砂仁 桔梗各八錢

【剂量及用法】每服二、三錢，棗湯或米飲送下。

【禁忌】急性腸胃炎患者禁服。

四、蘭州

【功能与主治】助氣，健胃，止瀉。主身體衰弱，消化不良，胸滿膨脹，大便溏泄，精神疲乏，不思飲食。

【处方】白朮 党参 茯苓 陈皮 山药 甘草各十一兩 薏米六兩 扁豆半斤 砂仁 蓮子 桔梗各六兩

【制法】共軋細面。

【剂量及用法】每服三錢，开水送下。

五、大同

【功能与主治】快胃健脾。

【处方】党参 白朮各一兩 云苓七錢 砂仁五錢 山药一兩 蓮肉三錢 桔梗七錢 薏米一兩 炙草四錢 扁豆一兩

【制法】共研細面。

【剂量及用法】每服一錢，开水送下。

六、青島

【处方】人參 一兩 云苓四兩 白朮三兩五錢 广皮 扁豆 建蓮子 薏苡仁 砂仁 桔梗各四兩 甘草二兩

【制法】共軋極細面。

七、沈陽

【功能与主治】健脾養胃，除濕止瀉，助消化。主脾虛作瀉，腸鳴腹痛，久瀉不止，體倦無力，食慾不振，面黃肌瘦。

【处方】人參 茯苓 白朮 扁豆 陈皮 山药 甘草各二錢 蓮子肉四錢 砂仁二錢 薏米 桔梗各二錢

【制法】共軋極細面。

【剂量及用法】每服二錢 小兒酌減，开水送下。

【禁忌】生冷油膩，不易消化之食物。

八、撫順

【功能与主治】健胃整腸。主胃腸衰弱，瀉泄，消化不良，食慾不振，顏面萎黃，四肢倦怠，精神乏困，以及暑濕瀉泄等症，和病后胃腸衰弱。

【处方】白人參 白朮 桔梗各二兩 薏米六兩 茯苓二兩 砂仁一兩 扁豆二兩 蓮子一兩 山药二兩 炙草 陈皮各一兩

【制法】共為細面。

【剂量及用法】每服一錢至二錢，姜、棗水送下，早晚二次。

【禁忌】忌食生冷，油膩等物。

九、吉林(白朮散)

【功能与主治】健胃，補虛，扶羸。主脾胃虛弱，飲食不進，嘔吐泄瀉，或久瀉，或病后脾胃衰弱等症。

胃腸病藥

【处方】人參三兩 蓮肉(炒) 山药(炒) 薏米(炒) 白朮(炒) 扁豆(炒) 桔梗 陈皮各二兩 茯苓三兩 砂仁五錢 炙草二兩

【制法】共研細末，用絹羅篩之，以極細為度。

【剂量及用法】大人每服二錢，七岁至十一岁每服七分，四岁至六岁可服四分，三岁至周岁可服一分或二分。每日早晚服之，白水送下。

十、哈爾濱

【功能与主治】健脾止瀉，益氣養血。主消化不良，病后調養。

【处方】人參 塊苓各二兩 蓮肉(炒) 山药(炒) 薏仁(炒) 焦朮 扁豆(炒) 桔梗 陈皮 炙草各二兩 砂仁五錢

【制法】共碾為細面，絹羅篩過。

【剂量及用法】每服一錢五分，小兒酌減，姜、棗煎湯為引。

【禁忌】忌食腥冷，孕婦忌服。

十一、承德

【功能与主治】健胃止瀉。主食慾不振，倦怠無力，胸腹脹滿，嘔吐泄瀉。

【处方】白扁豆二十四兩 人參 茯苓 白朮 甘草 山药各三十二兩 蓮子 桔梗 砂仁 薏仁米各十六兩

【制法】共為細粉。

【剂量及用法】每服二錢，日服二次，姜湯或温开水送下。

十二、呼倫浩特

【处方】蓮肉四兩 苡米 桔梗 云苓 山药各二兩 白朮二兩 党参 一兩 扁豆三兩 炙草 广皮 砂仁各一兩

【制法】共為細面。

附參考古方

【来源】太平惠民和劑局方。

【功能与主治】治脾胃虛弱，飲食不進，多困少力，中滿痞噎，心忪氣喘，嘔吐泄瀉，及傷寒咳嗽。此藥中和不熱，久服養氣育神，醒脾悅色，順正辟邪。

【处方】白扁豆(姜汁浸去皮，微炒)一斤半 人參(去蘆) 白茯苓 白朮 甘草(炒) 山药各二斤 蓮子肉 桔梗(炒令深黃色) 薏苡仁

縮砂(或什)各一斤

【制法】上為細末。

【劑量及用法】每服二錢，棗湯調下，小兒量歲數加減服之。

平胃散

一、福州(東垣平胃散)

【功能與主治】治脾胃不和，不思飲食，心腹脇肋脹滿刺痛，嘔噦惡心，吞酸噎氣，體重節痛，目利霍亂，噎膈反胃等症。

【處方】厚朴(姜汁炒) 陈皮(去白)各五兩 蒼朮(去皮米泔浸炒)八兩 炙甘草二兩

【制法】共為末。

【劑量及用法】每服二錢，水一盞，姜二片，棗二枚，煎七分，去渣溫服。

二、沈陽

【功能與主治】健胃止嘔，燥濕除脹。主脾胃不和，痞脹腹痛，嘔噦吐酸，飲食不進。

【處方】蒼朮八兩 厚朴五兩

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二錢，溫水送下。

附參考古方

【來源】太平惠民和劑局方。

【功能與主治】調氣暖胃，化宿食，消痰飲，辟風寒冷濕，四時不正之氣。治脾胃不和，不思飲食，心腹脇肋脹滿刺痛，口苦無味，胸滿短氣，嘔噦惡心，噎氣吞酸，面色萎黃，肌體瘦弱，怠惰嗜臥，體重節痛，常多自利，或發霍亂及五噎八痞，膈氣反胃，並宜服之。

【處方】陈皮(去白)五十兩 厚朴(去粗皮，水浸一宿，剉，生姜汁制，炒)五十兩 甘草(剉炒)十兩 蒼朮(去粗皮，米泔浸二日，焙干，炒)五斤

【制法和用法】上為細末，每服二錢。水一盞，生姜二片，干棗二枚，同煎七分，去姜棗，熱服。食前入鹽一捻，沸湯點服亦得。

參苓平胃散

福 州

【處方】東垣平胃散加入參 茯

苓各二兩

香砂平胃散

昆 明

【功能與主治】飲食不節，消化不良，腹部脹痛，食積微瀉。

【處方】蒼朮八兩 陈皮三兩 甘草一兩 厚朴五兩 香附三兩 砂仁二兩

【制法】研末。

【劑量及用法】每服二錢半，幼童減半，用開水早晚各服一次。

【禁忌】久瀉忌服。

千金白朮散

蘭 州

【功能與主治】補氣健胃止瀉。主身體衰弱，消化不良，胸滿膨脹，大便溏瀉，精神疲乏，不思飲食。

【處方】黨參 白朮 山藥 扁豆 蓮子各二兩 云苓 薏米各一兩六錢 桔梗 陈皮各一兩二錢 澤瀉一兩六錢 砂仁 炙草 鷄內金各一兩

【制法】共為細面。

【劑量及用法】每服二錢，開水送下。

神朮散

沈 陽

【功能與主治】芳香解穢，燥濕和胃。主水土不服，感受山嵐瘴氣。又治四時邪氣，胃中嘔逆或吐瀉等症。

【處方】厚朴一錢五分 蒼朮二錢五分 陈皮 藿香各一錢五分 石菖蒲 甘草各一錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二錢，引用生姜二片，大棗一枚，煎水送下。

安中散

沈 陽

【功能與主治】散寒止痛，主遠年近日，胃寒疼痛，惡心吐酸，胸腹攻痛，脹滿不舒，四肢倦怠，面黃肌瘦，婦人血寒，腹痛腰疼攻竅等症。

【處方】甘草一斤 延胡 良姜 干姜 茴香 肉桂各五錢 牡蠣四兩

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二錢，熱黃酒送下，婦人用淡醋湯調下。

【禁忌】實熱者忌服。

活胃散

天津、蘭州

【功能與主治】去胃寒，助消化，止疼利便。主胸膈脹滿，胃部時作疼痛，嘔吐嘈雜，不思飲食，大便秘結。

【處方】五靈脂(醋炒)二錢 白胡椒四分 西紅花一錢 公丁香 廣木香各四分 枳殼(麩炒)二錢 共為細粉

兌入：雄黃面 淨巴豆霜各四分

【制法】以上研細和勻，每包二分重，每袋裝六包。

【劑量及用法】每次服一包，一日兩次，以舌舐藥粉嚥下，服後一小時再飲水為佳。

【禁忌】孕婦忌服。

舒肝健胃散

沈 陽

【功能與主治】健腸胃，舒肝氣，利大便。主肝氣郁結，兩肋刺痛，嘈雜噯氣，胃不消化，食少脹滿，吞酸作嘔，腸滿不運，便燥便難。

【處方】豆蔻三錢 白芍一錢五分 厚朴 龍胆草 砂仁各二錢 甘草 元明粉 大黃各一錢 茯苓 蓮肉各二錢 薏米 陈皮各二錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服一錢，開水送下。

肝胃氣痛散

南 京

【功能與主治】主肝胃氣痛，嘔吐酸水。

【處方】海螵蛸四兩(漂淨) 人坎氣二十條 上沉香一錢

【制法】先將坎氣剪碎，用蛤粉炒酥，與海螵蛸共研細末，沉香另研和勻為度。

【劑量及用法】每服三分，開水調服。

健胃止嘔散

沈陽

【功能与主治】健胃清熱，止嘔鎮吐。主食火胃熱，消化不良，肚腹脹滿，不思飲食，嘔吐惡心，嘈雜吞酸，身體倦怠等症。

【處方】枳殼二錢 厚朴一錢 山楂炭五錢 竹茹 半夏 大黃各一錢 廣皮 雞內金各二錢 焦檳榔錢半 薏仁一錢 砂仁八分 黃連 龍胆草各一錢 犀角錢半

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】滿二歲小孩，每服二分，余者酌量增減。成人每服一錢，開水送下。

【禁忌】忌食有刺激性及硬性食物。

玉露散

一、福州

【功能与主治】治傷熱嘔吐，此散退陽明煩熱而止吐也。

【處方】石膏(煨) 寒水石各五錢 甘草二錢五分

【制法】共為末。

【劑量及用法】每服五分，白湯送下。

二、沈陽

【功能与主治】清涼解熱，祛暑安神。主腸胃有熱，煩渴頭痛，瘟疫發瘧，熱痰咳嗽，身熱口渴。

【處方】石膏一斤 硃砂五錢 甘草一兩五錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服一錢，量老幼虛實用之。新汲水調下，或溫水調下，按症用引，日服三次。

【禁忌】慢驚風並虛痰症忌用。

附參考古方

【來源】錢氏小兒藥証直訣。(甘露散)

【功能与主治】治腸熱吐瀉，黃瘦。

【處方】寒水石(軟而微青黑，中有細紋者是) 石膏(堅白而墻壁手不可折者是) 各半兩 甘草(生)一錢

【制法】上同為細末。

【劑量及用法】每服一字或半錢，一錢。食后溫湯調下。

養臟散(真人養臟散)

吉林

【功能与主治】止瀉除寒，固胃健脾，止痛定痛。

【處方】米壳一兩二錢四分 黨參 訶子 當歸 酒芍各一兩 肉蔻 焦朮 木香各六錢七分 甘草 肉桂各五錢四分

【制法】共為細面，用絹羅篩過一、二次，至極細為度。

【劑量及用法】每服二錢，用米湯送下。

止瀉溫中散

大同

【功能与主治】主傷食受寒。能理脾健胃止痛，散寒溫脾止瀉。

【處方】廣木香八錢 黃連 茯苓各四錢 川朴一錢 砂仁二錢 白芍五錢 半夏 陳皮 於朮各四錢 藿香一錢 干姜一兩 甘草 澤瀉各一錢 車前子四錢 丁香 沉香 人參 檳榔各三錢

【制法】共為細面。

【劑量及用法】每服一錢，米湯送下。

肉豆蔻散

沈陽

【功能与主治】健胃固腸，去寒止瀉。主脾胃虛弱，完谷不化，久瀉不止，倦怠無力，口淡無味，飲食減少，日漸瘦弱，腹脇脹滿。

【處方】訶子肉 川烏 肉桂各二兩 姜朮 炙甘草 炮姜 橘皮各一兩 蒼朮八兩 茴香二兩

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服一錢五分。水一盞，生薑二片，紅棗一枚，煎至七分，溫服。

【禁忌】生冷硬物。

萬金散

沈陽

【功能与主治】收斂止瀉。主水瀉下痢，久而不癒，面黃肌瘦，四肢倦怠，脫肛便血等症。

【處方】罌米壳 甘草 陳皮 烏梅各一兩

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二錢，開水送下。

附參考古方

【來源】幼科証治準繩。

【功能与主治】治水瀉下痢，久不癒者。

【處方】罌粟壳(去蒂，一半剉碎醋蜜炒，一半生用) 甘草(不去節，一半炙，一半生用) 陳皮(去白)各二兩 烏梅(和核)一兩

【制法】上藥共為細末。

【劑量及用法】每服二錢。熱湯一盞，略煎二沸，和渣傾出盞內，上以蓋蓋定，候澄清去渣，空心溫服。

香連散

沈陽

【功能与主治】清熱舒郁，調氣止痛。主瀉痢煩渴，米谷不化，腹脹腹鳴，下痢膿血，里急后重，不思飲食。

【處方】廣木香五錢 川黃連二兩 吳茱萸一兩

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二分至四分，米湯送下或砂仁湯送下。

【禁忌】生冷硬物。

痢疾香連散

沈陽

【功能与主治】清熱導滯，化痢止瀉，通氣止血。主頭痛身熱，口渴煩躁，腹痛下痢，里急后重，胃脹嘔吐，紅白痢疾，膿血夾雜，臍腹絞痛，飲食積滯。

【處方】牛芍 雙花炭各五錢 牛黃二分 黃芩五錢 椿皮炭一錢 山楂炭 廣皮各四錢 廣木香三錢 黃連四錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】成人每服五分，小兒三歲以上每服二分。開水送下。

【禁忌】辣腥硬物。

治痢散

沈陽

【功能与主治】清熱化滯，止痢

健腸。主四時感冒，停滯腹痛，吐瀉痢疾，嘔逆食少，里急后重，內傷生冷，消化不良。

【处方】香附 陈皮 赤芍 黑梔 車前 黃連各五錢 木香一錢 連翹三錢

【制法】共碾為極細面。

【劑量及用法】每服一錢，姜湯送下。

【禁忌】辛辣食物，孕婦忌服。

痢疾散

一、南 京

【功能与主治】主赤白痢疾，水瀉初起。

【处方】川羌四兩 制川烏一兩 茅蒼朮(米泔水浸)六兩 制草烏一兩 甘草一兩五錢 生大黃一兩 杏仁霜二兩 熟大黃一兩

【制法】共研極細末。

【劑量及用法】每服五分，小兒酌減，一日二次，白開水調服。

【禁忌】孕婦忌服。

二、武汉(痢症散)

【功能与主治】赤白久痢，腹痛熱帶。

【处方】广木香二錢 沉香一兩 肉蔻霜 黃連 枯礬 厚朴各二錢 赤石脂一兩半

【制法】混合碾細，成淨粉85-90%即得。

【劑量及用法】每服一至二錢。

【禁忌】痢症初起者忌服。

三、大 同

【功能与主治】紅白痢疾，大腸濕熱。

【处方】黃連二十兩 吳茱萸十兩 木香四兩八錢 炮姜五錢 甘草一兩 人參二錢

【制法】共研細面，醋糊為小丸。

【劑量及用法】每服三錢，開水送下。

痢疾導滯散

大 同

【功能与主治】腹痛下痢，里急后重。

【处方】川大黃二錢 广木香二錢 檳榔三錢 白芍四錢 白茯苓

五錢 前皮三錢 萊菔子四錢 車前子五錢

【制法】共為細末。

【劑量及用法】三歲以下每服五分。

瀉痢導滯散

大 同

【功能与主治】痢疾，腹痛，里急后重。

【处方】煨木香二錢 檳榔八錢 前皮 陳皮各四錢 川軍八錢 吳茱萸四錢 枳實六錢 生當歸八錢 生白芍 萊菔子各六錢 車前子八錢 甘草四錢

【制法】共為細面。

【劑量及用法】每服二錢。

清腸解痢散

沈 陽

【功能与主治】清腸止痢，宿食停飲，腹痛重墜，泄下滯積，赤白痢疾。

【处方】松蘿茶五兩 陈皮一斤 苦參八兩 赤芍一斤 炒麦芽五兩 山楂一斤 川黃連五兩 川軍六兩 酒黃芩五兩 桃仁 紫朴各三兩 广木香五兩

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】一歲小兒服三分，大人二錢，日二次至三次，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

止痢散

一、沈 陽

【功能与主治】清理腸胃，除熱涼血補虛。主血痢日久不癒，脫肛便血，氣虛下陷，及久瀉久痢等症。

【处方】赤石脂 白龍骨 阿膠各一兩 訶子肉 广木香 干姜 黃連 制甘草各五錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服五分，粟米湯送下。

二、沈 陽

【功能与主治】整腸消炎，收縮腸管。主腸出血，便血，血痢。

【处方】椿根皮 槐花各一兩

烏梅 米壳各五錢 陈皮 錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二錢，小兒酌減，紅糖水送下。

【禁忌】生冷硬物及油膩。

八 厘 散

濟 南

【功能与主治】痢疾日久，晝夜無度，紅白相兼，精神倦怠，飲食少思，以及禁口痢服之均效。

【处方】黃連二斤 干姜四兩

【制法】共碾細面。

【劑量及用法】每次一分，白開水送下。

【禁忌】生冷食物。

阿 膠 散

沈 陽

【功能与主治】厚腸止痢。主膿血痢疾，繞臍疼痛，久痢脫肛，甚者大便下血等症。

【处方】阿膠二兩 當歸 黃連 芍藥 干姜各一兩

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二錢，以米湯調下。

党 参 膏

上 海

【功能与主治】體倦氣虛，食少便溏。

【处方】党参九百六十兩

【制法】將党参煎汁三次，將各次所煎藥汁澄清過濾，煎成濃汁，加冰糖二十斤收膏，成膏七百二十兩。

【劑量及用法】每次一羹匙，開水化服。

暖 臍 膏

一、北 京

【功能与主治】散寒止痛。主寒冷腹痛，大便泄瀉。

【处方】當歸 小茴香 大茴香 白芷各四兩 木香二兩 香附(生) 烏藥各四兩

【制法】上藥用香油二百四十兩炸枯去渣，煉至滴水成珠，入黃丹一

百兩攪勻成膏另兌；乳香 沒藥 沉香 母丁香 肉桂各一兩 麝香一錢五分

共為細粉，每二百四十兩膏油兌入以上細粉，攪勻攤貼。

【劑量及用法】微火化開貼臍上。

【禁忌】忌食生冷；孕婦忌貼。

二、天津(十香煖臍膏)

【功能與主治】散寒止痛，暖臍止瀉。主寒涼腹痛，疝氣痞塊，大便瀉瀉，臍腹脹痛。

【處方】生附子 川棟子各二兩 大生蒜二十支 干姜 並榮子 吳茱萸各二兩 川椒六兩 小茴香三兩

【制法】以上藥料用香油十五斤，炸枯去渣濾淨，煉至滴水成珠，再入章丹九十兩攪勻成膏。每膏藥油十五斤兌：肉桂面四兩二錢 公丁香面一兩二錢 麝香一錢 廣木香面一兩二錢 攪勻。每大張淨油八錢，中張淨油四錢，小張淨油二錢。

【劑量及用法】貼臍部。

【禁忌】孕婦忌貼。

三、上海

【功能與主治】受寒腹痛。

【處方】清膏藥肉四兩 胡椒二錢 肉桂二錢 母丁香二錢 硫黃(制)二錢 吳茱萸一錢

【制法】共研細粉，和入清膏藥肉內，攤紅布上，每張用膏藥肉一錢。

【劑量及用法】對臍孔貼之。

【禁忌】不可入口。

四、武漢

【功能與主治】嘔吐泄瀉，臍腹疼痛。

【處方】真麻油五斤 生天雄一斤 炮姜八兩 廣木香 香橼皮 小茴各四兩 黃丹三十兩 沒藥木二兩 肉桂木十二兩

臨攤時重加：

肉桂木五兩 母丁香一兩 倭硫黃三兩 生香附八兩 麝香二錢

【制法】取天雄、炮姜、廣木香、香橼皮、小茴五味，加麻油五斤，浸七日；入油鍋內，熬至藥枯黑為度，濾淨渣，再熬至滴水成珠；加炒黃丹三十兩，提攪至煙盡微冷，再加沒藥、肉桂木十二兩，入膏內攪勻成

膏，傾鉢內收貯，浸冷水中三日，煉化去火毒用。攤時重加肉桂五兩及母丁香、倭硫黃、生香附、麝香等研粉，每張加藥粉二厘，以紅布為元，每張重二錢。

【劑量及用法】貼于腰臍上。

【禁忌】孕婦忌用。

五、杭州

【功能與主治】治寒氣入里，腸胃受病，脘脹腹痛，大便泄瀉等症。能散寒通氣，溫通臟腑，無論老幼皆可貼之。

【處方】每方應靈膏藥肉一斤加：白胡椒四錢，肉桂八錢。

【制法】研末，調入藥肉攪勻，攤紅布上。

【劑量及用法】貼于臍上。

六、西安

【功能與主治】腸胃機能不振，消化不良，吞酸噯氣，腸胃虛寒，慢性腸炎，便秘腸鳴諸症。

【處方】母丁香 白胡椒各二錢 枳殼 綠豆粉各三錢 淡吳茱萸一錢

【制法】共研為極細末，加入太乙膏四兩溶化攪勻。

【劑量及用法】貼于臍上或臍附近。

七、蘭州(十香煖臍膏)

【功能與主治】鎮疼止瀉，去風散寒，健腸胃，煖肚。主受寒受冷，腹疼，腹脹，嘔吐酸水，瀉肚，兩脇膨脹，疝氣痞塊等症。

【處方】同天津。

【制法】用香油十五斤將藥炸枯去渣，加樟丹七、五兩收膏。再加肉桂面一兩二錢，丁香面一兩二錢，木香面一兩二錢，麝香一錢。

【劑量及用法】用火將膏溶化，貼在臍上。每張用兩星期。

【禁忌】孕婦忌貼。

八、大同(十香煖臍膏)

【功能與主治】溫煖下元，止久瀉。主少腹寒痛，婦女白帶。

【處方】元參 白芷 當歸 赤芍 大黃 生地 小茴 大茴 廣藿香 懷膝 續斷 杜仲 香附 烏藥各十兩

【制法】用香油十五斤煎熬前藥三斤枯黑，去滓熬煉至滴水成珠，入

章丹一百兩成膏，收入涼水內。再以每鍋兌入下列藥面一兩攪勻。

乳香 沒藥 木香 沉香 母丁香 肉桂各二兩 麝香三兩 共為細面兌入前膏。

【劑量及用法】貼臍臍、腰眼。

九、禹 縣

【功能與主治】肚腹寒疼，大便寒瀉。

【處方】母丁香 白胡椒各二錢 倭硫黃 綠豆粉各三錢 淡吳茱萸一錢

【制法】香油二兩章丹一兩五錢熬膏。前約為面加入膏內。

【劑量及用法】每貼一張，將膏藥放茶壺上煖開貼臍上。

【禁忌】火熱症忌用。

【備考】有效期二年。

十、濟南(十香煖臍膏)

【功能與主治】臍腹冷痛，泄瀉久痢等症。

【處方】當歸 小茴香 大茴香 白芷各四兩 乳香 沒藥 木香 沉香 母丁香 肉桂各二兩 麝香三錢

【制法】共為細粉，用香油十五斤，熬至滴水成珠，入黃丹一百兩攪勻成膏，每斤膏油，兌藥粉五錢。

【劑量及用法】微火化開，貼臍上。

【禁忌】忌食生冷。

十一、沈 陽

【功能與主治】化寒止痛，利小便，止瀉。主胃腸寒痛，大便久瀉，腹痛疝氣，面色青白。

【處方】同禹縣。

【制法】諸藥共研細面，和太乙膏四兩，以水燉化攪勻。

【劑量及用法】攤布貼臍部，大人小兒均可用。

【禁忌】孕婦忌用。

十二、沈 陽

【功能與主治】煖寒止痛，利水止瀉。主胃腸寒痛，大便久瀉，腹痛疝氣。

【處方】附子 天麻 小茴香 菟絲子 川芎各二兩 木香 川烏 草烏 干姜 白芷各一兩

【制法】用香油五斤和諸藥熬枯

去渣，再入黃丹攤時每二十兩入丁香，乳香面，沒藥面，肉桂各一錢，每貼一錢四分重(淨油)。

【劑量及用法】攤布貼臍部，大人小兒均可貼之。

【禁忌】孕婦忌用。

十三、撫順

【功能與主治】溫中散寒鎮痛。主瀉心腸鳴，虛滑久痢，痞塊癥瘕，小腸寒疝，舉丸腫痛，婦人血寒，白帶頻頻，久不孕育，腰腹疼痛，以及小兒腹痛，夏季大小便不調等症。

【處方】花椒一斤 貫筋半斤 鮮姜二斤半 生草烏 生川烏 三稜 整文朮各二兩 牙皂 桂楠 廣木香 母丁香各一兩 阿魏五錢 麝香一錢 生馬錢一兩

【制法】用香油十斤，樟丹五斤，共熬成膏，攤于布上。

【劑量及用法】貼臍部。

十四、吉林

【功能與主治】暖臟腑，去風寒。男人疝氣，婦女月經不調等症。

【處方】生川烏 生草烏 生川附 整干姜 川椒 透骨草 整防風 烏蛇 川羌活 邊桂 全蠍各一兩 三錢四分 虎骨 乳香 沒藥 血竭花各六錢七分 生馬錢二兩

【制法】用香油十斤六兩七錢，章丹四斤二兩，共熬成膏，攤于布上。

【劑量及用法】烤粘貼于患處。

十五、承德(十香暖臍膏)

【功能與主治】主臍腹冷痛，瀉泄久痢等症。

【處方】元參 白芷 當歸 赤芍 生地 小茴香 大茴香 茯苓 牛膝 川斷 杜仲 香附 烏藥各十兩(以上為第一宗)

乳香 沒藥 木香 沉香 母丁香 肉桂各二兩 麝香三錢

【制法】第一宗搗勻，每三斤用香油十五斤熬枯黑去渣，用鉄沙羅過淨渣子，再熬煉至滴水成珠，入黃丹一百兩攪勻，候溫再將第二宗共為細粉摻入三兩攪勻。

【劑量及用法】貼于臍部或臍之附近地位。

【禁忌】孕婦忌用。

十六、呼和浩特 (封臍暖肚膏，附：暖臍丸)

【處方】附子 官桂 干姜各四兩 葱白 老蒜各六兩 吳萸四兩

【制法】上藥用香油二十斤炸枯去渣，入黃丹二十兩收成膏。

【備考】暖臍丸：用肉桂六錢 良姜三錢 干姜 吳萸各五錢 藜蘆 丁香各三錢 石脂五錢 共為細面，蒜泥為丸，如綠豆大，雄黃為衣。

便血紅痢膏

撫 順

【功能與主治】便血，赤痢。

【處方】椿皮半斤 酸梨一斤 鮮姜二兩 紅糖四兩

【制法】先將椿皮多加水(約三斤水)熬剩一斤，去渣取汁，再將姜、梨搗汁去渣，將汁對在一起，放在鍋內熬開，再下紅糖成膏。

【劑量及用法】每日早晚各服一匙，開水沖服。

健胃丹

沈 陽

【功能與主治】健胃消食，調氣止痛。主胃脘脹痛，消化不良，嘔吐吞酸，噯氣脇痛。

【處方】豆蔻二錢 陳皮三錢 砂仁 香附 厚朴各二錢 公丁香一錢 白朮 白芍 龍胆草各三錢 黃芩二錢 茯苓三錢 三仙一兩 當歸一錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸。二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，食後一時許，開水送下。

【禁忌】魚肉，生冷物品。

化食丹

沈 陽

【功能與主治】健胃助消化。主胃弱消化不良，痞滿脹飽等症。

【處方】綠黑豆三斤 白朮一兩 厚朴二兩 茯苓 陳皮 枳櫚各二兩 枳殼一兩 制甘草五錢

【制法】先將黑豆蒸熟，晒干為面，再將群藥碾極細面，煉蜜為丸，

二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，早晚空心開水送下。

順 逆 丹

沈 陽

【功能與主治】健胃利尿。主霍亂轉筋，吐瀉不止，傷食停飲，胃腸失和，腹中絞痛，氣滯不舒。

【處方】白朮 茯苓 陳皮各一兩 厚朴五錢 澤瀉一兩 豬苓八錢 蒼朮一兩五錢 神曲五錢 麦芽七錢 砂仁五錢 木香二錢 甘草五錢 薏仁一兩 硃砂五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，紅糖水送下。

【禁忌】生冷食物。

胃 病 丹

北 京

【功能與主治】健胃化滯，理氣止嘔。主胃脘疼痛，脹滿吞酸，嘔吐惡心，倒飽噯氣。

【處方】檳榔 香附 枳殼 橘皮各一兩 砂仁五錢 六神曲 山楂各一兩 谷麦芽各二兩 枳梗 扁豆 厚朴各一兩 黃連五錢 瓜蒌二兩 雞肫皮一兩 萊菔子五錢 枳實一兩 山藥二兩 吳茱萸五錢 茯苓 黑郁金 礞石(煨) 甘草 澤瀉各一兩 檀香 木香 紫豆 薏仁各五錢 沉香一錢 於朮一兩 黃芩 半夏各一兩

【制法】共為細粉，水泛小丸，滑石為衣闔亮。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

健脾增力丹

大 同

【功能與主治】健脾開胃，利濕和中。

【處方】陳皮 厚朴 蒼朮 神曲 麦芽 山楂各一斤 甘草 黑豆各半斤

【制法】以上八味，共軋細末，煉蜜為丸。

【剂量及服法】每服三錢。

緩中丹

沈陽

【功能与主治】健胃整腸，散寒止痛。主四肢拘攣，腹中寒痛，身体厥冷，便唐久瀉，寒痢腹痛。

【处方】黑附子 白朮 干姜 肉桂 吳萸 川朴 陈皮 当归 党参各一兩 川椒五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸，二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，姜湯送下。

【禁忌】破物生冷。

神妙奇效丹

濟南

【功能与主治】久痢水瀉。

【处方】云苓 白朮各五兩 澤瀉 黃連各二兩 木香一兩 川朴二兩 米壳二兩 粉草二兩 白石脂八兩 滑石一斤 椿皮二斤 黃耆二兩 江米五兩 甘姜二兩 禹余糧八兩

【制法】共为細末，水泛为丸，綠豆大。

【剂量及用法】每服二錢，米湯送下。

【禁忌】羊肉燒酒，辛辣厚味等物。

瀉痢丹

禹縣

【功能与主治】久痢赤白，久瀉滑腸。

【处方】当归一斤 广木香一斤 六兩 訶子肉 酒白芍各一斤 黃連一斤四兩 茯苓一斤 於朮 吳茱萸各一斤四兩 石榴皮一斤半 板榔一斤 肉豆蔻十兩 甘草五兩 姜厚朴 砂仁各一斤

【制法】共为細面，水泛为丸，白石脂为衣，每包重七分。

【剂量及用法】每服一包，开水送下。小兒一岁一丸，七岁六丸。

【禁忌】初痢忌用。孕妇忌用。

【备考】有效期間二年。

紫砂丹

濟南

【功能与主治】胃口寒疼，时疼时止。

【处方】紫葳二兩 砂仁六兩 母丁香二錢 干姜 良姜 神曲各四兩

【制法】共为細末，煉蜜为丸，每丸重三錢，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，开水送下。

【禁忌】生冷。

胃痛丹

禹縣

【功能与主治】胃气疼，寒积腹痛。

【处方】广木香四錢 全蝎二錢 白胡椒 青皮 玄胡索 巴豆霜 硃砂各三錢

【制法】共为細面，水丸如豆大，硃砂为衣。

【剂量及用法】每服五粒，三岁服二粒，开水送服。

【禁忌】孕妇忌用。

【备考】有效期間二年。

来复丹

一、南京

【功能与主治】主内寒外热，中脘郁結，驟然嘔吐水瀉，剧烈腹痛，及痰飲喘促等症。

【处方】焰硝 硫黃各一兩（同入鍋內，以文火炒，炒至砂子狀为度，不用猛火以免伤药性） 青皮二兩 玄精石一兩 陈皮 五灵脂（用酒飞，去砂石）各二兩

【制法】上药照方法炮制后，共研細末，醋煮米糊为丸，每錢約做一百粒。

【剂量及用法】每服一至二錢，一日一次。食前以开水或米湯吞服。

二、福州

【功能与主治】治伏暑泄瀉，里寒外热，其效如神及治諸腹痛疝气，小兒惊風。

【处方】硝石（用硫黃为末，入磁碟內用極微火炒，以柳枝攪結砂子，

胃腸病类

火不可大恐伤药力，再研極細名二气末） 舶上硫黃各一兩 五灵脂（澄去砂） 橘紅 青皮各二兩（一方各二錢） 太陰玄精石一兩

【制法】上为末，醋糊丸，碗豆大。

【剂量及用法】每服三十丸，空心米飲下。伏暑悶乱紫苏湯下，大人疝气諸痛宜服之，小兒惊風欲絕研碎米湯下。

三、杭州（太乙来复丹）

【功能与主治】化积消痰，清理腸胃。治上盛下虛，内寒外热，伏暑霍乱，嘔吐泄瀉，腹痛肢厥，虛汗不止等症。

【处方】硝石 硫黃（入鍋內微火溫炒用柳木不断攪令成珠） 玄精石（水飞）各一兩 五灵脂（酒炒去砂） 青皮 广木皮各二兩

【制法】研为細末，醋煮米糊为丸。

【剂量及用法】每服一至五十丸，米飲湯或开水送下。

附参考古方

【来源】太平惠民和剂局方。（正一丹）

【功能与主治】此药配类二气，均調陰阳，夺天地冲和之气，乃水火既济之方，可冷可热，可緩可急，善治榮衛不交养，心腎不升降，上实下虛，气閉痰嗽，心腹冷痛，藏腑虛滑，不問男女老幼，危急之証，但有胃气，無不获安，补損扶虛，救陰助阳，为效殊胜。

【处方】硝石（同硫黃，并为細末，入定鍋內，以微火微炒，用木篋子不住手攪，令陰阳气相入，不可火太过，恐药力竭。再研細，名二气末） 太陰玄精石（研水飞）各一兩 五灵脂（須擇五台山者，水澄去砂石，日干研） 陈皮（去白） 青皮（去白）各二兩 硫黃（舶上透明者）一兩

【制法】上用五灵脂、二橘皮为細末，次入玄精石末，及前二药末拌勻，以好醋打糊为圓如豌豆大。

【剂量及用法】每服三十粒，空心粥飲下。甚者五十粒，小兒三、五粒，新生嬰兒一粒。小兒慢惊風，或吐利不止，变成虛風，搖擻者，非風也，胃气欲絕故也，用五粒研碎，米飲送下。老人伏暑迷悶，紫苏湯下。

如人产后血逆，上搶悶絕，並惡露不止，及赤白帶下，並用醋湯下。常服和陰陽，益精神，散腰腎陰濕，止腹脇冷疼，一切諸疾，不辨陰陽者，並宜服之。

香砂正胃丹

一、沈 陽

【功能与主治】健胃消食。主四时不正之气，山嵐瘴癘之毒，宿食不消，胸膈痞滿，停食停水，郁結腹痛等症。

【处方】藿香三錢 甘草 香附 橘紅各一兩 蘇叶四錢 厚朴 桔梗 神曲炭 山楂各一兩 砂仁六錢 赤茯苓 半夏各一兩 扁豆六錢 枳殼 蒼朮各一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，姜水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、撫 順

【处方】藿香三錢 香薷 蘇叶各五錢 陳皮 白朮 赤苓 苦梗各二錢 白芷 川朴 半夏 木通 猪苓各二錢 砂仁 扁豆各二錢 澤瀉 粉草各二錢 焦山楂三錢

【制法】為細面，蜜丸一錢大。

痢疾奇妙丹

禹 縣

【功能与主治】紅白痢疾，小腹痛，里急後重，下墜脫肛。

【处方】檳榔一兩六錢 川黃連二兩四錢 車前子二兩 地榆 白芍 白茯苓 全當歸各一兩六錢 甘草八錢 黃柏二兩四錢 萊菔子 猪苓 陳皮 枳殼各一兩六錢 廣木香四兩 南山楂一兩二錢 槐花一兩六錢 吳茱萸 訶子 黃芩各二兩 川厚朴二兩四錢 升麻一兩六錢

【制法】共碾為細面，水送丸，如豌豆大。

【劑量及用法】每服一包，每日二次（每包二十四粒）。滿十歲者服半包。

【禁忌】孕婦忌服。

【備考】有效期一年。

止痢急救丹

濟 南

【功能与主治】紅白痢疾，久瀉不止，里急後重，肚腹疼痛。

【处方】上沉香三錢 丁香 木香 黃連各二錢 冰片四分 海金砂二錢 硃砂五分 米壳五錢 牛黃 麝香各一分

【制法】共為細末，煉蜜為丸，每丸重三分，赤金為衣。

【劑量及用法】每服一丸，小兒減半。紅痢黃芩、姜連湯送下，白痢姜湯送下，脫肛滑瀉牡蠣湯送下。

【禁忌】孕婦忌服。

久 痢 丹

天 津

【功能与主治】健脾開胃，消滯化滯。主久痢，腹疼腹脹，里急後重，不思飲食，四肢無力，身體疲乏。

【处方】椿皮（醋炒）十斤 廣木香 黃連 白朮（數炒） 茯苓（去皮） 枳殼（數炒） 甘草各八兩 當歸尾一斤 野黨參（去蘆）八兩 厚朴（姜制）一斤 鴉胆子仁一兩

【制法】共為細粉，涼開水泛小丸。每斤丸藥用滑石粉三兩，桃膠二錢化水七衣，二錢五分重裝袋。

【劑量及用法】每服一袋，小米湯送下，開水亦可。

【禁忌】生冷油膩食物。

屠 蘇 酒

吉 林

【功能与主治】嘔吐不消化。

【处方】厚朴 桔梗 防風 桂枝 茅朮 貢朮 川烏 白芷各二錢七分 川軍 白皮各二錢四分 檀香 紫豆蔻 川椒 藿香各二錢 靈仙 甘草各一錢七分。

【制法】用白酒十斤六兩七錢，冰糖一斤七錢，將以上藥品泡好熬用。裝入玻璃瓶內，密封其口，或貯于瓷壇中。

【劑量及用法】早晚二次服用，每服二、三杯。

附參考古方

【來源】沈氏尊生書。（屠蘇飲）

【功能与主治】預防外感瘟疫。

【处方】白朮兩八錢 大黃 桔梗 川椒 肉桂各兩半 虎杖根兩二錢 川烏六錢

【制法】共剉盛絳囊，十二月晦沉井中，正月朔日早取藥，入一瓶清酒中煎數沸，東向飲之，從少至老飲一杯，其餘還沉井中取水飲之。

白玉露（白玉霜藥酒）

吉林、哈爾濱

【功能与主治】開胃順氣去寒，助消化，進飲食，悅容顏。主中氣虛損，寒郁氣滯，元陽虧耗，身體衰弱，胃脾膨滿等症。

【处方】當歸一兩 肉桂八錢 廣皮一兩 凌零香五錢 排草五錢 木香二錢 公丁香二錢 佛手六錢 白酒三十斤 冰糖五斤

【制法】將當歸、肉桂、廣皮、凌零香、排草、木香、公丁香、佛手，七味置于布袋中，浸白酒內，文火煮之，約一小時后再加入冰糖即成。

【劑量及用法】凡患上治病症者，每于飯前飯後服一、二杯。

【禁忌】孕婦忌服。

甘 露 茶

一、南京、廣州

【功能与主治】主感冒停滯，腹脹胸悶等症。

【处方】陳皮（鹽水洗）四兩 台烏藥八錢 谷芽（炒）一兩 川厚朴八錢 神曲一兩五錢 枳殼 炒山楂各八錢 陳茶葉一兩

【制法】共研為粗末，每三錢用紙袋包裝。

【劑量及用法】每服三錢，加鮮生姜一斤煎服，或開水泡服。

二、南 昌

【功能与主治】感冒時氣，頭痛腹脹，不服水土。

【处方】同南京，僅炒山楂用一兩。

【制法】共切碎拌勻。

【劑量及用法】每服二錢至三錢，用生姜一片同煎服。

【禁忌】生冷油膩等物。

六 神 麵

一、上 海

【功能与主治】胸悶作嘔，傷食腹脹。

【处方】鮮辣蓼草四十斤 赤豆二十斤 杏仁(去皮尖)十五斤 鮮青蒿四十斤 鮮蒼耳草二十斤 麥粉二百五十斤 麩皮四百五十斤

【制法】以鮮辣蓼草、鮮蒼耳草、鮮青蒿打汁。再將赤豆、杏仁煮爛，和入麥粉、麩皮內打和成麵。

【劑量及用法】每次三錢，包煎服湯。

二、武汉(陈麵、神麵)

【功能与主治】胃弱積滯，腹脹滿。

【处方】鮮青蒿 鮮蒼耳草 鮮辣蓼草各十斤 紅豆蔻十二兩 苦杏仁泥二十兩 面粉二十斤 赤小豆十二兩 麩皮四十斤

【制法】先取三味鮮草，加水五倍，煮沸四小時，去渣濃縮，約四十斤；調和藥粉、面、麩成麵五七斤半。用稻草蓋好，發酵一星期後，待生綠衣為度。

【劑量及用法】每服二至三錢，或遵醫囑。

【禁忌】孕婦慎服。

三、沙 市

【功能与主治】治宿食積滯，胸膈痞滿及傷食瀉痢等症。

【处方】鮮蓼草 鮮青蒿 鮮蒼耳草各十斤 赤小豆 杏仁各一斤 小麦麩一百斤 麵粉五十斤

【制法】于三伏日先將以上三味鮮草洗淨，切碎，用冷開水泡汁，再加杏仁、赤小豆末、麥麩、麵粉和勻，用布包成小塊，再用稻草包裹，待生黃衣，晒干收貯。

【劑量及用法】每服三錢，水煎去渣溫服，或加入適宜之湯藥，丸散中用之。

【禁忌】脾虛胃弱而無積滯者忌服。

四、重庆(神麵)

【功能与主治】行氣化痰，消食調中，健脾開胃。

【处方】麥麩皮一百斤 赤小豆

杏仁各九斤 鮮青蒿 鮮蓼草 鮮蒼耳草

【制法】杏仁、赤小豆研細末，同麥麩和勻。用鮮蓼草、青蒿、蒼耳草三種自然汁合作餅，楮葉或荷葉蓋定置木架上，待發酵生黃衣後，晒干貯藏備用。

【劑量及用法】二錢至三錢。

【禁忌】脾虛、胃火盛不能服；孕婦宜少用。

五、昆 明

【功能与主治】食積肚痛，嘔吐腹瀉。

【处方】青蒿 蓼草 蒼耳草 苦杏仁各五斤 紅豆蔻 飯豆各二斤半

【制法】研末為麵。

【劑量及用法】每服三錢，幼童減半，炒黃以開水煎服。

【禁忌】不易消化食物。

六、禹 县

【功能与主治】消食化滯，解表寬中。

【处方】青蒿 蒼耳子 赤小豆 杏仁 野蓼各五斤 白面七十四斤 小軸一斤

【制法】共為粗末，以面和藥，放麥糠內，七天取出晒干。

【劑量及用法】每服二錢，小兒每服一錢，炒過後用。

【禁忌】孕婦忌用。

【備考】有效期二年。

七、撫順(神麵，附：半夏麵)

【处方】白面百斤 杏仁 赤豆各九斤 青蒿 蒼耳 蓼實

【制法】將杏仁、赤豆為粗面，入面內拌勻。次用青蒿、蒼耳、蓼實三藥，煎水和面內揉成軸，蘇葉包裹。

【備考】半夏麵之制法，用半夏去杏仁，照前一樣。

八、吉 林

【功能与主治】化水穀，健脾緩胃。主食積停水，食熱脹滿，婦人血滯胎動，小兒積滯腹堅等症。

【处方】杏仁五兩 赤小豆四兩 白面 蒼耳 野蓼 青蒿各五斤

【制法】于每年六月六日，選擇新鮮蒼耳、野紅蓼、青蒿各五斤，俱取自然汁，或切碎，以淨水煎汁，調

以上三味面藥，調成長方扁磚狀，外用鮮麻葉裹之，懸過風處，經過一年後再用，方能有效。

消食万应麵

禹 县

【功能与主治】寬胸利氣，消食消脹。

【处方】山查 陳皮各五斤 大麥芽 檳榔各三斤 枳實二斤 厚朴一斤 小麦麵一百斤

【制法】共為細末，和面為塊。

【劑量及用法】每服三錢，小兒每服一錢。熬水飲之。

【禁忌】孕婦忌用。

【備考】有效期間一年。

沉香百消麵

福 州

【功能与主治】味苦，氣辛，性微溫。寬胸開膈，調胃健脾。

【处方】靈脂 香附各一兩六錢 黑丑 白丑各二錢 沉香一錢

【制法】共研細末，糊為麵，每塊一錢。

健 脾 膏

一、南 昌

【功能与主治】胃腸虛弱，消化不良，食少體倦，發育不良，易患吐瀉。

【处方】黨參三兩 淮山藥 芡實 云苓 扁豆 蓮子各六兩 廣陳皮一兩五錢 使君子六兩 糯米三升 粳米七升 苡米六兩 白朮二兩

【制法】各藥微炒香研細末，另將糯米、粳米各蒸熟晒干後炒爆，磨成細粉，與各藥和勻，加白糖十五斤(如嫌糖量重可酌減以適量為準)用模印成塊，干。

【劑量及用法】小兒視年齡適量服之。營養不良者可常服。

二、重 庆

【功能与主治】健脾開胃，進食生肌，調氣養血，潤顏壯神。

【处方】上粉沙參八兩 冬瓜仁十六兩 芡實十二兩 橘皮 蓮米 糖子肉 云茯苓 山楂各四兩 雷丸二兩 白合四兩 山藥八兩 苡

仁四兩 建神柚 麦芽 谷芽 鷄
內金各一兩

【制法】共碾細末，每淨藥粉二斤，另加糯米粉十五斤，白糖二十斤，開水少許打成塊。

【劑量及用法】每服二、四片，小孩一、二片。

健 脾 粉

武 漢

【功能與主治】脾虛不食，面黃肌瘦，積滯脹滿，腹瀉腹痛。

【處方】黨參一兩半 陳柚 砂仁 陳皮 麦芽各一兩 炒白朮二兩半 木香(研) 黃連(酒炒) 甘草各七錢半 白茯苓二兩 山楂 山藥 肉豆蔻(麩裏煨去油)各一兩

【制法】混合碾細，成淨粉85—90%即得。

【劑量及用法】每服二錢，空腹開水湯下，兒童酌減。

胃 潰 瘍 粉

天 津

【功能與主治】解酸止痛，促進潰瘍面愈合。主治胃及十二指腸潰瘍，飯後燒心噯心，或胸腹膨脹，有患數年至十餘年者，有時怕冷，或著氣即犯，疼痛難忍，重則后背及兩脇牽引作痛，大便色黑，及因胃潰瘍而嘔血。

【處方】浙貝母粉一兩五錢 烏賊骨粉(去壳)八兩五錢

【制法】將浙貝母用水洗淨晒干，與烏賊骨研細和勻，酌加少許丁香香油或橘皮油，作調味劑。

【劑量及用法】每服一錢，日服三次，溫開水送服。如為十二指腸潰瘍，可酌加用量，每服二至三錢。

蜜 煎 導

福 州

【處方及制法】蜜一杯，于銅器內微火煎凝如飴狀，取紙撚作挺子，以線紮之，外以蜜厚包之，如指許，長二寸。

【劑量及用法】微熱納谷道中，以手急抱，欲大便時乃去之。時法蘸些皂角末。

糊 藥

昆 明

【功能與主治】消化不良，停食反胃，胸腹脹滿，大便微結。

【處方】蒼朮 陳皮各八兩 甘草四兩 厚朴八兩 鷄內金二兩 紅糖 酒藥 焦棗各八兩 麦芽 糊飯 糯米 麥餅各一斤 草果四兩 神曲八兩 板榔 枳實各一斤

【制法】研末。

【劑量及用法】每服二錢半，幼童減半，開水送服。

【禁忌】泄瀉及胃酸不足勿服。

血 症 類

十 灰 丸

一、南 京

【功能與主治】主吐血，衄血，血崩，及一切出血症。

【處方】黃柏 絲棉 藕節 馬尾 井介 松樹皮 蓮房 斬艾叶 陳棕 血各一兩

【制法】分別燒灰存性，研為細末，用清米湯泛丸，每錢約五十粒。

【劑量及用法】每服二錢，溫開水吞服。

二、武 漢

【功能與主治】主吐血，衄血，瀉血，便血及各種出血病症。

【處方】大蓼炭 側柏炭 茅根炭 大黃炭 茜草炭 山梔炭 小蓼炭 陳棕根炭 丹皮炭各一兩 艾叶炭五錢

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用淨水達成小丸，每錢不得少於四粒。

【劑量及用法】每服二錢至四錢，溫開水送下。

三、杭州(血症十灰丸)

【功能與主治】治男婦血不循經，吐血，衄血，血崩，及一切血出不止等症。

【處方】大蓼草 小蓼草 粉丹皮 白茅根 茜草根 側柏叶 山梔 陳棕 蒲黃 大黃各四兩

【制法】各炒炭研細，藕汁和水泛丸。

【劑量及用法】每服三錢。開水

送下。

四、重 慶

【功能與主治】治吐血，衄血，血崩及一切血出不止。

【處方】大蓼 小蓼 牡丹皮 茅根 茜草 薄荷 側柏 山梔 棕櫚皮 絲棉各一兩

【制法】各藥炒為炭，保存性研細藕汁泛丸，紙盒包裝。

【劑量及用法】二錢。

附參考古方

【來源】女科証治准繩。

【功能與主治】治崩中下血不止。

【處方】大黃灰 黃絹灰 馬尾灰 艾叶灰 藕節灰 蓮房灰 油髮灰 赤松皮灰 棕櫚灰 蒲黃灰 各等分

【制法】上研勻，用醋煮糯米糊和丸，如梧子大。

【劑量及用法】每服七十九，加至一百丸，空心米飲送下。

荷 叶 丸

一、北京、承德

【功能與主治】清熱止血。主吐血，咯血，衄血，瀉血。

【處方】荷葉一百六十兩(酒蒸一半，炒炭一半) 藕節三十兩 生地(煨炭) 白茅根(炒炭) 玄參(去蘆) 大小蓼(炒炭) 棕櫚炭各四十八兩 白芍 知母 梔子(炒焦) 黃芩炭各三十二兩 當歸十六兩(炒炭) 香墨四兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重二錢。

【劑量及用法】每服二丸，日服三次，溫開水送下。

二、天 津

【功能與主治】清熱、化瘀、止血。主吐血、咯血、衄血，便血，咳嗽，痰中帶血。

【處方】鮮荷葉五斤 生地炭 茅根各一兩五錢 側柏炭二兩五錢 梔子炭一兩五錢 蒲黃炭 大蓼 小蓼 川牛膝 槐花炭各一兩 二仙膠六錢 生紫菀一兩 仙鶴草二兩 旱三七一兩

【制法】將方內鮮荷葉用清水洗淨，放入籠內蒸透晒干，再用黃酒二

斤八兩浸勻，裝入罐內(或不生鏽的桶)，罐口封固，隔水煮至酒盡為度。倒出晒干，再和羣藥，共為細粉，煉蜜為丸，二錢重，蠟皮或蠟紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】服藥期間忌房事及忌食辛辣之物。

三、南 京

【功能與主治】主吐血，咯血，衄血，崩血。

【處方】荷葉一斤(用黃酒八兩，以酒之一半噴于荷葉上，然後炒炭，再以酒之一半蒸荷葉) 入生地四兩八錢 白芍二兩二錢 西當歸一兩六錢 玄參四兩八錢 肥知母二兩二錢

【制法】將荷葉用黃酒制後，共研細末，煉老白蜜為大丸，每粒一錢重，外用蠟紙包裝。

【劑量及用法】每服一丸，一日服一次或二次，用溫開水和服。

四、蘭 州

【功能與主治】散瘀血，止咳嗽。主吐血，咯血，衄血，便血，白帶及四肢浮腫。

【處方】同天津。

【制法】鮮荷葉，籠屉蒸一次，晒干再用黃酒十五斤浸透，用履九蒸。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】外感咳嗽忌服。

五、大同(加料荷葉丸)

【功能與主治】吐血衄血，痰中帶血。

【處方】荷葉炭三斤 白芍二兩四錢 白芍一兩六錢 川芎五錢 生地十二兩 赤芍一兩六錢 梅片四兩五錢 犀角 羚羊各四錢五分 旱三七四兩五錢

【制法】共為細麵，煉蜜為丸，二錢重，金箔十六片為衣，蠟皮封固。

【劑量及用法】每服二丸，常服者一丸，白開水送下。

六、濟 南

【功能與主治】主吐血，咯血，鼻衄，便血。

【處方】荷葉五斤 牛膝八錢 槐花八錢 生地二兩 白茅根一兩五錢 側柏炭一兩五錢 黑梔子一兩五錢 炒阿膠二兩 紫菀一兩 小蘗一兩 蒲黃炭一兩 三七八錢 血余炭八錢 大蘗一兩

【制法】共為細末，煉蜜為丸，重二錢。

【劑量及用法】每服二丸，白開水送下。

【禁忌】忌油膩辛辣等食物。

七、青 島

【處方】鮮荷葉六十枚 大生地(炒)二兩 茅根 黑梔子 側柏叶各一兩五錢 紫菀 蒲黃炭 阿膠珠各一兩 大小蘗二兩

【制法】用老黃酒十斤，先將荷葉用籠屉蒸過，取出晒干，蘸酒再蒸，此法共九蒸九晒，晒干軋面，再和余藥共軋細麵，煉蜜為丸。

八、呼和浩特

(叶灵神丹)

【處方】荷葉炭拾斤 生地 杭芍 川芎 白芍各四兩

【制法】共為細麵，蜜大丸，重二錢五分。

四 生 丸

福 州

【功能與主治】治吐血，衄血。陽乘于陰，血熱妄行，宜服此藥。

【處方】生荷葉 生艾葉 生側柏叶 生地黄等分

【制法】上搗爛如鷄子丸。

【劑量及用法】每服一丸，水二盞，煎一盞，濾去渣服。

【備考】內熱暴患者宜用，若病人本元不足，須健脾以資化源，不宜用此丸。

归芍理中丸

昆 明

【功能與主治】主治吐血鼻衄腸紅，兼能安胎止盜汗。

【處方】潞黨參五兩 漂於朮四兩 炮姜三兩 炙草二兩 當歸五兩 炒杭芍三兩

【制法】研末煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服一丸。開水

送下。

【禁忌】忌生冷。

奉 賢 丸

武 漢

【功能與主治】主咳嗽吐血，便血，血崩。

【處方】仙鶴草 荷葉炭 陳棕炭各二兩 川貝母 化橘紅 茅根炭 當歸炭 旱三七 白芨 蓮蓬炭各一兩 膠皮膠 生地炭各一兩 側柏炭 槐花炭 萬草炭 陳蜜 蒲黃炭 山梔炭 甘草炭各一兩

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜150—160%，和成大丸，每丸重四錢，蠟壳封固。

【劑量及用法】每服半丸至一丸，每日一次。

止 血 丸

沈 陽

【功能與主治】化瘀止血。主腸風便血，大便下血，勞傷便血，便前便後帶血，紅白痢疾，肚腹疼痛。

【處方】椿皮二兩 旱三七一兩五錢

【制法】共碾極細麵，陳醋泛為小丸。

【劑量及用法】每服一錢，早晚各服一次，小米湯送下。

【禁忌】辣物厚味等。

神效止血丸

呼 和 浩 特

【處方】貫眾炭一兩 棕炭 土牛黃膠 杭芍 萬草 大小蘗 生地各五錢 元參 川貝各六錢 冬六錢 生地榆 焦梔各五錢 七厘 橘紅四錢 甘草五錢 大棗炭五錢(去核) 每料兌：三七 犀角 當歸各五錢 欽落花八錢

【制法】共為細麵，蜜大丸，重二錢，蠟皮。

腸 紅 丸

上 海

【功能與主治】主痔瘡，便血。

【處方】黃連 白草霜 烏梅各一兩

【制法】先將烏梅蒸爛去核，加余藥打和焙干，共研細粉，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，溫開水送服。

止紅腸澀丸

一、北 京

【功能與主治】清熱散風，止血止痛。主腸風便血，痔瘡下血，肛門腫痛。

【處方】生地(炭) 當歸 黃芩各九十六兩 地榆炭 梔子各八十四兩 白芍七十二兩 升麻二兩 槐花六十三兩六錢 側柏炭六十四兩 烏梅四兩 阿膠(蛤粉炒) 荆芥穗各六十四兩 黃連二十四兩

【制法】共為細粉，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服一錢，白開水送下。

二、大 同

【功能與主治】內外漏瘡下血等。

【處方】槐花 陳皮 椿皮 一條 芩 連翹 芥穗 蒼朮 阿膠 姜炭 側柏炭 厚朴 當歸 地榆各半斤 升麻一斤 棕炭一斤 甘草十兩

【制法】共為細麵，蜜為小丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

斷紅腸澀丸

天 津

【功能與主治】清熱，除濕，止血。主痔瘡漏瘡，肛門腫痛，大便出血。

【處方】生地炭 當歸 黃芩各六斤 地榆炭 生梔子各五斤四兩 生白芍四斤八兩 升麻三兩 炒槐花二斤十五兩 側柏炭四斤 烏梅四兩 生阿膠 芥穗各四斤 黃連一斤八兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

濟生烏梅丸

福 州

【功能與主治】治大便下血如神。

【處方】殭蠶(炒)一兩 烏梅肉一兩半。

【制法】共為末，醋糊丸，桐子大。

【劑量及用法】每服四、五十丸，空心醋湯下。

十 灰 散

一、天 津

【功能與主治】止咳嗽吐血。主因勞傷暴怒而致吐血，咯血，嘔血，嗽血，衄血。

【處方】大黃炭 大蘗炭 小蘗炭 側柏炭 梔子炭 荷葉炭 棕板炭 茜草炭 茅根炭 丹皮炭各二斤八兩

【制法】共研細粉。

【劑量及用法】每次服三錢，白開水送下。

二、福 州

【處方】同天津。分量用等分。

【制法】上藥燒灰存性，研極細末，用紙包，碗蓋于地上一夕出火毒。

【劑量及用法】用時先將白藕搗汁或蘿蔔汁，磨京墨半碗調服五錢。輕吐吐血，服之立止。

三、南 昌

【功能與主治】主吐血，咳血，便血，溺血，衄血，如人崩漏。

【處方】人蘗 山梔 小蘗 白茅根 丹皮 大黃 薄荷 茜草 棕皮 側柏葉各二兩

【制法】各藥燒灰，紙裹蓋地上一宿出火毒，研為細末。

【劑量及用法】每服二至三錢，空腹以童便、藕汁、蘿蔔汁、京墨半盅調下。

【禁忌】虛寒出血者忌服，忌烟、酒、辛熱食物。

四、重 慶

【功能與主治】治虛癆肺損，吐血，咯血。

【處方】同南昌。分量各用一兩。

【制法】各藥炒存性，細末，磁瓶裝。

【劑量及用法】三錢至五錢。

五、蘭 州

【功能與主治】同天津，處方亦同。

【制法】以上均炒存性，共研細末。

【劑量及用法】每服三錢或四錢，白開水送下。

六、西安、呼和浩特

(止血十灰散)

【功能與主治】治吐血，咯血等症。

【處方】大蘗 側柏 荷葉 茅根 茜草 梔子 丹皮 棕皮 熟軍 生地各等份

【制法】燒灰存性，研極細末，用紙包以碗蓋于地上一夕出火毒，封存勿洩氣。

【劑量及用法】先搗藕汁或蘿蔔汁半碗食后調服五錢，血不止者續服五錢。

七、濟 南

【功能與主治】治吐血，嗽血，便血，溺血。

【處方】同天津。分量各用三錢。

【制法】上藥各燒灰存性，研極細末，瓷瓶收貯。

【劑量及用法】每服三錢，空心白藕汁或白開水送下。

【禁忌】忌辛辣油膩等食物。

八、青 島

【處方】大小蘗 側柏葉 茅根 丹皮 棕炭 生地 熟軍各四兩 茜草 梔子 荷葉各二兩

【制法】將前藥炒黑為度，研面。

附參考古方

【來源】1. 六科准繩。

【功能與主治】治下血不止。

【處方】大黃 木賊 棕櫚 柏葉 艾葉 干漆 鱗魚鱗 鯉魚鱗 血余 當歸(以上逐味火化存性) 各等分研末 麝香少許(研)

【制法】上研勻。

【劑量及用法】每服二錢，空心溫酒調下。

2. 張氏醫通

【功能与主治】治虛勞吐血咯血，先用此遏之。

【处方】人薊 小薊 柏叶 薄荷 茜根 茅根 山梔 大黃 牡丹皮 棕櫚皮等分。

【制法】各燒灰存性，紙裹蓋地上一夕。

【剂量及用法】食遠服二、三錢。童便調下。

花蕊石散

福州

【功能与主治】治五臟崩損，湧噴血成升者用此止之。

【处方与制法】花蕊石，火煅存性，研為末。

止血散

大同

【功能与主治】主失血，吐血，衄血，血崩，及一切出血症。

【处方】蓬蓬壳 黃絹 血余 百草霜 棕櫚皮各一兩

【制法】將各藥燒存性，共研極細面。

【剂量及用法】每服三錢，白水送服。

附参考古方

【来源】沈氏尊生書，杂病源流犀燭。

【功能与主治】治跌仆閃挫，皮肉出血。

【处方及用法】血竭末一味搽之。

【备考】一方有白膠香、松香、白芷末。金瘡血不止，黃丹、白矾末搽。

地榆散

沈陽

【功能与主治】整腸止痢。主下痢膿血，日久不癒已成坏症，色如爛瓜瓢及便血等症。

【处方】地榆七錢 當歸 白芍各一兩 黃芩 梔子炭 薤白各五錢 黃連 犀角各四錢

【制法】用藥一料為面，再用藥一料煎水為膏，再晒干，共碾極細面，貯瓶待用。

【剂量及用法】每服二錢，開白水送下，每日早晚二服。

【禁忌】辣腥硬物。

附参考古方

【来源】沈氏尊生書，杂病源流犀燭。

【功能及主治】主腸風。

【处方】地榆 卷柏各五錢

【制法】砂瓶煮十余沸。

【剂量及用法】溫服。

四紅丹

一、蘭州

【功能与主治】止血。主吐血，衄血，咯血，尿血，便血，腸出血，胃潰瘍出血，子宮、膀胱等出血。

【处方】熟軍炭 當歸炭 槐花炭 蒲黃炭 阿膠(炒) 荷葉炭各八兩

【制法】共研細面，蜜丸三錢重，珠砂為衣，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，日服二次，白開水送下。

二、大同

【功能与主治】主便血，鼻衄，吐血，子宮出血。

【处方】大黃 當歸 槐花 阿膠 蒲黃各一斤

【制法】以上均要炒黑，共軋細面，蜜為一錢丸。

【剂量及用法】每服三錢，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、濟南

【功能与主治】主吐血，衄血，便血。

【处方】當歸(生、炭各半) 地榆炭 大黃(生、炭各半) 槐花炭(存性)各十斤

【制法】共軋細面，煉蜜為大丸，重三錢。

【剂量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】忌辛辣等有刺激性之食物。

四、青島

【功能与主治】治下血。

【处方】當歸(炒黑) 槐花(炒黑) 蒲黃(炒黑) 熟軍(炒黑) 阿膠珠各二兩

【制法】以上共軋細面，煉蜜為

丸。

五、沈陽

【功能与主治】消瘀化滯，調經理血，主婦人經血淋漓，崩漏下血，大便下血，小便尿血，各種血症。

【处方】大黃 紅花 芥穗 香附 槐花 當歸 阿膠各二兩

【制法】諸藥俱用黃酒炒黑，共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【剂量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】忌食辛辣及有刺激性之物。

六、呼和浩特

(止血四紅丹)

【处方】同大同。分量各二斤。

【制法】共為細面，蜜大丸，重三錢。

八寶治紅丹

一、北京、濟南

【功能与主治】清熱止血。主吐血，咯血，衄血，唾血。

【处方】荷葉一百六十兩 石斛四十八兩 大小薊 香墨 甘草 白芍各三十二兩 丹皮 藕節 側柏炭 黃芩 百合 梔子(炒焦) 橘皮各六十四兩 棕櫚炭十六兩 貝母二十四兩 生地 竹茹各四十兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重三錢。

【剂量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌食辛辣之物。

二、天津

【功能与主治】清熱化瘀止血。主吐血，咯血，衄血，唾血，痰中帶血，胸中積血，兩肋刺疼，陰虛咳嗽。

【处方】鐵樹叶二斤 鮮荷葉十斤 側柏叶四斤 大薊二斤 生地炭 荷葉炭各四斤 棕櫚炭一斤 橘絡二斤八兩 石斛二斤 甘草二斤 廣陳皮 丹皮各四斤 生地二斤八兩 浙貝母一斤八兩 黃芩 百合各四斤 木通 香墨各二斤

【制法】用以上鮮荷葉同群藥串碎晒干，共為細粉，煉蜜為丸三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，白开水送下。

三、沈 陽

【功能与主治】清心平肝，理肺止血。主治吐血，衄血，咯血，肺热咳嗽，痰中帶血。

【处方】荷叶一斤 石斛四兩 百合二兩 側柏六兩 大小蓟二兩 丹皮六兩 橘絡四兩 黃芩六兩 浙貝二兩 陈皮六兩 藕节二兩 甘草二兩 生地炭四兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，一錢重，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，開白水送下。

【禁忌】辛辣厚味椒酒等物。

止 血 丹

撫 順

【处方】川軍炭 槐花炭 蒲黃炭 當歸炭 阿膠炭各二兩。

【制法】共為細面，蜜丸三錢大。

止血化痰丹

沈 陽

【功能与主治】止血，清熱，化痰。主治吐血，衄血，咯血，咳血，痰中帶血，便血，尿血，及一切由氣火刺激而生之血症。

【处方】生地五錢 黃連二七 降香 赤芍 大黃各二錢 紅花二錢 當歸五錢 丹皮三錢 黃芩 蒲黃 郁金 甘草 阿膠各二錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】忌一切辛辣動火之食物，孕婦忌服。

止血秘紅丹

沈 陽

【功能与主治】鎮逆止血。主肝逆吐血，胃逆吐血，痰中帶血，肋痛咯血，大口咳血，咳吐血絲，血色紫黑，鼻衄噴血，傷力吐血，心悸喘促，崩中下血。

【处方】益沉一兩 生赭石二兩

大黃一兩 牛鉄末二兩 肉桂五錢 旱三七一兩

【制法】共碾極細面，用白蜡四兩，核桃肉（去皮搗碎）二兩，溶化成汁，合藥為小丸。

【剂量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】忌食辛辣腥物及鷄肉等；忌怒氣。

蚕豆花露

上 海

【功能与主治】主鼻衄，咯血（作為輔助飲料）。

【处方】蚕豆花六十兩

【制法】用蒸氣蒸溜方法成露四百兩。

【剂量及用法】每次服二兩至四兩。

鮮生地露

上 海

【功能与主治】主咯血，鼻衄（作為輔助飲料）。

【处方】鮮生地八十兩

【制法】將鮮生地切成小片，用蒸氣蒸溜方法成露四百兩。

【剂量及用法】每次服二兩至四兩。

八宝止血藥墨

沈 陽

【功能与主治】清熱，鎮靜，止血。主治吐血，衄血，大小便血，急怒暴熱，驟然吐血。

【处方】墨面一斤二兩 紅花 冰片各三錢 麝香一錢 熊胆四錢 冰糖一兩 阿膠一兩六錢

【制法】共碾極細面，万杵為陀。

【剂量及用法】每服一錢四分，開白水送下。

【禁忌】忌食有刺激性之食物，孕婦忌服。

腫脹淋濁类

舟 車 丸

一、北京、上海、沈陽

【功能与主治】行氣利水。主停

水腹脹，四肢浮腫，小便短少。

【处方】黑牽牛四兩（炒） 大黃二兩 甘遂（醋制） 紅芽大戟（醋制） 芫花（醋制） 青皮 橘皮各一兩 木香 枳殼各五錢 輕粉一錢（另研）

【制法】共為細粉，水泛小丸，滑石為衣闌亮。

【剂量及用法】每服一錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌食鹽醬百日；孕婦忌服。

二、天 津

【功能与主治】行氣利水。主蓄水腹脹，四肢浮腫，胸腹脹滿，停食喘急，大便秘結，小便短少。

【处方】甘遂（醋制） 芫花（醋制）各一兩 炒黑丑四兩 大黃二兩 廣木香五錢 青皮（醋炒） 陈皮 紅大戟（醋制）各一兩 共為細粉兌入；輕粉一錢

【制法】以上研細和勻，涼開水泛小丸，一錢重裝袋。

【剂量及用法】每次服一袋，白開水送下。

【禁忌】孕婦及身弱者忌服，勿與甘草同服。

三、武汉（舟車神佑丸）

【功能与主治】水血積聚，腹大脹滿等症。

【处方】黑牽牛四兩（炒） 大黃二兩（酒浸） 甘遂（煨） 大戟（煨） 芫花（醋炒） 青皮（炒） 橘紅 枳殼 木香各五錢 輕粉一錢

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于三十粒。

【剂量及用法】每用五分，五更時開水送下。若服一、二次仍不通利，加至六至七分。

【禁忌】忌食鹽、醬，孕婦及身體極弱者禁服。

四、杭州（河間舟車丸）

【功能与主治】治水道壅塞，遍身腫脹，形氣俱實，口渴面赤，腹滿氣粗，二便不暢等症。

【处方】黑丑（炒）四兩 大黃（酒浸）二兩 制甘遂（麥粉裹煨） 紅芽大戟 芫花（醋炒）各一兩 小 青皮五錢 橘紅一兩 廣木香五錢

板榔五錢 輕粉一錢

【制法】共研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服一至一錢五分，開水送下。

【禁忌】重症忌食鹽、醬百日。

五、吉林、哈爾濱 (神祐丸、淨腑丸)

【功能與主治】瀉瀉血管、經絡、臟腑之積水。主燥實陽性之水腫，四肢浮腫，氣息急促，不能仰臥，口渴面赤，大便秘結，小便澀閉。

【處方】黑丑四兩(炒) 川軍(酒浸)二兩 甘遂(面裹煨) 芫花(醋炒) 大戟(面裹炒) 青皮(炒) 橘皮各一兩 木香五錢 輕粉一錢

【制法】共碾為細面，用水泛為小丸，丸如梧桐子大。

【劑量及用法】輕症每服一錢，重症每服二錢，空腹白開水送下。服後大瀉，青黃色為佳。

【禁忌】勿與甘草同用，並忌食鹽百日(鹹物亦忌)，孕婦勿服。

附參考古方

【來源】宣明論方(三花神祐丸)。

【功能與主治】治中滿腹脹，喘嗽淋閉，一切水濕腫滿。久病不已，黃瘦困倦，氣血壅滯不得宣通。或風熱燥郁，肢體麻痺走注疼痛，風痰涎嗽。癥瘕積聚，堅滿痞悶，一切痰飲嘔逆，及婦人經病不快，帶下淋瀝，無問赤白。並治一切下痢及小兒驚疳積熱乳癰滿。

【處方】甘遂 大戟 芫花(醋拌濕炒)各半兩 牽牛二兩 大黃一兩(為細末) 輕粉一錢

【制法】上為末，滴水為丸，如小豆大。

【劑量及用法】初服五丸，每服加五丸，溫水下。每日三服加至快利，利後却常服，病去為度。

十 棗 丸

一、上 海

【功能與主治】主水腫喘喘，水泛為痰，小便不利。

【處方】芫花(炒) 甘遂(制) 大戟(炒)各十兩

【制法】共研細粉，用紅棗二十兩，煮爛去核皮，加糊打和為丸，如

梧桐子大。

【劑量及用法】憑醫師處方購用。

【禁忌】忌食鹽。

二、杭州、福州 (仲景十棗丸)

【功能與主治】治水飲停積，痰熱內壅，脇肋水瀉，經絡作痛，中脘痞硬，氣短空嘔等症。

【處方】芫花(醋炒焦) 紅芽大戟 甘遂(甘草水炮浸透再用麵粉裹煨)各五兩

【制法】共研細末，大紅棗五十枚，煮熟打爛為丸。

【劑量及用法】強壯人每服一錢，體虛人每服五分，米飲湯送下，病不除者再服五分，得便利後糜粥自養。

三、南 昌

【功能與主治】主水飲，心下痞硬滿引脇下痛，干嘔短氣或兼咳逆。

【處方】芫花(熬) 甘遂 大戟各一錢 大棗(劈煎水)二十枚

【制法】研末，以紅棗煎水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服三分至五分，晨用大紅棗十枚煎濃汁送下。得暢泄後，稍進稀粥。若下後病不除者，明日再服。

【禁忌】忌服甘草。

【備考】非經醫師處方不得使用。

附參考古方

【來源】金匱要略方論(十棗湯)。

【功能與主治】主懸飲內痛。

【處方】芫花(熬) 甘遂 大戟各等分

【制法】上三味搗篩，以水一升五合，先煮肥大棗十枚，取九合，去渣，內藥末。

【劑量及用法】強人服一錢匕，羸人服半錢。平旦溫服之，不下者，明日更加半錢得快下後，糜粥自養。

禹余糧丸

一、上海、杭州

【功能與主治】水氣膨脹，脚膝

浮腫，上氣喘滿，小便不利。

【處方】蛇含石(醋煨) 禹余糧(醋煨)各二兩 鐵砂(醋煨三次)五兩 怀牛膝(酒浸) 肉桂 白蒺藜(炒) 炮姜 大茴香(炒) 三稜(炒) 莪朮(炒) 川芎 當歸(酒洗) 豆蔻 木香 羌活 茯苓 附子(炮去皮制) 青皮(炒)各五錢

【制法】共研細粉，加糊為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服一錢半，溫開水送服。

【禁忌】忌食鹽。

二、福 州

【功能與主治】治濕熱傷脾，脾困木乘，食不運化，五臟十脹，小便短赤，氣虛中滿，脚腫，上氣喘急，一切水病虛腫。此乃補氣血，緩小藏之聖劑也。

【處方】禹糧石(醋煨) 蛇含石(醋煨)各二兩 鐵砂(煨) 附子 肉桂 干姜 茯苓 當歸 羌活 白蒺藜 川芎 怀夕 青皮 蓬朮 三稜 大茴 木香 薏仁各五錢 甘草二錢

【制法】共為末，蒸餅為丸。

【劑量及用法】每服三錢，陳皮、生薑湯送下，虛者人參湯下。

【禁忌】忌食咸味。

附參考古方

【來源】三因極一病証方論。

【功能與主治】主十腫水氣。凡脚膝腫，上氣喘滿，小便不利，但是水氣，悉皆主之。

【處方】蛇黃大者三兩(以新鐵鑊盛入一秤炭火中燒蛇黃，與銚子一般通赤，用鉗取銚子出便傾蛇黃入醋醋二升中，候冷取出，研極細則止，即含石) 禹余糧二兩(用真針沙五兩，先以水淘淨控干，更以銚子炒干入禹余糧一處用米醋二升就銚內煮醋干為度，却用銚並藥入一秤炭火中燒通赤，傾藥淨磚地上，候冷研無聲即止)

以三物為主，其次量人虛實，人下項藥：

羌活 木香(煨) 茯苓 川芎 牛膝(酒浸) 白芷(炮) 大茴香(炒) 蓬朮(炮) 桂心 干姜(炮) 青皮(去瓢) 京三稜(炮) 白蒺藜 附子(炮) 當歸(酒浸一

宿)各半兩,虛人老人全用半兩,實壯人減之。

【制法】右為細末,拌極勻,以湯浸蒸餅揀去水,和藥再搗極勻,丸如梧子大。

【劑量及用法】食前,溫酒,白湯下三十丸至五十丸。

【禁忌】忌鹽。

續隨子丸

沈 陽

【功能與主治】行水消腫。主咳嗽,胸滿脹悶,皮膚腫脹,四肢浮腫,小便不利,一切水腫。

【處方】續隨子一兩 人參 木香 漢防己 赤茯苓 大檳榔 海金沙 葶藶各四兩

【制法】共碾極細面,棗肉為小丸。

【劑量及用法】每服二十丸至三十丸,食前用桑白皮煎湯送下。

附參考古方

【來源】雜病証治類方。

【功能與主治】治通身腫滿,喘悶不快。

【處方】人參 木香 漢防己 赤茯苓(面蒸) 大檳榔 海金沙(另研)各五錢 續隨子一兩 葶藶(炒)四兩

【制法】上為末,棗肉丸如梧子大。

【劑量及用法】每服二十丸至三十丸,煎桑白皮湯送下,食前。

通關滋腎丸

福 州

【功能與主治】治下焦濕熱,小便点滴不通以致腹悶欲吐。

【處方】黃柏 知母(俱酒炒)各二兩 肉桂二錢

【制法】共研細末,冬蜜為丸,桐子大。

【劑量及用法】每服五十丸,空心白湯下。

萆薢分清丸

一、北 京

【功能與主治】抑制膀胱,強心利尿。主小便頻數,渾濁不清。

【處方】萆薢 益智仁 菖蒲 烏藥各等分

【制法】共為細粉,水泛小丸,滑石為衣曬亮。

【劑量及用法】每服二錢,日服二次,溫開水送下。

【禁忌】忌辛辣食物。

二、上海、杭州、福州

【功能與主治】小便頻數,渾濁不利。

【處方】川萆薢 益智仁(鹽水炒) 茯苓 石菖蒲(鹽水炒) 烏藥各一兩 甘草稍五錢

【制法】共研細粉,水泛為丸,如綠豆大。

【劑量及用法】每服三錢,溫開水送服。

三、南 京

【功能與主治】清利小便。主下焦濕熱郁結,小便頻數,或時下凝濁如膏糊,莖中作痛等症。

【處方】川萆薢 台烏藥 石菖蒲(鹽水炒) 益智仁 赤茯苓 甘草稍各二兩

【制法】共研細末,溫沸水泛丸,每錢約做八十粒。

【劑量及用法】每服三錢,一日一次,空腹時淡鹽湯吞服。

四、大 同

【功能與主治】腎虛淋病。

【處方】萆薢 菖蒲 烏藥 益智 茯苓 山藥 甘草各一兩

【制法】共為細面,煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服一錢,白水送下。

五、濟 南

【功能與主治】小便頻數,時下白濁,凝如膏糊。

【處方】石菖蒲三兩 甘草稍八兩 粉萆薢一斤 台烏藥四兩 益智仁二兩

【制法】共為細末,水泛為丸,如綠豆大,滑石六兩為衣。

【劑量及用法】成人每服二錢至三錢,白開水送下。

【禁忌】忌辛辣、油膩、茶醋及有刺激性之食物。

附參考古方

【來源】楊氏家藏方(萆薢分清散)。

【功能與主治】治真元不足,小便白濁頻數無度,面如油光彩不定,脚澄下,如羊糊,或小便,類虽不白濁,亦能治。

【處方】益智仁 川萆薢 石菖蒲 烏藥

【制法】上藥各等份,為細末。

【劑量及用法】每服三錢,水一盞半,入鹽一捻,同煎至七分,溫服食前。

琥珀丸

武 漢

【功能與主治】小便淋濁,尿道澀痛。

【處方】滑石二兩(飛) 當歸 琥珀 郁金 扁蓄 广木香 木通各一兩

【制法】取上藥進行干燥,混合碾細,照淨粉量加煉蜜50~54%,迭成小丸,每錢不得少于二十五粒。

【劑量及用法】每服二錢,日服二次,溫開水送下。

琥珀分清丸

沈 陽

【功能與主治】行水散瘀,瀉熱解毒。主肝經濕熱,毒火下注,便后淋濁,尿道炎痛,小便不利,下疳腐爛,花柳梅毒,新久淋病,小便頻數,或排尿作痛,時流白濁。

【處方】琥珀一兩 錦紋大黃一斤

【制法】共碾極細面,用鵝蛋清二十個杵為小丸硃砂為衣。

【劑量及用法】每服一錢,空心開水送下。

【禁忌】油膩。孕婦忌服。

琥珀通淋丸

(琥珀五淋丸)

南 京

【功能與主治】清熱,通利。主小便澀痛混濁。

【處方】飛琥珀一錢 飛滑石二錢 木通 西當歸 广木香 川郁

金 篇蓄各一錢

【制法】共研細末，后加琥珀和勻，用溫沸水泛為小丸，每錢約做二百粒。

【劑量及用法】每服二錢至三錢，一日一次或二次，食前開水吞服。

妙香琥珀丸

沈陽

【功能與主治】清熱毒，利尿鎮痛。主膀胱火熱，小便淋漓作痛，一切淋症。

【處方】大黃 海金沙各一斤 甘草五兩 琥珀一兩二錢

【制法】共碾極細面，用鷄子清為小丸，六一散為衣。

【劑量及用法】每服二錢，早晚白開水送下。

【禁忌】忌食一切魚腥等物。

鳳凰丸

一、濟南(琥珀鳳凰丸)

【功能與主治】主膀胱邪熱，小便渾濁，淋漓作痛，五淋皆宜。

【處方】生半夏 大黃 海金沙 甘草各三兩 琥珀一兩

【制法】共研細面，每細面一斤，用鷄子三十個(清)為小丸，滑石八兩為衣闌亮。

【劑量及用法】每包二錢，白開水送下。

【禁忌】忌食辛辣、腥物；孕婦忌服。

二、沈陽

【功能與主治】消炎解毒，利尿止淋。主淋病炎腫，尿管疼痛，小便頻數，淋漓不斷。

【處方】鷄蛋一枚 斑蝥三個(去頭足翅) 大黃二錢

【制法】將斑蝥、大黃碾極細，納入鷄蛋內封口，火燉研細，醋為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】忌酸性及肉類食物；孕婦忌服。

三、吉林、哈爾濱

【功能與主治】利尿解毒。主淋

毒，病後傳染，毒襲尿道，延及膀胱，小便不清，膿汁混濁，尿道痛癢，睪丸腫脹，偏墜疼痛。

【處方】川軍四兩 雞卵四枚 斑蝥七個

【制法】將川軍碾為細面，斑蝥去翅足研細，同入雞卵中混合蒸熟，曝干碾細，煉蜜為小丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，用黃酒為引，日服二、三次。

【禁忌】忌食辛辣及茶酒類。

四、呼和浩特

(秘制鳳凰丸)

【處方】生人黃五錢 生半夏二錢 海金沙二錢 琥珀五分

【制法】以上共為細面，鷄子清為小丸，滑石衣，裝盒重六錢。

分清五淋丸

一、北京(分清止淋丸)

【功能與主治】清膀胱熱，疏通尿道。主小便不利，淋漓刺痛。

【處方】木通 黃芩 滑石各一百二十八兩 大黃一百九十二兩 豬苓 知母 篇蓄 瞿麥 茯苓 澤瀉 梔子 黃柏 車前子各六十四兩 甘草三十二兩

【制法】共為細粉，水泛小丸，滑石為衣闌亮。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌辛辣食物；孕婦忌服。

二、天津

【功能與主治】清熱利濕，通淋止痛。主膀胱濕熱，小便赤短，尿道疼痛，小腹停水作脹。

【處方】木通 黃芩 滑石各八斤 大黃十二斤 甘草一斤 豬苓 澤瀉 黃柏 篇蓄 生梔子 瞿麥 車前子(鹽炒) 茯苓(去皮) 知母各四斤

【制法】共為細粉，涼開水泛小丸，一錢重裝袋。

【劑量及用法】每次服一袋，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、大同

【功能與主治】小腸熱盛，迎風淋漓，小便不通，大便秘結。

【處方】木通 黃芩 滑石各八斤 大黃十二斤 甘草二斤 豬苓 知母 篇蓄 瞿麥 赤芍 澤瀉 梔子 黃柏 車前各四斤 海金沙二斤 琥珀一斤

【制法】共碾細面，水泛小丸。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

四、濟南(金砂五淋丸)

【功能與主治】小便混濁淋瀝作癢，膀胱邪熱。

【處方】海金沙 車前子 篇蓄 瞿麥 山楂 木通 赤芍 當歸 熟地 赤茯苓 豬苓 黃芩 黃柏 大黃各四兩

【制法】共研細粉，水泛為丸，綠豆大。

【劑量及用法】每服二錢，燈心草湯送下。

【禁忌】忌辛辣食物。

五、沈陽(1)

(金砂五淋丸)

【功能與主治】清熱解毒，利尿止淋。主火淋、氣淋、血淋、砂淋、花柳毒淋等症，及小便頻數，溺管疼痛，尿后淋漓，混濁不清。

【處方】當歸 雄黃 川牛膝 大黃 廣木香 海金沙各等分

【制法】共碾極細面，水泛為小丸。

【劑量及用法】每服一錢或五分，黃酒送下。

【禁忌】忌食五辛及酸物。

六、沈陽(2)

(淋症丸)

【功能與主治】解毒除淋，利尿止痛。主尿道刺痛，小便淋漓，渾如米泔，甚則如膏脂。經久不愈或愈而復發。

【處方】海金沙三錢 大黃一兩 石韋 豬苓 肉桂 木通 黃芩 赤茯苓 澤瀉 滑石各三錢

【制法】共碾極細面，用鷄蛋黃調面，裝入鷄蛋壳內，用紙封固以火煨熟。

【劑量及用法】每服二錢，竹叶

煎湯送下。

【禁忌】忌食辛辣酒類。

七、撫 順

(金砂五淋丸)

【功能与主治】利水通淋。主淋下膿血，小便不利，尿道疼痛，滴点难出，尿如热湯或冷脂，小腹脹痛。

【处方】金砂 石葦 猪苓 桂楠各二兩 赤苓 云苓 白朮各三兩 滑石七兩 炙草一兩 澤瀉五兩 寸冬二兩 生地 黄芩各四兩 木通五兩

【制法】共为細面，水泛小丸。

【剂量及用法】每服二錢，一日二次，灯心湯送下。

【禁忌】忌辛辣酒類。

八、呼 和 浩 特

【处方】海金砂 瞿麦 篇蓄 車前 大黃 甘草 滑石 木通 猪苓 澤瀉 赤苓各四兩八兩

【制法】共为細面，水泛小丸。

五淋白濁丸

一、大 同

【功能与主治】淋病白濁。

【处方】赤茯苓五錢 猪苓 澤瀉 瞿麦各四錢 草梢 白朮各二錢 草薢 篇蓄各三錢 車前子五錢 梔子二錢 椿皮一錢 寧澄茄一錢半

【制法】水泛为丸，滑石为衣。

【剂量及用法】每服三錢，白水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

二、吉 林

【功能与主治】搜毒，止淋，消濁，利下，祛瘀鑲痛。主五淋白濁，女子赤白帶下，橫痃，下疳，膀胱發熱，夢遺滑精，便溺不清，尿管混血，花柳諸症。

【处方】公英 地丁 瞿麦 篇蓄 木通 澤瀉 金砂 灯心 竹叶 甘草 猪苓 土苓各六錢七分 薤白 滑石 赤苓各一兩三錢四分 赤芍 蟬退各三錢四分 車前 鳳眼草 石葦 通草各一兩 山梔 貫桂各二錢

【制法】共研細面，水泛为小丸，

滑石为衣。

【剂量及用法】每服二錢，白水送下，一日二次早晚用之。

【禁忌】服后忌飲茶水，孕妇忌用。

三、呼 和 浩 特

【处方】生大黃五錢 生半夏二錢 海金砂二錢 琥珀五分 輕粉一錢

【制法】以上共为細面，鷄子清为丸，如黃豆大，滑石为衣，闌亮裝元盒重六錢。

八 正 丸

南 京

【功能与主治】清熱利尿。主濕熱下注之尿道刺痛，血淋熱淋等症。

【处方】車前子 生大黃 生甘草梢 瞿麦 飞滑石 篇蓄 木通 黑山梔各一兩

【制法】共研細末，用溫沸水泛丸，每錢約七十粒。

【剂量及用法】每服三錢至四錢，沸水或灯心煎湯送下，一日二次，食前服。

【禁忌】孕妇忌服。

五色淋濁丸

大 同

【功能与主治】五淋白濁，小便渾濁，淋漓作痛。

【处方】人黃 海金砂各一斤 滑石半斤 龙骨 琥珀各二兩

【制法】用鷄子清水泛为丸，滑石青黛为衣。

【剂量及用法】每次二十粒，每日三次，白水送下。

治濁固本丸

一、福 州

【功能与主治】固本之中，兼利濕熱。治濕熱，精濁。

【处方】蓮鬚 黃連各二兩(炒) 砂仁 黄柏 益智仁 半夏(姜制) 茯苓各一兩 猪苓二兩 甘草(炙)二錢

【制法】共研細末，煉蜜为丸。

二、杭 州

【功能与主治】治濕熱下注，流入膀胱，小便頻數，白濁不止之症。

【处方】炙甘草二兩 猪苓二兩 五錢 白茯苓 春砂仁 益智仁 姜半夏 炒黄柏各一兩 川黃連 蓮鬚各二兩

【制法】共研細末，水泛为丸。

【剂量及用法】每服三至四錢，开水送下。

附参考古方

【来源】医学正傳。

【处方】蓮花鬚 黃連(炒)各二兩 白茯苓 砂仁 益智 半夏(湯泡七次、去皮膽) 黄柏(炒)各一兩 甘草(炙)二兩 猪苓二兩五錢

【制法】为末，蒸餅为丸。

【剂量及用法】空心溫酒下五十丸。

归 参 丸

青 島

【处方】当归 苦参 元参 連翹 梔子 花粉 桔梗 生地 黄芩 桑叶各二兩

【制法】共軋細面，蜜为丸。

附参考古方

【来源】古今医鑑(参归丸)。

【功能与主治】治酒渣鼻，乃血熱入肺。

【处方】苦参淨末四兩 当归淨末二兩

【制法】上用酒糊丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服七八十丸，食后熱茶下。

八 正 散

西 安

【功能与主治】由濕熱引起之心煩，面赤目紅，睛痛鼻衄咽痛，口舌瘡腫，腎臟炎，膀胱炎，尿道炎，小便淋漓，赤露痛症。

【处方】瞿麦(炒) 篇蓄 滑石 車前子(炒) 木通 大黃 甘草梢 山梔仁各等分

【制法】共为粗末。

【剂量及用法】每服二錢，一日二次，加灯心七寸、水一杯煎七錢，食前溫服。

【禁忌】無濕熱、實火者不宜服。

附參考古方

【來源】衛生寶鑑：胞癰門。

【功能与主治】大人、小兒心經邪熱，一切蠱毒咽干口燥，大渴引飲，心忪面熱煩躁不寧，目赤睛疼，唇焦鼻衄，口舌生瘡，咽喉腫痛，及治小便赤澀，或癃閉不通，及熱淋血淋並宜服之。

【处方】瞿麥 篇蓄 車前子 滑石 山梔子仁 甘草(炙) 木通 大黃(面裹煨，去面，切焙)各一斤

【制法】上為散。

【剂量及用法】每服二錢，水一盞，入灯心煎至七分，去渣，溫服，食后臥。小兒量力，少少与之。

鎮坎散

一、上海

【功能与主治】水腫臃脹，面目浮腫。

【处方】西瓜一个(每个十斤左右) 春砂仁 大蒜头(独子)各二斤

【制法】在西瓜蒂头处，切一小塊，挖去瓜肉少許，塞入春砂仁与大蒜头，將瓜蒂盖好，西瓜外面全部以泥封七、八分厚，用炭火煨約十小时，出火冷透，將泥去淨，研極細粉。

【剂量及用法】每日清晨或臨臥时，开水送服一錢。

二、杭州

【功能与主治】調氣利水。治蓄水臃脹，腹大異常，脹硬如鼓，氣逆喘滿，二便不暢，面目浮腫等症。

【处方】大西瓜一只 春砂仁一兩 独子大蒜四十九枚

【制法】先將西瓜蒂边开一孔，挖出瓜瓤，只留沿皮無子者，將砂仁及大蒜裝入，仍用蒂盖好。用蠟头泥以陈酒化开，塗于瓜上全遍，約厚一寸为度。即于泥地上挖一小坑，用磚將瓜圍空，以炭火煨之，須四周均灼，約煨半日熄火，待其自冷，次日打开去泥，取瓜炭及葯，研細末为度。

【剂量及用法】陈酒或米飲湯送

下，每服一錢至二錢。

蟾香散(益欢散)

上海

【功能与主治】胸膈氣脹，小溲短少。

【处方】活蝦蟆一支 春砂仁五錢

【制法】將春砂仁入活蝦蟆口腹內，用線將嘴縫牢，裝入瓦罐內用泥封固，炭火煨存性，(約四至五小时)候冷研細粉。

【剂量及用法】每次一錢，米湯送服。

五淋白濁散

重慶

【功能与主治】利小便。

【处方】桂枝一兩 篇蓄 胆草各二兩 木香一兩五錢 知母 地榆各五錢 海金砂六錢 苦參一兩 前仁一兩五錢 粉草一兩 琥珀三錢 生地四兩 黃柏 滑石各一兩

【制法】共為細末。

【剂量及用法】每日二次至三次，用鹽开水服。

止淋散

撫順

【处方】地丁 刘寄奴各二兩

【制法】共為細面。

【剂量及用法】每服二錢，黃酒引。

白淋散

撫順

【处方】輕粉 乳香 地膚子各二兩。

【制法】共為細面。

【剂量及用法】每服二錢，黃酒引。

金砂散

一、哈尔滨(海金砂散)

【功能与主治】利溲通淋，止痛。主淋下膿血，小溲不利，尿道疼痛。

【处方】海金砂 肉桂 炙甘草各二錢 赤茯苓 猪苓 白朮 生杭

腫脹淋濁類

芍各三錢 澤瀉五錢 滑石七錢 石葦一錢去毛

【制法】共碾為細面，絹羅篩過，瓷瓶存貯。

【剂量及用法】每服二錢，灯心湯送下，空腹時溫服。

【禁忌】忌食辛辣酒類。

二、呼和浩特

(神效金砂散)

【处方】白朮 大黃 牛膝 木香 雄黃 海金砂各等分

【制法】共為細面。

琥珀參苓散

沈陽

【功能与主治】止痛，調氣，利尿。主男子莖中刺痛，女子陰中腫痛，小便淋瀝不利，脇痛氣逆，各種疝痛淋病等症。

【处方】人參五分 茯苓四分 琥珀二分 澤瀉四分 柴胡四分 當歸尾五分 玄胡索七分 川楝子五分 生甘草五分

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】每服一錢，白开水送下。

【禁忌】忌食辛辣酒類。

回春散

沈陽

【功能与主治】溫腎散寒暖子宮。主房事之后感受風寒，飲食生冷，小腹疼痛，陰部收縮，四肢冰冷，呼吸無力，陰寒危症。

【处方】白朮一錢 黃丹八分 胡椒二分 煅硝一分

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】醋調勻，置于手中，以手掌托約合陰處須臾，出汗而愈。

【禁忌】忌食生冷硬物。

【備考】此方加入吳茱一錢，功效尤著。

附參考古方

【來源】沈氏尊生書：雜病源流犀燭

【功能与主治】陰冷。

【处方】白朮一錢 黃丹八分 胡椒(細研)二分 煅硝一分。

【齊量及用法】好醋調勻，手內攤，男左女右合陰處，揮身是打濕衣衫。

控涎丹

一、天津(子龙丸)

【功能与主治】去湿化痰，消水解毒。主湿痰流注，腹脹停水，小便短，四肢半腫，頸項痰核。

【处方】甘遂(醋制透) 白芥子 紅毛戟(醋制透)各二斤

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，一錢重。蠟皮或蠟紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦及體虛者忌服。不得與甘草同服。

二、上海

【功能与主治】通利瀉下，主治水腫。

【处方】大戟 甘遂(用甘草水浸一日后用面粉包煨) 白芥子(炒)各四兩

【制法】共研細粉，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】憑醫師處方購用。

【禁忌】孕婦忌服。虛症慎用。

三、南京(子龙丸)

【功能与主治】主痰飲聚于胸膈及皮里膜外形成之疾患，如流注癰瘰、貼骨陰疽，及腰背胸脇牽引作痛。

【处方】同上海。

【制法】共研細末，加煉白蜜為小丸，每錢約做四十粒。

【劑量及用法】每服五分至一錢，臨臥時用生薑湯吞服。

【禁忌】忌與甘草同服。孕婦忌服，虛人慎用。

四、武汉(控涎丸、子龙丸)

【功能与主治】癰瘰癧，痰核流注及手足冷木等症。

【处方】同上海。

【制法】共研細末，照淨粉量加煉蜜40—45%送成小丸，每錢不得少于二十五粒。

【劑量及用法】每服一分，日三次。

【禁忌】孕婦忌服。

五、广州(子龙丸)

【功能与主治】由痰病引起之手足胸背諸症。

【处方】同上海。

【制法】洗淨切碎，隔水蒸透，晒干研為細粉，以米糊制成小丸。

【劑量及用法】每服五分。

六、福州

【功能与主治】凡人忽患胸背手足腰膝疼痛，牽引釣痛，時時走易不定不可忍者。或手足冷痺，氣脈不通，皆痰涎在心膈上下，故為此証。

【处方】同上海。

【制法】共為末，糊丸桐子大。

【劑量及用法】煎臥淡姜湯或溫水下五、七丸至十丸。痰甚者量加之。

七、杭州(三因控涎丹、子龙丸)

【功能与主治】治痰飲停蓄，肩背、胸脇、四肢，遍身牽引疼痛，手足冷痺，一切痰滯經絡等症。

【处方】制甘遂(甘草一兩泡水浸，再用麵煨) 紅毛大戟 白芥子各四兩

【制法】共研細末，米糊為丸。

【劑量及用法】每服五分至一錢。淡姜湯送下。

八、南昌

【功能与主治】癰癧，脇痛，頸項胸脇腰背筋骨牽引釣痛，流走不定，手足冷木或喉中結氣如梅核，時有時無，沖喉咽絕，遍身忽起筋塊如瘤如粟，皮色不變不疼不痛，但覺酸麻或自貫串爛，流水如涎，經年不愈，有若管漏，並治療癰貼骨，魚口、便毒，一切陰疽。

【处方】甘遂(制去心) 大戟(煮透去骨晒干忌用火炒) 白芥子(炒)各四兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服五分至一錢，淡姜湯或溫開水送下，以效為度。病愈後須用六君子湯或丸調補。但非經醫方處方不得使用。

【禁忌】忌與甘草同日服。

九、沙市(子龙丸)

【功能与主治】治痰濕在經絡，頸項、胸脇、腰背、筋骨牽引釣痛，流走不定，手足冷木，氣脈不通，遍身或起筋塊如瘤如粟，皮色不變，不疼不痛但覺酸麻等症。

【处方】同上海。

【制法】上藥共研細末(忌火炒)煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服八分或一錢。

【禁忌】體虛及孕婦忌服。

十、西安(子龙丸)

【功能与主治】主治一切痰症，淋巴腺機能衰退如癰疾、流注、陰疽癰瘰、鼠瘻、淋巴腺結核，喉中痰結如梅核氣壯及因痰飲引起之大項胸脇腰背牽引釣痛，流走無定，手足冷、麻、木等症。

【处方】同上海。

【制法】分別研細，稱取等分，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每次五、七丸可加至十五丸。姜湯送下，以利為度。

【禁忌】忌與甘草同服。孕婦亦忌。此藥猛峻，服下水瀉。病去後宜用六君子湯調補。

十一、濟南

【功能与主治】忌飲脇痛。

【处方】甘遂(面煨) 大戟(泡去水) 白芥子各二兩

【制法】共研為細末，棗肉小丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服三分至五分，白開水或淡姜水送下。

【禁忌】辛辣油膩等食物。孕婦忌服。

十二、沈陽

【功能与主治】祛痰逐水。主一切頑痰怪症，癰癧癰瘰，筋骨痠痛，四肢麻木，痰涎悶絕，遍身結核，貼骨陰疽。

【处方】同廣州，分量作各等分。

【制法】共研極細面，麵糊或煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服七分，姜湯送下。

【禁忌】生冷食品。孕妇忌服。

十三、吉林、哈尔滨 (妙应丸)

【功能与主治】降痰涤涎。主痰症。

【处方】甘遂(去心制) 大戟(煮透去骨,晒干,忌火炒) 白芥子(炒)各一两

【制法】共研极细面,麴糊或炼蜜或滴水为丸,如梧桐子大,晒干,玻璃瓶存貯之。

【剂量及用法】每服五、七丸至十丸;重症十五丸至二十丸,临臥时

以生姜汤或热汤送下。

【禁忌】忌与甘草同日服用;孕妇及气虚白,大便不实,小溲清长者忌用。

附参考古方

【来源】三因极一病证方论。

【功能与主治】凡人忽患胸背、手脚、颈项、腰膝、隐痛不可忍,连筋骨,牵引钓痛,坐臥不宁,时时走易不定,俗医不晓,谓之走注,便用风药及针灸,皆无益;又疑是风毒结聚,欲以药贴,乱以药贴,亦非也;此乃是痰涎伏在心膈上下,变为比疾,

腫脹淋濁类

或令人头痛不可举,或神意昏倦多睡,或飲食無味,痰唾稠粘,夜間喉中如鋸声,多流唾涎,手脚腫,腿冷痺,气脉不通,誤認為癱瘓,亦非也;凡有此疾,但以是药,不过数服,其疾如失。

【处方】甘遂(去心) 紫大戟(去皮) 白芥子(真者)各等分

【制法】以上为末,煮糊丸,如梧子大,晒干。

【剂量及用法】食后,临臥,淡姜汤,或熟水下五、七丸至十丸。如疾猛气实,加丸数不妨。其效如神。

外科

瘡瘍類

連翹敗毒丸

一、北京

【功能与主治】消炎解毒。主瘡瘍初起，紅腫疼痛，憎寒壯熱。

【处方】連翹 防風 白芷 黃連 苦參 薄荷 當歸 荆芥穗 天花粉 甘草 黃芩 赤芍各四十兩 柴胡二十四兩 麻黃 羌活 黃柏各八十兩 地丁 大黃各二百四十兩 金銀花一百六十兩

【制法】共為細粉，水泛小丸，滑石為衣闌亮。

【劑量及用法】每服三錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌食發物，孕婦勿服。

二、天津

【功能与主治】清熱解毒，消腫止痛。主瘡癤潰爛，灼熱發燒，流膿流水，丹毒疱疹，疥癬痛癢。

【处方】銀花一斤 地丁 公英 生梔子 白芷 黃芩 赤芍 浙貝 元參(去蘆) 桔梗 木通 防風 白鮮皮 甘草各十二兩 蟬蛻 花粉各八兩 連翹(去心) 川軍各一斤

【制法】共為細粉，水丸一涼開水泛小丸，三錢重裝袋；蜜丸一煉蜜為丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】水丸——每次服一袋，蜜丸——每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、蘭州

【功能与主治】清熱解毒，消腫止痛。主諸瘡初起，紅腫疼痛，灼熱發燒，或瘡癤潰爛，流膿流水，或無名腫毒，丹毒疱疹疥癬，痛癢不止，均可治之。

【处方】大黃一斤 銀花一斤 地丁 公英 梔子 白芷 黃芩 赤芍 元參 浙貝 桔梗 木通

防風 鮮皮 草梢 以上各十二兩 蟬蛻八兩 花粉八兩 連翹一斤

【制法】共研細面，水打小丸；如熬膏每清膏一斤，加蜜二斤，收煉成膏。

【劑量及用法】內服每次一錢，白開水送下，如服膏，每服一瓶或一兩，白開水沖服。

四、濟南

【功能与主治】癰毒初起，憎寒壯熱。

【处方】連翹 錦紋大黃各一兩六錢 歸尾 赤芍 花粉 白芷 甘草 薄荷各八錢 黃芩 柴胡 防風各六錢 銀花二兩四錢 芥穗五錢 乳香二兩 沒藥二兩

【制法】共研細末，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二十粒，日服二次，白開水送下。

【禁忌】辛辣腥羶等物，孕婦忌服。

五、沈陽

【功能与主治】清熱解毒，止痛消炎。主頭痛身疼，口渴咽痛，血熱瘡毒，瘟病斑疹，嘔吐眩暈、食慾不振、小便赤黃，大便秘結。

【处方】連翹二兩 銀花一兩 桔梗六錢 薄荷六錢 竹叶四錢 甘草五錢 芥穗四錢 淡豆豉五錢 牛子六錢 元參四錢 玉金二錢 花粉五錢 生地六錢 麥冬六錢

【制法】共碾細面，水泛為丸。

【劑量及用法】每服二錢，飯後白開水送下，日服三次。

六、撫順

【处方】連翹 雙花各八兩 花粉 甘草 生地 川軍 元栢 山梔 桔梗 赤芍 歸尾 防風 丹皮 白芷 元參 荆芥各一兩 元芩一兩

【制法】共為面，水泛小丸。

七、哈爾濱

【功能与主治】清癰解毒。主大頭瘟(即丹毒)，頭毒，癰疥。

【处方】連翹 銀花各八兩 防風 荆芥 生地 花粉 大黃 黃柏 黃芩 梔子 歸尾 丹皮 桔梗 玄參 白芷 赤芍 甘草各四兩

【制法】共碾為細面，水泛為小丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服一付(二錢)，大便燥結者，用野軍二錢明粉一錢煎湯服下，皮膚病癰疥等症，均用金銀花湯服下。

【禁忌】孕婦勿服，忌食辛辣。

【備考】每一錢一付，裝入印制之紙袋內封之。

八、承德

【功能与主治】癰毒初起，疼痛灼熱。

【处方】同蘭州。

【制法】共為細粉，水泛小丸。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

九、呼和浩特

【处方】連翹 大黃各九斤 歸尾 白芷 花粉 赤芍 甘草 薄荷各四斤半 黃芩 銀花各十三斤半 川芎 桔梗 生地 防風 浙貝 芥穗各三斤六兩

【制法】水泛小丸。

蜡矾丸

一、杭州

【功能与主治】治癰疽發背、一切惡瘡、肺癰腸癰、初起預服，功能托里消毒、排膿止痛。

【处方】生明礬一兩 黃蜡七錢

【制法】將黃蜡熔化，和明礬粉打丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二十丸，漸加至三十丸，食遠開水送下，每日三

次,初起未破內消,已破自合。

【禁忌】忌食鷄肉三月。

二、撫 順

【处方】血珀一錢 白矾一兩二錢 雄黃一兩二錢 元蜡一兩 硃砂一兩二錢。

【制法】共為細面,化元蜡為小丸,硃砂衣。

附參考古方

【來源】沈氏遺生書: 雜病源流犀燭。

【功能與主治】懸癰。

【处方】黃蜡 白矾等分。

清血解毒丸

沈 陽

【功能與主治】清血解毒。主瘡毒血熱,腸胃癰毒,皮膚瘡癤,發赤腫痛。

【处方】銀花 赤芍 花粉 桃仁 藏紅花 丹皮 大黃 元柏 白芷各一兩 龍腦一錢 木香八錢 麝香一錢

【制法】除龍腦麝香另研外,余則共碾極細面,煉蜜為丸,二錢重。

【劑量及用法】每服一丸,食后白開水送下。

【禁忌】辛辣。

清血珠黃丸

呼 和 浩 特

【处方】乳香二兩 沒藥二兩 大黃一兩五 雄黃二兩 血余二兩 牛黃二分 麝香二分 冰片一錢 干蟬三個(每個二錢)

【制法】共細面,糊小小丸。

犀角紫草丸

撫 順

【处方與制法】犀角一錢 紫草五錢 珍珠四分 青黛二錢 牛黃二分 羚羊三錢 川貝三錢 冰片二分 珠砂五錢 血珀三錢 乳香三錢 雄黃一錢 沒藥三錢 元參五錢 羌活一錢 竹黃五錢,為細面。

双花二兩 地丁二兩 核桃仁二兩 甘草一兩 菊花一兩,此五味

用長流水五碗,以砂鍋慢火煎至半,煉蜜熬至成膏,和前藥為丸五分大,蜡皮封。

琥珀蜡矾丸

一、南 京

【功能與主治】定痛。主已成未潰之癰疽,疔毒發背等症。

【处方】飛琥珀一錢 黃蜡一兩 白矾一兩二錢 雄黃一錢二分 飛硃砂一錢二分 白蜜二錢

【制法】先以琥珀白矾雄黃研為細末,另將蜡蜜溶化,和末乘熱做為小丸,硃砂為衣,每錢約做二十粒。

【劑量及用法】每服二錢至三錢,一日一次,開水吞服。

二、杭 州

【功能與主治】治癰疽發背,已成未膿之際,恐毒不能外達,宜預服此丸則不致內攻,有護膜護心,清血排毒之功。

【处方】同南京。

【制法】上藥各取淨粉,將黃蜡烱化和蜂蜜為丸,以方內辰砂為衣。

【劑量及用法】每服二至三錢,開水送下,毒盛者早晚各服一次。

三、南 昌

【功能與主治】癰疽發背,已成未膿之際,恐毒氣不能外出,預服此丸防毒內攻。

【处方】同南京。

【制法】先以琥珀、白矾、雄黃、硃砂研為細末,另將蜡蜜入銅杓內溶化,離火片時,候蜡四邊稍凝,方將藥末投入攪勻共成一塊,以一人將藥火上微烘,眾手急速作丸,如綠豆大,以方內硃砂為衣,瓷瓶收貯。

【劑量及用法】每服一錢五分,食后溫開水送下,毒盛者早晚各服一次。

【禁忌】戒食油膩辛辣等物,服藥且忌食葱。

四、西 安

【功能與主治】主治癰疽發背諸惡瘡,其形已成,而膿未成之際,其人即不虛弱,恐毒氣不能外出,預服此藥解毒和血,有不致內陷之功。

【处方】琥珀一錢 明雄一錢二分 硃砂一錢 黃蜡一兩 白蜜二

錢 白矾二錢

【制法】上六味先將珀、雄、硃、矾四味分別研極細末,另將蜡末入銅杓內溶化,離火片時,候蜡四邊稍凝,方將藥末入內攪勻,共成一塊,將藥火上微烘,急作小丸如綠豆大,硃砂為衣,玻璃瓶分裝,每瓶五十丸至一百丸,固封瓶口。

【劑量及用法】成人每次服二十丸至二十五丸,食后白湯送下,瘡重者一日二次,小兒按年齡遞減。

【禁忌】忌醋、生冷及性交。

五、沈 陽

【功能與主治】托里護心,散瘀解毒。主癰疽發背,已成形未成膿,為托里護膜防毒內攻之藥。

【处方】同南京。

【制法】先將硃砂琥珀雄黃白矾碾極細面,另將蜡蜜入銅勺內溶化,離火片時,候蜡四邊稍凝,入藥面攪勻共成一塊,作為小丸,硃砂為衣,瓷瓶密貯。

【劑量及用法】每服三十丸,白開水送下,早晚二次。

六、吉 林(蜡矾丸)

【功能與主治】解毒透膿。癰疽瘡疹,癰疽疔毒等症。

【处方】黃蜡六錢七分 白矾六錢七分 明雄八分 血珀七分 硃砂八分 白蜜一錢四分。

【制法】將以上藥品共為細面,將白矾明雄硃砂血珀四味化黃蜡為丸。每丸如綠豆大。保存于瓷罐內。

【劑量及用法】每服三十丸,早晚二次,用白開水送下。

【禁忌】忌食發物。

附參考古方

【來源】外科正宗。

【功能與主治】治癰疽發背已成未膿之際,恐毒氣不能外出致內攻,預服此丸護膜護心,亦且散血解毒。

【处方】白矾一兩二錢 黃蜡一兩 雄黃一錢二分 琥珀一錢(另研極細) 硃砂一錢二分 蜂蜜二錢(臨入)

【制法】上前四味,先碾研極細,另將蜜蜡銅杓內溶化,離火片時,候蜡四邊稍凝時,方入上藥攪勻,共成

一塊，以一人將藥火上微烘，眾手急丸，小塞口大，用硃砂為衣，磁罐收貯。

【劑量及用法】每服二三丸，白湯食后送下，病甚者早晚日進二次，其功最效。

蟾酥丸

一、天津

【功能與主治】消炎解毒，活血止痛。主治毒惡瘡，發背癰疽，紅腫疼痛，心中煩亂。

【處方】蟾酥(酒化)二錢 枯硃 銅綠 制乳香 制沒藥 胆矾各一錢 雄黃二錢 活蝸牛二十一個 煅寒水石一錢 麝香一錢 硃砂面二錢 輕粉五分

【制法】先將活蝸牛、雄黃共串一處晒干，除蟾酥外，與羣藥共為細粉。

【用法】蟾酥用白干酒四錢化開，再入細粉和勻，為小小丸，一分重裝瓶。

【劑量及用法】每次服一分，用葱白五寸，嚼爛同黃酒送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、上海(外科蟾酥丸)

【功能與主治】疔瘡初起，癰疽紅腫。

【處方】輕粉五分 乳香(制)一錢 麝香一錢 枯硃一錢 寒水石(煅)一錢 沒藥(制)一錢 腰黃二錢 蟾酥二錢 蝸牛二十一只 硃砂三錢

【制法】各取淨粉，共研極細末，將蟾酥燒酒化烊，加蝸牛二十一只打爛，為丸如高糧栗子大。

【劑量及用法】每服五粒，開水送服，外用醋調敷患處。

【禁忌】孕婦忌服。

【備考】原方有膽硃銅綠二味，因失真取消不用。

三、南京(外科蟾酥丸)

【功能與主治】解毒消腫。主治毒初起，腫痛麻木。

【處方】蟾酥一錢 制乳香二錢 輕粉一錢 制沒藥二錢 制川烏一錢五分 硃砂一錢五分 連翹一錢五分 麝香五分 明雄黃一錢五分

【制法】上藥九味，共研細末，以蟾酥用酒化烊，加米糊為丸，每丸計重五厘。

【劑量及用法】每服一丸至二丸，溫湯或溫酒吞服，取汁為宜。

【禁忌】孕婦忌服。

四、武漢

【功能與主治】一切疔疽，疔瘡惡毒，青紅腫痛。

【處方】麝香一錢 蟾酥二錢 雄黃二錢 沒藥一錢 乳香一錢 胆矾一錢 枯硃一錢 硃砂一錢 寒水石一錢(煅) 蝸牛一錢半 輕粉五分 銅綠一錢

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，照淨粉量加淀粉百分之五十，混合成丸，每錢不得少于二十粒。

【劑量及用法】內服五厘至一分，外用二分磨搽。

【禁忌】孕婦忌服。

五、福州(外科蟾酥丸)

【功能與主治】治疔毒初起及諸惡瘡，外用化腐消堅，內服驅毒發汗。

【處方】蟾酥(酒化) 雄黃各二錢 輕粉 銅綠 枯硃 寒水石(煅) 胆矾 乳香 沒藥 射香各一錢 硃砂三錢 蝸牛二十一個

【制法】研為細末，于端午日午時，在淨室中先將蝸牛研爛，同蟾酥和研稠粘，方入各藥共搗極勻，和丸如綠豆大，修合時忌婦人雞人見之。

【劑量及用法】每服三丸，用葱白五寸，令患者嚼爛吐于手心中(男用左手，女用右手)，將藥丸裹入葱泥內，用無灰熱酒一茶盅送下，蓋被，約行五六里路，病者出汗為度，如外用，隨症用之。

六、南昌

【功能與主治】疔瘡發背，腦疽及附骨臂腿等症，初起不痛，或麻木或嘔吐，甚至昏憤者。

【處方】硃砂三兩 雄黃二錢 制乳香一錢 制沒藥一錢 蟾酥(酒化)一錢 蝸牛二十一個 銅綠一錢 寒水石(煅)一錢 枯硃一錢 麝香一錢 輕粉一錢 胆矾一錢

【制法】各藥研為細末，先將蝸牛研爛，同蟾酥和研稠粘，再入各藥

搗極勻為丸，每丸干市秤一分，約如豌豆大，方內硃砂為衣，瓶收貯封固。

【劑量及用法】每服一丸，用葱白五寸搗爛，將丸裹入葱泥，用溫酒一茶盅送下，然後被蓋暖臥約半小時，病者出汗為度，病甚者再服一丸。

【禁忌】孕婦忌服，體弱者慎用。

【備考】非經此處方不得使用。

七、沙市

【功能與主治】治疔毒初起及諸惡瘡，外用消堅化毒。

【處方】蟾酥一錢 正梅片 乳香 血竭 胆矾 寒水石 輕粉各一錢 天蝸牛二十八个 沒藥一錢 硃砂 枯硃各一錢 明雄一錢 麝香六分

【制法】共研細末，先將蝸牛研爛，同蟾酥和研勻，方入藥末共搗極勻，用糯米漿為丸，如細豌豆大，每丸重一分。外用搓條作錠，每錠重二分。

【劑量及用法】每次服三丸，用葱白五寸研爛，用溫升水一茶杯兌酒少許送下，蓋被出汗為度，甚者再服三丸。

【禁忌】白疽及孕婦忌服。

八、西安

【功能與主治】主治無名腫毒，頑惡結核，疔癰疽及實火牙舌口喉諸瘡腫，及婦人乳瘡諸症。

【處方】蟾酥二錢(酒化) 輕粉一錢 銅綠一錢 胆矾一錢 枯硃一錢 寒水石(煅)一錢 制乳香一錢 制沒藥一錢 明雄一錢 麝香七分 硃砂三錢 蝸牛二十四個(有壳如螺螄者是)

【制法】最好在夏季先將蝸牛研爛，同蟾酥和研升，再入各藥研升極細粉，燒酒為丸如粟米大，玻璃瓶裝，固封瓶口勿令洩氣。

【劑量及用法】成人每服一丸至二丸，服時先食生葱白嚼爛，再將丸藥送入口內，用陳酒送下，蓋被睡臥一二小時出微汗，病重者再服，一日二次，小兒按年齡遞減，不必嚼葱，可用葱汁調湯送服，外敷酒化開塗患處。

【禁忌】虛寒及小兒慢驚險症，

虛火所致口牙諸瘡及孕婦忌服。

九、蘭州

【功能与主治】消毒、杀菌、化腐。主疔毒惡瘡，癰癤腫疼，內服外敷均可。

【处方】蟾酥二錢(用酒化) 輕粉五分 枯矾一錢 寒水石一錢 沒藥一錢 乳香一錢 麝香一錢 雄黃二錢 蝸牛二十一个 硃砂二錢

【制法】先將各藥為極細末，再將蝸牛蟾酥搗泥和丸，硃砂為衣，一分重。

【劑量及用法】每服一丸，黃酒送服。

【禁忌】孕婦忌服。

十、禹县

【功能与主治】諸般疔毒，惡瘡腫毒。

【处方】蟾酥二錢 明雄黃二錢 輕粉一錢 枯矾一錢 胆矾一錢 銅綠一錢 寒水石一錢 乳香一錢 沒藥一錢 麝香二分 硃砂二錢 蝸牛二十一个

【制法】酒化蟾酥為丸，每丸重六厘。

【劑量及用法】葱白酒送下，蓋被取汗，每服一丸。

【禁忌】忌吃發物，孕婦忌服，小兒不用。

【備考】有效期三年。

十一、濟南

【功能与主治】疔毒初起，及諸惡瘡無名腫毒等症。

【处方】同天津。

【制法】先將蝸牛研爛，同蟾酥和研稠粘，再入其他各藥共搗極勻，為丸如綠豆大。

【劑量及用法】葱白為引，白開水送下，每服三丸。

【禁忌】辛辣油膩等食物。

十二、沈陽

【功能与主治】鎮痛消腫，解毒化癰。主疔毒發背，腦疽乳癰，附骨疽，髖腿等疽，一切惡瘡，不痛麻木，惡心嘔吐，貼筋着骨等症。

【处方】蟾酥 雄黃各二錢 輕粉五分 枯矾 寒水石 乳香 沒藥 銅綠 胆矾 麝香各一錢 硃

砂三錢 蝸牛廿一个

【制法】活蝸牛搗亂，入蟾酥合併諸藥面，共搗成小丸，重七厘。

【劑量及用法】每服三丸，用葱白五寸煎元酒一杯送下，蓋被取汗，重者再進一服。

【備考】劇約。

十三、撫順

【功能与主治】解毒、消炎、驅菌。主外科毒瘡惡瘡，毒氣內攻，寒熱嘔吐，神昏煩躁，心中攪鬧，面色不常，疼痛欲死等症。

【处方】雄黃六錢 輕粉一錢 血竭花 兒茶各四錢 蜈蚣四條 寒水石二錢 沒藥 乳香 炙蟾酥各四錢 射香三分

【制法】共為細面，元酒化蟾酥為小丸。

【劑量及用法】葱白五寸搗亂，將蟾酥丸三丸裹入，熱酒吞服出汗，外用醋調敷患處。

【禁忌】忌食魚類，孕婦勿服。

十四、哈爾濱

【功能与主治】解毒消腫，腫而潰者可消，已潰者可斂，外敷化腐消瘡，內服驅毒發汗。主疔毒，癰疽發背，腦疽乳癰，附骨疽，無名腫毒，一切外科惡症。

【处方】同蘭州。

【制法】于端午日午時，在淨室中，將蟾酥用黃酒烱化，蝸牛研爛，一處調粘，再將各藥研細，一起搗勻，和丸如綠豆大。玻璃瓶存貯。

【劑量及用法】用葱白五寸搗爛，將蟾酥丸三丸裹入，熱黃酒吞服，蓋被取汗。

外用法：醋調或水調敷腫處，可止痛消腫，或搓為細條，入瘡口內，可提毒去腐生肌。

【禁忌】忌食魚蝦發物，孕婦忌服。

十五、呼浩特

【处方】煨蝸牛二兩 血竭 乳香 沒藥 輕粉 雄黃各五分 硃砂五錢 麝香 冰片

【制法】蟾酥一兩燒酒化，為小丸如黃豆大。

附參考古方

【來源】1.外科証治全生集。

瘡瘍類

【处方】寒水石三錢 血竭 沒藥 胆矾 乳香 雄精 銅青 穿山甲 殭蠶 全蠍(酒炒)各一錢 硃砂 枯矾 皂角刺 冰片 輕粉 紅砒各三分 蜈蚣(去足)三錢

【制法】各制為末，用蝸牛二十一个，蟾酥三錢，酒化共搗為丸，如綠豆大。金箔為衣。

【劑量及用法】每用葱白裹一丸，敲碎酒服。

【禁忌】白疽忌用。

2. 外科正宗。

【功能与主治】治療瘡發背，腦疽癰，附骨髖腿等疽。

【处方】蟾酥(酒化)二錢 輕粉五分 枯矾 寒水石(煨) 銅綠 乳香 沒藥 胆矾 麝香各一錢 雄黃二錢 蝸牛二十一个 硃砂三錢

【制法】以上各為末，稱准，于端午時，在淨室中，先將蝸牛研爛，再同蟾酥和研稠粘，方入各藥，共搗極勻，丸如菜豆大。

【劑量及用法】每服三丸，用葱白五寸，患者自嚼爛，吐于男左女右手心，包藥在內，用無灰熱酒一茶鍾送下，被蓋，如人行五六里許，出汗為效，甚者再進一服。

3. 瘍醫准繩。

【功能与主治】治疔黃，一切惡瘡。

【处方】川烏 蓮花蕊 硃砂各一錢半 乳香 沒藥各二錢 輕粉 蟾酥各一錢 麝香五分

【制法】上為細末，糊為丸，豌豆大。

【劑量及用法】每服一丸，病重者二丸，生葱三五莖嚼極爛吐于手心，包藥在內，熱酒和葱送下，如重車行五七里汗出為效。

蟾酥解毒丸

沈陽

【功能与主治】鎮痛解毒。主疔毒惡瘡，發熱惡寒，嘔吐心煩，周身疼痛，疔毒走黃，外科瘡瘍等症。

【处方】蟾酥一兩 雄黃一兩五錢 乳香一兩

【制法】共碾極細面，和葱汁為丸，七厘重。

【劑量及用法】每服五丸至七丸，黃酒化服。

【备考】劇藥。

附參考古方

【來源】惠直堂經驗方

【功能及主治】治疔瘡惡毒，走黃疔，舌下癰之即黃出耳疔神效。

【處方】蟾酥一兩 雄黃一兩五錢 乳香一兩

【制法】研末和葱汁為丸，菜豆大，硃砂為衣。

【劑量及用法】每服五丸，酒下；用銀針刺瘡頂出血，津化藥半粒，點入瘡內立愈。凡治疔瘡宜銀針刺瘡中心至痛處，又刺四邊十餘下，令去惡血，敷藥，藥力得針穴則易入，看口中頰邊舌上有黑赤珠，是疔瘡也；刺出毒血，將蟾酥丸捏成細條如針大，插入，用水澄膏貼之，仍用奪命丹發汗。

醒消丸

一、北京

【功能與主治】消腫止痛。主癰毒初期，堅硬疼痛。

【處方】乳香 沒藥各一錢 麝香一錢五分 雄精五錢

【制法】共為細粉，用黃米面打糊為小小丸。

【劑量及用法】每服一錢，日服二次，溫黃酒送下，溫開水亦可，按病狀酌情增減。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天津

【功能與主治】解毒活血，消腫止痛。主各種瘡癰，癰毒初起，紅腫疼痛。

【處方】雄黃面五兩 制乳香面十兩 制沒藥面十兩 麝香三錢

【制法】共為細粉，每藥面一兩，用黃米面三錢，蒸糊為小小丸，三錢重裝袋。

【劑量及用法】每次服一瓶，黃酒送下。

【禁忌】孕婦及瘡疽已潰忌服。

三、上海

【功能與主治】消散癰癤。

【處方】麝香一錢五分 乳香(制)一兩 腰黃五錢 沒藥(制)一兩

【制法】各藥取淨粉和勻，加糯

米糊為丸，如高粱粟子大，低溫干燥。

【劑量及用法】每服一錢至三錢，溫開水送服。

【禁忌】孕婦忌服。

四、南京

【功能與主治】消痰止痛。主癰瘍初起，堅硬疼痛。

【處方】制乳香一兩 制沒藥一兩 明雄黃五錢 麝香一分

【制法】上藥四味，先將乳沒研細末，秤准重量，再將明雄麝香乳細和勻，用木飯一兩，杵融和木飯為小丸。如綠豆大。

【劑量及用法】每服五分至一錢，用溫酒吞服，醉復取汗，如不能飲酒，開水吞服。

【禁忌】孕婦忌服。

【備考】密藏。

五、武漢

【功能與主治】乳部腫痛，或癰腫痛等症。

【處方】乳香一兩 沒藥一兩 麝香一錢半 雄黃五錢

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，照淨粉量加淀粉百分之五十，混合成丸，每錢不得少于五十粒。

【劑量及用法】每服一至三錢，熱陳酒送下，或伏汁酒亦可。

【禁忌】孕婦忌服。

六、杭州

【功能與主治】治一切火癰熱毒、紅腫癰痛，以及疔瘡熱癰，無名腫毒等症。此丸消腫止痛，人有奇功。

【處方】麝香五分 飛腰黃五錢 制乳香 制沒藥各一兩

【制法】各取淨粉研勻、用煮熟黃米飯搗和為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二至三錢，熱酒送下。蓋被取汗甚效。

七、南昌

【功能與主治】紅腫癰毒初起，腫痛不已。

【處方】飛雄黃五錢 麝香一錢五分 乳香(去油)一兩 沒藥(去油)一兩

【制法】共研細末，用粟米飯一兩和搗為丸，每丸重一錢，蜡壳封

固。

【劑量及用法】每服一丸，熱陳酒送下，蓋被取汗。小兒視年齡及病情酌減服。

【禁忌】孕婦忌服，戒辛辣食物。

八、沙市

【功能與主治】消諸癰等症。

【處方】乳香(去油) 沒藥(去油)各一兩 雄黃五錢 麝香一錢五分

【制法】先將乳香沒藥雄黃三味各研秤准，再合麝香共研，煮爛黃米飯一匙，和木搗為丸，如梧桐子大，晒干(忌火)，密貯勿泄氣。

【劑量及用法】成人量每次服三錢，熱陳酒送下，醉復取汗。

【禁忌】孕婦忌服。

九、西安

【功能與主治】主治一切無名腫毒，癰紅作痛，發背炎癰，毒氣內攻等症。

【處方】犀黃五分 麝香一錢五分 腰黃五錢 乳香一兩 沒藥一兩

【制法】上五味分別杵研細末，黃米濃汁為丸，如粟米，磁瓶裝入，每瓶二錢固封，瓶口勿令洩氣。

【劑量及用法】成人每次五分至一錢，溫酒或熱水送服，一日二次，飯前服用，小兒按年齡酌減。

【禁忌】孕婦忌服。

十、濟南

【功能與主治】主陽疔瘡癰毒初起，紅腫高起，疼痛不已。

【處方】乳香一兩 沒藥一兩 雄精五錢 麝香三分

【制法】共為末，黃米糊小丸。如綠豆大。

【劑量及用法】每服一錢，白開水送下。

【禁忌】辛辣刺激等物。孕婦忌服。

十一、吉林

【功能與主治】消腫解毒，癰瘡初發，紅腫高大，尚未潰膿，疼痛干嘔，發熱畏冷，無名腫毒，毒火內攻，一切陽性腫瘍。

【處方】乳香(去油)一兩 沒藥(去油)一兩 麝香一錢五分 牛黃

五分 雄黃五錢

【制法】共研為細面，黃米飯一兩打糊為丸，如菜菔子大，晒干（忌烘），用玻璃瓶封藏。

【劑量及用法】每服二錢，熱陳酒送下，醉復取汗，酒醒癰消。

【禁忌】忌腥辣發物，孕婦忌服。

十二、哈爾濱

【功能與主治】消腫解毒。主癰腫。

【處方】乳香（去油）沒藥（去油）各一兩 麝香一錢五分 牛黃五分 雄黃五錢

【制法】共研為細面，黃米飯一碗打糊為丸，如菜菔子大，晒干（忌烘）。

【劑量及用法】每服二錢，熱陳酒送下，醉復取汗，酒醒癰消。

【禁忌】孕婦忌服，忌食腥辣發物。

十三、呼和浩特

【處方】乳香 沒藥各一兩 雄黃五錢 麝香一分五

【制法】共為極細面，黃米糊為菜菔子丸。

附參考古方

【來源】廣增驗方新編。

【功能與主治】治疔瘡及一切火熱癰毒腫痛不已，立能消腫止痛，乃疔癰之聖藥。

【處方】乳香（制）沒藥（制）各一兩（制法見藥物備要） 麝香二分（不宜多） 雄精五錢。

【制法】共研細，用黃米飯一兩，和為丸，如粟米大晒干，忌火烘。

【劑量及用法】每服二錢，熱陳酒送服，蓋被取汗為妙。

【禁忌】孕婦忌服。

犀黃丸

一、北京

【功能與主治】解毒散癰化結。主乳巖癰癥，肺癰流注。

【處方】牛黃三分 麝香一錢五分 乳香 沒藥各一兩

【制法】每料用黃米麪七錢，打糊為小小丸。

【劑量及用法】每服一錢，日服二次，溫黃酒送下，溫開水亦可，按

病狀酌量增減。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天津

【功能與主治】解毒消腫，活瘀止痛。主瘡瘍癰疽，乳癰癰癥，潰瘍久不收口，癰核流注。

【處方】制乳香面一兩 牛黃三錢 麝香一兩五錢 制沒藥面一兩

【制法】共為細粉，每藥面一兩，用黃米面二錢蒸糊為小小丸，二錢重裝瓶。

【劑量及用法】每次服一瓶，黃酒送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、上海（牛黃醒消丸、西黃醒消丸）

【功能與主治】消散癰癥。

【處方】牛黃三分 麝香一錢五分 乳香（制）沒藥（制）各一兩

【制法】各取細粉，充分和勻，用六神麵打糊為丸，如高粱菜子大，低溫干燥。

【劑量及用法】每服一錢，溫開水送服，日服一、二次。

【禁忌】孕婦忌服。

四、南京

【功能與主治】消散。主初期癰癥痰核，流注疔瘡等症。

【處方】制沒藥 制乳香各一兩 麝香一錢五分 西牛黃三分

【制法】先將各藥末秤准，共乳極細，以煮爛黃米飯一兩，拌融和為小丸，如菜豆大，晒干，忌用火炒。

【劑量及用法】每服一至二錢，一日一次。

【禁忌】孕婦忌服。

五、武漢

【功能與主治】疔疽流注，癰癥痰核，婦人乳岩。

【處方】犀牛黃三分 麝香一錢半 乳香 沒藥各一兩

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，照淨粉量加淀粉百分之五十混合成丸，每錢不得少于五十粒。

【劑量及用法】每服一錢，日服二次，熱陳酒送下，開水亦可。患在上部，臨臥時服，在下部者，空腹時服。

【禁忌】孕婦忌服，或遵醫囑。

六、廣州（解毒犀黃丸）

【功能與主治】癰癥陰疽。

【處方】乳香三分 沒藥 乳香各一兩 牛黃三分

【制法】各藥和勻，研為細末，糯米煮糊，埋成小丸，每丸一錢。

【劑量及用法】熱陳酒送服或清茶送服，大人每次服一丸，小兒每次服半丸。

七、杭州（1）（西黃醒消丸）

【功能與主治】治癰疽發背、乳巖癰癥、流注橫痃、肺癰腸癰，一切無名腫毒、癰紅作痛之症，無不效。

【處方】麝香五分 西牛黃三分 制乳香 制沒藥各一兩

【制法】上藥各取淨粉研勻，用黃米飯搗和為丸，如綠豆大，晒干勿烘。

【劑量及用法】每服二至三錢，溫酒送下。

八、杭州（2）（外科西黃丸）

【功能與主治】治乳巖癰癥、痰核橫痃、流注肺癰、小腸癰毒等症。此丸熱解毒、消腫止痛，卓有奇效。

【處方】麝香六分 西牛黃四分 制乳香 制沒藥各一兩

【制法】上藥各取淨粉研勻，用煮爛黃米飯搗和為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二至三錢，溫酒送下。

九、南昌（犀黃丹）

【功能與主治】乳巖、癰癥痰核、橫痃流注、肺癰小腸癰等。

【處方】沒藥（去油）乳香（去油）各一兩 麝香一錢五分 西牛黃三分

【制法】共研細末，用粟米飯一兩搗和為丸，每丸一錢重，蜡壳封固。

【劑量及用法】成人每服一丸，熱陳酒送下。病在上部臨臥服，病在下部空腹服。小兒視年齡及病情酌減服。

【禁忌】孕婦忌服，戒食辛辣物。

十、沙市

【功能與主治】治療癰痰核，橫

流注等症。

【处方】牛黄一錢五分 麝香一錢 乳香(去油)一兩 沒藥(去油)一兩

【制法】先將乳香、沒藥各研秤准，再和牛黃、麝香共研，用煮爛黃米飯一兩，入藥末搗和為丸，如粟米大，晒干(忌烘)。

【劑量及用法】成人量每次服二錢，熱陳酒送下，患在上部者高臥時服，患在下部者空腹服。

【禁忌】無熱者忌用。

十一、重慶

【功能與主治】疔癰疽疔瘡，乳岩癰瘰，瘰癧惡核，橫痃流注，肺癰，一切腐爛陰疽。

【處方】牛黃一錢 麝香一兩五錢 乳香 沒藥各一兩

【制法】先將乳香、沒藥研為細末，再將牛黃、麝香滲入合勻，用黃米飯一兩搗和為丸，每重一錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每次服一丸。

十二、西安

【功能與主治】主治陰疽惡核，癰瘰乳岩，流注橫痃，肺癰小腸癰，一切潰瘍諸疔。

【處方】沒藥 乳香各一兩 牛黃 當門子各二分

【制法】先將沒藥乳香二味去油，和牛黃麝香一味共研勻，用黃米飯一兩搗如泥，與各藥末和勻為丸，如粟米大，用玻璃瓶裝，固塞瓶口，勿令洩氣。

【劑量及用法】成人每次服二錢，一日二次，瘡在上部，飯後半小時用熱陳酒送服，瘡在下部，臨臥時空心服，小兒酌減，開水化服。

【禁忌】忌辛辣諸刺激性食物，孕婦忌服。

十三、蘭州

【功能與主治】消腫，止痛，解毒。主瘡毒癰癤，紅腫堅硬。

【處方】乳香 沒藥各十一兩 牛黃一錢 麝香一兩五錢

【制法】共為細末，黃米糊小小丸。

【劑量及用法】內服每次二、三錢重，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

十四、濟南

【功能與主治】癰疽瘰癧，瘰癧瘰癧，如入乳瘡。

【處方】乳香 沒藥各一兩二錢 京牛黃二分 麝香一錢五分

【制法】共研細末，黃米適量為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服五分一錢至三錢，白開水送下。

【禁忌】辛辣等物，孕婦忌服。

十五、沈陽

【功能與主治】宣氣血，化凝滯，去腐生新。主癰疽疔瘡，乳岩癰瘰，橫痃流注，瘰癧肺癰，一切慢性寒性腐爛瘡瘍。

【處方】个牛黃二分 麝香一錢五分 乳香 沒藥各一兩

【制法】共碾極細面，黃米面一兩，搗和為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，用黃酒送下。

【禁忌】孕婦忌服。

十六、呼和浩特

(虔制犀黃丸)

【處方】乳香 沒藥 明雄各一兩 牛黃二分 麝香一錢 冰片一錢

【制法】共為細面，大黃面一兩五錢，打糊為小小丸。

附參考古方

【來源】外科証治全生集。

【功能與主治】凡患乳癌，癰瘰瘰癧，橫痃流注，肺癰小腸癰等毒。

【處方】乳香 沒藥末各一兩 麝香一錢五分 西牛黃二分

【制法】共研和，取黃米飯一兩搗爛，入木杵搗，為人，如羅蔔子大，晒干，忌烘。

【劑量及用法】每服三錢，熱陳酒送下，患生上部臨臥服，下部空心服。

陽和丸

南京

【功能與主治】溫散。主陰疽慢腫平塌，皮色如常，久不潰散。

【處方】肉桂一兩(去粗皮) 麻黃五錢 炮姜炭五錢

【制法】共研細末，用溫沸水泛

為丸，每錢約做一百粒。

【劑量及用法】每服一錢，一日一次，開水吞服。

瘡科保安丸

呼和浩特

【處方】銀花二兩 貝母五錢 歸尾五錢 紅花五錢 乳香三錢 沒藥三錢 生芪四錢 熟地四錢 麻黃二錢 防風二錢 花粉五錢 赤芍三錢 白芷一錢 牛膝四錢 地龍三錢 山甲三錢 石決明三錢 血竭三錢 雄黃五錢

【制法】每料兌麝香冰片，蜜大丸重二錢，硃衣結皮。

瘡科蝦蟆丸

福州

【功能與主治】治一切頑癬疥癬，風毒濕癩等症。

【處方】防風二兩 當歸二兩 薄荷二兩 白芍二兩 大黃二兩 石膏二兩 麻黃二兩 連翹二兩 芒硝二兩 甘草十二兩 枯芩四兩 枯梗四兩 梔子二兩 人楓肉二兩 荆芥一兩二錢 蒼朮二兩 滑石十二兩 川芎二兩 川連四兩 百草霜二兩 蝦蟆一百頭

【制法】上方二、一味，共研細末，水泛為丸。

大麻風丸

杭州

【功能與主治】治風濕相乘，惡血凝滯，成大麻風，週身不仁，紅斑破爛，遍身如癬，惡症。

【處方】陳皮二錢 當歸二錢 防風二錢 白芷二錢 荆芥二錢 海桐皮二錢 苦參二錢 羌活二錢 茅蒼朮二錢 明天麻二錢 海風藤二兩 廣木香二錢 秦艽二錢 薤米仁二錢 生甘草二錢 川續斷二錢 川牛膝二錢 連翹二錢 桂枝一錢 大紅棗四枚 生姜二片(以上共煎汁泛後丸藥用) 大胡麻二十兩 小胡麻二十兩 白朮參二十兩 苦參一六兩 防風八兩 荆芥八兩 全當歸六兩 茅蒼朮六兩 薤米仁四兩 川續斷四兩 川牛膝四兩 大風子霜十兩

【制法】共研極細末，用煎藥汁

泛丸。

【剂量及用法】每服二至三錢。用細芽茶湯送下，日服三次。

【禁忌】忌房事，厚味動風之物。

小金丸

武漢

【功能与主治】痰核流注，癰疽腫毒，瘰癧乳癌，橫痃，貼骨疽等症。

【处方】白膠香一兩半 麝香二錢 地龍一兩半 制草烏一兩半 陳香墨一錢二分 當歸身七錢半 木別子(制)一兩半 乳香(去油)七兩半 五靈脂一兩半 沒藥(去油)七兩半

【制法】取上藥除麝香外，進行干燥，混合碾細，按淨粉量加50%淀粉，送成小丸，每錢五粒，蜡壳封固。

【剂量及用法】日服二次，每服四分，黃酒送下，溫開水亦可。

【禁忌】孕婦忌服。

千里追風丸

西安

【功能与主治】痰核流注，風濕疼痛，疽發背疔等症。

【处方】生川烏三兩 草烏三兩 沒藥四兩 龍衣五兩 南星三兩 走司馬七兩 歸身五兩 蜈蚣八个 梅片五分 琥珀二兩 生半夏三兩 明雄一兩 麝香一錢 全蠍十五个 殭蚕二兩 天麻五兩 乳香四兩

【制法】上十七味，分別搗研細末，煉蜜為丸，硃砂為衣，每丸五分，黃蜡固封。

【剂量及用法】成人體壯者，每次可服一丸至二丸，體弱者減半，生薑葱白煎湯送下，中病即止服，小兒按年齡遞減，不可過量。

【禁忌】此藥為治神經痛風劑，又為鎮痙藥，其性峻猛，用時宜慎，不可亂服，孕婦忌服。

海龍丸

沈陽

【功能与主治】軟堅和血化核。主各種瘰癧硬堅，瘡毒內陷。

【处方】海藻 昆布 白茯苓 山山甲各二兩 全蠍三錢 胆草一兩五錢 當歸身一兩 核桃仁三錢

【制法】共碾極細面，蕎麥面打糊為丸，一分重。

【剂量及用法】每服二錢，熱或溫酒送下，日服二次。

【禁忌】孕婦忌服。

附參考古方

【来源】瘍醫大全。

【处方】海藻(酒洗炒) 昆布(酒洗炒) 白茯苓(炒) 穿山甲(炒)各二兩 全蠍一百个(尾全者) 龍胆草(酒洗炒)一兩五錢 當歸身(炒)一兩 核桃五十个(劈開去肉，將全蠍嵌在核內合緊，煨存性)

【制法】研細，蕎麥面打糊為丸，桐子大。

【剂量及用法】每早晚白湯送下三錢，酒下亦可。

芩芳丸

一、上海

【功能与主治】消瘰癧。

【处方】芩芳干一百兩

【制法】研細粉，用陳海蜃(漂淡)十兩，荸薺十兩，煎湯泛丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每服三錢，溫開水送服。

二、杭州(蹲鴟丸)

【功能与主治】治新久瘰癧，結核，浮腫，硬塊疼痛，小兒弱體每多此症，已潰未潰，皆可常服。此丸消痰軟堅，化毒生肌，頗具卓效。

【处方】香梗芩芳(淨粉)十斤

【制法】切片晒干，研為細末，用漂淡陳海蜃一斤、大荸薺一斤煎湯泛丸。

【剂量及用法】每服一錢。開水送下。

經驗瘰癧丸

天津

【功能与主治】活血除濕，消瘰散結。主各種瘰癧，濕痰結核，紅腫疼痛，皮色不變，堅硬不消，或潰破流水，經久不愈，纏綿不已。

【处方】制山甲一斤十四兩 當歸尾二兩 荆芥一兩 防風八錢 蛇蛻一錢 公英一兩二錢 茅茨菇一兩二錢 制首烏一兩二錢 大黃

瘰癧丸

桔梗 連翹(去心)各一兩 漏蘆 菊花各一兩二錢 制乳香 蟬蛻各一兩 陳皮一兩二錢 炒殭蚕一兩五錢 羌活八錢 黃芩一兩 川貝 牛黃仁 茄根 地丁各一兩二錢 全蠍一兩 生阿膠二兩 黃草 柴胡 鼠婦虫各一兩二錢 制沒藥一兩 甘草 橘叶 銀花各一兩二錢 蛤蚧尾十对 共三十三味，共為細粉，每細粉四兩二兩六錢(蛤蚧尾分量未計在內)兌：雄黃面四錢 麝香一錢五分

【制法】以上研細和勻，用紫草茸、紅花、牙皂角、蘇木各四兩煎汁，再兌醋四兩泛小丸，二錢重裝袋。

【剂量及用法】每次服一袋，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

瘰癧疏肝丸

南京

【功能与主治】主瘰癧乳癰。

【处方】川貝母 山茨菇 茜草 廣陳皮 生甘草 茄蒂 蒲公英 連翹 漏蘆 鼠婦虫 瓜蒌仁 金銀花 柴胡 白菊花 制何首烏 地丁草 橘叶以上十七味各重一兩

【制法】上藥共研細末，以夏枯草二兩煎湯泛為丸，每錢約做八十粒。

【剂量及用法】每服二錢，一日二次，開水吞服。

消瘰丸

一、福州

【功能与主治】治陰虛火盛，灼液成痰，痹于絡，致生頸項瘰癧串馬刀瘰癧等症。

【处方】元參 浙貝 牡蠣等分

【制法】共研末，夏枯草泛丸。

【剂量及用法】每服一錢，夏枯草湯送下。

二、南昌

【功能与主治】治肝火挾痰，項生瘰癧。

【处方】元參四兩 牡蠣(醋研)四兩 真川貝母(去心)四兩

【制法】共研細面，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】早晚各三錢，開

水送下，小兒視年齡及病情酌減服。

【禁忌】煎炒助燥之品。

三、西安 (瘰癧內消丸)

【功能与主治】主治瘰癧陰疽初起，結核皮色不變，按之則疼或不疼等症。

【处方】元參一兩 川貝一兩 牡蠣二兩 夏枯草二兩

【制法】上四味分別搗研細末，羅過，水泛為丸，如小椒大。

【劑量及用法】成人每服二錢，一日二次，溫開水飯前服，小兒酌減。

【禁忌】戒房事、怒郁及生冷食物。

四、濟南

【功能与主治】淋巴結核，已破未破等症。

【处方】貓頭骨（全的帶牙的最好將貓骨用瓦微火焙干研細面）

【劑量及用法】將貓頭骨一個分六次，用黃酒每次一兩合開水送下，服三次即愈，如服三次不愈者再服一次，均用黃酒開水送下，蓋被出汗即愈。

【禁忌】食醋，牛羊肉，鷄子等，忌三年。

五、沈陽

【功能与主治】散癰瘤，消瘰癧，消火除痰。主頸項結核。

【处方】生牡蠣 玄參 貝母各四兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】蔥蒜辛辣食品。

附參考古方

【来源】醫學心悟。

【功能与主治】瘰癧。

【处方】元參（蒸） 牡蠣（煨、醋研） 貝母（去心，蒸）各四兩

【制法】共為末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢，開水送下，日二服。

海藻丸 (內消瘰癧丸) 杭州

【功能与主治】治肝經郁熱，痰滯經絡，頸項結核，瘰癧癰瘤，堅硬腫痛，時發寒熱之症，久服自能消散。

【处方】海藻十六兩

【制法】漂淨研細末，用鹽梅一兩，煎湯水泛丸。

【劑量及用法】每服二錢，開水送下。

內消瘰癧丸

一、北京

【功能与主治】消堅散結。主瘰癧堅硬，皮色不變，或腫或疼。

【处方】夏枯草八兩 玄參 大青鹽各五兩 海藻 貝母 薄荷 天花粉 蛤壳 白蘞 連翹 大黃（制） 甘草 牛地 桔梗 枳壳 當歸 玄明粉 牡蠣（生）各一兩

【制法】共為細粉，水泛小丸，滑石為衣，圓亮。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌食牛肉，孕婦勿服。

二、上海(瘰癧丸)

【功能与主治】消瘰癧

【处方】玄參五兩 海藻 薄荷 天花粉 連翹 甘草 桔梗 枳壳（炒） 海粉各一兩 青鹽五兩 象貝母 牛地 白蘞 大黃（制）各一兩 夏枯草八兩 當歸 芒硝各一兩

【制法】除夏枯草芒硝外，將余藥共研細粉，用夏枯草煎湯，芒硝化水泛丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二錢，溫開水送服。

三、天津

【功能与主治】消堅化痰。主頸項癰瘤，瘰癧未破，堅硬腫痛，服之有內消之功。

【处方】夏枯草八兩 元參（去蘆）五兩 青鹽五兩 海藻 浙貝母 薄荷 花粉 煨蛤粉 白蘞 連翹（去心） 熟軍 甘草 生地 桔梗 枳壳（麸炒） 當歸 元明粉各一兩

【制法】共為細粉，涼開水泛小丸，二錢重裝袋。

【劑量及用法】每次服一袋，白開水送下。

四、武漢

【功能与主治】瘰癧硬腫未潰。

【处方】夏枯草八兩 元參五兩 青鹽五兩 海藻一兩 川貝母一兩 薄荷叶一兩 天花粉一兩 海蛤粉一兩 白蘞一兩 連翹一兩（去心） 熟大黃一兩 生甘草一兩 牛地黃一兩 桔梗一兩 枳壳一兩 當歸一兩 硝石一兩

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于三十粒。

【劑量及用法】每服二錢，臨臥時開水送下。

【禁忌】孕婦忌用，或遵醫囑。

五、重慶

【功能与主治】治瘰癧結核。

【处方】夏枯草八兩 玄參五兩 青鹽五兩 海藻一兩 浙貝母一兩 薄荷一兩 天花粉一兩 白蘞一兩 連翹一兩 熟大黃一兩 生甘草一兩 生大黃一兩 桔梗一兩 當歸一兩 枳壳一兩 硝石一兩

【制法】除青鹽硝石外，余藥共研細末，用青鹽硝石酒化泛丸，紙盒包裝。

【劑量及用法】每次一錢。

六、蘭州

【功能与主治】除熱化痰、消炎解毒。主瘰癧癰瘤，凡屬兩耳前後、頸腋、下腫脹結核，瘰癧如珠，堅硬疼痛，服此藥可以消散。

【处方】昆布四兩 木香四兩 細辛二兩 甘草四兩 海藻四兩 二錢四兩 香附四兩 元參一兩 蛤粉四兩 莖朮四兩 南星二兩 川貝三兩 海硝四兩 桔梗四兩 白芷四兩 夏枯草四兩 海帶四兩 海螺二兩

【制法】細面，水小丸。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】房事。

七、濟南

【功能与主治】主瘰癧未潰。

【处方】元参六兩 甘草二兩 昆布二兩 海藻四兩 烏藥二兩 青皮二兩 柴胡一兩(醋炒) 川貝母二兩 白芍一兩五錢 夏枯草四兩 牡蠣八兩(开水浸,鹽水泡煮七次)

【制法】共研細末,醋水为丸,如綠豆大。

【剂量及用法】每服二錢,白开水送下。

【禁忌】辛辣油膩生冷等物。孕妇忌服。

八、沈陽

【功能与主治】軟坚化核解毒。主瘰癧未成則消,已成則潰。

【处方】夏枯草八兩 玄参五兩 青鹽五兩 海藻 貝母 当归 薄荷 花粉 海粉 白蘇 連翹 朴硝 熟大黃 生甘草 牛地 桔梗 枳壳各一兩

【制法】共碾極細面,酒糊为小丸。

【剂量及用法】每服二錢,临臥时白开水送下。

九、承德

【功能与主治】瘰癧未潰。

【处方】同上海。

【制法】除夏枯草芒硝外,將余药共为細粉,用夏枯草煎湯,芒硝化水为丸,如綠豆大。

【剂量及用法】每服二錢,温开水送服。

【禁忌】孕妇忌服。

十、呼和浩特

【处方】牡蠣二十四斤 元参十八斤 甘草 昆布 海藻 烏藥 青皮 柴胡 胆草 白芍 枯草各二斤四兩

【制法】水泛小丸。

附参考古方

【来源】瘍医大全。

【功能与主治】瘰癧。

【处方】夏枯草八兩 元参 青鹽各五兩 海藻 川貝母 薄荷叶 天花粉 海粉 白蘇 連翹(去心) 熟大黃 生甘草 生地 桔梗 枳壳 当归 硝石各一兩

【制法】共磨細,酒糊丸,桐子大。

【剂量及用法】临臥白湯送下三錢。

消瘰五海丸

一、西安(消瘰七海丸)

【功能与主治】主治瘰癧初起,肉色不变,漸長漸大即用此药。

【处方】海帶 海藻 海蛤 海螵蛸 昆布 大貝 木香以上七味各五錢

【制法】上七味分別搗研極細末,煉蜜为丸,每丸三錢,蜡皮包封。

【剂量及用法】成人每服一丸,飯前温开水送下,或煎一丸当茶饮,一日三次,小兒酌減,外用櫻桃核好醋磨敷患处。

二、济南

【功能与主治】粗脖瘰癧,瘰癧等症。

【处方】同西安。

【制法】共为極細粉,煉蜜为丸,重三錢,蜡皮封固。

【剂量及用法】成人每服一丸,飯前温开水送下,或煎一丸,当茶饮,一日三次,小兒酌減,外用櫻桃核好醋磨敷患处。

三、沈陽

【功能与主治】消瘰化坚,破瘀散滯。主一切缺碘質淋巴腺腫脹。

【处方】海藻 海螺 昆布 海帶 海蛤粉各三兩 川芎 木香各五錢

【制法】先取海藻海螺等七种药料,用炕箱干燥后,碾成極細末,称足分量,然后将夏枯草俾量煎濃汁合煉蜜为丸即得。每丸重三錢

【剂量及用法】成年人每服三錢,十五岁至十岁服一錢五分,十岁以下酌減。

【禁忌】孕妇忌服,忌与甘草同服。

四、撫順

【功能与主治】結核病,化坚消腫。主瘰癧結核,气類瘰癧,皮色不变,逐日增大,結于頸間;結于腋窩,按之坚硬,推之不移,以及乳結腫痛,寒熱往來等症。

【处方】海藻 海帶 海蛤 海

瘰 川芎 昆布各一兩 广木香三

錢

【制法】共为細面,蜜丸二錢重。

【剂量及用法】每日早晚服一丸,白水送下。

【禁忌】孕妇勿服,忌辛辣酒類。

五、吉林(五海丸、五海瘰癧丸)

【功能与主治】軟坚化核,消腫散瘀,活血舒气。主瘰癧瘰癧,气胖乳核,無名腫毒等症。

【处方】海帶二兩 海藻二兩 海螵蛸二兩 昆布二兩 浮麦二兩 白芷一兩 广木香二錢 海粉二兩

【制法】共为細末,煉蜜为丸,二錢重

【剂量及用法】大人每服一丸,九岁至六岁每服半丸,五岁至兩岁每丸分三次服。一日二次,早晚用开白水送下。

六、哈尔滨(五海瘰癧丸、瘰癧五海丸)

【功能与主治】軟坚消腫化核。主瘰癧,結無定处,軟柔不疼,皮色不变,無寒無熱,逐日增大,終釀大患。瘰癧,瘰癧鼠瘻,結于項間,內有硬核,推之不动,皮色不变,膿尚未成,此丸可消,若膿已成,則非所宜。气胖,項下腫滿,按之虛軟,不痛不痒,皮色如故,气促噎食。乳核,乳核腫痛,寒熱往來,勢轉乳瘻。此丸可消無名腫核,气血痰濕各种核腫。主瘰癧瘰癧,气胖乳核,無名核腫。

【处方】同吉林。

【制法】共碾为細面,煉蜜为二錢一分重丸。瓷罇存貯。

【剂量及用法】每日早晚各服一丸,白水送下,以全消为度。

【禁忌】孕妇忌服,勿食生冷油膩發物。

七、承德(五海丸)

【功能与主治】瘰癧初起,肉包不便。

【处方】海帶十二兩八錢 昆布六兩四錢 海藻十二兩八錢 海蛤粉三兩二錢 大貝三兩二錢 桔梗六兩四錢 夏枯草二兩二錢 陈皮

六兩四錢 檳榔六兩四錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，每丸重一錢。

【劑量及用法】成人每服一丸，飯前溫開水送下，或煎一丸為茶飲，一日三次，小兒酌減，外用櫻桃核好醋研磨敷患處。

【禁忌】孕婦忌服。

消癭順氣丸

呼和浩特

【處方】地貝母 海粉 海藻 昆布 海蜇各四兩 夏枯草八兩 海石四兩

【制法】共為細面，水泛小丸。

二分丸

北 京

【功能與主治】清熱消毒止痛。主熱毒下注，痔瘡作癢腫痛。

【處方】蒼朮 荊芥穗 山藥 蜂房 苦參 蒺藜(炒)各十六兩 馬錢子三十二兩(炒) 槐花八兩 穿山甲八兩(炙) 胡黃連八兩 刺楸皮八兩(炙)

【制法】共為細粉，水泛小丸，滑石為衣闔亮。

【劑量及用法】每服五分，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌食辛辣之物，孕婦忌服。

臟連丸

一、天 津

【功能與主治】潤腸清熱，止血通便。主痔瘡便血脫肛，大便秘結。

【處方】黃芩十五斤 生槐角十斤 生地七斤八兩 炒槐花七斤八兩 赤芍 生阿膠各五斤 地榆炭七斤八兩 當歸 芥穗各五斤 黃連二斤八兩

【制法】用豬大腸頭一百段，將群藥中粗末裝入腸內，兩頭紮緊蒸熟晒干，共為細粉，煉蜜為丸，二錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

二、上 海

【功能與主治】痔瘡。

【處方】黃連(酒炒) 豬大腸各八兩

【制法】將豬大腸洗淨煮爛，加黃連粉打勻，焙干，研細粉，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服一錢五分至三錢，食前溫開水送服。

【禁忌】忌食辛辣刺激性食物。

三、南京(榆槐臟連丸)

【功能與主治】清熱潤燥。主腸風下血，痔瘡腫痛。

【處方】槐米三兩 地榆二兩 川黃連三兩 炒荊芥二兩 黃柏三兩 薄荷二兩 淡黃芩二兩 橡碗元一兩五錢 烏梅二兩

【制法】上藥九味共研細末，用豬大腸一具煮爛，加煉白蜜為丸，每錢約二十粒。

【劑量及用法】每服三錢，一日一次，開水吞服。

四、武漢(腸連丸)

【功能與主治】大便下血，肛門墜腫。

【處方】黃連八兩(酒炒) 鮮公豬大腸八兩(洗淨)

【制法】將大腸洗淨，填入黃連細粉煮爛，打勻，焙干再碾細，照淨粉量加淀粉40%，用適量之水迭成小丸，每錢不得少于三十粒。

【劑量及用法】每服一錢半至二錢，食前開水送下。

【禁忌】忌食辛辣食物。

【備考】鮮公豬大腸，既不易得，又難辨認，且對便血脫肛的治療亦無特殊意義，故操作時可改用鮮豬大腸。

五、福 州

【功能與主治】治近年近日腸風，臟毒下血。

【處方】大鷹爪黃連八兩 槐米二兩 枳殼一兩 防風 粉草 槐角 香附 牙皂 木香各五錢

【制法】上用陳蒼米三合，同香附一處為末，外藥共為細末，用豬大腸約長一尺，洗淨裝入米附縛定，量用水，置沙鍋內炭火煎干，即添水，慢火煎爛如泥，取起和藥，搗丸梧

子大。

【劑量及用法】空心米飲下七八十丸，一料病瘳。

【禁忌】忌麵蒜生冷煎炙之物。

六、杭州(治痔臟連丸)

【功能與主治】治大腸濕熱，大便下血，日久不止，多食易飢，新久諸痔，痛癢皆作，肛門墜腫以及臟毒等症。

【處方】川黃連八兩 公豬大腸二尺

【制法】將黃連研細，裝入腸內，兩頭用線紮緊，加酒以猛火煮爛，搗和為丸。

【劑量及用法】每服二至四錢，溫酒或米飲湯或開水送下，久服除根。

【禁忌】若血色晦淡屬虛寒者忌之。

七、沙 市

【功能與主治】大便下血，日久不止，多食易飢，腹不痛，里不急，肛中墜痛等症。

【處方】黃連六兩 槐米一兩 地榆一兩

【制法】上藥共研細末，用豬大腸二尺許，洗淨將藥末裝入腸內，兩頭紮緊入砂鍋內，酌用水若干，炭火煮干即添水，慢慢煮爛，切片晒干碾末，陳倉米糊為丸。

【劑量及用法】成人量每次服三錢，空腹米湯下，每日一次，小兒老人及體弱者酌減。

【禁忌】血色晦淡，體質虛寒者忌服。

八、重 慶

【功能與主治】治腸風毒臟下血。

【處方】黃連八兩 槐花二兩 枳殼一兩 防風五錢 甘草五錢 槐角五錢 香附五錢 豬牙皂角五錢 廣木香五錢 陳倉米八兩 豬大腸八五尺

【制法】先將香附陳倉米碾末，裝入豬大腸內，入砂鍋內漫火煮爛，至豬腸如泥取出，再入黃連等末，煉蜜為丸，紙盒包裝。

【劑量及用法】四錢至五錢。

【禁忌】麵蒜生冷煎炒。

九、大 同

【功能与主治】腸風下血，痔漏下血，大便燥結。

【处方】黄芩十五斤 槐角十斤 槐花 地榆 生地各七兩半 赤芍 阿膠 归尾 芥穗 黃連各二斤半

【制法】共軋細面，蜜为丸。

【剂量及用法】每服二錢，白水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

十、禹 县

【功能与主治】痔漏腫痛，腸風下血，脫肛疼痛，腸風臟毒，定痛消毒，退管生肌。

【处方】川黃連八兩 槐花米二兩 枳壳一兩 防風五錢 粉甘草五錢 槐角五錢 香附五錢 猪牙皂角五錢

【制法】猪大腸二尺長，裝入香附等藥，縛口入沙鍋內，慢火煮爛搗糊，入黃連末为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二次，每次服二錢，白开水送下，五岁至十岁服一錢。

【禁忌】寒症忌用。

【备考】有效期一年。

十一、濟 南

【功能与主治】痔瘡便血。

【处方】黃連四兩 生地六兩 当归三兩 川芎二兩 白芍二兩 赤芍三兩 槐角二兩(炒) 槐米二兩(炒) 山甲二兩(土炒)

【制法】前藥九味，共研粗末，黃酒拌勻，裝入猪大腸內，兩端紮緊，上鍋蒸熟，再剖開晒干，同入腸共研細面，煉蜜为丸桐子大。

【剂量及用法】每服三錢，每日一服，每日晨飯前空腹，白开水送下。

【禁忌】烟酒辛辣 刺激腥羶等物，並戒房勞，孕婦忌服。

十二、青 島

【处方】黃芩十五斤 槐豆十斤 槐花七斤半 生地七斤半 赤芍五斤 阿膠五斤 地榆七斤半 归尾五斤 荆穗五斤 黃連二斤半

【制法】共軋面，蜜小丸。

十三、青 島

【处方】生地四兩 槐豆四兩 当归三兩 川芎一兩 白芍一兩 赤芍一兩 川連一兩 槐米二兩 山甲一兩五

【制法】共合用酒拌勻，裝入猪大腸內，兩頭扎住，蒸熟切片，晒干共軋面，煉蜜为小丸。

十四、沈 陽

【功能与主治】痔漏腸風，臟毒腫痛，腸風下血，大便重墜，腰痛無力等症。

【处方】川黃連八兩

【制法】共碾極細面，納入公猪肥大腸內，長一尺二寸，洗淨兩端紮住，用黃酒二斤五兩，置沙鍋內煮至酒干为度，搗乱为小丸。

【剂量及用法】每服二錢，空心淡鹽湯送下。

【禁忌】五辛發物，房事。

槐 角 丸

一、北 京

【功能与主治】疎風涼血，瀉熱潤燥。主腸風下血，痔瘡痛痒。

【处方】槐角一百四十四兩 槐花九十六兩 枳壳四十八兩 紅花十二兩 地榆炭九十六兩 当归四十八兩 黃芩九十六兩 赤芍四十八兩 生地九十六兩 防風四十八兩 大黃四十八兩 荆芥穗四十八兩

【制法】共为細粉，煉蜜为小丸。

【剂量及用法】每服三錢，日服二次，溫开水送下，空腹服。

【禁忌】忌食辛辣厚味，孕婦忌服。

二、天 津

【功能与主治】消腫、解毒、止血。主痔漏下血，肛門腫痛，腸熱便秘。

【处方】生槐角四斤八兩 芥穗一斤八兩 地榆炭一斤 生地 黃芩各一斤 大黃一斤八兩 炒槐花一斤 紅花六兩 归尾一斤八兩 赤芍一斤八兩 防風一斤八兩 枳壳(麸炒)一斤八兩 共十二味，二十五斤十四兩

【制法】共为細粉，涼开水泛小

丸，三錢重裝袋，或煉蜜为丸三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】水丸 每次服一袋，蜜丸每次服一丸，白开水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、上 海

【功能与主治】痔血，便血。

【处方】槐角四兩 防風二兩 当归二兩 枳壳(炒)二兩 黃芩二兩 地榆(炒焦)二兩

【制法】共研細粉，煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢至三錢，食前溫开水送服。

四、南 京

【功能与主治】主痔漏腫痛，火盛便血。

【处方】同上海。

【制法】上藥六味，共研細末，加煉白蜜为丸，每錢約做二十粒。

【剂量及用法】每服三錢，一日二次，空腹時開水吞服。

五、武 汉

【功能与主治】腸風瀉血，風熱濕痒，內痔外痔，瘡癰脫肛。

【处方】槐角四兩(炒，去梗) 黃芩 防風各二兩(麸炒) 当归二兩(酒焙) 枳壳二兩(麸炒) 地榆二兩(酒焙)

【制法】取上藥进行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜 61—62% 迭成小丸，每錢不得少于二十五粒。

【剂量及用法】每服三錢，米湯下。

六、杭州(腸風槐角丸)

【功能与主治】治大腸熱盛，腸紅下血，濕熱郁積，痔漏臟毒等症。

【处方】槐角二兩 炒枳壳一兩 当归(酒制)一兩 地榆炭一兩 防風一兩 黃芩(酒炒)一兩

【制法】共研細末，酒調米糊打丸。

【剂量及用法】每服三錢。空腹時米飲湯或開水送下。

七、南昌(地榆槐角丸)

【功能与主治】大便下血。

【处方】当归(酒制)二兩 地榆二兩 防風二兩 炒槐角四兩 黃

芩二兩 炒枳壳二兩

【制法】共研細面，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】日服二次，每服三錢，開水送下。

八、昆明

【功能與主治】內外痔瘡，大腸出血。

【處方】槐角八兩 地榆八兩 荆芥八兩 側柏叶八兩 枳壳八兩 防風七兩 當歸八兩 炒黃芩八兩 蒼朮八兩 生地八兩 甘草六兩

【制法】水疊為丸。

【劑量及用法】每服二錢半，開水送服。

【禁忌】除痔瘡下血外，其餘血症無效。

九、西安

【功能與主治】主大腸痔漏下血。

【處方】槐角四兩 枳壳二兩 當歸二兩 地榆二兩 防風二兩 黃芩二兩

【制法】細末，蜜丸。

【劑量及用法】每服三錢，一日二次，飯前開水送下。

十、蘭州(地榆槐角丸)

【功能與主治】消腫，解毒，止血。主痔漏下血，肛門腫痛，腸熱便秘。

【處方】同天津。

【制法】以上軋細面，水打小丸。

【劑量及用法】每次服用二錢重，白開水送下，每日早晚各服一次。

十一、大同

【功能與主治】去風消毒，解熱涼臟，和血止血潤燥。

【處方】槐角一兩 枳壳六錢 黃芩五錢 黃連三錢 黃柏七錢 荆芥六錢 防風五錢 地榆五錢 歸尾六錢 栝叶五錢

【制法】共軋細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

十二、濟南

【功能與主治】痔漏腫痛，大便

下血。

【處方】槐角三兩 地榆二兩 黃連一兩 黃芩二兩 烏梅一兩四錢 黃柏二兩 生地二兩 當歸三兩 川芎一兩 防風二兩 荆芥二兩 側柏炭三兩 枳壳二兩

【制法】共為細末，煉蜜為丸，如桐子大。

【劑量及用法】成人每服二錢，病重每日二次，白開水送下。

【禁忌】辛辣刺激等食物，孕婦忌服。

十三、青島

【處方】槐角九斤 槐花六斤 枳壳三斤 紅花十二兩 地榆六斤 歸尾三斤 黃芩六斤 赤芍三斤 生地六斤 防風三斤 大黃三斤 荆芥一斤

【制法】共軋細面，水法小丸

十四、沈陽(槐角地榆丸)

【功能與主治】清熱止血，消炎除痛。主大腸積熱，先便後血或先血後便，痔漏破裂，淋漓下血，紅痢疼痛，灼熱腸炎。

【處方】槐角二兩 地榆二兩 赤芍 炒梔子 枳壳各一兩 黃連二兩 荆芥一兩 生地黃二兩 紅花 防風 當歸各一兩 槐花二兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空心白開水下。

【禁忌】辛辣發物。

十五、撫順(槐角地榆丸、地榆丸)

【功能與主治】清熱涼血。主腸風便血，大腸積熱，絡脈受傷，先血後便，症名近血，痔瘡下血，痔瘡破裂，淋漓下血，搔痒難堪，疼痛異常。

【處方】槐角八兩 防風四兩 黃柏六兩 當歸四兩 大芩四兩 枳壳四兩 地榆炭四兩 山梔四兩 熟軍四兩 黃連二兩 生地四兩 黃芩四兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服二錢，米湯或開白水送下。

【禁忌】忌食辛辣。

十六、哈爾濱(槐角地榆丸、地榆丸)

【功能與主治】清腸涼血，祛風解毒。主腸風便血，痔瘡下血。

【處方】槐角四兩(去梗炒) 枳壳(麸炒) 當歸(酒制) 地榆 防風 黃芩各二兩

【制法】共碾為細面，酒糊或神麵糊(吉林或面糊)為小丸，如梧桐子大。瓷罇存貯。

【劑量及用法】每服二錢，空腹時米湯或熱湯送下。

【禁忌】忌食辛辣。

十七、呼和浩特(地榆槐角丸)

【處方】槐角 生地 黃芪 全歸各四斤 川芎一斤 阿膠 白芷各一斤 黃連 黃芩 枳壳 秦艽 防風 連翹 地榆 升麻各二斤

【制法】共為細面，蜜小丸。

附參考古方

【來源】1. 瘍醫大全。

【功能與主治】痔漏

【處方】槐角子 槐花各八兩 板榔四兩 黃芩二兩 刺楸皮二個(酒浸焙)

【制法】共為細末，煉蜜丸，桐子大。

【劑量及用法】每空心白湯送下一百丸。

2. 沈氏尊生書：雜病源流犀燭。

【功能與主治】便血。

【處方】槐角(去梗炒)一兩 地榆 酒當歸 麸炒枳壳 防風 黃芩各五錢

【制法】酒糊丸。

【劑量及用法】米飲下五十丸。

痔瘡丸

吉林

【功能與主治】清熱、消毒、止痛。痔瘡。

【處方】炙獾皮 槐花 雙花各六錢七分 板榔 歸尾各一錢七分 黃連五錢 赤芍 乳香 防風 白芷各一錢 沒藥 甲珠 廣木香各五分五厘 紅花一錢四分 甘草七分

【制法】將以上藥品共碾細面，

用煉蜜制成小丸，除包裝保貯外，用玻璃瓶或瓷罇保存。

【劑量及用法】每服二錢，用白開水送下。

愈痔丸

沈陽

【功能與主治】消腫排膿，化腐生新。主內痔外痔、疼痛流水，結核不消，潰爛成膿，日久生管，肛門腫痛。

【處方】石蓮子 制大黃 象牙 槐角各一兩 黃連 黃芩 赤芍 川芎 黃柏 當歸 懷牛膝各一兩 蛇蛻 全蠍各五錢 京墨三錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】辛辣油膩。

除痔丸

沈陽

【功能與主治】清熱利濕，止血生肌。主治瘡痔漏痔出血，肛痛肛痒脫肛，肛門濕疹，肛門破裂。

【處方】夏枯草 槐花 連翹 粉甘草各四兩 西紅花一兩 金銀花一斤

【制法】前五味共碾極細面，再加金銀花煎濃汁蜂蜜膏，和煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】辣腥刺激品。

神效化痔丸

呼和浩特

【處方】象皮五錢 獾皮二兩 蜂房五錢 乳香三錢 沒藥三錢 血竭五錢 火硝三錢 姜蚕三錢 黃蜡五錢

【制法】共細面，黃蜡化開兌入拌勻，糊小丸。

諸痔脫管丸

沈陽

【功能與主治】化痰解毒止痛。主大腸毒熱，內外諸痔，脫肛便血，

肛門痛痒，痔漏生管，膿血淋漓。

【處方】蜂房八錢 獾皮二兩五錢 血竭花一兩 制象牙二兩五錢 殭蚕 木香 蟬退各一錢五分 火硝一錢 乳香 沒藥各一錢五分

【制法】共碾極細面，煉蜜和黃蜡二兩熔化為小丸。

【劑量及用法】每服一錢，空心白開水送下。

【禁忌】發物，孕婦忌服。

【備考】劇藥。

痔漏丸

一、南京

【功能與主治】主痔漏。

【處方】石蓮肉三兩 當歸一兩 冬青子三兩 淡黃芩一兩 槐角二兩 川黃柏一兩 象牙屑二兩 熟大黃一兩 川黃連一兩 龍衣五錢（去尾頭） 川芎一兩 全蠍五錢 炒懷牛膝一兩 陳黑墨二錢 赤芍一兩

【制法】上藥十五味，共研細末，加煉白蜜為丸，每錢約做二十粒。

【劑量及用法】初服每次三錢，早晨開水吞服，服至七日後，每次改為二錢五分，服至十四日後，每次改為一錢，服至二十一日後，每次改為一錢五分。

二、沙市

【功能與主治】治濕熱下注，大腸痔漏腫痛，腥臭粘液点滴時下，經久不愈等症。

【處方】刺獾皮一兩 槐米八兩 黃連 黃柏各一兩 當歸八兩 地榆四兩 乳香 沒藥 穿山甲（炮）各一兩

【制法】上藥研極細末，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】成人量每次服三錢，飯前溫開水下，每日服二次。

【禁忌】體弱久痔，肛門虛墜而無炎症者忌服。

三、濟南

【功能與主治】痔漏肛門腫痛作痒，及已潰粘液淋漓，或大便秘結出血。

【處方】大黃八兩 槐角八兩 黃連八兩 當歸尾八兩 桃仁六兩 象牙屑六兩 郁李仁六兩 芒硝六

瘡瘍類

兩 石決明六兩 荆芥穗一兩 雄黃一兩 沒藥一兩 乳香二兩 刺獾皮二兩 穿山甲二兩 滑石二兩 香墨四兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，每丸重三錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】辛辣等物，孕婦忌服。

四、沈陽

【功能與主治】消炎和血，解毒止痛。主大腸毒熱內外諸痔，脫肛便血，肛門痛痒，痔漏生管，膿血淋漓。

【處方】黃連 苦參 乳香 沒藥 雄黃各一兩 連翹 殭蚕 蟬退 防風 全蠍 槐角 生地 牛膝 陳皮 炮甲珠 當歸 枳殼 淨土龍各二兩 蜈蚣二十條 象牙末五分 人參五分 蜂房一個

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空腹白開水送下。

【禁忌】烟酒刺激物。

附參考古方

【來源】瘍醫大全。

【功能與主治】此方退管生肌。

【處方】石蓮蓬 冬青子各三兩 川黃連 真川芎 牛膝（酒炒） 赤芍 當歸（酒洗） 黃芩 黃柏 熟大黃各一兩 槐角子 象牙末各二兩 蛇蛻（去頭尾） 全蠍各五錢 金墨一錠約重二錢

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每早服一錢，至七日後服二錢五分，又七日服二錢，又七日服一錢五分，每早晚用柳鬚，花椒煎水薰洗。

【禁忌】忌火酒羊肉，驢肉，公鷄，鯉魚辛辣。

王氏痔漏丸

沈陽

【功能與主治】化管止痛。主年久痔漏，肛門生管，痛痒難忍，膿血淋漓。

【處方】胡黃連 制刺獾皮 象牙屑 五倍子各一兩 蟾蜍（酒化）三錢 明礬五錢

【制法】共研極細面，蜜治小丸，雄精泛衣，玻璃瓶存貯。

【劑量及用法】每服二錢，用金銀花湯送下。

【禁忌】辛辣刺激品。

痔漏無雙丸

一、天津

【功能與主治】消腫解毒，退管止痛，清熱，通便，止血。主治漏林癰，日久不愈，肛門疼痛，腸風便血。

【處方】大黃 炒槐花 胡連 當歸尾各八兩 桃仁（去皮） 象牙 淨芒硝各六兩 芥穗 一兩 制沒藥 制乳香 制山甲 滑石各二兩 香墨四兩 獾狸皮（滑石燙）二兩 生石決明六兩 共為細粉，兌入雄黃面一兩

【制法】以上研細和勻，煉蜜為丸三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】辛辣食物。孕婦忌服。

二、大同

【功能與主治】新舊諸痔，肛門腫痛，膿水淋漓。

【處方】連肉五兩 一錢 甲珠 槐花 石決明 銀花各五錢 甘草四兩

【制法】丸成細面，蜜為小丸。

【劑量及用法】成人每次服一錢，開水送下。

三、呼和浩特

【處方】胡連 山甲 槐花 石決明 姜蚕各五錢

【制法】共為細面，糊小丸珠衣。

王氏三黃丸

沈陽

【功能與主治】消堅化毒。主治癰癤紅腫，熱毒疼痛，火毒火癰，楊梅結毒等症。

【處方】熟大黃三錢 沒藥一兩 乳香一兩 雄黃五錢 木香三分 牛黃二分

【制法】上六味藥，先將熟大黃酒浸後隔湯蒸軟，搗爛再將其余碾極細面，和入再搗千杵，為小丸晒干，忌烘。

【劑量及用法】每付二錢，空心陳酒送下。

【禁忌】孕婦忌服。

清血搜毒丸

呼和浩特

【處方】全蠍五錢 蜈蚣四大條 斑蝥十五個 山甲五錢 海金砂四錢 山金一錢 土人黃二兩 明雄五錢 乳香五錢 沒藥五錢 牛膝二錢 金蟬二個 板榔五錢 獨活二錢 甘草二錢 麝香二分 牛黃冰片 二五錢

【制法】共細面，用敗毒膏汁加芒硝五錢 水法小丸如黃豆大，滑石開亮衣，每盒四錢，丸藥十粒重二分。

花柳搜毒丸

呼和浩特

【處方】連翹一兩 銀花二兩 全虫五錢 蜈蚣五條 乳香五錢 沒藥五錢 兒茶五錢 血竭五錢 木香五錢 雄黃五錢 豆霜二錢 冰片二錢

【制法】共為細面，蜜大丸，重二錢，半金衣，蜡皮封固。

五虎搜毒丸

沈陽

【功能與主治】驅毒搜風，梅毒瘡瘍。上陰部瘡瘍，橫痃入泡，魚口便毒，紅腫未破，潰爛不愈，瘰癧下疳，倒反天疳，視力大衰，脫髮穿頂穿鼻，喉痛齦爛落等症。

【處方】金銀花一兩 蜈蚣一條（去頭足） 全蠍 殭蚕各七錢 防風 羌活 連翹 土茯苓 野大黃 炮山甲 朴硝 白芷 甘草 當歸各三錢

【制法】共碾成極細面，糯米打成糊為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，空心白開水送下，日服。

【禁忌】腥膻茶水辣物。

花柳敗毒丸

一、沈陽

【功能與主治】清血敗毒。主梅

毒落後，大便下血，梅毒升入，咽喉腫爛，鼻爛，髮脫，身發梅痘、梅疹及魚口、便毒。

【處方】朴硝二兩 桃仁 赤芍 全蠍 浙貝母 血竭各一兩 金銀花四兩 野大黃四兩 茯苓五錢 炮山甲五錢 車前子五錢 蜈蚣三十條（去頭足）

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸白開水送下，再服白水一盅以助藥力。

【禁忌】一切發物，油膩。

二、撫順

【處方】朴硝四兩 大黃四兩 桃仁一兩 赤芍一兩 全蠍一兩 蜈蚣二十條 土苓五錢 金花一兩 大貝一兩 山甲五錢 豆霜八錢 車前五錢 血竭一兩。

【制法】丸三錢大，雄黃衣。

花柳解毒丸

沈陽

【功能與主治】清血解毒，消腫止痛。主楊梅結毒，初期腫痛，便溺淋澀，筋骨疼痛。

【處方】金銀花 白鮮皮 土茯苓 薏苡仁 防風各五錢 木通三錢 木瓜二錢 皂角二錢 歸尾五錢 紅花二錢 大黃三錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，一錢五分重。

【劑量及用法】每服一丸，每日三次，飯後一小時，白開水送下。

【禁忌】辛辣，刺激發物。

聖靈解毒丸

杭州

【功能與主治】治楊梅結毒，橫痃下疳，一切花柳毒症，上攻五官，內陷五臟，遍身斑點，四肢結毒，或發於面咽喉，或形如膿窠癰癤等症，誠清血解毒之要藥也。

【處方】西牛黃一錢 珍珠五錢 滴乳石五錢 西琥珀一兩 川黃連一兩 飛腰黃一兩 金銀花六兩 木通六兩 龍胆草六兩 飛滑石六兩 杏仁六兩 生甘草一兩 白殭蚕三兩 炙山甲三兩 飛羅麵六兩

【制法】研為細末，用鮮土茯苓

五斤煎得打丸。

【劑量及用法】每服三錢。土茯苓湯或汁水送下。

如意金黃散

一、北 京

【功能與主治】消腫解毒止痛。主無名腫毒，婦人乳癰初期，濕瘡丹毒及受傷等症。

【處方】大花粉 黃柏 大黃 姜黃各一兩八錢 白芷一兩 厚朴 橘皮 甘草 蒼朮 天南星(生)各六錢

【制法】共為細粉。

【劑量及用法】用茶調濃，未破時敷患處，醋調敷亦可。

【禁忌】不可內服。

二、天 津

【功能與主治】消腫，解毒，止痛。主無名腫毒，乳癰初起紅腫，濕瘡丹毒，濕毒發頭，兩腮紅腫，灼熱疼痛。

【處方】花粉一兩 色姜黃八兩 陳皮 生南星各二兩二錢 黃柏 白芷各八兩 甘草二兩二錢 大黃八兩 蒼朮 厚朴(姜制)各二兩二錢

【制法】共為細粉，五錢重裝袋。

【劑量及用法】茶乳調敷患處。

三、上海(金黃散)

【功能與主治】癰癤丹毒，無名腫毒。

【處方】大黃五斤 姜黃五斤 黃柏五斤 白芷五斤 厚朴(制)二斤 甘草二斤 陳皮二斤 天南星(漂淨)二斤 蒼朮二斤 天花粉十斤

【制法】共研細粉。

【劑量及用法】菊花水調敷患處，遵醫師指示應用。

【禁忌】外用藥，勿入口。

四、南 京

【功能與主治】主癰疽腫毒流注，漆瘡天泡瘡，丹毒乳癰等症。

【處方】同大津。

【制法】生晒，共研為細末。

【劑量及用法】每用少許敷患處，紅腫者用茶蜜調敷，不腫皮色白不紅者，用葱蜜調敷。

五、武 漢

【功能與主治】疔疽初起，紅腫熱痛，以及跌打損傷，血瘀青腫疼痛。

【處方】南星二斤 陳皮一斤 蒼朮一斤 黃柏五斤 甘草二斤 白芷五斤 大花粉十斤 姜黃五斤 厚朴一斤 大黃五斤

【制法】取上藥混合碾細，成淨粉85—90%即得。

【劑量及用法】視患處大小，酌量用粉，用醋或蜜調敷。

六、福 州

(金黃如意散)

【功能與主治】治消腫去濕，散結退熱。

【處方】蒼朮三兩 生南星四兩 甘草二兩 白芷各二兩 大黃三兩 川朴 赤豆 陳皮 花粉 黃柏各二兩 姜黃十二兩 黃芩二兩

【制法】共研為散。

七、南 昌

(金黃如意散)

【功能與主治】癰疽發背，腫毒癰疽，火灼腫痛，火丹漆瘡，天泡瘡，肌膚腫痛，湯潑火燒，皮膚破爛。

【處方】大花粉四兩 大黃五分 黃柏五分 姜黃五分 白芷五分 厚朴八錢 陳皮八錢 甘草八錢 蒼朮八錢 南星八錢

【制法】各藥晒干，勿用火炒，共研極細末，密篩篩過，瓷瓶收貯，封固。

【劑量及用法】癰疽腫毒未膿者，茶湯同蜂蜜調敷。如欲作膿者，葱湯同蜂蜜調敷，其餘俱用麻油調敷。

【禁忌】皮色不紅者忌敷，並忌入口。

八、沙 市

【功能與主治】治紅赤腫痛，發熱未成膿者，及夏月暑癰初起等症。

【處方】天南星 甘草 陳皮各二斤 姜黃五斤 厚朴 蒼朮 生大黃各二斤 天花粉一斤 黃柏八兩 白芷五斤

【制法】上藥晒干研三次，用細絹多篩篩過，貯磁罐勿泄氣。

【劑量及用法】紅赤腫痛，發熱

未成膿者，用茶湯同蜜調敷，欲化膿者，用葱湯同蜜調敷。

【禁忌】凡屬痘性不紅腫者忌用。

九、西安(如意金黃丸)

【功能與主治】主治癰疽諸般熱瘡疥毒，跌打損傷，濕痰流毒，漆瘡火丹，肌膚赤腫，濕腳氣，婦人乳癰，小兒丹毒等症。

【處方】胆南星 陳橘皮 茅蒼朮各半斤 川黃柏一斤一兩 片姜黃一斤一兩 甘草半斤 白芷一斤 天花粉一斤半 厚朴半斤 西大黃一斤二兩

【制法】上十味共搗研細末，用絹羅篩，貯磁罐內勿令洩氣。

【劑量及用法】外用法，夏日用清茶清和蜜調敷患處，如欲化膿者用葱汁和蜜調敷，流毒附骨疽等用葱酒調敷，丹毒漆瘡用板蘭根叶泡汁調敷，加蜜亦可，火傷麻油調敷。敷藥時應先將瘡患處燒酒洗淨。

十、蘭 州

【功能與主治】消腫，解毒，止痛。主癰疽瘡瘍，紅腫堅硬，燒熱疼痛，以及皮膚起水泡丹毒，燒傷燙傷等症。

【處方】大黃 姜黃 川黃柏 白芷 生川烏 生南星 生草烏 甘草 白芷各一兩

【制法】共為細面。

【劑量及用法】外用搽敷患處。

十一、濟 南

【功能與主治】癰毒初起，紅腫熱痛。

【處方】天南星八錢 甘草八錢 陳皮八錢 厚朴八錢 蒼朮八錢 錦紋大黃二兩(生) 黃柏二兩 白芷二兩 片姜黃二兩 大花粉四兩

【制法】共研細末，貯磁罐內，勿洩氣。

【劑量及用法】按患處大小酌用，蜂蜜或茶水調敷。

【禁忌】辛辣刺激等物。

十二、沈 陽

【功能與主治】消腫防腐止痛。主無名腫毒，諸瘡痛癢，癰疽初起，

蛇虫咬伤,蜂蝎螫毒,癰疥湿癩,皮膚搔痒,湯火灼伤,消腫化核,疔瘡痒痛。

【处方】花粉一兩 黃柏五錢 大黃五錢 姜黃五錢 白芷五錢 厚朴二錢 白橘皮二錢 蒼朮一錢 南星二錢 甘草二錢

【制法】共為極細面。

【劑量及用法】用時不拘多少,量患處大小醋調塗之。

十三、撫順(金黃散)

【功能与主治】消炎解毒。主癰疽疔毒,火火瘟毒,疥癩流毒,頭腫乳癰。

【处方】花粉五兩 黃柏 大黃 姜黃各二兩五 白芷二兩五 甘草 生南星 蒼朮 陳皮 川朴各一兩

【制法】共為細面。

【劑量及用法】蜜茶調敷之。

【禁忌】辛辣發物

十四、撫順(金黃散)

【处方】花粉五錢 元柏二兩半 川軍二兩半 姜黃二兩半 生草一兩 南星一兩 蒼朮一兩 陳皮一兩 厚朴一兩半 白芷二兩半

【制法】共為細面。

十五、哈爾濱(金黃散)

【功能与主治】消腫解毒。主癰疽發背,疔腫,跌仆損傷,流毒火火瘟毒,頭腫乳癰,一切陽性紅腫癰毒。

【处方】天南星二兩生 陳皮皮二兩 生蒼朮二兩 川黃柏五錢 姜黃五兩 生甘草二兩 芳白芷五兩 天花粉十兩 厚朴二兩 川軍五兩

【制法】共碾為細面,絹羅篩過。

【劑量及用法】瘡未成膿者,用茶清同蜜或鷄子清調敷,如欲作膿者,或散漫無入,皮色不變,俱用葱湯同蜜酒調敷,湯火燙傷,皮膚破爛,用香油調敷

【禁忌】忌食腥辣發物。

【備考】瓷瓶存貯。

附參考古方

【來源】外科正宗。

【功能及主治】癰疽發背,諸般疔腫,跌仆損傷,濕痰流毒,火火時腫,漆瘡火丹,風熱天泡,肌膚赤腫,

干濕脚氣,婦女乳癰,小兒丹毒,凡外科一切諸般頑惡腫毒,隨手用之無不立效,誠為瘡家良便方也。

【处方】大花粉十斤(上白) 黃柏(色重者) 大黃 姜黃各五斤 白芷五斤 紫厚朴 陳皮 甘草 蒼朮 天南星各一斤

【制法】以上共為咀片,晒極干燥,用大礮磨連磨三次,方用密絹羅篩過,磁器收貯,勿令泄氣。

【劑量及用法】凡遇紅赤腫痛,發熱未成膿者及夏月火令時,俱用茶湯同蜜調敷;如微熱、微腫及大瘡已成欲作膿者,俱用葱湯同蜜調敷;如漫腫無頭,皮色不變,濕痰流毒,附骨癰疽,鶴膝風症等病,俱用葱酒煎調;如風熱惡毒所生患,必皮膚亢熱,紅色光亮,形狀游走不定者,俱用蜜水調敷;如入泡火丹、赤遊丹,黃水漆瘡、惡血攻注等症,俱用大藍根汁搗汁,調敷,加蜜亦可,湯火燙傷,皮膚破爛,麻油調敷,具此諸引理,取寒熱溫涼制之。又在臨用之際,順合天時,洞窺病勢,使引為當也。

三、黃 散

一、南 京

【功能与主治】主治瘡紅腫熱痛。

【处方】生大黃 黃芩 黃柏各四兩

【制法】生晒共研細末。

【劑量及用法】每次用三錢,清茶或蜜調敷患處。

二、武 漢

【功能与主治】紅腫成癰,堅硬作痛。

【处方】大黃(微炒)一兩 黃連五錢 黃芩五錢

【制法】取上藥混合碾細,成淨細粉85—90%即得。

【劑量及用法】每次二錢,用蜂蜜調敷患處。

三、福 州

【功能与主治】解毒退熱,消腫利濕。

【处方】川連 大黃 黃柏各一兩

【制法】共研為散。

瘡毒化毒散

沈 陽

【功能与主治】解毒活血,透達經絡壅塞,退熱消腫,宣通氣血凝滯。主治:(1)癰毒熱節,癰腫痛疼,小兒胎毒,頭瘡禿瘡。(2)斑疹余毒,流膿流水。(3)項腫腮腫,潰破流膿。(4)耳瘡耳底流膿水,各種血毒流膿。(5)風火毒血風瘡等症。

【处方】乳香 沒藥 赤芍 花粉 川軍 元連 甘草 綠豆面 白芷各二錢 貝母八錢 冰片五分 雄黃八分

【制法】共碾極細面,后兌冰片雄黃再共研細面調勻,貯磁瓶內。

【劑量及用法】周歲小兒每服一分至五分,周歲以上者每服五分至一錢,白開水送下。

柏 叶 散

哈 爾 濱

【功能与主治】清火解毒消腫。主治火丹毒疔,因小兒腠理空疏,風邪毒熱襲入,或蓄伏胎熱與血相搏所致。初必身熱啼哭,煩躁不寧,次則紅暈發于肌表,膚熱色赤,如塗濕丹,先發一處,漸及遍身。失治則肌肉糜爛,入腹、入腎則死。至于成人火火瘟毒,火面癰腫,漸及全身,情況與此均同。

【处方】側柏叶(炒黃)五錢 蚯蚓糞(韭菜地內者佳)五錢 川黃柏 野紋軍各五錢 明雄黃 赤小豆 輕粉各二錢

【制法】共碾為細面,絹羅篩過。玻璃瓶存貯。

【劑量及用法】涼水調敷,香油調敷尤妙。

【禁忌】忌食辛辣。

芙 蓉 散

南 京

【功能与主治】消腫拘攣。主一切瘡瘍紅腫熱痛之症。

【处方】芙蓉叶(不拘量)

【制法】生晒研為細末。

【劑量及用法】每用少許,以茶蜜調敷患處四圍,干則換之。

韓氏驅毒散

沈 陽

【功能与主治】杀菌化毒，止痛消腫，生肌長肉。主癰疽惡瘡，下疳陰蝕，楊梅瘡，痔瘡，疔毒紅傷，燙傷破傷，以及小兒胎毒風火毒，其它皮膚癰爛破爛等症。

【处方】龙骨 甘石各一兩 輕粉二錢五分 冰片三錢 兒茶七錢 元連五錢 紅粉五錢五分

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】酌量用之敷患處，用方應膏貼之。

冲和散(冲和膏)

一、北 京

【功能与主治】活血解毒消腫。主癰疽初起，紅腫疼痛。

【处方】紫荊皮五兩 独活 白芷各二兩 赤芍二兩 菖蒲一兩五錢

【剂量及用法】葱湯熱酒調敷患處。

二、南 京

【功能与主治】活血消腫。主癰疽初起，紅腫疼痛。

【处方】紫荊皮五兩(炒) 独活三兩(炒) 赤芍二兩(炒) 白芷一兩(生研) 石菖蒲一兩(生研)

【制法】共研細末。

【剂量及用法】以葱頭煎濃湯，或用溫酒調敷患處。

(用于已潰者，圍敷藥，須憑醫生指定)

三、武 漢

【功能与主治】癰疽流注，腫硬作痛。

【处方】紫荊皮(炒)五兩 独活(炒)三兩 赤芍(炒)三兩 白芷一兩 石菖蒲一兩半

【制法】取上藥混合碾細，成淨粉85-90%即得。

【剂量及用法】葱火濃湯或熱酒調塗，不必留頭，一日一換。

四、南 昌

【功能与主治】癰疽發背，陰陽不和，冷熱不明者。

【处方】紫荊皮(炒)五兩 独活(炒)三兩 赤芍(炒)二兩 石菖蒲一兩五錢 白芷一兩

【制法】共研極細末，通過密篩篩過，瓷瓶收貯，封固。

【剂量及用法】葱湯或熱酒調和敷于患處。

五、沙 市

【功能与主治】治一切癰疽未潰者。

【处方】紫荊皮八兩 白芷一兩五錢 独活六兩 石菖蒲二兩 赤芍四兩

【制法】上藥研細末。

【剂量及用法】用葱煎水調勻敷患處。

【禁忌】忌辛辣葱蒜等品。

六、濟 南

【功能与主治】癰疽初起，腫痛未潰。

【处方】紫荊皮五兩(炒) 独活三兩(炒) 白芷二兩 炒赤芍二兩 石菖蒲一兩五錢

【制法】共為細面。

【剂量及用法】熟葱頭搗敷，或熱黃酒調敷患處。

【禁忌】腥羶油膩辛辣等物。

七、沈 陽

【功能与主治】行氣疏風，活血消腫。主癰疽瘡瘍，壅腫疼痛，腦疽惡毒，乳癰乳岩，流注濕痰，一切外傷凝滯不散者，敷此藥可消堅散腫。

【处方】紫荊皮五錢 独活三錢 赤芍一錢 白芷一兩 石菖蒲一兩

【制法】共熬成膏，或為面。

【剂量及用法】用葱頭煎湯或熱酒調塗患處。

八、撫 順

【处方】荊皮五兩 羌活三兩 赤芍二兩 白芷一兩 菖蒲一兩半

【制法】共為細面。

九、吉林、哈爾濱

【功能与主治】散腫解毒，驅風消炎。主腫瘍瘡瘍腫毒，紅腫疼痛，寒熱往來。

【处方】荊皮五兩 白芷三兩

独活三兩 赤芍二兩 菖蒲兩半

【制法】共碾為細面。遮光瓶存貯。

【剂量及用法】用陳醋或涼茶調敷患處。

【禁忌】忌食發物、辛辣。

十、呼和浩特

【处方】白芷 独活 石菖蒲 荊皮 赤芍各等分

【制法】共為細面。

附參考古方

【来源】外科正宗。

【功能与主治】治癰疽發背，陰陽不和，冷熱不明者宜用此藥。

【处方】紫荊皮(炒)五兩 独活(炒)三兩 赤芍(炒)二兩 白芷一兩 石菖蒲一兩半

【制法】上為細末。

【剂量及用法】葱湯熱酒俱可調敷。

千金內消散

沈 陽

【功能与主治】解毒，消腫，止痛。主腸癰臟毒，初起能消，已腫能潰，並治一切瘡毒，排膿散瘀，活血止痛。

【处方】大黃三錢 赤芍一錢 白芷一錢半 木鼈一錢 乳香一錢半 沒藥一錢 皂刺一錢半 殭蠶一錢 瓜蒌一錢半 花粉一錢 歸尾一錢半 炮山甲三錢 甘草五分 銀花一錢

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】每次服二錢，開白水送下。

【禁忌】辣物及孕婦禁忌。

鐵 箍 散

一、南 京

【功能与主治】主癰疽發背，对口疔瘡，無名腫毒。

【处方】生人黃一兩 生南星五錢 天竺黃一兩 生半夏五錢 生川烏五錢 白蘞五錢 生草烏五錢 白芨五錢 川黃柏一兩

【制法】上藥九味，共研細末為散。

【剂量及用法】每用少許，用醋

外科
調勻，薄敷于患处四週。

【禁忌】不可內服。

二、福州

【功能与主治】治癰疽初起，或未成熟，敷之不至散大。

【处方】生南星 白芷 五倍各五錢 姜黃一兩 赤芍 山慈姑 白芨 生半夏 花粉 大黃 生草烏 白蘞各五錢

【制法】共為細末。

三、呼和浩特

【处方】白芨 大黃 赤小豆 芙蓉叶 五倍子各二兩 青黛二兩

【制法】共為細面。

护心散

沈陽

【功能与主治】托里护心，防毒內侵。主發背癰疽，發腦發鬚，疔瘡煩躁，發狂頭暈，風濕等症。

【处方】綠豆粉二錢 甘草一錢 硃砂一錢(研水飛)

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】每服二錢，白開水送下。

提膿八將散

武漢

【功能与主治】癰疽不起，疔毒不透，腐肉不脫。

【处方】西牛黃三分 冰片三分 蟬蛻(烘)一錢 炙蜈蚣一錢 麝香三分 穿山甲(炙)一錢 全蠍(炙)一錢 五倍子(焙)三錢

【制法】取上藥混合碾細，成淨粉85—90%即得。

【剂量及用法】每以少許摻于瘡頂上，以膏藥蓋之。

紅提毒散

一、沈陽(1)

【功能与主治】拔毒化痰，消炎消腫。主諸瘡潰瘍，癰疽發背，潰瘍破口流膿者。

【处方】紅粉一兩 孩兒茶 輕粉各一錢 梅片五分 明雄黃一錢 台麝三分 乳香一錢

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】先洗淨患处上之。

二、沈陽(2)(提毒散)

【功能与主治】拔毒去腐。主諸瘡潰瘍，癰疽流膿。

【处方】紅粉一兩 孩兒茶一錢 輕粉一錢 冰片五分 雄黃一錢 麝香三分 乳香一錢 沒藥一錢

【制法】共碾極細面。

三、撫順(1)(提毒散)

【功能与主治】提毒化腐生肌，長肉排膿殺菌。主癰疽瘡瘍腐潰疼痛青紫，腥臭難聞，久不斂口，新肉不生，腐敗流水，余毒不尽。

【处方】珍珠散二錢 輕粉五錢 麝香一分 兒茶 血竭花各二錢 紅粉四錢 冰片一分

【制法】共為細面。

【剂量及用法】撒復瘡口上，用膏藥貼之。

【禁忌】辛辣發物。

四、撫順(2)

(加味提毒散)

【处方】血竭二錢 兒茶二錢 紅粉四兩 輕粉五錢 台麝一分 冰片一分 珍珠散二錢。

【制法】共為細面。

白提毒散

一、沈陽

【功能与主治】拔毒防腐。主諸般惡瘡，癰疽發背，潰爛流水，拔毒生肌。

【处方】輕粉 乳香 梅片 台麝各一錢 煅石膏五分 白降丹三分

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】先拭淨患处，上瘡口即可。

二、撫順

【处方】月石二兩 冰片一錢 台麝一分

【制法】共為細面。

三、吉林

【功能与主治】解毒，消癰，止痛。主無名腫毒，疔毒惡瘡，出頭內潰，余毒未清等症。

【处方】石膏三錢四分 白芷一錢七分 廣木香二錢七分 輕粉 梅片各二錢 麝香七厘 豬胆一个

【制法】共研細面，用絹羅篩之二三次，極細為度。

【剂量及用法】可將本品撒于膏藥上，貼于患处即可。

【備考】用遮光瓶內貯之，勿使洩氣走味，置于清涼之處保存。

提毒散

撫順

【处方】水銀一兩半 白矾一兩二錢 火硝一兩 輕粉一錢 銅綠一錢 銀珠一錢

【制法】共為細面，用文武火升之。

拔毒散

呼和浩特

【处方】花粉 生南星 白蘞 黃芩 生半夏 白芨 三柰 黃柏 梔子 殭虫 大黃各四兩 生川烏 生草烏各一兩

【制法】共細面。

五行散

福州

【功能与主治】化毒散結。主癰疽。

【处方】荆皮 川蒲 獨活 赤芍 白芷各一兩

【制法】共研為散。

太平散

沈陽

【功能与主治】麻醉神經止痛。主癰腫已潰未潰，疼痛不止，或瘡瘍痛極時用之有效。

【处方】川烏二錢半 生草烏二錢半 生半夏一錢半 華撥一錢半 生南星二錢半 細辛五錢 胡椒五錢 蟾酥二錢

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】用時以酒精調合，敷于患处之周圍，每次一至二錢即可，一二十分內即生效力。

【禁忌】不可內服。

珍珠散

一、北京、承德

【功能与主治】化腐生肌。主諸瘡潰爛，不生肌肉。

【处方】白石脂二兩 龙骨五兩（煨） 石膏二兩（煨） 石决明二十五兩（煨） 共为細粉，兌入：麝香二錢五分 冰片一兩 珍珠二錢五分

【制法】上藥和勻。

【剂量及用法】用熱開水將瘡口洗淨，按病狀取藥粉敷患處。

【禁忌】忌食生冷發物。

二、天津

【功能与主治】提毒消腫，生肌長肉。主瘡癰疽潰爛，流膿流水，不生肌肉，久不收口。

【处方】生乳香 海螵蛸（去壳）各五錢 生白石脂一兩 煨海巴五錢 煨龙骨一兩 煨爐甘石一兩 官粉五錢 共为細粉兌入：輕粉五錢 珍珠二分 冰片二錢

【制法】以上研細和勻，五分重裝瓶。

【剂量及用法】敷于患處，以磁砂膏或磁砂膏貼，日日換之。

三、重慶（珍珠丹）

【功能与主治】治外症瘡瘍潰爛，不生肌肉。

【处方】珍珠一錢 爐甘石八兩 琥珀七分 龙骨四分 赤石脂四分 鐘乳石六分 硃砂五分 血竭二分 象皮五分

【制法】先將爐甘石火煨飛淨，珍珠血竭另研，象皮與硃砂同余藥共研細末，合勻后，每兩再加冰片二錢研細，玻璃瓶包裝。

【剂量及用法】不拘。

四、蘭州

【功能与主治】止痛生肌斂瘡。主瘡癰潰爛，流膿流水，久不收口，敷此散可以促進新陳代謝作用，化腐生肌。

【处方】乳香五錢 輕粉五錢 赤石脂一兩 海螵蛸五錢 珍珠十粒 甘石一兩 海巴五錢 龙骨一兩 官粉五錢 梅片二錢 硃砂三錢 麝香五分

【制法】共研細面。

【剂量及用法】此散上瘡口內，

用消毒紗布蓋之。

【禁忌】忌房事。

五、濟南

【功能与主治】疔瘡已潰，久不生肌。

【处方】白石脂二兩 石决明二十五兩 龙骨五兩（煨）

【制法】以上三味共研極細粉，另研白石脂二兩（煨） 麝香二錢五分 冰片一兩 珍珠二錢五分 共研細粉合勻。

【剂量及用法】先用溫開水將瘡口洗淨，將藥面敷上。

【禁忌】生冷辛辣等食物。

六、沈陽（1）

【功能与主治】化腐生肌，疔瘡已潰及疔瘡腐蝕等症。

【处方】珍珠 黃連 黃柏 輕粉 象皮 鉛粉 孩兒茶 沒藥 乳香 五倍子 石膏 龙骨 白石脂 血竭各一兩

【制法】上面藥味各研面，兌一處再研細面。

【剂量及用法】先洗患處，擦之上藥。

七、沈陽（2）

【功能与主治】去腐生肌。主癰瘡已潰及疔瘡腐蝕等症。

【处方】連珠五錢 黃連五錢 黃柏五錢 輕粉五錢 象皮五錢 孩兒茶五錢 沒藥五錢 乳香五錢 五倍子五錢 石膏五錢 龙骨五錢 白石脂五錢 血竭五錢

【制法】以上藥味各研面，兌一處再研極細面。

【剂量及用法】先洗患處，擦之上藥。

八、撫順

【处方】乳香二錢 沒藥二錢 血竭二錢 龙骨二錢 兒茶二錢 水石二錢 象皮二錢 海螵蛸二錢 冰片二分五 珍珠一分

【制法】共为細面。

九、撫順（生肌珍珠散）

【功能与主治】生肌斂口，去腐生新。主瘡瘍毒盡，氣血不足，久不生肌斂口。

瘡瘍類

【处方】乳香 沒藥 血竭 兒茶 水石 象皮 海螵蛸各二錢 龙骨三錢 冰片二分五 蘇珠一分

【制法】共为細面。

十、吉林、哈爾濱

（生肌珍珠散）

【功能与主治】生肌斂口。主瘡瘍毒盡，氣血不足，久不生肌斂口。

【处方】象皮 乳香各三錢 血竭二錢 龙骨 沒藥 赤石脂各三錢 珍珠五分 冰片一分 輕粉二錢 海螵蛸一錢五分 參蘆一錢五分 枯礬一錢

【制法】共碾为細面，珍珠冰片血竭另研后入，絹羅篩過。玻璃瓶存貯。

【剂量及用法】撒復瘡口上，以膏藥蓋貼之。

【禁忌】忌食辛辣，禁入口。

十一、呼蘭浩特

【处方】石决明五錢 龙骨五錢 石膏二兩 輕粉五錢

【制法】共为細面，每兩兌冰片二分，珠子十個。

附參考古方

【来源】1. 玄宗金鑑：外科心法要訣。

【功能与主治】疔瘡。

【处方】珍珠 黃連（末） 黃柏（末） 定粉 輕粉 象牙（末） 五倍子（炒） 兒茶 沒藥 乳香各等分

【制法】共研極細末。

【剂量及用法】先以米泔水洗患處，再撒此藥甚效。

2. 外科正宗。

【功能与主治】諸毒膿腐已盡，用此藥上，即能生肌長肉，平口收功，神效無比。

【处方】珍珠（人乳浸三日，夏天須每日換乳，珠質最堅，尤宜研極細如飛麵）一錢 血竭五分 兒茶五分 石膏（煨）一錢 爐甘石（以黃連五分煎汁，煨淨，研極細，水飛淨）一錢 赤石脂（煨）一錢 陳年絲吐頭（煨存性）五分 冰片一分二厘

【制法】上各研極細末，再秤准，共研極勻，瓷瓶收貯，勿令泄氣。

月白珍珠散

一、武 汉

【功能与主治】潰瘍新肉已生無皮，燙火傷及下疳腐痛。

【处方】珍珠一錢 輕粉一兩 冰片五錢 煅龍骨一兩 煅白石二兩 青黛二錢

【制法】取上藥混合研細，成淨粉90—95%即得。

【劑量及用法】視瘡口潰爛大小，酌量將上藥撒患處。

【禁忌】痛癢初潰者忌用。

二、沙 市

【功能与主治】治潰瘍新肉已生而無皮，及湯火傷痛，下疳腐爛等症。

【处方】青黛二分 輕粉一兩 珍珠五分 正梅片五分

【制法】上藥四味研極細末。

【劑量及用法】潰瘍撒在患處，外以膏藥護之，下疳腐爛用豬脊髓或凡士林調均外擦。

【禁忌】痛癢初潰者忌用。

三、吉林、哈尔滨

【功能与主治】生肌生皮。主瘡瘍新肉已滿不能生皮，湯火燙傷及花柳下疳。

【处方】青黛五分 輕粉一兩 珍珠一錢

【制法】共研極細面，絹羅篩過。

【劑量及用法】撒覆瘡口上，以膏藥護貼。

【禁忌】忌食辛辣；不可入口。

附參考古方

【来源】医宗金鑑

【功能与主治】此散治諸瘡新肉已滿，不能生皮及湯火燙傷，并下疳腐痛等症。

【处方】青紅花五分 輕粉一兩 珍珠一錢

【制法及用法】上為末撒之。下疳腐爛，用豬脊髓調搽。

【備考】一用雞子清傾瓦上，晒干取清，為末散之。

八宝珍珠散

一、武 汉

【功能与主治】疔疽瘡毒，已潰未潰，流膿流水。

【处方】麝香一錢 煅龍骨二兩 飛明雄二錢 冰片一兩 輕粉七兩 紅花二錢 乳香二錢 飛硃砂二錢 珍珠米一錢 煅白石四兩 沒藥二錢 血竭二兩

【制法】取上藥混合碾極細粉，成淨粉80—90%即可。

【劑量及用法】已潰者將患處洗淨后，用藥粉塗上，而未潰者用藥粉少許撒在患處貼之，不久即潰。

二、蘭 州

【功能与主治】生肌止痛。主各種瘡科潰爛。

【处方】珍珠米五个 梅花片五分 龍骨(煅)一錢 乳香二錢(去油) 沒藥一錢(去油) 象皮一錢(土炮) 孩兒茶八分 銀珠一錢 輕粉一錢半

【制法】共研細末。

【劑量及用法】以少量敷貼上，用消毒紗布蓋之。

珍珠八宝散

福 州

【功能与主治】止血定痛生肌。主瘡毒破爛，久不收口。

【处方】珍珠一錢 琥珀二錢五分 川連四錢 珊瑚二錢五分 飛白石五錢 乳香一錢 老片一錢 龍骨五錢 硃砂二錢五分 牛黃一錢 麝香五分 赤金一百張

【制法】共研末為散。

八宝生肌散

福 州

【功能与主治】功同八宝散。

【处方】乳香一錢 甘石一錢 川貝一錢 川連一錢 梅片八分 兒茶二分 硃砂五分 象皮二錢 血竭二錢 琥珀一錢 珊瑚一錢 珍珠二分 麝香一分二厘 山甲一錢

【制法】共研末為散。

生 肌 散

一、北京、承德

【功能与主治】生肌止痛。主瘡癤潰后，久不收口。

【处方】象皮(制) 乳香 沒藥 血竭 龍骨(煅) 海螵蛸 赤石脂(生)各一兩 冰片二錢

【制法】共為細粉。

【劑量及用法】干濕患處。

二、天 津

【功能与主治】化腐生肌，解毒止痛。主諸般瘡癤，潰膿流水，肌肉不生，久不收口。

【处方】血竭 煅龍骨 生乳香 生沒藥各一兩 海螵蛸(去壳)五錢 象皮(滑石燻) 生赤石脂各二兩 共為細粉兌入，冰片一錢

【制法】以上研細和勻，一錢重裝瓶。

【劑量及用法】患處，外貼藥砂膏或硃砂膏。

三、南 昌

【功能与主治】瘡疽腫毒潰后，膿腐已淨，用以生肌收口。

【处方】青花龍骨(煅)三錢 血竭(另研)二錢 紅粉三錢 制乳香二錢 制沒藥二錢 冰片一錢 煅赤石脂三錢 煅石膏三錢 海螵蛸二錢

【制法】共研極細末，通密篩篩過，再入乳鉢內搗至極細無聲為度，瓷瓶收貯封固。

【劑量及用法】先將瘡口洗淨，再將藥納入瘡口內，外用膏藥蓋護。

【禁忌】膿腐未淨忌用。

四、沙 市

【功能与主治】治一切腫毒潰爛，生肌肉收口等症。

【处方】熟甘石一兩 輕粉一錢 赤石脂五錢 龍骨五錢 正梅片 黃丹各一錢 熟石膏一兩 乳沒五錢

【制法】共研極細末，以無聲為度。

【劑量及用法】每次用少許撒患處，外貼膏藥。

【禁忌】辛辣魚腥葱蒜等品。

五、西 安

【功能与主治】疗虫唇。

【处方】花蕊石(醋煅) 兒茶 鷄內金 血竭各二錢 大紅絨(煅灰) 黃連 飛黃川(煅) 乳香各一錢

【制法】研為細末，加冰片一分，干搽。

六、蘭 州

【功能与主治】解毒止痛，生肌滲濕，去腐生新。主癰疽瘡癤潰爛后，久不收口。

【处方】血竭花 一兩 龍骨二兩 象皮二兩 乳香二兩 沒藥二兩 赤石脂二兩 海螵蛸五錢 梅片二錢 硃砂四錢

【制法】共研細面。

【劑量及用法】將此藥敷瘡上，用紗布蓋貼之。

【禁忌】房事。

七、濟 南

【功能与主治】癰疽瘡癤，潰后不斂。

【处方】象皮二錢 乳香一錢 沒藥一錢 血竭二錢 兒茶二錢 冰片六分 海螵蛸三錢 煅龍骨三錢 煅石決明一兩 煅石膏一兩 珍珠一錢

【制法】共為極細末。

【劑量及用法】將瘡口洗淨，敷患處，外以藥膏復之。

【禁忌】辛辣等食物。

八、沈 陽

【功能与主治】化腐生肌。主癰疽瘡瘍，潰后不斂，生肌長肉，收斂瘡口。

【处方】珍珠五分 冰片五分 象皮一錢 乳香五分 沒藥五分 爐甘石五分 輕粉四分 孩兒茶三分 血竭五分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】先用淨水拭患處，再上藥而即可。

九、撫順(珍珠散)

【功能与主治】生肌斂口鎮痛。主瘡瘍毒盡，氣血不足，久不生肌，膿青如水，瘡口陷陷。

【处方】乳香 沒藥 兒茶 象

皮 水石 龍骨 海螵各三錢 血竭四錢 冰片一分

【制法】共為細面。

【劑量及用法】撒復瘡口上，用荷藥貼之。

【禁忌】辛辣發物。

十、哈爾濱 (八宝生肌散)

【功能与主治】生肌收口，瘡瘍毒氣已盡，新肉不生，久不斂口。主瘡瘍久不斂口。

【处方】血竭四錢 乳香二錢 沒藥三錢 龍骨一錢 海螵蛸三錢 兒茶二錢 象皮一錢 寒水石三錢 梅花片五分

【制法】共碾為極細面，絹羅篩過，后入梅片研勻。

【劑量及用法】撒復瘡口上，外用荷藥貼蓋之。

【禁忌】瘡毒未盡者勿用。

十一、呼 和 浩 特

【处方】象皮 兒茶 龍骨 煅赤石脂 血竭 乳香 沒藥各一兩

【制法】共細面，每兩兌冰片二分。

附參考古方

【來源】1.張氏醫通。

【处方】乳香 沒藥各一兩 海螵蛸(水煮)五錢 黃丹(炒飛)四錢 赤石脂(煅淨)七錢 龍骨(煅淨)四錢 血竭三錢 熊膽四錢 輕粉五錢 冰片一錢 麝香八分 珍珠二錢(另研)

【劑量及用法】為極細末，針罐收貯，早晚搽二次，膏掩漸斂而平。

2. 重樓王鑑。

【处方】赤石脂一兩(水飛數次再用) 乳香一兩(去盡油) 沒藥二錢(去盡油) 輕粉二錢五分 礞砂二錢五分 龍骨一兩(火煅紅淬入米醋內，水飛) 孩兒茶二錢五分 入梅片三分

【用法和用量】研極細末，每于患處略用少許。

拔毒生肌散

武 漢

【功能与主治】癰疽已潰，久不

生肌，瘡口下陷，常流敗水。

【处方】冰片一兩 淨紅丹二兩四錢 淨黃丹二兩四錢 淨輕粉二兩四錢 煅龍骨二兩四錢 制甘石二兩四錢 煅石膏二兩四錢 白蜡木五錢

【制法】取上藥混合碾細，成淨粉90—95%即得。

【劑量及用法】洗淨患處，視患處大小，酌約量薄撒貼膏。

化腐生肌散

沈 陽

【功能与主治】化腐生肌，主瘡瘍潰爛，腫痛有腐肉者，用此化腐定痛生肌。

【处方】生石膏一兩 硃砂三錢 梅花冰片一分 礞砂五錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】敷患處，每用一分。

附參考古方

【來源】醫宗金鑑：外科心法要訣(生肌定痛散)。

【功能与主治】治潰爛紅熱，腫痛有腐者，用此化腐定痛生肌。

【处方】生石膏一兩(為末用甘草湯飛五七次) 辰砂三錢 冰片二分 礞砂五錢

【制法】上四味共為末。

【用法】撒患處。

四 虎 散

一、南 京

【功能与主治】主陰疽腫硬不痛，厚如牛皮，皮色不變而不作膿腐者。

【处方】生草烏一兩 生狼毒一兩 生半夏一兩 生芫花一兩

【制法】生晒，共研細末。

【劑量及用法】用豬腦同搗塗敷患處，留頂出氣，或用醋調敷。

【禁忌】不可入口。

二、武 漢

【功能与主治】凡因跌打損傷之郁血部位紅腫疼痛。

【处方】生南星一兩 生白附子一兩 生草烏一兩 生川烏一兩

【制法】取上藥混合碾細，成淨

粉 80—85% 即得。

【剂量及用法】视患处大小，取药用醋或酒调敷。

【禁忌】切勿入口。

回 陽 散

吉 林

【功能与主治】有回阳生肌，消毒止痛之效。主癰疽發背，潰后余毒不淨，身發黑紫，諸瘡內郁大毒等症。

【处方】硃砂三分五厘 血竭二錢 乳香二錢 沒藥一錢 雄黃二錢 紅粉二錢七分 梅片一分五厘 銀砂三分五厘 輕粉一錢四分 麝香七厘

【制法】將以上十味藥共研為細末。

【剂量及用法】將此藥塗于患处，每日二三次，必見功效。

薏苡敗醬散

沈 陽

【功能与主治】解毒，消腫，止痛。主腸癰未潰，消腫止痛，已潰化膿解毒。

【处方】薏苡仁一兩 附子二錢 敗醬五錢

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】每服二錢，小兒酌減，白開水送下。

【禁忌】辛辣之物。

附參考古方

【来源】金匱要略方論（薏苡附子敗醬散）。

【功能与主治】腹內有癰膿。

【处方】薏苡仁十分 附子二分 敗醬五分

【制法】上三味，杵為末。

【剂量及用法】取方寸匕，以水二升，煎減半，頓服。

消 核 散

天 津

【功能与主治】活血、消腫、止痛。主婦女乳瘡癰腫初起，灼熱作痛，堅硬不消。

【处方】山楂核五斤 當歸尾八兩 廣木香四兩

【制法】共軋粗末，每包四兩。

【剂量及用法】每次一包，煎湯一大碗，熱服取汗。

橘 香 散 (原名乳癰橘香散)

武 漢

【功能与主治】乳癰初起未潰。

【处方】陳皮一斤 麝香一錢

【制法】取上藥混合碾細，成淨粉 85—90% 即得。

【剂量及用法】每服二錢，溫酒沖服。

清 痔 散

沈 陽

【功能与主治】清熱解毒，消腫化腐，消導去風熱。主一切痔瘡，不論內痔與外痔，或大腸與肛門之疳疽毒熱之症。

【处方】金銀花一兩 大黃五錢 黃芩五錢 白芷五錢 當歸五錢 生地五錢 防風五錢 藏紅花五錢 槐花二錢 梅片一錢 熊胆一錢

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】每服一錢至一錢五分，白開水送服。

【禁忌】辛辣腥物，孕婦忌服。

枯 痔 散

一、南 京

【功能与主治】主外痔。

【处方】煅信石一錢五分 輕粉一分 石硫黃一錢 制乳香三分 象牙屑五分 制沒藥三分 煅刺楸皮五分 枯礬二分 炒黃芩五分

【制法】上藥九味，共研細末。

【剂量及用法】每用少許擦肛門上，初中黃水，久則枯干，其根自落，用時須以膏藥剪碎，護四圍好肉，以防影響其他肌肉。

【禁忌】不可入口。

二、沈 陽

【功能与主治】蝕管消腫止痛。主內外痔瘡，流膿流水，疼痛不已，纏綿不愈。

【处方】紅砒一錢 枯礬一錢 烏梅一錢

【制法】先將紅砒置瓦上，火煅白烟將盡時取起，次將烏梅燒存

性，再將枯礬加入共研極細面，瓷瓶貯。

【剂量及用法】以淨紗布，用香油蘸藥面少許于患处搓擦，一日二三次。

【備考】毒

附參考古方

【来源】1. 絳囊撮要。

【处方】紅砒不拘多少（放旧瓦上火煅，白烟將盡取起）枯礬各一錢 烏梅（燒存性）二錢

【制法】研極細末。

【剂量及用法】用時以口津濕手，蘸藥于痔身痔头上搓擦，一日二次，初敷不腫，五六日出臭水盡，其痔干枯，不用上藥，輕者七八日全愈，重者半月收功。

2. 張氏醫通。

【功能与主治】凡痔瘡突出，即用此藥。

【处方】白礬二兩 蟾酥二錢 輕粉四錢 砒霜一兩 天靈蓋（青鹽水浸，煅赤，清水內淬七次）四錢

【制法】共研極細末，入小新鉄鍋內，上用磁碗密蓋，鹽泥封固，炭火煅至二杜香，待冷取藥研極細末，鉛罐收貯。

【剂量及用法】每日上午葱湯洗淨，用津唾調捻如錢厚，貼痔上令著，以薄綿紙按輒掩上，卷束其藥，不使侵好肉上，若內痔至晚再換一次，至六、七日，其痔枯黑堅硬住藥，待其裂縫自落，換落痔湯洗之。

消痔千金散

杭 州

【功能与主治】治風濕郁熱，下注肛門，痔瘡腫痛，膿水淋漓之症。此散涼血解毒，消腫止痛。

【处方】兒茶 川黃連 寒水石 各一錢 飛月石 赤石脂 爐甘石 各六分 熊胆四分 梅冰片二分

【制法】共研極細末為度。

【剂量及用法】先用敗醬草明礬煎湯洗淨后，用清茶調敷患处，腫痛即止，屢用輒效。

桃 花 散

上 海

【功能与主治】瘡節膿水淋漓，

久不收口。

【处方】石碯(煨)四兩 東丹一兩 輕粉二兩 冰片一錢

【制法】先將煨石膏研粉，再加入余藥共研極細粉。

【劑量及用法】將藥摻于瘡口。

【禁忌】外用藥，不可入口。

鵝黃散

一、沈陽

【功能與主治】燥濕止痛。主梅毒潰爛，濕癢侵淫，痛痒難忍，膿水淋漓。

【处方】煨石膏 黃柏 薄荷叶 各等分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】先用双花、甘草湯洗患處，再以藥面擦患處。

二、撫順

【处方】黃柏 兩 石膏 一兩 白芷一兩 輕粉二錢

【制法】共為細面，用文武火升之。

附參考古方

【來源】外科正宗。

【功能與主治】治楊梅瘡潰爛成片，膿穢多而疼甚者。

【处方】石膏(煨) 輕粉 黃柏(炒)

【制法】以上各等分，為極細末。

【劑量及用法】干摻爛處，即可生肌，再爛再摻，毒盡乃愈。

【備考】此解毒、止痛、收口之效藥也。

下疳散

一、蘭州

【功能與主治】拔疳，消炎。主男婦花柳病症。

【处方】石決明五分 輕粉五分 兒茶五分 冰片五分 半龍骨一錢 石膏二錢 銀粉一錢 枯礬一錢

【制法】以上共為細面。

【劑量及用法】用花椒、艾叶熬水，將患處洗淨，以此藥粉少許，撒于瘡上，每日兩次。

【禁忌】忌刺激性食物。

二、呼和浩特

【处方】兒茶四兩 輕粉一兩五錢

【制法】共為細面，每兩兌冰片二分。

銀粉散

一、南京

【功能與主治】主下疳破爛。

【处方】好錫六錢 飛硃砂二錢 鉛粉 輕粉 水銀各一兩

【制法】先將錫化開，入硃砂攪炒，炒至砂枯。去硃砂留錫，再炒化后，加入水銀，和入錫內炒勻，傾出。另以鉛粉平鋪于桑皮紙上，卷成一條，以火點火，燒至紙盡，吹去紙灰，以前制之錫汞，再加淨輕粉(另研，乳至極細末)，共合一處再研，越細越佳。置于干燥地上，退去火氣即成。

【劑量及用法】先將患處用甘草煎水洗淨后，用少許摻之。

二、南昌

【功能與主治】下疳腐爛，用以止痛生肌。

【处方】好錫六錢(放鉄杓內火上化開入硃砂末二錢，攪炒砂枯去砂留錫。再化開投入水銀一兩和勻傾出听用) 鉛粉一兩(研細鋪草紙上卷成一條，在一頭以火點着，煨至紙盡為度，吹去紙灰) 輕粉一兩

【制法】將錫、汞、鉛、輕粉共合一處，研成極細末，須密篩過。

【劑量及用法】先以生甘草煎湯，將患處洗淨拭干，以此藥撒之。

【禁忌】不可入口。

三、重慶

【功能與主治】生肌止痛，治下疳並舌斷。

【处方】水銀六兩 鉛粉六兩 點錫六兩 輕粉六兩 青黛五錢 冰片二錢 麝香二分

【制法】先將黑鉛化開吹去灰，投入水銀炒。傾出攤紙上去火毒。余藥共研細末，共同攪乳，至無聲為度。玻璃瓶包裝。

【劑量及用法】適宜為度。

四、蘭州

【功能與主治】消炎，解毒。無論新久下疳，腐爛作疳，及楊梅結毒，玉莖腐爛或陽物半全者皆治之。

【处方】銀粉二兩 水銀(煨)五錢 輕粉三錢 梅片三錢

【制法】以上共研細面，用五枝的柴香板(敬神燒的香)將藥面放在香板上，用火點之，煨盡為度。再共為極細面。

【劑量及用法】用花椒艾叶水，洗淨患處，將藥粉撒于瘡口內外。每日二次。

【禁忌】刺激性食物勿食。

五、大同

【功能與主治】楊梅結毒，便毒。

【处方與制法】用上好錫六錢，火化開，入硃砂二錢，攪炒砂枯，去砂留錫。再化開投入水銀一兩，和勻傾出听用。再用官粉一兩，研極細鋪棉紙上，卷成一條。一頭點火煨至紙盡為度，吹去紙灰。將粉同前錫、汞再加輕粉一兩，共合一處，研成極細末。

【劑量及用法】先以甘草湯淋洗患處，拭干，隨撒藥。

六、濟南

【功能與主治】禿瘡頑癬，下疳腐爛。

【处方】黑錫六錢 硃砂二錢 水銀一兩 官粉一兩 輕粉一兩 寒水石四錢(煨) 硼砂二錢

【制法】將錫化開，下硃砂拌炒。候炒枯，去砂留錫。再投入水銀，和勻傾出听用。另以官粉研細鋪夾紙上卷成一條，一頭點火，燒至紙盡為度。吹去灰再和水銀、錫同煎勻，冷研加輕粉、寒水石、硼砂，共研極細，瓶收，蜡封口。

【劑量及用法】先用甘草湯或白開水洗淨瘡面，隨用此藥撒之。一日一次。

【禁忌】忌辛辣及有刺激性之食物。

七、沈陽

【功能與主治】殺菌防腐。主疳瘡潰爛，下部濕瘡，浸淫潰腐，搽此散防止潰爛，並止陰部止搔痒。

【处方】煨水銀一兩 輕粉二錢 梅片一錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】將患處洗淨，干上藥面。

【禁忌】大、面部禁用。

八、撫順

【處方】水銀一兩 輕粉五錢 官桂一兩 冰片二分(后兌)

【制法】共為細面，用夾紙卷燒之。研面入冰片。

九、吉林、哈爾濱 (下疳散)

【功能與主治】消毒殺菌，生肌止痛，消炎防腐。主下疳破爛，陰莖腐爛，陰唇破潰，疼痛作痒，毒水黃稠，瘡口內陷，膿水過多。凡一切花柳梅毒所致，皮破為患者，其效卓著。

【處方】水銀一兩二錢五分 輕粉一兩二錢五分 黑鉛五錢 寒水石三錢五分 硼砂一兩 珍珠一錢 錫六錢 硃砂二錢 官粉一兩 夾紙數張(哈爾濱硼砂一錢)

【制法】先將黑鉛五錢化開，投入水銀一錢五分，研不見星為度。再取好錫六錢化開，投入硃砂二錢，攪炒枯，去硃砂留錫。再化開，入水銀一兩合勻傾出。再將輕粉、寒水石、硼砂、珍珠，各研細甚為面，合黑鉛、官粉于一處研勻。將夾紙鋪好，卷約成一条，懸于靜處，下端點火燃之，至紙吹去紙灰，加入輕粉一兩，研細即成。

【劑量及用法】用甘草煎湯淋洗患處，拭干，以此藥撒之。

【禁忌】忌食發物、辛辣、酒類。

十、呼和浩特

【處方】官粉 水銀 銀朱各一兩 白鉛六錢

【制法】以上共研一處，用表心紙將藥鋪于紙上卷好。以火燒透，取其灰收存(臨燒時務要蓋好，莫洩氣。倘有一點洩氣，水銀就飛走了)，共燒好時每兩兌冰片二分。

黃連膏

一、南京

【功能與主治】清熱潤燥。主皮膚生瘡，干燥疼痛。

【處方】川黃連 川黃柏 姜黃

各三錢 當歸尾五錢 生地一兩 黃蜡四兩(后加熔化) 麻油十二兩

【制法】用麻油十二兩，將藥熬枯去渣，再將黃蜡放入熔化，濾清為度。

【劑量及用法】每用少許，搽塗患處。

二、武漢

【功能與主治】鼻痔牛瘡，干燥疼痛。

【處方】同南京。

【制法】以黃柏姜黃生地歸尾四味，用麻油十二兩，將上藥熬枯，去淨渣，微凍，加黃蜡四兩，溶化微冷，再下黃連末五錢攪勻，成膏十二兩九錢，共裝六十七盒，每盒重二錢。

【劑量及用法】每用少許，搽入患處。

三、沙市

【功能與主治】清熱化毒，活血止痛。

【處方】同南京。

【制法】除黃蜡外，將上藥入油浸一日，用文武火熬枯去渣，再入黃蜡攪勻。

【劑量及用法】用布攤貼患處。

【禁忌】白疽者忌用。

四、西安

【功能與主治】肺胃燥熱，鼻孔干痛，及鼻外口環生小瘡如粟狀，甚至皮膚紅腫，兼搽諸燥瘡，湯火泡傷。

【處方】同南京。

【制法】上五味，用芝麻油十二兩將藥燻枯，撈去渣，入黃蜡四兩溶化盡，用細羅或夏布將油濾淨，傾入磁碗內，不時攪拌之，候凝為度。

【劑量及用法】用金銀花泡水，先將患處用藥棉洗淨后(溫水亦可)，再用此膏搽之，一日一次，高臥洗去，次早如前法再搽。

【禁忌】濕癢化膿者勿搽。

五、沈陽

【功能與主治】潤燥清火止痛。主肺胃火盛，鼻孔生瘡，干燥結痂，疼痛欲裂，湯燙火燒，皮膚諸瘡。

【處方】同南京。

【制法】香油一斤二兩，將藥煎枯去渣，下黃蜡四兩溶化淨盡，用細布將油濾淨，傾入瓷盆內，以柳枝不

時攪之，候凝為度。

【劑量及用法】每用少許搽敷患處。

六、吉林

【功能與主治】潤燥、清火、止痛。鼻痔牛瘡。

【處方】同南京。

【制法】將藥入油內熬燥枯干，濾去渣滓，加黃蜡俟溶化盡，用夏布將油濾淨，倒入瓷碗內，以柳枝攪之，候凝為度。用銅鉄盒包裝，或用瓷缸貯存。

【劑量及用法】每用少許搽敷患處。

【禁忌】忌食辛辣。

附參考古方

【來源】醫宗金鑑。外科心法要訣。

【功能與主治】鼻瘡。

【處方】黃連一錢 當歸尾五錢 生地一兩 黃蘗一錢 姜黃二錢

【制法】香油十二兩，將藥燻枯，撈去渣，下黃蜡四兩溶化盡，用夏布將油濾淨，傾入磁碗內，以柳枝不時攪之，候凝為度。

三妙膏 武漢

【功能與主治】主痛疽瘍毒，未潰已潰。功能活血散瘀，排膿生肌。

【處方】黃柏 川槿皮 藿香 柴胡 大黃 土貝 白芨 全蠍 防風 海桐皮 白附子 苦參各五錢 蜈蚣三錢 甲片 桃仁 牛蒡子 紅花 牙皂 蘇木 防己 細辛 黃耆 花粉 蓖麻各五錢 赤芍二兩 荆芥 半夏 鱉甲 巴豆 烏藥 天麻 甘草 連翹 黃芩 黃連 銀花各五錢 蛇蛻二錢 當歸 刺楸皮 良姜 血竭 獨活 麻黃 僵蚕 川膝 白蘇 川羌 草烏 千金子 大戟各五錢 黃丹八十兩 麻油二百兩 臨攤時再加：

乳香 檀香 樟腦 明雄 肉桂 降香 公丁香 麝香 白椒香 沒藥各五錢 冰片一兩等香料細末。

【制法】將黃柏至大戟以上諸藥，與麻油同入銅鍋浸七日夜；再加柳枝、槐枝各一段，慢火熬至藥枯黑，去渣濾淨，熬至滴水成珠，瀉火；加黃丹八十兩，用槐枝攪勻，收

膏一百四十四兩六錢八分。臨離時再將乳香至冰片以上諸藥，共研細粉對入和勻。每大張重二錢，小張重一錢。用紅布為壳。

【劑量及用法】貼患處，一日更換一次。

連翹敗毒膏

天津

【功能與主治】清熱解毒，消腫止痛。主瘡癤潰爛，灼熱發癢，流膿流水，丹毒疱疹，疥癬癢。

【處方】銀花一斤 地丁 公英 生梔子 白芷 黃芩 赤芍 浙貝 元參(去蘆) 桔梗 木通 防風 白鮮皮 甘草各十二兩 蟬蛻 花粉各八兩 連翹(去心)一斤

【制法】以上藥熬汁，去渣過濾，將汁煉至滴毛頭紙上，背面不滲為標準，收清膏，每料兌：大黃面一斤攪勻，每斤清膏兌蜜二斤，收膏裝瓶。

【劑量及用法】每次服一兩，白開水沖服。

【禁忌】孕婦忌服。

萬應膏

一、北京

【功能與主治】消癰疽，化痰核。主癰疽發背，對口瘰癧流注。

【處方】官桂 烏藥 川烏(生) 草烏(生) 白芷 當歸 羌活 馬錢子(生) 木鱉子 生地 白蘇 白芨 象皮 赤芍 苦參 穿山甲(生) 甘草 獨活 玄參 大黃各一兩五錢

【制法】上藥用香油二百四十兩炸枯去渣，煉至滴水成珠，入黃丹一百兩攪勻成膏。

【劑量及用法】微火化開貼患處。

【禁忌】忌酒色發物。

二、天津

【功能與主治】舒筋活血，驅風散寒。主跌打損傷，閃腰岔氣，受風受寒，手足麻木，腰疼腿疼，肚腹疼痛，積聚痞塊。

【處方】元參 大黃 赤芍 木鱉子 白芷各二兩 生血余一兩五錢 生地 當歸各十二兩五錢 蜈蚣二條(五分)

【制法】以上藥料用香油十五

斤，炸枯去渣濾淨，煉至滴水成珠，再入草丹九十兩，攪勻成膏，每膏藥油十五斤兌。

肉桂面一兩五錢 阿魏面 乳香面 沒藥面各六兩攪勻，每張淨油一錢五分重。

【劑量及用法】貼患處。

三、武漢、南昌、

濟南、沈陽(1)、

吉林、哈爾濱

【功能與主治】消腫止痛，提毒生肌。主癰疽發背，對口瘰癧流注，一切惡瘡腫毒。未潰者敷之可消，已潰者服之可斂。

【處方】川烏 草烏 生地 白蘇 白芨 象皮 官桂 白芷 當歸 赤芍 羌活 苦參 木鱉子 山甲 烏藥 甘草 獨活 玄參 大黃各五錢 官粉若干 香油五斤

【制法】將上十九味藥(官粉在外)放入香油內，春五日夏三日，秋七日冬十日，候日數已足，入淨鍋內，慢火熬至藥枯浮起為度，住火片時，用布袋濾去藥渣，將油稱准，每油一斤加入官粉半斤，用桃柳枝不時攪拌之，以黑亮如鏡，滴水成珠為度。攤置膏藥背紙上對合之。

【劑量及用法】用文火烘之，貼敷患處。

四、福州

【功能與主治】治各種惡瘡成膿，貼之立癒。

【處方】生地一兩 黃柏 歸尾 山甲各八錢 蜈蚣五條 蛇退 甘草各二錢 巴豆 蓖麻 紅花 桃仁各五錢 大黃二錢

【制法】上藥用茶油二斤，春浸夏熬數沸後，再熬至滴水成珠，入炒黃丹十二兩。

五、重慶(1)

【功能與主治】治癰疽發背，對口瘰癧，痰核流注。

【處方】川烏 草烏 生地黃 白蘇 白芨 象皮 官桂 白芷 當歸 赤芍 羌活 苦參 木鱉子 穿山甲 烏藥 甘草 獨活 玄參 大黃各一兩 麻油五斤 黃丹三十七兩五錢

【制法】各藥稱准，用麻油泡一日，煎枯去渣，每淨油一斤加黃丹七

瘡 瘍 類

兩五錢成膏，厚紙攤成貼，仿單包固。

【劑量及用法】一貼。

六、重慶(2) (附：紅毛

拔毒膏、拔毒生肌膏、

陽和解凝膏)

【功能與主治】風濕、損傷、咳嗽、停滯。

【處方】北辛 川甲 生地 板麻仁 草烏 白芥子 羌活 川烏 柴胡 南星 獨活 當歸 木香 桂枝 杏仁 牛膝 川芎 白蘇 香附 防己 枳殼 桃仁 防風 古文錢 官桂 麻黃 藍藤 木瓜 杜仲 白芷 威靈仙 蜂房 黃丹 麻油

萬應膏每張附加末藥如下：

白芷 大黃 附片 牙皂 公丁香 吳萸 北辛 廣木香 甘松 茴香 桂子 麻黃 沉香 田七 麝香 冰片

【制法】先將各藥用麻油熬煎，取汁去渣，後加入黃丹制成膏藥，分攤成張包裝。

【劑量及用法】狗皮膏淨藥六錢，紅布膏淨藥四錢，藍布膏淨藥三錢。

用法：先用煨姜擦患處，再將末藥一包撒在膏藥之上，熨貼患處。

【禁忌】禁忌入口，孕婦忌貼臍下。

【備考】1.萬應狗皮膏附末藥二包，萬應紅布膏附末藥一包，萬應藍布膏末藥撒于膏藥之上。

2.紅毛拔毒膏：即萬應膏之不加末藥而加麝香冰片者，每張淨藥一錢，拔膿拔毒，化腐生肌，用時用花椒銀花蒲公英煎湯或用茶將膿水洗淨，將膏藥熨熱貼上，忌食發物及刺激物。

3.拔毒生肌膏：六月石 耳香 虫退 北辛 石膏 銀花 甘草 白芷 黃柏 僵虫 薄荷 沒藥 蒼朮 花椒(麝香 冰片 銀珠) 除冰麝銀珠外，先將各藥熬煎，漂三月，每日搞轉一次，後取汁晒干，加入麝香冰片銀珠，用紙包裝，每包淨藥五分，用時以開水或茶將瘡洗淨，用丹藥撒于患處，再將膏藥熨熱貼上。

4.陽和解凝膏：即萬應膏之不加末藥而只加麝香者，用軟布攤制，每張淨藥一錢五分，主治核積瘰癧。

气魚，將患处搽淨，以膏藥熨熱貼上。忌食鵝羊等肉。

七、西安

【功能与主治】癰疽發背，对口痰核流注。

【处方】川烏 草烏 生地黄 白薇 白芨 象皮 官桂 白芷 当归 赤芍 羌活 苦參 土木鱉 穿山甲 烏藥 甘草 獨活 元參 各五錢 官粉數不定

【制法】除官粉外，以淨香油五斤浸諸藥，春五夏三秋七冬一日，入淨鍋內，文火熬至藥枯浮起為度，住火片時濾去渣，將油稱准，每油一斤兌官粉八兩入鍋再熬，以桃柳枝不時攪之，以黑如漆亮如鏡，滴水成珠為度。

【劑量及用法】視腫瘍之大小，以藥膏在開水壺上蒸化，攤于油紙上，敷于腫瘍之上。

【禁忌】腫瘍已潰者，須經外科醫師指示使用。

八、沈陽

【功能与主治】消腫防腐止痛。主一切癰疽，發背对口諸瘡，痰核流注等毒。

【处方】羌活 透骨草 当归 赤芍 生山甲 生地 防風 靈脂 連翹 官桂 白芷 烏藥 川烏 各二兩 大黃 一兩 苦參 牙皂 各一兩五錢 木鱉肉 三兩 草烏 一兩

【制法】用香油十五斤，合諸藥熬枯去渣，用炒樟丹成之，再兌乳香面、沒藥面及輕粉面各二兩。

九、撫順

【功能与主治】消腫化毒鎮痛。舉凡癰疽發背，对口痰核流注，一切外科瘍毒惡瘡，未潰者敷之可消，已潰者敷之可斂。

【处方】羌活 透骨草 当归 赤芍 甲片 生地 防風 靈脂 連翹 官桂 白芨 白薇 白芷 各二兩 草烏 烏藥 川軍 川烏 苦參 各五錢 牙皂 一兩二錢 木鱉肉 二兩

【制法】香油十斤，樟丹五斤，后兌乳香、沒藥各二兩熬膏。

【劑量及用法】貼敷患处。

附參考古方

【來源】1. 瘍醫大全。

【功能及主治】貼內外諸証。

【处方】好松香十斤 葱汁 生薑汁 各一斤 黃柏 牛大黃 甘草 苦參 各二兩 蒼朮 一兩

【制法】同入鍋內熬至水氣升足，再入真麻油三觔，熬至滴少許入水中，約看凝片不散即是火候已到，但須不時以竹片攪之免其巴底，隨用麻布一方過入水中，又用大綱一只貯水大半鍋，臨傾膏時，將綱週圍攪盪免得膏滋粘綱，膏即入綱再取起捏去水頭，復入淨鍋內熬化，加乳香（去油研）、沒藥（去油研）各六兩，黃蜡八兩，熬化撤去火，再入百草霜（篩細四五兩）均勻篩入攪勻，另用麻布一方濾入水內扯捏成團，平日浸水內，臨用時取起攤貼，如火候太老，量加麻油少許可也。

2. 醫宗金鑑：外科心法要訣。

【功能与主治】此膏治一切癰疽發背，对口諸瘡，痰核流注等毒，貼之甚效。

【处方】川烏 草烏 生地 白薇 白芨 白芷 当归 赤芍 羌活 苦參 土木鱉 穿山甲 烏藥 甘草 獨活 元參 官粉 大黃 象皮 官桂 各五錢

【制法】上十九味，官粉在外，用淨香油五觔，將藥浸入油內，春五夏三，秋七冬十，候日數已足，入潔淨大鍋內，慢火熬至藥枯浮起為度，住火片時，用布袋濾去渣，將油稱准，每油一觔，對官粉半觔，用桃柳枝不時攪之，以黑如漆，亮如鏡為度，滴入水內成珠，薄紙攤貼。

太乙膏

一、沈陽

【功能与主治】散瘀活血、消腫止痛。主治癰疽瘡瘍、已潰拔膿，未潰消腫止痛。

【处方】生地黄 土木鱉 玄參 赤芍 大黃 白芷 当归 各五錢 乳香 沒藥 各二錢 阿魏 一錢 輕粉 一錢五分 血余一團 肉桂 二錢五分 黃丹六兩五錢

【制法】先將草藥用麻油一斤浸之，春五夏三秋七冬十日，傾入鍋內，文武火熬至藥枯浮起為度，住火

片時，用布袋濾淨藥渣，將鍋擦淨，入油于鍋內下血余再熬，以柳枝挑看，俟血余熬枯浮起方為熬熟，每淨油一斤將炒過黃丹六兩五錢，徐徐投入，不住手攪，俟鍋內先發青烟，后發起白烟疊之升起其膏已成，將膏滴入水中，試看軟硬適中下方阿魏，次下乳沒輕粉末，攪勻傾入水內，以柳木棍攪成一塊。

【劑量及用法】用布或紙攤貼之。

二、撫順

【处方】元參 白芷 当归 大黃 生地 赤芍 阿魏 各四兩 木鱉 血余 各二兩 官粉四兩 輕粉八錢 乳香 沒藥 各一兩

【制法】用柳桑槐桃各二十寸，香油十斤，后入輕粉阿魏乳沒官粉。

附參考古方

【來源】外科正六（加味太乙膏）。

【主治及用法】治發背癰疽及一切惡瘡，跌仆傷損，濕痰流毒，風濕風溫，遍身筋骨走注作痛，內傷風郁，心腹胸背攻刺作疼，腿脚酸軟，腰膝無力，湯火燒灼，刀傷棒毒，五損內癰，七傷外症俱貼患处，又男子遺精，婦人白帶俱貼臍下，臟毒腸癰亦可丸服，諸般瘡癤血氣癰痒，諸藥不止痛痒者並效。

【处方】肉桂 白芷 当归 玄參 赤芍 生地 大黃 土木鱉 各二兩 真阿魏 一錢 輕粉四錢 槐枝 柳枝 各一百段 血余一兩 東丹四十兩 乳香末五錢 沒藥末二錢

【制法】上十味併槐柳枝用真麻油足稱五斤，將藥浸入油內，春五，夏三，秋七，冬一，候日數已畢，入潔淨大鍋內，慢火熬至藥枯浮起為度，住火片時，用布袋濾淨藥渣，將油稱准足數，將鍋展淨，復用細絹將油又濾入鍋內，要清潔為美，將血余投下，慢火熬至血余浮起，以柳枝挑看，以膏溶化之象方算熬熟，淨油一斤，將飛過黃丹六兩五錢徐徐投入，大加火些，夏秋尤熱，每油一斤加丹五錢，不住手攪，俟鍋內先發青烟后至白烟疊疊旋起，氣味香馥者，其膏已成，即便住火，將膏滴入水中試軟硬得中，如老加熟油，若稀亦加炒丹，每各少許，漸漸加火，務要冬夏老嫩得所為佳，候烟盡端下鍋來，方

下阿魏切成薄片，散于膏面上化尽，次下乳没轻粉搅均倾入水内，以柳棍搅成一块，再换冷水浸片时，乘温每膏半斤扯拔百转成块，又换冷水投浸，随用时每取一块铜杓内复化，随便摊贴至妙。

太乙万应膏

抚 顺

【处方】官粉一两 元参 白芷 当归 阿魏各四两 血余二两 木鳖二钱 雄黄四钱 赤芍 生地各四两 轻粉八钱 乳香 没药各一两 油十斤 章丹四斤

【制法】用柳桃槐桑枝各二十寸，次下乳香没药轻粉。

千捶膏

一、

处方删

二、南 京

【功能与主治】主痈疽热疔，初起未溃。

【处方】蓖麻子肉五两 松香十两 银朱二两 杏仁二两（研细末） 广丹二两 轻粉一两（乳细） 茶油二两

【制法】先将蓖麻子肉捶融如泥，再将余药缓缓加入，须捶之极透后，放入茶油再打成膏，捶数以愈多愈佳，隔水煨化，用油纸摊成膏。

【剂量及用法】贴患处。

三、杭州（秘传千捶膏）

【功能与主治】治痈疽瘰癧、疔毒瘰癧，癰癧瘰癧，小儿热疔，一切无名肿毒，初起贴之能解毒除根，消肿止痛。

【处方】白胶香十六两 蓖麻子二十两 乳香 没药各一两二钱

【制法】各研细粉，和匀，打一千捶后再加银朱二两五钱 麝香八分 拌匀，摊油纸上。

【剂量及用法】贴于患处。

四、呼和浩特

【处方】银朱一钱 松香五钱 黄丹一钱 轻粉五钱 蓖麻子二钱 青黛五分

【制法】共捣成泥。

观音救苦膏

杭 州

【功能与主治】治痈疽恶瘡，无名肿毒，初起皮肉不变，漫肿无头、流脓痰核，偏正头风，胸腹腰痛，膨脹腹大，妇人经闭，小儿疳积等症。

【处方】生地一两 檳榔七钱 土木鳖一两 穿山甲（炒） 文蛤各七钱 麻黄八钱 皂角刺八钱 防风七钱 巴豆肉 紅毛大戟 羌活各八钱 制香附七钱 蜈蚣十条 枳实八钱 桃仁 白杏仁 烏玄参各七钱 制甘遂二两 芫花八钱 三棱七钱 龙衣五钱 独活七钱 生川烏八钱 全蝎七钱 草烏 当归各一两 天花粉七钱 黄柏八钱 莪朮一两 白芷八钱 細辛七钱 黄连五钱 大黃 蓖麻子各二两 川厚朴七钱

【制法】用麻油十五斤，浸入前药，煎至黑色去渣，熬至滴水成珠，再加章丹六十两收膏。临摊时每药油一斤，再加玉桂五钱 制没药 广木香 制乳香各三钱 苏合油 密陀僧各五钱

以上六味研细末，同药油和匀，摊于布上。

【剂量及用法】用时烘热，外症贴于患处，内症贴于肚脐，再饮甘草汤尤妙。

藤 黄 膏

一、武 汉

【功能与主治】痈疽肿毒，坚硬疼痛，难溃难消。

【处方】川烏 羌活 赤芍 草烏 独活 皂刺 肉桂 象皮 紅花 白芷 苦参 白藓 当归尾 木鳖 烏药 甘草 穿山甲各一两 蜈蚣二钱 全蝎四钱 摊时加藤黄。

【制法】用上麻油十斤，将上药泡（春五天，夏三天，秋七天，冬十

疮 瘍 类

天）入锅内，熬至药枯黑，去渣滤净，再熬至滴水成珠，加炒黄丹六十五两，成膏一百九十七两半。临摊时每大张加藤黄一分，小张五厘；每大张者重二钱，小者重一钱。

【剂量及用法】洗净患处，视患处大小熔贴。

【禁忌】阴疽及已溃者忌用。

二、沙 市

【功能与主治】专治一切无名肿毒。

【处方】松香四两 藤黄一两 银朱三钱 香油一两

【制法】先将香油熬开，再入松香熬化和匀，后入藤黄银朱搅匀。

【剂量及用法】贴患处。

【禁忌】白疽及溃口忌用。

官 粉 膏

沈 阳

【功能与主治】止痛退热，散瘀活血。主疔瘡及創伤。

【处方】官粉 陀僧各四两 白蜡 轻粉各五钱 乳香 没药 艾叶 净发各三钱 香油一斤

【制法】先将艾叶净发入油内燥枯，再下陀僧末，搅到滴水成珠，次将白蜡熔化油内，继入诸药力搅极匀，冷定膏成。

【剂量及用法】洗净瘡口或伤部，量其大小摊敷之。

独 角 連 膏

一、西安（独角连膏药）

【功能与主治】瘰癧疔肿，痰核结毒。

【处方】三棱 文朮 杏仁 透骨草 大黃 萊菔子 川山甲 木鳖子 乳香 没药 阿魏各一两 独蒜四两 麝香三分 独角連根二两

【制法】以相当之香油，同上述各味药（乳香没药阿魏及麝香除外）入锅，文火熬至枯黑，滤去渣，酌加适当之黄丹，再入锅熬，以柳枝时搅，膏滴水成珠，离火，和入乳香没药阿魏麝香之药末和匀，摊于油纸上。

【剂量及用法】將膏藥放开水壺上溫開貼之。

【禁忌】孕婦忌用。

二、濟南

【功能与主治】無名腫毒，瘡癤疥癩，疔瘡癰毒，凍瘡癰瘡等症。

【处方】肉桂 白芷 赤芍 元參各一兩 獨角蓮五錢 乳香 沒藥各一兩 當歸一兩二錢 生地一兩五錢 麝香五分 章丹二斤 連翹八錢 輕粉一錢 大黃五錢

【制法】除乳香沒藥麝香輕粉另研極細粉后入外，其余群藥用香油四斤炸枯，去淨渣，加章丹如法收膏。

【剂量及用法】貼患處。

三、撫順(独角膏)

【功能与主治】消腫化毒鎮痛。主舉凡一切疔毒，惡瘡癰瘡，癰疽發背，及一切無名腫毒未潰者，貼之可消，已潰者敷之可斂。

【处方】川軍二錢 羌活 大活 細辛 麻黃 生地 桂枝 黃連 黃柏 元參 桃仁 杏仁 白芷各二錢 連翹 地丁各二錢 防風 乳香 沒藥 五倍子 山甲 木鱉 當歸 桂楠 赤芍 皂角 下稜 文龍 川朴 枳殼 香附 川烏 草烏 烏蛇 甘遂 人戟 羌花 江子 二丑各一錢 馬錢一兩 全蠍一錢 蜈蚣十條 陀僧五錢 蛤蟆二個 獨角蓮二兩

【制法】香油十斤，樟丹五斤，如常法收膏。

【剂量及用法】貼敷患處。

四、吉林(独角膏)

【功能与主治】解毒消腫，活血止痛。癰疽惡瘡，癰瘡癰瘡，魚口便毒橫痃，破傷及鼠瘡等。

【处方】獨角蓮 鳳仙花根各二兩六錢七分 當歸 川附 赤芍 蒙桂 白芷 桃仁各二兩 西紅花 乳香 沒藥 阿魏 血余炭各一兩二錢四分 章丹十四斤八兩六錢 麝香一錢四分 香油七斤四兩七錢

【制法】先將以上諸藥用香油浸透，再用火熬枯去渣，再將油熬至滴水成珠，入章丹攪均為膏。瓷壇貯存，或攤置膏藥背紙上對合之，每貼重三四錢均可。

【剂量及用法】將本品用火烤粘貼患處。

麝香膏(麝香蜈蚣膏)

吉林

【功能与主治】散風止痛。生肌解毒。無名腫毒，癰疽癰瘡，疔毒，瘋狗咬傷，疥癬，魚口便毒，楊梅疳瘡，臟毒等症。

【处方】香油十六斤 馬錢子三斤二兩 全蠍五兩二錢四分 蜈蚣一百條 麝香三分五厘 公鷄頭一個 官粉六十盒

【制法】將以上藥品共和為一處，熬成膏。每五錢攤于布面上，放清涼處。

【剂量及用法】貼患處。

礞砂膏

一、天津

【功能与主治】散風活血，消腫止痛。主瘡癰膿，久不收口，或堅硬紅腫，痛痒難忍。

【处方】當歸 川芎 白芷 白薇 木鱉子(打碎) 蓖麻子 元參(去蘆) 生蒼朮 生山甲各三兩 蜈蚣十條 銀花 連翹 生地 大黃 桔梗 赤芍各四兩

【制法】以上藥料用香油十五斤炸枯，去渣濾淨，煉至滴水成珠，再入章丹九兩攪勻成膏，每膏藥油十五斤兌。

乳香面 沒藥面 輕粉面 血竭面 紅粉面 兒茶面各五錢 潮腦八錢 生礞砂面六兩攪勻。

每大張淨油五分重，每中張淨油三分重，每小張淨油一分五厘重。

每中盒五十張裝，每小盒一百張裝。

【剂量及用法】貼于患處。

二、上海

【功能与主治】癰疽，癰瘡，乳癰。

【处方】血余(鹽水洗)四兩 山梔子八兩 穿山甲(炙)六兩 棉子油十斤 東丹(炒)一百兩 槐枝 杏枝 桑枝 柳枝各六兩 沉香 方兒茶各二兩 血竭二兩 琥珀 象皮(微炒)各一兩 冰片 麝香各五錢 礞砂四兩

【制法】先將血余、山梔子、穿山甲、槐枝、杏枝、桑枝、柳枝浸入棉子

油內一夜，随后文火熬至藥枯，去渣濾清，加入東丹，再熬至滴水成珠收膏，攤時再加沉香、方兒茶、血竭、琥珀、象皮、冰片、麝香、礞砂藥粉和勻，攤布上，大號每張用藥肉四錢，中號每張用藥肉二錢半，小號每張用藥肉一錢半。

【剂量及用法】貼患處。

【禁忌】疔瘡不可貼，不可入口。

三、福州

【功能与主治】專貼癰疽發背，對口疔瘡，痰核瘰癧破爛，一切無名腫毒，能化腐消堅，生肌收口。

【处方】鮮桃枝 柳枝 桑枝 槐枝各五尺 大山梔八十個 頭髮一兩二錢 象皮 山甲(炮)各六錢

【制法】麻油四斤燥煉去渣，再熬至滴水成珠后下飛黃丹二十四兩成膏加入真礞砂三錢，血竭一錢，兒茶二錢，三味預研細末，共攪極勻，出火氣听用。

四、杭州(外科礞砂膏)

【功能与主治】治癰疽發背，對口痰毒，瘰癧痰核，乳癰流注，一切無名腫毒，未成能消，已成能潰，有去瘀軟堅之功，消腫止痛之效。

【处方】血余四兩八錢 象皮 穿山甲各二兩四錢 生山梔八兩 桃枝 槐枝 桑枝 柳枝各一丈

【制法】用麻油十五斤，入藥煎枯去渣，煎至滴水成珠，加章丹六十兩收膏，臨攤時每藥肉一斤，再加礞砂一兩 血竭二錢 兒茶三錢共研細末，和藥肉攪勻，攤于綾上。

【剂量及用法】用時在熱茶壺上烘熱，貼于患處。

【禁忌】忌用火烘，因礞砂見火則力薄。惟疔瘡忌貼，恐毒走散。

咬頭膏

南京

【功能与主治】主外瘍腫脹，膿成未潰。

【处方】巴豆仁二錢 蓖麻子仁 制乳香(研細末) 制沒藥(研細末) 各一錢

【制法】上藥四味，共搗碎如泥狀。

【剂量及用法】每用少許(如綠豆大)，放在瘡頭上，用膏藥貼之，破

則揭去。

綠云膏

一、福州(綠膏藥)

【功能与主治】治小兒夏天头上生瘡，未能收功，以此膏貼之。

【处方】江子仁一兩五錢 蓖麻仁二兩五錢 銅綠五錢 沒藥 乳香各二兩 松香一兩

【制法】共搗千錘成膏。

二、沈陽(千錘綠云膏)

【功能与主治】呼膿長肉。主治一般瘡症火癰子等。

【处方】松香一斤六兩 火麻仁四兩 杏仁二兩 乳香 沒藥各一兩 康青八錢

【制法】共搗成膏。

【劑量及用法】攤紙上貼患處。

三、撫順

【处方】松香一斤 乳香 沒藥各五錢 麻仁四兩 銅綠 杏仁各二兩

【制法】共搗成膏。

鯽魚膏

一、南京

【功能与主治】諸瘡腫痛，已潰或未破。

【处方】活大鯽魚一條(約重十斤左右) 巴豆四兩 蓖麻子仁六兩 甘草五錢 菜油 麻油各一斤

【制法】將活鯽魚放入油內，文火炸枯，揀去魚，再將巴豆蓖麻仁甘草三樣放入油內，再慢慢熬至枯，去渣濾淨，將油炸滾，至滴水成珠時，加入鉛粉二斤，徐徐投入，攪勻成膏，退火氣后再用。

【劑量及用法】以牛皮紙攤成膏藥貼患處。

二、武漢

【功能与主治】諸瘡腫疼，潰破流膿，並治脚生雞眼。

【处方】鯽魚(四兩一尾)五尾 蓖麻仁十二兩 巴豆肉各十二兩 蟾蜍五个 血余 乳香末各五錢 鉛粉四十兩 冰片五錢

【制法】取前五約，用麻油二斤，置鉢中泡三天，加火熬至藥枯，去渣

濾淨，再熬至滴水成珠，離火至冷后，加淨鉛粉四十兩攪拌成膏狀，再加乳香末，投膏內攪勻，使成膏七十四兩八錢貯之，攤時加冰片末五錢混勻，攤于牛皮紙上，每張重三分。

【劑量及用法】用微火化升，貼于患處。

三、南昌

【功能与主治】癰毒瘡癤潰后用法。

【处方】同南京。

【制法】用麻油二斤，先將鯽魚炸枯去渣，再入巴豆蓖麻仁甘草，熬枯濾淨渣，復熬滾，離火，將鉛粉徐徐投下收膏，攤薄紙上。

【劑量及用法】貼于患處。

四、重慶

【功能与主治】治諸瘡腫毒潰破流膿，並治脚生雞眼。

【处方】鯽魚五尾 蓖麻仁 巴豆各六兩 蟾酥二个(含人頭髮一团) 乳香五錢 麻油一斤半 鉛粉十二兩五錢

【制法】用麻油先將鯽魚炸枯去渣，再入巴豆蓖麻仁蟾酥熬枯，濾去渣，每淨油一斤加鉛粉九兩，成膏后下乳香末，皮紙攤貼。

【劑量及用法】一貼。

【禁忌】忌食蝦蟇。乳岩白陰疽均不可貼。

五、撫順(白魚兒膏)

【处方】鯽魚一尾 巴豆五錢 蓖麻仁上貝各一兩 官桂十兩 木龍五錢 蛤蟆一兩 香油十二兩

【制法】熬成珠，再下乳香沒藥官粉各三錢，白蜡二兩。

六、呼和浩特

(鯽魚白油膏)

【处方】活鯽魚四兩 蓖麻子 巴豆 木龍 千金子 龟板各二兩 山甲一兩五 干蟾八个 乳香(另) 沒藥各一兩五錢

【制法】用香油五斤炸枯，官粉成膏。

附參考古方

【来源】1. 瘍医准繩。

【功能与主治】治諸癰瘡，或干或濕，痒痛不可忍。

瘡瘍類

【处方】鯽魚(中者一尾) 乱髮(如鷄子大)二枚 豬脂半斤 雄黃一兩半 硫黃一兩

【用法及用量】上件藥，先煎豬脂令沸，即下魚，煎令烟尽，次下髮令銷，濾去粗，下雄黃硫黃末攪令勻，于磁器中，不拘時候塗之，以瘡為度。

2. 瘍医大全。

【功能及主治】貼癰毒瘡癤。

【处方】大鯽魚一尾 巴豆四兩 蓖麻仁六兩 甘草五錢

【制法】用菜油麻油各一斤，先將鯽魚炸枯去渣，再入巴豆蓖麻仁甘草熬枯濾淨，熬滾離火，將鉛粉徐徐投下，攪均成膏攤貼。

玉紅膏

一、上海

【功能与主治】瘡毒潰爛，久不收口。

【处方】当归二兩 甘草一兩八錢 麻油一斤八兩 紫草三兩 輕粉六兩 白蜡二兩 白芷七兩五錢 血竭六兩

【制法】將当归甘草紫草白芷浸入麻油內一夜后，用文火煎至藥枯，去渣濾淨，再熬至滴水成珠，加入血竭粉白蜡輕粉調和成膏。

【劑量及用法】將膏勻塗紗布上，敷貼患處。

【禁忌】不可入口。

二、南京

【功能与主治】主瘡瘍潰爛、火傷燙傷、紅腫疼痛、久不收口。

【处方】同上海，分量为其三分之一。

【制法】以麻油將归、草、芷、紫四味入油內浸透，文火熬枯后，濾去藥渣，將油再熬滾后，至滴水成珠時，再將白蜡放入溶化，俟微冷時，再下血竭輕粉末，攪勻為度。

【劑量及用法】用藥膏勻塗紗布上，敷貼患處。

【禁忌】不可入口。

三、武漢(生肌玉紅膏)

【功能与主治】瘡瘍潰爛，火傷燙傷，紅腫疼痛，久不收口。

【处方】同上海，分量为其三分

之二。

【制法】將当归甘草紫草白芷浸入麻油內，浸一夜后，用文火煎至藥枯，去渣濾清，再熬至滴水成珠，加入血竭粉白蜡輕粉調和成膏。一兩三錢，共分小、大、中三裝，每小盒重二錢，每大盒重一兩，每中盒重五錢。

【劑量及用法】視瘡口大小，酌用藥膏勻塗紗布上，敷貼患處。

【備考】不可入口。

四、沙市

【功能与主治】治癰疽潰爛，用以防腐生肌。

【处方】当归二兩 紫草二錢 血竭四錢 粉甘草一兩 白芷五錢 輕粉四錢 白蜡五錢 黃蜡四兩

【制法】麻油一斤，先將当归紫草粉甘草白芷四味浸一日，熬成滴水成珠，去渣再下血竭，搗勻，再入白蜡黃蜡溶化，微冷再下輕粉，成膏。

【禁忌】凡癰疽膿未提淨者已用。

五、昆明

【功能与主治】拔毒提膿生肌。主治膿腫瘡瘍。

【处方】当归二兩 紫草 血竭 乳香各五錢 冰片二錢 川貝 白芷 生地 口芪各一兩 紅花 沒藥 甘草 黃蜡 白蜡各五錢 猪油半斤

【制法】用油蜡熬煉成膏。

【劑量及用法】分患處大小，由五分至一錢外搽患處。

六、西安(1)

【功能与主治】生肌長肉收口。治一切癰疽發背，对口入毒，腐去孔深，洞見隔膜者。

【处方】川椒(另研末篩細)一兩 松香(用好醋加葱頭打碎或取汁同煮)八兩 黃丹二兩 枯矾二兩五錢 輕粉七錢五分

【制法】共研為末。

【劑量及用法】先以猪鬃湯洗淨，茶油調塗。

七、西安(2)(生肌玉紅膏)

【功能与主治】主治癰疽發背，諸般潰爛膿瘡等症。

【处方】白芷五錢 紫草二錢

当归二兩 沒藥二錢 乳香五錢 輕粉四錢 血竭四錢 白蜡二兩 麻油一斤

【制法】先將当归白芷、紫草三味入麻油內浸三日，放入銅杓內慢火熬微枯色，細絹濾清，將油復入杓煎滾，入血竭化盡，次入白蜡微火溶化，用茶鍾四個預放水中，將膏分作四處傾入盅內，候一小時，再將研極細輕粉乳香、沒藥各投入一錢攪勻，候至一日夜用之。

【劑量及用法】先用甘草湯洗瘡，甚者用猪鬃湯淋洗患處，約棉搽淨，再以清潔竹器或銀器搽膏。

【禁忌】非內服藥，忌勞醇性食物。

八、蘭州(生肌玉紅膏)

【功能与主治】生肌。主治瘡潰爛生肌。

【处方】白芷五錢 甘草一兩二錢 当归二兩 紫草二錢 血竭四錢 香油一斤

【制法】將藥入油內浸三日，火熬半枯，去渣再入血竭花化盡，再入白蜡二兩 輕粉四錢 生肌散面五錢 攪勻成稀泥膏。

【劑量及用法】按瘡爛大小，將藥膏攤于消毒紗布上貼患處。

九、撫順

【功能与主治】化腐生肌。主治瘡瘍潰爛，流膿流血，久不收口，氣穢疼痛，水燙火傷，皮破糜爛，色紫塌陷，疼痛異常，勢將潰膿。

【处方】白芨 白蘞 当归 生地各五錢 紫草六錢 乳香 龍骨 兒茶 海螵 象皮各一兩 沒藥二兩 血竭 銀珠各五錢 猪板油 香油各一兩

【制法】將二油化開，入黃蜡二兩，攪均為妥。

【劑量及用法】攤敷瘡面上，量瘡大小隨意塗之。

【禁忌】忌食辛辣。

十、吉林、哈爾濱(生肌玉紅膏)

【功能与主治】化腐生肌。主治瘡瘍潰爛，潰爛流膿，久不收口，氣穢疼痛，色紫塌陷。水燙火燒，皮破糜爛，疼痛異常，勢將潰膿。

【处方】同上海，分量为其三分

之二。

【制法】將当归白芷紫草甘草四味入油內浸三日，慢火熬微枯，少冷絹羅濾清，將油復入鍋內煎滾，入血竭化盡，次入白蜡，微火化之，俟少冷，將研細之輕粉投入攪勻即成。

【劑量及用法】攤敷瘡上，量瘡面大小隨意塗敷。

【禁忌】忌食辛辣。

附參考古方

【来源】医宗金鑑：外科心法要訣(生肌玉紅膏)。

【功能及主治】治癰疽發背，諸般潰爛瘡毒等瘡。

【处方】当归二兩 白芷五錢 白蜡二兩 輕粉四錢 甘草一兩二錢 紫草二錢 瓜兒血竭四錢 麻油一斤

【制法】上將当归白芷紫草甘草四味入油內浸三日，大杓內慢火熬微枯色，細絹濾清，將油復入杓內煎滾，入血竭化盡，次下白蜡，微火亦化，用茶鍾四個，預放水中，將膏分作四處，傾入鍾內，候片時方下研極細輕粉各投一錢攪勻，候至一日夜用之極效。

【劑量及用法】用在已潰流膿時，先用甘草湯，甚者用猪鬃湯淋洗患處，軟絹搽淨，用抵爛挑膏于掌中擦化，遍搽新肉上，外以太乙膏蓋之，大瘡洗換二次，內煎服大補氣血之藥，新肉即生，瘡口自斂。

紅玉膏

呼和浩特

【处方】白芨 白蘞 当归 白芷 乳香 沒藥 生地各等分

【制法】香油十兩，炸枯去渣，兌黃蜡收膏，對銀珠一包。

白玉膏

一、上海

【功能与主治】瘡毒腐爛，久不收口。

【处方】木鼈子 蓖麻子肉 金銀花 白芷各二兩 乳香(制)五錢 牡丹皮一兩 巴豆一兩 大花粉三兩 白蜡 沒藥(制)各五錢 赤芍藥大黃各一兩 象貝母二兩 鮮鳳仙花根叶二斤 輕粉二錢 鉛粉

七斤半 鮮鱖魚八兩 鮮大力子根
叶三斤 麻油十五斤

【制法】先將鮮鱖魚、白芷、木鱧子、象貝母、蓖麻子肉、巴豆、白蜡、牡丹皮、金銀花、天花粉、赤芍藥、大黃、鮮鳳仙花根叶、鮮大力子根叶浸入麻油內二五日，隨後煎熬至藥枯，濾清候冷，隨後加鉛粉、輕粉、乳香粉、沒藥粉，再用文火徐徐攪勻，至滴水成珠為度。

【劑量及用法】敷貼患處。

【禁忌】不可入口。

二、沙市

【功能與主治】治癰瘡潰口，去毒生肌。

【處方】鱖魚一尾先炸八兩 白芷 穿山甲 當歸 木鱧子 大貝各一兩五錢 輕粉一錢 水粉四斤 香油四斤

【制法】用文武火熬枯去渣，滴水成珠，將油提開，候冷再下水粉，熬成時再下輕粉攪勻。

【劑量及用法】貼患處。

【禁忌】白疽者忌貼。

三、禹縣

【功能與主治】下部濕毒潰瘡。

【處方】香油 官粉各一斤

【制法】熬至滴水成珠，攤油紙上。

【劑量及用法】煖開貼患處。

【備考】有效期二年。

四、沈陽

【功能與主治】芳潤解毒，生肌去腐。主治膿瘡及諸瘡惡毒，久不收口。

【處方】白蜡二兩 猪板油四兩 潮腦六錢 輕粉 冰片各三錢

【制法】先將白蜡猪油溶化濾淨，入潮腦研勻，冷定加輕粉冰片和勻，即盛瓷瓶存貯。

【劑量及用法】挑塗瘡上，油紙蓋復之，一日一換。

【禁忌】刺激性食品。

五、吉林、哈爾濱

【功能與主治】小股內膿生瘡，以及各種毒瘡，年久不收口，流膿流水，皆能消毒殺菌，生肌化腐。主膿瘡毒瘡，久不收口等症。

【處方】、【制法】同沈陽，僅冰片用二錢。

【劑量及用法】可將此藥挑塗瘡上，油紙蓋復，用量可照瘡口大小酌量用之。

【禁忌】用后忌食辛辣發物。

六、呼和浩特

【處方】官粉 樟腦 冰片 青粉 石硃各五錢

【制法】用香油炸枯去渣，免黃蜡收膏。

云母膏

沈陽

【功能與主治】斂瘡口，蝕腐生肌。主各部生瘡，日久成漏。

【處方】云母石八錢 硃霜二錢 白蜜六兩 寒水石(煨) 滑石 銅綠各六錢 明礬 膩粉各三錢

【制法】諸藥共研細面，次將白蜜置淨碗內，用沸水更置火上加熱溶化，次入藥粉攪勻，冷定成膏。

【劑量及用法】按瘡口大小用油紙攤貼之。

五虛膏

禹縣

【功能與主治】無名腫毒，大小疔毒，疔腸疔瘡，瘡瘍潰爛。

【處方】當歸 人黃 白芨 白蘞 川烏 草烏 官桂 木鱧 苦參各四兩 全蠍一兩 蜈蚣二十條 烏蛇一兩五錢 乳香 沒藥各一兩 蝦蟆十個 白芷 連翹 防風各二兩 廣丹六斤 香油十二斤

【制法】把藥入油內熬枯，滴水成珠，加廣丹乳香沒藥即成。

【劑量及用法】外貼患處。

【備考】有效期二年。

血云膏

吉林

【功能與主治】去毒散風，殺菌活血，消腫止痛。主無名腫毒，疔瘡癰癤，惡瘡潰破，周身搔痒等症。

【處方】廣松香一斤二兩四錢 乳香一錢四分 沒藥 血竭花各二錢 銀珠一小包 麻油二兩六錢七分

【制法】藥研細面，用鍋熬成

瘡瘍類

膏，兌入麻油，每二錢滑石為衣。置于清涼之處，勿使發潮生霉。

【劑量及用法】貼于患處。

硃砂膏

一、天津

【功能與主治】解毒去濕。主瘡癰潰破，流膿流水，濕氣膿瘡。

【處方】硃砂 銀珠各四兩 章丹八兩 官粉六斤 松香一斤 黃蜡四兩 香油八斤

【制法】以上共熬成膏。

【劑量及用法】貼患處。

二、濟南

【功能與主治】瘡瘍腫痛，潰久不斂。

【處方】銀珠五兩 硃砂一兩 官粉四斤

【制法】共研細末，用香油六斤，熬至滴水成珠后，再入方內官粉四斤，如法收膏，攪勻備用。

【劑量及用法】油紙攤膏，貼患處。

夾紙膏

一、上海

【功能與主治】膿瘡潰爛。

【處方】甘石(制)一錢 白蜡六兩 乳香(制)六錢 黃蜡五兩 樟腦四錢 當歸一兩 沒藥(制)六錢 輕粉五錢 猪油四斤

【制法】先將猪油及黃白蜡同烱化后，再和各藥細粉調勻，用白皮紙拖之，陰干。

【劑量及用法】將膏藥鑽細孔貼患處，一日一換。

【禁忌】不可水洗，不可入口。

二、南京

【功能與主治】膿瘡腐爛，臭穢痛痒。

【處方】同上海，僅樟腦用洋樟。

【制法】先將乳香沒藥等六味研為細末，乳之極細，以猪油熬化去渣，和黃白蜡一起烱化，候微冷時，再將另研六種藥末放入攪勻，即以牛皮紙裁成二寸寬八寸長的紙條拖之，使藥粉與油俱粘于紙上。

【劑量及用法】將膏用針密刺細孔，貼于患處，一日一換，用時須將患處洗淨。

三、武汉

【功能与主治】腫瘡腐爛，臭穢痛痒。

【处方】同上海。

【制法】先將猪油同白黃蜡等鎔化后，再將各藥細粉調勻，成膏七十四兩半，用紙拖之，共作成一百二十四張，每張長七寸，寬三寸（市尺）。

【劑量及用法】將軟膏敷貼患處，一日一換。

四、沙市

【功能与主治】治腫瘡腐爛臭穢，不時痛痒等症。

【处方】生猪油八兩 熟石膏四兩 生龙骨 黃柏各五錢 黃丹 生大黃 赤石脂各五錢 紅昇片 輕粉各三錢 乳沒五錢 洗片一錢 甘石五錢 雄黃三錢 枯矾二錢

【制法】共研細末。

【劑量及用法】用生猪油捶融，攤紙上，貼患處。

【禁忌】體寒者勿用。

五、濟南

【功能与主治】腫瘡潰爛。

【处方】同上海。

【制法】先將猪油及黃白蜡同鎔化后，再將各藥細粉調勻，用白紙拖之，陰干。

【劑量及用法】將膏藥鑽細孔，貼患處，一日一換。

【禁忌】不可水洗。

六、沈陽

【功能与主治】收斂排膿，生肌止痛。主小股內腫生瘡，腐爛臭穢，不時痛痒，流膿流水，久不收口，多年腫瘡。

【处方】煅石膏 爐甘石各一兩 寒水石 嫩松香 龙骨 輕粉各五錢

【制法】將松香放銅勺內熬至黑色，傾入水內，候冷與諸藥共研極細末，加以適量猪脂調勻，貯玻璃瓶內。

【劑量及用法】量瘡部大小，剪油紙兩張，夾膏于內，周圍用糊封黏，針刺數孔，並將瘡口洗淨拭干，貼后以藥布縛之，每日洗換一次，貼愈為止。

【禁忌】辛辣刺激品。

七、撫順

【处方】乳香六錢 黃丹 雄黃各一錢。

【制法】用水膠半斤化開，和藥刷紙上二次妥。

八、吉林（隔紙膏）

【功能与主治】殺菌消毒防腐，生肌止痛。主腫瘡。

【处方】炒黃丹 輕粉 兒茶 沒藥 雄黃 血竭 五倍（炒） 銀硃 枯矾各一兩

【制法】共研細面。

【劑量及用法】先將瘡口用葱椒煎湯洗淨拭干，可量瘡口之大小，用油紙兩張，夾藥于內，紙之周圍用麵糊粘住，然後貼于患處，以布帶縛上，一日洗一次，再換新藥。

【禁忌】忌食辛辣腥冷等物。

附參考古方

【来源】醫宗金鑑。

【功能与主治】腫瘡。

【处方】黃丹（炒） 輕粉 兒茶 沒藥 雄黃 血竭 五倍子（炒） 銀硃 枯矾各等分

【制法】共為末。

【劑量及用法】量瘡大小，剪油紙二張，夾藥于內，紙周圍用麵糊粘住，紙上用針刺孔，先將瘡口用葱椒煎湯洗淨拭干，然後貼上，以布縛之，三日一洗，再換新藥貼之。

腫瘡膏

天津

【功能与主治】除濕殺菌、活血解毒。主各種腫瘡，潰爛流水，或腫或疼或痒，浸淫不已，久不收口。

【处方】血竭面二錢 乳香面五錢 松香面八錢 枯矾面 輕粉各四錢 紅粉二錢 銀硃一錢 冰片八分 官粉 章丹各四錢

【制法】共為細粉，用大麻油三兩五錢調膏，二兩重裝瓶。

【劑量及用法】量瘡口大小，取適量此膏攤于油紙上，取另一塊油紙用針刺孔蓋之，將有孔一面貼患處，以布縛好，二日換一次。

膝下膏

濟南

【功能与主治】膝下濕毒腫瘡。

【处方】乳香 沒藥 白芷 爐甘石各四錢

【制法】猪板油半斤，黃蜡一兩收膏。

【劑量及用法】先以米泔水，煮沸洗患處，再以膏擦之，外敷油紙，棉花包裹，隔日再換。

【禁忌】魚蝦辛辣食物。

清濕紫金膏

杭州

【功能与主治】治常風濕地、腳發濕瘡、紅腫痛痒，挖破潰爛，或每年一發，或日久不愈。

【处方】西紫草 紫金皮各十六兩

【制法】用麻油十斤，煎透去渣，加黃蜡一斤八兩，共熬成膏。

【劑量及用法】將藥搽塗患處，上裹油紙。

胭脂膏

濟南

【功能与主治】殺虫止痒，生肌消腫。

【处方】紫草五錢 香油四兩 黃蜡二兩 乳香（研細） 沒藥（研細）各五錢

【制法】紫草入香油內煎數滾去渣，再入黃蜡化盡為度，再入乳香沒藥收膏。

【劑量及用法】用棉紙做如膏藥狀貼患處。

【禁忌】辛辣油膩等物。

烏龍膏

沈陽

【功能与主治】消腫生肌，主凍傷紅腫，或潰爛日久不愈者。

【处方】老松皮不拘多少

【制法】老油松外面老皮，焙焦炭存性，為細面。

【劑量及用法】香油調塗患處。

白鯽魚膏

重慶

【功能与主治】生肌收口。

【处方】北辛、姜虫、虫退、全虫、白芷、黃柏 薄荷 檳榔子

地榆 生地 鱗魚 鉛粉 麻油

【制法】先將各藥用麻油熬煎取汁，去渣后加入鉛粉制成膏藥，用油紙分攤成張，包裝成盒。

【劑量及用法】每盒一百張，淨藥二兩五錢。用開水或茶將患處洗淨，膏藥熨熱貼上。

【禁忌】同重慶之紅毛拔毒膏。

紫 草 膏

一、北 京

【功能與主治】化腐生肌。主瘡瘍已潰，疼痛不斂。

【處方】當歸 生地 白芷 防風 乳香 沒藥各三錢

【制法】用香油四兩炸枯去渣，再兌入紫草一兩，用溫水悶濕微炸，再加入黃蠟一兩四錢成膏。

【劑量及用法】塗敷患處。

【禁忌】忌食發物。

二、天津(玉紅膏)

【功能與主治】活血解毒，消腫止痛。主瘡癤疽后潰爛，膿血淋漓，久不收口，紅腫疼痛，冬日凍瘡，水火燙傷。

【處方】當歸 紫草 白芷 紅花各二兩

【制法】以上藥料用香油二斤炸枯，去渣濾淨，加黃蠟六兩收膏，五錢重裝盒。

【劑量及用法】塗抹患處。

呼 和 浩 特

【處方】當歸 白芷 甘草各一兩 紫草二兩

【制法】用香油二斤炸枯去渣，加黃蠟成膏。

瓜 蒞 膏

沈 陽

【功能與主治】消腫定痛散瘀。主發背對口疔搭，初起疼痛發熱，掀赤高腫。

【處方】瓜蒞五枚(取子去壳) 乳香一兩

【制法】先將乳香研面，和瓜蒞搗一處，用白蜜共熬成膏，瓷瓶存貯。

【劑量及用法】每服三錢五分，每日兩次，溫酒化服。

附參考古方

【來源】回生集(珍本醫書集成)(呂祖治發背靈寶膏)。

【處方】栝蒞(取子去壳)五枚 乳香(如聚人者)五塊

【制法】共研細末，以白蜜一斤，同熬成膏。

【劑量及用法】每服三錢，溫酒化服。

琥 珀 膏

吉林、哈爾濱

【功能與主治】解毒生肌消腫。瘰癧經久不愈，漸成瘻疾，流膿腥臭，勢轉癆病。

【處方】琥珀一兩 丁香 木香各三錢 桂心 硃砂 白芷 當歸 防風(去蘆) 木通 木鼈子(去壳)各五錢 黃丹七兩 垂柳枝二兩 松香二兩 香油一斤二兩。

【制法】除琥珀 丁香 桂心 硃砂 木香 松香各研極細末，余藥細剉，以油浸一夜，入鍋中以慢火煎，候白芷焦黃，濾出，次下松香末，濾去渣，再澄清油，却入鍋中慢火熬，下黃丹，以柳木不住手調，令黑色，滴水中成珠不散，看軟硬適中，入琥珀等末調勻即成，攤于布上合之，放于瓷器存貯。

【劑量及用法】視患處大小，用火煨烱，攤勻紙上貼之。

附參考古方

【來源】瘍醫准繩。

【功能與主治】頸項瘰癧，初發如梅子，腫結硬強漸若連珠，或穿穴膿潰肌汁不絕，經久不瘥，漸成瘻疾並皆治之。

【處方】琥珀一兩(細研) 丁香 木香各二分 桂心半兩 硃砂 白芷 當歸 木鼈子(去壳) 防風(去蘆) 木通各半兩 黃丹七兩 垂柳枝二兩 松脂二兩 麻油一斤二兩

【制法】上除琥珀 丁香 桂心 硃砂 木香為細末，余藥細剉，以油浸一宿，入鍋中以慢火煎，候白芷焦黃濾出，次下松脂末，濾去滓，再澄清油，却入鍋中，慢火熬，下黃丹，以柳木不住手攪令黑色，滴水中成珠不散，看軟硬得所，入琥珀等末攪勻，磁器盛。

【劑量及用法】用時看大小，用

火燭紙上勻攤貼。

拔 毒 膏

一、北 京

【功能與主治】提毒止痛。主癰疽腫痛，已潰未潰，疼痛不止。

【處方】白蘇 木鼈子 蓖麻子 蒼朮 穿山甲(生) 金銀花 連翹 赤芍 生地 黃芩 梔子 當歸 白芷 大黃 黃柏 黃連各三兩二錢

【制法】上藥用香油二百四十兩炸枯去渣，煉至滴水成珠，入黃丹一百兩攪勻成膏，另兌：

乳香 沒藥 血竭 兒茶 輕粉 樟腦 紅粉各六錢

共為細粉，每二百四十兩膏油兌以上藥粉攪勻攤貼。

【劑量及用法】微火化開貼瘡上。

【禁忌】忌食發物。

二、濟 南

【功能與主治】瘡癤初起，紅腫熱痛。

【處方】白蘇 當歸 川芎 元參 黃芩 赤芍 人參 黃柏 蒼朮 生地 梔子 輕粉 紅粉 血竭 乳香 沒藥各四兩

【制法】用香油八斤，將前藥十一味煎至枯浮，去渣過稱，再煎至滴水成珠，每油一斤，下炒透黃丹八兩，再合輕紅二粉乳香血竭等面攪勻，出火氣，攤貼用。

【禁忌】辛辣等物。

三、沈 陽

【功能與主治】活血散瘀，消腫止痛排膿。主發背，對口搭手，掀赤高腫，疼痛發熱，潰后久不收口。

【處方】山梔八十個 木鼈子二十五个 象皮二兩 穿山甲五十片 血竭五錢 巴豆仁二十五个 兒茶 乳香 沒藥 硼砂各五錢 香油四斤

【制法】將香油燻枯，入木鼈子 象皮 穿山甲 巴豆 梔子燻化濾渣，入適量樟丹收膏，將血竭 兒茶 乳香 沒藥 硼砂共研細末，溶化入內，攪勻即成。

【劑量及用法】將患處使溫沸水洗淨，量大小攤膏貼之。

大敗毒膏

呼和浩特(附:連翹敗毒膏)

【处方】大黃一兩四錢 車前子全蠍(另)各二錢 蜈蚣二个 地丁生地 木通 甘草 木鼈子 連翹黃芩各二錢 銀花四錢 干蟬一个 芒硝(另)六錢 斑蝥三个

【制法】共合一处,水煎数次去渣,熬至毛紙不透时成膏,每斤兌蜜一斤,每斤淨膏兌大黃面二兩五錢,芒硝一兩五錢,每膏再兌豆霜一分,每罐裝二兩。

【備考】連翹敗毒膏再兌大黃面一兩二錢,元明粉八錢。

沈氏拔毒膏

沈陽

【功能与主治】防腐拔毒,主各种瘡毒,未成則散,已成則膿。

【处方】蓖麻子肉 銅青各一兩大蘗汁一碗 豆油春夏三兩,秋冬四兩 松香一斤

【制法】先將油煎滾,入松香溶化,次下大蘗汁,再入蓖麻銅青攪勻。

【剂量及用法】重湯煮化攤貼。

【備考】以器盛貯。

附參考古方

【来源】沈氏尊生書:杂病源流犀燭(拔毒膏)。

【功能与主治】呼膿長肉。

【处方】蓖麻子肉 銅青各一兩同研 大蘗汁一碗 豆油(春夏二兩秋冬四兩) 松香(煮融淨)一斤

【制法】先將油煎滾,入松香溶化,下大蘗汁,沸水尽,下水缸內,如絞糖法,入蓖麻、銅青攪勻,以器盛之,如用重湯煮化攤貼。

【剂量及用法】外貼。

麝香拔毒膏

濟南

【功能与主治】無名腫毒,癰疽紅腫。

【处方】人南星 当归 白芷 赤芍 粉甘草 肉桂各五錢 母丁香二錢五分 血竭一錢五分 沒藥 乳香 冰片各三錢 麝香五分

【制法】將以上各藥研極細粉备用,另用香油二斤熬开,加章丹一斤,熬至滴水成珠。放入涼水內泡之(拔去毒火),再撈出溫化,並將藥粉參入攪勻為度。

【剂量及用法】貼患处。

拔毒生肌膏

一、武 汉

【功能与主治】癰疽瘡癤,潰爛久不收口者。

【处方】当归 生地 黃柏 槐枝各八錢 人髮三錢 紫草皮二錢 紅升五錢 冰片五分 黃連粉五錢 黃蜡四兩

【制法】用前六味加麻油一斤,用火熬枯,去渣,再加紅升、冰片、黃連粉、黃蜡攪勻,待冷,成膏十七兩八錢,共裝八十九盒,每盒重二錢。

【剂量及用法】攤于紗布上,貼患处。

二、西 安

【功能与主治】拔毒生肌,护膜防菌。主治已潰之癰毒瘡瘍。

【处方】羊蹄甲一只 牛抵角 豬蹄甲 商陸各五錢 開陽花一兩 西大黃兩半 巴豆 白芨 白蘞各一錢半 蒼耳二兩 蓖麻兩半 干蟬一个 当归 漏蘆各五錢 山甲一兩 兩夫大兩半 鱧魚一个 元參一兩 木鼈 生肌烏 生草烏 杭大戟各一錢半 香油十斤 黃丹五斤 沒藥一錢 乳香一錢 元桂 芒硝 輕粉各錢半

【制法】后五味為面,熬成時兌入,照一般熬膏藥法熬制,攤于油紙上。

【剂量及用法】將瘡口先以開水洗淨,用此膏貼之,一日一換。

生肌膏

呼和浩特

【处方】川芎 生地 生山甲 白芷 獨活 赤芍 生白附子 当归 木鼈子 大麻子 大黃 黃柏 蒼朮 苦參 白蘞 赤小豆各一兩

【制法】用香油十斤,炸枯去渣,煉至滴水成珠,加黃丹收膏。

清涼膏

一、北 京

【功能与主治】清熱解毒止痛。主湯火燙傷,疼痛難忍。

【处方】石灰末一百六十兩 香油十六兩

【制法】用涼水潑开石灰末,攪渾澄清汁,加香油十六兩,以木棍順攪數百轉,自然稠黏如糊。

【剂量及用法】塗患处。

二、上 海

【功能与主治】瘡癤潰爛。

【处方】大黃 防風 玄參 黃芩 羌活 小生地 白芷 当归 烏藥 荆芥 麻黃(去節) 黃柏 赤芍藥 獨活 申姜(去毛)各六錢 木鼈子三錢 牡丹皮二錢 官桂四錢 棉子油十一斤 东丹(炒)三斤半

【制法】除东丹外,將余藥入油內煎熬至藥枯,濾去渣滓,再加入东丹,充分攪勻成膏,攤于紙上。方上东丹,依天气冷熱,可適當調整分量。

【剂量及用法】貼患处。

【禁忌】不可入口。

三、呼和浩特

【处方】脂油十兩(去皮渣) 乳香 沒藥 人黃各四錢 輕粉二錢

【制法】炸好去渣,每兩加黃蜡二錢五分成膏。

凍瘡膏

南 京

【功能与主治】主凍瘡已潰。

【处方】蝦瓦楞子(研末用水飛)一兩 冰片五分 山羊油脂(熬化)二兩

【制法】將瓦楞子蝦透研末,水飛乳細,加水片共乳成細末,以山羊油熬化,調和成膏,用瓶或膏盒裝之,每盒約重二錢。

【剂量及用法】每用少許,塗于患处。

陽和解凝膏

一、北 京

【功能与主治】散凝化結。主一切疽瘡乳疽瘰癧初起,及潰后流水

永不收斂。

【处方】鮮牛蒡四十八兩 川芎 鮮白鳳仙花梗各四兩 川附片 桂枝 人黃 當歸 官桂 川烏(生) 地龍肉 草烏(生) 殭蠶 赤芍 白芷 白蘇 白芨各二兩 續斷 防風 荊芥 五靈脂 木香 香櫞 橘皮各一兩

【制法】上藥用香油二百四十兩，炸枯去渣，煉至滴水成珠，入黃丹一兩攪勻成膏，另兌：麝香一兩 乳香 沒藥各二兩 共為細粉，每二百四十兩膏油，兌以上藥粉攪勻攤貼。

【劑量及用法】微火化開貼患處。

【禁忌】忌食生冷。

二、天津

【功能與主治】消腫止痛。一切陰疽瘰癧，乳瘡結核，不紅不腫不熱，凍瘡，疼痛不安，久不收口。

【处方】川附片 白蘇各二兩 荊芥一兩 桂枝 白芨各二兩 陳皮 兩 川芎四兩 大黃 當歸 地龍 生川烏 生草烏 殭蠶 赤芍 白芷各二兩 續斷 防風各一兩 鮮鳳仙花(代梗、葉)四兩 五靈脂 香櫞各一兩 鮮大力子(代梗、葉、根)三斤

【制法】用香油十五斤，先將鮮鳳仙花梗葉，鮮大力子梗葉根炸枯去渣，再炸群藥至枯，去渣濾淨，再入章丹九十兩攪勻成膏，每膏藥油十五斤兌：肉桂面四兩 乳香面 沒藥面各一兩 蘇合油四兩 麝香一兩 廣木香面一兩攪勻。每大張淨油二錢重，小張淨油一錢重。

【劑量及用法】貼患處。

三、上海(陽和膏)

【功能與主治】消散癰疽瘰癧，寒濕痰滯痠痛。

【处方】粗料：鮮大力子根三斤 爾丹(炒)七十二兩 荊芥 陳皮 香櫞 續斷各一兩 廣地龍 白芨 赤芍 殭蠶 大黃 白芷各二兩 生草烏(漂淨)二兩 五靈脂一兩 官桂二兩 木香一兩 附子(泡去皮制)生川烏(漂淨)各二兩 川芎四兩 桂枝 當歸各二兩 鮮白鳳仙花梗四兩 防風一兩 白蘇二兩 細料：肉桂一兩 蘇合香油四兩 乳香(制) 沒藥(制)各二兩 麝香

一兩

【制法】先將大力子根白鳳仙花梗，用菜油十斤熬枯去渣，加粗料藥熬枯，去渣澄清，再加爾丹熬至滴水成珠收膏，攤時再加細料中肉桂乳香沒藥麝香蘇合香油和勻，攤紙上。大號每張用膏藥肉四錢，中號二錢五分，小號一錢五分。

【劑量及用法】貼患處。

【禁忌】不可入口。

四、南京

【功能與主治】消散。主痰核、瘰癧、凍瘡。

【处方】鮮牛蒡根葉三斤 川芎四兩 鮮白鳳仙根四兩 附子二兩 廣木香一兩 桂枝二兩 五靈脂一兩 大黃二兩 廣陳皮一兩 當歸二兩 香櫞皮一兩 肉桂一兩 麝香一兩 (攤膏藥時和入) 官桂二兩 蘇合油四兩(和入) 地龍二兩 制沒藥二兩(另研和入) 殭蠶二兩 制乳香二兩(另研和入) 赤芍二兩 生草烏二兩 白芷一兩 生川烏二兩 白蘇一兩 防風一兩 白芨二兩 荊芥一兩 川斷一兩

【制法】用菜籽油十斤，先將牛蒡白鳳仙熬枯去渣，除乳沒藥香蘇合油另研和入外，余藥陸續入鍋煎枯，去渣濾淨，文火熬至滴水成珠，以不粘指為度，秤准斤兩，每油一斤加黃丹炒透六兩收膏，俟冷時，再將乳香沒藥細末與蘇合油徐徐和入膏內，麝香隨攤隨加，攪之極勻，半月後可用。

【劑量及用法】用紅布或牛皮紙，攤成膏藥，貼于患處。

五、武漢

【功能與主治】一切疽症，瘰癧凍瘡潰爛，并治瘡疾。

【处方】牛蒡草一斤半 川芎四兩 鮮白鳳仙梗 川附子 桂枝 大黃 當歸 肉桂 官桂 草烏 川烏 地龍 殭蠶 赤芍 白芷 白蘇 白芨 乳香 沒藥各二兩 續斷 防風 五靈脂 荊芥 木香 香櫞 陳皮各一兩 蘇合香油四兩 麝香一兩

【制法】先將牛蒡草、白鳳仙梗用菜油十斤熬枯去渣，再將其余粗料藥熬枯去渣，熬至滴水成珠，加黃丹六十五兩，收膏一百三十三兩六錢，攤時再加肉桂蘇合香乳香

瘡 瘍 類

沒藥麝香共研粉入內，大號每張二錢，小號一錢，以紅布為壳。

【劑量及用法】視患處大小，熔膏貼患處。如治瘡疾，貼背脊第三節骨上。

六、廣州

【功能與主治】外用貼癰疽潰瘍。

【处方】牛蒡子三斤 川芎 白鳳仙梗各四兩 附子 桂枝 大黃 當歸 肉桂 草烏 川烏 地龍 殭蠶 赤芍 白芷 白蘇 白芨 乳香 沒藥各二兩 續斷 防風 荊芥 五靈脂 木香 香櫞 陳皮各一兩 蘇合油四兩 麝香一兩

【制法】用菜油十斤，先將牛蒡白鳳仙熬枯去渣，除乳香、沒藥、麝香、蘇合油外，余藥陸續入鍋內煎枯，濾淨去渣，每油一斤加黃丹七兩，熬至滴水成珠，不粘指為度，將乳香沒藥、麝香、蘇合油和入成膏藥狀。

【劑量及用法】將膏藥用布攤開貼患處。

七、杭州

【功能與主治】治陰疽風毒，乳巖惡核，瘰癧流注，凍瘡腫硬，諸種白色惡疽，一切無名腫毒，未成能消，已潰能斂，有溫熱氣血之功。兼治瘡疾。

【处方】荊芥 廣皮 陳香櫞 川斷各一兩五錢 地龍 白芨 赤芍 殭蠶 大黃 白芷 白鳳仙花梗 官桂各一兩 五靈脂 廣木香各一兩五錢 淡附片 草烏 川烏 桂枝 當歸各二兩 鮮大力子一兩五錢 川芎六兩 防風一兩五錢

【制法】用麻油十五斤，入藥熬枯去渣，煎至滴水成珠，加章丹六十兩收膏，每藥肉一斤，臨攤時再加制乳香 麝香 蘇合油 制沒藥 玉桂各一錢 共研細末，同藥肉攪勻攤于布上。

【劑量及用法】用時烘熱，按症貼于患處。治瘡疾貼背脊第三節骨上。

八、南昌

【功能與主治】陰毒乳疽瘰癧，及一切潰爛陰疽凍瘡，並治瘡疾。

【处方】新鮮牛蒡子根梗三斤 活白鳳仙梗四兩 川附片 桂枝

大黃 當歸各二兩 肉桂四兩 川烏 草烏 地龍 蠶蛭 赤芍 白芷 白蘇 白芨各二兩 川芎四兩 續斷一兩 乳香(研細末) 沒藥(研細末)各二兩 麝香(研細末) 防風 荊芥 五靈脂 木香 香櫞 陳皮各一兩 蘇合香油四兩

【制法】用麻油拾斤，先將牛蒡白鳳仙熬枯去渣，次日除乳香沒藥麝香蘇合香油外，余藥俱陸續入鍋煎枯，去渣濾淨，秤准斤兩，每油一斤用當日炒透黃丹七兩，徐徐投入攪和，熬至滴水成珠，不粘為度，離火待膏將凝時，將乳香沒藥蘇合香油麝香入膏攪和，半日後攤紙上用之。

【劑量及用法】貼患處，瘡癰貼背脊骨第三椎上。

【禁忌】紅腫癰癤勿貼，孕婦忌用。

九、沙市(陽和膏)

【功能與主治】治寒濕白疽及癰癤凍瘡等症。

【處方】牛蒡三斤(鮮根梗葉) 鮮白鳳仙(梗切細)四兩 麻油十斤 將上三味熬枯去渣，再加桂皮一兩 生二烏二兩 白蘇一兩 地龍五錢 蠶蛭 赤芍 白芷 白芨 生附子(切片) 桂枝 大黃(生) 當歸各一兩 中安桂二兩 川芎四兩 續斷 防風 荊芥 五靈脂 廣木香 香櫞皮 陳皮各一兩

【制法】上藥均入油內熬枯去渣，俟冷將油秤准，每一斤油春夏二季下黃丹七兩夏秋二季下八兩 黃丹須炒透攪勻，用文武火熬，候冷再加乳沒麵一兩 蘇合油四兩(如無不用亦可)麝香一兩和入膏內。

【劑量及用法】攤貼患處。

【禁忌】紅腫者忌用。

十、重慶

【功能與主治】專貼腦疽背疽，癰癤凍瘡，及一切潰爛陰毒，兼治瘰癧。

【處方】鮮牛蒡根三斤 川芎 鮮鳳仙梗各四兩 生附子 桂枝 大黃 當歸 肉桂 官桂 草烏 川烏 地龍 蠶蛭 赤芍 白芷 白蘇 白芨 續斷 乳香 沒藥各二兩 橘皮 防風 荊芥 五靈脂 青木香 香櫞各一兩 蘇合香油四

兩 麻油十斤 黃丹七十兩 麝香一兩

【制法】先將牛蒡根鳳仙根煎枯去渣，再將余藥投入煎枯去渣，每斤淨油用黃丹七兩收膏，惟乳香沒藥另研細末，膏收完時，投入攪勻，蘇合香油 麝香，臨攤膏時平均放入，亮油布攤膏，仿單包固。

【劑量及用法】貼。

十一、西安

【功能與主治】主治陰疽癰癤，惡瘡結核，已破未破，如人乳癰流注橫痃諸瘡，牛癰不起諸瘡症，也可疔瘡。

【處方】牛蒡子葉梗三斤 活白鳳仙花四兩(又名指甲花) 附子 桂枝 大黃 當歸 肉桂 官桂 川烏 草烏 地龍 蠶蛭 赤芍 白芷 白蘇 白芨各二兩 川芎四兩 續斷 防風 荊芥 五靈脂 木香 香櫞 陳皮各一兩

【制法】用麻油十斤，先將牛蒡白鳳仙花三味熬枯去渣，次日將附子等二十二味共入油熬枯去渣，過夜油冷，秤過斤量，每藥油一斤加炒黃丹七兩攪勻，文火慢熬至滴水成珠，越老越好，將油鍋放置冷處，將制過的乳香沒藥各一兩為末，再用蘇合油四兩，麝香一兩研細末，同入膏攪和勻，半日後用潔白細布攤之，或冷後作塊。

【劑量及用法】先用酒少許將患處洗淨，再將膏藥煖升貼之，三五天換一次。

【禁忌】謹戒房事。

十二、蘭州

【功能與主治】消腫止痛。主治瘰癧乳癰，一切陰性腫毒，不疼不紅不熱，及有瘡貼之有效。

【處方】大麻油十斤 活白鳳仙花梗四兩 川附片 白蘇 桂枝 白芨各二兩 鮮人參葉梗根一斤(先煎至枯去渣) 川芎四兩 大黃 當歸 肉桂 官桂 地龍 生川烏 生草烏 蠶蛭 赤芍 白芷各二兩 續斷 防風 荊芥 靈脂 木香 香櫞 陳皮各一兩

【制法】用香油十五斤，將藥炸枯去渣，兌黃丹七十五兩成膏，另兌乳香 沒藥各二兩 蘇合油四兩 麝香一兩

【劑量及用法】貼患處。

【禁忌】孕婦忌貼。

十三、濟南

【功能與主治】一切疽症，癰癤凍瘡等症。

【處方】粗棵鮮牛蒡子根三斤 黃丹(炒)七十二兩 荊芥 陳皮 香櫞 續斷各一兩 地龍 白芨 赤芍 蠶蛭 大黃 白芷各一兩 生草烏(漂淨)三兩 五靈脂一兩 官桂二兩 木香一兩 川附片(泡去皮制) 生川烏(漂淨)各二兩 川芎四兩 桂枝 當歸各二兩 鮮白鳳仙梗四兩 防風一兩 白蘇二兩 細料肉桂二兩 蘇合香四兩 乳香(制) 沒藥(制)各二兩 麝香一兩

【制法】先將鮮牛蒡子根白鳳仙梗，用菜油十斤熬枯去渣，熬至滴水成珠，再加黃丹，如法攤膏時，再加細料各藥合勻，大號每張用膏油四錢，中號二錢五分，小號一錢五分。

【劑量及用法】貼患處。

十四、沈陽

【功能與主治】散腫消堅，活絡止痛。主治瘰癧背疽乳疽，癰癤凍瘡，及一切潰爛陰毒瘡毒瘰癧等症。

【處方】鮮牛蒡三斤 川芎 鮮白鳳仙梗各四兩 川附子 桂枝 大黃 肉桂 當歸 官桂 草烏頭 地龍 川烏頭 蠶蛭 赤芍 白芷 白蘇 白芨 乳香 沒藥各二兩 防風 荊芥 五靈脂 木香 香櫞 陳皮 續斷各一兩 蘇合油四兩 麝香一兩

【制法】用菜油七斤，將鮮牛蒡鮮白鳳仙梗入油熬枯去渣，次日除乳香沒藥麝香蘇合油外，余藥俱陸續入鍋煎枯，去渣濾淨，秤准斤兩，每斤油加炒透黃丹七兩，熬至滴水成珠，不粘指為度，撒下鍋，再將乳香沒藥麝香蘇合油入膏攪和，半日後再用。

【劑量及用法】攤貼患處，若治瘰癧，貼背脊第三節骨上。

【備考】一方麝香用五錢，攤時每斤油加麝香四分，每張七分重。

十五、撫順(1)

(陽和膏)

【功能與主治】軟堅解凝，散瘀

消腫。主腫而未潰者可消，已潰者可斂，舉凡一切陰瘡，青紫塌陷，不疼不痒，膿清流水者均宜。

【處方】荆芥 防風 川斷 靈脂 木香 整青皮 陳皮各一兩 川芎四兩 白薇 川烏 草烏 地龍 殭蚕 白芷 赤芍 桂楠 當歸 大黃 山梔 川附子各二兩

【制法】香油二十斤，先下生薑四兩，再以油煎枯去渣，熬滴水成珠，每斤油下丹五兩，次下乳香沒藥各四兩，麝香一錢后兌。

【劑量及用法】貼患處。

十六 撫順(2)

(陽和膏)

【處方】同撫順(1)，僅青皮改用香櫞。

【制法】先下生薑牛子根叶梗三斤，鳳仙花四兩，再以油煎枯去渣，熬滴水成珠，每斤油下丹七兩，次下乳香沒藥各四兩，台麝一錢，半月后別。

十七、吉林、哈爾濱

(陽和膏)

【功能與主治】軟堅解凝，消腫生肌。主瘰癧背疽，乳疽瘰癧，凍瘡，以及一切潰爛陰毒。

【處方】牛蒡(取新鮮根莖叶)三斤，白鳳仙梗 川芎各四兩 附子 杜枝 大黃 當歸 肉桂 官桂 草烏 川烏 地龍 殭蚕 赤芍 白芷 白薇 白芨 乳香(細研) 沒藥(研細)各二兩 續斷 防風 荆芥 靈脂 木香 香櫞 陳皮各一兩 蘇合油四兩 麝香一兩 香油十斤 黃丹(炒透)若干

【制法】先將香油十斤(菜油更佳)入鍋，將牛蒡白鳳仙熬枯去渣，次日除乳香沒藥麝香蘇合油黃丹外，余藥俱陸續入鍋煎枯，去渣濾淨，稱准斤兩，每油一斤加黃丹(炒透)七兩，熬至滴水成珠，不粘指為度，撥下鍋來，將乳香沒藥麝香蘇合油入膏攪和，半月后可用，于瓷壇中貯貯，或攤置膏藥背紙上，每貼重三四錢。

【劑量及用法】攤貼患處。

十八、承德

【功能與主治】同濟南。

【處方】亦同，但將白芨列入細料。

【制法】先將牛蒡子梗白鳳仙梗，用菜油十斤熬枯去渣，次將其余數種藥熬枯去渣，加黃丹熬至滴水成珠收膏，攤時再加細料各藥和勻，大號每張用膏藥油四錢，中號二錢五分，小號一錢五分。

【劑量及用法】貼患處。

十九、呼和浩特

【處方】鮮牛蒡根叶二斤 白鳳仙根四兩 川附子 杜枝 大黃 川烏 草烏 地龍 殭蚕 川斷 白芷 赤芍 白薇 白芨各二兩 撫順四兩 防風 荆芥 木香 香櫞 靈脂 廣皮各一兩 官桂 當歸各二兩

【制法】用香油十二斤，熬至滴水成珠，加黃丹四斤半成膏，攤時再加細料：乳香 沒藥 肉桂各二兩 蘇合香四兩 麝香二兩 共為細面，每斤膏兌細面七錢。

附參考古方

【來源】外科全生集。

【功能與主治】治一切陰疽流注，潰爛不堪，及凍瘡毒根等症，未潰者，一夜全消；已潰者，三張全愈。瘰癧貼背心立愈。

【處方與制法】鮮大力子梗叶根二斤 白鳳仙梗四兩 大麻油十斤 先煎至枯去渣，次日用川附子 杜枝 大黃 當歸 肉桂 官桂 草烏 川烏 地龍 殭蚕 赤芍 白芷 白薇 白芨各二兩 川芎四兩 續斷 防風 荆芥 五靈脂 木香 香櫞 陳皮各一兩 再煎藥枯，瀝渣隔宿油冷，見過斤兩，每油一斤，用炒透桃丹七兩攪和，明日文火再熬，至滴水成珠，不粘指為度，以濕草紙覆火，移鍋放冷處，將乳香沒藥木各二兩，蘇合油四兩，麝香一兩，研細入膏，攪和極勻，出火氣，半月后攤貼。

回陽玉龍膏

京

【功能與主治】主陰疽瘰癧發背，寒濕流注，冷痺風濕，仙膝風等症。

【處方】生草烏(炒)三兩 淡干姜(煨)二兩 赤芍藥(炒) 生南星(煨) 白芷(生研)各一兩 肉桂

(不見火)五錢

【制法】共研細末。

【劑量及用法】每用三五錢，溫酒調敷患處。

【禁忌】不可入口。

夏枯草膏

一、天津

【功能與主治】化痰止痛。主瘰癧堅硬，或流膿流水，腫疼纏綿不已。

【處方】夏枯草十斤

【制法】以上熬汁，去渣濾淨，將汁煉至滴毛頭紙上，背面不墜為标准，收清膏，每清膏一斤兌蜜三斤，收膏裝瓶。

【劑量及用法】每次服一兩，白開水沖服。

二、上海

【功能與主治】消瘰癧。

【處方】當歸五錢 陳皮三錢 夏枯草廿四兩 甘草 昆布各一錢 象貝母 殭蚕(炒)各五錢 桔梗 川芎各二錢 白芍藥(炒) 玄參 烏藥各五錢 紅花二錢 香附(制)一兩

【制法】共煎汁兩次，榨淨，將各次所煎藥汁澄清過濾，蒸發成濃汁，加白蜜八兩，收成膏十兩。

【劑量及用法】每次半羹匙，開水化服。

三、南京

【功能與主治】解熱散結。主瘰癧瘰癧氣。

【處方】夏枯草十斤

【制法】以清水煎熬取汁，去渣濾清，加白蜜二斤收膏。

【劑量及用法】每服三錢，開水和服。

四、武漢

【功能與主治】瘰癧結核，堅硬不消。

【處方】同上海。

【制法】取上藥按量加水十倍，煮四小時，照例三次，每次過濾，取液濃縮至五斤，加冰糖一斤半，使成膏一斤十一兩即得。

【劑量及用法】每服五錢至一兩，開水沖服。

五、杭州

【功能与主治】治憂思郁怒，肝旺血燥，寒熱瘰癧，癰疽堅硬，結核腫痛，癰癰腫毒，目珠夜痛等症。

【处方】同上海，分量为其十倍。

【制法】共煎濃汁去渣，酌加白蜜，文火收成膏。

【剂量及用法】每服二至五錢，不拘時，開水沖服。

【禁忌】忌惱怒，魚腥發物。

六、濟南

【功能与主治】瘰癧。

【处方】夏枯草五十斤

【制法】將草煎熬，取汁收膏，每斤兌蜜二斤。

【剂量及用法】每服五錢，升水化服。

七、撫順

【处方】枯草八兩 烏藥 苦梗 當歸 白芍 殭蚕各二錢 昆布 川芎各一錢半 紅花三錢 云連二錢 貝母 牛子 香附各三錢 甘草一錢半 大貝 陳皮 元參各二錢 連翹 青皮各二錢

【制法】熬成膏，加蜜四兩收之。

陀僧膏

一、沈陽

【功能与主治】拔膿生肌長肉。主諸般惡瘡流注，瘰癧鼠瘡，跌打金刃創傷，潰破流膿等症。

【处方】密陀僧(研末)二斤 赤芍 當歸各二兩 乳香 沒藥各五錢 赤石脂(研)二兩 苦參四兩 百草霜三兩 銀麝一兩 桐油一斤 血竭(研) 孩兒茶(研)各五錢 川大黃半斤

【制法】先將赤芍當歸苦參大黃入油內燻枯，熬至滴水不散，再下陀僧木，用槐柳枝攪至滴水成珠，將百草霜細篩入攪勻，再將羣藥及銀麝篩入攪極勻，傾入盆內，众手扯千余下，再入磁盆內，常以水浸之。

二、撫順

【处方】官粉十兩 陀僧四斤 香油五斤

【制法】將油熬成珠，下丹陀僧官粉，成膏即妥。

三、哈爾濱

【功能与主治】止痛散血消腫。一切外科腫瘍，已潰未潰，創破流血，疼痛異常。主惡瘡流注瘰癧，跌扑損破，金刃創傷。

【处方】同沈陽，制法亦同。

【剂量及用法】量瘡瘍傷口之大小攤敷之。

【禁忌】不可入口。

附參考古方

【来源】医宗金鑑

【功能与主治】專貼諸般惡瘡，流注瘰癧，跌扑損破，金刃誤傷等症。

【处方】南陀僧(研末)二十兩 赤芍 全歸各二兩 乳香(去油研) 沒藥(去油研)各五錢 赤石脂(研)二兩 苦參四兩 百草霜(篩研)二兩 銀麝一兩 桐油二斤 香油一斤 血竭(研) 孩兒茶(研)各五錢 川大黃半斤

【制法】上藥先將赤芍、當歸、苦參、大黃入油內燻枯，熬至滴水不散，再下陀僧木，用槐柳枝攪至滴水成珠，將百草霜細篩入攪勻，再將羣藥及銀麝篩入，攪極勻，傾入水盆內，众手扯千余下。再收入磁盆內，常以水浸之。

結乳膏

天津

【功能与主治】活血化痰，消腫止痛。主婦女乳癰，乳腫乳癰，吹乳乳疼，乳房堅硬有核，初起紅腫，疼痛難忍，瘰癧結核。

【处方】香油十五斤 章丹九十兩

【制法】以上香油煉至滴水成珠，入章丹攪勻成膏，每膏藥油二斤兌：韭菜汁 銅綠面 血竭面 乳香面 沒藥面各五錢 白砒面三錢 麝香六分 攪勻，每張淨油一錢重。

【剂量及用法】貼患處。

【禁忌】已破勿貼。

化堅膏

天津

【功能与主治】活血散瘀，消堅

止痛。主瘰癧鼠瘡乳核，以及一切瘡癰初起的紅腫堅硬，疼痛不止。

【处方】夏枯草 昆布 海藻各六兩 干姜 生鹿角 生靈脂 生甘遂 生人戟 生牡蠣 生白芥子各三兩

【制法】以上藥料用香油十五斤，炸枯去渣濾淨，煉至滴水成珠，再入章丹九十兩攪勻成膏。每膏藥油十五斤兌：雄黃面 肉桂面 信石面各二兩 麝香三錢 攪勻。每大張淨油一錢，小張淨油一錢。

【剂量及用法】貼患處。

化核膏

沙市

【功能与主治】治淋巴腺結核。攤此膏貼患處可以消散毒氣。

【处方】香油四斤 壁虎十四個 蜘蛛廿八個 蝸牛卅六個 入鍋熬枯去渣，再入首烏屯叶 菊花根 牛子 蒼耳子(用文武火熬枯去渣)各八錢

【制法】先將連翹四錢 玄參 苦參 白蘆 芥子 殭蚕 栝子仁 人黃 荆芥 防風各四錢 木鼈子一兩 蒼香二兩 公丁香四錢 沒油中一夜以後，熬前藥，每斤油入黃丹七兩五錢，炒透攪勻，用文武火熬，候冷再加麝香一錢。

【禁忌】無結核者忌用。

消核膏

沈陽

【功能与主治】軟堅消腫化核。主瘰癧、項間結核串及胸部。

【处方】制甘遂 紅牙大戟各四兩 白芥子二兩 麻黃八錢 生南星 姜半夏 殭蚕 藤黃 朴硝各三兩 香油二十斤

【制法】先入甘遂南星半夏熬枯，撈出，次下大戟麻黃殭蚕芥子藤黃，逐次熬枯撈出，再下朴硝，用絹將油濾淨，再下鍋熬滾，徐徐投入炒透章丹，丹量以膏之老軟酌用，攪勻，冷定成膏。

【剂量及用法】洗淨患處，量其大小而攤敷之。

万应消核膏

济 南

【功能与主治】無名腫毒，癰疽發背，結核瘰癧。

【处方】元參一兩五錢 馬錢子三兩 蓖麻子八錢 五倍子八錢 蛇退三錢 杏仁三兩 木鼈子八錢 川山甲二兩 蜂房八錢 男子髮一兩(洗淨) 巴豆二十五粒 黃丹一斤 香油二斤

【制法】將以上各藥入香油內，用火將藥炸枯去渣，熬至滴水成珠為度，再加章丹收膏，加樟腦五錢收膏備用。

【劑量及用法】按敷處大小酌情。

【禁忌】辛辣燒酒等物。

神效癰癧膏

呼 和 浩 特

【处方】生半夏 生甘遂各二兩 生馬錢子四錢 生川山甲 生牙皂各三錢 血竭花(另兌面)二錢

【制法】將前五味用香油六兩炸枯去渣，入黃丹收膏后，再入血竭面化勻如患癰癧量大小攤于布上貼之，惟攤膏時兌麝香少許。

千 鍾 膏

西 安

【功能与主治】主治癰癧(淋巴腺結核)初起，貼之自消，將潰貼之不穿潰亦可漸消。

【处方】杏仁 蓖麻仁各四十九粒 琥珀(灯心同研) 冰片各二錢 珍珠(豆腐包煮) 血竭 當門子 乳香 沒藥 銅綠 黃丹 龍骨 輕粉各六分 水安息(如龙眼肉大三塊) 松香(入鍋內文火化開，濾去渣冷定，用豆腐水煮數次，再用葱、薑生薑汁各一杯，煮干研細末)八錢

【制法】先將杏仁、蓖麻仁搗如泥，次將前藥細末逐漸加入搗至極融勻，磁瓶收入待用。

【劑量及用法】視核之大小，將膏化攤于大紅緞上貼之。若內有化膿，可以木鼈子七分、鹽蹄甲(煨研)五分，和于膏內，即可隔皮收膿。

癰癧千槌膏

天 津

【功能与主治】消堅散結，活血止痛。濕痰流注，癰癧結核，耳前耳后，或在項下胸腋間，累累如珠，痛腫堅硬不消，或皮色不變。

【处方】生松香八兩 生乳香 生沒藥各一錢 杏仁(去皮) 銅綠各一兩 巴豆仁五粒 大麻子仁一兩

【制法】共搗千槌成膏，作圓餅每個一錢。

【劑量及用法】用熱壺溫軟攤于布上，貼患處。

鴟 鴞 膏

濟 南

【功能与主治】筋骨疼痛，手足麻木，癰癧結核，無名腫毒。

【处方】鴟鴞一個 穿山甲一兩二錢(生) 桂枝五錢五分 白芷一錢五分 木賊草三錢五分 山萸肉一兩 郁金 赤芍各五錢 赤芍六錢 當歸一兩 云苓 南紅花各五錢 白芍六錢 全蠍十條 麻黃三錢五分 右斛二兩

【制法】用香油二十八兩，先將鴟鴞炸枯去骨，再入他藥同炸，濾去渣，用章丹三兩，官粉十四兩收膏。

【劑量及用法】將藥膏攤于布上，貼患處。

【禁忌】辛辣發物。

顯曲氏回春膏

禹 縣

【功能与主治】疔毒惡瘡，無名腫毒，跌打損傷，凍瘡癰癧，牙疼疔腮，脚氣狗咬，搭背對口，鼠瘡癰癧，附骨陰疽，手足麻木，胃腹腹疼，鶴膝風症，氣痞寒積，乳岩乳核，臂腰腿疼。

【处方】當歸 木鼈子各二兩 梔子 牙皂 白芨 兒島 草烏 烏藥 白薇 連翹各二兩五錢 苦參 槐枝各四兩 西大黃 乳香 去油 沒藥去油 血竭 兒茶 明雄 樟腦各一兩五錢 麝香一錢 葱白一斤 生薑二斤 香油七斤 廣丹三斤八兩

【制法】香油將藥煎枯去渣，加

瘡 瘍 類

丹熬成膏，下乳香 沒藥 血竭 兒茶 明雄 麝香 樟腦即成。

【劑量及用法】均按患處大小貼用，溫開水煖軟，夏天用水泡成薄片，攤在布上，貼到患處。

【禁忌】孕婦忌用。

【備考】有效期二年。

紅毛紫金膏

重 慶

【功能与主治】專貼惡瘡結毒，癰癧冷瘡瘡塊，乳癰乳岩，魚口便毒，潰爛不癒。

【处方】梔子二兩 地丁 蜂房 黃芪 貝母 牙皂 殭蠶 穿山甲 白芷 白薇 蒼朮 防風 黃芩 川芎 荆芥 獨活各二兩 薄荷 黃連各一兩五錢 枳殼 生川烏各二兩 大楓子五兩 姜黃一兩 細辛 花椒 附子 全山 連翹 赤芍 地骨皮 黃柏 靈仙 五倍子 吳茱萸 羌活 紅花 木瓜 白蘚皮 花粉 橘皮 生半夏 地黃 生甘草 木鼈子 桃仁 當歸各二兩 生附子一兩五錢 丁香一兩 血竭一兩五錢 沒藥 乳香各二兩 密陀僧五錢 三七一兩 脆蛇二條 雄黃一兩 硃砂四兩 象皮二兩 蜈蚣十五條 麻油二十斤 黃丹十斤 麝香四錢 蟾酥一兩 梅片四兩

【制法】血竭、沒藥、乳香、密陀僧、三七、脆蛇、雄黃、硃砂、象皮、蜈蚣另研，麝香、蟾酥、梅片后下，均入余藥，油泡一日，煎枯去渣，每淨油一斤，加黃丹八兩，油紙攤貼。

【劑量及用法】不拘。

麝香回春膏

禹 縣

【功能与主治】橫痃下癰，婦女奶瘡，搭背對口，疔毒惡瘡，腰疼腿疼，無名腫毒。

【处方】香油四斤半 血竭一兩半 紅花三錢 双醋二斤 廣丹二斤四兩 乳香一兩半 甘草三錢 麝香七分 沒藥一兩半 冰片三錢 黃柏十兩 白芍三錢 三七七錢 牛胆二斤

【制法】將油、廣丹熬成，再將双醋、牛胆熬稠共合一处，將各樣藥

面下入膏內即成。

【剂量及用法】貼患處。

【禁忌】孕婦忌用。

【備考】有效期二年。

熊胆軟膏

武漢

【功能与主治】痔瘡要藥，亦可點治火眼。

【处方】熊胆 珍珠母各十兩 冰片六兩 麝香六錢 制甘石五十兩

【制法】取上藥碾細粉，加黃石蠟三百零一兩（亦可按季節適當加減，混合調成膏，分裝一千一百八十支，每管重三錢二分，用錫管裝。

【剂量及用法】塗布或擠出。

紅膏藥

一、

处方刪

二、抚顺

【功能与主治】消腫殺菌防腐。主疔毒瘡瘍、結核瘰癧，脚氣（脚泡炎）、一切外傷化膿痛癢等症。

【处方】松香一兩 潮腦五錢 白芷 大貝各二錢 輕粉 銀朱各一錢 蜈蚣四條 冰片五分

【制法】共為細面，放盆內以水燉成膏。

【剂量及用法】貼患處。

黑膏藥

一、沙市

【功能与主治】治癰疽潰口等症。

【处方】川烏一兩 當歸 木鱉子 大黃 白芷 天丁 苦參 天雄 穿山甲 乳沒 連翹 赤芍 生地各二兩 黃丹五斤 草烏一兩 香油十斤

【制法】上藥用文武火熬枯去渣，滴水成珠，將油提開，再入黃丹，候冷再加樟腦三錢。

【剂量及用法】用時先將丹藥貼患處，再貼此膏。

【禁忌】辛辣蔥蒜諸品。

二、重慶

【功能与主治】除風消毒。

【处方】二烏各六錢 大黃 秦歸 赤芍 白芷 白芨 白朮 木鱉 川桂各八錢 連翹六錢 苦參 牙皂各五錢 藿香梗三錢 黃丹二兩 天地丁各一兩 蜂房 蒼朮各八錢 木瓜六錢 云母五錢 麻油三斤

【制法】共用麻油熬成膏藥。

三、禹縣

【功能与主治】無名腫毒，一切潰瘍。

【处方】芙蓉葉八兩 乳香 沒藥 連翹 白芷各二兩 當歸 紅花各一兩 香油十斤 廣丹五斤

【制法】將藥入油內煎枯，滴水成珠，加乳香沒藥廣丹即成。

【剂量及用法】外貼患處。

【備考】有效期二年。

梅花點舌丹

一、北京

【功能与主治】解毒消炎止痛。主疔瘡發背，癰疽紅腫。

【处方】乳香 沒藥 硼砂 雄黃 血竭 葶藶子各三十兩 沉香十五兩 白梅花一百五十兩 生石決明十八兩 蟾酥六十兩 朱砂三十兩 共為細粉兌入：牛黃 冰片各十五兩 麝香 珍珠各九兩

【制法】上藥和勻，用熊胆九兩熬湯打小丸，每兩分為六百粒，用方內朱砂為衣。

【剂量及用法】每服五粒，日服二次，黃酒送下，溫開水亦可，外敷用醋化開敷患處。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天津

【功能与主治】消腫、解毒、止痛。主疔毒惡瘡，癰疽搭背，乳癰乳癰，初起紅腫，疼痛心煩。

【处方】白梅花一錢二分 生硼砂 葶藶子 沉香 血竭 制乳香 制沒藥各二錢

共為細粉兌入：冰片 牛黃各一錢 珍珠 麝香各六分 朱砂面雄黃面各一錢

【制法】以上研細和勻，用蟾酥汁，熊胆汁、蟾酥一錢用白酒二錢化開，熊胆用水化開）為小丸，每丸重二厘，每二粒裝瓶。

【剂量及用法】每次服一瓶，白酒送下，白開水亦可。外用使醋泡開敷上。

【禁忌】孕婦忌服。

三、上海

【功能与主治】疔瘡癰疽。

【处方】麝香八錢 珍珠一兩二錢 朱砂 牛黃各八錢 冰片 熊胆 血竭各四錢 蟾酥八錢 沒藥（制） 葶藶子 月石（飛） 乳香（制） 腰黃 沉香各四錢

【制法】除蟾酥外，余藥分別研細粉，充分和勻，用燒酒化蟾酥打丸，每丸重一錢。

【剂量及用法】每服二粒至五粒，溫開水送服。

【禁忌】孕婦忌服。

四、南京

【功能与主治】主疔瘡對口，發背癰疽。

【处方】珍珠三錢 制沒藥一錢 蟾酥二錢 熊胆一錢 麝香二錢 明雄黃一錢 西牛黃二錢 硼砂一錢 飛朱砂二錢 血竭一錢 梅花冰片一錢 沉香一錢 制乳香一錢 葶藶子一錢

【制法】上藥十四味，細料另研，各取淨粉，將蟾酥用人乳化開，和勻搗融，酌加煉白蜜為丸，分做五百粒。（每粒淨粉計重四厘外蜜）每粒用蠟壳封護。

【剂量及用法】每服一粒，以陳酒溫熱吞服。

【禁忌】孕婦忌服。

五、武漢

【功能与主治】疔毒惡瘡，癰疽腫痛，實火牙痛，喉痛喉蛾，喉風口舌諸症，小兒急驚風。

【处方】制乳香 制沒藥 硼砂 明雄黃 熊胆 血竭 葶藶 沉香

冰片各一錢 珍珠二錢 麝香 硃砂 西牛黃 蟾酥 琥珀各二錢

【制法】混合碾細，按淨粉量加淀粉50%，用適量水和成小丸，每錢不得少於四十粒，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一至五粒，黃酒或白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

六、福州

【功能與主治】外癰腫毒，癰疽發背，疔瘡惡症，紅腫疼痛初起，並治山嵐瘴氣，時疫痧脹。

【處方】熊胆 珍珠 麝香 冰片各一錢 血竭 沒藥 雄黃 月石各二錢 西黃 蟾酥 黃連 沉香 葶藶 梅花瓣各二錢

【制法】加入乳煨化為丸，金箔衣。

【劑量及用法】內服一丸，好酒化下，外治外敷。

七、杭州

【功能與主治】治一切疔瘡、腦疽發背、紅腫癰癤、無名熱毒初起、喉痛乳蛾、婦人乳癰、一切惡瘡難治之症。能護心解毒，不使內陷，化險為夷，轉危為安。

【處方】西牛黃二錢 淨沒藥四錢 珍珠粉一錢二分 淨乳香四錢 麝香一錢二分 真沉香四錢 梅冰片一錢 飛月石四錢 熊胆肉二錢 明雄黃四錢 杜蟾酥二錢 飛辰砂上血竭 綠萼梅各四錢 苦葶藶二錢

【制法】各取淨粉，用人乳化蟾酥為丸。每三粒重一分。

【劑量及用法】每服二至三丸，溫酒送下，睡臥蓋暖取汗甚效，或入葱白內打碎酒送，蓋被取汗尤妙。

【禁忌】孕婦忌之。

八、南昌

【功能與主治】疔瘡腦疽發背，癰疽腫毒。

【處方】葶藶 血竭 熊胆 飛雄黃 礞砂 制沒藥 制乳香 上冰片 上沉香各一錢五分 人珍珠四錢五分 西牛黃二錢 飛硃砂三錢 麝香二錢

【制法】共研細末，另用蟾酥二錢，人乳汁化開和勻，搗融為丸。每料七白五十粒，金箔為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每用一丸，葱白一個搗碎，陳酒送下，睡臥蓋暖取汗，小兒視年齡及病情酌減服。

【禁忌】孕婦忌服，戒食辛辣物。

九、沙市

【功能與主治】治疔瘡發背、紅腫癰癤，及一切無名腫毒初起等症。

【處方】乳香(制) 沒藥(制) 礞砂 明雄黃 熊胆 血竭 葶藶子 沉水香 正梅片各一錢 麝香 硃砂 牛黃各二錢 珍珠三錢

【制法】上藥共為細末，另用蟾酥二錢 研細(酒化亦可)，加糯米漿和勻為丸，每丸淨重一分，金箔為衣。

【劑量及用法】成人量每用二丸打碎，陳酒浸，以葱頭煎湯送下，睡臥蓋暖取汗，或用醋磨外敷。

【禁忌】白疽不紅腫者及孕婦均忌用。

十、重慶

【功能與主治】治疔瘡腦疽，發背，紅腫癰癤，一切無名熱毒初起，及實火牙痛，喉蛾喉風，小兒驚風。

【處方】乳香 沒藥 礞砂 雄黃 熊胆 血竭 葶藶 沉香 梅片各一兩 麝香 硃砂 牛黃 蟾酥各二兩 珍珠三兩

【制法】除麝香、珍珠、牛黃、梅片、熊胆另研外，余藥共研細末，人乳汁和丸，如綠豆大，蜡壳封固，每壳內三粒。

【劑量及用法】每次一丸至二丸。

【禁忌】慢驚風，陰疽，陰虛，口舌牙喉等症及妊娠切不可服。

十一、西安

【功能與主治】主疔瘡毒紅腫癰癤，無名腫毒初起，並治實火牙疼，喉蛾喉風，口舌諸火瘡，及小兒急驚等症。

【處方】制沒藥 制乳香 真礞砂 明雄 真熊胆 真血竭 葶藶上梅片 海南沉各一錢 當門子 硃砂 犀牛黃各二錢 破珍珠三錢

【制法】分別搗研極細末，另用蟾酥二錢以人乳化開，入藥和勻，搗融為丸，如綠豆大，金箔為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】內服每次一丸，入葱白內搗碎，黃酒送服，睡臥蓋暖取微汗，小兒按年齡遞減，葱白煎湯化服，外敷用酒化開敷患處。

【禁忌】小兒慢驚，陰疽或陰魚口，舌牙喉等症及孕婦切不可服。

十二、蘭州

【功能與主治】消腫解毒。主疔毒瘡癤，乳癰，各種惡瘡初起，紅腫疼痛。

【處方】珍珠(豆腐煮過) 麝香 熊胆各六分 乳香(去油) 沒藥(去油) 牛黃 葶藶子 硃砂 礞砂 蟾酥各二錢 白梅花(陰干)一錢二分 血竭花 冰片 沉香各一錢

【制法】共研細末，用酒發蟾酥汁為丸，每丸重二厘。

【劑量及用法】內服每次二至三丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦勿服。

十三、禹縣

【功能與主治】諸般疔毒，無名腫毒，癰疽發背，喉痧口瘡。

【處方】梅花一兩 麝香一錢 冰片三錢 熊胆三錢 珍珠五分 硃砂 乳香 沒藥 明雄黃 血竭 葶藶子 象牙各一兩 礞砂一錢 沉香五錢 犀牛黃一錢 蟾酥一兩

【制法】共研細末，用前蟾酥人乳化開，和均為丸，如梧桐子大，大赤金為衣。

【劑量及用法】每服一丸，葱白陳酒送下，蓋被取汗，或外敷亦可。

【禁忌】陰疽陰虛忌用，孕婦忌用。

【備考】有效期二年。

十四、濟南

【功能與主治】疔毒惡瘡，癰疽腫痛。

【處方】牛黃 麝香 熊胆各六分 真珠一錢 辰砂 血竭 乳香 沒藥 苦葶藶 梅花各二錢 梅片 沉香 象牙各一錢 雄黃一錢五分

【制法】用蟾酥二錢酒磨，以乳化為丸，如黃豆大，金箔為衣。

【劑量及用法】每服一丸至二丸，將藥含口內，覺麻用冷開水送下。

【禁忌】辛辣油膩等物，孕婦忌服。

十五、沈陽(1)

【功能与主治】解毒活血，鎮痛消腫。主無名腫毒，疔毒惡瘡，堅硬麻木，疔毒初起，乍寒乍熱，神昏憤亂，惡心嘔吐，煩悶欲絕。

【处方】乳香五錢 葶藶五錢 沒藥五錢 明雄 片硃砂五錢 血竭五錢 硼砂各五錢 熊胆 麝香 梅片 个牛黃 盆沉 連珠 蟾酥各一錢五分

【制法】共碾極細面，牛乳化蟾酥為丸，綠豆大。

【劑量及用法】每服三粒計重五厘，小兒按年齡比例酌減，黃酒湯送下，白水亦可。

【禁忌】孕婦忌服。

十六、沈陽(2)

【功能与主治】同沈陽(1)，处方、禁忌亦同。

【制法】共碾極細面，乳化蟾酥為小丸。金衣。

【劑量及用法】外敷用醋調上。內服每服七丸，用葱心嚼嚥，元酒送下。

十七、撫順(梅花丸子)

【功能与主治】解毒、消腫、鎮痛。主無名腫毒，疔毒惡瘡，外科熱毒初起之時，發熱惡冷，紅腫疼痛，嘔吐惡心，煩悶攪鬧，起線走黃，喉蛾喉痹，腫閉不通，實火牙痛，口舌諸瘡，齦腐起疳，小兒驚風，發熱抽搐。

【处方】雄黃二兩 葶藶子 本沉香各一錢二分 血竭 乳香各四錢二分 月石二錢一分 硃砂三錢 冰片二錢 熊胆六分 牛黃二分 制蟾酥四錢二分 麝香七分 沒藥四錢二分 蘇珠二分

【制法】共為細面，酒化蟾酥，小丸，金衣。

【劑量及用法】每服二丸至三丸，黃酒送下，睡臥蓋被取汗，外可用陳醋調敷患處。

【禁忌】陰性瘡疽，慢驚風症，陰虛白喉等均忌用，孕婦勿服。

十八、吉林、哈爾濱

【功能与主治】解毒散瘀，消腫止痛。主治：

(1) 無名腫毒，發背，腦疽，疔

瘡，一切外科熱毒。初起之時發熱惡冷，紅腫疼痛，煩悶攪鬧，起線走黃。

(2) 喉蛾，喉風，喉痹等一切喉痛(白喉除外)，腫閉不通，滴水難嚥。

(3) 實火牙疼，肝胃火盛，牙痛口臭。

(4) 口舌諸瘡，口糜舌爛，齦腐起疳。

【处方】制乳香 制沒藥 硼砂 雄黃 熊胆 血竭 葶藶 沉香 梅花片各一錢 麝香(當門子) 牛黃 蟾酥 硃砂各二錢 破大珍珠三錢

【制法】將以上諸藥共為細面。另用人乳將蟾酥化開，和勻搗融，作五百丸，如綠豆大，大赤金為衣。包裝，貯于玻璃瓶中。

【劑量及用法】內服每服一丸，用時入葱白內打碎，陳酒送下，睡臥蓋被取汗，二個時辰毒消而愈。

外用用陳醋調敷腫處，干后再抹陳醋。

【禁忌】陰性瘡疽，慢驚風症，陰虛白喉等，均忌用。孕婦禁服。

十九、承德

【功能与主治】疔毒惡瘡，癰疽腫痛。

【处方】乳香 雄黃 血竭 葶藶子 沒藥 硼砂 硃砂各三十兩 沉香 牛黃 冰片各十五兩 白梅花九斤六兩 蟾酥六十兩 麝香 珍珠各九兩 石決明一斤二兩

【制法】除牛黃、冰片、麝香、珍珠另研外，余者共為細粉，用熊胆熬湯泛為小丸，每兩分作五百粒，以方內硃砂為衣闌亮。

【劑量及用法】每服五粒，日服二次，黃酒送下，溫開水亦可。

【禁忌】孕婦忌服。

二十、呼和浩特

【处方】苦葶藶(另) 血竭 白梅花 乳香 沒藥各二兩 沉香 象牙硝 硼砂(煅)各一兩 雄黃一兩五錢 胆星五錢 硃砂二兩 牛黃一錢 麝香 冰片 珍珠

【制法】共為細面，牛乳發蟾酥二兩，為小丸，滿金衣。

附參考古方

【來源】外科証治全生集。

【功能与主治】治紅腫癰癤初起，一丸即消。

【处方】熊胆 大冰片 藤黃 硼砂 血竭 葶藶 沉香 乳香 沒藥各一錢 破大珠子三錢 牛黃 麝香 蟾酥人乳化 硃砂各二錢

【制法】各研細末為丸，如綠豆大，金箔為衣。

【劑量及用法】每服一丸，以葱白打碎，陳酒送下，醉蓋取汗。

飞龙夺命丹

一、沈陽(1)

【功能与主治】解毒活血，止痛消炎。主疔毒癰疽，發背腦疽，乳癰附骨疽，無名腫瘍，外科患症。

【处方】輕粉 冰片 麝香各五分 血竭 胆矾 寒水石各一錢 蟾酥 沒藥 乳香各二錢 蝸牛二十个 蜈蚣(酒浸泡炙去頭足)一條

【制法】共碾極細面，先用酒化蟾酥，將蝸牛連壳搗爛如泥，和藥面為小丸。硃砂為衣。

【劑量及用法】每服三丸或七丸或十一丸，用葱白三寸搗爛，將丸包裹，熱黃酒下，蓋被取汗，如無汗者可用熱酒助之，病在上者，食后服之，病在下者，食前服。

【備考】本藥為劇藥

二、沈陽(2)夺命丹

【功能与主治】解毒活血，止痛消炎。主疔毒癰疽發背，腦疽乳癰，附骨疽，無名腫毒，外科惡症。

【处方】片硃砂二錢 雄黃三錢 炙輕粉 梅片 麝香各五分 血竭 胆矾 寒水石各一錢 蟾酥 乳香各二錢 蝸牛二十个 沒藥二錢 蜈蚣二分(酒浸泡炙去頭足)

【制法】共碾極細面，先用酒化蟾酥，將蝸牛連壳搗爛如泥，和藥面為小丸，硃砂為衣。

【劑量及用法】每服三丸，重五厘，病重者酌加之，用葱白搗爛，將丸包裹，熱黃酒送下，蓋被取汗，如無汗者可飲熱酒助之，病在上者食后服，病在下者食前服。

【禁忌】孕婦忌服。

三、撫順

【处方】雄黃錢半 水石五分 銅綠一錢 輕粉二錢半 胆矾二錢

蜈蚣二条 乳香一錢 沒藥一錢
血竭五錢 硃砂五分 蝸牛十个
台麝五分 蟾酥一錢半 冰片二分半

【制法】共為細面，人乳化蟾酥，小丸硃砂衣。

四、吉林、哈爾濱

【功能與主治】解毒消腫，化腐消堅，內服驅毒發汗。主外科一切毒瘡惡瘍，毒氣內攻，寒熱嘔吐。神昏煩躁，心中攪悶，面色不常，疼痛欲死。並主丹毒、癰、疽、發背、癰疽、乳癰、附骨疽、無名腫毒，一切外科惡症。

【處方】同撫順。

【制法】共為細面，先用酒化蟾酥，將蝸牛連壳搗爛如泥，和藥面為丸，如綠豆大，硃砂為衣。

【劑量及用法】每服二丸或七丸，或九丸或十一丸，用葱白三、五寸搗爛，將丸包裹，熱黃酒送下，蓋被取汗為效，如無汗者，以熱酒助之，病在上者食後服，病在下者食前服。外用以醋或水調，敷腫處，或酒蒜灸之。

【禁忌】忌食生冷、瓜、茄、油膩，豬、鷄、魚、腥、血類，及一切發物；孕婦忌服。

五、呼蘭浩特

【處方】雄黃三錢 乳香二錢五分 銅綠二錢五分 胆礞一錢 血竭一兩 沒藥二錢五分 輕粉一錢 寒水石一錢 煨蝸牛二十个 蜈蚣五分 冰片五分 麝香

【制法】共細面，蟾酥二錢五分燒酒化，為小丸黃豆大，硃砂衣。

衛生寶丹

一、北京

【功能與主治】解諸毒，消癰腫。主癰疽發背，痔瘡疔瘡，及吐瀉腹痛。

【處方】山慈姑 五倍子 紅芽大戟 千金子霜各二兩 乳香 沒藥 丁香 沉香各三錢 共為細粉，兌入：麝香 牛黃 珍珠 琥珀各三錢

【制法】上藥和勻，糯米水泛小丸，用雄黃三錢、硃砂二錢和勻為衣。

【劑量及用法】每服五分，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、沈陽(1)(衛生丹)

【功能與主治】強心解毒，調整胃腸，興奮神經，殺菌止痢。主頭痛身熱，嘔吐泄瀉，腹痛下痢，霍亂轉筋，神疲氣促，煩懣肢冷，中暑中噎，猝然昏厥。

【處方】粉甘草十兩 細辛一兩半 香白芷一兩 薄荷霜四錢 冰片二錢 朱砂一兩

【制法】共碾極細面，水泛小丸。朱砂衣。

【劑量及用法】每服一錢，溫水送下。

【禁忌】生冷食物。

三、沈陽(2)(衛生寶)

【功能與主治】芳香化濁，解毒清熱，強心鎮靜。主猝然昏倒，頭昏目眩，痰火上壅，口眼喎斜，不省人事，四肢抽搐，舌苔不真，口角流涎，心神不穩，夜睡不寧，胸膈痞滿，煩悶不舒，嘔噦泄瀉，赤白痢疾，急性胃炎。

【處方】琥珀五錢 大竺黃 鈎藤各六錢 茅慈姑一兩 片砂 殭蠶 紅參 千金霜各五錢 重樓一兩五錢 个牛黃三錢 大戟 文蛤各二兩 雄黃五錢 麝香二錢四分

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸。大丸七分，小丸三分五厘。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】辣、腥、鷄肉。孕婦忌服。反甘草。

四、撫順(衛生寶)

【功能與主治】消炎退熱，鎮靜解毒。主急癰高熱，神昏抽搐項強，角弓反張，嗜眠昏睡；猩紅熱，斑疹傷寒，麻疹壯熱煩渴，神昏譫語，狂躁干渴；急性胃腸炎，吐瀉，並治疹後腸炎，毒瀉毒痢；疔毒惡瘡，毒火內攻，半寒半熱，攪亂昏迷；咽喉腫痛，嚥下困難。

【處方】天竺黃 鈎藤 千金霜各三錢半 琥珀一錢二分 麝香三錢 殭蠶二錢半 重樓八錢四分 雄黃三錢半 牛黃八分 茅慈姑七錢一分 朱砂二錢半 文蛤一兩一

瘡 瘍 類

錢 江珠錢半 大戟一兩 紅人參一錢半

【制法】共為細面，蜜丸七分或三分重。

【劑量及用法】每服一丸，小兒服一小丸，白水送下。

【禁忌】孕婦忌服，四肢逆冷，體溫低降之霍亂(虎列拉)、白喉禁用。

五、吉林、哈爾濱(神效衛生寶丹、衛生寶)

【功能與主治】順氣滌痰，清熱解毒，化濁定驚，清里解表。主中風，中痰，瘟疫，陽霍亂(熱霍亂)，干霍亂(或食物中毒)，疔毒惡瘡，喉風喉痹喉蛾，小兒急驚風，時行感冒。

【處方】琥珀 朱砂 雄黃各二錢五分 竺黃 茅慈姑 鈎藤各三錢 千金子二錢五分 牛黃 珠子各一錢五分 重樓 大戟 五倍各一兩 台麝一錢二分 人參二錢五分

【制法】千金子去油取霜，琥珀、硃砂、雄黃、牛黃、珠子、台麝均另細研，其餘諸藥一處碾細，入鉢調勻，煉蜜為丸，大丸七分重，小丸二分重。大赤金衣。棉紙包，蜡皮封固。

【劑量及用法】大人每服大丸一丸至二丸。小兒服小丸一丸。喉症及疔瘡均用白水為引。其它諸症，均用鮮姜湯調服。

【禁忌】四肢逆冷，體溫低下之陰霍亂(虎列拉)禁用；白喉禁用。

附參考古方

【來源】惠直堂經驗方(珍本醫書集成)。

【功能與主治】一切飲食、藥毒，虫毒，烟霧瘴癘，水磨服，吐利即安；癰疽、發背、对口、疔瘡、天蛇、無名腫毒，虻蛇、紅絲等疔，及楊梅，痔瘡，無灰酒磨服，外以水磨塗瘡上；陰陽二毒，傷寒瘟疫發狂，喉風，薄荷湯冷磨服；赤白痢、吐瀉、霍亂、絞腸痧及諸痰喘，姜湯磨服；男婦急中顛邪，鬼交鬼胎，失心狂亂，羊兒猪癲等風，石菖蒲湯磨服；縊溺，但心口微溫者，生姜續斷酒磨服；蛇蠍瘋犬咬傷，酒磨灌下，內服葱湯，被蓋取汗；新久瘧疾，急發時，東流水煎桃柳枝湯磨服；急慢驚風，五疳五疳，脾病黃腫，癰瘡瘡，薄荷浸水磨濃汁，加蜜服，仍搽腫處，年小者

分數次服；牙痛酒磨塗腫處，仍含少許，良久咽下；小兒因父母遺毒，皮爛爛斑，谷道腫爛，清水磨塗；打扑損傷，無灰酒研服；久年頭脹頭痛，偏正頭風，葱酒研服，仍磨塗太陽穴；如人經閉，紅花湯下；天行疫氣，桃根湯磨濃汁，搭入鼻孔，次服少許，得不傳染；傳尸癘瘡，為虫所噬，磨服一錢，或吐或下惡物小虫，其病頓失。

【處方】山慈姑 川文蛤 紅芽大戟 千金子各二兩 麝香 西牛黃 珍珠 明雄黃 滴乳香(去油) 沒藥(去油) 硃砂 琥珀(蜜珀不用) 丁香 沉香各三錢 金箔十帖

【制法】為細末，糯米粉煮糊，木臼搗，印錠，每重一錢。

【劑量及用法】每服一錠，重者連服二錠，取通利後，以溫粥補之。

【禁忌】孕婦忌服。

保安萬靈丹

一、天津(風濕止痛丹)

【功能與主治】散風除濕，活血解毒。主受風受濕，筋骨疼痛，半身不遂，鶴膝風，腰痠腿軟，行步艱難。

【處方】炒蒼朮八兩 全蠍 石斛 天麻 當歸 甘草 川芎 羌活 荊芥 防風 麻黃 細辛 制川烏 制草烏 制首烏各一兩 共為細粉，兌入，雄黃面六錢

【制法】研細和勻，煉蜜為丸，二錢重，每斤丸藥用硃砂面三錢上衣，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、南京

【功能與主治】主癰疽疔瘡，對口發背，濕痰流注，附骨陰疽，鶴膝風，風寒濕痹，遍身走痛等症。

【處方】茅蒼朮八兩(米泔水浸) 金釵石斛 麻黃 西當歸 川羌活 炙甘草 荊芥 何首烏 防風 明天麻 北細辛 制草烏 全蠍 川芎 制川烏各一兩 雄黃 硃砂各六錢

【制法】共研細末，用溫沸水泛丸，每錢約做一十粒，以硃砂雄黃為衣。

【劑量及用法】每用一錢五分至二錢，凡病狀有惡寒身熱者，用連鬚葱白九個煎湯吞服，蓋被取汗。如無寒熱，酌用熱酒或白開水吞服。但體力虛及孕婦慎用。

三、武漢(保安丸)

【功能與主治】癰疽疔毒，風寒濕痹，濕痰流注，附骨陰疽，口眼歪斜，半身不遂，遍身走痛，偏正頭痛。

【處方】同南京。

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，並用硃砂六錢為衣，每錢不得少于三十粒。

【劑量及用法】每服二十丸，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

四、杭州(散毒萬靈丹)

【功能與主治】治癰疽發背，疔毒對口，濕痰流注，附骨陰疽，鶴膝風痛，初起各症及風寒濕痹，半身不遂，氣血阻滯，遍身走痛，偏正頭痛等症。乃發散之劑。

【處方】同南京。

【制法】共研細末，煉蜜為丸，每潮重一錢五分，將方內辰砂為衣。

【劑量及用法】每服二至三丸，用葱白煎湯或熱酒化服，服後避風，蓋被取汗，或吃稀粥助汗尤妙。

【禁忌】孕婦忌之。

五、沙市

【功能與主治】治風寒濕痹，痰流注及四肢痠軟且痛等症。

【處方】蒼朮八兩 防風 細辛 麻黃 羌活 川烏(桑豆煮水浸) 首烏 荊芥 當歸 石斛 全蠍 草烏(桑豆煮水浸) 粉甘草 天麻 川芎 明雄各一兩

【制法】共為細末，煉蜜和丸，每粒重三錢，再加硃砂六錢 研細為衣，磁罐收貯。

【劑量及用法】用連鬚葱白九根，煎湯調服，蓋被出汗為效，如汗遲以葱湯催之，如淋如洗令其自收，不可露風，患者自快。

【禁忌】紅腫非寒濕痹及貧血者忌服。

六、西安

【功能與主治】主治癰疽疔毒，對口發背，濕痰流注，附骨疽，鶴膝

風，及氣血凝滯偏身走疼，舉丸發炎，偏正頭痛，破傷風抽搐諸症。

【處方】茅蒼朮八兩 麻黃茸 羌活 荊芥 防風 細辛 川芎 川烏(湯泡去皮) 草烏(湯泡去皮) 石斛 全蠍 當歸 甘草 天麻 何首烏各一兩 明雄六錢

【制法】上十六味分別搗杵，共研極細末，羅過，煉蜜為丸，硃砂為衣，每丸重二錢，黃蜡皮包。

【劑量及用法】如惡瘡初起二、三日，或癰疽已成未出膿者，寒熱頭痛，時發嘔，或人體壯者每服三錢，弱者減半，葱白煎湯服下，蓋被取汗，小兒按年齡酌減，白湯送下。

【禁忌】忌生冷食物及房事，孕婦忌服。

七、濟南

【功能與主治】癰疽初起，憎寒壯熱，兼治濕痹等症。

【處方】同南京。

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，硃砂六錢為衣，每丸重三錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】口服一次，每服一丸，熱黃酒或溫開水送下。

【禁忌】忌生冷或房事，孕婦及臨經婦女忌服。

八、沈陽

【功能與主治】疎風消腫，活血解毒。治癰疽疔毒惡瘡，乳瘡乳岩，對口發背，風濕流注，附骨陰疽，鶴膝風癱瘓，口眼歪斜，半身不遂，遍身走痛，疝氣頭風，破傷風牙關緊閉，歷節風等症。

【處方】茅朮八兩 麻黃 羌活 荊芥 防風 細辛 川烏 草烏 天麻 當歸 甘草 何首烏 全蠍 各一兩 明雄六錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸。二錢重。硃砂為衣。

【劑量及用法】每服一丸，葱白煎湯，調服取汗，如不必發汗，只用熱酒調服。

【禁忌】孕婦忌服。

九、撫順

【功能與主治】疎風活絡，散毒消腫。主顏面神經麻痺(口眼歪斜) 癰疽疔毒，腫而未潰，寒熱往來，惡

心昏迷，以及鶴膝風膝腫骨細等症。

【處方】蒼朮八兩 全蠍 石斛 天麻 甘草 細辛 麻黃 荊芥 羌活 川芎 川烏 草烏 首烏 當歸 防風各二兩 雄黃一兩一錢

【制法】共為細面，蜜丸二錢重，硃砂為衣。

【劑量及用法】每服一丸，用連翹煎湯調服此丸，復被出汗為度。

【禁忌】孕婦及月經將來婦女忌服。

十、哈爾濱(萬靈丹)

【功能與主治】活絡疎風，消腫散寒。主風寒濕氣合而為痹，筋骨疼痛，屈伸不便；卒中風邪，口眼歪斜，左癱右瘓，半身不遂；並治癰疽疔毒，癰疽疔毒腫而未潰，寒熱往來，口渴嘔噦，疼痛昏沉，以及破傷風，牙關緊閉，項背反張。

【處方】同沈陽。

【制法】將各藥碾為細面，煉蜜為二錢一分重丸，硃砂為衣。瓷瓶存貯，以免風干。

【劑量及用法】用連翹煎湯為引，調服此丸。服後復被出汗，其汗如林如洗，令其自收，不可露風，瘡未成者即消，已成者可潰。

【禁忌】孕婦及臨經婦女均忌，忌食冷物，戒房事。

十一、承德

【功能與主治】癰疽疔毒，風寒濕痹。

【處方】茅朮八兩 麻黃 羌活 荊芥穗 防風 細辛 川烏(湯泡去皮) 草烏 川芎 石斛 全蠍 當歸 甘草 炙大馬 何首烏各一兩 雄黃六錢

【制法】共為細粉，水泛小丸，滑石為衣，每兩分作二百粒。

【劑量及用法】每服二十粒，日服二次，開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

十二、呼和浩特

【處方】茅朮 全蠍 川芎 歸尾 雄黃 甘草 川烏 天麻 防風 姜黃 麻黃 首烏 荊芥 草烏 白芷 細辛各一斤四兩 川芎二斤半

【制法】蜜大丸，三錢重，硃砂衣。

附參考古方

【來源】外科正宗。

【功能與主治】治癰疽疔毒，对口發頤，風浮風溫，瘰癧流注，附骨陰疽，鶴膝風症，左癱右瘓，口眼喎斜，半身不遂，氣血凝滯，偏身走痛，步履艱辛，偏墜疝氣，偏正頭痛，破傷風牙關緊閉，截解風寒無不應效。

【處方】茅朮八兩 全蠍 石斛 明天麻 當歸 甘草(炙) 川芎 羌活 荊芥 防風 麻黃 北細辛 川烏(湯泡去皮) 草烏(湯泡去皮尖) 何首烏各一兩 明雄黃六錢

【制法】上為細末，煉蜜為丸彈子大，每料一兩分作四九、一兩作六九、一兩作九九，三等做下，以備年老少壯病勢緩急取用，預用硃砂六錢研細為衣，磁罐收貯。

【劑量及用法】如惡瘡初起二三日之內，或癰疽已成至十朝前後，但未出膿者，狀若傷寒，大發煩渴，拘急惡寒，肢體疼痛，惡心嘔吐，四肢沉重，恍惚悶亂，坐臥不寧，皮膚壯熱，又治寒傷四時感冒傳染疫症，但惡寒身熱表症未盡者俱宜服之，用連翹八錢白九枝煎湯一茶鐘，將藥一丸乘熱化開，通口服下，被蓋出汗為效；如服後汗遲，再用葱白湯催之，後必汗如淋洗，漸漸退下，復蓋衣物，其汗自收自斂，患者自然爽快，其病如失，但病未成者隨即消去，已成者隨即高腫潰膿，如諸疾無表症相兼不必發散者，只用熱酒化服此方。

【禁忌】服後避風，宜食稀粥，忌冷物，房事，孕婦勿服。

治毒紫霞丹

杭州

【功能與主治】治癰疽發背，無名腫毒，橫痃結核，或已成無膿，或漫腫不潰，以及跌打損傷等症。能化膿解毒，祛瘀生新，內服外敷，功效甚偉。

【處方】西牛黃一錢二分 藤黃(制淨) 大黃 參山漆各一兩二錢 天竹黃 明膠黃 粉兒茶各六錢 梅冰一錢二分 阿魏一錢 沒藥(去油)一兩二錢 鞭血竭六錢

瘡瘍類

麝香一錢二分 乳香(去油)一兩二錢

【制法】以上各取淨粉，和煉白蜜為丸，每潮重五分，金箔為衣，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，重則加倍之，用溫酒化服，外用濃茶汁搽敷患處。

【禁忌】孕婦忌服。

諸瘡解毒丹

沈陽

【功能與主治】化毒解熱，消腫止痛。主疔毒惡瘡，頭面諸瘡，無名腫毒，婦人乳癰，皮膚頑癬，干濕疥癬。

【處方】雙花五錢 元參 地丁 甘草 桔梗 川連 山梔 乳香 黃柏 連翹 京母 白芷 青皮 當歸 赤芍 花粉 沒藥各二錢 生芪 皂刺 重樓 蒼耳各二錢 薄荷 山甲各一錢 公吳四錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下，接連服之有效。

【禁忌】孕婦忌服。

再造至寶丹

一、沈陽

【功能與主治】解毒活血，消腫疏風。主大風風周身腫瘍疔毒，遍身痒痛，皮膚潰爛。

【處方】麝香一兩 大風肉 防風 白朮各二斤 荊芥 胡麻 當歸 大馬各一斤 黃連 烏藥各四兩 棕炭 雄黃各五錢 海風藤 人參各八兩 甘草 官桂各七兩 天竹黃 檀香根各一兩 苦參二斤

【制法】共碾極細面，米糊為小丸。

【劑量及用法】每服一錢，飯後二時用溫酒送下，或酌用藥引，如不効加倍用之。

【禁忌】刺激性辛辣物及房事。

附參考古方

【來源】瘍症大全。

【處方】大風肉 白朮 防風 苦參各二斤 荊芥 胡麻 當歸各一斤 大馬一兩 黃連 烏藥各四兩 棕灰 雄黃各五錢 海風藤

人參各八兩 官桂 甘草各七兩
人參黃 檀香根各二錢 麝香一兩

【制法】上為末，米糊丸。

【劑量及用法】酒服。

消腫化毒丹

沈陽

【功能與主治】消腫止痛 主無名腫毒及一切瘡瘍未潰者。

【處方】秦黃五兩 人參五兩 麝香五分 赤小豆一兩 川五倍五兩

【制法】共研極細面，用白芨二兩打糊，和場成丸。

【劑量及用法】用醋磨敷患處。

黑虎丹

一、上海

【功能與主治】消散癰疽腫痛。

【處方】殭蚕(炒炭)七分(約七只) 磁石(醋煨飛)一錢五分 母丁香(炒黑)一錢 全蠍(炒炭)一錢五分(約七只) 公丁香(炒炭)一錢 冰片一錢 麝香五分 穿山甲(炙)三錢 蜈蚣(炒炭)二錢 4黃二分 蜘蛛(炒炭)七只

【制法】各取淨粉，共研極細粉。

【劑量及用法】搽膏藥貼之，遵醫師指示用。

【禁忌】不可入口。

二、南京

【功能與主治】拔膿拔毒。主癰疽發背，对口外瘍，已破潰者。

【處方】殭蚕一錢五分(煨水飛) 殭蚕七條 麝香一錢 全蠍七個 母丁香一錢 大蜈蚣七條 冰片一錢 公丁香一錢 大蜘蛛七個 穿山甲七個

【制法】上藥十味，共研極細末，磁瓶密貯，勿使洩氣。

【劑量及用法】每用少許，用膏藥貼之。

壺公丹

沈陽

【功能與主治】回陽化毒。主瘡瘍陷，顏色灰白，肢體發冷，或流汚水，纏綿日久，清瘦倦怠。

【處方】附子(半生半熟以面包煨)一個 五倍子(炒微黑) 麻黃 枯芩 甘草各五錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】用米醋調塗周圍，留天不敷。

附參考古方

【來源】惠直堂經驗方(珍本醫書集成)。

【功能及主治】治諸般腫毒陰疽。

【處方】附子(半生半熟以面包煨)一個 倍子(炒微黑)五錢 麻黃五錢 枯芩五錢 甘草五錢

【制法】共為細末。

【劑量及用法】用米醋調塗留天。

九一丹

一、天津、蘭州(提毒散)

【功能與主治】化腐生肌，解毒止痛。主癰疽瘡瘍腫痛，流膿久不收口，及虫蛇咬傷，以致潰爛。

【處方】紅粉一錢 冰片五分 煨石膏九錢

【制法】共研細粉，一錢重裝瓶。

【劑量及用法】將此藥少許敷于患處，以確砂膏貼之，常更換

二、上海

【功能與主治】拔膿拔毒。

【處方】石膏(煨)九兩 紅升藥(附)一兩

【制法】先將石膏研細，加入紅升藥，研極細粉。

【劑量及用法】將藥粉搽患口中。

【禁忌】不可入口。

三、南京

【功能與主治】去腐生肌。主瘡瘍破爛。

【處方】煨熟石膏九兩 陳黃升一兩

【制法】將生石膏尿浸一月后，剝去外層尿殼，清水漂洗多次，再以火煨熟研末，乳至極細，加入黃升，共同乳細為度。

【劑量及用法】每用少許搽患處。

【禁忌】不可入口。

四、武漢

【功能與主治】疔瘡潰爛，腫痛流膿。

【處方】同上海。

【制法】取上藥混合碾細，成淨粉90—95%即得。

【劑量及用法】每用二至三厘搽患處。

【禁忌】不可入口。

五、呼和浩特(提毒散)

【處方】煨石膏一兩五錢 紅粉一錢 黃丹二錢

【制法】共細面，每兩兌冰片二分。

附參考古方

【來源】金宗金鑑。

【功能與主治】疔瘡

【處方】石膏(煨)九錢 黃丹藥一錢

【制法及用法】共研極細，撒于患處

白降丹

一、上海

【功能與主治】癰疽疔毒。

【處方】水銀一兩 明礬 食鹽 銀硝 綠礬各一兩五錢 礬砂五錢 硃砂 雄黃各二錢

【制法】先將雄黃、綠礬、銀硝、明礬、食鹽、硃砂研勻入瓦罐中，用微火使其烱化，再和入水銀調和勻，待其干固，然後用瓦盆一只，盆下有火，即以盛干固藥料之瓦罐復置盆中，四週以赤石脂鹽泥層層封固，再以炭火置于倒置之瓦罐上，如有空隙漏氣處，急用赤石脂鹽泥加封，約過二柱香時(約三小時)去火，冷定開看，即有白色晶片在于盆中即成。

【劑量及用法】供醫師應用。

二、重慶

【功能與主治】治癰疽，發背，疔毒。

【處方】硃砂 雄黃各二錢 水銀一兩 礬砂五錢 火硝 食鹽 白礬 皂礬各一兩五錢

【制法】先將硃砂礬砂雄黃研細末，入鹽礬硝皂水銀共乳勻，不見星為度，用磁碗放微火上，徐徐起藥

入碗化尽，微火令干，再用碗合上扣好，如法燒之成丹，再加冰片二分，磨香二分乳細，瓶裝用。

【劑量及用法】一厘至六厘，掩瘡上，膏約蓋定或藥棉蓋定。

三、西 安

【功能与主治】主癰疽發背疔毒，已潰未潰之諸瘡瘍症。

【處方】同重慶。水銀用一兩。

【制法】先將硃砂、明雄、礬砂三味研細，和入食鹽精、白矾、火硝、皂矾、水銀共研勻，以不見水銀星為度，用磁罐一個先放炭火上，徐徐起要入罐化尽，微火逼令干，取起，如火太大，則汞走，如不干則藥倒下無用，其難處在此，再用一磁罐大小如前罐，合上用好棉紙截半寸寬，罐子泥草鞋灰光粉三樣研細，以鹽滴調汁極濕，一层泥一层紙，糊合口四五层，及糊有藥的藥罐上二三层，在地上挖一个小坑，用飯碗盛水放坑底，將無藥罐放于碗內，以瓦挨坑口四边齐地，須防炭灰落碗內，有藥罐上，以上炭蓋之，不可有空處，約三柱香去火，冷定開看，約有一兩余重量之藥，煉時罐上如有綠烟起，急用毛筆蘸罐子泥固之。

【劑量及用法】若諸瘡未潰可用少許，瘡大者約五六厘，用水調敷瘡头上，立刻起，泡消散，已潰成膿者敷之，功能去腐消腫毒。

【禁忌】忌生冷發物性食品。

四、濟 南

【功能与主治】癰疽疔瘡，已潰或成膿未潰。

【處方】同重慶，水銀用一兩。

【制法】以上八味，先將硃雄礬三味研細，入鹽硃硝皂水銀共研勻，以水銀不見星為度，用陽城罐一個，放微炭火上，徐徐起藥入罐化尽，微火逼令干，取起，如火入太多則汞走，如不干則藥倒下無用，其難處在此，再用一陽城罐合上，用棉紙截半寸寬，將罐子泥草鞋灰，光粉三樣研細，以鹽滴調汁極濕，一层泥一层紙，糊合口四五重，及糊有藥罐上二三重，地下挖一小潭，用飯碗盛水放潭底，將無藥罐放于碗內，以瓦挨潭口，四边齐地，恐炭灰落碗內也，有藥罐上，以生炭火蓋之，不可有空處，藥灼一个半小时去火，冷空開

看，約有一兩外藥矣，煉時罐內如有綠烟起，急用毛筆蘸罐子泥固之。

【劑量及用法】瘡大者五六厘，小者一二厘，調敷瘡面上，按張樹筠云，此丹用法另有配合，或加煅石膏，有一丹，二八丹之名称，或作藥捻用，各按症施用，不可拘泥。

五、沈 陽

【功能与主治】拔毒消腫，化腐生肌。主癰疽發背，一切疔毒，調敷瘡大，初起者即刻起，泡消散，成膿者即潰，腐者即脫。

【處方】硃砂一兩 白矾二錢 食鹽一兩五錢 水銀一兩 雄黃二錢 皂矾一兩五錢 火硝二錢 礬砂五錢

【制法】先將硃、雄、礬三味研細，入鹽、矾、硝、皂、水銀共研勻，以水銀不見星為度。入陽城罐內，放微炭火上徐徐化尽，微火逼令干，如火太大則汞走，如不干則藥無效，其難處在此，再用另一空陽城罐合上，用棉紙截半寸寬，將罐子泥調極濕，一层泥一层紙，糊合口四五重，見兩罐口對口糊接一处，在地下挖一小潭，用飯碗盛水放潭底，將無藥空罐放置碗內，以瓦遮罐口，防炭火落碗內，在有藥之罐蓋以炭火，嚴蓋之不可有空處，約三柱香去火，冷定開看者空罐內約有藥一兩，煉時罐上如有綠烟，必有漏氣處，汞走則無用矣，急用毛筆蘸罐子泥固之。

【劑量及用法】瘡大者用五六厘，瘡小者用一二厘，水調敷瘡头上。

六、吉林、哈爾濱(奪命丹)

【功能与主治】消腫，拔毒，化腐。主癰疽發背，一切疔毒。

【處方】硃砂 雄黃各二錢 水銀一兩 礬砂五錢 火硝 食鹽 白矾 皂矾各一兩五錢

【制法】先將硃雄礬三味研細，入鹽硃硝皂水銀共研勻，以水銀不見星為度，入陽城罐內放微炭火上，徐徐化尽，微火逼令干，如火入太多，則汞走，如不干，則藥倒下無用，其難處在此，再用另一空陽城罐合上，用棉紙截半寸寬，將罐子泥(草灰，光粉，鹽滴調成，名罐子泥。)調極濕，一层泥一层紙，糊合口四五重，見兩罐口對口糊接一处，在地下

挖一小潭，用飯碗盛水放潭底，將無藥空罐放置碗內，以瓦遮潭口，防炭火落碗內，在有藥之罐上蓋以炭火，嚴蓋之不可有空處，約三柱香去火，冷定開看，則空罐內約有藥一兩。(煉時罐上如有綠烟，必有漏氣處，汞走則無用，急用毛筆蘸罐子泥固之。)

【劑量及用法】瘡大者用五六厘，瘡小者用一二厘，水調敷瘡头上。

【禁忌】忌食辛辣；不可服用入口。

附參考古方

【來源】醫宗金鑑：外科心法要訣。

【功能与主治】此丹治癰疽發背，一切疔毒。初起者立刻起，泡消散，成膿者即潰，腐者即脫消腫，誠奪命之靈丹也。

【處方】硃砂 雄黃各二錢 水銀一兩 礬砂五錢 火硝 食鹽 白矾 皂矾各一兩五錢

【制法】先將硃雄礬三味研細，入鹽硃硝皂水銀共研勻，以水銀不見星為度，用陽城罐一個，放微炭火上，徐徐起藥入罐化尽，微火逼令干，取起，如火入太多則汞走，如不干則藥倒下無用，其難處在此，再用一陽城罐合上，用棉紙截半寸寬，將罐子泥草鞋灰光粉三樣研細，以鹽滴調汁極濕，一层泥一层紙糊合口四五重，及糊有藥罐上二三重，地下挖一小潭，用飯碗盛水放潭底，將無藥罐放于碗內，以瓦挨潭口四边齐地，恐炭灰落碗內也，有藥罐上以生炭火蓋之，不可有空處，約三柱香，去火冷定開看，約有一兩外藥矣，煉時罐上如有綠烟起，急用毛筆蘸罐子泥固之。

【劑量及用法】用少許，瘡大者用五厘，瘡小者用一二厘，水調敷瘡头上。

紅 升 丹

一、重 庆

【功能与主治】拔毒去腐，生肌長肉。治一切瘡瘍潰后，瘡口堅硬，肉黯紫黑。

【處方】硃砂 雄黃各五錢 水銀二錢 硝石四兩 白矾一兩 青

硃六錢

【制法】先將二硃碾碎入鍋內，加火酒一杯炖化，下后取起研細，另將水銀硃砂雄黃研細，不見星為度，再入硝石末研勻，依法升煉，每丹四兩加海螵蛸一兩，礬砂一兩，梅片一錢，麝香二分，乳細無聲為度，玻璃包裝。

【劑量及用法】外用適宜為度。

二、西 安

【功能與主治】主治一切瘡瘍潰爛后，瘡口堅硬，白色紫黯，功在拔毒去腐生肌。

【處方】硃砂 明雄各五錢 水銀一錢 火硝四兩 白硃一兩 皂硃六錢

【制法】先將二硃火硝研細末，放入大銅杓內，加火酒約兩許炖化，一干即起研細，另將水銀明雄研至不見星為度，再入硝硃末研勻，將陽城罐用紙筋泥搗一指厚，陰干常輕輕扑之，不使生裂紋，瘡泥罐子泥亦可用，如有裂紋，以罐子泥補之，極干再晒，至無裂紋方可入前藥在內，罐口以鉄油蓋蓋定，加鉄梁蓋上，下用鉄鑼鉄絲扎緊，用紙燃條蘸蜜周圍塞罐口縫間，外用熟石膏細末醋調封固，蓋上加炭火二塊，使蓋熱罐口封固易干，用火釘二根釘地下，將罐子放釘上，罐底下置堅大炭火一塊，外砌有眼爐，升三柱香時，第一柱香用底火，如火太大汞先升上，二柱香用大半罐火，以筆蘸水蓋，第三柱香火平罐口，用扇搗之，頻頻搗勿令干，干則汞先飛上，香完去火，冷定開看，方氣足，蓋上約有藥六七錢，刮下研極細，裝入玻璃瓶備用，再預以鹽鹵汁調和罐子稀泥，用筆蘸泥水打罐口週圍，勿令洩氣，蓋恐綠烟一起汞走無用。

【劑量及用法】先將瘡口用藥水洗淨，用丹少許鷄翎掃上；外用膏藥貼護，一日一換。

【禁忌】忌生冷及有發酵性之食物。

三、濟 南

【功能與主治】一切癰疽已潰，瘡口堅硬，肉黯紫黑。

【處方】硃砂 雄黃各五錢 水銀二兩 火硝四兩 白硃一兩 皂硃六錢

【制法】先將皂白二硃火硝碎，

入大銅杓內，加火酒一小盃炖化，一干即起研細，另將汞硃雄研細，至不見星為度。再入硝硃面研勻，先將陽城罐用紙筋泥搗一指厚，陰干，常常扑之，不使生裂紋，瘡泥罐子泥亦可用，如有裂紋，以罐子泥補之，極干再晒，如無裂紋方入前藥在內，罐口以鉄油蓋蓋定，加鉄梁，蓋上下用鉄鑼鉄絲紮緊，用棉紙燃條蘸蜜，周圍塞罐口縫間，外用熟石膏細末，醋調封固，蓋上加炭火二塊，使蓋熱罐口封固易干也，用火釘二根釘地下，將罐子放釘上，罐底下置堅大炭火一塊，外砌有眼爐，用底火燒半小時，不可火大，火大則汞先升上，再用大半罐火燒半小時，再以火平罐口，以扇搗之，頻頻用火擦蓋勿令干，干則汞先飛上，共一個半小時去火，冷定開看，方氣足，蓋上均有六七錢藥，刮下研極細，瓷瓶收貯備用，再預以鹽鹵汁調罐子稀泥，筆蘸泥水打罐口周圍，勿令洩氣，蓋恐綠烟起而汞走也。

【劑量及用法】以丹少許干搽患處。

四、撫 順

【處方】水銀一兩 火硝七錢 白硃八錢

【制法】先煉成胎，后于火中昇之。

五、吉 林

【功能與主治】化腐殺菌，生肌長肉。主癰疽潰瘍，瘡口堅硬，內毒未清，奇痒紅邊，及一切惡瘡余毒等症。

【處方】硃砂 雄黃各五錢 水銀一兩 火硝四兩 白硃一兩 皂硃六錢

【制法】先將二硃火硝研碎，入大銅杓內，加火酒一小杯炖化，一干即起出研細，另將汞硃雄研細，至不見星為度，再入硝硃末研勻，先將陽城罐（泥罐）用紙筋泥搗一指厚，陰干之，常輕輕扑之，不使生裂紋，如有裂紋，以罐子泥補之，（草灰、光粉、鹽鹵、黃泥調濕名罐子泥）俟極干，將藥入內，罐口以鉄油蓋蓋定，即油灯碗上下用鉄絲紮緊，用棉紙燃條蘸蜜周圍塞罐口縫間，外用熟石膏細末醋調封固，勿令透縫，然后蓋上加炭火兩塊，使蓋熱罐口干燥，

封固。用火釘二根，釘地上成三角架，將罐置釘架上，罐底置炭火，外砌以磚塊，煉三炷香，第一炷香用底火，如火大則汞先飛上。第二炷香用大半罐火，以筆蘸水擦鉄蓋。第三炷香火平罐口，用扇搗之。頻頻蘸水擦鉄蓋，勿令干，干則汞先飛上，三香完畢去炭火，冷定開看，鉄蓋上約有藥六七錢，刮下研極細即成，裝于玻璃瓶中。（在升煉時，切勿令透氣，否則綠烟一起，汞升飛散，即無用，宜預備罐子泥，以筆蘸打漏縫處。）

【劑量及用法】用鷄翎掃上瘡口內，瘡面立即紅活，外用藥膏蓋復之。

【禁忌】忌食辛辣，不可服用。

附參考古方

【來源】五宗金鑑：外科心法要訣。

【功能與主治】此丹治一切瘡瘍潰后，拔毒去腐，生肌長肉，瘡口堅硬，肉黯紫黑。

【處方】硃砂五錢 雄黃五錢 水銀一兩 火硝四兩 白硃一兩 皂硃六錢

【制法】先將二硃火硝研碎入大銅杓內，加火酒一小盃炖化，一干即起研細，另將汞硃雄研細，至不見星為度，再入硝硃末研勻，先將陽城罐用紙筋泥搗一指厚，陰干常輕輕扑之，不使生裂紋，瘡泥罐子泥亦可用，如有裂紋，以罐子泥補之，極干再晒，無裂紋方入前藥在內，罐口以鉄油蓋蓋定，加鉄梁，蓋上下用鉄鑼鉄絲紮緊，用棉紙燃條蘸蜜，周圍塞罐口縫間，外用熟石膏細末，醋調封固，蓋上加炭火二塊，使蓋熱罐口封固易干也；用火釘二根釘地下，將罐子放釘上，罐底下置堅大炭火一塊，外砌有眼爐；升三炷香，第一炷香用底火，如火大則汞先飛上；二炷香用大半罐火，以筆蘸水擦蓋；第三炷香火平罐口用扇搗之，頻頻擦蓋，勿令乾，干則汞先飛上，三香完；去火冷定開看，方氣足，蓋上約有六七錢，刮下研極細，磁罐盛用，再預以鹽鹵汁調罐子稀泥，用筆蘸泥水打罐周圍，勿令洩氣，蓋恐有綠烟起汞走也，綠烟一起，即無用矣。

【劑量及用法】用丹少許，鷄翎掃上立刻紅活。

一粒金丹

一、沈陽

【功能与主治】解毒、消腫、鎮痛。主中風痰厥，猝然暴死，胃氣沖痛，痢疾腹脹，口眼歪斜，一切腫毒，頭痛作腮，項腫喉痛，食積癰疾，蛇犬咬傷，疫癘癰毒。

【处方】明雄 乳香 沒藥 砂仁 羌活各一錢 半夏 烏藥各二錢 白根五錢 蒼朮四錢 杏仁（去尖皮）四十九粒 麝香二分

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，五分重。

【劑量及用法】每服一丸，姜湯服下。

【禁忌】孕婦忌服。生冷食物及冷茶水。

二、撫順

【处方】木香 沒藥 牙皂 陳皮各一兩半 乳香一兩 郁金五錢 雄黃五錢 豆霜二兩 沉香一兩

【制法】共為細面，神麵面糊小丸，硃砂衣。

三、吉林

【功能与主治】清血解毒，開瘀散滯，主癰疽疔毒惡瘡，無名腫毒，手搭腰搭，心槍毒初起，大便燥結，皆能治之。

【处方】广木香 沉香 乳香各五分 豆霜一錢五分 雄黃三錢四分 郁金二錢四分 沒藥 陳皮 皂角 公丁香各一錢

【制法】共為極細末，如臨時用之，以棗肉為丸，如芡實大。

【劑量及用法】每服一丸，細嚼服之，白開水送下，毒氣泄盡，即飲米湯補之。

【禁忌】病久身體虛弱者勿用。

【備考】此藥純系猛下瀉毒之良劑。但虛弱人，及瘡毒發生日久者，不宜服用，對初起之瘡疽有特效。

附參考古方

【來源】余病証治癰方。

【功能与主治】治一切惡瘡癰腫，無名腫毒。

【处方】沉香 木香 乳香各五分 巴豆霜一錢五分

【制法】各為細末，照稱分數和

勻，用黑肥棗箇半去皮，搗爛為丸，如芡實大。

【劑量及用法】每服一丸，量人虛實，先呷水一口，行一次，胃氣壯實者，只可呷水三四口，不可太過，後用水一口送藥下，行盡數次，以米飲補之。

提膿丹(三仙丹)

武漢

【功能与主治】疔毒潰爛，膿多不出，瘡口擴大。

【处方】冰片一錢 輕粉一兩 紅粉三兩

【制法】取上藥混合碾細，成淨粉90~95%即得。

【劑量及用法】洗淨患處，將上藥二至三厘薄搽，加蓋尋常膏藥。

【禁忌】癰膿已淨者忌用。

三仙丹

一、沙市

【功能与主治】治一切癰腫潰后，久不肌者，用此藥搽之。

【处方】紅粉一兩 輕粉二錢 正梅片四分

【制法】共研細末，嚴密貯藏于瓶內，勿使藥性揮發。

【劑量及用法】先洗淨患處，搽上藥末，外以膏藥護之。

【禁忌】癰膿已淨者忌用。

二、重慶

【功能与主治】提膿長肉，治小瘡毒。

【处方】水銀一兩 明礬 硝石各一兩一錢

【制法】將藥研細，用鉄鍋一口，依法升丹，括下，每丹一兩，再加海螵蛸五錢，硼砂五錢，梅片一錢，麝香一分，乳細無聲為度，玻璃包裝。

【劑量及用法】外用，適宜為度。

生肌八寶丹

一、上海

【功能与主治】瘡毒潰后不斂。

【处方】石膏(煨) 赤石脂(老式) 輕粉各一兩 東丹 龍骨 血竭 乳香(制) 沒藥(制)各三錢

【制法】各取淨粉混和，研極細

粉。

【劑量及用法】將藥粉搽患處。

二、南京

【功能与主治】去腐生肌。主瘡瘍潰爛，久不收口。

【处方】煨熟石膏五錢 煨甘石四錢 煨龍骨三錢 煨石脂四錢 白蜡三錢 輕粉一錢五分 血竭五分 冰片六分

【制法】上藥共研為極細末。

【劑量及用法】每用少許搽患處。

附參考古方

【來源】瘍醫大全(八寶丹)。

【处方】珍珠(在包入豆腐內，煮一伏時，研細。如治顛頂、十手指尖、十趾指尖、龟头此三十二處，非圓滾珍珠合藥，不能包裹还原，若治癰疽一切瘡瘍，即飯魂珍珠皆可用也)一錢 牛黃五分 象皮切片 琥珀(灯心同乳) 龍骨(煨) 輕粉各一錢五分 冰片三分 煨甘石(銀罐內煨紅研細)三錢

【制法】共乳極細，磁瓶密封。

【劑量及用法】每用少許，生肌長肉，收口如神。

生肌玉紅丹

沈陽

【功能与主治】生肌止痛消腫。主瘡瘍潰爛，火傷燙傷，皮膚疾患，敷之有效。

【处方】當歸一兩 紫草二錢 白芷五錢 血竭(研)四錢 白蜡六兩 香油一斤半 輕粉(研)四錢 生地一兩 甘草一兩二錢 白芨一兩 乳香(研) 沒藥(研)各三錢

【制法】將當歸白芷紫草甘草四味入油內浸三日，慢火熬，微枯，少冷，絹布濾清，將油復入鍋內煎滾，入血竭乳香沒藥化盡，次入白蜡及凡士林一斤，微火化之，候少冷將研細之輕粉投入攪勻即成。

【劑量及用法】量瘡面之大小隨塗敷之。

青龍丹

沙市

【功能与主治】去腐拔毒生肌。

【处方】熟石膏廿兩 輕粉四兩
水粉(煨)一兩二錢 正梅片四錢
水銀 鉛(同水銀煨)各五錢

【制法】共研細末。

【劑量及用法】用新棉花蘸藥撒患處。

【禁忌】自煎忌用。

龍虎化毒丹

杭 州

【功能與主治】清血解毒。治瘋犬毒蛇咬傷，及傷寒中風，瘡瘍驚風，諸種危急痧症，內服外敷，並點眼舌。

【处方】西牛黃 珍珠粉各一兩六錢五分 門子一兩八錢五分
梅水片二兩四錢一分 銀硝四兩五錢
飛腰黃十兩七錢 飛月石四兩六錢三分 爐甘石五兩六錢

【制法】先用斑蟊四只，去頭足，童便十四兩，浸三日，取出斑蟊，將腰黃浸七日，然後風干，先研腰黃，次和月石，漸次加入諸藥，研和極勻極細為度。

【劑量及用法】瘋狗毒蛇咬者，點二眼角及舌尖上，宜連點七日，兼敷傷處，並內服半分，重則連服數日，傷寒中風，昏迷驚風，痰厥急症，皆點舌上，並內服半分，危急痧症，點舌並吹鼻孔。

【禁忌】孕婦酌用，不宜吞服。

立馬回疔丹

一、上海(回疔丹)

【功能與主治】疔瘡。

【处方】蜈蚣(炙)一條 麝香五分 乳香(制)六分 金頂砒五分
輕粉 蟾酥(酒化) 硃砂各一錢
硃砂 腰黃各二錢

【制法】各取淨粉和勻，以蟾酥用燒酒化烊，加糊為丸，如麥子大。

【劑量及用法】用一枚入瘡孔，膏藥蓋之。供醫師應用。

【禁忌】豬肉葷腥食物。

【備考】原方有白丁香今已不用。

二、杭 州

【功能與主治】治疔瘡初起，或用針刺、挖碎破爛，或誤灸失治，以致頃刻潰爛，此疔瘡走黃險症也。

【处方】杜蟾酥(酒化)一錢 滴乳香(去油)六分 明腰黃二錢 淡硃砂 輕粉各一錢 金頂砒五分
麝香三分 飛辰砂一錢 蜈蚣一條約五分 白丁香(雀糞)一錢

【制法】各研細粉和勻，用蟾酥打丸。如麥子式大。

【劑量及用法】先以銀針挑破，用一粒插入瘡口，外用膏藥蓋之，追出膿血疔根甚效。

三、沈 陽

【功能與主治】托毒活絡，防毒內侵。治疔瘡初起，用針刺后或誤灸失治，以致瘡毒走散不定，乃疔瘡走黃險惡之症，急用此丹敷之。

【处方】蟾酥(酒化) 硃砂 輕粉 白丁香各一錢 蜈蚣一條 雄黃 硃砂各二錢 乳香六分 麝香七厘 金頂砒五分

【制法】共碾極細面，糊為小丸。

【劑量及用法】針破患處，用此一粒插入孔內，膏蓋之，追出膿血疔根。

四、撫順(回疔散)

【处方】白砒五錢 白公丁 蟾酥 輕粉 硃砂各一錢 片砂 雄黃 乳香各二錢 麝香一分 蜈蚣一條

【制法】共為細面。

五、哈爾濱(回疔丹)

【功能與主治】解毒止痛。主疔瘡誤醫走黃，面甲常紫，喉乾神昏，麻痛欲死，煩悶攪鬧。

【处方】輕粉 蟾酥(酒化) 白丁香 硃砂 雄黃 硃砂各一錢 麝香五分 乳香(去油)六分 蜈蚣(炙)一條 金頂砒五分

【制法】研為細面，面糊搓如麥子大。玻璃瓶存貯。

【劑量及用法】先以針挑破疔頭，用藥一粒插入孔內，外以膏藥蓋之，追出膿血疔根為效。

【禁忌】不可內服，忌食辛辣。

附參考古方

【來源】外科正宗。

【功能與主治】治疔瘡初起，已用針刺后，或誤灸失治，以致瘡毒走散不住，乃疔走黃險惡症也，急用此插。

【处方】蟾酥(酒化) 硃砂 輕粉 白丁香各一錢 蜈蚣一條(炙) 雄黃 硃砂各二錢 乳香六分 射香一字 金頂砒五分

【制法】共為細末，糊成麥子大丸。

【劑量及用法】凡遇疔瘡針破，用此一粒插入孔內，膏蓋之，次后追出膿血疔根為效。

小 金 丹

一、北 京

【功能與主治】活血消結散毒。主瘰癧乳巖，橫痃，貼骨疽等症。

【处方】白膠香(煎膏) 草烏 五靈脂 地龍肉 木鱉子(去皮)各一兩五錢 乳香 沒藥 當歸各七錢五分 香墨一錢二分

共為細粉，兌入麝香三錢。

【制法】上藥和勻，用白麵二兩打糊為丸，干重二分。

【劑量及用法】每服二丸，日服二次，黃酒送下，溫開水亦可。

【禁忌】忌飲燒酒及食生冷，孕婦勿服。

二、天 津

【功能與主治】解毒，活血，止痛。主瘰癧，乳巖乳瘡，痰核橫痃，騎馬癰，貼骨疽陰疽，初起灼熱作痛。

【处方】白膠香 地龍 五靈脂(醋炒) 制草烏各一兩五錢 制乳香 制沒藥 當歸身各七錢五分 陳墨一錢二分 木鱉子仁一兩五錢
共為細粉，兌入麝香三錢。

【制法】以上研細和勻，每料用江米面一兩二錢蒸糊為丸，干重五分，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，打碎用黃酒送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、南 京

【功能與主治】瘰癧核流注，瘰癧乳巖，橫痃貼骨疽，鱗瘕頭等症。

【处方】制川烏 番木鱉(麻油炸刮去毛) 地龍各一兩五錢 制沒藥 制乳香 當歸各七錢五分 麝香三錢 五靈脂 上云香(水煮去油)各一兩五錢 陳京墨一錢二分

【制法】上藥共研細末，麝香另

乳后加，用熟米粉一兩二錢打糊為丸。每料連米粉共重十兩一錢七分，每粒一分，計做一千零十七粒，每五粒用蠟壳封護。

【劑量及用法】每服五粒(小丸)，一日二次，用黃酒吞服。

【禁忌】孕婦忌服。

四、廣州

【功能與主治】癰疽癰腫。

【處方】白膠香 草烏頭 五靈脂 地龍 木鱉各一兩五錢 乳香 沒藥 當歸各七錢五分 麝香三錢 墨炭一錢二分

【制法】將上列藥洗淨，晒干切碎，隔熱蒸透，研成細末，和入麝香墨炭，用米糊制成丸，每丸重五分，用蠟壳封固。

【劑量及用法】每服一丸。

五、杭州

【功能與主治】治流注痰核、乳巖、癰瘰、橫痃惡核，一切陰疽初起、未成消散、已成拔毒，並杜流走增患，功效甚著。

【處方】白膠香 制草烏 五靈脂 地龍 木鱉(去壳油)各一兩五錢 乳香(去油) 沒藥(去油) 當歸身各七錢五分 麝香三錢 京墨一錢二分

【制法】各研細粉，用糯米粉調糊打丸，每粒潮重二分，蠟壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，重則加倍，熱酒送下，蓋被取汗，如流注將潰及潰久者，每日二服。

六、南昌

【功能與主治】癰瘰痰核，流注乳巖，橫痃貼骨疽等。

【處方】沒藥(去油) 乳香(去油)各七錢五分 木鱉子(制) 地骨五靈脂 制草烏 白膠香(即楓香脂)各一兩五錢 當歸身七錢五分 黑炭一錢二分 麝香三錢

【制法】共研細末，用糯米粉一兩二錢為厚糊，打融為丸，如芡實大，每料約二百五十粒，陰干忌火烘，蠟壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，陳酒送下，如流注將潰，每日早晚各服一丸，初次服藥飲酒盡醉，蓋暖取汗，以後服不必取汗。

【禁忌】孕婦忌服。忌人參高麗參石柱參黨參等藥同時服，戒油膩。

七、沙市

【功能與主治】治流注痰核，癰瘰乳岩，橫痃骨結核等症。

【處方】白膠香 草烏頭(制) 五靈脂 地龍 木鱉(制去油)各一兩五錢 乳香(去油) 沒藥(去油) 當歸各七錢五分 麝香三錢 陳香墨一錢二分

【制法】上藥研細末，用糯米糊為丸，如枝元核大，每粒淨重四分。

【劑量及用法】成人量每次服一丸，防酒送下，蓋被取汗。

【禁忌】體熱而為癰(紅腫)症者及孕婦忌服，並忌食豬肉。

八、重慶

【功能與主治】治流注痰核，癰瘰乳岩，橫痃貼骨疽，蟻蟻頭等症。

【處方】白膠香(安息香代) 草烏 五靈脂 地龍 木鱉各一兩五錢 乳香 沒藥 當歸各七錢五分 麝香三錢 墨炭一錢二分

【制法】共研細末，糯米粉糊為丸，每重五分，蠟皮封固。

【劑量及用法】每服一丸。

九、西安

【功能與主治】主治諸險瘡，一切結核，如險疽初起即服，至消散為止，如流注等症，將欲潰爛或已潰爛均可服，以免流走，若小兒患症不能服湯劑者，服此最妙。

【處方】楓脂香 草烏 五靈脂 地龍 制木鱉各一兩半 制沒藥 歸身各七錢半 麝香一錢 好陳墨一錢二分

【制法】上十味分別搗研極細末，羅過，用糯米粉一兩二錢，煮稠爛和入各藥，搗千錠，為丸如芡實大，一料約為二百五十丸上下，晒干忌火烘，裝瓶勿令洩氣。

【劑量及用法】成人每次服一丸至二丸，服時先取一丸，潔布包好，放平石上，隔布敲碎，放杯內，以黃酒浸入，用小杯掩蓋一二小時，熱酒送服，蓋被臥取微汗，患在上部臨睡服下，下部空心服，小兒酌減。

【禁忌】內有五靈脂不可與人參黨參高麗參同日服。

十、大同

【功能與主治】流注惡核，癰瘰

橫痃，乳巖乳癰，楊梅魚口。

【處方】白膠香 草烏 地龍 靈脂 鱉子各一兩五錢 歸身 乳香 沒藥 陳香墨各一錢二分 麝香三錢二分

【制法】共為細面，江米糊為小丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每次一服，白水送下，每服一錢。

十一、禹縣

【功能與主治】流注惡核，癰瘰橫痃，乳巖乳癰，無名腫毒。

【處方】白膠香一兩五錢 沒藥 歸身各七錢五分 五靈脂一兩五錢 麝香三錢 京墨炭一錢二分 木鱉子一兩五錢 乳香七錢五分 草烏 地龍各一兩五錢

【制法】共為細面，糯米打糊，做芡實大丸，三分重，赤金為衣。

【劑量及用法】每服一粒，白開水送下，小兒每服半粒。

【禁忌】孕婦忌用。

【備考】有效期二年。

十二、濟南

【功能與主治】癰疽腫毒，痰核流注，癰瘰乳岩，貼骨疽等症。

【處方】白膠香 五靈脂各一兩五錢 沒藥 當歸身 乳香各七錢 木鱉 草烏各一兩五錢 占墨二錢 麝香 地龍各一錢五分

【制法】除麝香外，其他藥共為細末，用白面二兩打糊為丸，重二分。

【劑量及用法】每服二丸，黃酒送下，日服二次，溫開水送下亦可。

【禁忌】辛辣等物，孕婦忌服。

十三、沈陽

【功能與主治】活血消腫。主濕痰流注，癰瘰結核，乳岩初起，服之消散。

【處方】白膠香 靈脂 木鱉子 乳香各三錢 淨地龍 麝香 沒藥 當歸身各七錢五分 黑炭一錢二分

【制法】共碾極細面，糯米粉一兩半為糊，和藥為丸，一分五厘重。

【劑量及用法】每服二至四丸，熱酒送服。蓋被取汗。

【禁忌】妊娠忌服。

【備考】是劇藥。

十四、吉林(小粒金丹)

【功能与主治】消毒杀菌，消炎散肿，行气止痛。主阳瘡陰疽，乳岩乳癰，瘰癧結核，濕熱流注，四肢疼痛，終年不愈者，及一切無名腫毒等症。

【处方】白膠香 灵脂 草烏 地龍 沒藥 乳香 當歸各五錢 麝香七分 京墨八錢 木鱉子一兩

【制法】共為細末，用糯米八錢，合在一處，杵為丸，如芡實大，晒干。

【劑量及用法】大人每服五丸，七歲至十二歲，每服三四丸，六歲至三歲，服二丸，三歲至滿歲，可服一二丸，每日服二次，元酒為引，蓋被出汗，汗透身愈。

十五、呼和浩特

【处方】白膠香 草烏 灵脂 地龍 木鱉子各一兩五 歸身 沒藥七錢五

【制法】共為極細面，糯米糊為丸，重二分。

附參考古方

【来源】外科全生集。

【功能与主治】治一切流注痰核，瘰癧乳岩，橫痃貼骨疽，蟻瘻頭等症。

【处方】白膠香 草烏 五灵脂 地龍 木鱉各一兩五錢（俱為細末）乳香 沒藥（各去油）歸身（俱淨末）各七錢半 射香三錢 墨炭一錢二分

【制法】亦各研細末，用糯米粉一兩二錢，為厚糊，和入諸粉，搗千捶，為丸如芡實大，每料約250粒。

【劑量及用法】臨用陳酒送下一丸，醉蓋取汁，如流注將潰及潰久者，以十丸均作五日服完，以杜流走不定，可絕增入者，如小兒不能服煎劑，以一丸研碎，酒調服之。

【禁忌】但丸內有五灵脂，與人參相反，斷不可與參劑同日服也。

消核丹

沈陽

【功能与主治】消腫滅菌，化痔排膿。主頸淋巴腺結核。已潰能排膿生肌，未潰能化核消腫，撲滅菌毒，不論頸腋腫硬瘰癧如果，一切氣

療服之消散。

【处方】蜈蚣一條 台麝一厘 鷄蛋一個

【制法】共碾極細面，裝鷄蛋內，用文武火煨熟，晒干研極細面，用面糊為小丸。

【劑量及用法】作一次服，白開水送下。連服十次以上有效，至瘰癧停服。

【禁忌】酒及刺激性食物。

消癰丹

禹縣

【功能与主治】消癰瘤。

【处方】黃柏 昆布 海藻各二兩 海帶 海螵蛸各一兩

【制法】共為細面，水丸豆大。

【劑量及用法】每服一錢，白開水送下。

【禁忌】非癰瘤忌用。

【備考】有效期一年。

消痔丹

沈陽

【功能与主治】消腫化痔。主內外痔瘡，痔核腫痛，大便出血，痔久成漏，肛腫疼痛，膿血淋漓。

【处方】夏枯草四兩 生甘草 川黃連各二兩 金銀花一斤

【制法】先將前三味共碾極細面，再將金銀花煎水熬膏合為小丸。

【劑量及用法】每次服用二錢，白開水送服。

【禁忌】辛辣鷄肉。

九龍丹

一、杭州

【功能与主治】活血散瘀，消腫排毒。治懸癰橫痃，魚口便毒，一切花柳毒症，初起未成膿者，服之能消。

【处方】廣木香 粉兒茶 上血竭 乳香（去油）沒藥（去油）巴豆霜各一兩

【制法】共研細末，生白蜜為丸，每粒一分。

【劑量及用法】每服九粒，分三次用溫酒送下。大便行四五次，食稀粥自止，腫甚者間日再服一服。

二、南昌

【功能与主治】懸癰、魚口、便毒，橫痃，初起未成膿者。

【处方】同杭州。

【制法】共研細末，生白蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服五分，空腹時熱酒一杯送下，俟大便行四至五次方食冷稀粥。腫甚者隔日再服一次。非經醫師處方不得使用。

【禁忌】孕婦忌服，虛者慎用。

三、沙市

【功能与主治】治便毒橫痃，癰毒初起未成膿者，服此藥後大便瀉下，臭惡病即減輕，以後再酌量用藥。

【处方】同杭州。

【制法】共研極細末，用生蜜調勻為丸，如黃豆大，每丸重一分。

【劑量及用法】成人量每次服二或三丸，空腹溫開水下，病重者，隔一或二天后再服一次。

【禁忌】體虛者及小兒老人忌服。

四、大同

【功能与主治】楊梅結毒，魚口便毒，小便腫爛。

【处方】同杭州。

【制法】蜜丸如綠豆大。

【劑量及用法】每付九粒，每次服一付。

五、沈陽

【功能与主治】瀉火解毒消腫。主治花柳余毒，小便淋濁，軟硬下疳，魚口，便毒，下疳潰爛。疼痛異常兩腿拘牽，不能伸屈。

【处方】同杭州。

【制法】共碾極細面，棗肉為小丸。

【劑量及用法】每服十粒，用開白水送下，此是劇藥，不可多服。

六、撫順

【功能与主治】解毒消腫鎮痛。主陰囊之後，谷道之前，若懸物然，故名懸痛，疼痛難堪，下疳下疳，易潰難合，性病淫毒，鼠蹊腺腫，結成橫痃，寒熱往來，兩腿牽絆，不能屈伸。

【处方】兒茶 乳香 沒藥 血竭 廣木香各三錢 豆霜二錢半

【制法】共為細面，面糊小丸。

【劑量及用法】每服九粒，溫白水送下。

【禁忌】忌食發物。

七、吉 林

【功能與主治】清血解毒，消腫止痛，已潰能合，初期能消，便秘能通，積滯能除。主花柳淫毒，魚口便毒，雙單橫痃，凝滯結核，狀如魚卵，疼痛難禁，寒熱往來等症。人凡花柳起初之際，此藥均能治之。

【處方】同杭州。

【制法】以上六味藥，共為極細面，煉蜜為丸，如芡實大，用蜡紙包之。

【劑量及用法】每付九丸，早空腹服，溫水送下。

八、哈 爾 濱

【功能與主治】解毒消腫。懸癰，陰囊之後，谷道之前，若懸物然，故名懸癰，疼痛欲死，下墜苦悶，易潰難合，初腫可消。橫痃，花柳淫毒，凝滯結核，腿股合縫，癰腫如卵，左名魚口，右名便毒，寒熱往來，疼痛異常，兩腿牽絆，不能屈伸。主惡癰橫痃。

【處方】同杭州。

【制法】共碾為細面，棗肉為丸，如芡實大。

【劑量及用法】每服九粒，白水送服，不可多服。

【禁忌】忌食發物。

九、呼 和 浩 特

【處方】同杭州。

【制法】煉老蜜為丸，小丸。

【劑量】每服九個。

附參考古方

【來源】外科正宗。

【功能與主治】治魚口便毒，騎馬癰橫痃初起未成膿者服之。

【處方】兒茶 血竭 乳香 沒藥 巴豆(不去油) 木香

【制法】上各等分為末，生蜜調成一塊，磁盒盛之，臨時旋丸塞口大。

【劑量及用法】每服九丸，空心，熱酒一杯送下，行四五次方吃稀粥，腫甚者，間日再用一服自消。

花柳九龍丹

福 州

【功能與主治】治魚口便毒，騎馬癰，橫痃初起未成膿者服之神效。

【處方】血竭 兒茶 乳香 沒藥 木香 巴豆霜各一兩

【制法】共研末，生蜜為丸。

【劑量及用法】每服九丸，空心，熱酒送下。

新加五寶丹

沈 陽

【功能與主治】清血解毒。主梅毒，硬性下疳，咽疼骨痛，肛門蝕爛。

【處方】牛黃二分 乳石一錢 硃砂一錢 冰片 珍珠各五分 麝香一分

【制法】共碾極細面，瓷罐收貯。

【劑量及用法】每服五分，每日早晚各服一次。土茯苓湯送下。對於初生兒先天性梅毒，每服四分之。

【禁忌】雞、魚、牛、羊一切發物茶水。

十 仙 丹

吉 林

【功能與主治】主花柳梅毒，魚口便毒，下疳橫痃，梅毒入骨，關節作痛，四肢不仁，人破鼻爛。

【處方】輕粉 紅粉各二錢 蜈蚣二條(去足頭) 紅娘(去足頭) 斑蝥(去足頭) 木鱉各七個 紅棗七個 豆霜一分五厘

【制法】共研細末，煉蜜為丸，如芡實大，滑石為衣。遮光瓶保存。

【劑量及用法】每服一丸，黃酒送下，每日服一次，空腹時服。

【禁忌】戒食生冷。孕婦忌服。

避 火 丹

濟 南

【功能與主治】火傷燙傷，輕、重程度皆有效，一般重傷火傷愈後，並不結疤。

【處方】劉寄奴 生熟地榆 川軍各等分

【制法】共研極細末。

【劑量及用法】香油調擦。

蟾 酥 錠

一、北 京

【功能與主治】解毒消炎止痛。主疔毒惡瘡初起，麻木疼痛。

【處方】蟾酥(酒化) 沒藥 乳香 雄黃 巴豆霜各二錢 樟腦 硃砂各一錢 輕粉五分 麝香二分

【制法】各為細粉和勻，用方內蟾酥酒化為錠，干重一錢。

【劑量及用法】醋研敷患處。

【禁忌】忌發物。

二、天 津

【功能與主治】消腫，解毒，止痛，主疔毒惡瘡，癰癤初起，腫痛不消，以及蠍蟻虫咬，疼痛不止。

【處方】雄黃八兩 活蝸牛四兩(上二味，共中一處，晒干製成細粉) 硃砂八兩 麝香五分 冰片一錢 蟾酥二兩(用白酒化開)

【制法】先將方內蟾酥，用白酒四兩化開，再入群藥和勻為錠，干重一錢。

【劑量及用法】用好醋磨汁，塗抹患處。

【禁忌】瘡癰潰破勿用。

三、南京(外科蟾酥錠)

【功能與主治】主初起之疔瘡，癰瘍、腦疽。

【處方】蟾酥二錢 樟腦一錢 制沒藥二錢 飛硃砂一錢 制乳香二錢 輕粉五分 雄黃一錢 麝香二分 巴豆霜一錢

【制法】上藥九味，共研細末，將蟾酥酒化升，加米糊做錠，每錠計重二分。

【劑量及用法】每用一錠，用醋磨敷患處。

【禁忌】不可內服。

四、武 漢

【功能與主治】疔瘡惡毒，紅腫疼痛，蠍蟻虫傷。

【處方】硃砂六錢 乳香(去油) 輕粉 枯矾 麝香 沒藥(去油) 寒水石各二錢 蝸牛(去壳)三錢 明雄 蟾酥(酒化) 藤黃各四錢

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，按淨粉量加米粉40%，用適量

水、煮成糊狀，和成爲錠，大者重爲一錢，小者重爲五分。

【劑量及用法】研磨二分，敷患處有洞。

【禁忌】不可入口。

五、福州

【功能與主治】治癰疽發背，無名腫毒，諸般惡瘡，並一切毒蛇蟲咬傷者，用涼水磨搽。

【處方】大黃一兩 雄黃 片子黃 硃砂 沒藥各五錢 乳香 明礬 蟾酥 生黃各三錢 樟腦片五錢

【制法】共研細末，水糊爲錠，每重八分，硃砂衣。

六、蘭州

【功能與主治】解毒消炎止痛。主疔毒惡瘡，癰疽紅腫堅硬，以及虫蛇咬傷，疼痛不止，均宜擦敷。

【處方】雄黃十二兩 硃砂四兩 蝸牛二兩 蟾酥一兩(酒化) 麝香三錢

【制法】共軋細面，以蟾酥化升爲錠，每錠一錢重亮光。

【劑量及用法】此錠以醋磨開，用汁水塗擦患處。

【禁忌】忌房事。

七、禹縣

【功能與主治】癰疽發背，無名腫毒，諸般惡瘡，蠍螫虫咬。

【處方】雄黃十兩 麝香五分 硃砂五兩 蟾酥二兩五錢 冰片四兩

【制法】共爲細面，以米面糊爲錠。

【劑量及用法】醋磨化塗搽患處。

【禁忌】潰瘍忌用。

【備考】有效期一年。

八、濟南

【功能與主治】癰疽腫毒，蠍螫虫咬。

【處方】同北京。

【制法】各爲細粉合勻，酒化蟾酥爲錠，重一錢。

【劑量及用法】外敷藥，用醋研敷患處。

九、撫順(1)(蟾酥條)

【處方】硃砂一錢 雄黃 輕粉

各二錢 血竭一錢半 乳香 牛沒藥各一錢 胆矾 水石各一錢 蝸牛二十個 台麝一分 蜈蚣一條 冰片一分 蟾酥三錢 硃砂一錢 白丁香 白粉霜各二錢

【制法】共爲細面，化蟾酥糯米爲條。

十、撫順(2)

【功能與主治】消腫解毒鎮痛。主外科毒瘡惡瘍，初起堅硬，疼痛冷麻，起線走黃，均可敷消。

【處方】硃砂 雄黃各四兩 蟾酥五錢 麝香二錢半 蝸牛二兩

【制法】共爲細面，入乳化石化蟾酥爲錠七分，硃砂衣。

十一、吉林、哈爾濱

(蟾酥條、蟾酥餅)

【功能與主治】消腫解毒。治疔毒，癰疽發背，腦疽乳癰，附骨疽，無名腫毒，一切外科惡症。

【處方】同北京。

【制法】于端午日午時，在淨室內先將蟾酥酒化，其餘均研爲細面，用蟾酥混合爲錠子，重三分或七分(均詳爲條均可)。玻璃瓶存貯。

【劑量及用法】量患處大小，每用一二錠，用口涎或陳醋調敷。

【禁忌】切忌入口。

十二、承德

【功能與主治】癰疽腫毒，蠍螫虫咬。

【處方】同北京。

【制法】共爲細粉和勻，酒化蟾酥爲錠，重一錢。

【劑量及用法】外敷藥，用醋研敷患處。

十三、呼和浩特

【處方】硃砂四兩 雄黃八兩 活蝸牛四兩 蟾酥二兩 白花四錢 麝香 水片

【制法】用活蝸牛與雄黃軋一處晒干，再共研細面，以牛乳化石化蟾酥爲錠，重一錢，陰干，硃砂衣亮光。

附參考古方

【米砂】瘍醫大全(蟾酥餅)。

【功能與主治】治腦疽乳癰，附骨疽髯癰，一切惡症，或不痛或大痛或麻木。

【處方】潮腦 硃砂各一錢 真蟾酥(酒化) 沒藥(去油) 乳香(去油) 明雄黃 巴豆霜各二錢 輕粉五分 麝香三分

【制法】以上爲細末，于五月五日午時，在淨室中用蟾酥酒和爲丸，爲條爲餅以便施用。

【劑量及用法】敷貼瘡頭上，以膏蓋之。

【備考】一方：去巴豆霜，潮腦，加寒水石(煨)，枯礬，膽礬各一錢，蝸牛二十一個。

坎宮錠

一、武漢

【功能與主治】一切瘡癤，紅腫作痛，並治痔瘡。

【處方】陳京墨一兩 胡黃連二錢 熊胆三錢 麝香五分 冰片七分 兒茶二錢 牛黃二分 豬胆汁二錢 生薑片一錢 大黃汁二錢 紅醋三錢

【制法】混合碾細，按淨粉量加粘米粉40%，適量之水，煮成糊狀，和成爲錠，每錠大者爲一錢，小者爲五分。

【劑量及用法】用涼水磨濃塗患處。

二、杭州

【功能與主治】治熱毒諸瘡，癰赤腫痛，痔瘡腫毒等症。此錠抹敷甚效。

【處方】陳京墨一兩 胡黃連二錢 熊胆三錢 麝香五分 兒茶二錢 梅冰片七分 西牛黃二分

【制法】以上七味研爲細末，用豬胆汁加生薑汁，大黃水浸濃汁，陳醋各少許，搗和爲錠，每潮重四分。

【劑量及用法】涼水抹濃，敷于患處。

三、吉林

【功能與主治】活瘀止痛，解熱去毒之功。癰疽發背，紅腫焮人，凝解不消，痔漏等症。

【處方】京墨六錢七分 胡連一錢四分 熊胆二錢 兒茶六錢七分 梅片五分 牛黃二分 麝香一錢四分

【制法】共研細末，然后用豬胆汁調成，制錠劑五錢重，置避光瓶貯

存之。

【劑量及用法】磨開敷于患處，瘡未濕者，用陳醋調用之。

四、呼 和 浩 特

【處方】京墨四兩 熊胆二兩
兒茶三兩 胡連二兩 牛黃五分
麝香二分 冰片二錢

【制法】共為細面，豬胆汁合江米糊為錠，重五分。

離 宮 錠

一、武 漢

【功能與主治】疔瘡腫毒，一切皮肉不變，漫腫無頭。

【處方】陳京墨一兩 硃砂二錢
麝香一錢半 胆矾 真蟾酥 血竭各三錢

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，按淨粉量加米粉40%，用適量水，煮糊狀，和成為錠，大者重為一錢，小者重為五分。

【劑量及用法】用涼水磨濃敷患處。

二、呼 和 浩 特

【處方】血竭 京墨 胆矾 硃砂各二兩 麝香 冰片

【制法】共為細面，用蟾酥二兩，用牛乳化為錠，重六分。

化 瘍 錠 子

沈 陽

【功能與主治】消腫止痛。主治諸瘡腫痛，熱毒掀赤，散痛止痛，消一切未潰瘡癰。

【處方】京墨一兩 麝香五分
熊胆三錢 冰片七分 兒茶二錢
牛黃三分 胡連二錢

【制法】共碾極細面，用豬胆汁姜汁醋各少許和藥成錠。

【劑量及用法】水磨敷患處。

五 色 靈 藥（提毒散、八寶提毒散）

吉 林、哈 爾 濱

【功能與主治】提毒化腐，生肌長肉，活血排膿。主癰疽瘡瘍腐潰，疼痛青紫，腥臭難聞，久不斂口，贅肉叢生，腐敗流水，余腐不盡，新肉

不生。

【處方】食鹽五錢 黑鉛六錢
枯白矾二兩 枯皂矾二兩 水銀二兩 火硝二兩

【制法】先以鹽鉛溶化，入水銀結成砂子倒出，再將二矾火硝一同炒干研細后，合已制好之鉛汞砂子于一處細研，以不見銀星為度，入罐內鹽泥封固，置文火上升煉之，打三炷香，不可太過不及，經一宿取出，視之其白如雪，約有二兩為火候適中之靈藥，如要藥色紫者，在升煉前加硫黃五錢。要藥色黃者，在升煉前加雄黃五錢。要藥色紅者，則用黑鉛九錢、水銀一兩、枯白矾二兩、火硝三兩、辰砂四錢、明雄黃三錢，升煉方法火候俱如前法。凡升煉靈藥，硝要炒燥，矾要煨枯為要，一法凡煉出靈藥，倍加生石膏研勻，復入新罐內，如前煉一炷香，用之不痛。

【劑量及用法】撒復瘡口上，膏藥復蓋之，毒重者，研入輕粉少許，即能拆口，俟毒盡后，欲速封口時，可用王紅膏調敷之，或加入烏鯢骨面少許，或加珍珠面少許，即能急速封口。

【禁忌】忌食發物及辛辣物品。

附 參 考 古 方

【來源】醫宗金鑑：外科心法要訣。

【功能與主治】治癰疽諸瘡已潰，余腐不盡，新肉不生，撒之最效。

【處方】食鹽五錢 黑鉛六錢
枯白矾 枯皂矾 水銀 火硝各二兩

【制法】先將鹽鉛溶化，入水銀結成砂子，再入二矾火硝同炒干研細，入鉛汞再研，以不見星為度，入罐內泥固濟，封口打三炷香，不可太過不及，一宿取出視之，其白如雪，約有二兩，為火候得中之靈藥。

如要色紫者加硫黃五錢，要黃色者加明雄黃五錢，要紅色者，用黑鉛九錢、水銀一兩、枯白矾二兩、火硝三兩、辰砂四錢、明雄黃三錢。升煉火候俱如前法。

凡升打靈藥，硝要炒燥，矾要煨枯。

【備考】一方：用燒酒煮干，炒燥方研入罐。一法：凡打出靈藥，倍加石膏和勻，復入新罐內打一炷香，用之不痛。

外 用 紅 靈 藥

武 漢

【功能與主治】瘡瘍潰后，堅硬紫黑。

【處方】淨紅粉十兩 冰片三兩
麝香一錢半 銀珠二錢

【制法】取上藥混合碾細，成淨粉90—95%即得。

【劑量及用法】洗淨瘡口，視患處大小，酌藥量，薄撒貼膏。

清 毒 藥

沈 陽

【功能與主治】解毒活血。主瘋狗咬傷。

【處方】防風二錢 一分 滑石七分 甘草二錢 香附（去毛醋制）四個 川椒七粒 丹皮一錢 大黃（元酒浸）三錢 牛黃三厘一五厘

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，每丸重二錢。

【劑量及用法】每次服一兩即五丸。

【禁忌】辛辣生冷發物、惊吓、房事一百天，終身不吃狗肉。

疔 藥

南 京

【功能與主治】主疔瘡。

【處方】生靈磁石四兩 川白蜡一兩二錢 冰片一錢六分 明矾五分

【制法】上藥四味，將磁石研末，用水飛乳細，白蜡刮成細末，共同和勻為度。

【劑量及用法】每用少許，放入膏藥內，貼于患處。

坐 板 瘡 藥

南 京

【功能與主治】主臀部坐板瘡。

【處方】豬脊髓一條 輕粉一錢 杏仁七粒 麝香一分 枯矾二分

【制法】上藥四味，共乳研成細末，將豬脊髓調和藥末成膏狀。

【劑量及用法】每用少許，搽于患處。

薄荷油

禹 县

【功能与主治】主湯火燒，薄皮濕癢，風火牙疼，皮膚瘡癰，耳流膿，痔瘡疼痛，眼干眼澀，眼多模糊，眼痒眼疼，暴發赤腫，害眼初期。

【处方】樟腦四兩 薄荷油二兩 香油六兩 紫草二錢

【制法】先將油加溫后，將樟腦紫草入內即成。

【劑量及用法】皮膚抹患處，眼症抹上下眼胞。

【禁忌】切忌內點及內服。

【備考】有效期一年。

健民薄荷油

禹 县

【功能与主治】主蠍螫蜂刺，湯火燒，風火牙疼，耳流膿，眼痒眼疼，目干模糊，暴發赤腫。

【处方】薄荷油一兩 樟腦二兩 香油二兩 薄荷冰五錢 黃蜡六錢

【制法】先將油蜡化開，再加上藥即成。

【劑量及用法】以上均抹患處，眼疾抹眼外皮。

【禁忌】眼內忌用。

【備考】有效期二年。

黑藥油

南 京

【功能与主治】主瘡瘍破爛。

【处方】細生地 黃柏各八兩 當歸 赤芍 大黃各四兩 白芷 獨活 麻黃各二兩

【制法】用麻油八斤，桐油二斤，先將藥浸泡一宿，文火熬枯，去渣濾淨，再慢慢熬至滴水成珠時，加黃丹（炒透），夏季用丹七十兩，冬季用丹六十兩收膏，退火氣再用。

【劑量及用法】用油紙或牛皮紙攤之，貼患處。

專治瘰癧藥面

呼 和 浩 特

【处方】珍珠三個 銀珠二錢 梅片五分 麝香一分 白信三分

松香二錢

【制法】共為細面，用麻三張裹緊，浸于香油內，一月后取出。

【劑量及用法】用鷄翎蘸藥抹于患處立效，但必須用淘米泔洗之。

【禁忌】忌小米十天。

凍瘡藥水

南 京

【功能与主治】主凍瘡疼痛，硬結未潰。

【处方】樟腦 紅花各一兩 酒精一磅

【制法】先將紅花用酒精浸，濾去紅花，加樟腦于酒精內，使其溶開，用一兩裝玻璃瓶裝之，密封瓶口。

【劑量及用法】先將患處溫水洗淨，以少許塗患處，塗時應多加揉擦，使局部皮膚發暖，一日數次。

治大背瘡驗方

呼 和 浩 特

【处方】真川貝三錢（用背陰之細榆皮搗泥再兌鷄子清為膏）加冰片一分用白布攤上貼患處。

瘰癧神效方

福 州

【处方】爐甘石（飛淨）一兩 用甘草水飛八九次，或加冰片三分 密陀僧（研飛）三錢

【制法】用生豬油調攤油紙上。

【劑量及用法】貼瘡外，用布條纏緊，愈緊愈好。

【禁忌】切勿開看，十余日平復如常。

專治痔漏方

青 島

【处方】馬錢子（去毛）八兩 山藥 芥穗 蒺藜 蜂房 芡實 茅朮各二兩

【制法】共軋細面，水泛成丸，每付二錢。

【劑量及用法】開水送服。

一粒珠

一、天 津

【功能与主治】活血消腫解毒。

主癰疽瘡癤，乳癰乳癌，紅腫疼痛，初起未潰者可消，有膿者速潰。

【处方】穿山甲二十四兩，分作四分，一分以清水洗淨生用，一分用香油炙酥，一分打碎用醋一兩浸拌微炒，一分打碎用綠茶一兩熬透去渣取汁浸拌微炒。再與制乳香、制沒藥各二兩共為細粉，兌入：牛黃珍珠各二錢五分 麝香 冰片 硃砂面 雄黃面各五錢 制蟾酥面一錢五分

【制法】以上研細和勻，用江米麵十二兩蒸糊，加蘇合油一兩燉化為丸，每丸重五分，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，黃酒送下，白開水亦可。

【禁忌】孕婦忌服。

二、上 海

【功能与主治】無名腫毒，癰疽。

【处方】穿山甲十六兩 蟾酥一錢二分 珍珠二錢 冰片 硃砂 腰黃各四錢 蘇合香油 牛黃各三錢 麝香二錢

【制法】穿山甲分四份，一分生用，余三分用陳米醋紅茶麻油炙炒，研細所用，再將余藥（除蟾酥蘇合香油）各研細粉，和入穿山甲粉同研勻，將蟾酥用燒酒烊化，和入蘇合香油內，用藥粉和勻，加糯米粉打糊為丸，每丸潮重四分半，蜡壳固封。

【劑量及用法】每次一丸，溫開水化服。遵醫師指示服用。

【禁忌】孕婦忌服。

一 笔 消

一、武 汉

【功能与主治】癰疽惡瘡，及一切無名腫毒。

【处方】大黃二兩 蟾酥五錢 乳香二錢 藤黃一兩 麝香二錢 蝸牛（淨）六錢 明礬五錢 沒藥二錢

【制法】進行干燥，混合研細，按淨粉量加糯米粉40%，用適量水煮糊狀，和成為錠，每錠為二分半。

【劑量及用法】視瘡大小，酌用少許，米醋磨敷，日二次。

【禁忌】白疽忌用。

二、吉 林

【功能与主治】消癰散腫，活血

去毒，鎮痛止痒，外敷时，而药力能深达皮肤，主痈疽发背，各种疔毒恶疮，及一切无名肿毒。

【处方】同武汉。

【制法】七味药品，以六味共为细末，凡红绢罗筛之二次，然后再将麝香兑入，用钵研均，再取鲜蜗牛捣烂作铤，每铤二分五厘。

【剂量及用法】每次照患处大小，酌而用之，用时以米醋化开，敷在患处，一日换二次。

附参考古方

【来源】外科证治全生集。

【处方】大黄二两 藤黄一两 明矾 蟾酥各五钱 麝香 乳香 没药各二钱。

【制法】用蜗牛捣烂作铤。

【剂量及用法】取铤醋磨，新笔蘸药圈围，干再圈，圈至疔消方止。

一笔勾

一、福州（局方一笔勾）

【功能与主治】外伤，无名肿毒，痈疽发背，疔疮诸毒，肿痛初起者，涂之无不神效。

【处方】山慈姑 花粉 白芷 五倍子各一两 原麝香二钱 老片三钱 乳香五钱

【制法】共研细末，糯米为铤，每重八分，滑石粉为衣。

二、济南

【功能与主治】肿毒初起，疔癰頑瘡。

【处方】毛慈菇二两 蜗牛二两 五钱 蟾酥二两五钱（酒制） 白芷一两 白石 川芎各五钱 官粉二两五钱 生半夏四两 冰片 麝香各二分

【制法】共为细末，化蟾酥为铤，每铤五分或一钱。

【剂量及用法】醋抹敷患处。

【禁忌】刺激性等食物。

三、呼和浩特

【处方】茅慈菇三两 白芷二两 甘石六两 蟾酥三两 川芎五钱 生半夏四钱 官粉二两五钱 石膏

二两 麝香一钱 冰片二钱

【制法】共为细面，牛乳蟾酥为铤，重一钱，江米糊亦可。

堆毒羣芳白

济 南

【功能与主治】发背对口，膀痈肋疽，乳痈乳岩，瘰癧结核以及无名肿毒。

【处方】白芨白藓白矾等分。

【制法】共为细末。

【剂量及用法】用凉水和匀，用笔扫堆患处，干即重扫，中间留头。

【禁忌】牛羊肉。

吃疗虎

兰 州

【功能与主治】消炎解毒。主治无名肿毒，诸般恶疮。

【处方】上牙硝六钱 明雄黄一两 大青盐三钱 麝香五分 冰片五分

【制法】共为细面。

【剂量及用法】每次少许，用香油调患处。

皮肤病类

苦 参 丸

沈 阳

【功能与主治】遍身搔痒，疥瘡，赤游风 癩风刺痒等症。

【处方】苦参四两 玄参 黄连 大黄 独活 枳实 防风各二两 黄芩 栀子仁 菊花各一两

【制法】共碾成细面，炼蜜为丸，一分重。

【剂量及用法】每服三十丸，茶送下。

苦参扫疥丸

昆 明

【功能与主治】疥瘡后余毒未净，周身发痒。

【处方】苦参 荆芥 防风 独活 羌活各二两 当归四两 川芎一两 赤芍 连翘 银花各二两

皮 肤 病 类

黄柏一两 黄芩 栀子 滑石 白朮各二两 黄连一两 甘草二两

【制法】水送为丸。

【剂量及用法】每服二钱半，幼童减半，开水送服。

【禁忌】忌鱼。

合 掌 丸

一、沈 阳

【功能与主治】解毒杀菌。主癬疥、湿疥、干疥、皰疹，疥毒发痒，经久不愈。

【处方】大枫子四十九粒 樟脑 花椒 檳榔各三钱 枯矾 雄黄各二钱 水银一钱

【制法】先将枫子与水银同研至不见星为度。再碾核桃数个令烂，入前药捣丸如龙眼大。

【剂量及用法】日则手搓并擦患处，夜则合于掌中而睡。

二、抚 顺

【处方】麻子一两 硫磺二钱 川椒一两 大枫子三钱 胡桃一两 人言 樟脑 水银各一两 雄黄一两 柏油十二两 大枣十四个。

【制法】共熬成膏。

三、吉林（合手香、合掌散）

【功能与主治】解毒杀菌，止痛消痒。主疥瘡，干疥湿疥，蔓延周身，搔痒流水，烦躁难寐等症。

【处方】大枫子（去皮）十四个 红矾五分 胡桃（去皮）三个 红枣（去皮核）七个 制水银一钱

【制法】上药五味共捣一处，后兑入猪油为丸，二钱重。以蜡纸包之。

【剂量及用法】将此药搽敷患处，谷草微火熏烤。此药有毒不可入口。于临睡时，两手可着手套。

四、哈尔滨（合手香 又合掌散）

【功能与主治】解毒止痒。主湿毒疥瘡，遍体蔓延，搔痒流水，烦躁难寐。

【处方】大枫子（去皮）十四两 红矾五分 胡桃（去皮）三个 硫黄

一錢 紅棗(去皮核)七个 水銀(制)一錢

【制法】共搗一處，兌猪油為丸，二錢重。瓷瓶存貯。

【劑量及用法】擦敷疥上，谷草微火燻烤之。

【禁忌】切勿觸摸腎囊及目內，否則必至腫脹，夜睡時兩手應着手套為宜。此藥有大毒，不可入口。

胡麻散

沈陽

【功能與主治】消風止痒，清血解毒。主風熱癰疹，皮膚作痒，日輕夜重，見風尤甚，心煩腹痛苦楚不堪。

【處方】薄荷叶 胡麻子各一兩 甘菊花五錢 白蒺藜 威靈仙 苦參 白芷 荆芥穗 川芎 防風 黃芩 牛蒡子各一兩

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二錢，溫酒送下。

【禁忌】魚、肉、糖、葱、蒜。

蛤粉散

吉林、哈爾濱

【功能與主治】燥濕清熱。主黃水瘡，爛流黃水，蔓延浸潤，搔痒干緊。

【處方】蛤粉 石膏各一兩 輕粉 黃柏各五錢

【制法】共為細面，絹羅篩極細。包裝，玻璃瓶存貯。

【劑量及用法】干敷患處或香油調敷。

【禁忌】忌食辛辣。

青蛤散

一、天津

【功能與主治】杀虫，消毒，滲濕。主皮膚濕瘡，刺痒難忍，破流黃水，潰爛疼痛，浸淫不已，日久不愈。

【處方】煅蛤粉一兩 青黛三錢 煅石膏一兩 黃柏五錢 共為細粉兌入，輕粉面五錢。

【制法】以上研細和勻，五錢裝袋。

【劑量及用法】用花椒油，將此散兌入調勻，塗抹患處。

二、沙市

【功能與主治】一切火毒，諸瘡等症。

【處方】青黛二錢 蛤粉一兩 石膏(煅)一兩 輕粉 黃柏各五錢

【制法】上藥共研細末。

【劑量及用法】用麻油調成膏，薄塗患處。

【禁忌】不由于熱毒的寒性瘡症勿用。

三、西安

【功能與主治】大人，小兒患鼻瘡，鼻下兩傍腐爛或疼或痒，流出黃水。

【處方】同沙市。

【制法】上五味分別搗杵細末，共研勻。用磁罐裝盛，蓋塞罐口。

【劑量及用法】先用香油將藥調成塊，用涼水調稀，薄塗瘡處。一日換塗二次。

四、濟南

【功能與主治】一切濕毒出水，或黃粘水等症。

【處方】黃柏二錢 青黛一錢 輕粉二錢 蛤粉四錢 乳香三錢 冰片一分

【制法】共為極細粉。

【劑量及用法】香油調搽。

五、沈陽

【功能與主治】燥濕止痒。主鼻生粟米瘡，小兒鼻瘡及皮膚潰瘍，流膿流水，浸淫疥等。

【處方】同沙市，制法亦同。

【劑量及用法】香油調塗患處。

六、撫順

【功能與主治】解毒化濕，生肌長肉。主黃水瘡濕毒流串，生瘡結痂，浸淫黃水，搔痒干痛，大面鼻孔叢生蔓延。

【處方】青黛 輕粉 黃柏各五錢 蛤粉一兩 石膏一兩 冰片二錢

【制法】共為細面。

【劑量及用法】香油調敷患處。

【禁忌】辛辣、發物。

七、哈爾濱

【功能與主治】同撫順，劑量及用法亦同。

【處方】同沙市，制法亦同。

【禁忌】忌食辛辣。

附參考古方

【來源】醫宗金鑑。

【功能與主治】鼻癰瘡。

【處方】蛤粉一兩(煅) 青黛三錢 石膏一兩(煅) 輕粉 黃柏各五錢(生末)

【制法】共研細末。

【劑量及用法】先用香油調成塊，次加涼水調稀，薄塗瘡處。

冰蛤散

吉林、哈爾濱

【功能與主治】燥濕解毒。主濕熱流串，皮膚糜爛，並主鼻生粟米瘡，兒童鼻瘡，黃水瘡，疥瘡，腳氣等症。

【處方】龍骨一兩 蛤粉一兩 梅片五分

【制法】將龍骨、蛤粉先研為細面，然后再入梅片研均。

【劑量及用法】干敷或用香油調敷于患處。

【禁忌】忌食辛辣、酒等物。

五倍子散(文蛤散)

吉林

【功能與主治】除濕解毒祛火。主風火濕毒，疔疽脫肛等症。

【處方】文蛤 石膏各六錢七分 黃柏二錢四分

【制法】共研極細面。

【劑量及用法】將此藥敷于患處。

甘石散

一、沈陽

【功能與主治】除濕熱，止痛痒，明目去翳，除風止痛，清熱消腫。

【處方】煅甘石一錢 冰片一分 黃連二分五厘

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】乳汁和勻上患處。

二、吉林、哈爾濱

【功能與主治】化毒去濕，生肌止痒，杀菌去腐。主皮膚濕瘡，腳氣等症。

【處方】爐甘石一兩 輕粉二錢 冰片四分

【制法】共為細面，絹羅篩二、三次。

【劑量及用法】患者可將本品施撒患處，用消毒藥布包裹之。

【禁忌】勿入口。

一掃光散

一、沈陽

【功能與主治】收斂瘡毒。主一切濕瘡浸淫，黃水瘡，梅毒破爛。

【處方】松香 銅綠 枯礬 章丹各二錢 梅片二錢 鉛粉三錢

【制法】共研極細面。

【劑量及用法】塗于患處。

二、撫順

【功能與主治】止痛止癢，消炎。主黃水瘡，濕熱成毒，皮膚腐綻，黃水浸潤，蔓延無已，頭面耳輪，傳染周遍，禿瘡。

【處方】黃丹 官粉 松香 枯礬各等分

【制法】共為細面。

【劑量及用法】撒敷患處，干則用香油調敷之。

【禁忌】辛辣、發物。

黃金散

呼和浩特

【處方】黃柏三兩 輕粉五錢 石膏二兩 蛤粉二兩 枯礬五錢

【制法】共為細面，兌冰片二分。

龜版散

北京

【功能與主治】燥濕消炎止痛。主黃水瘡浸淫潰爛，作痛作癢。

【處方】龜版二十兩（制） 黃連一兩 紅粉五錢 冰片一錢

【制法】共為細粉。

【劑量及用法】用溫開水調敷患處。

二味拔毒散

一、西安

【功能與主治】風濕瘡潰爛，諸瘡紅腫癢痛不堪，疥癩等皮膚症。

【處方】明雄 白礬各一兩

【制法】共研極細末，每瓶裝二錢。

【劑量及用法】用茶調化，以鷄鵝翎消毒后拭干患處，可消腫上癢，一日數次。

【禁忌】非內服藥。

二、蘭州

【功能與主治】消腫止痛。主瘡癤初起，皮色未變，灼熱疼痛。

【處方】雄黃 白礬各二兩

【制法】共研細面。

【劑量及用法】以鷄子清調和如漿糊狀，敷腫處，候干時，用清茶洗去前藥，再另敷之，日易一次。

【禁忌】勿食辛辣、發物。

三、沈陽

【功能與主治】消腫止痛。主濕熱諸瘡，紅腫痛癢，及疥癩刺痒等症。

【處方】雄黃 白礬各等分

【制法】共研極細面。

【劑量及用法】茶調敷患處。

四、吉林

【功能與主治】消毒殺菌，止癢除濕。主胎毒，濕瘡、黃水瘡、熱毒，皮膚痒症，潮疹等疾患。

【處方】雄黃 白礬各三錢

【制法】共研細粉末。

【劑量及用法】瘡濕者干上，瘡面干者，調香油上。每日兩次，早晚用之，必需將瘡洗淨，再另換之。

附參考古方

【來源】醫宗金鑑。

【功能與主治】此散治風濕諸瘡，紅腫痛癢，疥癩等疾甚效。

【處方】明雄黃 白礬各等分

【制法】上二味為末。

【劑量及用法】用茶清調化，鷄翎蘸打患處，痒痛自止，紅腫即消。

三妙散

沈陽

【功能與主治】防腐燥濕。主治濕熱流注，黃水瘡，一切濕毒諸瘡。

【處方】蒼朮 檳榔 黃柏各一兩

【制法】共研極細面。

【劑量及用法】按瘡之大小酌量敷擦。

四聖散

一、天津

【功能與主治】滲濕止癢，收斂生肌。主皮膚濕癢，黃水瘡，禿瘡，薄皮膚，浸淫瘡。

【處方】章丹 官粉 枯礬各二兩 制松香四兩

【制法】共研細粉，五錢重裝袋。

【劑量及用法】用花椒油調敷患處，膿水過多者干敷。

二、蘭州

【功能與主治】滲濕消毒，殺菌止癢。主黃水瘡，薄皮膚濕癢流黃水。

【處方】黃丹二兩 官粉二兩 枯礬二兩 松香二兩 明雄一兩

【制法】共研細面。

【劑量及用法】少許用香油調敷患處，每日二、三次。

三、吉林

【功能與主治】利濕解毒，止癢消腫，殺菌化腐。主風火毒瘡，黃水瘡，濕毒搔癢，皮膚諸瘡。

【處方】松香 銅綠 章丹 枯礬各等分

【制法】將上列四味藥品，研為細末，用絹羅篩之，二、三次。

【劑量及用法】將藥敷于患處，用消毒藥布包好。

【禁忌】有毒不可入口。

九聖散

一、天津

【功能與主治】消腫滲濕，解毒止痛。主各腫濕瘡、膿瘡、脚氣、黃水瘡，紅腫潰爛，流膿流水，痒癢不止。

【處方】蒼朮一兩五錢 黃柏 蘇叶各二兩 杏仁（去皮）四兩 生乳香 生沒藥各一兩二錢 薄荷二兩共為細粉兌入，輕粉 紅粉各五錢

【制法】以上研細和勻，二錢重裝袋。

【劑量及用法】用花椒油調均，敷患處。

二、濟南

【功能与主治】皮膚病，黃水瘡，癬疥等症。

【处方】黃柏 蘇叶 杏仁各二兩 青黛一兩 薄荷 蒼朮 甘草各二兩 輕粉一兩 紅粉三錢

【制法】共研細面。

【劑量及用法】香油調擦患處。

【禁忌】內服。

黃水散

蘭州

【功能与主治】消炎解毒除濕。主黃水瘡。

【处方】黃柏面 紅藥(燒炭) 銅灰 松香各一兩 梅片四分 枯礬五錢

【制法】共研細面。

【劑量及用法】用香油調和擦抹患處。

必效散

北京、承德

【功能与主治】消毒殺虫止痒。主干癬、濕癬、牛皮癬、一切頑癬刺痒難忍。

【处方】川槿皮四兩 海桐皮 大黃各二兩 百藥煎一兩四錢 巴豆霜一錢五分 斑蝥一个 雄黃 輕粉各四錢

【制法】共為細粉。

【劑量及用法】溫開水或白酒調敷。

【禁忌】切勿入口。

桃花散

一、西安

【功能与主治】白禿瘡。

【处方】松香二錢 枯礬二錢 黃丹五錢 梅片一錢

【制法】共為細面。

【劑量及用法】可作十分塗搽于患部，一天一次，香油調搽，用溫開水洗去瘡痂再搽藥。

二、呼和浩特

【处方】黃柏 松香 黃丹各四兩 枯礬二兩 輕粉五錢

【制法】共為細面。

四白天癢散

沈陽

【功能与主治】祛風火癢。主面癢，天癢癢，塗擦有效。

【处方】白芷 白附子 白殭蚕 密陀僧各等分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】清水調擦。

附參考古方

【來源】幼科証治准繩。

【功能与主治】痘瘡及落癩。

【处方】白芷 白附子 白殭蚕 鷹矢白 密陀僧各等份

【制法】共研極細末。

【劑量及用法】以水調搽面野神效。

汗斑散

一、沈陽(汗斑粉)

【功能与主治】清血化斑瘡。主汗斑面瘡，紫白癩風，面部粉刺等症。

【处方】密陀僧五錢 雄黃 硫黃 蛇床子各一兩 輕粉二錢

【制法】共為極細面，玻璃瓶收貯。

【劑量及用法】醋調搽或用黃瓜蒂蘸搽。

【禁忌】搽摩時勿入目內。

二、吉林、哈爾濱(密陀僧散)

【功能与主治】蝕化斑痕。主汗斑，紫白癩風。

【处方】密陀僧 石黃各一錢 雄黃 硫黃 蛇床子各二錢 輕粉五分

【制法】同沈陽，劑量及用法、禁忌亦同。

附參考古方

【來源】外科正宗(密陀僧散)。

【处方】硫黃 雄黃 蛇床子各二錢 石黃 密陀僧各一錢 輕粉五分

【制法】為末。

【劑量及用法】醋調搽患上。

玉容散

一、青島(玉容粉)

【处方】殭蚕五錢(生) 白附子

三錢 白丁香三錢 山柰一兩 滑石一兩 白芷五錢 防風三錢 銀硝五錢 豆粉二兩 香皂面二兩 冰片一錢五 麝香一錢

【制法】共研細面。

二、撫順(玉容粉)

【处方】豆粉二兩 白芷 白芨 白蘇 白附各一兩 花粉 甘松 山柰 防風 藁本各五錢 排草三錢 官粉一兩 檀香 零陵香各五錢。

【制法】共為細面。

三、吉林

【功能与主治】祛風止痒化斑點。主脾濕受風，血熱發斑，黑斑斑痕，癩痒硬堅等症。為清涼性之塗搽劑。

【处方】綠豆粉二錢 白附子 白芷 白蘇 白殭蚕各一兩 官粉五錢 明粉 防風 零陵香 排草香各二兩 上冰片二錢 山柰 檀香各二兩

【制法】共研為末，用絹羅篩二、三次，至極細。

四、呼和浩特(洗面玉容散)

【处方】豆粉二兩 白芷五錢 花粉三錢 滑石四錢 生白附子三錢 山柰二錢 殭蚕二錢 白丁香二錢 防風二錢 零陵香二錢

【制法】共為細面，每兩兌官粉一兩、冰片一分。

附參考古方

【來源】醫宗金鑑。

【功能与主治】薰黑肝鬚。

【处方】白牽牛 團粉 白蘇 白細辛 甘松 白鴿糞 白芨 白蓮蕊 白芷 白朮 白殭蚕 白伏苓各一兩 荊芥 獨活 羌活各五錢 白附子 鷹矢白 白扁豆各一兩 防風五錢 白丁香一兩

【制法】共研末。

【劑量及用法】每用少許放手心內，以水調濃擦搽面上。良久再以水洗面。早晚日用二次。

【禁忌】戒憂思勞傷。忌動火之物。

除濕膏

天津

【功能与主治】解毒殺菌，消腫

止痛。主濕疹、疥瘡、黃水瘡、干濕疥瘡、流膿流水、疹癢不止。

【處方】香油六斤四兩 白蜡一斤十四兩 生地 黃柏各二兩 川椒 防風 甘草 大黃各二兩 當歸二兩 烏錢子一斤四兩

【制法】以上八味藥料，用香油炸枯去渣，將白蜡兌入溶化，待濃時再兌：冰片面二兩 銅綠面三兩 輕粉面四兩 紅粉面二兩 青黛面四兩 煅蛤粉面三兩 攪勻成膏，五錢重裝盒。

【劑量及用法】塗抹患處。

白龙膏 驗方千鍾膏)

西 安

【功能與主治】皮膚瘡癤及由濕毒引起之發癢腫。

【處方】蓖麻仁十二兩 沒藥 乳香 輕粉 鉛粉各五錢 杏仁 銅綠各二錢 松香一斤四兩

【制法】各藥入石臼內搗碎千余下，以和勻融粘為度。收貯磁罐中。

【劑量及用法】視腫瘍之大小，裁青布對剪貼之。

輕 黃 膏

沈 陽

【功能與主治】殺菌，燥濕。主黃水瘡，入瘡，搔癢浸淫，皮膚濕疹等症。

【處方】輕粉 川黃連各等分

【制法】共為細面，用麻油或凡士林油混合成膏。

【劑量及用法】洗淨患處，將藥膏塗佈之。

外科黃連膏

上 海

【功能與主治】濕瘡。

【處方】黃連一兩 大黃 黃柏 黃芩各四兩 麻油一斤 黃蜡一斤

【制法】將黃連大黃黃柏黃芩浸入麻油內，浸一天後，用文火熬煎至藥枯，去滓，加入黃蜡，再用文火徐徐收成膏。

【劑量及用法】將膏勻塗紗布上，敷貼患處。

【禁忌】不可入口。

摩 風 膏

沙 市

【功能與主治】治皮起白屑，癢如虫行，肌膚枯燥，祛風濕，穢毒等症。

【處方】麻黃一兩 羌活二錢 升麻四錢 松香二錢 白芨 防風 白芷各二錢 黃蜡二兩

【制法】上藥除黃蜡外用香油一斤浸藥五日。用文武火熬枯去渣，再入黃蜡攪勻。

【劑量及用法】塗擦患處。

【禁忌】皮膚潰爛者忌用。

附參考古方

【來源】醫宗金鑑

【功能與主治】面遊風。

【處方】麻黃五錢 羌活一兩 白檀香一錢 升麻二錢 白芨一錢 防風一錢 當歸身一錢

【制法及用法】用香油五兩，將藥浸五日，文火燉黃，即撈去渣，加黃蜡五錢溶化盡，用絹過濾，攪冷塗抹瘡上。

干疥刺痒搽抹膏

呼 和 浩 特

【處方】大麻子仁 大風子仁 巴豆仁 水銀(炙)各二錢

【制法】搗成膏。

【劑量及用法】布包搽患處。

天疥膏(硫黃膏)

天 津

【功能與主治】殺菌，消毒，止癢，入疥。不論輕重或經年不愈之干濕疥瘡，均可塗擦。

【處方】硫黃粉 石灰塊各四兩

【制法】以上藥入沙鍋內(忌鐵)加水2000毫升(即四斤)共煮一小時，隨煮隨添水，並攪拌之，然後取下，用濾紙取500毫升(即一斤)得深紅色之澄明液，隨即徐徐加入花生油，隨加隨攪至呈黃色之稠厚液，不現出紅色水珠為止，並滴少許杏仁油(香料)作為矯味劑。

【劑量及用法】搽抹患處。

疥 瘡 膏

一、南 京

【功能與主治】殺虫止癢。主疥瘡、濕癬、濕疹等症。

【處方及制法】西麻黃十二兩 斑蝥五錢 江子五錢 以麻油二斤、猪油四兩、黃蜡四兩，文火化開，將藥放入，炸枯，去渣，濾清，再將寒水石十二兩 硫黃二兩 樟腦二兩 花椒九錢 雄黃二兩 明礬三兩(炒枯) 黃丹三兩共研細末，乳之極細，和入膏內攪勻，俟凝時分裝瓶盛。

【劑量及用法】每用少許，于沐浴後蘸擦患處，以摩擦均勻為度。

【禁忌】不可入口。

二、武 漢

【功能與主治】疥瘡。

【處方】麻黃一兩 川椒一兩 白芷一兩 蛇床子一兩 大楓子二兩 胡桃肉二兩 斑蝥五錢 五華硫黃一兩 輕粉三錢 信石二錢 煅枯礬一兩 明雄一兩 樟腦一兩 黃蜡一兩

【制法】先取麻黃、白芷、大楓子、斑蝥、川椒、蛇床子、核桃仁等藥，用麻油一斤炸枯去渣，加猪油一斤、黃蜡一兩，再將輕粉、信石、枯礬、雄黃、硫黃、樟腦等細粉對入攪勻，成膏三十四兩六錢，每盒五二錢。

【劑量及用法】塗擦患處，視瘡之大小酌用。

【禁忌】切勿入口，頭面部及陰部禁用。

三、撫 順(疥藥膏)

【功能與主治】殺菌消毒。專治干瘡膿疥、梅毒疥、濕疥、皮膚破爛、膿泡痛癢、流水浸潤等。

【處方】木鱉肉 楓子肉 雄黃 核桃仁各一兩 洋老 硫黃 水銀(炙)各二錢 人言一錢 川椒 床子各五錢 猪脂油七兩

【制法】共搗成膏，每付三錢重。

【劑量及用法】每付二錢，用布裹藥，烤擦患處。

【禁忌】辛辣酒類。

万灵油

禹县

【功能与主治】脚气潰爛，風火牙疼，痔瘡腫疼，蠍螫蜂刺，薄皮濕爛，干濕瘡症，蚊咬作痒，火眼紅腫，風火头疼。

【处方】冰片一錢 麝香二厘 薄荷冰一錢五分 麝仁霜一分 潮腦五錢 硼砂一錢 白蜡 香油各一兩八錢

【制法】先將油蜡化开，再加入上六味即成。

【剂量及用法】均抹患处。

【禁忌】眼內忌用。

大楓子油

杭州

【功能与主治】杀虫攻毒，去腐生新。治風濕癬瘡、疥瘡、癩瘡、楊梅毒瘡。

【处方】大楓子不拘多少

【制法】打油去尽水气为度。

【剂量及用法】搽敷患处，油紙裹之。

冰霜痱子粉

天津

【功能与主治】消炎解毒，除湿止痒。主夏令暑濕結成痱子，或痱毒癬子刺痒难忍，常擦此粉，清涼爽身。

【处方】滑石粉三十七斤八兩 炭酸鈣一斤十四兩 冰片 薄荷冰各六兩 酒精 香料各五錢（龙涎香精）

【制法】以上研細和勻，二兩重裝盒。

【剂量及用法】用溫水洗淨，將此粉擦于患处。

【禁忌】切勿內服。

脚气粉

一、蘭州(脚气散)

【功能与主治】滲濕止痒。主脚縫發痒，腫脹流黃水，甚至化膿潰爛，不能行路，可用此藥外敷。

【处方】煅甘石一兩 煅龙骨五錢 輕粉五錢 枯矾五錢 煅石決

明五錢 冰片二錢

【制法】共研細面。

【剂量及用法】用溫水洗脚后，敷此藥粉。

二、济南(1)(脚气藥粉)

【功能与主治】兩脚局部作痒，腫痛潰爛流水。

【处方】煅石膏 枯矾各七錢 黃柏一錢五分 輕粉二錢 冰片一錢五分 黃丹一錢四分 元麝五厘

【制法】共為細粉。

【剂量及用法】干敷患处。

三、济南(2)(脚气散)

【功能与主治】脚气出粘水等症。

【处方】枯矾 白芷各一兩 甘石粉一錢 龙骨 冰片各一錢

【制法】共為極細粉。

【剂量及用法】干敷患处。

四、吉林(1)

【功能与主治】止痒止痛，祛濕消腫。主脚气。

【处方】石膏七錢 輕粉二錢 黃柏一錢五分 冰片一錢五分 章丹一錢四分 枯矾七分 麝香五厘

【制法】共為細面，包裝，玻璃瓶存貯。

【剂量及用法】敷于患处。

五、吉林(2)(脚气藥)

【功能与主治】除湿祛痰止痛。主治脚气。

【处方】硼砂一錢四分 煅枯矾六錢七分 香粉六錢七分 輕粉六錢七分 石膏(煅)六錢七分 明雄黃一錢四分 煅寒石二錢 梅片七分 薄荷冰二分

【制法】先將梅片、雄黃另研外，他藥共為細面，然后合一處調勻即成。除包裝保貯外，用玻璃瓶存貯。

【剂量及用法】撒于患处。

六、承德(脚气藥粉)

【功能与主治】兩脚局部作痒，腫痛潰爛流水。

【处方】石膏 枯矾各七錢 冰片一錢五分 輕粉二錢 黃丹一錢四分 黃柏一錢五分

【制法】共為細粉。

【剂量及用法】干敷患处。

黃水瘡散

一、济南、承德(黃水瘡散)

【功能与主治】主黃水瘡。

【处方】五倍子 槐子 枯矾 白芷 黃丹各二斤

【制法】共為細粉。

【剂量及用法】撒佈患处。

二、呼和浩特(1)

【处方】輕粉 蛤粉 石膏 黃柏各等分

【制法】共為細面。

三、呼和浩特(2)

【处方】山甲 輕粉 官粉 章丹各等分

【制法】共為細面。

濕氣藥

南京

【功能与主治】去濕收水。主手脚濕瘡破爛，流膿流水。

【处方】寒水石三錢 鉛粉一錢 生石膏四錢 輕粉六分 金陀僧五錢 陶丹五分 陈石灰一錢 冰片五分 紅升藥一錢

【制法】共研細末，乳至極細，冰片后加。

【剂量及用法】用黃連膏調勻，塗于患处。

【禁忌】不可入口。

擦疥藥

北京

【功能与主治】祛風除湿止痒。主疥癬搔痒。

【处方】蕪荑 蛇床子各一兩 雄黃 大楓子 胡椒 硫黃各五錢 枯矾一兩二錢 共為細粉入兌：樟腦 輕粉各二兩

【制法】上藥和勻，用核桃十六兩搗泥為丸，重一錢。

【剂量及用法】每用一丸擦患处。

【禁忌】切勿入口。

疥瘡藥

福州

【功能与主治】治疥瘡。

【处方】蛇床六兩 芥子 胡椒 三仙 樟腦 枯矾各四兩 川椒六兩 蒼朮 白芷 寒水石各二兩 硫黃二斤

【制法】共研為散。

【劑量及用法】加麻油調抹之。

癬瘡藥

一、呼和浩特(1)

【处方】川槿皮 海桐皮 百藥煎 巴豆霜 雄黃 青粉 大黃 斑蝥各等分

【制法】共為細面。

二、呼和浩特(2)

【处方】炒黑五倍子 輕粉各等分

【制法】共為細面。

神效癩頭藥

杭州

【功能與主治】治胃經風熱，頭生白癩，日久蔓延，髮焦脫落，搔痒難堪，抓破出膿成癩頭瘡症。

【处方】松香(卷汁制)五錢 大黃 川黃連各三錢 黃丹五錢 炙龜版四錢 黃芩二錢 黃柏二錢 紅棗炭四錢

【制法】共研細末。

【劑量及用法】將頭髮剃過，用米泔水、明礬、花椒煎湯薰洗，將藥用陳米油調敷患處。

禿瘡藥

撫順

【处方】藜蘆 枯矾 蚊蛤 苦參各六錢。

【制法】共為細面，香油調上。

禿瘡油藥

天津、蘭州

【功能與主治】殺菌消炎，解毒止痒。主濕瘡禿瘡，發癬脫屑，胎毒胎瘡，刺痒流水。

【处方】枯矾面 輕粉面各八兩 黃柏 黃芩 生梔子各一兩

【制法】用香油一斤，將以上三味，炸枯去渣，再用黃蜡四兩化開，和以前藥面和勻，五錢重裝盒。

【劑量及用法】將患處洗淨，塗抹此油藥。

【禁忌】切勿入口。

癬治 水

沈陽

【功能與主治】解毒殺虫，潤皮膚，去濕痒。主治一切癬症及禿瘡刺痒。

【处方】木槿皮四兩 潮腦 大楓子各三錢 水銀 硫黃 花椒 蟬退 木通 雄黃 全蠍 斑蝥各二錢 檳榔七個 皮硝五錢

【制法】用酒精三斤，浸之十日，去藥渣，入瓶貯之。

【劑量及用法】擦患處，每日五、六次即可。

【禁忌】不可入口。

癬藥 水

上海

【功能與主治】主癬瘡。

【处方】白芨 百部 檳榔 雄黃 生川烏各二兩 蜈蚣二十條 木槿皮四兩 蛇蛻 斑蝥各三錢 燒酒八斤 白礬三錢

【制法】共研粗末，盛入袋內入燒酒中，浸期一月左右。

【劑量及用法】用毛笔蘸藥水搽癬瘡上。

【禁忌】忌水洗。不可入口。

擦癬藥 水

一、天津

【功能與主治】祛風，解毒，止痒。主風癬，濕癬，金錢癬，吃髮癬，牛皮癬，蔓延不愈。

【处方】斑蝥五錢 百部二兩 川椒 紫荊皮 大楓子仁各一兩

【制法】共軋粗末，用酒精四斤，泡七天，去渣濾淨。一兩重裝瓶。

【劑量及用法】擦抹患處。

【禁忌】切勿入口。

二、蘭州

【功能與主治】殺菌消毒。主風癬，金錢癬，牛皮癬，吃髮癬，經年不愈，極易蔓延。以此藥外擦可以見效。

【处方】百部 檳榔 洋冰 山

甲 五加皮 苦楝皮 防風各一兩 紫荊皮一兩六錢 斑蝥七個

【制法】用燒酒四斤，將前藥泡百日。

【劑量及用法】外用淨毛笔蘸藥水塗癬上，一日數次。注意此藥慎勿入口。

疥藥 方

撫順

【处方】雄黃 硫黃 樟腦 水銀 川椒 床子各一兩 白礬五錢 胡桃肉一兩 木鼈五十個 人楓子一兩半 柏油十兩

【制法】共為細面。

癬瘡 方

撫順

【处方】輕粉四錢 陀僧 川軍 硫黃各二錢 石黃三錢 雄黃一錢半

【制法】共為細面。

霸王 泥

吉林

【功能與主治】去風除濕。主鵝掌風腫，手掌濕，汗過多等症。

【处方】黃蜡 熟地各二兩 檀香 天麻各五分 皂角三兩 白芷三分 麝香 防風各二分 蘇合油一兩

【制法】共為細面，兌膏藥油熬膏即成。保存于瓷瓶內。

【劑量及用法】將膏為丸，每丸二三錢重，以手頻頻玩握。

一 打 光

一、南京

【功能與主治】殺虫止痒。主疥瘡濕疹干癬。

【处方】淡吳萸 硫黃(另研乳細)各一兩 苦參四兩 雄黃(另研乳細) 花椒 升藥底(另研乳細) 蛇床子 明礬(另研乳細)各一兩 樟腦五錢 烟膠 大楓子肉 白芷各一兩

【制法】先將明礬、升藥底、雄黃、硫黃四味，另研乳細，再和余藥共研細末。

【剂量及用法】以猪油或牛油調勻，用紗布包裹，于沐浴后搽擦患处。

二、杭州(一扫光瘡藥)

【功能与主治】治疥瘡濕毒，皮膚癩癬，痒多痛少，抓破蔓延，杀虫解毒，塗擦自愈。

【处方】苦參五兩 川黃柏 烟膠各五兩 木鼈子 蛇床子 川紅椒 明矾 枯矾各一兩 硫黃一兩五錢 大楓子油 白樟腦各一兩五錢 輕粉 雄黃各一兩

【制法】研為細末，將大楓子油拌勻研和，用猪油攪勻。

【剂量及用法】將藥用稀布包裹，在開水內略浸。藥从布眼內溢出，即擦患處。

三、南昌

【功能与主治】疥瘡不論新久及身上下，但干痒少痛者用之。

【处方】苦參 黃柏 烟膠各一兩六錢 木鼈仁 蛇床子 川椒 枯矾 白矾 石硫黃 大楓子肉 樟腦 水銀 輕粉各三錢 白砒(煨)五分

【制法】共研極細末，以密篩篩過，用熟猪油一兩六錢，化開入藥攪勻作丸如桂圓大。

【剂量及用法】將藥放手掌中揉化，搽患處。

【禁忌】不可入口。虛弱人慎用，小兒及孕婦不用。

【備考】非經醫師處方，不得使用。

四、沙市

【功能与主治】去濕杀虫，清熱止痒。主疥瘡。

【处方】蒼朮 花椒 蛇床子 明雄各八兩 樟腦 白芷各四兩 大黃八兩 水銀二兩 木鼈子四兩 明矾八兩 硫黃四兩 皮硝八兩 大楓子四兩 皂莢二兩

【制法】除樟腦、水銀、硫黃外，共研細末。再入以上三味和勻。

【剂量及用法】視患處多少分用藥之輕重，用生猪油調擦。

【禁忌】忌辛辣葱蒜等品。面部勿用。

五、重慶

【功能与主治】治一切疥瘡濕

毒，風燥皮痒，久不痊癒之症。

【处方】黃柏 苦參 烟膠各一斤 木鼈子肉三兩 蛇床子 花椒 白矾 枯矾 硫黃 大楓子肉 樟腦 水銀 輕粉各二兩 白砒五錢

【制法】共研細末，紙袋包裝，每重五錢，用夏布包裹。

【剂量及用法】外搽每次一袋。

【禁忌】妊娠不搽下體。

六、西安

【功能与主治】主治皮膚干濕疥瘡，痛痒難堪。

【处方】大楓子一兩 硫黃二兩 明雄六錢 水銀 樟腦各二錢半 蛇床子 茅蒼朮各二兩 川花椒三錢

【制法】分別搗研細末和勻，磁罐裝貯。

【剂量及用法】先將藥用猪板油調和，紗布包裹，用火烘熱搽患處。如有膿泡，須用燒過的針挑破后搽之。

【禁忌】此藥需保存嚴密，謹防入口中毒。

七、撫順(諸瘡一扫光)

【处方】苦參 黃柏各八兩 硫黃 床子 白矾各二兩半 白砒二錢半 水銀一兩半 川椒一兩 大楓子 木鼈 輕粉 樟腦 枯矾各一兩半 烟膠一二兩

【制法】共為細面。

八、吉林(諸瘡一扫光)

【功能与主治】杀菌消毒，補皮生肌。主週身破潰，搔痒無度，疼痛流水，一般濕瘡疥癬，天泡瘡，黃水瘡，疥瘡，脚氣，濕瘡，熱毒。

【处方】同重慶。

【制法】共研細末，用細絹篩篩過。

【剂量及用法】每份一、二錢，用猪脂油或香油、麻油，調敷患處。

【禁忌】勿入口。忌食發物、辛辣。

九、哈爾濱

(諸瘡一扫光)

【功能与主治】止痛止痒消毒。主疥瘡，黃水瘡及一切濕瘡。

【处方】同重慶。

【制法】共碾為細面，絹篩篩過。用熟猪油二斤四兩化開，入藥攪勻

為丸，如龙眼大。

【剂量及用法】每用一丸，用紗布或夏布包裹，開水內略浸，藥从布眼內溢出，取擦患處。

【禁忌】勿入口。忌食辛辣。

附參考古方

【来源】外科正宗。

【功能与主治】此藥丸治疥瘡，不論新久，及身上下或干或濕，異殊形，但多痒少痛者並宜用之，俱各有效。

【处方】苦參 黃柏各一斤 烟膠一斤 木鼈肉 蛇床子 点紅椒 明矾 枯矾 硫黃 大楓子肉 樟冰 水銀 輕粉各二兩 白砒五錢

【制法】共為細末，熟猪油二斤四兩化開，入藥攪勻。

【剂量与用法】做面，对瘡貼之，三日一換，自效。

【禁忌】忌房事，煎、炒等件。

疥藥一扫光

一、天津

【功能与主治】杀菌消毒止痒。主干疥、濕疥、膿瘡疥、刺痒流水。

【处方】信石五分 核桃仁八錢 活水銀一錢 大楓子肉一兩

【制法】先將信石軋成細面，再將大楓子肉、核桃仁，軋成細泥，隨即將信石面，活水銀撒入碾細，成油坨形，六錢重裝盒。(軋藥及裝盒時候所用的工具，工作完了后，必須用清水洗淨消毒，切勿与其他藥品連續接用或混合。此種藥含有劇烈毒質，不能入口，配製時要注意)

【剂量及用法】每盒分六次用，每日一次，用布包裹在火上烤熱，在胸口前輕輕擦之，擦至第五日的时候隔一日，第七日再如前法擦之。俟前胸口處，起小瘡如小米粒狀則痊癒。

【禁忌】魚腥、發物，切勿入口。

二、蘭州

【功能与主治】杀菌，消毒，止痒。主疥瘡。不論干疥，濕疥，刺痒不已，經年不愈者以此藥擦之均有效。

【处方】大楓子一兩 人言五錢 核桃仁八錢 水銀一錢

【制法】共搗成泥為丸，每個一錢重。

【剂量及用法】外用每次一丸，緩擦患處及胸前，連用五、六日。

【禁忌】外用藥有劇毒不能入口。

三、濟 南

【功能与主治】疥瘡。

【处方】人楓子仁五錢 核桃肉五錢 水銀一錢

【制法】共搗細泥為丸，每付六丸。裝紙匣。

【剂量及用法】每服一丸，擦心口連用六日。

【禁忌】刺激性等物。不可入口。

四、呼和浩特

【处方】人楓子仁二兩 水銀(炙)一錢 核桃仁二兩 紅白人言各一錢

【制法】共搗成泥作丸重一錢，每盒裝六錢。

外 伤 类

三黄宝蜡丸

一、北京、承德

【功能与主治】散瘀活血止痛。主跌打損傷，閃腰岔氣，血瘀疼痛。

【处方】天竺黃 胆南星各六兩 紅芽大戟十二兩 當歸九兩(尾) 兒茶四兩 官粉一兩二錢 劉寄奴十二兩 共為細粉兌入；麝香一兩二錢 硃砂四兩 雄黃八兩 血竭十二兩 水銀一兩二錢(鉛一兩二錢炙)

【制法】上藥和勻，黃蜡六斤為丸，重一錢，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，日服二次，用黃酒燉化熱服。

【禁忌】忌生冷發物及燒酒三日。孕婦忌服。

二、天 津

【功能与主治】止痛，消腫，散瘀，活血。主跌打損傷，瘀血不消，閃腰岔氣，疼痛難忍。

【处方】天竺黃 劉寄奴各三兩 當歸尾一兩五錢 兒茶二兩 淨芒硝一兩 紅大戟(醋制)三兩 制乳香三錢 血竭三兩 藤黃(用豆付制)四兩 水銀三錢(用鉛三錢同制)共為細粉兌入，雄黃面三兩 麝香三錢 琥珀面二錢

【制法】以上研細和勻，用淨黃蜡二十四兩為丸，一錢重。蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，黃酒燉化溫服；白開水亦可。

【禁忌】孕婦忌服。

三、西 安

【功能与主治】跌打損傷，創傷及毒症，咬傷瘀血凝滯，中毒神昏致生異症，危在頃刻者。並治惡瘡。

【处方】藤黃四兩 天竺黃三兩 紅芽大戟三兩 劉寄奴三兩 孩兒茶三兩 明雄一兩 朴硝一兩 當歸尾一兩五錢 鉛粉三錢 水銀三錢 乳香三錢 麝香二錢 血琥珀二錢 血竭二兩

【制法】先將藤黃用秋荷葉露泡一宿，隔湯煮十餘次，將上浮和沉淀物除去，取用中間。以山羊血拌入晒干，再將水銀、鉛粉二味同放入鉄鍋內火上熱研成末，再將前藥分別搗研細末，秤准和研一處須研勻，用煉淨黃蜡二十四兩放磁器內，坐滾水中化開，將藥入內攪勻待冷為丸，每丸重五分蜡皮包封。

【剂量及用法】外用法，以香油隔滾水化開敷患處，內服者，成人病輕緩次服一丸，重病服二丸，熱黃酒調服，藥後飲酒復被出汗更好。一日三次，小兒按年齡酌減。

【禁忌】忌生冷及水果發物。

四、蘭 州

【功能与主治】止痛消腫，散瘀活血。主跌打損傷，瘀血不消，閃腰岔氣，疼痛難忍。

【处方】制藤黃二兩六錢七分 當歸尾八錢七分 大戟一兩三錢四分 兒茶一兩三錢四分 芒硝六錢七分 硃砂六錢七分 血琥珀一錢四分 制水銀(鉛炙) 乳香各二錢 沒藥二錢 血竭二兩 天竺黃二兩 劉寄奴二兩 雄黃一兩三錢四分 黃蜡二錢 麝香二錢

【制法】共研細面，黃蜡為丸，一錢重。

【剂量及用法】每服一丸，黃酒送下。

【禁忌】孕婦忌服。

五、濟 南

【功能与主治】跌打損傷，閃腰

岔氣，血瘀疼痛。

【处方】天竺黃六兩 胆南星六兩 紅芽大戟十二兩 當歸尾九兩 兒茶四兩 官粉一兩二錢 劉寄奴十二兩 麝香一兩二錢 硃砂四兩 雄黃八兩 血竭十二兩 水銀一兩二錢 鉛一兩二錢(制)

【制法】黃蜡六斤，將藥和勻為丸，重一錢。蜡封固。

【剂量及用法】每服一丸，日服二次，黃酒燉化，熱服。

【禁忌】甘草、生冷、發物及燒酒三日。孕婦忌服。

六、沈 陽(1)

【功能与主治】散瘀消腫，舒筋活血。主跌打損傷，惡瘡，破傷風，力成勞傷，閃腰岔氣，瘋狗、毒蛇咬傷。如人產後惡露不盡，瘀血沖心，痰迷心竅皆能治之。

【处方】藤黃四兩(此藥有毒，用湯熬十數沸潔淨，浮紅沫，金鑑以秋夜露水泡之，煮十餘次潔淨浮沉渣物取淨者) 天竺黃 大戟 劉寄奴各三兩 血竭 兒茶 明雄黃各二兩 朴硝一兩 琥珀二錢 當歸一兩五錢 鉛粉 水銀 乳香 台麝各三錢

【制法】各研極細面，秤准和一處，將水銀鉛粉入鉄鍋內，火上炒熱研成細末，入前藥共研勻，淨黃蜡二十四兩放磁器內坐滾水中化開，將藥入內攪拌勻，每丸一錢重，蜡皮封固。

【剂量及用法】重者每服一丸，輕者服半丸，小兒三分之一，均用溫黃酒送下。服後蓋被睡一小時，出汗立癒。

七、沈 陽(2)

【功能与主治】散瘀消腫，舒筋活血。主跌打損傷，紅傷惡瘡，勞傷瘀血，閃腰岔氣，毒蛇咬傷。

【处方】炙藤黃三兩 天竺黃三兩 雄黃二兩 劉寄奴四兩 大戟二兩 血竭三兩 歸尾一兩五錢 硃砂一兩 琥珀五錢 兒茶二兩 乳香二錢 麝香二錢 明粉一兩

【制法】除麝香、琥珀、硃砂、雄黃、血竭另研外，其餘羣藥共研細面，再加黃蜡一斤五兩化開合前藥面攪勻煉蜜五兩為丸，大丸一錢四分重，小丸七分重。

【剂量及用法】每服一丸，將藥放入碗內，用黃酒半兩，以水燉之。

【備考】炙藤黃制法：此藥有毒，用湯燉十數沸，去淨浮紅沫。

八、撫順

【功能与主治】活血，散瘀，驅毒。主外傷，創傷，鎗傷，刀傷等以及骨損筋傷，血瘀腫痛；狂犬、毒蛇、虫咬傷發為瘰癧，昏迷等症。

【处方】麝香一錢 雄黃一兩 血竭花兩半 朴硝八錢 琥珀二錢 寄奴兩半 乳香兩半 當歸尾八錢 藤黃二兩 大竹黃兩半 兒茶一兩 大戟兩半 炙水銀錢半 硃砂五錢 沒藥兩半

【制法】共為細面，黃蜡十二兩為丸，一錢四分重或七分重。蜡皮封。

【剂量及用法】每服一丸，黃酒送下，倘受傷過重，隔六小時再服一丸。外敷用香油化開，敷于患處。

【禁忌】孕婦忌服。忌生冷、油膩、發物、白酒等物。

九、吉林

【功能与主治】去瘀活血，生新止痛。主治：

(一) 跌打損傷，金瘡，箭傷，鎗傷，傷力癆等，一切瘀血凝聚疼痛或傷損筋骨；

(二) 破傷受風，發為瘰癧，昏迷不省；

(三) 狂犬咬傷，發生癲狂，或蛇虫咬傷，毒勢蔓延；

(四) 惡瘡，瘀血凝結，久不潰散；

(五) 婦人產後惡露不尽，兒枕痛，惡血攻心，致發昏迷；

(六) 頑痰膠固，昏厥不省。

【处方】藤黃二兩八錢（露水或雨水化開，滴入山羊血攪勻） 天竺黃二兩一錢（如無真者，以九轉南星代之） 紅芽大戟二兩一錢（去骨） 雄黃二兩一錢 劉寄奴二兩一錢 血竭花二兩一錢 孩兒茶二兩一錢 芒硝七錢 鉛粉二錢一分 當歸尾一兩零五分 水銀二錢一分 乳香（去油）二錢一分 麝香二錢一分 琥珀二錢一分 黃蜡十六兩八錢

【制法】研為極細粉末和勻，將水銀同鉛粉在鐵鍋內火上熱研成末，以不見星為止。入前藥內共研

勻，再將淨黃蜡放入瓷器或銅器內，燉滾水中化烱，將藥入內，不住手攪均，待半冷捏作七分重丸。大赤金衣。棉紙包，蜡皮封，用瓷罈貯。

【剂量及用法】每服一丸，熱黃酒化服，立見轉機。倘受傷至重，則連服數次。如鳥槍彈傷，鉛彈在內，危在旦夕，急服此丸飲黃酒數杯，睡時汗出即愈。

如外敷，用香油化開，俟少冷雞翎掃上。敷藥后，飲黃酒出汗最妙。

【禁忌】忌食生冷、油膩、生果、發物、燒酒、涼水三日。孕婦忌服。

十、呼和浩特

【处方】劉寄奴 血竭 大戟各二兩 藤黃四兩（豆腐炙） 歸尾一兩二錢 淨朴硝一兩二錢 兒茶二兩 竺黃二兩 乳香三錢 杭官粉三錢 雄黃三兩 麝香一錢 水銀三錢 琥珀二錢 冰片二錢 硃砂一兩

【制法】共細面，黃蜡二十兩，熔化為丸，重壹錢。蜡皮封固。

附參考古方

【來源】醫宗金鑑

【功能与主治】專治一切跌打損傷，及破傷風，並傷力成癆，女人產後惡露不尽，致生怪証，瘀血奔心，痰迷心竅，危在旦夕。

【处方】天竺黃三兩 雄黃二兩 劉寄奴 紅芽大戟（去骨） 麒麟竭各一兩 歸尾一兩五錢 淨乳香三錢（去油） 硃砂 兒茶各一兩 琥珀 輕粉 水銀（同輕粉研不見星） 麝香各一錢

【制法】以上各稱足分量，各研為細末，如無真天竺黃以真胆星二兩代之。再用好黃蜡二十四兩煉淨，滾湯坐定，將藥投入，不住手攪勻，取出裝磁罐內备用。

【剂量及用法】重者一錢，輕者三分，用無灰酒送下，立刻全生。如被鳥槍打傷，鉛子在內，危在頃刻，服一錢吃酒數杯睡一時汗出即愈，如外敷將香油熱化少許，雞翎掃患處。

【禁忌】服藥后忌涼水、生冷、燒酒三日，如不忌此酒則藥無功。

跌打丸

一、北京

【功能与主治】活血散瘀止痛。

主跌打損傷，皮膚青腫作痛。

【处方】當歸 川芎 土鱉虫 血竭各一兩 沒藥 乳香 自然銅（煅） 馬錢子（炒） 麻黃各二兩 共為細粉兌入，麝香四錢

【制法】上藥和勻，煉蜜為丸，重一錢五分，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，黃酒送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、南京（跌打損傷丸）

【功能与主治】舒筋活血，散瘀止痛。主跌打損傷及近年勞傷之筋骨疼痛。

【处方】西大黃八兩 青皮二兩 劉寄奴四兩 蘇木二兩 桃仁四兩（去皮尖） 炒枳實二兩 五加皮四兩 川芎二兩 土鱉虫四兩（酒浸） 降香二兩 山楂肉四兩 京三稜二兩 懷紅花三兩 凌霄花二兩 西當歸三兩 赤芍二兩 延胡索三兩 威靈仙二兩 川牛膝三兩 花檳榔二兩 牡丹皮三兩 制乳香一兩 制香附三兩 制沒藥一兩 蓬莪朮二兩 自然銅一兩（煅） 土血竭一兩

【制法】共研細末。加煉白蜜為丸，每錢約做二十粒。

【剂量及用法】每服二至三錢，用開水或黃酒溫服。

【禁忌】孕婦及小兒痘疹忌服。

三、武漢

【功能与主治】跌打損傷，腫脹青紫，疼痛不止。

【处方】赤芍二兩 蘇木一兩 枳殼（數炒）一兩 紅花一兩 三七二兩 錦紋大黃三兩 乳香（去油）一兩 牛地二兩 澤瀉一兩 土鱉一兩 澤蘭一兩半 當歸二兩（酒洗） 桃仁（去皮尖）一兩 血竭一兩 沒藥（去油）一兩半

【制法】取上藥干燥，混合碾細，按淨粉量加煉蜜110~120%，和成大丸，每丸重四錢，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服四錢，用溫開水或溫酒送下。

四、天津、蘭州、承德

【功能与主治】散瘀活血，消腫止痛。主跌打損傷，閃腰岔氣，傷筋動骨，跌木打傷，青紫紅腫，疼痛不

止。

【处方】制乳香六錢 土鱉虫 防風 當歸尾 丹皮 木通各四錢 漢三七八錢 甜瓜子 骨碎補各四錢 生白芍 甘草各六錢 枳實(麩炒)四錢 蘇木六錢 桃仁(去皮)四錢 色姜黃三錢 制沒藥 血竭各六錢 乳香奴四錢 續斷四兩 赤芍八錢 桔梗四錢 紅花 三稜(醋制)各六錢 煅自然銅(醋制)四錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸一錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，黃酒送下，白開水亦可。

【禁忌】孕婦忌服。

五、大 同

【功能與主治】跌打損傷，能消腫止痛，活血散瘀。

【处方】乳香六錢 沒藥六錢 蘇木六錢 三稜六錢 紅花六錢 自然銅四錢 甘草六錢 血竭六錢 杭芍六錢 桃仁六錢 防風四錢 申姜四錢 桔梗四錢 寄奴四錢 枳實四錢 丹皮四錢 歸尾四錢 甜瓜子四錢 木通四錢 續斷四錢 鱉子四錢 漢三七八錢 赤芍八錢 姜黃三錢五分

【制法】共為細面，煉蜜為一錢丸，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服二丸，早晚二次，黃酒送下。

六、濟南(軍中跌打丸)

【功能與主治】跌打損傷，筋斷骨折，瘀血攻心等症。

【处方】當歸一兩 土鱉虫一兩 川芎一兩 血竭一兩 沒藥一兩 麻黃 自然銅 乳香各二兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，每重一錢。

【劑量及用法】每服二丸，溫開水送下。

【禁忌】生冷、油膩、辛辣等食物。

乳香定痛丸

沈 陽

【功能與主治】活血止痛。主治金刃創傷，打撲損傷，折骨傷筋，癰腫疼痛。

【处方】乳香二錢 沒藥二錢 敗龜板一斤 紫荊皮二兩 當歸 制虎骨 骨碎補 川山甲各五錢 牛兩錢五分(如無，以自然銅一兩，醋淬七次代之)

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸七分重。

【劑量及用法】每服一丸，黃酒調服。

大力丸、英雄大力丸)

吉林、哈爾濱

【功能與主治】活血散瘀，消腫止痛，舒筋接骨。主跌打損傷，骨折筋聚，血瘀，因外傷，瘀腫痛甚，此藥均能治之。

【处方】馬錢子八兩(香油炙) 當歸三兩 蕤薹三兩 廣皮三兩 沒藥一兩 黨參三兩 川芎一兩 杜仲一兩 云苓二兩 桂枝二兩 牛膝二兩 續斷二兩 無名異二兩 然銅一兩 乳香二兩 貢丸二兩 珠砂一兩

【制法】共為極細面，煉蜜為丸，二錢一分重。

【劑量及用法】大人每服一丸，早晚服之，白開水或黃酒送下。

【禁忌】孕婦忌用，忌房事。

正骨紫金丸

(正骨紫金丹)

武 漢

【功能與主治】跌打仆墜，閃挫損傷，瘀血凝聚，內外疼痛。

【处方】丁香 木香 血竭 兒茶 紅花 熟大黃各一兩 當歸頭 蓮肉 白茯苓 白芍各二兩 丹皮五錢 甘草三錢

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細。照淨粉量加煉蜜110~120%和成大丸。每丸重為一錢。

【劑量及用法】每服一錢，早晚各一次，以溫酒吞服。

【禁忌】孕婦忌服。或遵丕囑。

黑 砂 丸

天 津

【功能與主治】舒筋活血，止痛消腫。主跌打損傷，筋骨疼痛，血瘀腫脹不消。

【处方】炒蒼朮四兩 木瓜 老鸛草各二兩 懷牛膝 當歸 石斛 秦艽 菖蒲 釣藤 制山甲 胆草 地龍 防己各一兩 杜仲炭(鹽炒) 甘草 防風 荊芥 肉桂(去粗皮) 細辛 制川烏 制草烏 羌活 天麻 靈仙 全蠍 制首烏 川芎各五錢 麻黃三錢 馬錢子(沙燙去毛)二錢 共為細粉兌入，雄黃面三錢

【制法】以上研細和勻，煉蜜為丸，一錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，每日一、二次，小兒酌減，白開水送下。

【禁忌】忌魚類。孕婦忌服。

嶸 峒 丸

一、天 津

【功能與主治】逐瘀生新，活血止痛。主跌打損傷，續筋接骨，墜車落馬，閃腰岔氣，紅腫堅硬，瘀血作痛。

【处方】漢三七 大黃 阿魏 兒茶 天竺黃 血竭 制乳香 制沒藥 藤黃(用豆付制)各二兩 共為細粉兌入，雄黃面一兩 冰片 麝香 牛黃各二錢五分

【制法】以上研細和勻，煉蜜為丸，一錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，黃酒送下，白開水亦可。

【禁忌】孕婦忌服。

二、上 海

【功能與主治】跌打損傷腫痛。

【处方】牛黃二錢五分 藤黃(鮮山羊血制) 天竺黃各二兩 麝香二錢五分 腰黃一兩 冰片二錢五分 阿魏一兩 血竭 參三七 乳香(制) 大黃 沒藥(制) 方兒茶各二兩

【制法】各取淨粉和勻，煉白蜜和黃蜡六錢，同化打丸，每粒潮重六分，蜡壳固封。

【劑量及用法】每服半丸至一丸，開水或溫酒化服。遵照醫師指示服用。

【禁忌】孕婦忌服。

三、南 京

【功能與主治】散瘀，活血。主跌打損傷，瘀血凝滯，癰毒腫痛。

【处方】藤黃二兩(隔水煮十余

次，去浮去沉，取其中者，以山羊血拌入晒干。山羊血五錢（如無山羊血以小子羊鮮血代之）制乳香二兩 生大黃二兩 制沒藥二兩 明雄黃一兩 上血竭二兩 阿魏一兩 廣三七二兩 麝香二錢五分 天竺黃一兩 冰片二錢五分 孩兒茶二兩 西牛黃二錢五分

【制法】除藤黃、山羊血外，共研細末，另將藤黃如法制后，用水化开，拌和其余各藥之末，加黃蜡六錢，熬化酌加煉白蜜乘熱為丸，每粒計重五分，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，用溫酒和服。外症亦可用黃酒磨塗患處。

四、廣州

【功能與主治】跌打損傷，腫毒瘡疽。

【處方】牛黃二錢半 麝香二錢半 冰片二錢半 阿魏一兩 大黃二兩 兒茶二兩 天竺黃一兩 三七二兩 沒藥二兩 藤黃二兩 山羊血五錢

【制法】先將上列藥洗淨，切碎隔水蒸透，晒干研成藥粉，和入麝香、牛黃、冰片、山羊血，拌蜜糖，制成大丸，每丸重五分，用蜡壳封固。

【劑量及用法】依法外用或內服。

五、福州

【功能與主治】此丸去瘀生新，續筋接骨，疎風活絡，宣氣行血，消腫解毒。故治一切損傷。

【處方】人參二錢 麝香一分 阿魏一錢 兒茶二錢 大黃一錢 冰片二分 乳香二錢 沒藥一錢 血竭三錢 三七二錢 硃砂四錢 然銅二錢 竺黃二錢 雄黃一錢 山羊血五分

【制法】共研細末，冬蜜為丸，金衣。每粒重一錢。蜡封。

六、杭州（神效燦峒丸）

【功能與主治】治癰疽發背，惡瘡癰癤，跌打損傷，瘀血內攻，昏暈不省以及蛇蠍蜂毒，一切無名腫毒等症，無不立效。

【處方】西牛黃 梅冰片 麝香各二錢五分 真阿魏 明腰黃各一兩 大黃 粉兒茶 天竺黃 參三

七 上血竭 乳香（去油）沒藥（去油）各二錢 山羊血五錢 藤黃（隔湯煮十餘次，去紅色浮沫，沉底雜物。用淨者）二兩

【制法】以上各取淨粉，將藤黃烱化，加煉白蜜為丸，每重六分，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，重則二丸。溫酒化服，蓋被取汗，外症用濃茶抹敷患處。

【禁忌】忌一切生冷、發物。

七、西安

【功能與主治】主治金瘡跌打損傷，發背癰疽，癰癤諸惡瘡及毒虫咬傷諸症，消瘀止痛止血。

【處方】三七 阿魏 血竭 乳香 沒藥 天竺黃 孩兒茶 生大黃 上八味各二兩 明雄一兩 山羊血五錢 梅片 麝香 牛黃各二錢半 藤黃二兩

【制法】先將藤黃用秋荷葉露泡之，隔湯煮過十餘次，去浮沉物取中間，再將山羊血拌入晒干，另取秋露水化开藤黃，另將各藥分別搗研細末，羅過均拌入藥搗干，余下晒干（勿用火烘）研勻加煉蜜為丸，一錢重，用蜡包封。

【劑量及用法】成人每服一丸，一日二次，飯前用黃酒服，外敷亦用黃酒磨塗患處，小兒按年齡遞減。甜酒化服。

【禁忌】忌醋及辛熱、動火之物。

八、蘭州

【功能與主治】活血散瘀，止痛解毒。主癰疽瘡瘍，疔毒癰疥，跌打損傷，傷筋傷骨，瘀血疼痛，紅腫堅硬。

【處方】麝香四錢 血竭花二兩 漢三七一兩 琥珀二錢 乳香二兩（去油）藤黃二兩（用豆腐制）明雄一兩 沒藥二兩（去油）天竺黃二兩 川軍二兩 阿魏一兩 兒茶二兩 冰片三錢

【制法】共為細面，蜜丸一錢重，蜡皮封固。

【劑量及用法】內服一丸，白開水送下；外敷無定量。

【禁忌】孕婦忌服。

九、濟南

【功能與主治】跌打損傷，金瘡

出血，癰毒腫痛。

【處方】藤黃一斤四兩（豆腐炙）雄黃十兩 大黃一斤四兩 乳香一斤四兩 沒藥一斤四兩 兒茶一斤四兩 竺黃一斤四兩 三七一斤四兩 血竭一斤四兩 山羊血五兩 阿魏一斤四兩

【制法】共軋細面，每二斤七兩加牛黃五錢、麝香五錢、冰片五錢，煉蜜為丸，重七分，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，黃酒送下。

【禁忌】一切生冷，辛辣等物。孕婦忌服。

十、沈陽

【功能與主治】活血舒筋止痛。主跌打損傷，瘀血停滯，昏暈不醒及刀傷、槍傷，墜車落馬，努傷吐血，閃腰岔氣，瘋狗毒虫咬傷，一切無名腫毒，濕痰流注。

【處方】漢三七 熟大黃 真阿魏 孩兒茶 天竺黃 血竭 滴乳香 明沒藥各二兩 山羊血五錢 明雄黃一兩 梅片 麝香 牛黃各二錢五分

【制法】除血竭、明雄黃、梅片、麝香、牛黃另研外，余則共軋極細面，再用秋露水化藤黃拌藥，加蜜杵為丸七分重，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，用溫黃酒送下，又可外敷疔毒，濃茶塗上，可消腫止痛。

【禁忌】辛辣、烟酒。

十一、撫順

【功能與主治】活血、去瘀、鎮痛。主外傷、創傷，一切跌打打撞等傷或損傷筋骨或損內臟，因而吐血，疼痛異常，或癰疽及毒瘡惡瘡，無名腫毒，癰癤；狂犬、蜂、蛇、蠍等毒虫咬傷；產後惡露不盡，敗血攻冲疼痛或淋血尿血；小兒急驚風等症。

【處方】牛黃一錢 冰片二錢 雄黃一兩 漢三七二兩 大黃 兒茶 乳香 沒藥 血竭花 制藤黃 天竺黃各二兩 麝香一錢

【制法】共為細面，蜜丸一錢四分或七分重。蜡皮封。

【劑量及用法】每服一丸，黃酒溫服。出汗為度。

【禁忌】孕婦忌服。忌食生冷、油膩、發物。

十二、撫順

(神效巉峒丸)

【处方】牛黃一錢 冰片二錢
阿魏一兩 雄黃一兩 三七二兩
大黃二兩 兒茶二兩 乳香二兩
沒藥二兩 血竭二兩 台麝一錢
炙藤黃二兩 竺黃二兩 玄羊血五錢。

【制法】共為細面蜜丸，二錢或一錢五。蜡皮封。

十三、吉林

【功能與主治】降下，去瘀，活血。主治：

(一) 金瘡，跌打損傷，傷損筋骨內臟，吐血疼痛；

(二) 瘋犬、毒蛇、蜂、蠍咬叮成傷，毒質蔓延，疼痛異常，惡血奔心；

(三) 勞傷瘀血，積蓄成癆，咳吐紫血；

(四) 產後瘀血不下，惡露不尽，兒枕骨痛，或經血不行，或膀胱毒熱，發為血淋，溺血澀痛，尿道腫塞；

(五) 急驚風症，氣壅血結。

【处方】東牛黃一錢七分五厘 梅花片一錢七分五厘 台麝香一錢七分五厘 阿魏七錢 雄黃七錢 野紋軍一兩四錢 孩兒茶一兩四錢 天竺黃一兩四錢 漢三七一兩四錢 血竭花一兩四錢 滴乳香一兩四錢(去油) 明沒藥一兩四錢(去油) 藤黃一兩四錢(以秋荷葉露泡之，水煮十餘次，去浮沉取中，將山羊血三錢五分或小子羊鮮心血代之，拌入晒干) 玄羊血三錢五分。

【制法】將東牛黃、麝香、梅花片等均各另研細面，余藥均碾細，陸續研勻。再取秋露水將藤黃化開，拌藥搗丸，白蜜二兩、黃蜡六錢同煎化攪勻，乘熱為丸。每丸重一錢四分，大赤金為衣，陰干(忌火烘)。如在夏天修合，取天落水(雨水)化開藤黃亦可。用棉紙包裹，蜡皮封固。

【劑量及用法】黃酒炖化，盡量飲醉，蓋被取汗。外症用茶滴，或黃酒磨塗。

【禁忌】忌生冷、油膩、發物。孕婦忌服。

十四、呼和浩特

(神效巉峒丸)

【处方】漢三七三兩 阿魏一兩五 乳香 沒藥 天竺黃各三兩 山羊血七錢五 兒茶 藤黃(豆腐炙) 血竭各三兩 牛黃 麝香 冰片

【制法】共為細面，老蜜為丸，重八分。蜡皮封固。

附參考古方

【來源】外科証治全生集。

【功能與主治】跌打損傷，腫毒危重之症，內服外敷皆效。

【处方】牛黃 冰片各二錢 阿魏 雄黃各一兩 生軍 乳香 沒藥 兒茶 天竺黃 血竭 參三七各二兩

【制法】各研細末，以羊血五錢，拌晒干透，再磨為末，加藤黃二兩，隔水煮熟，去淨浮膩，入木為丸如芡實大。

【劑量及用法】臨用以一丸，陳酒送服。

註：馬口，不及西洋十寶丹。

九 分 散

一、天 津

【功能與主治】活血，化瘀止痛。主跌打損傷，墜車落馬，傷筋動骨，紅腫疼痛。

【处方】制沒藥 麻黃 制乳香 馬錢子(沙燙去毛)各一兩

【制法】共為細粉，九分重裝袋。

【劑量及用法】內服每次一袋，黃酒送下。外敷打破見血者擦，腫痛者用黃酒調敷。

【禁忌】孕婦忌服。

二、南 京

【功能與主治】跌打損傷。

【处方】制乳香一兩 制沒藥一兩 麻黃一兩 番木鱉子一兩(用麻油炸后刮去毛) 煅自然銅一錢 土鱉虫一錢

【制法】共研細末。

【劑量及用法】傷處未破者，用酒調敷；已破者擦。如須內服，應經醫生處方證明，指定用量。

三、沈 陽

【功能與主治】舒筋活血，消腫

止痛。主跌打損傷，墜車落馬，傷筋動骨，疼痛不止。

【处方】馬錢子(用甘草水煮熟剝去皮毛晒干，用香油炸黃色撈出，用上炒成醬色為度，生者毒人，必須照制) 麻黃 乳香 沒藥各四兩

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服九分，藥力甚大，不可多服，溫黃酒調下。外傷破者干上，若未破僅腫痛者，用燒酒調塗。

【禁忌】孕婦忌服。

四、吉 林

【功能與主治】行血鎮痛，散瘀活絡。主跌打損傷，閃挫傷筋，疼痛難忍。

【处方】乳香一錢(去油) 沒藥一錢(去油) 麻黃一錢 炙馬錢子一錢(油制)

【制法】共研極細末，絹羅篩過。

【劑量及用法】每服六分三厘，早晚各一次，以百沸黃酒為引。

【禁忌】忌食辛辣，孕婦禁忌。

五、呼和浩特

【处方】麻黃 馬錢子 乳香 沒藥各等分。

【制法】共細面。

七 釐 散

一、北京、承德

【功能與主治】活血止痛。主跌打損傷，血瘀作痛。

【处方】血竭一兩 乳香 沒藥 紅花各一錢 兒茶二錢 共為細粉兌入：麝香 冰片各一分二厘 硃砂一錢二分

【制法】上藥和勻。

【劑量及用法】每服二分至五分，日服二次，溫黃酒送下。外用白酒調敷患處。

【禁忌】孕婦但可外敷，不可內服。

二、天 津

【功能與主治】散瘀，活血，消腫，止痛。主跌打損傷，黑紫紅腫，血瘀作痛，閃腰岔氣，傷筋動骨，皮破流血。

【处方】制乳香十五兩 當歸尾

二兩 制沒藥十五兩 血竭十二斤八兩 兒茶一斤八兩 紅花十五兩 共為細粉兌入；硃砂面十五兩 麝香 冰片各一兩二錢

【制法】以上研細和勻，五分重裝瓶。

【劑量及用法】每次服一瓶，黃酒送下，白開水亦可。外敷傷口酌用。

【禁忌】孕婦忌服。

三、上海

【功能與主治】跌打損傷，瘀血凝滯。

【處方】麝香二錢 硃砂一兩二錢 乳香(制)一兩五錢 冰片三錢 紅花一兩五錢 方兒茶二兩四錢 沒藥(制)一兩五錢 血竭十兩

【制法】各取淨粉，共研極細粉。

【劑量及用法】每次二分至五分，溫酒或開水送服。兼可外敷傷處。

【禁忌】孕婦忌服，但可外用塗敷。

四、南京

【功能與主治】主跌打損傷，瘀血停滯，遍身或傷處疼痛。

【處方】制沒藥一錢五分 血竭一兩 制乳香一錢五分 紅花一錢五分 飛硃砂一錢二分 麝香一分二厘 方兒茶二錢四分 冰片一分二厘

【制法】上藥八味，分別研末乳細。麝香、冰片后加和勻。密貯。

【劑量及用法】內服：成人每服五分至一錢；兒童酌減。用溫酒調服。

外敷：視傷處大小，未破者，以酒敷；已破者干搽。

【禁忌】孕婦忌服。

五、武漢

【功能與主治】跌打損傷，血瘀作痛，筋傷骨折等症。

【處方】麝香(去淨皮毛)一分二厘 冰片一錢二分 血竭一兩 紅花一錢半 淨乳香一錢半 沒藥一錢半 飛硃砂一錢二分 兒茶二錢四分

【制法】取上藥混合碾細，成淨粉90—95%即得。

【劑量及用法】成人每服五分至一錢，小兒酌減，陳酒送下。服后復搽七厘散于傷口外。

【禁忌】孕婦忌服。

六、福州

【功能與主治】治跌打墜壓等一切損傷，閃腰岔氣，筋骨疼痛，瘀血凝結等症。

【處方】麝香 冰片各一分二厘 血竭一兩 紅花 兒茶各一錢五分 乳香 沒藥各一錢七分 辰砂一錢二分

【制法】共為末。

【劑量及用法】每服七厘，陳酒送下。如血出不止，即以此散搽之，紮固，自能上血定痛。

七、杭州(傷科七厘散)

【功能與主治】治跌打損傷，高墜落馬，骨斷筋折，血流不止。或受傷日久，瘀血留聚，胸腹脹疼，遍身腫痛等症。此散舒筋活血，化瘀止痛，效驗非常。

【處方】同南京。量為南京的十倍。

【制法】共研細末為度。

【劑量及用法】每服一錢，重則酌加。用黃酒或燒酒吞服，然后再服湯藥。

【禁忌】孕婦忌服。

八、南昌

【功能與主治】跌打損傷，瘀血作痛。

【處方】制乳香一錢五分 制沒藥一錢五分 紅花一錢五分 血竭一錢 三七一兩 飛硃砂一錢二分 冰片一錢二分 麝香一分二厘

【制法】共研細末，瓷瓶收貯封固。

【劑量及用法】每服五分至一錢(成人量)，溫甜酒送下。

【禁忌】孕婦忌服。

九、沙市

【功能與主治】治跌打損傷，瘀血停滯，遍身疼痛。

【處方】血竭一兩 乳沒三錢 硃砂 紅花 田三七各一錢五分 麝香一分五厘 兒茶一錢五分 正梅片一分五厘

【制法】共研細末，磁瓶密貯。

【劑量及用法】成人量每次服七厘或一分，溫酒送下。不可多服。

【禁忌】無瘀及孕婦忌服。

十、重慶

【功能與主治】治跌打損傷，瘀血停滯，遍身疼痛。止刀傷、跌扑出血。

【處方】同南京。

【制法】除麝香、冰片另研細末，硃砂另稱。余藥共研細末，磁瓶封固。

【劑量及用法】內服七厘至一分。外搽不拘。

【禁忌】妊娠忌內服。

十一、昆明

【功能與主治】止痛止血，散瘀生新。主治跌打損傷及一切創傷。

【處方】血竭一錢 高麗參三錢 紅花一錢二分 三七三錢 硃砂一錢二分 沒藥一錢二分 乳香一錢五分 麝香五分 土龜七個 冰片五分

【制法】研極細末。

【劑量及用法】內服七厘。外塗以傷口大小決定。

【備考】內服不可過量。

十二、西安

【處方】同福州。

【制法】共研極細末。

【劑量及用法】成人每次服一錢，一日二次。早晚飯前熱水吞服。小兒按年齡酌減，用水沖服。

【禁忌】孕婦及虛弱者勿服。

十三、蘭州

【功能與主治】散瘀活血，消腫止痛。主跌打損傷，筋骨折斷，血流不止，疼痛難忍。

【處方】乳香十五兩 歸尾二兩 沒藥十五兩 血竭十二斤八兩 兒茶一斤半 紅花十六兩 冰片一兩二錢 麝香一兩二錢 硃砂十五兩

【制法】軋細面。

【劑量及用法】每次五分，白開水送下。外敷傷口酌量用。

【禁忌】孕婦忌服。

十四、大同

【功能與主治】跌打損傷，刀傷出血，紅腫高大。

【处方】乳香 沒藥 硃砂 南紅花各十五兩 兒茶二十四兩 血竭十二兩 麝香十二兩 冰片十二兩

【制法】共軋細面。

【劑量及用法】擦患處或內服。

十五、濟南

【功能与主治】跌打損傷，瘀血作痛。

【处方】乳香一錢五分(去油) 沒藥一錢五分(去油) 紅花一錢五分 麝香一分二厘 冰片一分二厘 兒茶一錢四分 血竭一兩(另研)

【制法】共為細末。

【劑量及用法】每服五分至一錢，溫黃酒送下。

【禁忌】辛辣、刺激等食物。孕婦忌服。

十六、沈陽

【功能与主治】散瘀活血，消腫止痛，續筋接骨。主跌打損傷，骨折筋傷。

【处方】台麝二分 血竭一兩 乳香一錢半 沒藥一錢半 紅花一錢半 梅片二分 孩兒茶一錢半 硃砂一錢半

【制法】共軋極細面。

【劑量及用法】每服七分，黃酒送下。外敷用燒酒調之。

【禁忌】孕婦忌服。

十七、撫順(1)

【处方】乳香三錢 沒藥二錢 兒茶三錢 血竭四兩 紅花八錢 冰片二錢四分 片砂二錢半 台麝一分四

【制法】為極細面。

又方

台麝二分二厘 沒藥一錢半 血竭一兩 冰片一錢二分 兒茶一錢四分 硃砂一錢二分 紅花一錢半 乳香一錢半 歸尾二錢。

【制法】為細面。

十八、撫順(2)

【功能与主治】外傷創傷。功能散瘀，消腫，鎮痛。主治跌打損傷，刀創出血，青紫腫痛，皮破筋折。

【处方】乳香 沒藥 兒茶各一錢 血竭四兩 南紅花八錢 冰片二錢四分 硃砂二錢半 麝香五分

土龍五錢

【制法】共為極細面。

【劑量及用法】每服七分至一錢，黃酒送下。外用白酒調敷患處。如出血可敷之。

【禁忌】孕婦忌服。忌食辛辣、發物。

十九、吉林、哈爾濱

神效七厘散、台麝七厘散

【功能与主治】止血定痛，散瘀消腫，生肌合口。主跌打損傷，刀創出血，青紫腫痛，皮破筋折。

【处方】硃砂一錢半 麝香一分二厘 梅片一分二厘 乳香一錢半 紅花一錢半 血竭一兩 兒茶三錢 沒藥一錢半

【制法】硃砂、麝香、梅片均另研。余均軋為細面，一處調勻。玻璃瓶存貯。

【劑量及用法】每服一錢，黃酒或童便調服。外用白酒調敷患處。如已破皮流血，干敷或開白水調敷之。

【禁忌】忌食發物。孕婦忌服。

二十、呼和浩特

【处方】硃砂二兩 血竭花二兩 乳香一兩五錢 沒藥一兩五錢 紅花四兩 兒茶七錢 歸尾四兩 雄黃五錢 麝香五分 冰片二錢

【制法】共為細面，每兩兌麝香三厘、冰片三分。

八厘散

一、沈陽

【功能与主治】活血，散瘀，消腫，接骨續筋。主跌打損傷，金刃刀傷。

【处方】礞砂三錢 土龍虫三錢 大黃三錢 自然銅三錢 乳香三錢 沒藥三錢 血竭三錢 當歸三錢 骨碎補三錢 川續斷三錢 硃砂三錢

【制法】共軋極細面。

【劑量及用法】每服一錢，溫酒送下。外敷亦可。

【禁忌】孕婦忌服。

二、撫順

【处方】土龍虫五錢 乳香八錢 沒藥八錢 血竭一兩 申姜五錢

外 傷 藥

然銅五錢 紅花八錢 川斷五錢 硃砂二錢 甜瓜子一兩 歸尾一兩 桃仁八錢

【制法】共為細面。

三、哈爾濱

【功能与主治】接骨續筋，止血定痛。主跌打損傷，骨斷筋折，皮破流血，青紫紅腫，疼痛昏厥。

【处方】苏木面一錢 半兩錢一錢醋淬酥 番木鱉一錢油燻去毛 自然銅三錢醋淬七次 滴乳香三錢 明沒藥三錢 血竭花三錢 麝香一分 紅花二錢 丁香五分

【制法】各如法炮制后，一處軋細，后入麝香。玻璃瓶存貯。

【劑量及用法】每服七分至一錢，溫酒或童便調下。外用白酒調敷患處，如已破皮流血，干敷或開白水調敷之。

【禁忌】忌食油膩、腥、冷。孕婦忌服。

附參考古方

【來源】1. 瘍醫大全。

【处方】土鱉虫(焙末) 乳香(去油) 沒藥(去油) 血竭各一錢 生半夏(大者) 當歸(酒浸) 巴豆霜 砂仁 雄黃 香甜瓜子各五分

【制法】共為細末，收貯听用。

【劑量及用法】每服八厘，好酒調下；小兒一厘，但能開口服下即得活矣。

2. 五宗金鑑。

【功能及主治】治跌打損傷，接骨散瘀。

【处方】苏木麵一錢 半兩錢一錢 自然銅三錢(醋淬七次) 乳香三錢 沒藥三錢 血竭三錢 麝香一分 紅花一錢 丁香五分 番木鱉一錢(油燻去毛)

【制法】共為細末。

【劑量及用法】黃酒溫服，童便調亦可。

打傷八味散

沙市

【功能与主治】治跌打打傷未破皮者，無論遠年近月均可用之。

【处方】生梔子一斤 生南星 生草烏 生川烏 生半夏 紅花各

四兩 桃仁 杏仁各六兩

【制法】共研細末。

【劑量及用法】依傷處之大小酌量用藥之多少。每次約用藥末八錢或一兩，用生機搗勻，量傷處大小敷之，約敷二十四小時以皮膚現青色或紫色為度。如傷久者可敷四十八小時。

【禁忌】已破皮出血者忌敷。

玉真散

一、上海

【功能與主治】內外損傷，有鎮痛之效。

【處方】生白附子(漂淨)十二兩 天麻一兩 防風一兩 生南星(漂淨姜汁炒)一兩 白芷一兩 羌活一兩

【制法】各取淨粉，充分和勻。

【劑量及用法】每服二分至五分，黃酒或開水調服。憑醫師處方購用。

【禁忌】孕婦忌服。

【備考】誤服者用冷綠豆湯解之。

二、南京

【功能與主治】主跌打損傷。

【處方】生白附子十二兩 白芷一兩 生天南星一兩 天麻一兩 羌活一兩 防風一兩

【制法】生晒，共研細末。

【劑量及用法】患處已破者干敷，未破者黃酒調敷。

【備考】內服須憑醫生處方。

三、武漢

【功能與主治】破傷初起，角弓反張，牙關緊閉，跌打損傷。

【處方】同南京。

【制法】取上藥混合碾細，成淨粉80—85%即得。

【劑量及用法】內服三至五分，黃酒或開水調服，用熱童便調服更好。外用酒醋調敷患處，用量視傷處大小酌用。

【禁忌】孕婦忌服。

四、南昌

【功能與主治】打傷欲死，心向溫者。及破傷風，牙關緊閉，腰背反張，甚則咬牙縮舌。外治刀斧傷，

血流不止。

【處方】南星(酒炒)一兩 白芷一兩 天麻一兩 羌活一兩 防風一兩 白附子(麩裏煨)十二兩

【制法】共研極細末，通過密篩篩。瓷瓶收貯封固。

【劑量及用法】打傷每服三錢，熱甜酒調服。刀斧之傷干敷傷口布條紮住。

【禁忌】孕婦忌服。

五、沙市

【功能與主治】治一切跌傷或打傷，破皮出血者。用此散上患處可以生肌。

【處方】同南京。

【制法】上藥共研細末。

【劑量及用法】將此散用好醋調勻敷患處。

【禁忌】魚腥、辛辣、葱、蒜諸品。

六、重慶

【功能與主治】治破傷風諸症。

【處方】同南京。

【制法】各藥稱准共研細末。磁瓶封固。

【劑量及用法】三錢。

七、昆明

【功能與主治】止血鎮痛，消炎生肌。主治跌打創傷。

【處方】羌活五兩 生小白附子十二兩 生南星一兩 吳白芷三兩 防風一兩 天麻一兩

【制法】研為細末。

【劑量及用法】分患處大小酌用。搽患處。

【禁忌】不能入口。

八、西安

【功能與主治】主治破傷風初起，角弓反張，痙攣牙關緊急等症。中風痰迷亦可用。跌打損傷諸症外敷。

【處方】南星 白芷 白附子 明天麻 大羌活 防風各一兩

【制法】上六味共搗研細末，絹羅過。每三錢分裝玻璃瓶內。固封瓶口勿洩氣。

【劑量及用法】成人每服三錢，熱童便或溫水服亦可；外用法，用唾津調濃敷傷口用膠布藥棉包紮，小兒酌減。

【禁忌】孕婦忌服。

九、蘭州

【功能與主治】預防破傷風。主治跌打損傷。

【處方】生白附子一兩二錢 天麻一兩 生南星一兩 白芷一兩 防風一兩 生半夏一兩 冰片五錢 羌活一兩

【制法】共研細末。

【劑量及用法】按傷處大小，將藥敷于消毒紗布上，蓋患處。

十、濟南

【功能與主治】跌打損傷。

【處方】白附子一兩(姜汁炒) 天麻一兩 生南星一兩(姜汁炒) 白芷一兩(姜汁炒) 防風一兩 羌活一兩

【制法】共為細末。

【劑量及用法】角弓反張，牙關緊閉時，每服三錢，溫黃酒送下。破爛者干滲患處。青腫者清水調塗。如濕爛不收者，原料約加煨石膏二錢、黃丹二分。

【禁忌】生冷、油膩等食物。孕婦忌服。

十一、撫順

【功能與主治】殺菌，解毒。主跌創破傷，因傷受風以致牙關緊閉，四肢抽搐，角弓反張，冷汗淋漓，不省人事，立見危亡等症狀。

【處方】生白附六兩 白芷 生南星 明天麻 防風 羌活各五錢

【制法】共為細面。

【劑量及用法】每服三錢調服。外敷用鷄子清調敷破傷處。

【禁忌】腥、冷。

十二、吉林

(破傷風玉真散)

【功能與主治】定風解毒，祛風止痛。主破傷風，跌打損傷，項強口噤，牙關緊閉，四肢抽搐，冷汗淋漓，不省人事等症。

【處方】白附子十二兩 天麻一兩 羌活一兩 防風一兩 白芷(姜汁炒)一兩 南星(姜汁炒)一兩

【制法】共研細面，用絹羅篩之，為極細面。每三錢以蜡紙包，用磁罐或玻璃瓶存貯。置于涼處。

【剂量及用法】每服二錢，以热童便調服，或黃酒送下。外用以唾液調敷傷處。

【禁忌】孕婦忌服。忌食腥冷。

附參考古方

【来源】1. 类証普濟本事方。

【功能及主治】治破傷風及打扑傷損。

【处方】南星(湯洗七次) 防風 各等分

【制法】上為末。

【剂量及用法】如破傷以藥敷瘡口，然後以溫湯調下一錢，如牙關緊急，角弓反張，用藥二錢，童便調下；或因斗傷內有傷損，酒調下二錢；打傷至死，但心頭微溫，以童便調下二錢，併三服可救兩人性命。

2. 醫宗金鑑。

【功能与主治】破傷風。

【处方】白芷 南星 白附子 天麻 羌活 防風各一兩

【制法】共為細末。

【剂量及用法】唾津調濃，敷傷處。如破傷風初起，角弓反張，牙關緊急，每用三錢，熱童便調服亦妙。

胜金散

沈 陽

【功能与主治】散瘀活血，消腫止痛。主打傷創傷擗傷，聚筋折骨，關節脫臼，骨膜腫痛，骨膜內積血瘀血，日久不散，發變潰膿等症。

【处方】西紅花 琥珀 青皮 硃砂 赤芍 川芎 連翹 地丁 豨薟草 白芷各二錢 乳香 沒藥 各一錢五分 全當歸 漢三七 双花 川斷 公英各三錢 血竭花一錢

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】大人每服一錢 小兒減半。黃酒送下。

【禁忌】孕婦忌服。

石灰大黃散(桃花散)

武 漢

【功能与主治】外傷跌扑，傷口出血。

【处方】陈石灰四斤 川大黃四兩

【制法】取灰石入銅鍋內，再加

大黃，不住手炒至桃紅色為度，再去大黃，用磁器裝貯，埋土中七週后，取出篩過，得淨細粉五十一兩即得。

【剂量及用法】用涼水調敷患處。

神授散

吉林、哈爾濱

【功能与主治】活血散瘀，消腫止痛。主跌打損傷(青紫腫疼，瘀血不散，終釀潰爛)。

【处方】紅花一兩 沒藥三錢 當歸一兩 兒茶三錢 雄黃三錢 白芷二錢 肉桂一錢 乳香五錢 硃砂一錢 川軍五錢 血竭四錢 梅片四分 台麝四分

【制法】將麝香梅片硃砂各另細研外。余均研為細面。于一切調勻。用玻璃瓶貯存之。

【剂量及用法】每服二錢。用黃酒或童便為引。

【禁忌】忌食生冷油膩。孕婦忌服。

定痛散

沈 陽

【功能与主治】活血消瘀，和血定痛，接筋續骨。主治一切打扑，瘀血腫痛。

【处方】蒼耳子 骨碎補 自然銅 血竭 白附子 赤芍 當歸 白芷 肉桂 沒藥 防風 牛膝 各七錢五分 虎脛骨 龜板各五錢 天麻 五加皮各二錢五分 羌活 檳榔各三錢五分

【制法】共研極細面。

【剂量及用法】每服一錢，溫酒調下。

【禁忌】孕婦禁忌。

附參考古方

【来源】沈氏尊生書：雜病源流犀燭。

【功能与主治】历节風。

【处方】蒼耳子 骨碎補 自然銅 血竭 白附子 赤芍 當歸 白芷 肉桂 沒藥 防風 牛膝 各七錢半 虎脛骨 龜板各五錢 天麻 五加皮 羌活 檳榔各二錢半

【剂量及用法】每末一錢，溫酒下。

舒筋活血定痛散

禹 县

【功能与主治】气血不和，四肢疼痛，傷筋動骨，瘀血不散。

【处方】當歸五錢 沒藥三錢 川芎五錢 甘草三錢 紅花五錢 血竭三錢 乳香三錢 赤芍一錢 生大黃五錢

【制法】共為細面。

【剂量及用法】每服一錢，黃酒送下。一歲至三歲用二分。

【禁忌】血亏忌用。孕婦忌用。

【備考】有效期二年。

鉄扇散

一、撫 順

【处方】象皮四錢 龍骨一兩 檀香一兩 枯礬一兩 石灰一兩 黑膠香一兩

【制法】共為細面。

二、吉 林

【功能与主治】生肌，長肉，止痛。跌打損傷。

【处方】象皮 龍骨各三錢四分 松香 石灰 枯礬 乳香各六錢七分

【制法】將以上藥品共為細面。用瓷瓶或玻璃瓶貯存或用紙袋盛之。

【剂量及用法】將藥面敷于傷處。

黎峒膏

沈 陽

【功能与主治】消腫化堅，止痛生肌。主癰疽發背，無名腫毒，瘡癤初起。

【处方】象貝一兩 豨薟草二兩 川草薢二兩 紫花地丁二兩 川貝母二兩 生甘草一兩 苦參三兩 陳橘核二兩 蒲公英二兩 山甲三兩 赤苓二兩 章丹三十兩 香油六十兩

【制法】將諸藥入香油內浸五日，用火熬之，以藥粘油黑為度，濾去渣，汁再熬至滴水成珠，次入章丹收膏攪勻，冷定成膏。

【剂量及用法】洗淨患處，量其

大小摊贴之。

附参考古方

【来源】《医方摘要》。

【功能及主治】治痈疽初起，及热疔瘰癧，俱效；并治疔腮发颐、一切风毒之症。

【处方】象贝一两 川山甲二两五钱 川贝一两（去心） 紫花地丁一两 蒲公英二两 生甘草一两五钱 赤芍一两 川草薢二两 稀莪草一两五钱 苦参三两 陈橘核五钱

【制法】用大麻油浸煎熬成膏，以草丹酌收，油纸照症摊贴神效。

万应宝珍膏

一、上海（宝珍膏）

【功能与主治】风湿疼痛，跌打损伤。

【处方】生地 茅朮（炒） 枳壳（炒） 五加皮 羌朮 桃仁（去皮） 山奈 当归 川乌（制） 陈皮 乌药 三棱 大黄 苜蓿（制） 草乌（制） 柴胡 防风 刘寄奴 牙皂 川芎 官桂 羌活 威灵仙 赤芍药 南星（制） 香附（制） 荆芥 白芷 海风藤 藁本 续断 良姜 独活 麻黄（去节） 杜松 连翘各三钱 棉子油四斤 血余二两 章丹（炒）三十两（以上为粗料）

【制法】将粗料用棉子油煎至药枯，去渣滤清加血余、章丹煎成膏，再将细料搅入膏药油内，摊在红布上。大号用膏药油五钱，中号三钱，小号二钱五分。

【剂量与用法】贴患处。

【禁忌】不可入口。

二、南京

（内伤膏药、万应内伤膏、万应太乙膏、万应红毛膏）

【功能与主治】舒筋活络，消肿止痛。主肢节麻木，跌打损伤，筋骨疼痛。

【处方】同上海粗料方。

【制法】用麻油五斤入前药三十六味，浸泡一宿后，文火煎熬至枯，滤去渣，慢慢熬至滴水成珠时，再用血余二两研末和入，以黄丹（炒透）

三十两收膏，俟冷后，临用时，再将麝香一钱 肉桂一钱 制附子片二钱 木香二钱 茴香二钱 制乳香二钱 阿魏二钱 冰片二钱 制没药二钱 樟脑二钱 细辛二钱

以上十一味，共研细末，乳至极细，徐徐和入药脂内搅匀为度，须退火气后用之。

【剂量及用法】用红布摊成膏药，贴于患处，每张药脂，计重五钱。

杭州

（万应灵膏）

（附：加料万应灵膏）

【功能与主治】治跌打损伤，负重闪腰，筋骨疼痛，腿膝痿软，瘫痪风痹，手足麻木，以及痈疽发背，痰核流注，胸胃气痛，腹胀寒痛等症。

【处方】淡附子 鲜红花 血余 羌朮 桂枝 羌活 独活 白僵蚕 秦艽 麻黄 当归 制川乌 防风 威灵仙 制草乌 生大黄 赤芍 生山栀 桃仁 三棱 白芷 淡全虫 五加皮 良姜各二两 生地 香附 乌药各四两

【制法】用麻油十五斤，入药熬枯去渣，熬至滴水成珠，加章丹六十两收膏。临摊时每斤药油再加：香料二两 肉桂粉五钱 苏合香油五钱

同药油搅匀，摊红布上。

【剂量及用法】用时烘热，按症各贴患处。甚效。

【备考】

1. 附：加料万应灵膏：

照上述各症，其功元伟。临摊时万应灵膏一斤药油再加 香料二两 肉桂粉一两 苏合油一两 麝香六分

同药油和匀摊之。用时烘热贴患处。

2. 附：万应灵膏香料方：

广木香 制没药 山奈 杜松 排草 白檀香 公丁香 制乳香 春花各二两 血竭 儿茶各八钱 以上共研细粉为度。

红鸡膏

济南

【功能与主治】筋骨疼痛，麻木不仁，跌打损伤，妇女乳痈。

【处方】降香 全当归各四两 川山甲一两 血竭五钱 乳香 没药各一两 红公鸡一个

【制法】将公鸡去肉，用骨用香油二斤炸五分钟，再将降香、当归、川山甲下油五分钟，再将血竭、乳香、没药下油，共同炸黑取出再下章丹一斤收膏。每张大的一两，小的五钱。

【剂量及用法】外贴患处。

内伤膏

武汉

【功能与主治】肢节麻木，跌打损伤，筋骨疼痛。

【处方】羌活一两 独活一两 草乌一两 半夏一两 良姜一两 麻黄一两 生附子一两 升麻一两 川乌一两 桂枝一两 当归一两 苍朮一两 红花一两 白芷一两 葛蒲一两 丁香二两 麻油十斤 黄丹六十两

临摊时再加。

肉桂一钱 牙皂一钱 年健一钱 乳香一钱 没药一钱 大黄一钱 青皮一钱等细末

【制法】将羌活至丁香以上诸药，与香油同入铜锅泡七日；熬枯去渣，炼至滴水成珠。下黄丹六十两搅匀，成膏二百零二两五钱，用冷水浸去火毒。临摊膏时，再将肉桂至青皮以上诸药，共研细粉兑入，用红布摊贴。每张重一两二钱。

【剂量及用法】先将生姜在患处揉红，然后贴膏药一张。

活血膏

天津（红伤黑药）

【功能与主治】消炎，杀菌，活血，止痛。主跌打损伤，墜車落馬，伤筋动骨，及痈疽疔疖，已破未破，红肿高大，日久溃烂，久不收口，蝎螫虫咬，疼痛不安。

【处方】轻粉四钱 红粉一钱 乳香面 没药面各四钱 儿茶面二钱 血竭面四钱 共为细粉

章丹 黄蜡各二两 头发 蛇蜕各二钱 香油八两 麝香二分 冰片一钱

【制法】先将香油放入勺内，熬

开放入蛇蛻、頭髮二味。炸枯去渣過濾后，再放入章丹、黃蜡二味。候黑色再放入前人種藥面，候片刻。离开火以后，候片刻再將麝香、冰片二味放入，攪均勻后倒入冷水盆內（以解火毒）收成軟膏為度。五錢重裝盒。

【劑量及用法】敷患處。

跌打損傷膏

沙 市

【功能與主治】治一切跌打損傷，破皮流血等症。

【處方】當歸五兩 川芎二兩 白芨 赤芍各三兩 大黃四兩 蘇木 血藤各二兩 郁金二兩 良姜 劉寄奴 五加皮 青木香 羌活 姜黃 桑寄生 三稜 莪朮 黃柏 血余各二兩 土鱉一兩 紅花二兩 桃仁二兩 川牛膝 玄胡 秦艽 防風 白鮮皮各二兩 大蔥白一斤

【制法】上藥切片，香油十八斤，將藥入油內浸泡，春秋二季七天，夏季四天，冬季十天。熬至藥枯，去渣濾淨。再熬至滴水成珠，再入炒黃丹，每斤油春夏秋八兩，冬季七兩，候冷又入自然銅（醋燬）二兩 乳香 沒藥各四兩 血竭二兩 兒茶二兩 以上五味共研細末，又入樟腦 洗片各一兩 上藥七味下入膏內攪勻。

【劑量及用法】用時將膏藥在火上烘融攤開貼患處。

【禁忌】非因跌打損傷致病及有癰疽症者忌貼此膏。孕婦忌用。

活絡膏

北 京

【功能與主治】活絡化癰。主跌打損傷，閃腰岔氣，百節痠痛，足膝痠軟。

【處方】穿山甲（生） 五倍子 防風 當歸 羌活 獨活 白芷 黃連 枳殼 官桂 豬牙皂 木鼈子 全蠍 細辛 黃柏 桃仁 川芎 訶子 天南星（生） 青皮 杜仲各二錢五分 三稜 莪朮 川烏（生） 川附片 厚朴 香附 地龍肉各二錢 大黃 檳榔 續斷 骨碎補各二錢五分 蜈蚣二條 馬錢子十四個（生） 蛇蛻一錢五分 木香二錢五分 烏蛇肉三錢 威靈仙

五錢 天麻 劉寄奴 紅花各三錢 首烏藤 海風藤各五錢 土鼈虫二錢

【制法】上藥用香油四百八十兩炸枯去渣，煉至滴水成珠，入黃丹二兩，攪勻成膏。每六十四兩膏油兌：血竭 乳香 沒藥 沉香各二錢五分 公丁香一錢五分 麝香一錢 攪勻攤貼。

【劑量及用法】微火化開貼患處。

【禁忌】孕婦忌貼。

雞血藤膏

上 海

【功能與主治】壯筋骨，暖腰膝，和血調經。主跌打損傷。

【處方】雞血藤

【制法】將雞血藤煎一天一夜出鍋，將藥渣澄清過濾收膏。

【劑量及用法】憑醫師處方購用。

燙火藥膏

一、天 津

【功能與主治】消腫、止痛，解毒。主皮膚被火燒傷，被熱水或蒸氣及油類燙傷，局部紅腫，起水泡，疼痛不止。

【處方】香油 鉛粉各二斤 生地四兩 米壳二兩 冰片二錢

【制法】以上五種先將香油燒熱，再炸生地、米壳二味。炸枯去渣濾淨，再入鉛粉成軟膏，候溫兌冰片。

【劑量及用法】敷患處。

二、武漢（燙火軟膏）

【功能與主治】燙傷，火傷。

【處方】乳香二錢 沒藥二錢 藤黃 錢 黃蜡二兩

【制法】取上藥（除黃蜡），用麻油十兩將三味炸枯去渣；再入黃蜡收膏，用絲棉過濾；八折得淨膏九兩六錢，分裝圓鐵盒。每盒重六錢。

【劑量及用法】用藥稍許塗患處，不愈再塗。

五虎丹

北 京

【功能與主治】活血止痛。主跌

打損傷，血瘀作痛。

【處方】當歸 紅花 防風 天南星（制）各三兩五錢 白芷二兩四錢

【制法】共為細粉。

【劑量及用法】每服一錢，黃酒調服；外敷黃酒調敷腫處。

【禁忌】孕婦忌服。

全 身 丹

南 昌

【功能與主治】跌打損傷疼痛。

【處方】紅花 土鱉虫 制乳香 桃仁 沉香 姜黃 漆渣 自然銅各二錢 桂枝 肉桂 蓬莪朮 骨碎補 醉仙桃 田三七 茜草根 當歸尾各三錢 烏藥 三稜 血竭各四錢 廣木香五錢 八稜麻一兩 枳殼一兩 制川烏六錢 制草烏六錢

【制法】共為極細末。

【劑量及用法】每服一錢，熱甜酒送下，年老及體弱酌減服用。

【禁忌】孕婦忌服用。

【備考】非經醫師處方不得使用。

回生第一丹

一、北 京

【功能與主治】接骨，活血，止痛。主跌打損傷，血瘀疼痛。

【處方】土鱉虫十兩 自然銅六兩（燬） 乳香四兩 血竭四兩 當歸二十兩 以上五味計四十四兩，共為細粉。每八兩八錢細粉兌：麝香四錢 硃砂八錢

【制法】共為細粉和勻。

【劑量及用法】每服二分，日服二次。黃酒送下，溫開水亦可，按病狀酌情遞減。

【禁忌】孕婦勿服。

二、濟 南

【功能與主治】跌打損傷，血瘀作痛。

【處方】活土鱉虫淨末五錢（瓦焙黃） 自然銅淨末三錢 乳香二錢 血竭二錢 硃砂二錢 麝香一錢 當歸一錢

【制法】共研細末。裝瓶，每瓶二分。

【剂量及用法】每服一瓶，白开水送下。

【禁忌】生冷、辛辣等食物。孕妇忌服。

三、沈陽(第一效丹)

【功能与主治】养血舒筋，通經鎮痛。主舒筋合骨，跌打損傷，瘀血凝結。

【处方】土鳖虫一百个 乳香一兩五錢 自然銅五錢 血竭二錢 硃砂二錢 当归一兩 麝香一錢 沒藥一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，重一分五厘。蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，黃酒送下。

跌打丹(內府跌打回生第一仙丹)

天津

【功能与主治】接骨，活血，止痛。主跌打損傷，閃腰岔氣，傷筋動骨，壓傷砸傷，墜車落馬，劇烈疼痛。

【处方】土鳖虫五錢 煅自然銅(醋制)二錢 血竭二錢 当归一兩 乳香一兩(用灯心二錢五分同炒去灯心) 以上五味，共為細粉，每細粉三兩兌硃砂面二錢 麝香一錢

【制法】以上研細和勻，一分五厘重裝瓶。

【剂量及用法】每次服一瓶，黃酒沖服，白開水亦可。

【禁忌】孕婦忌服。

補益活絡丹

天津

【功能与主治】舒筋活絡。主跌打損傷，氣血不足，筋骨痠疼，行動不利。

【处方】生黃芪五錢 生白芍三錢 桑枝五錢 黨參(去蘆) 熟地升皮 茯苓(去皮) 靈仙各三錢 紅花二錢 制首烏四錢 獨活三錢 桃仁(去皮)一錢 当归 木瓜各三錢 赤芍一錢 川芎一錢五分 杜仲炭(鹽炒)二錢 地龍 防己各三錢 香附(醋制) 甘草各二錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸二錢重。蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，重

症每次服二丸。白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

紫砂丹

天津

【功能与主治】舒筋活血，續筋接骨。主跌打損傷，閃腰岔氣，傷筋動骨，青紫腫脹，疼痛難忍。

【处方】大黃(醋制)二兩 煅干漆五錢 枳殼(麩炒) 紅花 五靈脂(醋炒) 当归各一兩 桃仁(去皮)二兩 生白芍 生地各一兩 土鳖虫二兩 香附(醋制) 丹皮 懷牛膝 川芎各一兩 占錢五錢 血竭一兩 煅自然銅一兩五錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，一錢五分重。蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，黃酒送下，白開水亦可。

【禁忌】孕婦忌服。

接骨丹

一、濟南(1)

【功能与主治】跌打損傷，筋斷骨折，瘀血攻心等症。

【处方】乳香三錢(制) 沒藥二錢(制) 知母三錢 当归三錢 川棟子三錢(炒) 金櫻子三錢(去心) 金精石三錢(煅) 血竭三錢

【制法】共為細粉。全方即一付。

【剂量及用法】大人每服一付。如一次不能服下，可分數次繼續服。小兒半付。黃酒送下。將傷處調理合穴，周身出透汗。

【禁忌】驚恐、一切發物。

二、濟南(2)

【功能与主治】傷筋動骨，瘀血敗症。

【处方】麻黃二錢 土鳖虫三錢 乳香三錢 沒藥三錢 地龍三錢 自然銅三錢(醋煅)

【制法】共研細面。

【剂量及用法】每服一至二錢，黃酒送下。外用白酒調敷傷處。

三、撫順

【处方】乳香 沒藥 血竭 兒茶 然銅 申姜 毛狗 故紙 川斷 川軍 龍骨 礞砂 紅花 土鳖虫 硃砂各一錢

【制法】共為細面。

【剂量及用法】每服五分，黃酒送下。

【備考】又方：

占銅錢一個 然銅三錢 乳香五錢 沒藥五錢 土鳖虫五錢 申姜七錢 生半夏一個

附參考古方

【來源】1. 潔古家珍

【功能与主治】治打扑傷損皮骨者。

【处方】蘇木(極細末)一錢 定粉一錢 南礞砂(另研)半兩占錢(燒紅醋碎為末)各一錢

【剂量及用法】上為末，同勻，作一服。煎当归酒調三、二服。痛止勿服。

2. 瘍科証治准繩。

【功能与主治】治骨折出臼，無草藥討處，用此方效。

【处方】南星(生)四兩 木鼈子二兩 紫金皮 芙蓉叶 獨活 白芷 官桂 松香 楓香各一兩 小麥麩二兩 乳香 沒藥各五錢

【剂量及用法】上末、米醋、生薑汁各少許，入酒調勻，攤油紙上夾縛。冬月熱縛，夏月溫縛。

3. 沈氏尊生書：雜病源流犀燭。

【功能与主治】骨碎。

【处方】乳香 沒藥 当归 川椒 自然銅(火煨醋淬三次) 龍骨 川芎 赤芍 骨碎補(酒炙) 敗龜板(酥炙) 白芷 郁李仁各一錢

【制法】黃蜡五錢化為丸，彈子大。

【剂量及用法】每一丸，熱酒一碗化開，攪散熱服。

跌打損傷酒

一、武漢

【功能与主治】跌打后筋骨疼痛，不時發作。

【处方】当归一兩 苡米仁五錢 羌活三錢 杜仲八錢 五加皮一兩 骨碎補五錢 桃仁三錢 莢虎一錢 生地一兩 紫荊皮五錢 廣木香三錢 破故紙五錢 川芎八錢 十大功勞五錢 虎脛骨一兩二錢

【制法】用高粱酒二十斤，入缸封固。隔水煮三小時取出；七日后，壓榨過濾，使成酒十九斤半，瓶裝；

大瓶一斤，中瓶半斤，小瓶四兩。

【劑量及用法】臨臥時，服半兩至一兩。

二、重 庆 (1)

【功能与主治】舒筋活血。

【处方】柴胡二兩 黃芩一兩 五靈脂一兩 桃仁一兩 當歸二兩 赤芍二兩 川芎二兩 紅花七錢 蘇木一兩 續斷一兩 碎補一兩 三稜七錢 伏水十八支 莪朮七錢

【制法】每方用干酒十斤，泡十日后即成。

【劑量及用法】每日三次，每次一至二兩。按病輕重增減之。

三、重 庆 (2) (跌打酒)

【功能与主治】專治跌打損傷，內服外搽均宜。

【处方】麝香三分 乳香一兩 自然銅二兩 紅花一兩 當歸尾一兩 砂仁一兩 三七三兩 香附三兩 蓬莪朮一兩 木通一兩 鎖陽二兩 威靈仙一兩 五加皮二兩 桂枝一兩 吳茱萸一兩 杜仲三兩 番木鱉二十一个 草烏一兩 法半夏一兩 硃砂一兩 生地三兩 川芎一兩 丁漆一兩 赤芍二兩 細辛一兩 枳殼一兩 蘇木一兩 羌活一兩 獨活一兩 公丁香五錢 大茴香一兩 沒藥五錢 首烏一兩 川烏一兩 紫花地丁一兩 橘皮二兩 廬虫二兩 青皮一兩 松節二兩 甘草一兩 桃仁一兩 海馬二錢 三稜二兩 骨碎補二兩 虎骨一兩 補骨脂二兩 白芷二兩 鹿角片一兩 鈎藤二兩 刺甲皮二兩 碎蛇二條 澤蘭二兩 紅牛膝二兩 茜草二兩 干酒六十斤

【制法】各藥研成細末，蒸一點鐘后，包酒三十天。玻璃包裝，紙盒封固。

【劑量及用法】五錢。

【禁忌】休虛与妊娠不可服。

勞 傷 藥 酒

重 庆

【功能与主治】治跌打損傷腰部痛。

【处方】大小血藤各四兩 紅白牛膝各三兩 舒筋草四兩 東五加

五兩 白花草一兩 白龍須四兩 木通根三兩 接骨丹根五兩 隨手香三兩 老鶴草四兩 碎補二兩 紅毛七兩 松節三兩 見血飛三兩 金腰帶三兩 紅澤蘭四兩 猪毛七兩 伸筋草四兩 破骨風四兩 黃龍須四兩 八爪龍一兩 地胡椒五兩 紅酸漿草四兩 筋骨草五兩 烏骨雞二兩 石蘭藤四兩 還魂草四兩

【制法】每方用干酒十五斤泡十日后即成。

【劑量及用法】成年病重者每服二兩，輕者一兩，每日三次。

風 損 膏 藥

南 昌

【功能与主治】跌打損傷，風寒溼痹，筋骨關節疼痛，四肢麻木，腹部痞塊。

【处方】羌活六兩 蒼朮四兩 秦艽八兩 甘遂 阿魏各四兩 當歸十八兩 姜黃 白芥子各八兩 南星二兩 川芎二兩 桑寄生 黨參 獨活各四兩 千年健二兩二錢 山甲片三兩二錢 皂角四兩 大戟八兩 白芷二兩 羌花四兩 三稜三兩二錢 草烏 良姜各八兩 桃仁二兩 生薑八兩 草果 黃柏 蒼朮各四兩 川烏十六兩 莪朮三兩二錢 桂枝尖 大黃 商陸各四兩 川牛膝二兩二錢 紅花八兩 威靈仙三兩二錢 半夏四兩 沒藥二兩 香葱十六兩 天麻三兩二錢 甘草二兩 五加皮三兩二錢 厚朴 郁金 元胡索 細辛各四兩 黃丹三十斤 麻油四十斤

【制法】依法熬制成膏后，待溫將后列藥末投入；肉桂 公丁香 山柰各八兩 麝香二錢共研細末，須過密篩篩過攪勻，用布攤之每張計七錢重。

【劑量及用法】貼于患處，十天換一張。

【禁忌】孕婦忌用。

刀 傷 藥

濟 南

【功能与主治】刀傷及跌打損傷。

【处方】當歸一錢 棗樹皮三錢

外 傷 類

【制法】各略炒存性，共為細末。

【劑量及用法】撒于患處。

吊 筋 藥

上 海

【功能与主治】閃筋，屈筋。

【处方】山梔子十六兩 杏仁 白芥子各四兩 紅花二兩 桃仁五兩

【制法】共研粗末。

【劑量及用法】用高粱、麵粉、雞蛋白和入藥粉中敷患處。

燙 火 藥

一、北 京

【功能与主治】清熱解毒消炎。主湯燙火灼。

【处方】生大黃八十兩 樟腦八兩

【制法】共為細粉。

【劑量及用法】香油調敷患處。

二、天 津

【功能与主治】消腫，止痛，解毒。主皮膚被火燒傷，被熱水或蒸氣及油類燙傷，局部紅腫，起水泡，疼痛不止。

【处方】大黃 煅蛤粉 黃柏 生石膏 生地榆各一兩 紅藥子二兩 生寒水石一兩 共為細粉兌入，冰片二錢。

【制法】以上研細和勻。三錢重裝袋。

【劑量及用法】用香油調敷患處。

三、南京 (火燙藥)

【功能与主治】主水、火燙傷。

【处方】焦地榆八錢 生大黃二錢 冰片二分

【制法】共研細末。

【劑量及用法】每用少許，以麻油調勻，塗于患處。

四、濟南 (1)、承德

【功能与主治】燙傷，燒傷。

【处方】生大黃四兩 樟腦二錢

【制法】共研細面。

【劑量及用法】香油調塗患處。

五、濟南(2)

【功能与主治】燙火燒傷。

【处方】生地榆八兩 熟地榆八兩 乳香五錢 沒藥五錢

【制法】共研極細粉。

【劑量及用法】香油調搽。出水者干敷。

六、沈陽

【功能与主治】防腐止癢。主湯燙火傷，人咬瘡血惡肉，凝聚腫疼。

【处方】生地榆去骨 黃柏各等分

【制法】共碾極細面，香油浸于缸內，越陳越妙。收貯备用。

【劑量及用法】量傷之大小酌敷，香油調之。

七、吉林

【功能与主治】水燙，火燒腫疼，癰疽腫疼。

【处方】硫丁 寒水石 大黃各六錢七分 黃柏一兩二錢四分

【制法】將上述藥品升為細面。用油紙包。

【劑量及用法】將此藥敷于燙處。或用香油調敷于患處。

獾油

天津

【功能与主治】活血，潤皮膚，止痛。主水燙、火燙、油燙，紅腫起泡，浸淫潰爛，疼痛不止。

【处方】獾油一斤 冰片面五錢

【制法】以上和勻，一兩重裝瓶。

【劑量及用法】塗抹患處。

邊臣十八位

吉林

【功能与主治】逐瘀化滯，舒筋活血。主跌打損傷。

【处方】銀花 紫草 烏藥 丹皮 紫朴 桃仁各錢半 紅花 乳香 沒藥 人芫 甘草各一錢 歸尾 赤木 赤芍 中藥 川軍 枳實各一錢 石斛二錢

【制法】用沸水煎至八分干，濾出。

【劑量及用法】用黃酒為引。治上部跌打損傷加川芎一錢；治中部加青皮一錢；治下部加牛膝一錢；治四肢加肉桂一錢。

【禁忌】孕婦忌服。

妇 产 科

經 帶 类

四 物 丸

一、南 京

【功能与主治】补血，和血。主血液亏少，月經不調。

【处方】大熟地三兩 炒白芍二兩 西当归二兩 撫芎一兩五錢

【制法】上药四味，共研細末，加炒白蜜为丸，每錢約做二十粒。

【剂量及用法】每服三錢，一日二次，开水吞服。

二、福 州

【功能与主治】治血虛營弱。一切血病当以此为主。

【处方】同南京，制法亦同。

四物益母丸

一、上 海

【功能与主治】調經补血。

【处方】熟地四兩 白芍药(炒)一兩 当归(酒洗)四兩 川芎一兩 益母草八兩

【制法】共研細粉，煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服三錢，温开水送服。

【禁忌】忌酸辣食物。

二、杭 州

【功能与主治】治妇人月經不調或經閉不通，血虛內热，气滯腹痛，产后惡露未淨，血塊作痛等症。

【处方】全当归四兩 川芎一兩 酒白芍一兩 大熟地四兩

【制法】共研細末，用益母草膏打丸。

【剂量及用法】每服三至四錢。温酒或开水送下。

女科八珍丸

一、上 海

【功能与主治】調补气血。

【处方】党参四兩 茯苓四兩 白芍药(炒)四兩 川芎三兩 白朮(炒)四兩 当归(酒洗)六兩 甘草(炙)二兩 熟地六兩

【制法】共研細粉，煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢，食后温开水送服。

二、福 州

【功能与主治】治妇人气血虛羸，面黃肌瘦，月事不調，血少經閉，陰虛內热，赤白帶下等症。有协调陰陽之妙。

【处方】人參二兩 白朮二兩 茯苓二兩 炙甘草一兩 熟地四兩 当归二兩 白芍二兩 川芎一兩五錢 香附二兩 羌活子一兩五錢

【制法】研末，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服三錢，开水送下。

三、杭 州

【功能与主治】治妇人气血兩亏，面黃肌瘦，精神疲惫，月事不調，血少經閉，陰虛內热，赤白帶下，胎产崩漏等症。

【处方】党参二兩 炒冬朮二兩 白茯苓二兩 炙甘草一兩 当归二兩 川芎一兩 酒白芍二兩 大熟地三兩

【制法】共研細末，煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服三錢。开水送下。

当归内补丸

一、青 島

【处方】全归一斤 阿膠四兩

(炒) 白芍四兩(炒) 条芩二兩 坤草四兩 陈皮四兩 炙芪二兩 茯苓四兩 白朮四兩 川芎四兩 香附一斤 山藥四兩 杜仲二兩(炒) 砂仁一兩 熟地六兩 艾炭四兩 炙草二兩

【制法】共研面，蜜小丸。

二、呼和浩特

【处方】当归斤半 川芎 坤草 白朮 陈皮 黃芪 熟地 白芍 香附 丹参 艾炭各一斤 茯苓八兩 砂仁 甘草各四兩

【制法】共为細面，蜜小丸。

当归养血丸

一、上 海

【功能与主治】月經不調，子宮寒冷。

【处方】茯苓 当归 黃芪(炙) 香附(制) 白芍药(炒)各二兩 白朮(炒焦) 杜仲(炒)各四兩 艾叶二兩 生地八兩 驢皮膠二兩

【制法】除驢皮膠外余药共研細粉，再將驢皮膠烊化和匀，煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服三錢，温开水送服。

二、杭 州

【功能与主治】补益元气，养血調經，治妇人血虛陰亏，月經不調，赤白帶下，子宮虛寒，久不能孕等症。

【处方】炙黃芪三兩 杜仲四兩 酒白芍三兩 粉丹皮二兩 炒冬朮四兩 制香附二兩 大生地八兩 白茯苓三兩 全当归二兩 驢皮膠三兩

【制法】共研細末，將膠烊化，和煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服二錢，开水送下。

内补养荣丸

沈 陽

【功能与主治】补血安胎，消炎止带。主妇人气血虚弱，头目眩暈，面色萎黄，經血不調，赤白帶下，腰痛耳鳴，四肢無力，子宮虛寒，久不孕育，胎動不安。

【处方】当归 川芎 白芍各二兩 熟地 醋香附各八兩 炒白朮 姜草各五兩 茯苓二兩 黃芪 阿膠 陳皮各四兩 杜仲 炙甘草 艾叶 砂仁各二兩

【制法】共为極細面，煉蜜为丸，二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下。

【禁忌】生冷食物。

千金吉祥丸

上 海

【功能与主治】子宮寒冷，月經不調。

【处方】天麻一兩 川芎二兩 柳絮一兩 桃仁(去皮尖)一兩 肉桂一兩 牛膝一兩 茯苓一兩 复盆子十六兩 白朮(炒)二兩 牡丹皮一兩 桃花二兩 五味子二兩 菟絲子一兩六錢 楮實子一兩六錢

【制法】共研細粉，煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服二錢，溫开水送服。

附參考古方

【来源】备急千金要方

【功能与主治】女人积年不孕。

【处方】天麻一兩 五味子二兩 复盆子一升 桃花二兩 柳絮一兩 白朮二兩 芎藭二兩 牡丹一兩 桃仁一百枚 菟絲子一升 茯苓一兩 楮實子一升 干地黄一兩 桂心一兩

【制法】上十四味末之，蜜和丸如豆大。

【剂量及用法】每服空心飲苦酒下五丸。日中一服，晚一服。

調經种子丸

一、上海(調經丸)

【功能与主治】調經補血。

【处方】香附(制)四兩 川芎二兩 杜仲(炒)四兩 艾叶二兩 鹽皮膠二兩 續斷二兩 当归二兩 熟地八兩 白芍药(炒)二兩 黃芩二兩 益母膏二兩

【制法】除鹽皮膠、益母膏外，余药共研細粉，再將鹽皮膠烊化和益母膏加煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服三錢，溫开水送服。

【禁忌】酸冷食物。

二、福州

【功能与主治】治妇人血虛气滯，腰痠腹痛，經水不調，赤白帶下，子宮寒冷，不能受孕。久服氣血溫和，令人有子。

【处方】熟地八兩 杜仲 香附各四兩(制) 川芎 当归 續斷 蕪艾各二兩 黃芩 阿膠 白芍各二兩(炒)

【制法】共研細末，益母膏和蜜为丸。

三、杭州

【功能与主治】治妇人血虛气滯，腰痠腹痛，月經不調，赤白帶下，子宮虛寒不能受孕。久服氣血調和，調經种子。

【处方】熟地八兩 杜仲四兩 制香附四兩 川芎二兩 全当归二兩 川續斷二兩 蕪艾二兩 黃芩二兩 鹽皮膠二兩 酒白芍二兩 益母膏四兩

【制法】共研細末，將膠烊化，和益母膏为丸。

【剂量及用法】每服三錢，溫酒或开水送下。

四、南昌

【功能与主治】同杭州。

【处方】同杭州。

【制法】共研細面，益母膏四兩和煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服三錢，溫酒送下。

【禁忌】生冷、辛辣等物。孕婦忌服。

五、重 庆

【功能与主治】治女性血虛气滯，腰痠腿痛，經水不調，赤白帶下，子宮寒冷，久不受孕等症。

【处方】熟地黄八兩 杜仲四兩 香附四兩 川芎三兩 当归二兩 續斷二兩 艾叶三兩 黃芩二兩 阿膠二兩 白芍二兩

【制法】除阿膠用酒燉化，臨和丸加入外，余药共研細末，煉蜜为丸，每重三錢。蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸。

【禁忌】妊娠不可服。

种 玉 丸

一、大 同

【功能与主治】調經种子，填精益腎。

【处方】熟地二兩 山萸一兩 山藥八錢 云苓 丹皮各三錢 枸杞六錢 洋參二錢 炙芪三錢 核桃仁二兩 牛膝 故紙各四錢 澤瀉三錢 鹽從蓉五錢 油桂一錢 巴戟 母丁香各三錢 蛇床子五錢 陽起石四錢 韭子五錢 紫梢花四錢 附子二錢半 沙苑子 淫羊藿 仙茅各三錢 鎖陽五錢 炙草三錢 大羊米一兩五錢 益智仁二錢 复盆子二錢 楮實子二錢 棗仁 远志 菟絲子 焦杜仲 狗脊 鹿膠各一錢 鹽腎(炙) 鹿腎(炙)各一兩五錢 大海馬(炙)一兩 狗腎(炙)二条 鹿茸三錢

【制法】煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服二錢。

二、呼和浩特(种育丸)

【处方】熟地四兩 杭萸 杜仲各六錢 白朮 牛膝 茯苓 党参 枸杞各六錢 菟絲子二兩 大芸 巴戟各四兩 炙藜一兩 附子四兩 故紙 茴香各一兩 龙骨 肉桂各三錢 母丁香二兩 狗腎一条(另) 黃芪五錢 虎骨 鹿茸各二錢 海馬一对(另) 鹿腎一条(另) 青鹽二兩 当归八錢 核桃仁一兩 五味子 山藥各六錢

【制法】每斤面兌硫黃二錢 鹿茸一錢五分 海馬一錢 三腎面二兩，蜜小丸。

毓麟珠丸

一、福 州

【功能与主治】治妇人氣血俱虛，經脈不調，或斷續、或帶濁、或腹

痛、或腰痠、或飲食不甘，瘦弱不孕。服一、二劑即可受孕。凡種子諸方無以加此。

【處方】人參二兩 白朮二兩（土炒） 茯苓二兩 芍藥二兩（酒炒） 川芎一兩 炙草一兩 當歸四兩 熟地四兩（蒸搗） 菟絲四兩（制） 杜仲二兩（酒炒） 鹿角霜二兩 川椒二兩

【制法】共為末，煉蜜丸，彈子大。

【劑量及用法】每空心嚼服一、二丸，用酒或白湯送下。或為小丸，吞服亦可。

二、大同（調經毓麟珠）

【功能與主治】氣血兩虛，赤白帶下。

【處方】黨參二兩 白朮二兩 茯苓二兩 炙草一兩半 熟地二兩 當歸四兩 川芎一兩 杭芍一兩 杜仲二兩 川椒（青、炒）五錢 鹿角霜一兩 菟絲子四兩

【制法】共研細面，煉蜜為二錢大丸。

【劑量及用法】早晚每服一丸，開水送下。

調經毓麟丸

濟南

【功能與主治】子宮虛寒，赤白帶下，行經作疼，久不受孕等症。

【處方】香附六斤（分為四分，酒炒一斤半，醋炒一斤半，鹽炒一斤半，童便炒一斤半） 當歸 白芍 丹皮各一斤 炮姜八兩 肉桂 紅花 桃仁（炒） 半夏 沒藥各八兩 元胡四兩八錢 甘草 莪朮 阿膠珠 小茴（炒）各四兩 川芎 白朮 茯苓各八兩 生地一斤

【制法】共為細面，水泛為丸（小丸）。

【劑量及用法】每服三錢，空心服。溫酒或白酒送下。

【禁忌】忌氣惱。孕婦忌服。

濟坤育麟丸

呼和浩特

【處方】坤草四兩 當歸 川芎 茯苓 丹皮 山藥 熟地 白朮 黃芪 元胡 石脂 白芷 白薇

甘草 沒藥 白前 黃柏 黃芩各二兩 阿膠 鹿膠各五錢 紅花三錢 砂仁 茴香 鎮陽各三錢 沉香 鹿茸

【制法】共為細面，蜜大丸，重二錢，半金衣，蜡皮。

鹿胎丸

一、北京、承德

【功能與主治】理血溫經。主經血不調，少腹冷痛，肢體痠軟。

【處方】益母草三十二兩 當歸 白芍各八兩 柴胡 木香各二兩 川芎一兩 鹿胎一具約十六兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重二錢，硃砂為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，黃酒送下，溫開水亦可。

【禁忌】孕婦忌服。

二、沈陽

【功能與主治】補氣生血，填精益髓。主五勞七傷，精血虧損，四肢無力，腰痠腿痛，步履困難，遺精盜汗，面色萎黃，一切虛症。

【處方】鹿胎一具（須重二斤以上者，去穢整成膏） 熟地黃 枸杞各十六兩 菟絲子二十兩 何首烏二十兩 石斛二兩 巴戟 黃芪 黨參各十兩

【制法】共碾極細面，加鹿胎膏為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，黃酒送下。

【備考】另有一方為：鹿胎一具，地黃 枸杞各八兩 菟絲子 何首烏各一斤 石斛六兩 巴戟肉五兩 人參四兩 制法、劑量及用法均同上。

三、撫順

【功能與主治】溫補子宮，補血調經。主子宮虛冷，久不孕育，月經稀薄，白帶頻頻，腹痛腰痛，身體羸瘦，面色萎黃，四肢清冷。

【處方】祁艾炭四兩 香附一兩五錢 當歸二兩 川芎一兩 白芍 元胡各一兩五錢 杜仲炭一兩 黃芪六錢 桂枝 姜炭各八錢 川斷一兩 紅花四錢 熟地二兩 吳萸八錢 懷牛膝 鹿胎膏各一兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重，

蜡皮封。

【劑量及用法】每服一丸，早晚一次，棗水送下。

【禁忌】陰虛火盛者忌服。

四、吉林、哈爾濱 （神效鹿胎丸、百補鹿胎丸）

【功能與主治】補腎填精，調月經，溫子宮，益氣養血。治腎虛陽痿，月經不調，子宮寒冷，虛勞等症。

【處方】萸肉 草薢 熟地 生地 寸冬 五味 小茴 故紙 盆子 鹿膠 杜仲 懷牛膝 青鹽 稻仁 歸身 巴戟 遠志 鎮陽 菟蓉 菟絲餅 巨勝 酒母 酒栢 草川椒各五錢 仙茅 枸杞 黃精 云苓 人參 山藥各一兩 首烏二兩 鹿胎一具

【制法】將鹿胎洗淨曬干，合諸藥一處碾細，煉蜜為丸，重二錢一分，大赤金為衣，用棉紙包之，外用蜡皮封固，貯于玻璃瓶或瓷罈中。

【劑量及用法】早晚各服一丸，棗湯為引，或淡鹽湯為引。

【禁忌】有相火盛，血熱者忌服。

五、呼和浩特 （秘制全鹿丸）

【處方】鹿胎一具（另） 海馬二對（另） 茯苓 首烏 人參（另） 仙茅 山藥 山萸 枸杞 故紙 蛇床 菟蓉 菟絲子各一兩 當歸 復盆子 巨勝 杜仲 巴戟各八錢 牛膝 遠志 龍骨 龜膠 附子 草薢 肉桂 鎮陽各六錢 茴香 沉香（另） 五味 澄茄各三錢

【制法】除鹿胎、海馬、人參、沉香外，研面合勻，每斤面兌沉香二錢、海馬一錢、硫黃二錢、鹿茸一錢、人參四錢。共為細面，蜜小丸。

附參考古方

【來源】沈氏尊生書：雜病源流犀燭。

【功能與主治】房慾。

【處方】鹿胎（去穢，煮爛）熟地八兩（用人乳粉、山藥各一兩，拌蒸九次） 菟絲子十兩（酒煮） 杞子八兩（乳浸） 制過首烏十兩（乳浸日曬夜露九次） 金石斛六兩（酒炒） 巴戟肉（酒炒） 黃芪（酥炙）各五兩 人參四兩

【制法】黃高膏丸。

鹿胎冷香丸

蘭 州

【功能与主治】調經種子，養血安胎，溫中止帶。主神經衰弱，子宮疾患，久不孕育，胎前產後諸症。

【處方】鹿胎一具 鹿茸一兩 黨參四兩 琥珀五錢 藏紅花五錢 柴胡一兩七 白芍二兩 坤草八兩 石脂一兩 白薇二兩 川芎八錢 益智一兩五 元胡一兩五 元肉三兩 薄荷八錢 鱉甲三兩 香附三兩 付蟪二兩 當歸二兩 桃仁一兩 甘草二兩 菊花炭二兩 金鈴子五錢 烏梅炭二兩 角霜四錢 桑參四兩 沉香一兩 油桂一兩 東參一兩 黃芪四兩 雞血藤一兩 蜚蠊炭五錢 白全參二兩

【制法】黃酒、乳汁，打為小丸，如梧桐子大，赤石脂及上硃砂為衣。裝瓶封固。

【劑量及用法】每日早晚各一次，每次三十粒，開水送下。

【禁忌】忌生冷硬物，氣惱憂勞。

齡 龜 丸

撫 順

【功能与主治】滋養強壯。腰腿痠痛，下肢萎弱，周身麻木，男子腎虛，女子血虧，氣短心跳，四肢無力，血枯經閉。

【處方】龜板一斤 當歸八兩 白芍八兩 牛膝五兩 桃仁二兩 紅花二兩 鹿膠二兩 杜仲三兩 黃耆 山藥各五兩

【制法】共為細面，水滾小丸。

【劑量及用法】每服一錢，一日二次，白水送下。

【禁忌】忌食生冷，孕婦勿服。

百補濟陰丸

青 島

【處方】益母草四兩 香附四兩 熟地八兩 龜絲子三兩 從蓉三兩 知母一兩 黃芪四兩 五味子一兩 黃柏一兩 炙草一兩 枸杞二兩 龜板二兩 大冬二兩 山英二兩 人參一兩

【制法】共為細面，蜜丸。

白 鳳 丸

一、北 京

【功能与主治】養血益氣，調經止帶。主婦人瘦弱，經水不調，崩漏帶下。

【處方】烏雞三十二只 人參 白芍 丹參 香附各八斤 當歸九斤 牡蠣(煨) 鹿角霜 桑螵蛸各三斤 甘草二斤 青蒿 天冬各四斤 熟地十六斤 以上十二味均下罐。除烏雞外共七十六斤，黃酒四十斤蒸下晝夜。

生地十六斤 川芎四斤 黃耆二斤 銀柴胡一斤半 芡實四斤 山藥八斤

以上六味不下罐，共重三十五斤八兩串粗木鋪槽，拌勻，晒干。

【制法】以上十九味，共為細粉，煉蜜為丸，重三錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。

二、天津(烏雞白鳳丸)

【功能与主治】補氣養血。主婦女血虛，月經不調，經期腹痛，白帶淋漓，腰腿痠痛，肢體浮腫，產後身體衰弱，虛汗發熱。

【處方】人參(去蘆) 鹿角膠 生白芍各八斤 當歸九斤 生牡蠣二斤 甘草二斤 生黃芪二斤 鱉甲(醋制)四斤 丹參 香附(醋制)各八斤 天冬四斤 桑螵蛸二斤 烏雞三十二只(去淨毛、腸子、爪尖，淨重不得低於四十二斤)

共十二味，計一百零九斤，用紹興酒八十四斤裝罐內(或不生鏽的桶亦可)，將罐口封固，隔水蒸煮，至酒盡為度。再將以下：鹿角霜三斤 熟地十六斤 生地十六斤 川芎四斤 銀柴胡一斤十兩 芡實(麩炒)四斤 生山藥八斤 軋成粗末，再和所蒸的藥料共和一起，攪勻晒干。

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，三錢五分重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

三、上海(烏雞白鳳丸)

【功能与主治】婦女體弱貧血，月經不調，臨經腹痛。

【處方】雄白鳳雞一支 甘草

(炙)一兩 蘆子二兩 黃芪(炙)四兩 丹參三兩 當歸四兩 茯苓三兩 續斷二兩 黃芩(酒炒)一兩五錢 熟地六兩 人參粉一兩五錢 春砂二兩 延胡索(炒)一兩五錢 驢皮膠二兩 白薇一兩五錢 香附(制)一兩五錢 白芍藥(酒炒)三兩 龜板膠三兩 黨參(炙)六兩 鹿角膠 川芎(炒) 毛鹿茸粉 於朮(炒) 枸杞子各三兩 益母草(制)六兩

【制法】先將白鳳雞纏死，洗淨去外毛內垢，加入枸杞子、熟地、於朮，加白酒蒸透去骨，搗爛和各藥(除參、茸、龜、鹿、驢皮膠)，打和烘干研細粉，再入參、茸粉拌和，再將龜膠、鹿膠、驢皮膠烊化加煉蜜為丸，大丸每丸潮重三錢，小丸如梧桐子大。

【劑量及用法】大丸每服一丸，小丸每服一錢。每日一次，溫開水送服。

【禁忌】生冷食物。

【備考】上列藥品，每料以毛雞三斤為標準，依此類推。

四、南京(烏雞白鳳丸)

【功能与主治】婦人羸瘦血虛有熱，經水不調，崩漏帶下，骨蒸等症。

【處方】白毛烏骨雄雞一只(另養一處，以黃芪炒米飼之，數日後閉死，去毛、腸洗淨) 制香附一斤 西當歸二兩 大熟地四兩 青蒿四兩 川牛膝二兩 斷艾葉四兩 知母二兩 白茯苓二兩五錢 秦艽一兩五錢 白芍二兩 淡干姜一兩 柴胡二兩 川貝母二兩 黃連一兩 生地黃二兩 延胡索一兩 西黃芪二兩 地骨皮一兩 牡丹皮二兩

【制法】上藥連烏骨雞共二十味，將艾葉、青蒿之一半，納入雞腹以內，其餘一半置雞外，同入罐內，用陳酒浸透，文火煮爛，取出檢去雞骨，緩火焙干，與余藥共研細末，以雞汁濃縮，酌加煉白蜜為丸，分做每粒三錢(潮重約二錢五分一粒)，用蜡壳封護。

【劑量及用法】每服一丸，丁癩臥時，開水化服。

五、武漢(烏雞白鳳丸)

【功能与主治】月經不調，崩漏帶下，及羸瘦虛弱等症。

【處方】白毛烏骨雄雞(去毛、

養)一斤半 青蒿四兩 陳艾葉四兩 三制香附四兩 杭白芍二兩 川黃連一兩 知母二兩 玄胡一兩 干姜一兩 秦艽一兩半 川牛膝二兩 地骨皮一兩 丹皮二兩 柴胡二兩 熟地四兩 川貝二兩 生地二兩 黃芪二兩 云茯苓二兩半 當歸二兩

【制法】先將雞去毛、腸、雜垢，再將艾葉、青蒿一半入雞腹內，余置雞外，同入罐內，以水浸漬高雞約二寸許。煮爛取出，再將各藥及雞混合搗勻，進行干燥，共同碾細，照淨粉量加煉蜜130—135%，和成為丸，大者每丸重為二錢，小者每丸重為一錢半，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服二錢。

六、福州(參茸白鳳丸)

【功能與主治】治婦人諸虛百病，久不孕育，常服則身體健康，精神加倍，未孕成胎，既孕安胎以及一切奇難等症皆能效驗，誠婦科之聖藥也。

【處方】人參一兩 杜仲一兩 川芎一兩 熟地一兩 於朮一兩 菟絲一兩 黑艾葉七錢半 炙甘草五錢 鹿茸一兩 茯苓一兩 當歸一兩 川椒五錢 大黃芪二兩 白芍二兩 香附一兩 阿膠一兩 白絨雞一尾

【制法】共研細末，和蜜為丸，每粒重四錢，白蜡壳封。

七、杭州

(女科烏雞白鳳丸)

【功能與主治】治婦人血虛陰亏，面黃肌瘦，神困體倦，虛勞成疾，月經不調，崩漏帶下，骨蒸潮熱，久不生育諸症。此丸補益氣血，調經種子。藥品純良，最宜常服。

【處方】白毛雄烏雞一只(縊死，去肚雜物，用黃酒二觔煮爛配入后藥)

黨參四兩 白芍(酒炒)二兩 川斷二兩 桑螵蛸二兩 炒於朮二兩 炙黃芪三兩 廣郁金二兩 川黨本二兩 茯苓(乳拌)三兩 三制香附四兩 地骨皮(酒炒)二兩 黃肉二兩 炙甘草一兩 杜仲三兩 煅龍骨二兩 丹皮二兩 當歸三兩 丹參二兩 煅牡蠣二兩 延胡索一兩 五錢 川芎二兩五錢 懷山藥二兩

五錢 白薇二兩 紅花一兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服一至四錢。淡鹽湯或米飲湯或開水送下。

八、南昌(烏雞白鳳丸)

【功能與主治】婦女體弱，月經不調，骨蒸潮熱，崩漏帶下。

【處方】白毛烏骨雞(去毛)一支 將青蒿四兩 艾絨四兩 裝入肚內，煮爛去骨，再加四制香附一斤研末拌雞，加入后藥：

白芍二兩 川黃連一兩 知母二兩 延胡索一兩 干姜一兩 秦艽一兩 五錢 懷牛膝二兩 地骨皮一兩 丹皮二兩 柴胡二兩 熟地四兩 川貝母二兩 生地二兩 黃芪二兩 茯苓二兩五錢 當歸二兩

【制法】共研細末，煉老蜜為丸。每丸重二錢，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸。溫酒或米湯送下。

【禁忌】辛辣、葷菜、生冷等物。

九、重慶

【功能與主治】治婦女羸瘦，血虛有熱，經血不調，崩漏帶下，不孕骨蒸等症。

【處方】白毛烏骨雄雞一只 香附十六兩 熟地黃四兩 生地黃二兩 當歸二兩 白芍二兩 黃芪二兩 川牛膝二兩 柴胡二兩 牡丹皮二兩 知母二兩 川貝母二兩 黃連一兩 地骨皮一兩 干姜二兩 延胡索一兩 茯苓二兩五錢 秦艽一兩五錢 艾葉四兩 青蒿四兩

【制法】先將艾葉、青蒿入雞腹內，用童便和水煮爛取出去骨，余藥和雞肉焙干，共研細末煉蜜為丸，每重二錢，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸。

【禁忌】油膩、葷菜。

十、西安(烏雞白鳳丸)

【功能與主治】治婦人貧血或病后虛弱，骨蒸潮熱及由此引起之月經不調，慢性子宮炎，赤白帶下，不易受孕等症。

【處方】一、香附一斤 熟地四兩 生地二兩 當歸二兩 白芍二兩 黃芪二兩 牛膝二兩 柴胡二兩 丹皮二兩 知母二兩 川黃連二兩 地骨皮二兩 干姜二兩 元胡各一兩 元參二兩半 秦艽一兩

半 艾葉 青蒿各四兩

二、烏骨雞一只

【制法】將烏雞殺死去毛及腸雜，入炖罐內加黃酒一斤，煎湯炖煮以肉離骨為準，取出將骨剔出，放火上炙黃，研末過羅，司雞肉待用，另將一項各藥共研細末與雞肉及骨粉和勻，共搗如泥，為丸二錢重，淨處陰干，蜡衣收藏。

【劑量及用法】每次一丸陳黃酒送，一日服一、二次。

【禁忌】肝臟發熱者不宜服。

【備考】此藥需冬季配制。

十一、蘭州(烏雞白鳳丸)

【功能與主治】補氣養血。主婦女血虛，月經不調，經期腹痛，白帶，腰痛腿痠，肢體浮腫，產後身體衰弱，出虛汗發燒。

【處方】黨參八斤 鹿角膠八斤 牡蠣三斤 白芍八斤 當歸九斤 甘草二斤 鹿角霜三斤 鱉甲四斤 丹參八斤 香附八斤 天冬四斤 桑螵蛸三斤 大熟地十六斤 烏雞三十二只 以上十四味均下罐用黃酒八十四斤蒸四晝夜。

生地十六斤 川芎四斤 黃芪二斤 銀柴胡一斤十兩 芡實四斤 山藥八斤 以上六味不下罐，共研粗末，墊底兌勻晒干。

【制法】共研細末，蜜丸三錢重，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

十二、大同(烏雞白鳳丸)

【功能與主治】調經養血，補虛散寒。

【處方】川芎 首烏 橘紅 阿膠 條芩 牛膝 木香 當歸 香附 白芍 益母草 熟地 干朮 茯苓 生地 琥珀 黨參各二兩 冰片一錢 丁香一錢 蘇木五錢 浙貝 桃仁 厚朴 沉香 血竭花 各五錢 枳壳三錢 麝香二分 硃砂二錢半 白毛烏雞一支

【制法】煉蜜為二錢丸。

【劑量及用法】每服一丸。

【禁忌】孕婦忌服。

十三、禹縣(烏雞白鳳丸)

【功能與主治】氣血雙亏，經血不調，骨蒸潮熱，崩漏帶下，久不生

育、血虧諸症。

【處方】潞黨參五兩 當歸身四兩半 白芍四兩 生地八兩 熟地八兩 川芎二兩 天冬二兩 麥冬二兩 丹參四兩 山藥四兩 山萸肉二兩 元絲子四兩 芡實二兩 炙龜甲二兩 桑螵蛸一兩五錢 銀柴胡八錢 制香附二兩 牡蠣一兩五錢 甘草八錢 鹿角膠四兩 鹿角霜一兩五錢 砂仁八錢 黃芪一兩

【制法】共為細面，用白毛烏雞一只，縊死去毛、腸、骨煮熟，與前藥合一處，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服一丸，米飲送下，白開水亦可。

【禁忌】孕婦忌用。

【備考】有效期二年。

十四、濟南(1)

【功能與主治】婦女休弱，月經不調，骨蒸潮熱，崩漏帶下。

【處方】白毛烏骨雞一只 香附四兩 制熟地四兩 生地 當歸 白芍 黃芪 川芎 膝 柴胡 丹皮 知母 貝母各二兩 黃連 地骨皮 干姜 延胡索一兩 茯苓二錢五分 秦艽一錢五分 斷艾四兩 青蒿四兩

【制法】先將雞去毛、腸、雜，將斷艾葉、青蒿一半入雞腹內，余置雞外，同入罐內，以童便和水浸過二寸許，煮爛取出，去骨焙干，再將各藥及雞共為細粉。用雞濃汁加蜜為丸，重二錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】辛辣、葷菜、生冷等物。

十五、濟南(2) 烏雞白鳳丸

【功能與主治】婦女體弱血虧，面黃消瘦，虛勞喘嗽，經血不調，經前錯后，行經腹痛，紫黑成塊，崩漏不止，久不受孕，胎動不安等症。

【處方】生地二斤 寄生六兩 當歸八兩 砂仁四兩 台參六兩 杭芍六兩 川芎六兩 香附八兩 白朮四兩 益母草八兩 木香二兩 丹參四兩 沉香四兩 丹皮四兩 艾炭二兩 生芪 青蒿 鱉甲 麥冬各四兩 知母八兩 肉桂二兩 烏雞二只

【制法】共為細面，每斤面兌人

參一兩、鹿茸二錢、肉桂五分，煉蜜為丸，每丸二錢五分重。

【劑量及用法】每服一丸，早晚用白開水送下。

十六、青島(烏雞白鳳丸)

【處方】川芎 荆芥 法夏 砂仁各五錢 當歸 元胡 麥冬 杏仁 吳萸 陳皮 貝母 人參 桃仁 木香 牛膝 紅花 白朮 木瓜 木通 乳香 杜仲 茯苓 干姜 續斷 燈心 青皮 香附 伏神 桑仁 丹皮 骨皮 寄生 棕炭 糯米 白芍 生地各一兩 艾葉四兩 青蒿四兩

【制法】用白毛烏雞一只，縊死去毛、腸用老酒煮熟，去骨入群藥，共軋面，煉蜜為丸，重四錢。蜡皮封固。

十七、沈陽(1)

【功能與主治】調經養血，利濕解熱。主婦人血虛而有濕，經血不調，骨蒸潮熱，四肢倦怠，飲食減少，精神萎靡，日漸消瘦，屢患流產。

【處方】同南京。

【制法】將艾葉入雞腹內，余置雞外，入罐內和水浸過二寸許，煮爛焙干研末。用雞湯打糊為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，空心白開水送下，一日二次，或用溫酒送下。

十八、沈陽(2)

(烏雞白鳳丸)

【功能與主治】養血益氣調經。主婦人虛弱，經血不調，骨蒸潮熱等症。

【處方】烏骨母雞(殺死去毛，洗淨，用祁艾、青蒿各四兩竹碎入雞腹內縫口，入錫鍋內，加黃酒煮透。將鍋內湯滷，連骨帶皮軋爛，入下藥(晒干碾面) 制香附一斤 熟地黃四兩 當歸 川芎 白芍 茯苓 人參 鱉甲各二兩 生地黃五兩 白朮 黃芪 牛膝 柴胡 丹皮 貝母 延胡索各二兩 京知母二兩 秦艽一兩五錢 干姜 地骨皮 川黃連各一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水或黃酒送下。

十九、撫順(烏雞白鳳丸)

【處方】香附一斤 熟地四兩 當歸三兩 川芎三兩 白芍三兩 白茯苓二兩 生地二兩 龜甲二兩 白朮二兩 黃芪二兩 川貝二兩 京知母二兩 丹皮二兩 柴胡二兩 牛膝二兩 大秦艽一兩半 骨皮一兩 干姜一兩 元胡一兩 黃連一兩 人參二兩

【制法】全烏雞一只去淨毛，用湯洗淨，用祁艾四兩，青蒿四兩，搗碎入雞肚縫住口，再入鍋內。用童便黃酒煮透將鍋內湯吃盡，並骨代皮同軋入群藥內，軋均晒干。蜜丸二錢大蜡皮封。

二十、承德

【功能與主治】婦女休弱，月經不調，骨蒸潮熱，崩漏帶下。

【處方】人參(去蘆) 鹿膠 川芎 香附(醋炙) 丹參 白芍 山藥各二斤 鹿角霜 牡蠣 桑螵蛸各十二兩 當歸身(酒洗)一斤四兩 甘草 黃芪(生)各半斤 生地 熟地各四斤 鱉甲 芡實 天冬各一斤 銀柴胡六兩 烏骨雞雞八只

【制法】前二日用四物加黃芪煎汁，煮高糧米喂雞，縊死，使其不吐血，去毛及五臟，和群藥同蒸，以川芎、丹參、銀柴胡、生地、芡實五味軋粗末，余味下罐加黃酒二十斤，蒸七晝夜，再和一起共軋細面，煉蜜為丸，重二錢五分，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】辛辣、葷菜、生冷之物。

二十一、呼和浩特

(婦科白鳳丸)

【處方】人參二兩 川芎 首烏 橘紅 甘草 川芎 木香 琥珀各五錢 阿膠 香附 白芍 桑寄生 益母草 當歸 熟地 於朮 茯苓 生地各二錢 蘇葉 沉香 浙貝 血竭 桃仁 紫朴各二錢 香一錢 枳殼二錢 冰片五分 麝香三分 白烏雞半支

【制法】以上共為粗末，裝入雞肚中，用黃酒煮透晒干，入為細面。每料連雞共重一斤，再加鹿茸，蜜丸，重一錢。珠衣蜡皮。

烏雞丸

一、廣州

【功能与主治】婦女久病體弱，月經不調，經前經後腹痛，產後貧血，大虛自眩。

【处方】五味子一兩 熟地四兩 北芪三兩 於朮三兩 白茯苓二兩 當歸一兩 白芍二兩 人參一兩 丹皮二兩 川芎一兩

【制法】將各藥洗淨，切碎隔水蒸透，晒干研成藥粉，又用烏毛雞宰淨入鍋內，用水煮爛，搗成糊狀，和入藥粉，再加淮山藥六兩，磨粉和入，制成大丸，每個二錢，用蠟壳封固。

【劑量及用法】除去蠟壳，用開水燉服，每服一丸。

二、福州烏雞種子丸

【功能与主治】治婦人氣血兩虧，腰痛腹痛，經水不調，宮寒不孕，赤白帶下等症。

【处方】太子參三兩 熟地四兩 五加皮一兩 炙芪三兩 茯苓二兩 當歸一兩 白芍二兩 丹皮二兩 川芎一兩 山藥六兩 於朮三兩

【制法】烏雞一尾和陳酒、童便蒸爛合和，晒干研末，冬蜜為丸。

三、沈陽

【功能与主治】養陰清肺，助氣健脾。治幼年男女虛弱發熱，吐痰咯血，自汗盜汗，飲食減少，四肢無力，骨蒸勞熱。

【处方】人參 黃芪 白朮 生地 何首烏 白芍 秦艽 陳皮 銀柴胡 前胡 胡連 黃芩 地骨皮 麥冬 川貝母 桑白皮 五味子 黃柏 桑知母 軟柴胡各一兩

【制法】上藥切片，碾細面，用烏雞一隻，取其骨肉，再用青島四兩，盛于甑器內，以火煮爛，然後將雞提出合前藥面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服一錢至二錢，空心米湯送下。

四、吉林(烏雞調經丸)

【功能与主治】補虛損，調經血，滋陰益氣，經血不調，赤白帶下，喘咳虛弱。

【处方】人參 當歸 熟地 白

芍 茯苓 香附各八錢七分 川芎 陳皮 秦艽 元胡 川貝 丹皮各四錢七分 甘草一錢四分

【制法】烏雞一隻，用黃耆末拌飯喂肥，將其縊死，去毛破開取出腸胃，再用好酒洗淨，將方劑中十二味藥品，裝在雞肚內，以綫縫住。用酒、醋等分，煮爛如泥。撈起焙干。共為細面。用蜜制成丸劑，重二錢。赤金為衣。蜡皮封固，貯于瓷罐中。

【劑量及用法】每服一丸，用黃酒送下。

附參考古方

【來源】1. 萬病回春。

【功能与主治】治婦人虛弱，咳嗽，吐痰，或骨蒸勞熱，或赤白帶下，或經水不調，形體瘦倦無力，或口干舌燥。

【处方】人參(去蘆)五錢 當歸(酒洗) 熟地(姜汁浸焙) 白芍(酒炒) 白茯苓(去皮)各一兩 香附(童便浸炒) 川芎 陳皮 秦艽 玄胡索 貝母(去心) 牡丹皮七錢 甘草五錢

【制法】以上剉成飲片研用，用黃芪為木拌飯餵烏骨雞，喂至雞肥，眼生多，縊死，燉去毛，破開取出腸胃，好酒洗淨，入前藥飲片在雞肚，以綫縫住，用酒、醋等分煮雞，至爛熟，即撈起焙干，或晒干，為細末，將雞汁打麵糊為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服五十丸，空心米湯吞服。

2. 存世保元。

【功能与主治】婦人年二十五、六歲，血海虛冷，經水不調，或時小腹疼痛，或下白帶如魚腦髓，或似米泔，不少信期，每日淋瀝不止，面色萎黃，四肢無力，頭暈眼花目眩，宜服四物補經湯，兼服烏雞丸調理。

【处方】海金沙 側柏葉(鹽水炒，焙干)各四兩 香附(炒)一兩 厚朴(姜炒)三兩 當歸(酒洗)二兩 白朮(去蘆) 川芎各一兩 白芍(酒炒)一兩 熟地二兩 羌活一兩 半 防風一兩半 人參一兩 砂仁一兩 粉草三錢。

【制法】上剉，用白毛烏肉膳雞一隻，不問三、五年者俱好，宰後去腸、灰、毛，將藥一半入雞肚中，放銅鍋內，好酒五壺，水二瓶文武火煮至干，取雞去骨，取肉切細，同藥晒干

為末，用粳米粉，酒水煮糊為丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每服百丸，空心米湯吞下，酒亦可。

溫經丸

一、北京

【功能与主治】養血溫經。主經期腹痛，煩熱嘔吐，婦人虛寒不孕。

【处方】吳茱萸 當歸 川芎 人參(去蘆) 杜枝 阿膠 干姜 甘草各二兩 半夏四兩 麥冬 白芍 丹皮各二兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重二錢，硃砂為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦勿服。

二、天津

【功能与主治】養血溫經，散寒止痛。主婦女血寒，經期腹痛，腰膝無力，濕寒白帶，血色暗淡，子宮虛冷。

【处方】黨參(去蘆) 白朮(麸炒)各一兩 茯苓(去皮)六兩 生黃芪四兩 制附子 厚朴(姜制)各二兩 干姜 黑龍金各四兩 肉桂(去粗皮)六兩 沉香二兩 吳茱萸(甘草水制)四兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸三錢重。蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、福州(十二溫經丸)

【功能与主治】治婦人小腹寒冷，久不受胎。兼治崩中下血，月水來多及至期不來。

【处方】吳茱萸三兩 當歸 川芎 白芍 人參 杜枝 阿膠 丹皮 甘草各二兩 生薑二兩 半夏半升(一本一升) 麥冬一升

【制法】共研細末，蜜煉為丸。

四、南昌

【功能与主治】月經不調，腰腹脹痛，赤白帶下。

【处方】吳茱萸(湯泡)二兩 丹皮二兩 白芍二兩 黨參二兩 杜枝二兩 當歸二兩 川芎二兩 黑

鹽皮膠二兩 炙甘草二兩 麥冬四兩 法半夏五兩 生薑二兩

【制法】共研細末，將方內黑鹽及膠烱化，加煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】日服二次，每服二至三錢，開水送下。

【禁忌】辛辣、生冷等食物。

五、吉 林

【功能与主治】調經，開瘀，止痛。主月經不調，子宮寒冷，赤白帶下，脾虛胃弱，氣虛等症。

【處方】吳茱萸二兩 當歸 川芎 酒芍 黨參 桂枝 阿膠 丹皮 甘草各一兩 二錢四分 半夏四兩 麥冬四兩

【制法】將以上藥品共為細面，煉蜜制成二錢重之丸劑。除包裝保存外，貯于瓷罇中。

【劑量及用法】每服一丸，黃酒送下。

安坤贊育丸

一、北 京

【功能与主治】益氣調經。主婦女經血不準，崩漏帶下，腹痛腰痠，日晡發熱，面色萎黃。

【處方】桑寄生 雞血藤 甘草 琥珀各十六兩 青毛鹿茸 陽春砂 阿膠各九十六兩 龍眼肉四十兩 乳香 赤石脂(生) 肉豆蔻 黃耆 紅雞冠花各二十四兩 於朮 沒藥各四十八兩 血余(煅) 人參(去蘆)各八兩 斷艾炭 澤瀉 茯苓 杜仲 白薇 玄胡索 秦艽 龜板(炙)各三十二兩 熟地 當歸 白芍各六十四兩 香附 川牛膝各五十六兩 紫蘇叶二十兩 烏藥十二兩 補骨脂四十四兩 天冬四十六兩 藏紅花二兩二錢 生地 棗仁 砂仁各六十四兩 柴胡 藁本 青蒿各二十四兩 川芎四十八兩 白朮九十六兩 紫丹參 木香各八兩 遠志三十二兩 橘皮五十六兩 續斷四十兩 沉香五十二兩

【制法】以生地、砂仁、柴胡、川芎、棗仁、藁本、橘皮、木香、續斷、紫丹參、白朮、青蒿、沉香、遠志十四味軋末鋪槽，余藥下罐，加黃酒一千二百八十四兩蒸透，再加一起共為細粉，煉蜜為丸，重三錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌氣惱；忌食生冷；孕婦忌服。

二、天 津

【功能与主治】補氣，養血，調經，常服身體健康。主氣虛血弱，心跳失眠，頭昏眼花，經血虧少，精神不振，四肢無力，腰痠腿疼，產後體弱，大便溏瀉，崩漏帶下，骨蒸潮熱。

【處方】北沙參二斤 菟絲子一斤 龜板(醋制)二斤 秦艽二斤 鹿茸(去毛)六斤 菴蓐(酒煮)一斤八兩 制乳香一斤八兩 血余炭八兩 艾炭二斤 絲綿炭八兩 茯苓(去皮)一斤 香附(醋制)二十四斤 桂元肉二斤八兩 雞血藤一斤 川牛膝三斤八兩 鎖陽 鱉甲(醋制)各二斤 枸杞子一斤八兩 制沒藥三斤 甘草一斤 人參(去蘆)八兩 白薇二斤 懷牛膝三斤八兩 琥珀一斤 雞冠花一斤八兩 當歸四斤 黃柏二斤 西紅花二兩二錢 生阿膠六斤 烏藥十二兩 紫河車五斤 生黃芪一斤八兩 天冬二斤十四兩 桑寄生一斤 杜仲炭(鹽炒)一斤 故紙(鹽炒)二斤十二兩 生白芍四斤 元胡(醋制)二斤 鹿尾(去毛)一斤十四兩 丹參八兩 鹿角膠一斤八兩(上藥用黃酒一百斤共裝入罐，或生不銹的桶內，將口封固，隔水蒸煮，至酒盡為度)續斷二斤八兩 川芎三斤 遠志肉(甘草水制)二斤 沉香三斤四兩 熟地四斤 澤瀉二斤 紅花一斤 山萸肉(酒制)二斤 黃芩二斤八兩 砂仁六斤 藁本一斤八兩 生於朮三斤 廣木香八兩 生地 炒棗仁各四斤 蘇叶一斤四兩 橘紅二斤 柴胡一斤八兩 廣皮三斤八兩 白朮(麸炒)六斤 肉豆蔻(滑石煨)一斤八兩 青蒿一斤八兩 煅赤石脂一斤八兩(以上軋成粗末)

【制法】共研一起，拌勻晒干，研為細粉，煉蜜為丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、濟 南(1)

【功能与主治】婦女月經不調，

崩漏帶下，腰痠腹痛，面色萎黃。

【處方】桑寄生 乳香 斷艾 熟地 杜仲 制香附 山萸肉 鱉甲 沒藥 琥珀 白芍 烏藥 當歸 紅花 龜板 澤瀉 砂仁 柴胡 廣陳皮 遠志 酸棗仁各八兩 木香二兩 川芎四兩 沉香四兩 青毛鹿茸四兩

【制法】共為細末，煉蜜為丸，重三錢。蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】忌氣惱及辛辣生冷等物。

四、濟 南(2)

【功能与主治】月經不調，經期腹痛，胸膈痞悶，赤白帶下等症。

【處方】益母草二斤(分作四分，用鹽水、黃酒、姜汁、醋炙干 燥備用) 香附四兩(用鹽水、黃酒、姜汁、醋分四分炙) 黃芩四兩 粉甘草四兩 芍(酒炒)四兩 赤芍(酒炒)一兩 川貝(去心)一兩 血竭一兩 丹參四兩 陳皮一兩 川芎一兩 阿膠一兩(蛤粉炒) 南紅花一兩 生地二兩 熟地三兩 麥芽二兩 當歸(酒炒)一兩 乳香(炒透)五錢 沒藥(炒透)五錢 砂仁二兩 木香一兩 云苓一兩 丹皮一兩 杜仲(炒炭)一兩 斷艾一兩(炒炭) 白朮(土炒)一兩 寸冬一兩

【制法】共研細粉，水泛小丸，綠豆大，硃砂為衣。

【劑量及用法】早晚各服二錢。腹痛下痢嘔吐姜湯送服；產後諸症黃酒送服。余皆白開水送下。

【禁忌】生冷食物。

五、青 島

【處方】當歸二兩 阿膠二兩 莪朮一兩 川芎一兩 艾叶一兩 桃仁一兩 棕炭三兩 歸尾二兩 紅花一兩 糯米二兩 茯苓三兩 白朮二兩 白芍一兩 神曲三兩 黃芩一兩 桔梗一兩 麥芽一兩 青皮一兩 陳皮一兩 香附二兩 麥冬一兩 五味子一兩 九皮三兩 骨皮二兩 桑皮一兩 牛膝二兩 骨碎補二兩 虎骨膠一兩 腹皮一兩 木香一兩 木通一兩 灯心五錢 黃芪一兩 人參一兩 童便一盅 昆茸一兩

【制法】共軋細末，蜜丸重四錢，蜡皮。

濟坤丸

一、北京

【功能与主治】养血健胃安神。主婦女經期不准，胸膈不舒，食慾不振，心跳不眠。

【处方】紫丹參一兩 益智仁一兩 木通一兩 當歸二兩 桔梗一兩 生地二兩 龍胆草二兩 遠志五錢 天冬二兩 棗仁五錢 麥冬二兩 草薢五錢 川棟子四錢 烏藥八錢 茯苓二兩 白芍二兩 於朮八錢 建神麴四兩 阿膠五錢 丹皮一兩 青木香八錢 藏紅花二兩 枳殼一兩 橘皮八錢 熟地四兩 香附四錢(制) 稻芽一兩 玄胡索二兩 青皮一兩五錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重三錢，硃砂為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，黃酒炖化服，或溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天津

【功能与主治】調經養血，健胃安神。主經期不准，血色紫黑，崩漏帶下，腰痠腹痛，心跳不眠，胸膈不舒，食慾不振。

【处方】丹參 丹皮各一兩 當歸二兩 生地二兩 熟地四兩 桔梗一兩 生白芍 天冬 麥冬 元胡(醋制)各二兩 木通一兩 紅花二兩 牛阿膠 炒棗仁 遠志肉(甘草水制)各五錢 川棟子(酒蒸)四錢 陳皮八錢 烏藥八錢 炒稻芽一兩 澤蘭二兩 茯苓(去皮)二兩 蓮子(去心)四兩 胆草二兩 廣木香八錢 蟬蛻一兩 草薢五錢 香附(醋制)四兩 枳殼(數炒)一兩 生於朮八錢 青皮(醋炒)一兩五錢 厚朴(姜制)二兩 炒益智仁一兩

【制法】共為細粉煉蜜為丸，四錢重，每斤丸藥用硃砂面三錢上衣，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、蘭州

【功能与主治】調經養血，經血

不調，經期不准，血色紫黑，漏下帶下，腹內痞塊，肚腹脹痛，產婦胎產艱難。

【处方】丹參一兩 丹皮一兩 當歸一兩 生地二兩 熟地四兩 桔梗一兩 白芍二兩 元胡二兩 天冬二兩 木通一兩 紅花二兩 阿膠五錢 遠志五錢 棗仁五錢 陳皮八錢 川棟四錢 烏藥八錢 谷芽一兩 蓮子四兩 澤蘭二兩 茯苓二兩 益智一兩 胆草二兩 木香八錢 蟬蛻一兩 香附四兩 草薢五錢 枳殼一兩 於朮八錢 青皮一兩 厚朴一兩

【制法】共研細末，蜜丸四錢重。硃衣。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

坤順丸

(參茸濟陰坤順丸)

南京

【功能与主治】益氣，調經。主婦女血氣不足，腹冷腹痛，形寒，頭暈，帶下，腰痠，經水不調。

【处方】鹿茸四兩 五靈脂四兩 石柱參二兩 紫丹參二兩 龜板膠二兩 延胡索二兩 鹿角膠二兩 淡黃芩二兩 阿膠四兩(炒珠) 川斷二兩 潞黨參五兩 川芎四兩 炙黃芪五兩 醋制香附二兩 西當歸六兩 炙甘草二兩 大熟地一兩 廣郁金二兩 川貝母六兩 春砂仁二兩 龜絲子六兩 白芍二兩 枸杞子五兩 大黃炭二兩 白茯苓五兩 陳皮四兩 白朮五兩 上肉桂一兩五錢

【制法】將熟地煮爛，和蜜為大丸，每粒一錢，蜡殼封固。

【劑量及用法】每服一丸，開水和服。

培坤丸

西安

【功能与主治】治婦女月經不調，赤白帶下，子宮炎，身困肢懶，腹痛肢冷各症。

【处方】炙黃芪三斤 白朮三斤 炙草八兩 廣陳皮二斤 當歸五斤 川芎一斤 杜仲一斤 揀砂仁九兩 北沙參一斤 云茯苓二斤 棗仁二

斤 寸冬二斤 杜仲(炒)二斤 核桃仁一斤四兩 蘆巴子二斤八兩 醋炒艾葉一斤 元肉二斤 山藥二斤 遠志肉四兩 熟地黃四斤 五味子八兩 酥油四兩

【制法】各藥研為細末，以酥油溶拌微炒，煉蜜為丸，梧桐子大。

【劑量及用法】每次二錢，黃酒或白開水送下。

【禁忌】中熱肝郁者不宜服用。

月事丸

蘭州

【功能与主治】調經活血，益氣養榮。主經血不調，顏色不正，赤白帶下，漏血不止，血凝痞塊，肚腹隱痛，子宮寒冷等症。

【处方】益母草一兩 白芍五錢 川芎一錢 紫蘇二錢五 橘紅五錢 阿膠二錢 廣木香一錢五 甘草一錢五 砂仁二錢五 香附子五錢 牛膝二錢 沉香二錢 黨參四錢 歸身一兩 白朮一兩 蘇木一兩 白薇二兩 白芷二兩 沒藥二兩 丹皮二兩 元明粉二兩 石脂二兩 桂心五錢

【制法】上藥共研細面，冰糖水打小丸，硃砂、滑石為衣。

【劑量及用法】每服二十粒，每日二次。白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

烏賊骨丸

一、福州

(女科烏賊丸)

【功能与主治】治婦人氣血虛弱，赤白帶下，月事衰少，肢體羸瘦，恐成癆瘵，此方能補介經八脈。

【处方】烏賊骨四兩 茜草一兩

【制法】共研細末，雀卵為丸。

【劑量及用法】每服一錢，鮑魚湯送。

二、杭州

(四烏賊骨一蘆茹二妙丸)

【功能与主治】治氣竭肝傷，婦人脫血血枯，月經衰少，面黃肌瘦，赤白帶下，久延不治漸成虛癆之症。此丸益氣養血，舒肝調經。

【处方】同福州。制法及用量等均同。

【備考】蘆茹即茜草的古名。

寧 坤 丸

一、南 京

【功能与主治】調經。主月經不調。

【处方】吉林人參四錢（另研和入）白芍一兩 益母草六兩 广木香五錢 大熟地一兩 琥珀五錢（另飛）制香附一兩 淡黃芩五錢 生地黃一兩 西砂仁五錢 上沉香一兩 紫蘇叶五錢 西當歸一兩 阿膠五錢（擦丸另化）橘紅一兩 川牛膝四錢 炒白朮一兩 炙甘草三錢 川芎一兩 烏藥一兩 白茯苓一兩

【制法】上藥共二十一味，共研細末和勻，以阿膠化開加煉白蜜為丸。每粒計重二錢。

【劑量及用法】每服一丸，開水化服。

二、武 漢

【功能与主治】婦人月經不調，腹痛腰酸等症。

【处方】黨參四錢 茯苓一兩 阿膠五錢 沉香一錢 白朮（土炒）一兩 香附一兩 琥珀五錢 牛膝四錢 生地一兩 烏藥一兩 蘇叶五錢 熟地一兩 川芎一兩 广木香五錢 炙甘草三錢 橘紅一兩 黃芩（酒丸）五錢 益母草六兩 西砂仁五錢 白芍（炒）一兩 全當歸一兩

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜160%~165%，和成大丸，每丸重為二錢，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸。

【禁忌】孕婦勿服。

三、广 州

【功能与主治】婦女身體虛弱，月經不調，經前經后腹痛腰痛。

【处方】同武漢。

【制法】將上列各藥洗淨，切碎隔水蒸透晒干。研成細藥粉，拌蜜糖制成大丸，每個重二錢，用蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，溫酒或滾水送服。

四、福 州

【功能与主治】治婦人經水不調，諸虛百損，胎前產后一切病。

【处方】同武漢。

【制法】共研細末，冬蜜為丸，每重一錢五分。蜡封。

五、杭 州

（婦寶寧坤丸）

【功能与主治】治婦人氣血兩虧，月經不調，崩漏帶下，諸虛百損，久不受孕，一切胎前產后諸病。此丸調經種子，養血安胎，乃婦科常用之藥也。

【处方】吉林人參二錢 大熟地五錢 制香附五錢 紫蘇叶二錢五分 大生地五錢 蠟皮膠二錢五分 全當歸五錢 广橘紅五錢 川牛膝二錢 於朮五錢 沉香一錢 川芎五錢 台烏藥五錢 西砂仁一錢五分 炒黃芩五錢 西琥珀二錢五分 白茯苓五錢 广木香二錢五分 炙甘草一錢五分 東白芍五錢 益母草二兩

【制法】上藥各取淨粉，用柏子仁一兩，煎湯去渣和煉白蜜為丸，每重二錢，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸。引藥另詳仿單。或用開水化服。

六、南 昌

【功能与主治】月經不調，腹痛腰痛。

【处方】同武漢。

【制法】共研細末，煉蜜為丸，每粒重二錢。蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】生冷、辛辣、油膩等物。孕婦忌服。忌氣惱。

七、重 慶

【功能与主治】治婦女經水不調，諸虛百損，胎前產后一切病症。

【处方】黨參四兩 川牛膝四兩 熟地十兩 生地十兩 香附十兩 當歸十兩 橘紅十兩 白朮十兩 川芎十兩 烏藥十兩 茯苓十兩 白芍十兩 蘇叶十兩 阿膠五兩 砂仁五兩 黃芩五兩 琥珀五兩 广木香五兩 沉香一兩 炙甘草三兩 益母草六十兩

【制法】除阿膠用酒燉化，臨時加入外，余藥共研細末，煉蜜為丸，每重二錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸。

【禁忌】忌氣惱、生冷、油膩。

八、禹 县

【功能与主治】經水不調，或前或后，小腹疼痛，赤白帶下，種子安胎，崩漏不止，骨蒸勞熱，一切郁結。

【处方】同武漢。

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

【禁忌】男子及小兒忌服。

【備考】有效期二年。

益 母 丸

一、广 州

【功能与主治】月經不調，經來腹痛。

【处方】益母草八兩 當歸一兩 赤芍二兩 木香二兩

【制法】將上列各藥洗淨，切碎隔水蒸透，晒干研成細粉，拌蜜糖為大丸，每個重一錢五分，用蜡壳封固。

【劑量及用法】用水燉溶內服，每次服一丸。

二、杭 州

（大顆益母丸）

【功能与主治】治經水不調，腹有癥瘕，久不受孕，赤白帶下，惡露不淨，氣滯腹痛，一切經產諸症。此丸調氣活血，祛瘀生新，皆有特效。

【处方】鮮益母草八兩（取嫩叶晒干，蜜拌九蒸九晒淨四兩）當歸二兩 酒赤芍二兩 广木香二兩

【制法】研為細末，煉蜜為丸，每重三錢，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，杵碎開水送下，口服二次。

三、大 同

【功能与主治】血崩，經期不行，血熱頭暈，經期腹痛。

【处方】益母草一斤 白芍二兩 熟地四兩 黨參四兩 茯苓二兩 川芎二兩 艾炭四兩 當歸二兩 香附二兩 木香五錢 草霜二兩

【制法】以上十二味，共軋細面，

煉蜜為二錢重丸，蜡皮。

【劑量及用法】每次服一粒，日服二次。

四、禹 县

【功能與主治】經水不調，腹有癥瘕，久不受孕。

【處方】益母草八兩 當歸二兩 赤芍藥二兩 廣木香二兩

【制法】共為細面，蜜丸，重二錢。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌用。

【備考】有效期二年。

五、濟 南(1)

【功能與主治】治產後惡露不淨，腹痛。去瘀生新。

【處方】益母草一斤 當歸二兩 川芎一兩 炮姜一兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，每丸重一錢五分。

【劑量及用法】每服一丸，黃酒紅糖水送下，或白開水亦可。

六、濟 南(2)

(四制益母丸)

【功能與主治】行經腹痛，腹脹脇滿。

【處方】益母草三十二兩 當歸十六兩 川芎八兩 木香八兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，三錢重。蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，溫開水送下。

七、青 島

【處方】益母草半斤 當歸二兩 白芍二兩 木香 砂仁 丹皮 一兩

【制法】共軋面，重二錢五分。

八、呼 和 浩 特

(四制益母丸)

【處方】坤草半斤 當歸 赤芍 木香各二兩 人參

【制法】共為細面，蜜大丸，重二錢。蜡皮封固。

附參考古方

【來源】1. 張氏醫通。

【功能與主治】經水不調，腹有

癥瘕，久不受孕等症。

【處方】益母草半斤 當歸 木香 赤芍各二兩

【制法】為末，蜜丸梧子大。

【劑量及用法】每五十丸白湯下，隨症引用。

2. 萬病回春。

【功能與主治】治婦人胎前產後，或阻產胎胞不下，血暈不醒，或惡露不尽，俱可服之。

【處方】益母草(陰干)

【制法】五月五日午時，取益母草陰干，搗為細末，煉蜜為丸，如圓眼大。

【劑量及用法】每服一丸，童便、好酒各半，研化服之，不飲酒，姜湯化下。

四制益母丸

一、福 州

【功能與主治】治婦人胎前產後諸般病症，未孕則調經，既孕則安胎，調和經脈，祛散風邪。

【處方】炙甘草一兩半 川撫芎一兩半 漂白朮二兩 九蒸地八兩 酒白芍二兩 廣木香一兩 益母草四兩 艾葉四兩 炒阿膠一兩 茯苓二兩 香附四兩 當歸四兩 縮砂仁二兩 京丹參二兩 陳皮二兩

【制法】共研細末，和蜜為丸，每粒重一錢五分，黃蜡封固。

二、青 島(1)

【處方】坤草一斤半 橘紅五兩 白芍五兩 白朮五兩 當歸五錢 沉香五錢 川芎五兩 砂仁二錢五 生地二兩 木香二兩五 茯苓五兩 牛膝二兩五 烏藥五兩 甘草二兩 人參二兩 琥珀二兩五

【制法】共軋面，蜜丸重二錢五。蜡皮。

三、青 島(2)

【處方】坤草四兩 白朮四兩 香附二兩 熟地四兩 川芎一兩 杜仲二兩 桑寄生二兩 祁艾炭一兩 陳皮一兩 川斷二兩 當歸三兩 白芍一兩 黨參二兩 木香五錢 炙草五錢 阿膠二兩 砂仁五錢 茯苓二兩

【制法】共軋面，蜜丸重二錢五。蜡皮。

八珍益母丸

一、北 京

【功能與主治】益氣調經。主經期不准，色淡量少，白帶過多，腰痠倦怠。

【處方】益母草 人參(去蘆) 白朮 茯苓 當歸 甘草 川芎 白芍 熟地各二兩

【制法】共為細粉，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服三錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天 津

【功能與主治】益氣調經。主婦女經期不准，行經腹痛，色淡經少，白帶過多，不思飲食。

【處方】黨參(去蘆)二兩 生白朮一兩五錢 當歸二兩 甘草一兩 茯苓(去皮)二兩 熟地二兩 川芎一兩 白朮(蜜炒)二兩 益母草八兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、上 海

【功能與主治】調經補血。

【處方】黨參二兩 白朮(炒)二兩 茯苓二兩 熟地二兩 甘草(炙)二兩 川芎二兩 白芍藥(醋炒)二兩 當歸(酒洗)二兩 益母草二兩

【制法】共研細粉，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送服。

【禁忌】酸冷性食物。

四、南 京

【功能與主治】補養氣血，調經止帶。

【處方】益母草二兩 酒洗當歸二兩 潞黨參二兩 川芎二兩 炒白朮二兩 醋炒白芍二兩 白茯苓二兩 大熟地黃二兩 炙草二兩

【制法】上約九味，共研細末，加煉白蜜為丸，每錢約做二十粒。

【劑量及用法】每服三錢，一日

一次，空腹時開水吞服。

五、武 漢

【功能与主治】体虛勞倦，經期不准，斷續無定或赤白帶下，身作寒熱。

【处方】党參 白朮(土炒) 茯苓 當歸(酒洗) 炙甘草 川芎 熟地黃 白芍(醋炒) 益母草(去根，忌鐵器，在開紫紅花時期採取者為佳)各二兩

【制法】小丸——取上藥進行干燥，混合碾細，照淨量加煉蜜68—70%，迭成小丸。每錢不得少于二十五粒。

大丸——如法得淨粉后，加煉蜜145—150%，和成大丸，每丸重為三錢。

【劑量及用法】每服三錢，早、晚空腹服二次。

六、杭 州

【功能与主治】治氣血兩虛，飲食少思，四肢無力，月經不調，或先或后或斷或續，腰痠腹痛，赤白帶下，常發寒熱，久不受孕等症。常服大有奇功。

【处方】潞黨參二兩 炙甘草一兩 酒白芍二兩 炒冬朮二兩 全當歸二兩 大熟地三兩 白茯苓二兩 川芎二兩 制香附三兩

【制法】共研細末，用益母膏和蜜打丸。

【劑量及用法】每服三至四錢。開水送下。

七、南 昌

【功能与主治】氣血兩虧，食少無力，月經或前或后，或斷或續，或赤白帶下，身作寒熱。

【处方】黨參二兩 白朮(土炒)二兩 炙甘草二兩 當歸(酒洗)二兩 茯苓二兩 川芎二兩 白芍(醋炒)二兩 熟地(酒洗)二兩 益母草(只用上半節帶葉者)二兩

【制法】共為細末，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】日服二次，每服三錢，空腹時開水送下。

【禁忌】忌食生冷、辛辣等物。孕婦忌服。

八、沙 市

【功能与主治】治婦女氣血兩虧，食少倦怠，月經不調，赤白帶下等症。

【处方】黨參八兩 土炒白朮七兩五錢 茯苓七兩五錢 粉甘草四兩 熟地 當歸各十兩 白芍七兩五錢 川芎五兩 益母草十兩

【制法】上藥研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每次服二錢，空腹溫開水下。每日服二次。

【禁忌】水份不足者忌服。

九、重 慶

【功能与主治】治氣血兩虧，食少無力，月經或先或后或斷或續，赤白帶下，身作寒熱。

【处方】同北京

【制法】共研細末，煉蜜為丸，紙盒包裝。

【劑量及用法】每服三錢至五錢。

十、蘭 州

【功能与主治】調經養血，順氣安胎。主婦女經血不調，體衰經少，行經腹痛，不思飲食等一切身體衰弱等症。

【处方】黨參四兩 白芍一兩五錢 當歸二兩 甘草一兩 茯苓二兩 熟地二兩 川芎一兩 益母草八兩 白朮一兩

【制法】以上共為細面，煉蜜為丸，每丸重三錢。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

十一、大 同

【功能与主治】氣血兩虛，產後發燒。

【处方】黨參四兩 白朮四兩 茯苓三兩 川芎二兩 當歸四兩 熟地四兩 白芍一兩半 炙甘草二兩 益母草一斤

【制法】共為細面，煉蜜為一錢大丸。

【劑量及用法】每服三丸，白開水送下。

十二、禹 縣

【功能与主治】氣血兩虛，食少無力，月經不調，或先或后，或斷或續，赤白帶下，身作寒熱。

【处方】同北京

【制法】共為細面，蜜丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空心服，黃酒送下。

【禁忌】孕婦忌用。

【備考】有效期二年。

十三、青 島

【处方】當歸一斤 川芎一斤 白芍十二兩 坤草十斤 白朮十二兩 茯苓半斤 杜仲半斤 陳皮半斤 枳殼半斤 熟地半斤 桑寄生半斤 炒艾半斤 甘草六兩

【制法】共軋面，蜜丸重二錢五。

十四、沈 陽(1)

【功能与主治】化瘀生新。主氣血兩虛，食少無力，月經或先或后或斷或續，赤白帶下，身作寒熱，行經腹痛，產後瘀血不盡等症。

【处方】益母草四兩 人參二兩 炒白朮二兩 茯苓二兩 當歸四兩 制甘草二兩 川芎二兩 白芍二兩 熟地二兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空腹開白水送下。

十五、沈 陽(2)

(人參益母丸)

【功能与主治】補氣養血，生新化瘀。主氣血兩虛，經脈不調，產後傷血過多，大暈眼黑，心神恍惚，瘀血不行，惡露不盡，臍腹攻痛，阻虛自汗，榮衛失和者統能治之。

【处方】人參一兩半 茯苓一兩半 制甘草一兩半 炒白朮二兩 熟地二兩四錢 川芎一兩半 白芍一兩半 當歸二兩 益母膏一斤

【制法】以上八味，共碾細面，再兌益母膏加蜜為丸二錢重，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，溫黃酒送下。

【禁忌】生冷硬物。

十六、撫 順

(人參益母丸)

【功能与主治】榮養補血調經。主貧血衰弱，月經不調先后不定，食少無力，赤白帶下淋漓不斷，腰痛腹痛，面色蒼白，產前諸症，胎動漏血，產後惡露不盡，腰痛腹痛，血多火暈。

【处方】白人參二兩 熟地 甘草 當歸 白芍 川芎 云苓 白朮各四兩 益母草一斤

【制法】共為細面，蜜丸二錢重，蠟皮封。

【劑量及用法】每服一丸，每日二次，產後黃酒送下，白水亦可。

【禁忌】生冷寒涼等物。

十七、呼和浩特

(人參益母丸)

【處方】益母草八兩 黃芩 白芍各一兩 茯苓一兩五錢 縮砂 川芎各一兩 當歸 白朮各二兩 熟地三兩 人參 甘草各一兩

【制法】共為細面，蜜丸，重二錢，半金衣，蠟皮封固。

十八、吉林、哈爾濱

(益母丸，人參益母丸)

【功能與主治】生新化瘀。主氣血虛弱，經期或先或後或續或斷，食少無力，赤白帶下，淋漓不斷，腰腿痠痛，面蒼氣短，惡露不盡，少腹疼痛，上串攻心，胸膈脹悶。

【處方】益母膏四兩 人參四兩 白朮四兩 塊苓四兩 炙草四兩 川芎四兩 白芍四兩 熟地四兩

【制法】共為細面，煉蜜為二錢一分重丸，大赤金衣。棉紙包裹，蠟皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，紅糖水為引。

【禁忌】孕婦忌服。

【備考】棉紙包裹，蠟皮封。

十九、承德

【功能與主治】益氣調經。主經期不準，色淡量少，白帶過多，腰痠倦怠。

【處方】同北京。制法亦同。

【劑量及用法】每服三錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二十、呼和浩特

【處方】黨參 炙草 川芎 白芍各一斤四兩 白朮 茯苓 當歸各二斤半 熟地三斤十二兩 益母草十斤

【制法】蜜丸，重二錢五分。

宋氏益母丸

大 同

【功能與主治】調和氣血，產後瘀血。

【處方】益母膏四兩 全當歸二兩 杭白芍二兩 川芎二兩五錢 銀柴胡五錢 廣木香五錢

【制法】共為細面，煉蜜為丸，每重一錢。

【劑量及用法】每日空心服一丸。

調經丸

一、北京(養血調經丸)

【功能與主治】理氣調經，止痛散瘀。主經期腹痛，氣滯血瘀。

【處方】當歸 熟地 香附(制)各八兩 川芎 橘皮 枳殼 白朮 小茴香 蘇艾炭 山藥 莪朮 三稜 玄胡索 琥珀 沉香 白芍 青皮 益母草 紅花各二兩 厚朴 砂仁各四兩 肉桂一兩

【制法】共為細粉，水泛小丸。滑石九成，酥砂一成為衣，圓亮。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌憂思抑鬱。孕婦忌服。

二、天津

【功能與主治】調經養血。主經期不準，行經腹痛，血虛血寒，血色暗淡，經閉經少，四肢痠痛。

【處方】熟地六兩 生白朮二兩五錢 香附(醋制)十二兩 麥冬三兩 制半夏三兩 白朮(蜜炒)二兩五錢 丹皮二兩 制沒藥一兩五錢 川芎三兩 艾炭二兩 生阿膠六兩 小茴香(鹽炒)一兩五錢 陳皮二兩 當歸四兩五錢 茯苓(去皮)續斷各二兩 益母草六兩 元胡(醋制)一兩五錢 黃芩三兩 甘草一兩 吳萸(，草水制)一兩五錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸三錢重。蠟皮或蠟紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、上海(調經益母丸)

【功能與主治】月經不調，經來

腹痛。

【處方】香附(制)二兩 川芎一兩 白芍藥(炒)二兩 延胡索一兩 干姜一兩 桃仁(去皮尖)一兩 蒲黃(炒焦)一兩 熟地四兩

【制法】共研細粉，用益母膏八兩烱化，和蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，溫開水送服。

【禁忌】酸冷食物。

四、南京(婦科調經丸)

【功能與主治】調經，和血。主月經不調，腰痠腹痛。

【處方】益母草二十兩 五靈脂七兩 制香附一兩 香白芷七兩 西當月十四兩 薄官桂七兩 廣陳皮十四兩 白薇七兩 延胡索七兩 蘇本七兩 撫川芎七兩 粉甘草七兩 炒白芍七兩 制沒藥七兩 白茯苓七兩 鹿角膠七兩 炒白朮七兩 西黨參五兩五錢 大熟地七兩 西砂仁五兩 牡丹皮七兩 阿膠七兩 淡黃芩七兩

【制法】上藥二十二味，共研細末，以阿膠烱化，加煉白蜜為丸，每錢約做二十粒。

【劑量及用法】每服三錢，一日二次，空腹時開水吞服。

五、武漢(調經益母丸)

【功能與主治】月經不調，腰痠腹痛，赤白帶下，身作寒熱。

【處方】熟地四兩 桃仁一兩 玄胡一兩 川芎一兩 蒲黃一兩 干姜一兩 香附二兩 白芍二兩 當歸二兩

【制法】小丸。一取上藥進行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜25~28%、益母膏25~28%，迭成小丸。每錢不得少于二十五粒。大丸。一如法得淨粉后，加煉蜜70~75%、益母膏70~75%，和成大丸。每丸重為一錢。

【劑量及用法】每服三錢，空腹時用蜜湯或陳酒送下。

【禁忌】孕婦忌服。

六、廣州

【功能與主治】月經不調，經來腹痛，月經過多。

【處方】吳萸一錢 丹皮一錢

白芍一錢 人參二錢 肉桂一錢
 當歸一錢 川芎一錢 阿膠二錢
 甘草一錢 麥冬二錢 半夏二錢

【制法】將上列各藥洗淨，切碎隔水蒸透晒干，研成藥粉，拌蜜糖為丸，每重一錢一分。用蜡壳封固。

七、杭州(調經養血丸)

【功能與主治】治婦人血虛氣滯，經水不調，赤白帶下，難於受孕等症。此丸有順氣養血，調經之功。

【處方】大熟地六兩 炙甘草一兩五錢 全當歸六兩 砂仁一兩五錢 川芎一兩 炒冬朮六兩 川續斷三兩 酒黃芩二兩 川芎三兩 酒白芍二兩 制香附十兩

【制法】共研細末，用大棗肉加姜汁和蜜打丸。

【劑量及用法】每服三錢。溫酒或開水送下。

八、重 慶

【功能與主治】調經種子。

【處方】香附八兩(制六兩，生二兩) 杜仲八兩 川芎四兩 白芍四兩 當歸四兩 生地四兩 橘皮四兩 小茴香四兩 延胡索四兩 肉蓯蓉四兩 烏藥四兩 黃芩四兩 烏賊骨四兩 青皮四兩

【制法】共研細末，煉蜜加麩醋少許和丸。

【劑量及用法】二錢至四錢。

九、蘭 州

【功能與主治】調經養血。主婦女月經病，凡屬經期不准，行經腹痛，血虛血寒，血色黯淡，經閉經少，四肢痠痛等症。

【處方】同天津

【制法】以上共為細面，蜜小丸。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

十、大同(調經育子丸)

【功能與主治】經血不調，肚腹疼痛。

【處方】當歸 川芎 白芍 熟地 元胡 焦艾 烏藥 陳皮各二兩 丹皮 砂仁 吳萸 杜仲 川斷 炙甘草各一兩 香附八兩 油桂五錢

【制法】共研細面，煉蜜為二錢大丸。

【劑量及用法】早晚每服一丸，

開水送下。

【禁忌】生冷，油膩等物。

十一、禹 縣

【功能與主治】經血不調，趕前錯后，經期腹痛，崩漏經閉，赤白帶下。

【處方】熟地一斤 當歸一斤 川芎八兩 生地一斤 赤芍八兩 白茯苓八兩 丹皮八兩 黃芩八兩 玄胡索八兩 枳壳八兩 青皮八兩 蘇木二兩 砂仁二兩 紅花二兩 五靈脂二兩 炒干姜二兩 陳皮四兩 香附四兩 阿膠八兩

【制法】共為細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢，黃酒送下或白開水送下。

【禁忌】孕婦忌用。

【備考】有效期二年。

十二、濟 南(1)

【功能與主治】經期不准，腹痛腰痠。

【處方】香附(制)十二斤八兩 麥冬二斤二兩 當歸四斤十一兩 阿膠(蛤粉炒)六斤四兩 法半夏三斤二兩 白芍(酒洗)四斤十一兩 熟地六斤四兩 續斷三斤二兩 延胡索一斤九兩(醋制) 益母草六斤四兩 丹皮三斤二兩 吳茱萸(甘草制)一斤九兩 川芎三斤二兩 黃芩二斤二兩 小茴香(炒)一斤九兩 陳皮三斤二兩 蘇艾(炒炭)三斤二兩 沒藥一斤十兩(醋炒) 茯苓三斤二兩 白朮四斤十一兩 甘草十五兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

十三、濟 南(2)

【功能與主治】經血不調，行經腹痛。

【處方】當歸(酒洗)二兩 川芎一兩 熟地一兩 青皮一兩 廣皮一兩 白朮一兩 姜川朴一兩 小茴香一兩 艾叶一兩 三稜一兩(醋炒) 莪朮一兩(醋炒) 砂仁一兩 白芷一兩 懷牛膝(酒洗)各一兩 枳壳(炒) 元胡 粉甘草各一兩 琥珀五錢 香附五兩(醋炒)

【制法】共為細末，醋打米糊為

丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服二至三錢，白開水送下。

十四、濟南(3)(養血調經丸)

【功能與主治】婦女經血不調，趕前錯后，忽多忽少，血色不正。

【處方】當歸八兩 白芍四兩 寄生二兩 香附四兩 坤草八兩 元胡四兩 丹參四兩 紅花二兩 黃芪十兩 葛蒿四兩 鱉甲 台黨參各四兩 阿膠二兩 桂枝二兩 砂仁四兩 木香二兩 人參二兩 甘草一兩

【制法】共為細面，水泛小丸，如黃豆大小，硃砂三兩為衣，闔亮光。

【劑量及用法】每服二十粒，每日早晚空心，白開水送服。

十五、青 島

【處方】全當歸四兩 生地四兩 川芎三兩 白芍一兩五(炒) 茯苓 條芩 丹皮 元胡 枳壳各二兩(炒) 炮姜一兩 香附半斤 砂仁一兩五 紅花一兩 陳皮 白朮 艾炭各二兩 炙甘草一兩

【制法】共其面，蜜小丸。

十六、沈 陽(1)

【功能與主治】調經養血，主氣血虛弱，月經愆期，赤白帶下，腹痛腰痠，四肢倦怠，飲食減少，精神不振。

【處方】熟地黃 兩 當歸 黨參各一兩 白芍五錢 黃芩一錢 川芎 白朮各五錢 茯苓六錢 制香附四錢 益母草五錢 續斷 丹參各四錢 砂仁 炙甘草各二錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，滾湯送下。

十七、沈 陽(2)

【功能與主治】和血理氣化痰。主婦女經血不調，行經腹痛，赤白帶下，小腹脹滿等症。

【處方】同濟南

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空心米湯送下。

【禁忌】生冷食物。

十八、撫順(調經養血丸)

【處方】人參一兩半 當歸二兩半 熟地一兩半 生地二兩 川芎一兩半 酒芩二兩 黃芩二兩半 橘紅一兩 元胡一兩 坤草一兩半 桑葉一兩 砂仁七錢半 鹿膠一兩 黑艾一兩半 香附七兩 茯苓一兩 棗仁一兩 炙草一兩 天冬一兩 山黃一兩

【制法】共為細面，蜜丸三錢重。

十九、吉林(大調經丸)

【功能與主治】調經安胎，安神定志。主月經不調，赤白帶下，及胎前產後各症。

【處方】人參 川芎 砂仁 川斷 阿膠 白芩 熟地 棗仁 生地 橘紅 酒芩 烏藥 白朮 遠志各六錢七分 紫蘇 懷膝 艾炭 枳殼 廣木香 杜仲 硃砂各三錢四分 沉香二錢 益母膏二兩 琥珀二錢 白芍一錢 香附 當歸各一兩二錢四分 炙草五錢四分

【制法】將以上藥品共為極細面，煉蜜為丸，每丸二錢重赤金為衣，棉紙包，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，用黃酒送下，日服二次。

【禁忌】生冷油膩。

二十、哈爾濱(大調經丸)

【功能與主治】養血順氣調經。主血虛氣滯，經血不調，脘脹氣促，腹痛腰痠，頭暈嘔熱，食少吞酸。主血虛氣滯，經血不調。

【處方】人參一兩 川芎一兩 紫蘇五錢 砂仁一兩 阿膠一兩 白芩一兩 熟地一兩 牛膝五錢 沉香三錢 續仁一兩 黑艾五錢 枳殼五錢 琥珀三錢 白芍一兩半 生地一兩 橘紅一兩 酒芩一兩 木香五錢 炙草八錢 香附二兩 烏藥一兩 杜仲五錢 白朮一兩 遠志一兩 硃砂五錢 當歸二兩 坤草膏三兩

【制法】共為細面，煉蜜為二錢一分重丸。大赤金衣。棉紙包，蜡皮封固或瓷罐存貯。

【劑量及用法】每服一丸，早晚二次，紅糖水為引。

【禁忌】忌食魚腥。

二十一、承德

【功能與主治】經期不准，腹痛

腰痠。

【處方】香附(炙)十二斤八兩 麥冬三斤二兩 仙(酒洗)四斤十一兩 阿膠(蛤粉炒)六斤四兩 法半夏一斤二兩 白芕(酒洗)四斤十一兩 熟地六斤四兩 續斷三斤二兩 延胡索(醋炙)一斤九兩 益母草六斤四兩 丹支三斤二兩 黃芩三斤二兩 小茴香(炒)一斤九兩 陳皮三斤二兩 新艾炭三斤二兩 沒藥(醋炒)一斤十兩 茯苓三斤二兩 白朮四斤一兩 甘草十五兩

【制法】共為細末，煉蜜為小丸。(如果作大丸重三錢)

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

二十二、呼和浩特

(養血調經丸)

【處方】熟地 當歸 坤草 杜仲各一斤 香附 白芕 川芎 茯苓各一斤半 人參半斤 川斷十二兩 牛膝十二兩 云苓半斤 丹參一斤 肉桂四兩 紅花四兩 炙草八兩

【制法】蜜小丸。

【備考】養血調經膏，照前方熬膏，每斤蜜膏兌人參、肉桂各五錢。

附參考古方

【來源】1. 萬病回春。

【處方】當歸(酒洗)二兩 川芎 熟地(姜汁炒) 白朮(去蘆) 厚朴(姜汁炒) 小茴香(炒) 艾葉(去筋)各一兩 香附(醋炒)五兩 三稜(煨醋炒) 砂仁 白芷 牛膝(去蘆酒洗) 玄胡索各一兩 粉甘草 琥珀各五錢(另研入) 枳殼(去穢炒)一兩

【制法】右為末，醋打糊丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服八、九十九丸，米湯下，酒亦可；若腹痛加蒼朮，去白朮。

2. 女科証治准繩。

【功能與主治】調經，種子。

【處方】香附半斤(童便、酒、醋各浸一分，生一分，俱酒炒) 川杜仲(姜汁炒)半斤 大川芎 白芍藥 當歸(去尾) 懷生地 廣陳皮 小茴香(酒炒) 延胡索(略炒) 肉蓯蓉(酒浸) 白青皮(麩炒) 台烏藥(炒) 枯黃芩(酒炒) 烏賊魚骨(酥炙)以上各四兩

【制法】上十四味足秤，真正好

料醋和麵打糊為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服百丸，空心好酒送下。

【備考】一方無陳皮、地黃，有人參、黃耆各二兩。

3. 醫宗金鑑。

【功能與主治】理氣養血，調經種子。

【處方】香附 川杜仲八兩(姜汁炒) 大川芎 白芍藥 當歸(去尾) 懷生地 陳皮 小茴香(酒炒) 延胡索(略炒) 肉蓯蓉(酒炒) 白青皮(麩炒) 台烏藥(炒) 枯黃芩(酒炒) 烏賊魚骨(酥炙)以上各四兩

【制法】上十四味，稱足，真正好醋和麵打糊為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服百丸，空心好酒送下。

【備考】一方無陳皮、地黃，有人參、黃耆各二兩。

黑神丸

一、天津

【功能與主治】化瘀生新，去風止痛。主經枯血閉，干血癆瘵，過午發熱，骨蒸潮熱，產後血昏、血迷，惡露不淨，腰腹疼痛。

【處方】陳墨 制沒藥各八兩 天麻十二兩 百草霜八兩 紅花 當歸各六兩

【制法】共為細粉，用神麵面十六兩打糊為丸，再用硃砂面一兩二錢上衣，每丸重一錢，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下，黃酒亦可。

【禁忌】孕婦忌服。

二、青島

【處方】當歸一兩五 木香 百草霜各一兩 川芎 柴胡各五錢 占墨二兩 飛羅面 血竭各一兩

【制法】共軋面，飛羅面打糊為丸，重一錢五。

三、沈陽

【功能與主治】活血化癥。主產後惡露不盡，瘀血凝滯，心腹作痛及胎衣不下等症。

【處方】熟地黃 當歸 赤芍 蒲黃 桂心 干姜 甘草各四兩 黑豆半斤

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，黃酒送下。

四、撫 順

【處方】蒲黃二兩 赤芍 干姜各一兩 肉桂一兩 熟地二兩 甘草一兩 全歸一兩 黑豆八兩 百草霜一兩

【制法】共為細面，蜜丸一錢大，蜡皮封。

五、吉林、哈爾濱 (烏金散)

【功能與主治】祛瘀生新，清熱止血。婦女產後胎衣不下，暈眩欲絕，惡露不尽，肚腹疼痛，血迷心竅或婦女產後傷血過多，淋漓不斷，勢將虛脫，眩暈不醒，並治血熱妄行，溢出常絡，吐血衄血或崩或漏。

【處方】全當歸五錢 百草霜干面各一兩 明大蘇 廣木香各二錢五分 松烟墨(煅)二錢

【制法】共為細面，煉蜜為二錢一分重丸，大赤金為衣。綿紙包蜡皮封，包裝或貯于瓷罇。

【劑量及用法】每服一丸，沸水調服。

【禁忌】辛辣等物。

附參考古方

【來源】女科証治准繩。

【功能與主治】主治癥瘕、瘰癧，疝墜，五疳、血崩，產後諸血漏下赤白。

【處方】神蘇 茴香各四兩 木香 椒(炒香，出汗) 丁香各半兩 板櫛四枚 漆陸兩(半生，半用電湯煮半日，令香)

【制法】上除椒、漆，五物皆半生半炒為細末，用前牛熟漆和丸，如彈子大，用茴香末十二兩鋪陰地蔭干，候外干，並茴香收器中，極干，去茴香。

【劑量及用法】一丸分四服，死胎一丸，皆綿裹溫酒下。難產炒葵子四十九枚，搗碎，酒煎下一丸。諸疾不過一服，瘕氣十服，膈氣癥瘕五服，血瘕三丸為瘕。

和血通經丸

一、沈 陽(1)

【功能與主治】和血化瘀。主寒

侵子宮，瘀血積聚，堅硬如石，小腹脹大，狀如懷孕，經閉不通，時發脹痛，倦怠瘦弱。

【處方】當歸五錢 京三稜五錢 蓬莪朮一錢 木香二錢 熟地黃三錢 肉桂三錢 紅花二錢 貫眾二錢 蘇木二錢 血竭一錢(另研)

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，食前，熱酒一盞送下。

【禁忌】酸醋生冷之物。

二、沈 陽(2)

【功能與主治】氣郁血滯，經前腹痛，經後腰腿痛，身體倦怠，不思飲食，日漸消瘦，午后潮熱，骨蒸勞熱。

【處方】熟地六兩 當歸二兩 川芎二兩 益母草二兩 白芍二兩 香附四兩 丹參二兩 牛膝二兩 九節一兩 川續斷二兩 杜仲二兩 紅花一兩 肉桂二兩 枳殼二兩 艾葉一兩 茯苓二兩 東黨參一兩 山藥六兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空心白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

附參考古方

【來源】衛生寶鑑(和血通經丸)。

【功能與主治】治婦人經水凝滯不行，腰背膈腹疼痛，漸成血瘕。

【處方】芍藥一兩 木香 當歸 肉桂 干漆(炒烟尽) 五靈脂 大黃(各半兩) 水蛭(炒)二錢半 廣茂半兩 蟅虫二十个(去人足，麩炒) 桃仁二十七个(浸去皮尖)

【制法】上為末，醋糊丸，如桐子大。

【劑量及用法】每服二十九，醋湯送下，溫酒亦得，食前日進一服。

紅花當歸丸

沈 陽

【功能與主治】和血化瘀，調經止痛。主婦人經血不調，崩漏淋漓，積瘀成塊，腰腹刺痛。

【處方】馬鞭草五兩 劉寄奴五

兩 當歸一兩 赤芍藥 牛膝 川芎 香附 牡丹皮 甘草各一兩五錢 紅花一錢五分 白芷七錢五分 官桂六錢 紫苑二兩 枳殼一兩

【制法】共碾極細面，以糯米面打糊為丸，五厘重。

【劑量及用法】每服二錢，空心黃酒送下。

通 經 丸

沈 陽

【功能與主治】調理經閉。主婦女經閉，少腹冷痛，或由受寒，或由怒氣統能治之。

【處方】桂心 青皮 大黃 川椒 莪朮 川烏 干漆 當歸 桃仁各一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服一錢，淡醋湯送下，溫酒亦可。食前服。

通經甘露丸

一、北 京

【功能與主治】化瘀通經。主婦人月經不通，少腹脹痛，午后發熱。

【處方】當歸 桃仁 大黃 丹皮 干漆(煅) 肉桂 懷牛膝各四兩 三稜五錢 莪朮一兩 紅花四兩(共為細粉) 麝香二分

【制法】上藥和勻，煉蜜為丸，重一錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天 津

【功能與主治】化瘀通經。主血瘀經閉，胸脇脹滿，癥瘕痞塊，小腹作痛，骨蒸潮熱，四肢痠懶。

【處方】熟軍十兩 白草霜五錢 川芎二兩五錢 當歸二兩五錢 廣木香一兩五錢 紅花二兩五錢

【制法】共為細粉，用當歸二錢五分，紅花二錢五分，熬水泛小丸，二錢重裝袋。

【劑量及用法】每次服一袋，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、蘭 州

【功能與主治】調經活血，散

瘀化滯。主婦女血瘀，經閉胸脇脹痛，腹部有硬塊，脹滿疼痛等症。

【處方】同天津。

【制法】以上共研細面，用當歸、紅花各四兩煎水打小丸。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

四、禹 縣

【功能與主治】瘀血經閉，小腹疼痛，骨蒸潮熱。

【處方】大黃八斤 紅花一斤 巴豆一百二十個 廣木香一斤 百草霜八兩 當歸一斤

【制法】紅花一斤煎汁，當歸一斤，醋、童便、食鹽、老酒三斤浸大黃，再晒干，巴豆一百二十個去皮同大黃炒黃，去巴豆不用，共為細末，水為丸。

【劑量及用法】每服一錢，黃酒送下或白開水送下。

【禁忌】孕婦及虛弱症忌用。

【備考】有效期二年。

五、濟 南

【功能與主治】血瘀經閉，小腹脹痛。

【處方】同北京。

【制法】除麝香另研兌外，其他藥共為細粉，用羌花豬牙皂各四錢，煎水泛為丸，綠豆大。

【劑量及用法】每服一錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

六、青 島

【處方】莪朮半斤 郁金六錢 木通半斤 稜半斤 木香四兩 香附半斤 大黃二兩 官桂六錢 歸尾半斤 紅花四兩 元胡半斤 陳皮六兩 赤芍六錢 桃仁四兩 蘇木四兩

【制法】共軋面，水泛成丸，如椒目大。

七、沈 陽

【功能與主治】活血通經，逐瘀生新。主經血不調，瘀積腹痛，經前腹痛，腰腿痠痛，少腹攻痛，身熱發燒，面黃肌瘦，血瘀經閉，憂郁暴怒。

【處方】當歸 桃仁 大黃 丹皮 干漆 肉桂 牛膝各四兩 三

稜五錢 莪朮一兩 麝香二分

【制法】共軋極細面，用羌花、牙皂各六錢，煎水調面，為小丸。

【劑量及用法】每服一錢，空心黃酒送下。

八、承 德

【功能與主治】血瘀經閉，少腹脹痛。

【處方】同北京。

【制法】除麝香另研兌外，其他藥共為細粉，用羌花、豬牙皂各四錢，煎水泛為丸，每兩分做一百粒，滑石為衣。

【劑量及用法】每服二十粒，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌食生冷及氣惱。孕婦忌服。

九、呼 和 浩 特

【處方】大黃十斤 木香一斤四兩 當歸十兩 百草霜五兩 紅花五兩

【制法】水泛小丸，百草霜為衣。

婦科黑豆丸 (保育回生丸)

武 漢

【功能與主治】婦女經閉不通，肚腹疼痛，及產後惡露不行，腹脹人痛。

【處方】黑豆(水煎，去壳晒干)二斤 蘇木(煎水)一兩 紅花(用醋一斗煎)一兩 大黃(用米醋九斤制至開為度，后用黑豆汁、蘇木汁、紅花汁同制)一斤 黨參一兩 香附一兩 白朮二錢 川芎一兩 桃仁(去皮、尖)一兩 廣木香四錢 歸身一兩 川牛膝五錢 玄胡索(酒洗)一兩 羌活五錢 炙草五錢 薄荷黃一兩 白芍五錢 乳香(去油)一錢 烏藥二錢半 青皮二錢 益母草一兩 口咬肉五錢 沒藥(去油)一錢 地榆五錢 馬鞭草五錢 蒼朮一兩 橘紅五錢 熟地一兩 云茯苓一兩 木瓜二錢 五靈脂五錢 良姜四錢 秋葵子二錢 稜五錢

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，以淨水和成大丸，每丸為二錢重。蜡泥封固。

【劑量及用法】每服二至三錢。

【禁忌】孕婦及產後下血過多者忌服。

固 經 丸

上 海

【功能與主治】經來不止，色紫成塊。

【處方】黃柏三兩 白芍藥(炒)三兩 龜板(炙)四兩 黃芩二兩 椿根皮一兩五錢 香附(制)一兩五錢

【制法】共研細粉，酒糊為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服一錢，食前溫開水送服。

附參考古方

【來源】婦人良方。

【處方】艾葉 赤石脂(煨) 補骨脂(炒) 木賊各半兩 附子一個(炮)

【制法】上為末，飯丸，桐子大。

【劑量及用法】每服二十丸，溫酒或米飲下。

痛 經 丸 (經期腹痛丸)

南 京

【功能與主治】調經，止痛。主經期腹痛腰痠。

【處方】制香附一兩 延胡索二兩 西當歸三兩 川芎一兩五錢 羌活子三兩 肉桂五錢(去粗皮) 紫丹參三兩 炮姜五錢 山查炭三兩 懷紅花一兩 五靈脂二兩 青皮五錢 人熟地二兩 廣木香五錢(生研) 炒白芍二兩

【制法】上藥十五味，共研細末，用益母膏為丸。每錢約做二十粒。

【劑量及用法】每服一錢，一日二次，在經期前，用開水吞服。

艾附煖宮丸

一、北 京

【功能與主治】溫煖子宮，驅寒止痛。主子宮寒冷，經血不調，經期腹痛，腰痠帶下。

【處方】新艾炭三兩 香附六兩(制) 當歸三兩 續斷一兩五錢 吳茱萸二兩 川芎二兩 白芍二兩 黃耆二兩 生地一兩 官桂五錢

【制法】共為細粉，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服三錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌寒冷食物。

二、天 津

【功能與主治】溫暖子宮，散寒，止咳喘。主子宮寒冷，月經不調，經期腹痛，血寒經閉，腰痠腿疼，白帶淋漓。

【處方】同北京。

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、上 海

【功能與主治】經水不調，行經腹痛。

【處方】生地一兩 當歸二兩 白芍藥(炒)二兩 川芎二兩 艾葉三兩 香附(制)六兩

【制法】共研細粉，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，溫開水送服。

四、南 京

【功能與主治】溫經和血。主經水不調，經行腹痛，腰痠帶下，虛寒不孕。

【處方】同北京。

【制法】共研細末，醋煮米糊為丸，每錢約十五粒。

【劑量及用法】每服三錢，以前開水吞服。

五、杭 州

【功能與主治】理氣補血，調經種子，治子宮虛寒，久不能孕及月經不調，行經腹痛，飲食減，胸膈脹悶，虛熱盜汗，腰痠帶下等症。

【處方】同上海。

【制法】共研細末，醋煮米糊為丸。

【劑量及用法】每服二至四錢。淡醋湯或開水送下。

六、西 安

【功能與主治】治婦人肝臟郁血，胸脇脹悶，潮熱盜汗，食欲不振，下元虛寒。有溫補下元，理氣養血

之功效。治小腹疼痛，月水不調，經行時子宮攣痛，腰腿痠痛，不易受孕等症。

【處方】同北京。

【制法】研為細末，醋煮米糊為丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，食遠淡醋湯送下，每日一次。

【禁忌】忌生冷房事。

七、蘭 州

【功能與主治】通經活血，散寒止痛。主月經不調，血寒經閉，經期不准，腰痠腿痛，子宮受寒，赤白帶下。

【處方】焦艾葉二兩 香附子四兩 當歸二兩 川芎一兩五錢 吳茱萸二兩 白芍二兩 黃芪二兩 熟地二兩 肉桂五錢

【制法】共研細面，蜜丸。

【劑量及用法】每次服三錢，白開水送下。

八、濟 南

【功能與主治】小腹冷痛，月經不調，腰痠帶下，久不受孕。

【處方】同北京。

【制法】共為細末，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

【禁忌】忌辛辣油膩等物。

九、青 島

【處方】香附一斤 艾炭二兩 當歸二兩 白芍二兩 熟地二兩 黃芪二兩 川芎一兩 官桂一兩 吳茱萸一兩。

【制法】共軋面，蜜小丸。

十、沈 陽

【功能與主治】促進生殖機能，鎮痛調經，溫暖子宮。主經血后期，行經腹痛，小腹脹痛，腰痠倦怠，子宮寒冷，赤白帶下，精神萎靡。

【處方】艾葉二兩 香附六兩 當歸二兩 續斷一兩五錢 吳茱萸二兩 川芎二兩 白芍二兩 黃芪二兩 熟地二兩 肉桂五錢

【制法】共軋極細面，醋煮米糊為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，空腹時用淡醋湯送下。

【禁忌】忌氣惱生冷。子宮濕熱者忌服。

十一、哈爾濱(暖宮丸)

【功能與主治】養血溫寒，理氣化濕。主治子宮寒冷，經血衍期，腹痛結塊，腰腿疼痛，久不生育；肝郁氣滯，氣結胸膈，胸膈脹痛，納少咯氣；積滯浸滯，帶脈不宣，濕濁下注，帶下白滑，腰痠腹痛，面蒼體軟。主痛經，氣滯，白帶。

【處方】香附六兩 艾炭 當歸 黃芪各二兩 吳茱萸二錢 白芍 川芎各二兩 續斷一兩半 熟地一兩 肉桂五錢

【制法】共軋為細面，煉蜜為二錢重丸。

【劑量及用法】痛經血寒者，紅糖水為引，其他均白開水送下。每服一丸，日服二、三次均可。

【禁忌】忌食腥冷。孕婦勿服。

十二、承 德

【功能與主治】少腹冷痛，月經不調，腰痠帶下，久不受孕。

【處方】同北京。

【制法】共為細粉，水泛小丸，滑石為衣圓亮。每兩分做二百粒（作蜜丸重二錢）。

【劑量及用法】每次服二十粒，日服三次，溫開水送下。

【禁忌】忌食生冷。

十三、呼 和 浩 特

【處方】艾炭二兩 當歸一斤半 丁香二兩 續斷一兩半 川芎 白芍 牛膝各九兩 紅花六兩 肉桂二兩 元胡六兩

【制法】共為細面，蜜小丸。

附參考古方

【來源】沈氏尊生書。

【功能與主治】子宮虛冷，不受孕。

【處方與制法】香附六兩，醋五升煮一日夜，打爛勿作餅，慢火焙。加艾葉、當歸各二兩，續斷兩半，吳茱萸、川芎、白芍、黃芪各二兩，生地一兩，官桂五錢，醋糊丸。

【劑量及用法】食遠，淡醋湯下。

大黃廔虫丸

一、北 京

【功能与主治】破血通經。主婦女經閉不通，血瘀成塊，腹脹煩悶，午后作燒。

【处方】大黃二兩五錢 廔虫一兩 黃芩二兩 甘草二兩 桃仁二兩 杏仁二兩 赤芍四兩 干漆一兩(煨) 虵虫二兩 生地十兩 水蛭二兩 鱗鱗二兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重一錢。蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天 津

【功能与主治】破瘀通經。主婦女經閉不通，血瘀成塊，腹脹腹痛，午后發熱，積聚痞塊，干血癆症。

【处方】大黃 生地各十兩 桃仁(去皮)四兩 赤芍四兩 黃芩二兩 杏仁(去皮炒)四兩 煨干漆一兩 甘草二兩 虵虫一兩五錢 水蛭(炒)二兩 干鱗鱗一兩五錢 廔虫一兩(土鱗虫)

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，一錢重。蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦及體弱者勿服。

三、上 海

【功能与主治】形瘦少食，營衛失調，肌膚甲錯，虛熱內燔。

【处方】土鱗虫(炒)一兩 水蛭(用猪油熬)一兩五錢 大黃(酒蒸)二兩五錢 生地十兩 杏仁(去皮尖炒)四兩 桃仁(去皮尖炒)四兩 干漆一兩 甘草二兩 虵虫(炒)一兩五錢 赤芍藥(炒)四兩 黃芩(炒)二兩 鱗鱗虫一兩五錢

【制法】共研細粉，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】憑醫師處方購用。

【禁忌】孕婦忌服。

四、南 京

【功能与主治】去瘀，生新。主干血經閉，肌膚甲錯，兩目黯黑。

【处方】水蛭一百个(猪脂炙黃) 酒蒸大黃二兩五錢 粉甘草二兩 苦杏仁四兩(去皮尖) 廔虫一兩五錢(去足炒) 土鱗虫一兩(廔虫) 桃仁四兩(去皮尖炒) 白芍四兩 生地黃十兩 炒黃芩二兩 炒鱗鱗虫一兩五錢(用一百个) 干漆一兩(煨令烟尽)

【制法】上藥十二味，如法炮制后，共研細末，加煉白蜜為丸，分做一錢一粒，烘干后，每丸用蜡紙包裝。

【劑量及用法】每服一粒，一日三次，溫酒調服。

【禁忌】肺癆經閉者忌服。

五、武 漢

【功能与主治】勞傷羸瘦，經閉，腹滿。不能飲食，肌膚甲錯，兩目黯黑。

【处方】大黃 干地黄各十兩 苦杏仁四兩 甘草二兩 黃芩二兩 廔虫一兩 桃仁四兩 水蛭五錢 虵虫一兩半 鱗鱗虫一兩半 白芍四兩 干漆一兩(煨)

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜40-45%，搓成小丸，每錢不得少于二十五粒。

【劑量及用法】每服一錢至二錢。

【禁忌】孕婦忌服。

六、福 州

【功能与主治】治五癆虛極羸瘦，腹滿不能飲食，食傷，憂傷，飲傷，房室傷，飢傷，勞傷，經絡不衛氣傷，內有干血，肌膚甲錯，兩目黯黑。能緩中補虛。

【处方】大黃二兩五錢酒蒸(一作十兩) 廔虫五合去足炒(一作八兩，一作一兩) 黃芩(炒)二兩 甘草二兩 桃仁一升炒(一作四兩) 杏仁一升炒(一作四兩) 芍藥四兩 干漆一兩煨令烟尽(一作炒) 廔虫一升去翅足炒(一作一兩五錢) 干地黄一兩 水蛭百枚猪脂熬(一作炙黃) 鱗鱗白枚炒(一作兩半)

【制法】上藥研末，煉蜜為丸小豆大。

七、杭 州

【功能与主治】治勞極羸瘦，腹滿不食，食傷，憂傷，飲傷，房室傷，

飢傷，勞傷，經絡營衛氣傷，內有干血，肌膚甲錯，兩目黯黑。此丸祛瘀生新，緩中補虛，為治干血癆之良方。

【处方】同天津。

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服五分。每日三服。溫酒送下。

八、南 昌

【功能与主治】勞傷干血，肌膚甲錯，婦人血瘀經閉。

【处方】大黃十兩 廔虫一兩 黃芩(炒)二兩 甘草三兩 桃仁(去皮、尖、炒)四兩 杏仁(去皮、尖、炒)四兩 白芍四兩 干漆(炒令烟尽)一兩 廔虫一兩五錢 大生地十兩 水蛭(炙黃)二兩 鱗鱗一兩五錢

【制法】共研細末，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】日服三次，每服五分至一錢，溫酒送下。

【禁忌】孕婦忌服。

【備考】非經醫師處方不得使用。

九、沙 市

【功能与主治】治五癆虛極，羸瘦腹滿，結成干血，瘀滯不通，肌膚甲錯，兩目黯黑等症。

【处方】西大黃(酒蒸)十兩(正香結亦可) 黃芩二兩 杏仁四兩 桃仁四兩 生地十兩 白芍(炒)四兩 粉甘草三兩 水蛭一兩五錢(猪油熬黑) 鱗鱗(去足炒)一兩五錢 干漆(炒)一兩 廔虫(去翅足炒)一兩五錢 廔虫(去足，炒)二兩

【制法】上藥十二味研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】成人量每次服三錢，空腹溫開水下(或兌酒少許)，每日服二次。

【禁忌】身體虛弱而無干血瘀滯者及孕婦忌服。

十、重 慶

【功能与主治】治五癆虛極，羸瘦腹滿不能飲食，食傷，憂傷，飲傷，房室傷，飢傷，經絡營衛，氣傷，因干血而肌膚甲錯兩目黯黑。

【处方】大黃二兩五錢 廔虫一

兩 黃芩二兩 甘草一兩 桃仁四兩 杏仁四兩 白芍四兩 干漆(炒去油)一兩 蠱虫(去翅足)一兩 生地黃十兩 水蛭(酒泡炒黃)一百條 鱗鱗一白條

【制法】共研細末，煉蜜為丸，紙盒包裝。

【劑量及用法】一錢至二錢。

十一、西安

【功能與主治】治熱病之血循環障礙，腹內發生血栓郁血，慢性炎腫及由此引起及維生素缺乏，致身體消瘦，肌膚甲錯，兩目黯黑，腹滿不能食等症。

【處方】大黃(酒蒸)二兩 蟅虫(去頭足炒)一兩 鱗鱗(炒)一百枚 蠱虫(去翅足炒)二兩 桃仁二兩 杏仁二兩 干漆(燒烟盡)一兩 干地黄十兩 白芍四兩 黃芩二兩 甘草一兩 水蛭(用油熬黑)一百枚

【制法】研為末，煉蜜為丸，如小豆大。

【劑量及用法】每服五丸，溫水送下，一日二次。

【禁忌】孕婦忌服。無郁血及身體過弱者亦不宜服。

十二、蘭州

【功能與主治】活血通經，破堅硬，化瘀血。主婦女經閉，干血癆，身體消瘦，腹痛腹脹，痞積血塊，按之則痛。

【處方】同天津。

【制法】以上共研細面，蜜丸一錢重，蜡皮封固。

【劑量及服法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦及體質弱者勿服。

十三、大同

【功能與主治】破血通經。主治干血癆症。

【處方】大黃十兩 杏仁四兩 芍藥四兩 甘草三兩 生地十兩 桃仁四兩 黃芩四兩 蛇虫一兩 鱗鱗一百個 水蛭一百個 蟅虫一兩 干漆一兩

【制法】蜜丸一錢大，蜡皮封固。

【禁忌】孕婦禁用。

十四、濟南

【功能與主治】勞傷干血，肌膚

甲錯，如女瘀血經閉。

【處方】酒大黃 生地(炒)各十兩 苦杏仁(去皮)四兩 干漆(炒)一兩 黃芩二兩 蟅虫(去頭足炒)一兩 (土鱗) 鱗鱗(去頭足炒)四兩 水蛭(猪油煎黑)一百個 白芍(炒)四兩 甘草三兩 桃仁(去皮尖炒)四兩 蠱虫(去翅足炒)一兩 五錢

【制法】共研細末，煉蜜為丸，一錢重，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸至二丸，白開水送下。

【禁忌】生冷辛辣等物。孕婦忌服。

十五、青島

【處方】大黃一錢 黃芩二錢 甘草三錢 桃仁 杏仁各一斤 杭芍四錢 干地黄十錢 干漆一錢 蛇虫一斤 水蛭一斤 鱗鱗一斤 蟅虫五錢

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

十六、沈陽

【功能與主治】破積聚，下瘀血。主五勞虛損，干血經閉，肌膚甲錯，目黑暗。

【處方】蒸大黃二兩 黃芩二兩 甘草二兩 桃仁四兩 杏仁四兩 白芍四兩 干地黄一斤 干漆一兩 蠱虫一兩五錢 水蛭百枚 鱗鱗百枚 蟅虫一兩

【制法】制后再碾極細面，煉蜜為丸二分重。

【劑量及用法】每服一丸，日二次，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

十七、呼和浩特

【處方】大黃七兩 黃芩二兩 甘草二兩 杏仁四兩 桃仁四兩 白芍四兩 生地七兩 干漆二兩 蟅虫二兩 鱗鱗一兩五 水蛭一兩八錢 蛇虫一兩五

【制法】共研細面，蜜大丸，重一錢，蜡皮。

附參考古方

【來源】金匱要略方論。

【功能與主治】五勞，虛極羸瘦，腹滿不能飲食，食傷，憂傷，飲傷，房室傷，飢傷，勞傷，經絡榮衛氣傷，內

有干血，肌膚甲錯，兩目黯黑。能緩中補虛。

【處方】大黃十分(蒸) 黃芩二兩 甘草三兩 桃仁一升 杏仁一升 芍藥四兩 干地黄十兩 干漆一兩 蠱虫一升 水蛭百枚 鱗鱗一升 蟅虫半升

【制法】上十二味，末之，煉蜜和丸，小豆大。

【劑量及用法】酒飲服五丸，日三服。

血府逐瘀丸

一、沈陽

【功能與主治】逐瘀生新。主胸膈瘀血，凝滯不行，心慌心跳，失眠發燒，胸膈痞塞，憂悶食少。婦女經閉，日久將成虛損勞瘵等症。

【處方】當歸二錢 生地三錢 桃仁四錢 紅花二錢 炒枳殼二錢 赤芍二錢 柴胡一錢 甘草一錢 桔梗一錢五分 川芎一錢五分 牛膝三錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

二、吉林(血府丸)

【功能與主治】調經活血，逐瘀生新。主婦女經血不調，胸痞，自汗心熱，驚悸急躁，夜睡失眠，心慌心跳，干嘔發燒等症。

【處方】當歸 生地 紅花各二兩 桃仁二兩六錢七分 枳殼一兩三錢四分 赤芍一兩二錢四分 柴胡六錢七分 桔梗一兩 甘草六錢七分 川芎二兩 牛膝二兩

【制法】將以上十一味藥，共研為細面，煉蜜為丸，每丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，用姜水送下。

【禁忌】孕婦忌用。

三、哈爾濱

【功能與主治】逐瘀生新。瘀血凝結，久成干血，腹痛腹脹，經血不行，皮膚甲錯，晡熱蒸燒。

【處方】同沈陽。用量大十倍。

【制法】共碾為細面，煉蜜為二錢重丸。

【劑量及用法】早晚空腹時各服

一丸，紅糖水為引。

【禁忌】孕婦忌服，忌食辛冷。

逍遙丸

一、北京(附：逍遙散)

【功能與主治】疏郁調經。主月經不調，腹臍脹痛，午後煩熱，精神疲倦。

【處方】柴胡 當歸 白芍 白朮 茯苓各一百兩 甘草八十兩 薄荷二十兩 丹皮 梔子(炒)各一百五十兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水或姜湯送下。

【禁忌】忌氣惱勞碌，孕婦忌服。

【備考】逍遙散：同上藥共為細粉，每服二錢。其餘同上。

二、上海

【功能與主治】氣郁不和，胸痞心煩，頭暈及月經不調。

【處方】當歸一兩 白芍藥(酒炒)一兩五錢 白朮(蜜水拌蒸)一兩 茯苓一兩 甘草(炙)八錢 柴胡(炒)七錢 薄荷五錢

【制法】共研細粉，用煨薑二兩煎湯泛丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服三錢，睡前或食前溫開水送服。

【禁忌】酸冷食物。

三、南京

【功能與主治】主肝經郁熱，氣不調暢，胸痞、寒熱、口苦、咽燥、掌熱及月經不調等症。

【處方】白茯苓一兩 炒白朮一兩 白芍一兩 當歸一兩 柴胡一兩 炙甘草一兩五錢

【制法】上藥共研細末，用薄荷二錢，煨姜三錢煎濃汁，兌入煉蜜做丸，每錢約二十粒。

【劑量及用法】每服三錢，每日一次，開水吞服。

四、武漢

【功能與主治】血虛頭暈，肢酸胸痞，寒熱往來，五心煩熱，及婦人經血不調。

【處方】柴胡 當歸(酒浸) 白芍(酒炒) 白朮(土炒) 茯苓各四

兩 炙甘草二兩 薄荷一兩

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于二十粒。

【劑量及用法】每服三錢，以開水吞下，隔六小時一次。

五、福州

【功能與主治】治肝脾血虛及郁怒傷肝，少血，目暗，發熱胸痞等症。

【處方】當歸 芍藥 白朮 茯苓 甘草 柴胡各等分

【制法】共研細末，以姜湯泛丸。

六、南昌

【功能與主治】血虧氣郁，兩脇作痛，臍腹脹痛，小腹重墜，婦人經水不調。

【處方】同上海。

【制法】共研細末，用煨薑一兩煎水泛丸，如綠豆大。

【劑量及用法】日服二次，每服二錢，溫開水送下。

【禁忌】忌氣惱及辛辣、生冷、薯芋等物。

七、大同

【功能與主治】婦女陰虛火熾，肝氣不舒，脾胃不快，精神疲勞。

【處方】柴胡 當歸 白芍 白朮 茯苓各六斤四兩 甘草五斤 薄荷一斤四兩 丹皮九斤六兩 梔子九斤四兩

【制法】以上九味，共為細面，水為小丸。

【劑量及用法】每次服三錢，日服二次。

八、沈陽

【功能與主治】調經和血，平肝理脾。主脾虛食少，氣逆胸痞，血虛勞倦，肢體疼痛，寒熱往來，月經不調，胸腹脹滿，氣逆不暢。

【處方】當歸 酒芍 柴胡 茯苓各一兩 白朮 炙甘草各五錢

【制法】共碾極細面，用生薑五錢 薄荷五錢 煎濃汁，調藥面煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空腹白開水送下。日服二次。

九、撫順

【功能與主治】調經舒氣，強心清熱。主頭暈目眩，肢體痠痛，血虛疲倦，五心煩熱，口燥舌干，發熱盜汗，月水不勻，臍腹疼痛，室女陰虛，骨蒸癆熱。

【處方】當歸二兩 赤芍一兩六錢 醋柴胡一兩六錢 茯苓一兩 焦朮一兩二錢 香附五錢 甘草六錢 丹皮一兩一錢 山梔一兩一錢 薄荷八錢

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服二錢，一日二次，白開水送下。

【禁忌】忌食辛辣。

十、吉林、哈爾濱

【功能與主治】散郁除蒸，清熱調經。主經血早行。

【處方】當歸(酒拌) 酒芍 柴胡 白朮(土炒) 茯苓 丹皮 焦梔各一兩 炙草 薄荷各五錢

【制法】共為細面，煉蜜為小丸，如梧桐子大。瓷罐存貯。

【劑量及用法】每服二錢，早晚空腹服，淡姜湯為引。

【禁忌】忌食辛辣，孕婦忌服。

加味逍遙丸

一、天津

【功能與主治】退熱，舒郁，調經，健胃。主婦女身體衰弱，陰虛咳嗽，寒熱往來，月經不調，心煩口渴，食慾不振，氣郁不舒。

【處方】柴胡 當歸 生白芍 白朮(蜜炒) 茯苓(去皮)各四兩 薄荷一兩 丹皮 生梔子各四兩 甘草一兩

【制法】共為細粉，涼開水泛小丸。三錢重裝袋。

【劑量及用法】每次服一袋，白開水送下。

二、南京(丹梔逍遙丸)

【功能與主治】肝經郁熱過甚，煩熱，口苦，胸痞，乳脹，耳鳴，頭眩，並具有調經治帶作用。

【處方】白茯苓一兩 當歸一兩 炒白朮一兩 柴胡一兩 炙甘草一兩 丹皮七錢 白芍一兩 梔子七錢(炒黑)

【制法】上藥共研細末，用煨姜一錢、薄荷二錢，煎湯泛丸，每錢約八十粒。

【劑量及用法】每服二錢，每日一次，開水吞服。

三、杭 州

【功能與主治】治肝脾血虛，寒熱往來，頭目昏重，怔忡心煩，嗜臥不寐，口舌生瘡，耳竅疼痛，胸脇腹脹，婦人血虛，月經不調等症。

【處方】同南京。

【制法】共研細末，薄荷、姜煎湯泛丸。

【劑量及用法】每服三至四錢，開水送下。

四、南 昌

【功能與主治】血虧氣郁，胸腹脹痛，頰赤口苦，煩熱口渴，婦人月經不調。

【處方】白芍(酒炒)二兩 當歸二兩 白朮(蜜水拌蒸)二兩 白茯苓二兩 甘草一兩六錢 柴胡(炒)一兩四錢 薄荷葉一兩 丹皮一兩五錢 梔子一兩五錢

【制法】共研細面，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】日服三次，每服二錢，開水送下。

【禁忌】辛辣、生冷、氣滯之品。

五、蘭 州

【功能與主治】退熱，調經，健胃。主婦女月經不調，心煩口渴，食慾不振均可服用。

【處方】同天津。

【制法】共為細末，水打為丸。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

六、濟 南

【功能與主治】血虛頭眩，寒熱往來，肢痠脇痛，經血不調。

【處方】北柴胡(酒拌)二兩 當歸(酒洗)四兩 炒杭白芍四兩 白朮(土炒)四兩 粉丹皮二兩 炒梔子二兩 粉甘草一兩 薄荷一兩 云茯苓二兩

【制法】共為細面，另用生薑一兩，薄荷五錢，煎湯泛丸如綠豆大。

【劑量及用法】每服二錢，白開

水送下。

【禁忌】忌辛辣生冷等物。並忌氣惱。

七、青 島

【處方】全當歸半斤 白朮二兩(炒) 炙香附一斤 丹皮八兩 條芩四兩 枳殼六兩(炒) 炙元胡四兩 芍藥四兩 醋柴胡四兩 白芍四兩(炒) 陳皮六兩 地骨皮四兩 薄荷六兩 焦梔半斤 生草三兩

【制法】共為細面，水丸如椒目大。

八、呼 和 浩 特

【處方】當歸 白芍各二斤半 丹皮 梔子各一斤四兩 薄荷十兩 生地二斤半 香附五斤 川芎一斤十四兩 茯苓二斤半 坤草五斤

【制法】水小丸。

香 附 丸

一、北 京

【功能與主治】舒郁調經。主郁結不舒，經水不調。

【處方】當歸二百二十兩 川芎八十兩 白芍 白朮 熟地各一百六十兩 香附四百八十兩 砂仁四十兩 橘皮 黃芩各八十兩

【制法】共為細粉，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，日服一次，溫黃酒送下，溫開水亦可。

二、西 安

【功能與主治】治抑鬱性之血循環障礙，子宮貧血，子宮拘攣疼痛及由此引起之月經不調，兩脇氣脹。

【處方】香附子

【制法】去毛研細末，醋糊為丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每次一錢五分至二錢，量人強弱而定，病在上者童便調服，病在下者黃酒調服。

【禁忌】貧血性心臟衰弱及子宮弛張充血者忌服。

三、撫 順

【功能與主治】活血溫經。主血寒經閉，血因寒凝，臍腹疼痛，堅硬拒按，胸熱骨蒸，氣滯經閉，經血不

行，胸脘脹滿，氣促呃逆，筋骨疼痛，經行腹痛，血色不正，腰痛腿痠，肢軟神疲。

【處方】白入參兩半 當歸二兩五錢 生地 川芎 酒芍各兩 黃朮二兩半 橘紅一兩 元胡一兩 坤草二兩半 黃芩一兩 砂仁七錢五分 阿膠一兩 艾炭一兩半 香附七兩 茯苓 棗仁 制草 天冬 山萸各一兩 熟地二兩半

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服二錢，空腹白開水送下。

【禁忌】忌食生冷，孕婦忌服。

四制香附丸

一、上海(制香附丸)

【功能與主治】月經不調。

【處方】香附一斤 陳皮三兩 熟地四兩 冬朮(炒)二兩 澤蘭葉三兩 川芎四兩 白芍藥(炒)四兩 黃柏一兩 甘草(炙)一兩

【制法】先將香附分三份，一份用米泔水浸，一份用酒浸，一份用醋浸，各浸一宿，候干，加余藥共研細粉，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，溫開水送服。

【禁忌】忌食蘿蔔、生冷。

二、南 京

【功能與主治】主婦人氣郁，經水不調，兩脇脹滿，腹痛帶下等症。

【處方】生香附一斤(分四份，一份用米泔水浸，一份用鹽水浸，一份用酒浸，一份用醋浸，各浸一宿晒干)

當歸四兩 人熟地四兩 白芍四兩 川芎四兩 炒冬朮二兩 陳皮三兩 澤蘭葉三兩 黃柏一兩 炙甘草一兩

【制法】上藥共研細末，煉蜜為丸，每錢約做二十粒。

【劑量及用法】每服一錢，一日二次，開水吞服。

三、武 漢

【功能與主治】血虛煩熱，胃納不強，經水失調，小腹疼痛。

【處方】香附一斤(晒去淨毛，一次以米泔水浸，二次以米醋浸，三

以鹽水浸，再三浸三晒，以晒干再煨為宜）制熟地 白芍 川芎各四兩 白朮 陳皮 澤蘭各二兩 黃柏 炙甘草各一兩

【制法】小丸 一取上藥進行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜50~62%，迭成小丸，每錢不得少于二十五粒。

大丸——如法得淨粉后，加煉蜜150~160%，和成大丸，每丸重為三錢。

【劑量及用法】每服三錢，早晚飯前各服一次，鹽湯送下。

四、福州

【功能與主治】調經養血，順氣，受孕。此丸統治七情，嘔吐食積等症。

【處方】香附米一斤（分四制：酒、醋、童便、米泔各浸一宿，晒干用） 當歸（酒洗） 熟地（酒洗） 白芍藥 川芎各四兩 澤蘭叶 白朮 陳皮各二兩 黃柏（酒炒） 甘草（酒炒）各一兩

【制法】共為末，酒糊丸，桐子大。

【劑量及用法】每服七十丸，空心白湯送下。

五、杭州

【功能與主治】治婦人氣郁血熱，月經不調，肌肉消瘦，四肢困倦，脇肋脹滿，少腹疼痛。凡血虛內熱，經行超前，腰痠腹痛諸症皆可服之。

【處方】香附十六兩（分為四份，一份用米泔水制透，一份用酒浸制透，一份用童便制透，一份用醋浸制透）

大熟地四兩 全當歸（酒炒）四兩 炒冬朮二兩 澤蘭三兩 酒白芍四兩 川芎四兩 廣陳皮三兩 川黃柏一兩 炙甘草一兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服三至四錢。溫酒或淡鹽湯或開水送下。

六、南昌

【功能與主治】胸悶脇痛，月經不調。

【處方】香附二斤 當歸八兩 川芎八兩 白芍八兩 熟地八兩

【制法】將香附分為四份，一份

用黃酒浸，一份用醋浸，一份用鹽水浸，一份用童便浸，各浸三日焙干。再合余藥共研細末，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

七、沙市

【功能與主治】治婦女氣血凝滯，月經不調，氣郁腹脹等症。

【處方】香附米四斤

【制法】上藥一味分作四制，第一次用淡鹽湯炒，第二次用米醋炒，第三次用山楂八兩同炒去梔，第四次用酒炒，制透候冷，研極細末，用冷開水疊為丸。

【劑量及用法】每次服二或三錢，空腹溫開水下，日服二次。

【禁忌】水份不足及體質虛弱者忌服。

八、濟南

【功能與主治】胸悶脇痛，月經不調。

【處方】同南昌。

【制法】先將香附分作四分，一分用黃酒浸，一分用鹽水浸，一分用童便浸，一分用醋浸，各浸三日，焙干，再合余藥共為細粉，醋糊為小丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

【禁忌】忌辛辣油膩生冷等物。

九、青島(1)

【處方】香附二斤（用童便、人乳、姜汁、老酒分四次炙后用） 當歸 生地 祁艾各八兩 條芩 陳皮 川芎 白芍 白朮 澤瀉各四兩

【制法】共軋面，水泛小丸。

十、青島(2)

【處方】當歸十二斤 黃芩六斤 川芎三斤 白朮六斤 白芍六斤 陳皮六斤 熟地九斤 木香十二兩 砂仁一斤半 香附二十斤。

【制法】共軋面，水丸如椒目大。

十一、沈陽

【功能與主治】調經和血，逐瘀生新。主經血不調，小腹疼痛，赤白

帶下，肝郁氣逆，四肢倦怠，虛勞貧血。

【處方】香附二斤（以黃酒、米泔、鹽水、醋各浸三日，然後焙干）合入 當歸 川芎 熟地 白芍各五兩

【制法】共碾極細面，醋糊為丸。

【劑量及用法】每服二錢，空心淡鹽水送下，冬月溫黃酒送下

【禁忌】忌氣惱與生冷食物。

十二、呼和浩特

【處方】香附十二斤 川芎各一斤半

【制法】水泛小丸。

附參考古方

【來源】1. 濟陰綱目。

【功能與主治】治婦人女子經候不調。

【處方】香附子（擦去皮二斤，分作四分，好酒浸一分 鹽水浸一分，童便浸一分，醋浸一分，各一日，焙干）

【制法】以上為細末，醋糊丸，如桐子大。

【劑量及用法】每服七十丸，空心食前鹽酒下。

2. 沈氏尊生書。

【功能與主治】能調和經脈。

【處方與制法】香附米一斤，分四制：一鹽水姜汁煮，略炒；一醋煮，略炒；一山楂四兩同炒，去梔；一童便洗，不炒。再加川芎、當歸各二兩，麵糊丸。

【劑量及用法】每服七十丸，隨症作湯下；氣虛加四君子湯，血虛加四物湯。

四物香附丸

沙市

【功能與主治】治婦女月經不調，氣滯腹脹等症

【處方】干地黃四兩 川芎（酒炒）二兩 白芍（炒）四兩 全當歸四兩 香附（制）八兩

【制法】上藥研細末，用冷開水疊為丸。

【劑量及用法】每次服三錢，空腹溫開水下，每日服二次。

【禁忌】貧血而腹脹者忌服。

久制香附丸 (九制香附丸)

上 海

【功能与主治】下腹冷痛，經閉腹痛，癥瘕積聚，胸悶氣脹。

【处方】香附(生)十八兩

【制法】將生香附分作九份，分別用黃酒八兩，米醋八兩，生薑八兩，蘿蔔二兩，丹參二兩，艾葉二兩，益智仁二兩，鹽一兩，小茴香二兩，煎汁浸制香附，烘干研細粉，麵糊為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，溫開水送服。

【禁忌】酸冷食物。

【備考】原方有童便制，現已取消。

七制香附丸

一、天 津

【功能与主治】開郁順氣，調經養血。主血滯經閉，胸悶氣郁，兩脇脹痛，飲食減少，四肢無力，腹內血塊，攻衝作痛，濕寒白帶。

【处方】香附(醋制)六斤(四兩) 生地 生白芍 當歸 熟地各四兩 川芎四兩 艾炭二兩 白朮(麩炒) 益母草各四兩 甘草一兩 山萸肉(酒制)二兩 炒棗仁二兩 茯苓(去皮)四兩 生阿膠 天冬各二兩 砂仁一兩五錢 人參(去蘆)一兩 黃芩二兩 元胡(醋制)一兩五錢

【制法】用生艾葉一兩 小茴香一兩 大米一兩 三味熬透去渣取汁，再和鮮牛乳七兩 大鹽(化水)七錢 拌方內香附，浸透微炒，和羣藥共為細粉，黃酒泛小丸，二錢重裝袋。

【劑量及用法】每次服一袋，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、杭 州

【功能与主治】治婦人七情郁結，月事不調，血寒經遲，腹中脹痛，癥瘕血塊，產後諸症，乃調氣活血之劑。

【处方】香附十四兩(分為七包用后藥汁制)

【制法】一包用當歸二兩，酒浸

制。二包用莪朮二兩，童便浸制。三包用丹皮一兩、艾葉一兩，米泔水浸制。四包用烏藥二兩，米泔水浸制。五包用川芎一兩、元胡索一兩，水浸制。六包用三稜一兩、柴胡一兩，醋浸制。七包用紅花一兩、烏梅一兩，鹽水浸制。以上照方，春五日、夏三日、秋七日、冬十日，各浸制透，只取香附晒干研末以浸余藥汁打糊和丸。

【劑量及用法】每服三至四錢。溫酒或開水送下。

三、重 慶

【功能与主治】治經水不調，結成癥瘕或骨蒸發熱。

【处方】同杭州，用量大十倍。制法亦同。

【劑量及用法】每服三錢至五錢。

四、大 同

【功能与主治】調經血，舒肝平胃，清熱解郁，養血，健精神，治虛癆。

【处方】當歸二十斤 川芎五斤 陳皮五斤 黃芩五斤 白芍十斤 白朮十斤 熟地十斤 香附三十斤 砂仁二斤半

【制法】以上九味共軋細面，黃酒兌水為小丸。

【劑量及用法】每日服二次，每次服三錢。

五、濟 南

【功能与主治】腹中痞塊，月經不調。

【处方】同杭州。制法亦同。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】辛辣油膩。孕婦忌用。

六、沈 陽

【功能与主治】理氣活血，調經逐瘀。主婦女子宮虛寒，氣血凝滯，經水不調，赤白帶下，經行腹痛，宜常服之。

【处方】香附米十四兩(分作七份，黃酒浸，醋浸，鹽水浸，米泔水浸，小茴香一兩熬水浸，益智仁二兩熬水浸，萊菔子二兩熬水浸。凡浸春秋三日、夏一日、冬七日，炒干只

取香附米，混入下列藥) 當歸四兩 熟地四兩 生地四兩 白芍四兩 益母草四兩 川芎三兩 黨參二兩 白朮二兩 白茯苓二兩 棗仁二兩 阿膠二兩 陳皮二兩 山萸肉二兩 艾葉二兩 炙甘草九錢 天冬二兩五錢 黃芩二兩 砂仁二兩 延胡二兩

【制法】共軋極細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空心白開水送下。

【禁忌】氣燥血熱者忌服。

七、青 島(1)

【处方】香附半斤 當歸四兩 川芎四兩 白芍六兩 白朮六兩 條芩六兩 生地十二兩 炒艾十二兩 陳皮十二兩 黃柏三兩 澤蘭葉六兩 炙草四兩

【制法】共軋面，水泛小丸。

八、青 島(2)

【处方】香附二斤(七炙) 人參 棗仁 元胡 橘紅 茯苓 燕窩 條芩 白朮 山萸 益母草各六兩 當歸 生地 熟地 白芍 天冬各十二兩 阿膠一斤 炙草三兩 砂仁三兩。

【制法】共軋末，水泛小丸。

九、青 島(3)

【处方】當歸二十斤 川芎五斤 白朮十斤 白芍十斤 熟地十斤 香附三十斤 砂仁二斤半 陳皮五斤 黃芩五斤

【制法】共軋面，水泛丸如椒目大。

十、撫 順

【处方】香附十四兩 黨參二兩 當歸二兩 生地四兩 白芍二兩 棗仁二兩 川芎一兩 丹皮一兩 文朮二兩 紅花一兩 台烏一兩 白朮二兩 橘紅二兩 黃芩二兩 天冬二兩 益母草四兩 熟地四兩 炙草二兩 阿膠二兩 元胡一兩 艾葉一兩 白朮四兩 薄荷二兩 吳萸二兩 砂仁一兩 六神六兩 赤白石脂二兩 角霜二兩

【制法】共為細面，蜜丸三錢重。

十一、哈尔滨 (香附丸)

【功能与主治】活血溫經。血寒經閉，血因凝滯，經血閉塞，凝結成塊，症見臍腹疼痛，堅硬拒按，皮膚甲錯，晡熱骨蒸；氣滯經閉，暴氣郁結，經血不行，胸脘脹滿，氣促喘氣，筋骨疼痛；痛經，經行腹痛，腰痛腿痠，肢軟神疲，血色不正。主血寒經閉，氣滯經閉，痛經。

【处方】同杭州。制法亦同。

【剂量及用法】每服二錢，白水或溫酒送下，早午晚各服一次。

【禁忌】孕婦勿服。

十二、呼和浩特

【处方】香附 川芎 当归 白朮 茯苓 生地 益母草 棗仁 元胡 条芩 艾炭各六兩 砂仁二兩 炙草一兩 熟地四兩

【制法】蜜小丸。

附参考古方

【来源】医学入門。

【功能与主治】治諸虛百損，氣血不調，月水前後結成癥瘕，或骨蒸發熱，四肢無力。

【处方】香附米十四兩

【制法】分七分：一分同当归二兩酒浸；一分同莪朮二兩蜜便浸；一分同艾叶、牡丹皮各一兩米泔浸；一分同烏藥二兩米泔浸；一分同川芎、玄胡索各一兩水浸；一分同三稜、北柴胡各一兩醋浸；一分同紅花、烏梅各一兩鹽水浸，春二、夏二、秋七、冬十日晒干，單取香附為末。浸藥水打糊為丸梧子大。

【剂量及用法】每服八十丸，臨臥酒下。

十珍香附丸

一、昆明

【功能与主治】血虛潮熱，氣郁不舒，月經不調，經期腹痛。

【处方】熟地一兩五錢 当归一兩 黨參一兩五錢 茯苓一兩一錢 白朮一兩 山芎五錢 杭芍一兩 元胡五錢 香附一兩 甘草五錢

【制法】研末，煉蜜為丸或水疊為丸。

【剂量及用法】每服一丸，水疊每服二錢半。用開水早晚各服一次。

【禁忌】感冒不宜服。

二、濟南

【功能与主治】血虛氣滯，月經短少。

【处方】香附(炒)一斤十一兩 斷艾八兩 人參六兩 炙甘草四兩 当归十二兩 川芎一兩 白芍十二兩 熟地十二兩 炙黃芪十二兩 白朮(土炒)十二兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，梧桐子大。

【剂量及用法】每服三錢，白開水送下。

【禁忌】生冷、氣惱。

三、青島(1)

【处方】香附 祁艾 白朮 当归 黃芪 白芍各十二兩 人參 川芎各六兩 熟地一斤 炙草四兩

【制法】共軋面，水泛為小丸。

四、青島(2)

【处方】当归五斤 熟地五斤 白芍五斤 白朮二斤半 茯苓二斤半 棗仁二斤半 甘草二斤半 天冬二斤半 益母草五斤 山萸二斤半 橘紅二斤半 元胡十四斤 阿膠一斤半 条芩二斤零二 砂仁十一斤四 生地五斤 香附二十斤

【制法】共軋面，水泛為小丸。

五、沈陽

【功能与主治】調氣活血。主治婦人血虛發熱，氣郁不舒，精神恍惚，經血短少或患流產等症。

【处方与制法】香附一斤用黃酒、姜汁、乳酒制(無乳用鹽)及台烏藥 紅花 三稜 莪朮各一兩 煎汁浸一宿，晒干微炒再加下列各藥：熟地二兩 当归一兩五錢 川芎一兩 白芍一兩五錢 黨參二兩 炒白朮一兩半 茯苓一兩半 炙甘草一兩 山藥二兩 杜仲二兩 共碾細面煉蜜為丸，每什二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，淡鹽水或溫黃酒送下。

【禁忌】生冷。

十味香附丸

濟南

【功能与主治】血虛有熱，月經不調，氣郁不舒，脇腹脹痛。

【处方】香附(四制)一斤 当归 川芎 白芍(炒) 熟地黃各四兩 白朮 澤蘭叶 陳皮各二兩 黃柏一兩(鹽水炒) 炙甘草一兩

【制法】十藥十味為末，蜡糊為丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服三錢，空心鹽湯送下。

【禁忌】生冷、辛辣等食物。並忌憤怒。

舒肝保坤丸

濟南

【功能与主治】婦女經血不調，氣虛血衰，行經作痛，肝郁不舒，赤白帶下。

【处方】木香 厚朴 廣皮各八兩 沉香 元胡 当归 艾炭 香附 生熟地各五兩 川芎 紅花各二兩 坤草二斤

【制法】共軋細面，蜜大丸，重三錢，蜡皮封。

【剂量及用法】每服一丸，白水送下。

【禁忌】生冷。

崩露丸

天津

【功能与主治】和肝化郁，引血歸經。主氣郁不舒，肝胃不和，血崩血漏，淋漓不斷，過期不止。

【处方】香附(醋制) 野黨參(去蘆)各六錢 焦枳殼四錢 陳皮 当归各六錢 棕板炭 生地各八錢 蓮房炭 生白芍 貫眾炭各六錢 茜草四錢 丹皮炭六錢 血余炭四錢 甘草三錢 焦梔子四錢 杏仁 皮炭五錢 焦廣木香三錢

【制法】共為細粉，涼開水泛小丸，二錢重裝袋。

【剂量及用法】每次服一袋，白開水送下。

【禁忌】煩惱氣怒。

砂 鍋 丸

西 安

【功能与主治】主治婦女青春期萎黃病，月經不調，消化不良，帶下腹痛，精神萎靡等症。

【处方】野党參四兩 全當歸四兩 川芎二兩 核桃仁二兩 大棗四兩(去核) 旱朮四兩 苦杏仁四兩 桃仁二兩 紅花四兩

【制法】取砂鍋一個，黃酒二斤同藥入鍋內熬干，連砂鍋底研為細末，細羅篩過，煉蜜為丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每次一錢，白開水送下，每日一次。服藥后有欲嘔情形時，即將藥量酌為減少。

【禁忌】忌飲茶。

千金止帶丸

一、北 京

【功能与主治】抑制子宮分泌。主婦女帶下，腹痛腰痠，四肢倦怠，精神不振。

【处方】香附(制) 椿根皮 紅雞冠花各百六十兩 補骨脂 木香 白芍 杜仲 白朮 砂仁 續斷 青黛 玄胡索 小茴香 牡蠣(煅) 各四十兩 人參二十兩(去蘆) 川芎 當歸各八十兩

【制法】共為細粉，水泛小丸，用方內青黛外加滑石為衣闌亮。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水送下。

二、天 津

【功能与主治】除濕熱，止痛止帶。主婦女赤帶白帶，子宮濕熱，腰痠腿痛，體倦食少，胸滿腹脹。

【处方】香附(醋制)十兩 川芎五兩 杜仲炭(鹽炒) 生白芍 砂仁 小茴香(鹽炒)各二兩五錢 雞冠花十兩 煅牡蠣 元胡(醋制)各二兩五錢 廣木香二兩五錢 當歸五兩 故紙(鹽炒)二兩五錢 椿皮(醋炒)十兩 青黛 白朮(麸炒) 續斷各二兩五錢 党參(去蘆)一兩二錢

【制法】共為細粉，涼開水泛小丸，一錢重裝袋。或煉蜜為丸，三錢重蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】水丸，每次服一袋；蜜丸每次服一丸。白開水送下。

三、南京(止帶丸)

【功能与主治】主氣血兩虛之赤白帶下，日久不愈。

【处方】同北京。

【制法】上藥共研細末，人參另研和入，以沸水泛丸，每錢約七十粒。

【劑量及用法】每服一錢，一日三次，開水吞服。

四、杭 州

【功能与主治】治婦人氣血兩虛，肝腎虧損，頭暈目眩，腰痠肢軟，月經不調，帶下淋漓，久不孕育等症。此丸補元止帶，功效卓著。

【处方】炙黃芪二兩 全當歸三兩 大熟地二兩 蕪荏葉一兩 潞黨參二兩 臭椿皮一兩 白茯苓二兩 山萸肉二兩 川斷二兩 懷山藥二兩 補骨脂(炒)一兩 川黃柏(鹽水炒)一兩 赤石脂(煅)二兩 驢皮膠(蛤粉炒)一兩五錢 炒冬朮二兩 川芎一兩五錢 川杜仲二兩 酒白芍一兩五錢 制香附二兩 茅蒼朮(米泔水浸)一兩 巴戟天二兩五錢 制半夏一兩五錢 煅牡蠣三兩 肉桂心六錢 化龍骨(煅)一兩

【制法】共研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服二至四錢，開水送下，日服三次。常服則帶病必愈。

五、蘭 州

【功能与主治】除濕熱，止痛，止帶。主婦女赤帶，白帶，腰酸腿痛，體倦，胸滿腹脹。

【处方】同天津。

【制法】共研細面，水打小丸。

【劑量及用法】每次服三錢，每日兩次，白開水送下。

六、大 同

【功能与主治】婦女赤白帶症，經年不愈。

【处方】香附 椿皮 雞冠花各十斤 故紙 木香 白芍 杜仲 白朮 砂仁 續斷 青黛 元胡 小茴 牡蠣各二斤半 党參一斤四兩 川芎五斤 當歸五斤 芡實一斤半

【制法】以上十八味共軋細面，

水為小丸。

【劑量及用法】每次服一錢，每日服三次，久服自愈。

七、禹 縣

【功能与主治】婦女赤白帶下，白淫腥臭，腰痠耳鳴，腹痛潮熱。

【处方】党參三兩 白朮三兩 川續斷三兩 炒杜仲三兩 當歸三兩 山藥二兩 熟地二兩 白茯苓二兩 黃芪二兩 山萸肉二兩 川芎一兩五錢 龍骨一兩五錢 白芍一兩五錢 巴戟天一兩五錢 半夏一兩五錢 赤石脂一兩五錢 艾葉一兩 阿膠一兩五錢 煅牡蠣三錢 黃柏一兩 蒼朮一兩 炙甘草一兩 白椿樹皮一兩 破故紙一兩 肉桂心六錢

【制法】共合細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】寒火症忌服。

【備考】有效期一年。

八、濟 南

【功能与主治】體虛帶下。

【处方】當歸 香附 黃芪 茯苓 牡蠣 巴戟天 椿根白皮(炒) 白朮各四兩 川芎 党參 山藥各二兩 蕪荏一兩 龍骨 阿膠 赤石脂各二兩 杜仲 補骨脂 續斷 白芍各二兩 黃柏 半夏 蒼朮各一兩

【制法】共為細面，水泛小丸(松打)。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

【禁忌】辛辣生冷食物。

九、青 島

【处方】人參 故紙 川芎 山藥 阿膠 杜仲 龍骨(煅) 桂心 川斷 艾葉 石脂各二兩 白朮 茯苓 牡蠣 白芍 黃芪 當歸 熟地 山萸 巴戟 香附各四兩 蒼朮 黃柏 半夏各一兩

【制法】共軋面，水泛小丸，青黛為衣。

十、呼 和 浩 特

【处方】人參 肉桂各一兩 川芎 蕪荏各四兩 香附八兩 陳皮 石脂 龍骨 故紙 阿膠各四兩

茯苓 牡蠣 黃芪 當歸 巴戟
白朮各八兩 川斷六兩 半夏二兩
杜仲 白芍各六兩 炙草二兩

【制法】水泛小丸。

白帶丸

一、天津

【功能与主治】溫經散寒，利濕止帶。主濕寒白帶，淋漓不止，經期腹痛，血寒經閉，不思飲食，四肢倦怠，精神不振。

【处方】當歸四兩 生白芍二兩 野黨參(去蘆)二兩 焦白朮二兩 茯苓(去皮)四兩 椿皮(醋炒)二兩 鹿角霜二兩 故紙(鹽炒)二兩 芡實(炒)四兩 海螵蛸 香附(醋制)各二兩 肉桂(去細皮)一兩 陳皮 杜仲炭(鹽炒) 續斷 甘草各二兩 木通一兩五錢 吳萸(甘草水制)二兩

【制法】共為細粉，涼開水泛小丸，每斤丸藥用桃膠二錢化水，滑石三兩上衣，二錢重裝袋。

【劑量及用法】每次服一袋，白開水送下。

二、武漢

【功能与主治】白帶下注，經水不調，頭暈眼花，四肢無力。

【处方】云茯苓二兩 白朮二兩 山藥二兩(炒) 干姜二兩半(炒) 煅牡蠣二兩 煅龍骨二兩 白朮二兩 鹿角八兩 白芍二兩 赤石脂三兩

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用醋達成小丸，每錢不得少于五十粒。

【劑量及用法】每服一錢至三錢，早晚各服一次，開水送下。

【禁忌】服藥期間，忌食生冷。

三、福州(婦科白帶丸)

【功能与主治】常治婦人赤白帶下，經水不調，四肢無力，腰痠，胸悶，頭暈眼花，骨蒸內熱，飲食減少等症。

【处方】太子參二兩 牡蠣四兩 龜甲四兩 瞿麥四兩 蓮子四兩 芡實四兩 龍骨二兩 豆腐巴五兩

【制法】上方八味，共研細末，和鷄卵清拾粒糊丸。

四、重慶

【功能与主治】治赤白帶下，經水不調或先或后，頭暈眼花，四肢無力，腰痠胸悶，骨蒸內熱，飲食減少等症。

【处方】烏鰂骨一兩 山藥二兩 芡實二兩 炒黃柏五錢 醋柴胡四兩 白芍一兩 續斷五錢 香附四錢 白果仁一兩 車前子五錢 牡蠣一兩 赤石脂五錢

【制法】共研細末，煉蜜加鹽醋一兩和丸。

【劑量及用法】每服一錢至四錢。

【禁忌】忌食生冷、面食。

五、濟南

【功能与主治】赤白帶下，淋漓不止，凝滯腹痛，腰痠腿疼，四肢倦怠，多睡少食。

【处方】人參八兩 白朮(土炒) 茯苓 芡實 川芎 當歸 白芍(炒) 煅龍骨 煅牡蠣 阿膠(炒) 山藥(炒) 巴戟(炒) 熟地 杜仲炭 肉桂 黃芪 川斷 香附 赤石脂各四兩 半夏 蒼朮 黃柏各二兩 破故紙六兩

【制法】共為細粉，水泛小丸，青黛兩為衣。

【劑量及用法】每服一錢五分，臨睡時白開水送下。

【禁忌】生冷食物。

六、沈陽(婦女白帶藥)

【功能与主治】化瘀養血，止痛消腫。主子宮漏血，小腹脹痛，赤白帶下，排出膿血，精神不振，四肢倦怠，心悸不安，腰痠腿疼。

【处方】禹根石五錢 白茯苓一兩 沒藥五錢 白月季花一兩 白朮一錢 白芍藥花一兩 白鷄冠花一兩 琥珀三錢

【制法】共為極細面，加當歸一斤，煎濃汁合藥為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】辣、腥、雞及發物。

七、呼和浩特

(婦女白帶丸)

【处方】當歸 熟地 白芍 香附 龍骨 牡蠣 海螵蛸 茯苓

經帶類

黃芪各一兩 川芎 赤石脂 於朮 阿膠 炙草各八錢 條芩 黃柏各五錢 每料兌人參 肉桂各五錢 鹿茸 琥珀各三錢

【制法】共為細面，蜜大丸，重二錢，紙包，蜡皮封固。

固下丸

一、武漢

【功能与主治】婦人赤白帶下。

【处方】生白芍五錢 良姜二錢(炒炭) 黃柏二錢(炒炭) 椿根皮一兩半(醋炒)

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用淨水達成小丸，每錢不得少于三十粒。

【劑量及用法】每服一錢至五錢，米湯送下。

二、杭州(治帶固下丸)

【功能与主治】清理濕熱，固澀止帶。主婦人陰虛體弱，濕熱下注，赤白帶下，不能受孕之症。

【处方】同武漢。用量大十倍。

【制法】共研細末，米糊打丸。

【劑量及用法】每服二至四錢，米飲湯或開水送下。

椿皮丸

沈陽

【功能与主治】清熱化濕止帶。主婦女經熱腹痛，帶下如注，久患崩中漏血等症。

【处方】椿根皮二兩 白芍一兩 黃柏四錢 良姜六錢

【制法】共碾極細面，米糊為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，空心白開水送下。

【禁忌】忌五辛厚味。

逍遙散

昆明

【功能与主治】胸腹氣滯，兩脇疼痛，口苦目眩，月經不調。

【处方】薄荷五錢 白朮一兩 赤芍一兩 當歸一兩五錢 杭芍一兩 柴胡七錢 甘草七錢 梔子三錢 粉丹皮三錢 香附五錢

【制法】研末。

【劑量及用法】每服二錢半。用開水早晚各服一次。

【禁忌】身體衰弱者不宜服。

附參考古方

【來源】太平惠民和劑局方。

【功能與主治】治血虛勞倦，五心煩熱，肢體疼痛，頭目昏重，心忪煩赤，口燥咽干，發熱盜汗，減食嗜臥，及血熱相搏，月水不調，臍腹脹痛，寒熱如瘧。又治室女血弱陰虛，榮衛不和，痲嗽潮熱，肌體羸瘦，漸成骨蒸。

【處方】甘草(炙微赤)半兩 芍藥 當歸(去苗剉微炒) 茯苓(去皮) 白朮 柴胡(去苗)各一兩

【制法】上為粗末。

【劑量及用法】每服二錢，水一大盞，煨生姜一塊切破，薄荷少許，同煎至七分，去滓，熱服，不拘時候。

調經和血散

大 同

【功能與主治】經血不調，散寒止帶。

【處方】香附四兩 川芎四兩 生地黄二兩 當歸二兩 炒白朮二兩 茯苓一兩 陳皮一兩 山藥一兩 小茴香一兩 玄胡索一兩 真阿膠一兩 山萸肉一兩

【制法】共研細面。

【劑量及用法】每服二錢，黃酒沖服。

崩漏止血散

呼 和 浩 特

【處方】杏仁皮炭三錢 赤石脂炭二錢半 鷄冠花炭八錢 牡蠣粉三錢 貫眾炭四錢 香附炭八錢 當歸炭六錢 木耳炭四錢

【制法】共為細面。

【劑量及用法】每服二錢，黃酒送下。

千金止帶散

重 慶

【功能與主治】婦女白帶。

【處方】熟地二兩 光條二兩 茯苓一兩 杜仲一兩 白朮一兩 烏賊骨一兩 於朮二兩 廣皮三兩

蒼朮一兩 酒芍一兩五錢 煨牡蠣一兩五錢 遠志肉五錢 棗仁一兩

【制法】共為細末。

【劑量及用法】每日三次，每次重者五錢，輕者二至三錢。

玳 瑁 散

沈 陽

【功能與主治】除濕化熱。主婦女赤白帶下，小腹作痛，腰痠倦怠，日漸消瘦，止血凝滯，崩漏等症。

【處方】玳瑁 續斷各一兩 安息香 血竭 乳香 沒藥各五錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二錢，食前溫酒送下。

【禁忌】五辛發物。

白 帶 散

昆 明

【功能與主治】濕盛帶下，腰酸肢軟。

【處方】於朮十六兩 淮藥十六兩 蒼朮十六兩 茯苓十兩 猪苓六兩 黨參六兩 杜仲八兩 故紙六兩 天雄八兩 土姜六兩 黃芪十兩 柴朮六兩 廣皮四兩 益智六兩 薏米六兩 甘草三兩 白果三兩

【制法】研末。

【劑量及用法】每服二錢半，用開水早晚各服一次。

【禁忌】煩熱無白帶者忌服。

鹿 胎 膏

一、沈 陽

【功能與主治】調經養血。主虛寒性貧血，肢體枯瘦，面色萎黃，血虛經少。

【處方】鮮鹿胎一具 人參 白朮 茯苓 甘草 當歸 川芎 白芍 熟地各一兩

【制法】以元酒熬成膏。

【劑量及用法】每服二錢。

二、撫 順

【功能與主治】調經溫寒，養血益氣。治男女一切虛癆，氣血虛弱，營養不足，腰腿疼痛，精神疲倦，經血不調，子宮虛寒，經血參差，腹痛臍冷，白帶稠凝，血枯經閉。

【處方】梅花鹿胎一具 芎艾三兩 香附二兩 川芎一兩 當歸兩半 白芍一兩 炮姜炭五錢 紅花三錢 熟地四兩 吳萸 桂楠 黃芩 川牛膝 元胡各五錢 杜仲 川斷各一兩 丹皮 丹參各五錢

【制法】上藥水煎數滾濾渣，再用水熬數滾一連四五次澄清，再熬成膏，兌元酒數壺，共煉成膏為度。

【劑量及用法】每服一錢即五瓦，開水或元酒化服。

【禁忌】火盛者及孕婦勿服。

三、吉林、哈爾濱

(鹿胎膠)

【功能與主治】養血益氣，調經溫寒。主腎虛，經血不調，氣血虛弱。

【處方】鹿胎四具 鹿膠四斤 熟地八斤 茯苓三斤 白朮 當歸 人參 甘草 川芎 白芍各一斤

【制法】微火水熬，極稠為度，去渣，入鹿膠收膏。瓷罈密封存貯。

【劑量及用法】每服一錢，開水化服。

【禁忌】君相火盛者勿服。

養血當歸膏

(養血當歸精)

武 漢

【功能與主治】面色萎黃，肌肉消瘦，及婦女月經失常。

【處方】當歸四斤 川芎二兩 黨參四兩 白芍四兩 熟地四兩 黃芪四兩 茯苓四兩 阿膠十五斤 炙甘草二兩

【制法】取當歸粗粉四斤，加60%醇八斤，浸一星期，過濾，將醇收回；再將當歸殘渣與川芎、黨參、白芍、熟地、黃芪、茯苓、炙甘草等藥，混合入鍋，照量加水五倍，用常溫(70℃)浸漬四小時，過濾，照例二次；最後濾液，加阿膠十五斤，與當歸液合併濃縮，再加蔗糖十三斤，使成稠膏即得。

【劑量及用法】每服一茶匙，日服三次。

養血調經膏

一、北 京

【功能與主治】養血散寒止痛。主女子宮寒冷，經血不調，腹痛帶下。

【处方】当归 川附片 小茴香 良姜 川芎 木香各十兩

【制法】上药用香油二百四十兩炸枯去渣，煉至滴水成珠，入黃丹一百兩攪勻成膏。青毛鹿茸八兩 肉桂十兩 沉香八兩 以上三味，共為細粉，每十兩膏油兌藥粉二錢，攪勻攤貼。

【劑量及用法】微火化開貼臍上。

【禁忌】孕婦忌貼。

二、天津

【功能與主治】養血調經，助氣散寒。主婦女氣虛血寒，經血不調，經前錯後，行經腹痛，虛寒腹脹，作冷作癢。

【处方】腹皮二兩 紅花 廣皮各四兩 生艾叶二兩 生茴香四兩 生三棱二兩 生歸四兩 益母草八兩 生干姜二兩 生莪朮二兩

【制法】以上藥料，用香油十五斤炸枯去渣，濾淨，煉至滴水成珠，再入黃丹九十兩攪勻成膏。每十五斤膏油兌：木香面四兩攪勻。每張淨油八錢。

【劑量及用法】貼肚腹。

【禁忌】孕婦忌貼。

三、濟南(婦女調經膏)

【功能與主治】經血不調，陰寒腹痛，赤白帶下等症。

【处方】益母草一兩 延胡索一兩 穿山甲一兩 香附二兩 南紅花一兩 巴豆一兩五錢 川芎一兩 丹皮五錢 柴胡二兩 生地三兩 干姜一兩 蒼朮一兩 吳茱萸一兩 透骨草一兩 木香五錢 荊芥一兩 小茴香一兩 蘇艾一兩 邊桂五錢 薄荷一兩 防風二兩

【制法】用香油十斤，將藥浸在油內，冬七日、夏三日，熬至藥焦，去渣再熬，至滴水成珠，入炒黃丹四斤，攪成膏。

【劑量及用法】將膏攤丁布上，微火化開，貼于丹田穴(臍下三寸)。大小酌用，痛時用姜片擦淨。

附桂紫金膏

天津

【功能與主治】溫經散寒，補氣養血。主婦女經血不調，血海虛寒，行經腹痛，經來黑紫，肚腹脹疼，以

及體弱氣弱，腰腿無力，遍身痠疼。

【处方】防風 生杜仲 木瓜 白芷 生艾脂 獨活 當歸 川芎 羌活 生附子各二兩

【制法】以上藥料，用香油十五斤，炸枯去渣濾淨，煉至滴水成珠，再入黃丹九十兩攪勻成膏。每十五斤膏油兌：

乳香面 沒藥面 木香面 肉桂面各一兩攪勻。每大張淨油一兩重；小張淨油五錢重。

【劑量及用法】貼肚腹。

【禁忌】孕婦勿貼。

女經膏

南京

【功能與主治】主婦女陰虛有熱，經期超前，經量或多或少，色紫，心悸，骨蒸，口干，掌心灼熱等症。

【处方】制附甲五兩 白茯苓二兩 益母草二兩 大熟地四兩 當歸一兩 炙甘草一兩 地骨皮二兩 淡黃芩一兩 山芎一兩五錢 南沙參一兩 制香附三兩 陳阿膠二兩 炒白芍二兩 丹參二兩 雪梨膏四兩 青蒿二兩 月斷三兩 白蜜四斤 生白朮二兩 杜仲二兩

【制法】上藥又火共熬濃汁去渣，再煮一用阿膠、雪梨膏、白蜜收膏。

【劑量及用法】每服一錢，一日三次，早晚開水吞服。

調經回春膏

北京

【功能與主治】理氣通經，化瘀止痛。主經血不調，血色不正，血瘀結塊，脇腹腹痛。

【处方】當歸二兩 生地一兩 香附二兩(制) 大黃一兩四錢 肉桂一兩 杜仲一兩 金蠟一兩 玄胡索各一兩 白朮一兩四錢 細辛五錢 防風一兩 益母草二兩 木香一兩四錢 鹿膠一兩 穿山甲六錢 杏仁一兩 獨活五錢 羌活五錢 大花粉一兩 黃連八錢 桃仁六錢 白芍一兩 枳實五錢 三棱六錢 黃芩一兩 玄參一兩 草烏各一兩 熟地二兩 豬牙皂八錢 莪朮六錢 板榔八錢 川芎一兩 烏藥一兩 紅花 懷牛膝各六錢 絲瓜絡一兩 丹參各一兩

【制法】上藥用香油三百二十兩

炸枯去渣，煉至滴水成珠，奉入黃丹一百三十八兩，秋入黃丹一百三十六兩攪勻成膏。

丁香七錢 干姜二錢 阿魏一錢 乳香 沒藥 血竭各一錢 肉桂四兩 冰片六錢 麝香二錢 以上九味，共為細粉，每十六兩膏油，兌藥粉八錢，攪勻攤貼。

【劑量及用法】微火化開貼臍上。

【禁忌】孕婦忌貼。

益母草膏

一、北京

【功能與主治】調經去瘀生新。主經期不準，血色不正，量少腹脹。

【处方】鮮益母草四百八十兩(干亦可) 白芍 生地 川芎 當歸各四十八兩

【制法】共熬汁收膏，以不陰紙為度，每十六兩膏汁加煉蜜十六兩。

【劑量及用法】每服五錢，開水調化送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天津

【功能與主治】調經活血，消瘀止痛。主經血不調，經閉經少，腰痠腹痛，產後血暈，胞衣不下，血瘀作癢。

【处方】當歸 川芎 生白芍 生地 紅花各二斤 鮮益母草一百斤

【制法】以上藥熬汁去渣過濾，將汁煉至滴在毛紙上，背面不滲為標準。收清膏，每十四斤膏兌紅糖五十斤，將紅糖用清水溶化成稀汁，待沉澱，去淨泥沙，煉去水分，再和清膏溶化一起收膏裝瓶。

【劑量及用法】每次服一兩，白開水沖服。

【禁忌】孕婦忌服。

三、南京

【功能與主治】主經水不調，產後瘀血腹痛。

【处方】益母草十斤 西洋參一斤 大熟地一斤 撫川芎一斤 醋炒白芍一斤

【制法】上藥共五味，用清水煎熬濃汁，去渣濾清，加赤砂糖二十斤收膏。

【劑量及用法】每服一湯匙(約五錢),一日二次,開水吞服。

四、武 漢

【功能與主治】治婦女月經閉阻,產後惡露不盡,亦可用治折傷。

【處方】益母草一百斤(采紫花、方莖者,連根洗淨)。

【制法】取益母草,照量加水十倍,將藥煮兩次,去渣過濾取汁,濃縮約四十斤,加赤砂糖四十斤(溶化),對入過濾,使成膏四十斤即得。

【劑量及用法】每服五錢,白開水沖服。

【禁忌】孕婦忌服。

五、杭 州

【功能與主治】治婦人瘀積經閉,月事不調,血塊腹痛,產後惡露不盡,血暈神昏,一切胎產氣血諸病,以及跌打損傷,瘀血積滯,天陰則痛等症。

【處方】益母草(采紫花方莖者連根洗淨)。

【制法】于石臼內搗爛,以布過濾取濃汁,酌加赤砂糖,文武火煎煉成膏。

【劑量及用法】每服二—五錢,不拘時,紅棗湯或開水沖服。如有瘀血者,熱黃酒沖服。

六、南 昌

【功能與主治】氣血不和,月經不調,產後惡露不盡。並治打傷內損,血上凝滯,天陰則痛。

【處方】益母草三十斤

【制法】用紅糖十斤收膏。

【劑量及用法】每服二至五錢,開水調服。

【禁忌】孕婦忌服。忌食生冷、辛辣等食物,並且忌氣惱。

七、沙市(四物益母膏)

【功能與主治】治婦人貧血,月經不調,容顏枯槁,瘀滯腹痛等症。

【處方】熟地五斤 川芎二斤 白芍一斤 鮮益母草一百斤(連根洗淨)

【制法】上藥煮取濃汁去渣,加紅糖二十斤收膏。

【劑量及用法】每次服五錢,用開水沖服,每日服二次。

【禁忌】大便滑瀉而無瘀滯者忌服。

服。

八、重 慶

【功能與主治】治女性經脈不調,胎前產後氣血兩虧,並治折傷、內傷,瘀血積滯。

【處方】益母草十斤 砂糖二斤

【制法】鮮益母草洗淨入鍋內熬汁去渣,用砂糖收膏,裝瓶包裝。

【劑量及用法】每服一匙。

九、西 安

【功能與主治】治婦人素有郁熱,以致經水不調,小腹脹痛,帶下等症。

【處方】益母草

【制法】益母草不拘多少,先以清水洗淨,入鍋內煮濃其汁,去渣熬稠,酌兌紅糖,續熬成膏收用。

【劑量及用法】每服五錢,統一湯匙,開水調和食前服。日一、二次皆可。

【禁忌】孕婦忌服。內無郁熱,小便頻數,大便溏泄,胃寒者均不宜服。

十、蘭 州

【功能與主治】調經活血,消瘀止痛。主經血不調,經閉經少,腰痠腹痛,血暈,胞衣不下,血瘀作癥諸症。

【處方】同天津。

【制法】用水熬膏,去渣加紅糖五十斤,煉成膏。

【劑量及用法】每服一瓶(即一兩),開水送下。

【禁忌】忌生冷油膩等物。

十一、禹 縣

【功能與主治】陰血虛弱,經脈不調,崩漏下血,胎漏難產,久不受孕。

【處方】益母草十斤 當歸十二兩 川芎十二兩 熟地一斤 白芍二斤 紅糖五斤 蜂蜜二斤

【制法】先將藥煎汁,再加紅糖,蜂蜜收膏。

【劑量及用法】每服三錢,黃酒、白開水均可。

【禁忌】胃弱、便溏忌用。

【備考】有效期二年。

十二、濟 南

【功能與主治】血虧血瘀,行經

腹痛。

【處方】益母草、子、葉、花、梗俱用。

【制法】用新汲水熬膏,用紅砂糖收之。

【劑量及用法】每服三錢(約二茶匙),白開水送下。

【禁忌】生冷辛辣等物。

【備考】每百斤益母草熬膏十三—十五斤,每十五斤—二十斤膏加砂糖四十斤,使全量成五十五斤—五、六斤。

十三、青 島(1)

【處方】益母草五十斤 川芎八兩 白芍八兩 生地八兩 紅花四兩

【制法】共為一處,熬膏加蜜收之。

十四、青 島(2)

【處方】益母草 當歸 赤芍 白芍 延胡 蜂蜜

【制法】共熬膏,加蜜收之。

十五、沈 陽

【功能與主治】活血行經,破瘀化積。主產後惡露不下,小腹疼痛,腹中積塊,發熱不食。

【處方】益母草一百斤 蜂蜜十斤

【制法】先將益母草熬汁調和,再入蜂蜜熬成膏。

【劑量及用法】每服一湯匙,棗湯或開水調服。

十六、吉林、哈爾濱

(坤膏或坤草膏)

【功能與主治】去瘀生新,經血不調,惡露不盡。

【處方】益母草若干

【制法】上端午日采紫花方莖之益母草,連根洗淨,于石臼內搗爛,以布濾取濃汁,入砂鍋中,文武火熬成膏,如沙糖色為度。用遮光瓶裝或瓷罐存貯。

【劑量及用法】用紅糖水沖服一匙,或用黃酒沖服。

【禁忌】孕婦忌服。

十七、承 德

【功能與主治】月經不調,產後惡露不盡。

【处方】益母草一千六百兩

【制法】將益母草先煮三次，榨淨澄清過濾，熬成濃汁，再將赤砂糖六百四十兩溶化濾清和入藥汁內，成膏六百四十兩。

【劑量及用法】每服五錢，白開水調服。

十八、呼和浩特

【处方】鮮益母草(先熬汁)十斤
當歸 生地 白芍 川芎各四兩

【制法】煎汁成膏。

八宝坤順丹

一、北京、承德

【功能与主治】補氣養血，舒肝調經。主經期不準，腹痛帶下，精神倦怠，飲食減少。

【处方】益母草一百五十兩 當歸 生地 香附 橘紅 沉香 烏藥 川芎 熟地 茯苓 黃芩 懷牛膝 白芍各二十五兩 人參十兩(去蘆) 白朮 紫蘇叶 木香 阿膠 甘草 琥珀 砂仁各十二兩五錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重二錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌食生冷，孕婦勿服。

二、天津

【功能与主治】調經養血。主經血不調，經前錯後，行經腹痛，氣虛血滯，腰腿疼痛，四肢浮腫。

【处方】茯苓(去皮) 黃芩 橘紅 白朮(煨炒) 熟地各一兩 甘草 人參(去蘆) 益母草 沉香各五錢 生地 當歸 生白芍 川芎各一兩 砂仁 懷牛膝各五錢 廣木香二錢 琥珀面五錢

【制法】以上研細和勻，煉蜜為丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、蘭州

【功能与主治】主婦女經血不調，經前錯後，氣虛血滯，腰腿疼痛，四肢浮腫各症。

【处方】云苓一兩 條芩一兩 橘紅一兩 白朮一兩 酒地黃一兩

甘草五錢 黨參五錢 益母草五錢 沉香五錢 琥珀五錢 生地一兩 當歸一兩 白芍一兩 川芎一兩 杜仲五錢 牛膝五錢 木香二錢

【制法】共研細末，蜜丸三錢重，蜡皮封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

四、大同

【功能与主治】婦女經血不調，月經參差，胎前產後，氣血兩虧。

【处方】生地 當歸 白朮 條芩 熟地 茯苓 烏藥 橘紅 白芍 木香 香附 川芎以上各五錢 蘇叶二錢半 阿膠二錢半 砂仁二錢半 甘草一錢半 牛膝一錢 沉香一錢 人參二錢 益母草一兩半

【制法】共為細面，煉蜜為二錢丸，金箔十六開上，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服二丸，每日服一次，常服每次一丸，白開水送下。

【禁忌】生冷、豬肉等物。

五、濟南

【功能与主治】經血不調，腰痠腹痛，赤白帶下，產後血瘀。

【处方】益母草九斤六兩 川芎一斤九兩 白朮十二兩五錢 當歸一斤九兩 熟地一斤九兩 紫蘇叶十二兩五錢 生地一斤九兩 茯苓一斤九兩 木香十二兩五錢 香附一斤九兩(醋炒) 黃芩一斤九兩 阿膠十二兩五錢 橘紅一斤九兩 懷牛膝一斤九兩 甘草十二兩五錢 沉香一斤九兩 白芍一斤九兩 琥珀十二兩五錢 烏藥一斤九兩 人參十兩 砂仁十二兩五錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重二錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服二丸，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌惱怒及食生冷。

六、青島(1)

(金衣八宝坤順丹)

【处方】同濟南。

【制法】共軋面，蜜丸重二錢五，赤金為衣。

七、青島(2)(坤順丹)

【处方】坤草三兩 香附三錢 紫蘇四錢 當歸五錢 阿膠三錢

川芎三錢 白芍二兩 生地三錢 木香二錢 熟地三錢 砂仁三錢 琥珀三錢 甘草三錢 黃芩三錢 橘紅五錢 烏藥五錢 茯苓五錢 白朮五錢 砂仁二錢 牛膝一錢 黨參三錢

【制法】共軋面，蜜丸，重二錢五分，赤金，蜡皮封固。

八、沈陽(人參坤順丹)

【功能与主治】養血調經，舒肝解郁。治婦人月經不調，經前錯後，經閉腹痛，赤白帶下，腰痠腿疼。四肢疲乏，心悸氣促，胸脇脹痛，頭暈心煩，驚恐善忘，口渴咽干，精神抑鬱。

【处方】人參五錢 益母草七兩二錢 云茯苓一兩二錢 白朮二兩二錢 生地黃一兩二錢 當歸一兩二錢 橘紅一兩二錢 香附一兩二錢 廣砂七兩二錢 白芍一兩二錢 紫蘇七兩二錢 台烏一兩二錢 熟地黃一兩二錢 川芎一兩二錢 牛膝一兩二錢 黃芩一兩二錢 木香一兩二錢 沉香一兩二錢 阿膠七兩二錢 琥珀五錢 甘草七兩二錢

【制法】共軋極細面，用益母膏和蜜為丸，三錢重。

【劑量及用法】每服一丸，開白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

【備考】赤金衣，蜡皮封固。

九、撫順

【功能与主治】養血調經。主月經痛，月經困難，先後不調，臍腹脹痛，心跳頭暈，午後發熱或月經稀薄，面色蒼白，四肢困乏等症。

【处方】白人參一兩 川芎 當歸 白朮 台烏 熟地各二兩 廣木香一兩 黃芩 云苓 生地 白芍 沉香各二兩 琥珀 阿膠各一兩 廣砂仁 橘紅各二兩 甘草 蘇叶各一兩 香附二兩 牛膝一兩 益母草十二兩

【制法】共為細面，蜜丸三錢重，蜡皮封。

【劑量及用法】每服一丸，早晚二次，食前白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

十、哈爾濱(人參坤順丹)

【功能与主治】清熱養血順氣。

經血先期，晡熱蒸燒，心跳頭暈，臍腹脹痛。經血參差，先後無定，面色蒼白，四肢乏困。主經血先期（血熱），經血參差（血虛）。

【處方】坤草三兩 川牛膝二錢 益沉香 撫芎各五錢 紫蘇梗二錢半 全當歸五錢 貢阿膠二錢半 炒白芍五錢 廣木香二錢半 大生地 制香附 子條芩各五錢 廣砂仁二錢半 大熟地 生白朮 塊茯苓各五錢 化橘紅二錢 台烏藥五錢 生甘草 揀人參各二錢 玄琥珀二錢半

【制法】共為細面，煉蜜為丸，每丸重二錢一分，大赤金衣。棉紙包裹，蜡皮封。

【劑量及用法】每服一丸。

【禁忌】孕婦忌服。

十一、呼和浩特

【處方】坤草三兩 當歸 生地 白芍 條芩 九地各五錢 茯苓 烏藥 橘紅各五錢 蘇葉 阿膠各一錢五分 白朮五錢 木香一錢 甘草錢半 砂仁二錢半 香附五錢 川牛膝一錢 川芎五錢 人參二錢 琥珀五錢 沉香一錢

【制法】蜜大丸，重二錢，半金衣，蜡皮封固。

寧 坤 丹

一、沈 陽

【功能與主治】調經和血。主婦人經血不調，赤白帶下，經崩經漏，腰腿疼痛，心跳失眠，驚悸怔忡。

【處方】制黃耆三兩 白朮二兩 桑仁二兩 當歸二兩 香附一兩 川續斷二兩 條黃芩（酒炒）二兩 枸杞二兩 血余二兩 阿膠一兩 杜仲二兩 茯苓兩半 酒白芍兩半 丹參兩半 五味子六錢 甘草一兩 生地黃四兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸。二錢重。再將硃砂研細為衣。

【劑量及用法】每服一丸。食前白開水送下。

二、撫 順

【功能與主治】養血調經。主月經不調或數月不潮，腹痛拒按，腰腿痠痛，四肢發熱，久不孕育，子宮濕寒，白帶頻頻，累月不斷，腰腿痠痛

等症。

【處方】黃芪三兩 茯神一兩半 川斷二兩 黃芩二兩 白芍一兩半 血余炭一兩 白朮二兩 桑仁二兩 丹參一兩半 五味子六錢 杜仲炭二兩 阿膠二兩 當歸 香附 枸杞各二兩 甘草一兩 熟地四兩 硃砂一兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。蜡皮封。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下，紅糖水亦可。

【禁忌】忌生冷油膩。孕婦忌服。

三、吉林、哈爾濱

（寧坤至寶丹）

【功能與主治】生新逐瘀，溫化寒濕。主血寒經閉，氣滯經閉，經血不調或數月不潮，腹痛拒按，腰腿痠痛，胸脘脹悶，四肢發熱或久不孕育，寒濕凝滯，帶脈不宣，赤白帶下淋漓不斷，腰腿痠痛。

【處方】黃芪 白朮 白芍 歸身 川斷各一兩五錢 茯神七錢五分 桑仁 香附 杜仲 枸杞各一兩 條芩七錢五分 甘草五錢 血余（炭）一兩 丹參（酒炙）七錢五分 黃桂一兩 熟地二兩 五味二錢 葶片五錢 硃砂（為衣）五錢

【制法】除硃砂為研外，余均研成細粉，煉蜜為二錢一分重丸，硃砂為衣。棉紙包，蜡皮封。用瓷罐保存。

【劑量及用法】每服一丸，用白開水或紅糖水為引。（吉林 每日早晚二次）

【禁忌】忌食生冷油膩。

寧坤至寶丹

一、蘭 州

【功能與主治】調經養血，順氣開瘀。主經血不調，腰腹疼痛，赤白帶下，四肢浮腫，胸膈疼痛，嘔逆脹滿等症。

【處方】益母草八兩 香附八兩 當歸四兩 川芎四兩 台烏藥四兩 黃芩四兩 生地四兩 白朮四兩 茯苓四兩 丹參四兩 砂仁四兩 青皮四兩 廣木香四兩 杜仲（炒）四兩 肉桂二兩 黨參八兩 甘草四兩 元胡四兩 枸杞四兩 柴胡

二兩 沉香四兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。蜡皮封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

二、青 島

【處方】人參 當歸 茯苓 白朮 艾炭 丹皮 益母草 生地 條芩各四兩 琥珀一兩 阿膠一兩 砂仁一兩五錢 沉香八錢 木香三兩 香附三兩 白芍三兩 川芎一兩 橘紅四兩

【制法】共為細面，蜜丸重二錢五分。

救 丹

北 京

【功能與主治】養血調經。主婦女經期不准，忽多忽少，行經腹痛。

【處方】白芍 川芎 生地 熟地 當歸 黃芩 茯苓 烏藥 橘紅各五錢 阿膠 紫蘇葉 砂仁 香附 白朮 琥珀 人參（去蘆）各四錢 木香 沉香各一錢 川牛膝 甘草各二錢 益母草二兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重二錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

參茸濟坤丹

呼 和 浩 特

【處方】坤草一兩 九地六錢 黃芪六錢 當歸六錢 台黨八錢 貢膠二錢 山藥五錢 丹皮五錢 茯苓 沒藥 杜仲 故紙 枸杞 香附 川芎各五錢 白芍 川柏各三錢 條芩 炙甘草各五錢 茴香二錢 鎖陽一錢 紫朴三錢 砂仁二錢 紫河車四錢 人參五錢 沉香二錢 血茸八錢 肉桂三錢

【制法】共為細面，蜜大丸，重四錢，半金衣。蜡皮。

百寶濟坤丹

青 島

【處方】丹參五錢 桔梗五錢 赤芍一兩（燒酒炒） 丹皮五錢

白芍一两 厚朴五錢(姜炙) 当归一两五 酒浸) 元胡一两五(酒炒) 熟地一两(姜炙) 生地一两(姜炙) 木通五錢 桑杏五錢(火酒炒) 天冬一两 牛乳浸) 麦冬八錢(酒炒) 香皮八錢(酒炒) 花粉七錢五 梔子五錢 炒) 枳壳五錢(麸炒) 澤蘭叶 一两五 雄黄五分 香附二两(酒浸炒) 伏龙肝一两 茯神 一两 於朮四錢 龙胆草 一两 連翹(去心) 七錢八分 建曲二两(麸炒) 益智仁五錢 广木香四錢 蟬退五錢(洗淨) 白豆蔻二两五錢 紅花一两

【制法】共軋面，蜜丸重二錢五分。朱衣蜡皮。

育麟保坤丹

天 津

【功能与主治】气滯血亏，养血种子。主經血不調，赶前錯后，行經腹痛，不思飲食，体倦身懶。

【处方】益母草一斤 香附(醋制)四两 生白芍二两 当归四两 广木香 丹参 柴胡各 一两 續断 杜仲炭 盐炒)各二两

【制法】共为細粉，炼蜜为丸，三錢重。每斤丸药用朱砂面三錢上朱、蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

保 坤 丹

一、

处方删

二、沈 阳

【功能与主治】养血調經，化痰定痛。主經血不調，癥瘕疼痛，产后血暈，胎衣不下。

【处方】益母草一斤 当归一斤 川芎八两 香附八两

【制法】共軋极細面，炼蜜为丸。二錢重。朱砂为衣。

【剂量及用法】每服一丸，黄酒送下。

培 坤 丹

兰 州

【功能与主治】調經养血健胃。主妇女貧血，消化不良，月經不調，赤白带下，小腹冷痛，精神不振，倦怠嗜卧，体溫低降，不耐寒冷等症。

【处方】炙黄芪三斤 白朮三斤 炙草八两 广陈皮二斤 当归五斤 川芎一斤 杭芍一斤 砂仁九两 北沙参一斤 云茯苓二斤 枣仁二斤 寸冬二斤 杜仲二斤 核桃仁一斤四两 胡芦巴二斤八两 艾叶一斤 元肉二斤 山茱二斤 远志肉四两 熟地四斤 五味子八两 酥油四两

【制法】以上各药研为細末，以酥油熔拌微炒，炼蜜为丸(小丸)。

【剂量及用法】每服二錢，一日两次。黄酒或白开水送下。

【禁忌】抑郁气滯，内有蕴热者忌服。

定 坤 丹

一、北 京

【功能与主治】調經理血。主如女虛弱，經期不準，行經腹痛，腰痠帶下。

【处方】当归二两 人参五两(去芦) 青毛鹿茸二两 藏紅花二两 熟地四两 於朮三兩 汉三七 鸡血藤各二两五錢 白芍 枸杞子各三兩 阿胶二两 益母草 香附 玄胡索 柴胡 羌蔚子 鹿角霜 五灵脂 甘草各五錢 茯苓 干姜(炮) 杜仲各四錢 川牛膝 砂仁各三錢 川芎 黄芩 肉桂各二錢 烏药三錢 細辛一錢五分

【制法】以上二十九味除汉三七、香附、甘草、茯苓、砂仁、肉桂、細辛串粗木鋪槽外，余药用黄酒四十八两蒸透，晒干共为細粉，炼蜜为丸，重四錢，朱砂为衣，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，日服二次，温开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

二、重 庆

【功能与主治】調养血气，清补脾胃。

【处方】鹿茸二两 当归二两 熟地二两 肉桂二两 丽参二两 杜仲二两 制香附二两 於朮一两 玄胡索一两 艾叶(炒炭)一两 茯苓一两五錢 沉香五錢 炙甘草五錢 丹皮五錢 杜牛膝五錢 煅赤石脂五錢 干姜(炒泡)五錢 白薇五錢 白芍五錢 川芎五錢 广木香二錢 紅花五錢

【制法】除鹿茸、丽参另研外，余药共研細末，炼蜜为丸，每重二錢，蜡壳封固。

三、兰 州

【功能与主治】气血亏損，經血不調。主妇女气血不足，經水不調，精神不爽，腰痛耳鳴，四肢酸懶，手足煩麻，骨蒸发热，血崩血漏，赤白带下，干血成癆及胎产前后等症。

【处方】鹿茸二两 当归二两 酒地二两 丽参二两 杜仲二两 香附二两 於朮一两 元胡一两 艾叶一两 云苓一两五錢 炙草五錢 粉丹皮五錢 川牛膝五錢 石脂五錢 炮姜五錢 白薇五錢 川芎五錢 杭白芍五錢 藏紅花五錢 沉香五錢 广木香二錢

【制法】共为細粉，炼蜜为丸，二錢重，蜡反封固。

【剂量及用法】每服一丸，温黄酒送服。

四、沈 阳

【功能与主治】調經养血，舒郁补虛。主月經愆期，赶前錯后，經閉不行，赤白带下，行經腹痛，食少骨蒸，干血癆瘵，屢患小产，胎动不安，崩漏不止，难产等症。

【处方】人参三兩 白朮三兩 熟地一斤 归身一斤 酒芍一两 茯苓一錢半 炙草五錢 川芎五錢 烏药五錢 阿胶二两 坤草五錢(醋炒) 香附七錢 牛膝三錢 肉桂五錢 枸杞二兩 砂仁二錢 鹿角霜五兩 細辛三錢 黄芩(酒炒)三錢 杜仲四錢 元胡五錢 藏紅花五錢 姜炭四錢 柴胡五錢 三七

二兩半 芡脂五錢 芫薺子五錢
鹿茸五兩 鶴血藤(羔)二兩半

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸。
錢重。蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸。黃酒送下。

【禁忌】五辛發物，油膩。

五、承德

【功能與主治】月經不調，體虛腹痛。

【處方】同北京。

【制法】上藥用紹酒蒸透晒干，共為細粉，煉蜜為丸，重二錢，硃砂為衣。蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。

救苦金丹

一、北京

【功能與主治】益氣調經。主經期不准，腹部脹痛，癥瘕痞塊，精神疲倦。

【處方】當歸六十四兩 木香十六兩 玄胡索 藁本 白薇 赤石脂(半) 黃柏 丹皮 阿膠 黃耆 人參(去蘆) 山藥 川芎 白芍 甘草 熟地 沒藥 白芷 黃芩 砂仁 鹿角 白朮 茯苓各六十四兩 血余(炭) 蘗艾(炭) 小茴香各八兩 青蒿 乳香 杜仲 鎖陽 菟絲子 紅花 肉桂 續斷 紫蘇叶 補骨脂各十六兩 松香脂 紅白鷄冠花各三十二兩 橘皮九十六兩 益母草二百四十兩

【制法】以青蒿、川芎、木香、益母草、白芷、藁本、白朮、砂仁、黃芩、橘皮、紫蘇叶、續斷、肉桂、紅花十四味，共軋粗末鋪晒槽，余下罐加黃酒一千一百八十四兩蒸三晝夜。再將群藥加在一起，共為細粉，煉蜜為丸，重一錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、大同(益坤救苦金丹)

【功能與主治】經血不調，赤白帶下，久不受孕，骨蒸癆瘵(常服經順血調，自能受孕)。

【處方】當歸半斤 白芷二兩 肉桂二兩 藁本二兩 川芎二兩

煅赤石脂二兩 九熟地四兩 茯苓四兩 白芍四兩 丹皮四兩 白薇一兩半 黨參四兩 白朮二兩 元胡二兩 沒藥二兩 益母二兩 艾炭二兩 阿膠六兩 香附十兩

【制法】以上十九味用白酒泡透，晒，共軋細面，煉蜜為三錢丸，蜡皮。

【劑量及用法】每次服一丸，日服二次。

三、濟南

【功能與主治】經期腹痛，月經不調，赤白帶。

【處方】同北京(益母草用二十五斤)。

【制法】將青蒿、川芎、木香、益母草、白芷、藁本、白朮、砂仁、黃芩、橘皮、紫蘇叶、續斷、肉桂、紅花，共為粗末，鋪入晒槽，余下罐內加黃酒一百五十斤，蒸三晝夜，再將各藥合在一處，共為細粉，煉蜜為丸，重二錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌食生冷及有刺激性之物。

四、青島(益心救苦金丹)

【處方】坤草三兩 茯苓五錢 木香一錢五 烏藥五錢 香附五錢 牛膝二錢 砂仁一錢五 白朮二錢 生地五錢 川芎五錢 沉香五分 阿膠一錢五 甘草一兩五 白芍五分 橘紅五錢 紫蘇二錢五 桑葉五錢 熟地五錢 當歸五錢 琥珀二錢五

【制法】共軋面，蜜丸重二錢，蜡皮封。

五、沈陽(婦女救苦金丹)

【功能與主治】調經養血，平肝理氣。主婦女氣虛血弱，經水不調，赤白帶下，不思飲食，行經腹痛。

【處方】元胡 山藥 熟地 黃芪 人參 白芍 甘草 茯苓 當歸 鹿角各四兩 川斷 兩六錢 阿膠四兩 杜仲一兩六錢 茴香八錢 故紙一兩六錢 菟絲一兩六錢 芎艾八錢 血余八錢 沒藥四兩 乳香四兩 紅鷄冠花一兩六錢 白鷄冠花一兩六錢 石脂四兩 黃柏四兩 益母膏一斤

【制法】以上諸藥共置一罐內，兌黃酒十斤，用火煮七天七夜，取出晒干，再對以下藥品：川芎 丹皮 白朮 白芷 黃芩各四兩 紅花一兩六錢 陳皮六兩 砂仁四兩 木香一兩六錢 共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】生冷。

六、呼和浩特

【處方】元胡 山藥 石脂 川芎 丹皮 熟地 黃芪 白芷 白薇 白朮 茯苓 甘草 沒藥 白朮 當歸 黃柏各二兩 阿膠 鹿膠各五錢 紅花 砂仁 茴香 鎖陽各二錢 坤草四兩 黃芩三兩

【制法】蜜丸，重二錢，半金衣，蜡皮封。

女金丹

一、北京、承德

【功能與主治】調經養血，溫暖子宮。主經期不准，子宮寒冷，腹痛腰痠，四肢無力。

【處方】玄胡索 白朮 官桂 川芎 白芍 茯苓 沒藥 丹參 熟地 鹿角霜 吳茱萸 阿膠 藁本 白芷 甘草 赤石脂 白薇各一百一十二兩 橘皮 當歸各二百二十四兩 香附三百三十六兩(炙) 黨參五十六兩 益母草三百二十兩 人參三十二兩(去蘆) 砂仁八十兩

【制法】共為細粉，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服三錢，日服二次，溫開水或姜湯送下。

【禁忌】孕婦勿服。

二、天津

【功能與主治】調經養血，順氣活瘀。主經血不調，起前錯后，腰腿痠痛，腹痛脹滿。

【處方】元胡(醋制) 生白芍 川芎 茯苓(去皮) 黃芩各七兩 陳皮十四兩 鹿角霜十五兩 白芷七兩 黨參(去蘆)五兩五錢 當歸十四兩 白薇 丹皮 白朮(熟炒) 制沒藥 肉桂(去粗皮) 熟地 生阿膠 藁本 甘草各七兩 砂仁五兩 香附(醋制)十五兩 益母草一斤四兩 煅赤石脂七兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸三

錢重。蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

三、武汉（女金丸）

【功能与主治】体力虚弱，发生头痛血厥，经闭腹痛，及崩带不止，虚烦呕吐等症。

【处方】党参 白薇 藁本 炙甘草 川芎 丹皮 云茯苓 白芷 白朮 肉桂 赤石脂 当归 没药 白芍 玄胡各一兩 香附十五兩（炒，酒浸三日，晒干）

【制法】小丸——取上药进行干燥，混合碾细，照净粉量加炼蜜50~52%，迭成小丸，每钱不得少于二十五粒。

大丸——如法得净粉后，加炼蜜120~130%，和成大丸，每丸重为二钱。

【剂量及用法】每服二钱至四钱，开水送下。

四、南昌

【功能与主治】妇人体虚，面色萎黄，腰痠腹痛，崩漏带下，月经不调，久不孕育。

【处方】同武汉

【制法】前药除香附、赤石脂、没药另研外，其余者用黄酒浸三日，晒干略炒，研细末共和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】日服二次，每服三钱，白开水送下。

【禁忌】忌辛辣等食物。孕妇忌服。

五、昆明

【功能与主治】安胎保产，温暖子宫，营养补血，强健身体。主月经不调，红崩白带。

【处方】党参四兩 白朮四兩 熟地四兩 当归四兩 枯芩一兩 川芎四兩 白芍四兩 茯苓四兩 丹皮四兩 香附四兩 陈皮一兩 白薇四兩 甘草二兩 續断二兩 砂仁一兩 元胡四兩 肉桂四兩 桑寄生四兩 阿膠四兩 杜仲四兩 菟絲子四兩 炒荆芥二兩 炒艾叶二兩

【制法】研末炼蜜为丸，外装蜡壳。

【剂量及用法】每服一丸，水吞，每服二钱半。用开水早晚各服一次。

【禁忌】感冒忌服，並忌鱼腥。

六、西安（胜金丹）

【功能与主治】治妇人神经性子宫贫血及由此而引起之头痛目眩，血压高，子宫炎（赤白带下）月经不调，不易受孕，产后瘀血腹痛等症。

【处方】人参 白芍 赤芍 川芎 丹皮各一兩五錢 肉桂 茯苓 白朮各一兩五錢 当归 白薇各四兩 藁本二兩（以上为第一项） 香附米一斤 熟地四兩（以上为第二项） 赤石脂 白石脂各二兩 乳香 没药各一兩 琥珀 硃砂各五錢（以上为第三项）

【制法】将第一项各药共合一处，酒浸一日，取出焙干为末。再将第二项之药和入打和一处。最后再入第三项之药和匀后，炼蜜为丸，梧桐子大，金箔为衣。

【剂量及用法】每服二十丸，温黄酒送下，每日早晚一次服。

【禁忌】孕妇忌服。

七、兰州

【功能与主治】调经养血，顺气活瘀。主腰腿疼痛，腹痛胀满，经期不准，月经不调等症。

【处方】同天津

【制法】以上共为细末，炼蜜为小丸。

【剂量及用法】每服一钱，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

八、大同（调经女金丹）

【功能与主治】调经养血，面黄肌瘦，精神倦怠。

【处方】党参二兩 白朮二兩 茯苓二兩 炙甘草二兩 当归二兩 川芎二兩 白芍一兩半 白薇一兩 丹皮一兩 白芷一兩 藁本一兩 肉桂一兩 元胡一兩 没药一兩 赤石脂一兩 香附十二兩

【制法】共为细面，炼蜜为一钱大丸。

【剂量及用法】每服二钱。

九、禹县

【功能与主治】活血温经，子宫寒冷，血风麻痺，崩漏带下，月经不

通，肚腹疼痛。

【处方】同武汉

【制法】共为细面，炼蜜为丸，每丸重一钱。

【剂量及用法】每服二钱，黄酒送下或白开水送下。

【禁忌】孕妇忌用。小兒不用。

【备考】有效期一年。

十、济南

【功能与主治】妇人体虚，面色萎黄，腰痠腹痛，崩漏带下，月经不调，久不孕育。

【处方】同武汉。

【制法】上药除香附、赤石脂、没药另研外，其余之药用黄酒浸三日，晒干略炒为细末，炼蜜为丸，如桐子大。

【剂量及用法】每服三钱，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。並忌辛辣等物。

十一、青岛(1)

【处方】香附三斤 白朮 赤石脂 丹皮 当归 白芷 官桂 茯苓 熟地各二斤 川芎 没药 甘草 元胡 白芍 藁本 坤草 丹参各一斤

【制法】共扎面，蜜丸，如桐子大。

十二、青岛(2)

（赵氏金丹）

【处方】当归四兩 川芎二兩 白芍四兩 香附八兩 於朮四兩 丹皮四兩 没药二兩 石脂四兩（煨） 藁本四兩 元胡四兩 白薇四兩 熟地四兩 茯苓四兩 沉香一兩二 甘草一兩四 肉桂二兩五 硃砂一兩

【制法】共研面，蜜丸重三钱。金衣、硃衣。

十三、沈阳

（人参女金丹）

【功能与主治】调经养血，补虚止带。主治妇人月经不调，赤白带下，经期腹痛，腰痠腿疼。

【处方】当归一兩 白芍一兩 丹皮一兩 茯苓一兩 白芷一兩 藁本一兩 川芎一兩 延胡索一兩 赤石脂一兩 桂心一兩 白薇一兩 没药一兩 白朮一兩 移山参一兩

甘草一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重，赤金衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸。溫水服下。

【禁忌】孕婦忌服。

十四、撫順(1)

(人參女金丹)

【功能與主治】調經養血，溫暖子宮，鎮痛。主月經不調，子宮虛冷，月經痛，月經稀薄，月經困難，白帶頻頻，腰腹痛，久不孕等症。

【處方】紅人參一兩六錢 丹皮二兩 白芍一兩一錢 赤石脂二兩一錢 當歸二兩一錢 元胡一兩六錢 白芷一兩六錢 藁本 川芎各一兩五錢 白朮二兩五錢 桂楠 白薇各一兩 炙甘草一兩六錢 沒藥四兩 香附十兩 茯苓三兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重，蜡皮封。

【劑量及用法】每服一丸，早晚兩次，黃酒送下。

【禁忌】孕婦忌服。

十五、撫順(2)

(調經女金丹)

【功能與主治】暖寒調經。主經血不調或前或後，氣血不正，腰痠腹痛，四肢無力，脾虛胃弱，赤白帶下，血枯經閉，產後各症。

【處方】白人參兩半 當歸二兩 生地二兩 白芍二兩 白朮兩半 黃仁二兩 云苓一兩 炙甘草九錢 天冬七錢 砂仁一兩 坤草四兩 黃芩二兩 山萸二兩 橘紅二兩 熟地四兩 川芎兩半 桂楠一兩 元胡兩半 香附一兩 阿膠五錢 白芷一兩六錢 沒藥一兩 白薇一兩六錢 丹皮二兩 赤芍二兩 硃砂一兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，早晚空腹黃酒送下。

【禁忌】辛辣。

十六、吉林

(人參女金丹)

【功能與主治】調經種子，散寒通經，開瘀順氣，溫血養榮。主血寒經閉，白帶赤帶，月經不調，經前錯後，痛經，行經時腰腹作痛。

【處方】貢朮一兩 當歸一兩 川芎一兩 赤石脂一兩 白薇一兩 丹皮一兩 延胡一兩 人參一兩 藁本一兩 白芍一兩 肉桂一兩 沒藥一兩 茯苓一兩 生草一兩 香附斤半

【制法】上藥十五味，共研細末，煉蜜為丸，每丸二錢一分重，赤金為衣。外用棉紙包，蜡皮封固。

【劑量及用法】每日服二次，早晚空心服之，黃酒為引，過一小時後，食鹽物或干果壓之。服用四十丸為一劑。

十七、吉林

(高氏女金丹)

【功能與主治】主治婦女血寒氣滯之經閉及干血癆症。

【處方】當歸二兩 川芎一兩 赤芍八錢 木香八錢 元胡一兩半 丹皮二兩 青皮一兩半 廣皮一兩 紅花一兩 枳殼一兩 香附三兩 我朮二兩 三稜二兩 桃仁一兩半 炙草七錢

【制法】將以上藥料共為細末，煉蜜為丸，每丸二錢一分重，赤金為衣。外用棉紙包之，再用蜡皮封固。

【劑量及用法】每日服二次，早晚空心服之，黃酒為引，過一小時後，食鹽物或干果壓之。服用四十丸為一劑，以經調，受孕為度。

十八、哈爾濱

(人參女金丹)

【功能與主治】溫寒種子。主經血不調，血寒經閉，赤白帶下，及子宮虛寒久不受孕。

【處方】同吉林(香附用十五兩)

【制法】除赤石脂，沒藥，另研。余均酒浸三日，焙干為末；香附醋浸三日，焙干為末，調研一處，煉蜜為二錢一分重丸，大赤金衣。綿紙包，蜡皮封固。

【劑量及用法】晨起空腹服一丸，黃酒為引，服後食鹹物干果壓之，服至四十丸為一劑，以經調受孕為度。

【禁忌】忌食辛辣。

十九、呼和浩特

(附：加料女金丹)

【處方】人參 茯苓 白朮 炙草 九芎 杭芍 當歸 白薇 白

芷 丹皮 藁本 肉桂 元胡 沒藥 紅石脂各一斤(加料八兩) 香附十五斤(加料二兩四錢)

【制法】蜜小丸。

【備考】加料女金丹：前方分量每料再加：坤草二兩二錢 木香一兩六錢 琥珀四錢 砂仁四錢 沉香八錢 紅花一兩六錢 蜜大丸，重二錢，半金衣，蜡皮封固。

婦科金丹

天 津

【功能與主治】調經活血。主體虛血少，月經不調，經期不准，腰痠背痛，肚腹疼痛，飲食不化，嘔逆惡心，自汗盜汗。

【處方】元胡(醋制) 生黃芪 人參(去蘆) 生阿膠 白薇 生白芍 甘草 茯苓(去皮) 制沒藥 當歸 黃柏 生鹿角(洗淨)各四斤 制松香二斤 制乳香一斤 杜仲炭(鹽炒)二斤 故紙(鹽炒)一斤 益母膏十斤 鎮陽一斤 小茴香(鹽炒)八兩 菟絲子一斤 血余炭八兩 艾炭八兩 紅白雞冠花二斤 (以上用黃酒一百斤裝入罐或不生鏽的桶內，將罐口封固，隔水蒸，至酒盡為度) 生山藥 川芎 丹皮 熟地 白芷 白朮(鹽炒) 藁本 黃芩各四斤 紅花一斤 陳皮六斤 砂仁四斤 廣木香一斤 續斷 青蒿 肉桂(去粗皮) 蘇叶各一斤 益母草十五斤 煨赤石脂四斤 (以上軋成粗末)

【制法】共和一起，拌勻晒干，研為細粉，煉蜜為丸，二錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

婦科婦寶丹

沈 陽

【功能與主治】調經養血。主經血不調，經行愆期，帶下淋漓，腰痠腿痛，四肢倦怠，崩中漏血，氣促大眩，手足冰冷，氣血兩虧。

【處方】當歸二兩 川芎二兩 艾叶二兩 白芍二兩 香附三兩 阿膠二兩 熟地黃四兩

【制法】共碾極細面，阿膠化烱，

煉蜜為丸。二錢重。

【劑量及用法】每服一丸。白開水送下。

滋陰至寶丹

一、禹 縣

【功能與主治】婦人經水不調，骨蒸潮熱，心熱不寧，夜熱盜汗。

【處方】當歸四兩 白茯苓四兩 陳皮二兩 白芍四兩 制香附四兩 白朮四兩 川貝四兩 地骨皮四兩 知母四兩 薄荷四兩 麥冬四兩 柴胡一兩

【制法】共為細面，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，清晨白開水送下。

【備考】有效期間一年。

二、青 島

【處方】全歸八兩 川貝八兩（炒） 地骨皮十二兩 白芍十二兩（炒） 香附一斤（炙） 麥冬十二兩 白朮八兩（炒） 茯苓十二兩 陳皮十二兩 知母十二兩 薄荷四兩 醋柴胡四兩 甘草一兩

【制法】共研細末，水泛小丸。

勝 金 丹

一、杭州（婦寶勝金丹）

【功能與主治】治婦人虛弱，腰腿痠軟，月經不調，子宮虛寒，氣滯血瘀，癥瘕腹痛，崩漏帶下，經行愆期，色淡或紫。凡虛寒諸症，皆可服之，乃溫通氣血之劑也。

【處方】炒冬朮 川芎 赤石脂 炙甘草 黨參 酒白芍 白芷 白茯苓 當歸 川芎 蘇本 玄胡索 粉丹皮 明沒藥 肉桂 赤石脂 熟地各一兩 制香附一四兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢。溫酒或開水送下。

二、青 島

【處方】香附三斤（四炙） 當歸九兩 熟地十二兩 桂心九錢 沉香九錢 沒藥 炙草 人參 蘇本 丹皮 川芎 茯苓 元胡 白薇 白芷 白芍各三兩 赤石脂六兩（炒）

【制法】共為細面，蜜丸重二錢

五，硃衣。

三、沈陽(1)

【功能與主治】調經養血，鎮靜安神。主婦人經血不調，崩中漏血或多或少，經前腹痛及經行不斷，赤白帶下，血瘀血癥，腹痛腰痠，嘔吐惡心，人覺心悸，倦怠嗜眠，驚悸不安，一切血虛等症。

【處方】人參 白芍 赤芍 川芎 丹皮各一兩半 肉桂 牛膝各二兩半 當歸 白薇各四兩 蘇本一兩 共合一處，酒浸一日，并水淘淨，焙木加下藥：香附末十六兩 熟地黃四兩 打和一處再入下藥：赤白石脂二兩 乳香一兩 沒藥一兩 琥珀五錢 硃砂五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸。二錢重。入赤金為衣。

【劑量及用法】每服一丸，溫酒送下。虛勞婦人臨產服之尤宜。

四、沈陽(2)

【功能及主治】養血調經，開郁祛寒。主婦人經血不調，經行障礙，經血紫黑，崩中帶下，子宮寒冷不受孕，死胎不下，產後血虧，經前腹痛，經後腰疼，中氣不足，頭暈心煩，四肢倦怠，咳嗽發熱，胸悶脹滿，一切血虛、氣滯、經帶疾患。

【處方】香附十六兩 當歸一兩半 赤芍一兩半 白芷一兩半 川芎一兩半 人參一兩 延胡索一兩半 遠志兩半 白朮兩半 桂心二兩半 丹皮二兩半 茯苓一兩半 川牛膝一兩半 熟地黃四兩半 白薇四兩 甘草七錢五 蘇本一兩 益母香一兩 乳香 沒藥 赤石脂 白石脂各一兩 琥珀五錢 硃砂五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸。二錢重。

【劑量及用法】每服一丸。白開水送下。

【備考】赤金衣，蜡皮封固。

五、沈陽(3)（婦寶勝金丹）

【功能與主治】調經活血，止帶除濁。主婦人氣血虛弱，經血不調，赤白帶下，產後血瘀，腹痛腰痠。

【處方】人參二兩 全當歸二兩 白芍二兩 赤芍二兩 川芎二兩 白芷二兩 熟地黃九兩 茯苓五兩 桂心五兩 牛膝五兩 丹皮五兩

蘇本五兩 血琥珀一兩 硃砂一兩 白薇八兩 赤石脂二兩 白石脂二兩 乳香二兩 沒藥二兩 粉甘草一兩半 香附三十二兩

【制法】先將赤白石脂醋浸三日，炭火煨七次，再淬醋干為度，研細。次將各藥用好黃酒浸。春五，夏三，秋七，冬十二日。晒干為末，与石脂合勻，煉蜜為丸，重二錢。入砂、金箔為衣。

【劑量及用法】每服一丸，隨症調引。

【禁忌】孕婦忌服。

六、撫 順

【功能與主治】補血調經。主血崩漏血，赤白帶下，月經不調，經前差后，虛寒腹痛，久不孕育，顏面萎黃，腰膝疼痛等症。

【處方】香附十二兩 熟地四兩 赤石脂一兩 白朮四兩 赤芍兩半 琥珀五錢 白薇一兩 甘草五錢 海沉一兩 乳香一兩 硃砂 元胡各五錢 蘇本二兩 廣邊桂二兩 云苓二兩 白芍二兩 當歸兩半 川牛膝一兩 沒藥一兩 白石脂一兩 紅人參一兩 遠志兩半 川芎兩半 丹皮一兩 白芷二兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重，蜡皮封。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦、干血癆、及瘀血实证者，均忌服之。

七、吉林、哈爾濱（神效勝金丹、參茸勝金丹、琥珀勝金丹、女勝金丹）

【功能與主治】溫補，收瀉，益氣，養血。主氣血虛脫，經血崩漏，赤白帶下，虛寒遺精，虛寒不孕。

(一) 氣血虛脫，中氣微弱，自汗形消，面色蒼白，爪枯膚燥。

(二) 經血崩漏，經血暴崩或点滴不斷，腰酸腿軟，頭暈氣短。

(三) 赤白帶下，積濕浸帶，帶脈不宣，帶下赤白，腰痠腿痛。

(四) 虛寒不孕，子宮寒冷，血分虛弱，經血不調，久不受孕。

【處方】香附十六兩 川芎一兩半 丹皮二兩半 當歸一兩半 元胡一兩半 牛膝二兩半 遠志一兩半 熟地四兩半 赤芍一兩半 白

求一兩半 白薇四兩 白芍一兩半
炙草七錢半 白石脂一兩 藁本三
兩 茯苓二兩半 乳香一兩 沒藥
一兩 赤石脂一兩 白芷一兩半
貢材二兩半 山參一兩半 琥珀五
錢 硃砂五錢 鹿茸一兩

【制法】琥珀、硃砂均各另研，余藥均一處研細，調勻，蜜丸，大赤金衣，一錢一分重丸。除包裝外用磁罐保貯。

【劑量及用法】每服一丸，白水調服。

【禁忌】干血癆及瘀血实证均忌用

八、呼和浩特

【處方】熟地一斤半 當歸一斤二兩 川芎 白芍 紅花 香附各十二兩 白朮 茯苓 艾炭 白薇各九兩 丹參一斤二兩 人參 沒藥各六兩 肉桂 甘草各三兩

【制法】蜜大丸，重二錢。

慈航丹

一、撫順

【功能與主治】活血調經。主經水不調，經血各病，赤白帶下，癥瘕血癆。胎前產後血迷暈耗，生產遲延，胎衣不下，子癰子攣，肝氣沖心。

【處方】當歸四兩 川芎三兩 坤草六兩 香附二兩

【制法】共為細面，蜜丸，二錢重或二錢重，硃砂為衣。

【劑量及用法】每服二錢，一日二次，黃酒送下。

【禁忌】忌食生冷。

二、吉林、哈爾濱

(九轉慈航丹)

【功能與主治】逐瘀生新。經血各病，赤白帶下。(詳見備考)

【處方】益母草(一方作益母膏)二十四兩 全當歸十六兩 撫川芎十二兩

【制法】將以上藥品共為細面，煉蜜為丸，每重二錢一分，硃砂為衣，棉紙包蜡皮封。

【劑量及用法】每服一丸，(各症有各症服法見后)

【禁忌】忌食腥冷膩物。

【備考】此丹婦人無病常服免生雜症，久而無子，服之能種子安胎，

其效如神。

本方共有八十一服法，今臚列于后：

(一) 治婦人經血不調，用鹿鞭子甘漆 紅花各三錢 黃酒煎汁為引，送藥。

(二) 治婦人久而不孕，用黑附子三錢 肉桂 小茴香 巴戟 烏藥各三錢為引。

(三) 治婦人久不孕育。用肉桂 洋參 黑附子各三錢 黃酒煎汁送下。須與男子同服。

(四) 治胎前產後諸病或室女經閉，男如勞傷，用黃酒、童便送下。

(五) 治胎前產後，腹痛下血不止，遍身疼痛。用桑朮湯，服下立愈。

(六) 治妊娠，子母不合，用川續斷為引，與黃酒服之出汗。

(七) 治妊娠患傷寒症，用麥門冬三錢 黃酒煎汁為引，服后出汗。

(八) 治妊娠死胎或動而不安，用米酒對半合藥同炖，連服數次，死胎即下，活胎能安。

(九) 治婦人小產，腹痛惡露不下，用延胡 白芍各三錢 紅花一錢 黃酒煎汁送下。

(十) 治臨產臍腹疼痛，寒熱往來，等症米湯送下。

(十一) 治橫生倒產，子死腹中。用黑豆一大碗，熱水一碗，入童便將藥四兩研開，共煎一碗，勻二次服，不效再服。

(十二) 臨產或產後，先服二丸，童便黃酒送下。能安魂定魄，氣血壯順百病不生，乳湧經調。

(十三) 產後血暈，用古京墨一錠為末，勻二次研開，開白水同調服，此丸若治產後亡血，用童便黃酒送下。

(十四) 產後胞衣不下，或難產數日不下，用炒鹽湯送下。

(十五) 產後不語，用菖蒲、甘草各三錢 黃酒煎汁送下。

(十六) 產後惡血沖心，昏迷喘滿，悶絕腹痛，用黑豆一大碗，熱水一碗，童便一碗，共炖汁入生姜數片送下。

(十七) 產後大暈，口渴心煩，狂言譫語，如見鬼神，用薄荷湯黃酒童便送下。

(十八) 產後嘔呃，心經煩躁，寒熱往來，大汗自出，用童便黃酒送下。

(十九) 產後受風，筋骨拘急，用勾藤三錢 天麻三錢 升麻三錢 黃酒炖汁送下。

(二十) 產後受風，遍身腫脹，用防己 大腹皮各三錢 黃酒煎汁送下。

(二十一) 產後中風，牙關緊閉，半身不遂，失音不語，用童便黃酒送下。

(二十二) 產後四肢浮腫，用血竭 靈脂 紅花各一錢半 黃酒炖汁送下。

(二十三) 產後頭痛，用白芷 菊花各錢半 黃酒煎汁送下。

(二十四) 產後小腹疼痛，用香附一錢半 靈脂二錢 小茴香三錢 黃酒煎汁送下。

(二十五) 產後鼻衄，口干舌黑，童便黃酒下，如大小便不利，薄荷湯送下。

(二十六) 產後痢疾，用米湯送下。

(二十七) 產後咳嗽，胸膈不利，口吐酸水，面目浮腫，兩脇疼痛，用溫黃酒送下。

(二十八) 產後兩太陽跳動，心驚氣短，骨蒸癆熱不思飲食，手足麻木，遍身疼痛，用黃酒米湯送下。

(二十九) 產後食物生冷，用藿香一錢半 肉桂三錢 炒干姜一錢半 黃酒煎汁送下。

(三十) 產後行床，惡露內停，用黨參 蘇木 紅花各三錢 片苓一錢 黃酒煎汁送下。

(三十一) 產後癆瘵，用下棧 莪朮各一錢半 紅花三錢 代赭石三個 黃酒煎汁送下。

(三十二) 產如結乳，用(不留行) 天花粉 木通 紫蘆各三錢 甘草一錢 水煎汁送下(參考十二條)。

(三十三) 婦人乳癰，用穿山甲一錢半 天花粉 川貝母各三錢 升麻二錢 黃酒煎汁送下。

(三十四) 婦人赤帶，止血安胎，用艾葉三錢 黃酒炖汁送下。

(三十五) 白帶，用小茴香三錢 黃酒炖汁送下。

(三十六) 赤白帶下，用阿膠、艾葉湯送下。

(三十七) 欲破血，用紅花三錢 蘇木三錢 黃酒炖汁送下。

(三十八) 婦人漏血，用棗湯送下。

(三十九) 婦人血山崩漏,用童便黃酒送,或糯米湯送下。

(四十) 室女癆病,二三年內,用香附 赤芍 三稜 莪朮 紅花各一錢半 代鬚葱頭二个 麝香半分黃酒煎汁送下。

(四十一) 室女腹痛,經水不調,白开水送下。

(四十二) 婦人血虛,气喘下腫,或胎動腹痛,用艾葉湯送下。

(四十三) 婦人虛損腹痛,往來寒熱,人暈自汗,中氣不足,用羚羊角屑二分 生薑一片為引。

(四十四) 婦人氣血虛弱,用茯苓 石斛 黨參各三錢 黃酒煎汁送下。

(四十五) 婦人四肢無力,用牛膝 杜仲 故紙各三錢 當歸一錢半 云苓二錢 黃酒煎汁送下。

(四十六) 婦人氣吼,用礬石 天花粉各一錢半 黃酒煎汁送下。

(四十七) 婦人胃氣疼痛,用吳茱萸 三錢 良姜一錢半 木香一錢半 黃酒煎汁送下。

(四十八) 婦人胃氣疼痛,延胡三錢 姜黃二錢 黃酒煎汁送下。

(四十九) 婦人胸脇滿悶,用枳殼 厚朴 青皮各三錢 黃酒煎汁送下。

(五十) 婦人膨脹腹飽,不思飲食,用砂仁三錢 焦檳榔片 厚朴各二錢 黃酒煎汁送下。

(五十一) 婦人臍腹疼痛,用烏藥三錢 黃酒煎汁送下。

(五十二) 婦人小腹疼痛,用肉桂 艾葉 小茴香各三錢 黃酒煎汁送下。

(五十三) 婦人嘔吐,心腹疼痛,用檀香 白豆蔻 砂仁各一錢 黃酒煎汁送下。

(五十四) 婦人腿疼,用牛膝三錢 年健二錢 地楓一錢 黃酒煎汁送下。

(五十五) 婦人傷寒,初起二三日內,用柴胡一錢 麻黃一錢 蒼朮二錢 黃酒煎汁送下。

(五十六) 婦人下翻,用巴戟 小茴香 肉桂各三錢 附子一錢 菴蓉錢半 灯心二十寸 黃酒炖汁送下。

(五十七) 陰虫搔痒,用升麻 蛇床子各五錢 小茴香三錢 防風二錢 甘草五分 黃酒炖汁送下。

(五十八) 婦人大便下血,槐花 地榆 貫眾各二錢 黃酒煎汁送下。

(五十九) 男子短精神少氣力,用天冬 萸肉 枸杞各錢半 黃酒炖汁送下。

(六十) 男子腎虛腰痛,陽痿不起,用肉桂一錢 甘草 黑附子各一錢 肉蓯蓉二錢 黃酒煎汁送下。

(六十一) 男子心神不足,用茯神 遠志 炒棗仁各三錢 黃酒煎汁送下。

(六十二) 男子抽風,用羌活 防風 殭蚕各三錢 黃酒煎汁送下。

(六十三) 男子跌打損傷,瘀血不消,用骨碎補 紅花各一錢 水炖汁送下。

(六十四) 男子鼻口出血,命在須臾,用童便送下。

(六十五) 男子嘔吐,心腹疼痛,用丁香五分 砂仁 沉香 半夏各錢半 枳殼一錢 黃酒煎汁送下。

(六十六) 男子氣痰,心腹疼痛,用木香一錢 竹茹二錢 黃酒煎汁送下。

(六十七) 男子胸膈滿悶,用姜仁 延胡索 白朮各三錢 黃酒煎汁送下。

(六十八) 男子胃口不升,用冬瓜仁 蓮肉 三稜 莪朮各錢半 黃酒煎汁送下。

(六十九) 男子胃氣疼痛,用良姜三錢 黃酒煎汁送下。

(七十) 男子臍腹疼痛,用霜打胡蘆芭 川棟子各二錢 白开水送下。

(七十一) 男子腿痛,用牛膝三錢 虎骨 乳香各一錢半 黃酒煎汁送下。

(七十二) 男子小便不利,用滑石 野軍各三錢 水炖汁送下。

(七十三) 男子大便下血,用赤茯苓 竹茹各三錢 水炖汁送下。

(七十四) 治諸般失血,一切金瘡,出血過多,心經煩悶,昏迷不省,用童便黃酒送下。

(七十五) 臟毒便下血塊,吐血,用槐花湯送下。

(七十六) 男女閃腰,岔氣,胸脇疼痛,用青皮 延胡 姜仁各三錢 黃酒炖服。

(七十七) 男女筋骨串痛,用乳香 沒藥 牛膝 木瓜 虎骨各錢

半 黃酒煎汁送下。

(七十八) 睡驚囈語,用蛇蛻一條 蟬蛻一錢半 雄黃一錢 灯心三尺 白水炖汁送下。

(七十九) 水谷不化,大便泄瀉,用茯苓三錢 澤瀉二錢 訶子一錢 黃酒煎汁送下。

(八十) 婦人全身發熱,用竹茹 黃芩 地骨皮各三錢 黃酒煎汁送下。

震 靈 丹

南 京

【功能與主治】主崩漏帶下、腹痛、眩暈。

【處方】煅禹余糧石四兩(水飛) 煅紫石英四兩(水飛) 制乳香二兩 制沒藥二兩 煅代赭石四兩(水飛) 煅赤石脂四兩(水飛) 五靈脂二兩 飛磁砂一兩(酌留為衣)

【制法】上藥八味,先將禹余糧石、紫石英、代赭石、赤石脂四味,用瓦罐裝,封口,置烈炭火中,煅至透紅,醋淬,以手捻即碎為度。除去火氣后,和余藥共研細末,加米粉打糊為丸,每錢約做二十粒。

【劑量及用法】每服三錢,一日服一次至二次。空腹時開水吞服。

【禁忌】忌食豬羊牛血。

【備考】服用需遵醫囑。

溯 源 丹

沈 陽

【功能與主治】調氣和血,除濕清熱。主赤白帶下,經血淋漓,尿血便血,崩中漏下。

【處方】當歸 熟地黃 艾葉(酒炒)各二兩 香附二兩 川芎一兩二錢 白芍六錢 阿膠六錢 白朮六錢 茅根六錢 椿根皮一兩 黃柏一兩 地榆七錢 茯苓八錢 白石脂七錢

【制法】共研極細面,醋糊為小丸。

【劑量及用法】每服二錢,空心米湯送下。

【禁忌】孕婦忌服。

經 帶 金 丹

沈 陽

【功能與主治】調經止帶,和血

鑰痛。主赤白帶下，紅白淋濁，經水不調，臍腹作痛，腰痠無力，子宮寒冷，難於受孕等症。

【處方】乳香二兩 玄胡索二兩 丹皮二兩 白薇二兩 甘草二兩 白朮一兩 蘇本二兩 白芷二兩 香附十兩 沒藥一兩 肉桂一兩 赤石脂四分

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸。二錢重。

【劑量及用法】每服一丸。白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

調 經 丹 禹 縣

【功能與主治】經閉不通，干血癆症，紫血成塊，瘀血腹痛。

【處方】血竭一兩 人黃四兩 紫草茸四兩 三棱二兩 莪朮二兩 凌霄花一兩 蘇木一兩 紅花一兩

【制法】共為細面，水為丸。

【劑量及用法】每服二錢，體壯者日服二次。

【禁忌】孕婦忌用。

【備考】有效期二年。

血 還 丹 沈 陽

【功能與主治】調整血行障礙。主婦女經血不調，崩漏不止，淋漓漏下，腹痛腰痛，頭暈心跳，中氣不足，五心煩熱。

【處方】絲瓜絡炭一兩 漢三七三錢 真貝膠一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸。二錢重。

【劑量及用法】每服一丸。白開水送下。

【禁忌】辣腥刺激食物。

二 益 丹 蘭 州

【功能與主治】調經，止帶，暖宮等症。主經血不調，赤白帶下，行經腹痛，心口痛疼等症。

【處方】草果二斤 砂仁二斤 紫蔻一斤 廣木香二斤 丁香一斤 母丁香一斤 肉桂三斤 附片二斤 蛇床子二斤 炙草二斤 煅龍骨二斤 炒吳萸二斤 云苓皮二斤 北細辛二斤 花椒二斤 檀香二斤

枯礬二斤 當歸六斤 白芷十斤 山奈二斤 海螵二斤

【制法】共研細面，用蜜為丸，每丸一錢二分重，每付十丸，粘金一張，作丸時加酥油少許。

【劑量及用法】每日服二次，每次一丸，早晚用黃酒送下，開水亦可。

【禁忌】生冷油膩等食物。

益母還魂丹

一、沈 陽

【功能與主治】治胎前產後，諸種危症。主經血不調，赤白帶下，腰腿疼痛，子宮寒冷，習慣性小產，及產後惡露不尽，瘀血凝滯，腹痛貧血。

【處方】益母草一斤 當歸六兩 白芍二兩 川芎二兩 香附六兩 熟地八兩 白塊苓四兩

【制法】上七味共碾極細面，煉蜜為丸。二錢重。

【劑量及用法】每服一丸。黃酒送下。

【禁忌】生冷酸物。

二、撫 順

【功能與主治】補血調經。主婦人貧血，經漏不止，月經不調，白帶頻頻，腰痛腹痛，面色萎黃，子宮虛冷久不孕育。

【處方】益母草一斤 香附六兩 熟地六兩 當歸二兩 川芎各六兩 白芍二兩 云苓四兩

【制法】共為細面，蜜丸。二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，黃酒送下，早晚二次。

【禁忌】生冷，寒涼。

五 寶 丹

吉 林

【功能與主治】調經，止帶，鎮痛。主婦女子宮寒冷，赤白帶下，經血不調，少腹疼痛，瘀結成塊等症。

【處方】枯礬四兩 銅綠三錢四分 五味子三錢四分 雄黃一錢四分 蛇床子六錢七分 桃仁六錢七分

【制法】以上六味藥，共研為細末，煉蜜為丸，每丸重七分。用蜡紙包之。

【劑量及用法】此藥一丸，用細絹布包好，送入陰戶內，三天一換。

【禁忌】忌食生冷，並忌房事。孕婦忌用。

自 行 丹

吉 林

【功能與主治】祛寒止痛。主女人子宮寒冷，少腹疼痛，赤白帶下等症。

【處方】青鹽 銅綠 明雄各二錢 文蛤一錢四分 枯礬六錢七分 硃砂一錢四分 梅片二分五厘

【制法】將以上七味藥，研為細末，用棗肉為錠，如梔子大。每錠重一錢四分。雄黃為衣。

【劑量及用法】每用一錠，裝入絹制袋內，入子宮腔內，三天一換。

【禁忌】切忌房事。

玉 液 金 丹

一、北 京

【功能與主治】益氣，舒郁，調經。主婦女暴怒郁結，胸肋刺痛，經期不准，白帶過多。

【處方】杜仲二兩四錢 生地黃各一兩一錢 沙苑子二兩 斷艾八錢(炭) 建蓮子五兩八錢 當歸八錢 肉蓯蓉二兩一錢 遠志二兩四錢 山藥五兩六錢 砂仁二兩 山楂八錢 益母草六兩 甘草二兩八錢 白芍一兩四錢 羌活八錢 麥冬二兩二錢 貝母二兩 紫丹參二兩八錢 血余八錢(炭) 兔絲子二兩八錢 續斷八錢 枳殼二兩八錢 紫豆蔻仁一兩一錢 香附二兩二錢(炙) 川芎二兩二錢 半夏麴一兩 茯苓八錢 款冬花二兩 旋復花二兩 龜板二兩 黨參二兩 川棟子二兩 梔子二兩 黃連二兩 黃芩二兩 於朮二兩 藏紅花一兩 厚朴一兩 琥珀一兩 沉香六錢 人參一兩(云蘆) 紅棗十六兩(去核) 阿膠八兩 山茱萸二兩 鹿角膠二兩 復盆子一兩 桑螵蛸一兩 五倍子一兩 巴戟天一兩 雞血藤四兩 仙鶴草二兩 龜版膠二兩 海螵蛸二兩 旱蓮草二兩 紅月季花一白朮

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重二錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、上 海

【功能與主治】月經不調。

【处方】黄芩一两五钱 紫苏二两五钱 党参二两 羌活八钱四分 当归身二两 茯苓六两四钱 黄芪一两二钱 琥珀八钱四分 麦冬二两五钱 丹参四两二钱 益母草六钱四分 枳壳(炒)一两二钱 艾叶六钱四分 生地一两二钱 人腹皮八钱四分 杜仲(炒)二两六钱 川芎二两四钱 木香八钱四分 白朮(炒)八钱四分 血余(炒炭)八钱四分 砂仁二两九钱 莲子六两四钱 白芍药(炒)一两六钱 香附(制)一两六钱 续断六钱四分 甘草二两 怀山药四两二钱 麝皮胶一两六钱 厚朴一两五钱 沉香一两六钱 淡苣蓉一两二钱 菟丝子二两二钱 硃砂五两八钱 橘红一两六钱 川贝母二两二钱 山楂(炒焦)八钱四分 潼蒺藜二两二钱

【制法】除麝皮胶外，余药各取细粉，用麝皮胶烔化，和炼蜜为丸，每丸潮重一钱，蜡壳固封。

【剂量及用法】每服半粒，温开水或温黄酒化服。

【禁忌】孕妇忌服。

三、南京(妇科补益丸、人参玉液金丹)

【功能与主治】益气养血，具有调经作用。

【处方】人参二两 生地一两二钱 制香附二两六钱 山楂肉八钱四分 黄芪一两二钱 淡黄芩一两五钱 沉香一两六钱 橘红一两六钱 益母草六钱四分 甘草二两二钱 白芍一两六钱 羌活八钱四分 阿膠二两六钱 当归二两二钱 紫丹参四两二钱 人腹皮八两四钱 杜仲二两六钱 白茯苓六两四钱 怀山药四两二钱 白朮八钱四分 菟丝子二两二钱 川芎二两四钱 血余八钱四分 川续断六钱四分 枳壳一两二钱 莲子六两四钱 川厚朴一两五钱 麦冬二两五钱 砂仁二两九钱 广木香八钱四分 苏叶二两五钱 琥珀八钱四分 淡苣蓉一两二钱 蕲艾六钱四分 川贝母二两二钱 沙苑子二两二钱

【制法】上药二十六味，共研细末，以大腹皮煎汁和阿膠烔化，加炼蜜为丸，每粒潮重二钱，硃砂为衣。蜡壳封护。

【剂量及用法】每服一粒，开水

和服。

【禁忌】孕妇忌服。

四、杭州

【功能与主治】补益真元，调和气血。主治胎前产后经水不调崩漏带下，妇人百病以及室女停经潮热等症。功宏效著，诚妇科之要药也。

【处方】党参二两 姜杜仲二两六钱 炙黄芪一两二钱 血余八钱四分 丹参四两二钱 阿膠二两六钱 川芎二两四钱 淡苣蓉一两二钱 酒归身二两二钱 人生地一两二钱 酒白芍一两六钱 川厚朴一两五钱 川续断六钱四分 西琥珀八钱四分 山楂肉八钱四分 艾叶八钱四分 羌活八钱四分 黄芩一两五钱 川贝母二两二钱 冬朮八钱四分 白茯苓六两四钱 菟丝子二两二钱 人腹皮八钱四分 潼蒺藜二两二钱 贡沉香一两六钱 枳壳二两二钱 制香附二两六钱 紫苏二两五钱 春砂仁二两九钱 麦冬二两五钱 建莲肉六两四钱 怀山药二两二钱 广木香八钱四分 益母草六钱四分 广橘红二两六钱 粉甘草二两二钱 白蜜(炼过)四十两

【制法】上药二十七味，研为细末，用陈酒化阿膠和蜜杵匀为丸。每丸潮重一钱五分，辰砂为衣，蜡壳固封。

【剂量及用法】每服一至二丸。用开水化服。

五、兰州

【功能与主治】调经活血，益气养荣。主经血不调，腰腿疼痛，气血双亏等症。

【处方】党参二两 川朴一两五钱 黄芩一两二钱 炙草一两二钱 琥珀八钱七分 粉丹皮四两五钱 沉香一两六钱 川贝二两六钱 川芎二两六钱 香附二两六钱 山药四两二钱 於朮八钱四分 归身一两六钱 砂仁二两四钱 白芍一两六钱 广木香八钱四分 茯神六钱四分 川断六钱四分 橘红一两六钱 菟丝子二两 杜仲二两六钱 枳壳二两二钱 益母草六两四钱 血竭八钱四分 山楂八两四钱 人腹皮八钱四分 公杏一两二钱 荷叶二两五钱 阿膠二两六钱 艾叶六钱四分 潼蒺藜二两二钱 麦冬二两五钱

【制法】共研细面，蜜人丸二钱

重，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，日服二次，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

得生丹

一、北京、承德(妇科得生丹)

【功能与主治】调经化瘀。主经血不调，血瘀腹痛。

【处方】益母草二两 白芍二两 白芍 当归各八十两 羌活 木香 柴胡各三十两

【制法】共为细粉，炼蜜为丸，重三钱。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

二、天津、济南(1)

【功能与主治】调经养血，顺气化瘀。主月经不调，经期和产后腹痛，瘕痞痞块，血瘀气滞，四肢浮肿。

【处方】益母草十二两 当归四两 川芎一两 生白芍四两 广木香一两 柴胡二两

【制法】共为细粉，炼蜜为丸，三钱重，蜡皮或蜡纸筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

三、兰州

【功能与主治】调经养血，顺气活瘀。主妇女月经不调，经期腹痛，瘕痞痞块，血瘀气滞，四肢浮肿等症。

【处方】益母草十二两 当归四两 川芎一两 白芍二两 广木香一两 柴胡二两

【制法】以上共研细面，炼蜜丸三钱重。

【剂量及用法】每次服一丸，白开水送下。

四、济南(2)

【功能与主治】妇人经血不调，过期不来，行经腹痛，赤白带下。

【处方】益母草八两 白芍二两 羌活三两 当归三两 木香三两 柴胡三两

【制法】共研细粉，炼蜜为丸，重

二錢。

【劑量及用法】白開水送下，每服一至二丸。

【禁忌】辛辣油膩等物。

五、青 島

【處方】當歸半斤 白芍半斤 柴胡(炙)二兩 木香二兩 川芎二兩

【制法】共研面，蜜丸重二錢五。

六、呼和浩特

【處方】羌活一兩 獨活八錢 柴胡一兩 木香二兩 川芎一兩 益母草二斤 白芍二兩

【制法】蜜丸重二錢。

五癥至寶丹

吉 林

【功能與主治】化積去滯，調經養血。主肚腹疼痛、癥瘕痞塊、胸膈膨脹。

【處方】歸尾一錢七分 赤芍一錢七分 干漆一錢七分 元胡一錢七分 三稜 莪朮 靈脂各二錢四分 枳殼 干姜 木香各六錢七分 山楂 紅糖各二兩七錢四分 枳實 腹皮 吳萸 神曲 礞砂各二錢四分 牛膝 朴硝各六錢七分 二丑二兩七錢 川軍二兩七錢

【制法】將以上二十二味藥品共為細面，然後再用陳醋面糊為小丸即成。

【劑量及用法】每服二錢，每日早晚兩次服之。用姜水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

【備考】除包裝保存外，貯于磁罐內，勿使風干為要。

化癥回生丹

一、福 州

【功能與主治】治癥結不散不痛，癥發痛甚，血癰，婦女經閉，跌仆昏暈欲死者，腰痛之因于跌仆死血者，婦女將欲行經而寒熱者，婦女干血癆証之屬實者，癥母左脇痛而寒熱者，婦女經前作痛古謂之痛經者，婦女將欲行經誤食生冷腹痛者，婦女經來紫黑甚至成塊者，治產後瘀血少腹痛拒按者。

【處方】人參六兩 安南桂二兩

兩尖二兩 麝香二兩 片子姜黃二兩 公丁香三兩 川椒炭二兩 蘇木二兩 藏紅花二兩 蘇子霜二兩 五靈脂二兩 降真香二兩 干漆二兩 歸尾四兩 沒藥二兩 白芍四兩 杏仁二兩 香附二兩 吳萸二兩 元胡二兩 水蛭二兩 阿魏二兩 川芎二兩 小茴香炭二兩 乳香二兩 良姜二兩 艾炭二兩 益母膏八兩 熟地四兩 鱉甲膠二斤 大黃八兩

【制法】共為細末，以糯米醋一斤半，熬濃晒干為末，再加醋熬，如是三次，晒干為末，以鱉甲、益母、大黃三味和勻，再加煉蜜為丸，重一錢五分，蜡皮封護。

【劑量與用法】用時溫開水和，空心服一丸。癥甚之証黃酒下。

二、南 昌

【功能與主治】瘀血癥結，癥母，並治跌打損傷，瘀滯作痛。

【處方】同福州。

【制法】將前藥三十三味，共研細末，以方內鱉甲膠、益母膏和勻，再加煉蜜為丸，重一錢五分，蜡皮封護。

【劑量及用法】口服一次，每服一丸，空腹時溫開水化服。癥甚之症黃酒化服。

【備考】非經醫下處方，不得使用。

三、重慶(化癥回春丹)

【功能與主治】治男婦癥結，血癰，婦女干血癆，久癰左脇病，婦女經前痛而兼寒熱者，婦女經閉或經現紫黑血塊者，產後瘀血作痛，以及跌仆損傷，死血凝結者。

【處方】同福州。

【制法】除麝香另研，鱉膠酒蒸合丸；益母膏合丸外，余藥共研細末。合麝香、鱉甲膠、益母膏另加煉蜜和丸，每重一錢五分，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，飯前白開水送下。瘀血過多，黃酒送下。

【禁忌】孕婦不能服。

四、沈 陽

【功能與主治】化瘀破血，散癥消積。主癥結不散，時痛時止，血癰癆病，經痛經閉，經行寒熱，經行食血

冷，腹痛，經來紫黑成塊，產後瘀血，腹痛拒按，跌仆腰痛及跌仆昏絕，金瘡棒瘡之有瘀滯者，並治癥，左脇痛而寒熱者。

【處方】同福州。

【制法】共碾極細面，以鱉甲膠、益母、大黃和勻，再加煉蜜為丸。重一錢五分。

【劑量及用法】每服一丸。溫開水空心服之。癥甚之症黃酒送下。

【禁忌】孕婦及體弱者忌服。

【備考】蜡皮封固。

寧 坤 錠

一、沈 陽

【功能與主治】收斂虛脫，澀止帶下。主婦女子宮寒冷，赤白帶下如注，腰膝痠痛。

【處方】烏梅肉五錢 蛇床子二錢 枯礬四錢 蒼朮五錢 生杏仁二錢 樟腦一錢二分 明雄黃四錢 輕粉二錢 冰片一錢

【制法】共碾極細面，陳醋膏為錠，如覆核大。雄黃為衣。

【劑量及用法】每一枚，納陰中。

二、撫 順

【功能與主治】調經，活血，祛濕。主婦女經血不調，赤白帶下，子宮寒冷，久不孕育，寒濕凝結，腰腹疼痛，血滯經閉，神疲體重，四肢無力。

【處方】雄黃一錢四分 川椒二錢 烏梅五錢 床子二錢 枯礬四錢 生杏仁二錢 生蒼朮一錢二分 樟腦一錢二分 冰片一分

【制法】共為細面，醋糊為錠，一錢四分重，雄黃為衣。

【劑量及用法】每次用一錠，用白軟布一寸五分方塊作袋，置藥于內，用白線牽藥袋，帶時將藥袋納陰戶內，留線在外，三天一換，病除為止。

婦女止痛酒

重 慶

【功能與主治】肚痛，腰痛，月經不調。

【處方】小紅花一兩 茶香根二兩 刮金板五兩 香附子二兩 小蘇二兩 月月紅六兩 對月草六

兩 尚香根二兩 血當歸三兩 茜草根二兩 女兒茶三兩 益母草六兩 三月記根三兩

【制法】用干酒十斤，泡十日即成。

【劑量及用法】每日三次，每日服一至二兩。

參茸補血露

沈 陽

【功能與主治】補血益精。主婦女氣滯血虧，經閉經漏，赤白帶下，腰腿痠痛，干血癆症。男服能補精種子，女服能調經受孕，為補血添精之劑。

【處方】當歸五錢 川芎四錢 丹參一兩 鹿茸一錢 枸杞二錢 五味子一錢 益母草一錢 焦朮五錢 蓮肉五錢 茯神四錢 遠志五錢 節菖蒲五錢 甘草四錢 首烏四錢 生地五錢

【制法】上藥以絹袋盛貯，用燒酒五斤，白糖五斤同置罐中，封口，放鍋中滾水煮至三小時，止火待涼，置陰地二日出火毒。五日後即可去藥用酒。

【劑量及用法】每日三次，每次一盞溫服。

【禁忌】虛而有熱者忌服。

藥 砂 糖

南 京

【功能與主治】調經和血。

【處方】西當歸八兩 炒白芍八兩 焦山楂八兩 川芎六兩 紫丹參六兩 懷紅花四兩

【制法】上藥六味，共研細末，用赤砂糖二十五斤，拌勻為度。

【劑量及用法】每次用量五錢，一日二次，開水和服。

妊 娠 类

養血安胎丸

一、濟 南(1)

【功能與主治】孕婦脾胃虛弱，血不充足，腰痠腹脹，時常見血，四肢無力，腿足浮腫，習慣小產等症。

【處方】當歸身 大熟地各四兩 生杭芍 山芎 白朮 制香附各三

兩 黃芪 阿膠 炒杜仲 川續斷各二兩 砂仁 廣皮 炙甘草各一兩

【制法】共為細末，煉蜜為丸，重三錢。

【劑量及用法】每服一丸，空腹時，白水送下，日服一次。

二、濟 南(2)

【功能與主治】腰腹疼痛，胎動不安。

【處方】當歸 川芎 續斷 廣皮 桑葉 茯苓 蘇梗 杜仲 寸冬 春砂仁各一兩 白朮二兩 益母草 香附各二兩 甘草五錢

【制法】共為細末，蜜小丸，如桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

【禁忌】氣惱，辛辣生冷食物。

三、青 島

【處方】當歸五斤 白朮 桑葉各二十斤 砂仁 香附各五斤

【制法】共軋面，重二錢五分，蜡皮。

養血固胎丸

沈 陽

【功能與主治】養血安胎。主氣虛血虧，腰部痛疼，經患流產，胎動不安，孕期腹痛。

【處方】生黃芪 當歸各二兩 川芎八錢 黃芩二兩 砂仁一兩 五錢 菟絲餅二兩 炙甘草八錢 川貝母一兩五錢 炙魚鱉一兩 益母草四兩 白芍 熟地 白朮各二兩 川續斷一兩 艾炭一兩五錢 西洋參九錢 杜仲一兩五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

健母固胎丸

撫 順

【處方】當歸一兩 杭芍 寸冬 元參各五錢 五味 甘草各二錢 仲炭 寄生 川斷 薏仁 山藥 膠珠 枳殼 廣皮 元參 遠志 京母 川貝 均育 柴胡 艾炭

焦朮各二錢

【制法】蜜大丸，二錢重，每日早晚各服一丸。

【備考】此方經過婦人連次流產二、四個的都可能保住，在三四月後確定受孕即服一料，保持四月里不流產，最好六月中再吃一料，以防七月里流產（凡流產者多在四七月里），如能服用兩料，不但產母健康，並能保持小兒不抽風不患口瘡，以及胎熱咳嗽等病。這方經驗多年，救人很多。

先天補胎丸

天 津

【功能與主治】補氣，養血，安胎。主妊娠腹痛，脾胃虛弱，四肢浮腫，腰腿痠痛，胸肋脹滿，養血安胎。

【處方】人參（去蘆） 生黃芪各三錢 當歸二兩 白芍七錢 川芎四錢 熟地一兩 砂仁四錢 焦白朮一兩 黃芩七錢 杜仲炭（鹽炒）七錢 續斷七錢 生山藥八錢 艾炭三錢 丹皮七錢 菟絲子五錢 甘草三錢 廣皮五錢 香附（醋制）一兩 棗肉一兩 絲綿炭一錢 共二十味計十二兩四錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，二錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

安 胎 丸

北京、承德

【功能與主治】益氣安胎。主妊娠氣弱，腰痠腹痛，胎動失常。

【處方】人參五錢（去蘆） 白朮一兩 甘草三錢 橘皮二錢五分 川芎三錢 當歸一兩 白芍八錢 紫蘇葉一錢五分 黃芩一兩 香附八錢（制） 杜仲一兩 續斷六錢 砂仁一錢五分

【制法】共為細粉，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服三錢，日服二次，溫開水或姜湯送下。

附參考古方

【來源】增補萬病回春。

【處方】當歸 白芍 川芎 桑葉各一兩 白朮（去蘆）五錢

【制法】以上為末，酒糊丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服五十丸，茶湯任下，空心服，日進三服。

【備考】此方養血清熱之藥也，瘦人血少有熱，胎動不安，素慣半產者，皆宜服之，以清其源，而後無患也。

保胎丸

一、天津

【功能與主治】助氣養血，安胎和胃。主孕婦氣血兩虧，屢經小產，胎動不安，腰痠腹痛，四肢痠懶，心跳氣短，咳嗽頭昏，嘔吐惡心，不思飲食。

【處方】當歸 生白芍 川貝各五兩 枳殼(麩炒) 白朮(麩炒) 生地 川芎各四兩 荆芥穗 生黃芪 甘草各二兩 艾炭 砂仁各二兩五錢 菟絲子四兩 羌活一兩五錢 黃芩二兩 厚朴(姜制)二兩五錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，二錢重，每斤丸藥用硃砂面三錢上，衣，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

二、濟南

【功能與主治】腰痠腹痛，胎動不安。

【處方】茯苓 熟地 黃芪 艾炭 白朮 白芍 當歸 菟絲子各四兩 桑寄生 川芎 枳殼各二兩 川貝母 厚朴 荆芥穗 人參各一兩 羌活 甘草各五錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重二錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

三、沈陽

【功能與主治】補氣養血安胎。主習慣性流產，虛弱貧血，生殖機能減退，腰膝無力，小腹疼痛，寒凝氣滯，心煩頭暈，四肢倦怠，面黃肌瘦，食慾不振。

【處方】白朮四兩 黃芩 當歸 人參 杜仲各二兩 川斷 陳皮 熟地各一兩五錢 香附一兩

【制法】共碾極細面，糯米糊為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，服過

七個月，不必再服。

保產安胎丸

重慶

【功能與主治】安胎催生，治一切產症。

【處方】炙黃芪八錢 厚朴七錢 炙甘草五錢 荆芥穗八錢 川芎 當歸各一兩五錢 枳殼六錢 川貝母 菟絲子各一兩 羌活五錢 白芍二兩 蘗艾七錢

【制法】共研細末，每斤淨粉加生薑汁二兩，煉蜜合丸，每重三錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸。

【禁忌】產後不可服。

保產無憂丸

一、廣州(保產無憂散)

【功能與主治】孕婦預防早產常用藥。

【處方】當歸一錢五分 川貝母 黃芪各一錢 蘗艾七分 菟絲子一錢 羌活五分 厚朴七分 枳殼六分 荆芥穗八分 甘草五分 川芎一錢五分 白芍二錢 老生薑二片

【制法】將上列各藥洗淨切碎，隔水蒸透，研為細末，拌蜜糖為小丸。

【劑量及用法】開水送服。

二、太原

【功能與主治】胎動不安，氣虛血虧，養血安胎。

【處方】當歸 川芎 菟絲子各一錢半 川貝二錢 枳殼一錢 生芪 芥穗各八分 杭芍一錢二 羌活五分 紫朴七分 艾葉七分 粉草五分 黃膠一錢 生地五分

【制法】二錢重，蜜大丸，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服二丸，白開水送下。

三、沈陽

【功能與主治】調氣和血。主橫生難產，屢患流產，臨月腰痛，步履艱難，產後血暈，兒枕腹痛及乳汁不通等症。

【處方】當歸 益母草 川芎各

一兩五錢 荆芥穗 黃芪各八錢 甘草五錢 川貝母一兩 艾葉七錢 菟絲子一兩四錢 枳殼六錢 羌活五錢 白芍一兩二錢

【制法】共研極細面，蜜丸，二錢重，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

四、呼和浩特(保胎無憂丸)

【處方】當歸 川芎各二兩 白芍一兩五錢 生地 白朮 生芪 菟絲 枳殼 沒藥 茯苓 紅花 艾炭 香附各二兩 竹茹 紫河車各五錢 甘草 桑葉各六錢 砂仁五錢 沉香 紫朴 川貝母

【制法】共為細面，蜜大丸，重二錢，半金衣，蜡皮固。

保孕安胎丸

沈陽

【功能與主治】滋補強壯，養血安胎。主妊娠期內腰腿痠痛，胎漏下血，食慾不振，習慣流產，倦怠衰弱等症。

【處方】生白朮八兩 人參四兩 寄生 茯苓各二兩 杜仲炭四兩 大棗三兩

【制法】共碾極細面，蜜丸二錢重，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，空心生薑湯送下。

千金保孕丸

一、武漢(保孕丸)

【功能與主治】妊娠腰背痠痛，慣于小產。

【處方】杜仲(炒去絲)八兩 續斷 懷山藥(另研)各六兩

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于四十粒。

【劑量及用法】每服二錢，空腹米湯送下。

二、杭州

【功能與主治】扶元固胎。治婦人妊娠腰背痠痛，時有漏血，頭眩肢軟，飲食少思，每慣小產者。

【處方】川杜仲八兩 川斷(酒炒)四兩 懷山藥六兩

【制法】共研細末，用糯米湯泛丸。

【剂量及用法】每服二至四錢，米湯或開水送下。

【禁忌】戒惱怒，忌食燒酒、發物。

所以載丸

武 漢

【功能与主治】妊娠体虛，或習慣小产。

【处方】白朮一斤 杜仲八兩 桑寄生六兩 党參八兩 茯苓六兩

【制法】取上藥进行干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于三十粒。

【剂量及用法】每服三錢，早晚各一次，開水或米湯送下。

泰山盤石丸

重 庆

【功能与主治】治女性气血兩亏，或肥而不实，或瘦而血热，肝脾素亏，倦怠少食，屢次墮胎。

【处方】党參 炙黃芪 当归 續斷 黃芩各一兩 熟地黃 川芎 白朮各八錢 白朮二兩(土炒) 炙甘草五錢 糯米二兩 砂仁五錢

【制法】共研細末，煉蜜為丸，每重三錢，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸。

孕婦金花丸

一、天 津

【功能与主治】清胎熱去火。主婦女在懷孕期間，頭痛眩暈，口舌生瘡，咽喉紅腫，暴發火眼，遍身發熱，牙齒疼痛。

【处方】炒梔子 銀花 川芎 黃柏 黃芩 当归 生白朮 生地各一斤 黃連八兩

【制法】共為細粉，涼開水泛小丸，一錢重裝袋。

【剂量及用法】每次服一袋，白開水送下。

二、蘭 州

【功能与主治】退熱解毒，養血安胎。主婦人在懷孕期間，頭痛眩暈，口舌生瘡，咽喉紅腫，暴發火眼，遍身發熱，牙齒疼痛。

【处方】梔子 銀花各一斤 川

芎四兩 黃柏 黃芩 当归 白朮 生地各一斤 黃連八兩

【制法】共研細面，水打為丸。

【剂量及用法】每服二錢，白開水送下。

三、大 同

【功能与主治】孕婦口干舌燥，頭目暈眩，胎熱不穩，或氣血弱，胎兒不安。

【处方】当归 銀花 白朮 生地 黃芩各四兩 黃柏 川芎 阿膠 竹茹 麥冬各二兩 枳殼 厚朴 甘草 梔子各一兩 砂仁 艾炭 党參各五錢

【制法】以上十七味共研細面，水為小丸。

【剂量及用法】每次服三錢，或遵生嚮。

四、濟 南

【功能与主治】孕婦頭眩煩渴，口舌生瘡。

【处方】炒梔子 金銀花 川芎 黃柏 黃芩 当归 白朮 生地各一斤 黃連半斤

【制法】共為細粉，水泛丸，綠豆大。

【剂量及用法】每服二錢，日服三次，白開水送下。

五、呼 和 浩 特

【处方】生地一斤十四兩 生梔子十五兩 黃連七兩 川芎 條芩各一斤十四兩 当归二斤十兩 白朮二斤十二兩 川柏一斤十四兩

【制法】共為細面，水泛小丸。

催生兔腦丸

一、北京(兔腦丸)

【功能与主治】刺激神經，收縮子宮，主臨產艱難。

【处方】兔腦髓一個去皮膜 母丁香二錢五分 乳香二錢五分 麝香一錢

【制法】共為細粉，用兔腦和丸，干重一分，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，臨產時服用，用溫黃酒送下，逾二小時未生，再服一丸。

二、天 津

【功能与主治】通氣活血。主婦女臨產胎兒不下。

【处方】乳香面七錢五分 麝香三錢 母丁香面六錢

【制法】以上研細和勻，用活野兔腦三個為丸，干重二分。(如無活野兔腦，用臘月的新鮮兔腦亦可)蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】體虛氣弱者勿服。

三、杭州(速產兔腦丸、催生丹)

【功能与主治】婦人臨產不順，痛久不下，或痛二、三日至五、六日不下，或橫或逆，交骨不開，精神已竭，難產危險各症。

【处方】母丁香二錢 淨乳香二錢五分 當門子一錢

【制法】三味研極細末，于臘月初八日，取活山兔腦髓一個，去皮膜杵為丸。每粒重一分，每顆內裝二粒，辰砂為衣，蜡壳封固。

【剂量及用法】凡橫生逆產者，先用手術調順，隨服此丸一顆，用開水嚥下。虛者用參湯吞服，不可嚼碎。

四、西安(催生丸)

【功能与主治】催生。

【处方】兔腦髓一個(十二月間之新鮮兔腦髓，去皮膜) 乳香二錢五分 母丁香二錢 當門子一錢

【制法】先將上藥各別研細，混合攪勻，用兔腦研如泥，和藥為丸如鷄子大，珠砂為衣，煖處陰干，蜡皮為丸，收藏。

【剂量及用法】每服一丸，熱湯送下。

【禁忌】初見陣痛而產門未開者，不可服用過早。

五、蘭 州

【功能与主治】催生。主婦女臨產胎兒不下。

【处方】母丁香 乳香各一兩 麝香三錢 兔腦二個

【制法】共為細面，兔腦二個，黃酒打糊為丸，二分重，蜡皮封固。

【剂量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

六、濟 南

【功能与主治】主難產。

【处方】同北京。

【制法】各為細粉，用兔腦髓合丸，每丸重一分，硃砂為衣，蜡皮封固。每一兩丸藥用硃砂三分为衣。

【劑量及用法】每服一丸，臨產時服，用溫黃酒送下，逾二小時未生，再服一丸。

七、青 島

【處方】兔腦十個 乳香 丁香 各二兩 麝香五分

【制法】共軋細末，兔腦為丸，重五分，硃衣蜡皮。

八、沈 陽

【功能與主治】開交骨，和氣血。主婦人生產困難，或橫生逆產，或六、七日胎兒不下，或胎死腹中，命在垂危。

【處方】同北京。

【制法】共碾極細面，兌兔腦中，杵為小丸。

【劑量及用法】難產時用一丸或二丸，冬月用溫黃酒，夏月用開白水送下。

九、撫 順

【處方】台麝四錢 乳香二兩 母丁香四兩

【制法】共為細面，用活兔腦三個搗和為丸，五分重，硃衣，蜡皮封。

十、哈爾濱(兔腦丸、催生丹)

【功能與主治】開交骨，催生。婦人交骨不開，或橫生逆產，久不分娩，勢瀕危殆，此丸為催生第一神方，主難產。

【處方】兔腦髓一個（用十二月者去皮膜研如泥）乳香一錢七分五厘（另研細末） 母丁香一錢四分 台麝香七分（用當門子者另研）

【制法】貼月初八日，將前列各藥配合一處，搗勻為丸，如黃豆大，陰干之，大赤金衣，或硃砂為衣。油紙包裹，蜡皮封。

【劑量及用法】每服一丸或二丸，熱湯送下。

【禁忌】孕婦非臨產勿服。

十一、承 德

【功能與主治】刺激神經，收縮子宮。主臨產艱難。

【處方】母丁香 乳香(醋炒)各一錢五分 麝香五分 兔腦髓一個

【制法】夏曆臘月將灰色野兔放在院中，打其極跑，使其熱血聚在頭髓，劈開取腦。再將母丁香，乳香共軋細麵，加入麝香研勻，以兔腦和丸。用硃砂為衣，重二分，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，臨產時服用，用溫黃酒送下，逾二小時未生，再服一丸。

十二、呼 和 浩 特

【處方】母丁香一兩 乳香 沒藥 雄黃 硃砂各四錢 麝香五分

【制法】共為細面，用活兔腦三個合丸重五分，蜡皮封。

保胎無憂散

一、西安(保產無憂散)

【功能與主治】調節妊娠期間之新陳代謝，預防妊娠血壓高，腎臟炎及胎兒肥大之難產。

【處方】當歸一兩半 菟絲子一兩四錢 川芎一兩三錢 白芍一兩二錢 川貝一兩 艾葉九錢 黃芪八錢 芥穗八錢 厚朴七錢 枳殼六錢 羌活 甘草各五錢

【制法】磨為粗末。

【劑量及用法】懷孕至七個月時，當月服一劑，八個月時服一、二劑，九、十兩月各服三劑，每劑粗末二兩，姜三片、水一碗，煎至大半碗，去渣空心溫服。體極弱者，宜就診察，酌加強壯藥。

【禁忌】產後及無孕者不可服。

二、哈爾濱(便產神方)

【功能與主治】安胎，養血。專治一切產症，懷孕不拘月數，偶傷胎氣，腰痠腹痛，甚至見紅，勢欲小產者。又或臨產，交骨不開，兒死腹中，橫生逆產，至六、七日不產臨危者，孕如常服，既可安胎，又可免難產之虞。

【處方】斷艾炭七錢(醋炙) 當歸一兩五錢(酒洗) 厚朴七錢(姜汁炒) 川芎一兩五錢 白芍一兩二錢(酒炒) 川貝 菟絲子各一兩(酒泡) 荆芥炭 生黃芪各八錢 羌活 甘草各五錢 枳殼六錢(數炒)

【制法】共碾為細面，絹羅篩過，玻璃瓶存貯。

【劑量及用法】每服一錢，或一錢五分，鮮姜湯送下。

【禁忌】忌食魚類。

佛手開骨散

一、北京(開骨散)

【功能與主治】促進交骨擴張。主臨產交骨不開。

【處方】當歸三兩 川芎二兩 血余一兩(燬) 龜版五兩(炙)

【制法】共為細粉。

【劑量及用法】每服二錢，黃酒送下，溫升水亦可。

二、青島(1)

【處方】龜板 當歸 川芎 紅花各六兩 血余四兩

【制法】共軋細面。

【劑量及用法】沖服。

三、青島(2)

【處方】當歸八錢 川芎五錢 龜版七錢 血余三錢 牙皂 冬葵子各一錢

【制法】共軋細面。

【劑量及用法】沖服。

四、呼 和 浩 特

【處方】當歸六兩 川芎四兩 血余 龜版 牛膝各二兩

【制法】共為細面。

通 產 散

沈 陽

【功能與主治】催生順胎。主難產交骨不開，產時困難者。

【處方】敗龜版四兩 女人髮(洗去油，燬存性，擇生過男者)一握 當歸四兩 川芎二兩 乳香四錢 益母草四兩

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二錢，圓肉湯送下。

保 胎 膏

一、青 島

【處方】當歸十兩 生地八兩 白朮 川斷各六兩 桑寄生十兩 白

乌五兩 木香一兩 莖蓉 黃芪各五兩 益母草十兩 甘草三兩 龙骨十兩 香油十五兩

【制法】共合一处，熬膏。

二、呼和浩特(千金保胎膏)

【处方】当归 川芎 白朮各一兩五錢 杭芍二錢 熟地 坤草 杜仲各一兩五錢 黃芪二錢 阿膠 香附 祁艾各三錢 肉桂一錢 酒 芍 陈皮各一兩二錢 壳砂一錢

【制法】用鵝油一斤，香油榨枯去渣，熬至滴水成珠，加黃丹成膏。

清热凉血膏

天 津

【功能与主治】消炎止渴，清热凉血。主妇女血热，大目眩昏，口舌生疮，牙痛，耳痛，眼目赤腫，煩躁口渴，胎热作嘔。

【处方】生地 黃芩各二斤

【制法】以上药熬汁去渣过滤，將汁煉至滴毛太紙上，背面不滲为标准，收清膏，每清膏一斤兌蜜二斤，收膏，裝瓶。

【剂量及用法】每次服一兩，白开水冲服。

熟地膏

济 南

【功能与主治】体虛血亏，及妇女胎产等症。

【处方】熟地五斤

【制法】將熟地熬汁去渣收膏，以不淨紙为度，每斤膏汁兌蜂蜜二斤收膏。

【剂量及用法】每服五錢，白开水調服。

保 孕 丹

撫 順

【功能与主治】补血安胎。主流产，妊娠漏血，腹痛腰痠，跌閃伤胎，妊妇腰痛白帶等症。

【处方】当归 香附炭 白人参 熟地 茯苓 广砂 川断各一兩 白朮四兩 杜仲炭 艾炭 貢膠 陈皮 益母草各八錢

【制法】共为細面，蜜丸二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，早晚

二次，滾水送下。

千金保孕丹

沈 陽

【功能与主治】养血助气，安胎固元。主胎不安穩，習慣流产，气血兩亏，並台腰痠腿疼等症。

【处方】当归 熟地各一兩 人參一兩半 白朮四兩 条芩 陈皮 香附各一兩 續斷 杜仲各一兩半

【制法】共碾極細面，糯米飯为小丸。

【剂量及用法】每服四十丸，开白水送下。

附参考古方

【来源】增补万世保元。

【功能与主治】妇人常懷小产，久而不育者，可服。

【处方】当归(酒洗) 熟地黄(酒蒸)各一兩 人參一兩半 白朮(去蘆炒)四兩 条芩 陈皮 香附子(童便浸)各一兩 續斷(酒浸) 杜仲(盐酒炒)各一兩半

【制法】上为細末，糯米飯为丸，如梧子大。

【剂量及用法】每服七十丸，白湯下。

胎产金丹

一、天 津

【功能与主治】助气养血安胎。

主屢經小产，胎动不安，脾胃虛弱，胎前漏血，腰腿痠痛，四肢浮腫，产后血昏，气血双亏，作冷作燒，不思飲食，白汗盜汗，骨蒸潮熱。

【处方】当归 白薇 藁本 茯苓(去皮) 艾炭 元胡(醋制)各二兩 熟地四兩 肉桂(去粗皮)一兩二錢 甘草一兩 制沒藥一兩二錢 川芎 丹皮 青蒿 白朮(麸炒) 益母草各一兩 制龜甲四兩 五味子(酒炙)一兩 香附(醋制)四兩 沉香六錢 鮮河車一具 人參(去蘆) 煅赤石脂各二兩

【制法】先將河車用整黃柏四兩，黃酒二斤，同煮好了，去掉黃柏，將河車与前药共串一处晒干。共为細粉，煉蜜为丸，二錢重，每斤丸药用硃砂面一錢为衣，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，白开水送下。

二、上 海

【功能与主治】月經不調，临經腹痛，子宮寒冷，腰痠無力。

【处方】紫河車一具 延胡索三兩 赤石脂(煅)四兩 党参 白朮(炒) 白薇 藁本 甘草(炙) 川芎 茯苓各一兩 熟地四兩 沉香六錢 硃砂一兩 当归八兩 乳香(制)三兩 牡丹皮二兩 香附(制)一兩 白芷二兩 肉桂一兩 白芍药(炒)四兩

【制法】共研細粉，煉蜜为丸，每粒潮重二錢，蜡壳固封。

【剂量及用法】每服一丸，溫开水化服。

三、杭 州

【功能与主治】治妇人胎前产后諸病，以及月經不調，临期腹痛，腰痠帶多，面黃肢倦，子宮虛寒，难子受孕等症。效著功宏。

【处方】全当归二兩 粉丹皮 蕲艾(醋炒) 玄胡索 川芎 白薇 党参 赤石脂(煅) 白茯苓 川藁本 青蒿 益母草 冬朮各二兩 大熟地 炙鱉甲各四兩 淨沒藥 炙甘草各一兩二錢 五味子一兩 制香附四兩 肉桂一兩 紫河車一具 真沉香六錢

【制法】各研細末，用赤砂糖一斤烱化，加煉蜜为丸。每粒潮重三錢，辰砂为衣，蜡壳封固。

【剂量及用法】每服一丸。开水嚼送或化服。

四、西 安

【功能与主治】治神經性之子宮机能衰弱，子宮貧血，子宮弛緩，子宮炎及由上項原因引起之头晕头痛，腹痛帶下，月經不調，子宮下垂等症。

【处方】香附子十兩 乳香(去油) 元胡各三兩 赤石脂 白芍各四兩 白朮一兩 当归八兩 白朮(炒) 丹皮 白薇 炙草 藁本各二兩 沒藥(去油)一兩 肉桂一兩

【制法】研細末煉蜜为丸，每丸重二錢，硃砂为衣，蜡皮包藏。

【剂量及用法】每次一丸，熱湯

食前送下，每日一次。

【禁忌】孕婦忌服。

五、蘭 州

【功能与主治】調經養血，助氣安胎。主胎前產後，胎動胎漏下血，胸腹脹滿，腿痠腿痛，四肢浮腫，產後血崩，胞衣難下，作冷作燒，不思飲食等症。

【處方】當歸五兩 川芎 於朮 赤石脂各二兩 白薇二兩五 炙草一兩五 云苓二兩五 元胡二兩 乳香二兩 沒藥一兩五 杭芍二兩 白芷二兩 桂心一兩五 黨參二兩 八錢 丹皮二兩 藁本二兩 香附五兩

【制法】共為細末，蜜丸，三錢重，硃砂衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

六、大同(保胎金丹)

【功能与主治】胎前產後諸症，胎漏，流產，滑胎，產後虛弱，倦怠無力，骨蒸潮熱。

【處方】生地 龜甲 香附各四兩 當歸 茯苓 元胡 白薇 藁本 益母 川芎 炒艾 煨赤石脂 丹皮 白朮 青蒿各二兩 肉桂五錢 沒藥一兩五錢 五味 炙草各一兩 沉香六錢 人參二兩 黃柏四兩

【制法】白酒二斤入鍋內封口煮一小時，同前藥共軋細面，煉蜜為丸三錢，硃砂為衣，蜡皮。

【劑量及用法】每次服一粒，日服二次。(多服可除流產)

七、濟 南

【功能与主治】紅白淋帶，月經不調，腰腹作痛，習慣性流產，胎前產後諸症。

【處方】當歸 茯苓 人參 白朮 白薇 炒杜仲 斷艾 藁本 赤石脂 川芎各二兩 川斷三兩 生地四兩 阿膠 香附各四兩 桑葉一兩五錢 沉香六錢 甘草一兩 五味子一兩 炒杭芍二兩 沒藥一兩二錢 菟絲子四兩

【制法】鮮河車一具，用竹籤排去筋膜洗淨，用無灰酒煮爛。黃柏二兩放在鍋底，將前藥共搗如泥，晒干共為細粉，煉蜜為丸，重二錢，硃

砂為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一至二丸，白開水送下。

【禁忌】辛辣油膩等物。

八、青 島

【處方】當歸 茯苓 元胡 桂枝 白薇 石脂 祁艾 藁本 沒藥 川芎 青蒿 白朮 丹皮各二兩 甘草 五味子各一兩 坤草 生地 龜甲 香附各四兩 沉香六錢 人參一兩

【制法】共軋面，蜜丸重二錢五，硃衣、蜡皮封。

九、撫 順

【處方】人參 全歸各一兩半 白薇二兩 元胡一兩半 赤石脂一兩 生地五錢 河車一具 白朮二兩半 艾葉二兩 川芎一兩半 沉香六錢 肉桂二兩半 益母草二兩 香附十五兩 龜甲一兩二錢 五味一兩 白朮一兩半 丹皮二兩半 沒藥一兩 粉草七錢 赤芍一兩半 白芍 遠志 白芷 川牛膝各一兩半 熟地四兩半 乳香 白石脂各一兩 血珀 片砂各五錢

【制法】共為細面，蜜丸三錢重，蜡皮封。

十、哈爾濱

(產金丹、神功產金丹)

【功能与主治】溫經，暖宮，催生，下胎，逐瘀生新。主經寒衍期，腰痠腹痛，子宮寒冷，久不孕育；交骨不開，胎兒不下，一切難產，胎死腹中，煩悶欲死，舌黑爪青；產後惡露不盡，瘀血不下，新血不生，兒枕骨痛；產後血暈，人事不省，頭暈目眩，心神不穩。

【處方】熟地四兩 當歸 白薇 玄胡各二兩 黃桂一兩 藁本二兩 炙草一兩二錢 赤石脂一兩 川芎二兩 益母六錢 沒藥一兩 坤草二兩 龜甲四兩 五味一兩 青蒿 艾炭各四兩 丹皮二兩 香附一兩 黃柏四兩 酒釀二個 紫河車一具

【制法】將紫河車、黃柏、酒釀，用錫罐盛之，重湯煮二日，取出搗爛，曬干。再合余藥面一處調勻，煉蜜為丸，重一錢四分，硃砂為衣，紙棉包，蜡皮封。

【劑量及用法】每服一丸，黃酒

煎服。

【禁忌】孕婦忌服。血虛、傷血者忌服。

十一、承 德

【功能与主治】安胎，助氣，散寒，助精壯氣，胎動不安，子宮寒冷，肚腹疼痛，易于分娩。產後胎衣不下，產後血虧。

【處方】當歸 益母草 元胡 茯苓 丹皮 白薇 艾葉炭 赤石脂 人參(去蘆) 藁本 川芎 白朮 青蒿各十斤 龜甲 生地 香附各二十斤 五味子 甘草各五斤 黃柏一斤八兩 肉桂 沒藥各六斤 沉香一斤 紫河車八十具

【制法】以生地、白朮、青蒿、益母草、沉香、川芎、藁本、赤石脂八味共軋粗末，舖晒槽，余者下罐加黃酒二百斤蒸七日夜，再入羣藥攪勻，晒干，共軋細面，煉蜜為丸，重三錢，硃砂為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，早晚各服一次，黃酒送下，白水亦可。

【禁忌】忌食生冷，忌生氣。

十二、呼 和 浩 特

【處方】當歸 茯苓 白朮 白薇 元胡 艾炭 藁本 石脂 丹皮 川芎 坤草各二兩 生地 龜甲 香附各四兩 甘草 五味 沒藥各一兩 肉桂一兩五錢 紫河車五錢 人參二兩 沉香六錢

【制法】煉老蜜為大丸，重二錢，硃砂衣，蜡皮封固。

附參考古方

【來源】胎產心法(家傳胎產金丹)。

【功能与主治】治婦人經水不調，諸虛自損，種子安胎，及胎前、產後諸証效驗如神。

【處方】當歸(酒洗) 丹皮(水洗，晒干勿見火) 斷艾(醋炙) 延胡索(酒拌炒干) 川芎 益母草(取上頭半截，童便浸晒) 青蒿(人多內熱者更宜，不用亦可) 人參 白茯苓 赤石脂(火煨，水飛亦可) 白薇(洗淨，人乳拌) 川藁本(洗淨) 白朮(土炒)各二兩 生地(酒洗煮，不犯鐵器) 龜甲(醋炒)各四兩 香附四兩(醋、酒、鹽、童便各浸制一兩) 桂心 沒藥(去油)

粉草(酒炒)各一兩二錢 北五味一兩(去梗,焙) 沉香六錢

【制法】以上共為細末,再用新鮮人參男胎紫河車一具,長流水浸半日洗淨,黑鉛打成大鉛罐一箇,將河車放在鉛罐內,再將黃柏四兩,放在河車下,加白酒醪二斤,在水二碗,灌滿鉛罐,仍以鉛化封口,再以鐵鍋盛水,將鉛罐懸在鍋內,煮兩日夜為度,取出搗爛,和入藥內,拌勻晒干;再研為末,煉蜜丸,彈子大,每丸重二錢五分,水飛珠砂為衣,再以黃蜡為皮,如蜡丸式收貯,治訂开后。

【劑量及用法】

一、婦人臨產,米湯化服一丸,助精神氣力,分娩順利。

一、產下,童便好酒服一丸,神清體健,再無崩漏之患。

一、產后,每日服一丸,服過五日,氣血完固,自無他病。

一、行經后,山芎當歸湯服一丸,服之三日,必然有孕。

一、苦于小產者,胎動欲產,白滾湯服一丸,睡半日,其胎自安,每月常服一丸,保全足月,分娩無憂。

一、產后血崩,好酒童便服一丸即止。

一、產后血暈者,當歸、山芎湯服一丸,即醒。

一、產后驚風,防風湯服一丸即解。

一、兒枕痛者,山查黑砂糖湯服一丸,即止。

一、胞衣不下,干姜炒黑,煎湯服一丸,即下。

一、產后虛怯者,川芎當歸湯,每日服一丸,十丸痊癒。

一、凡產后諸証,俱加好酒童便服,皆保命護身,回生起死,其功不能盡述,家有婦者,宜早備之。

產 后 類

產后丸(人參回生丹)

南 京

【功能與主治】主婦人產后惡露未淨,小腹脹痛,兼治癰瘕。

【處方】人參二錢 蒲黃一兩 甘草五錢 白朮二錢 赤茯苓一兩 川羌活五錢 青皮三錢 桃仁一兩 陳皮五錢 木瓜三錢 熟地一兩 白芍五錢 當歸一兩 懷牛膝五錢

良姜四錢 川芎一兩 京三稜五錢 烏藥二兩五錢 元胡索一兩 山萸肉五錢 广木香一錢 焦蒼朮一兩 五靈脂九錢 制乳香一錢 制香附一兩 地榆五錢 制沒藥一錢

【制法】共研細末,用大黃膏擦丸,每粒朝重二錢,蜡壳封護。

【劑量及用法】每服一粒,開水化服。

【備考】附大黃膏制法:

西綿文大黃一斤(用米醋三斤熬成稠汁) 蘇木(水煎汁) 紅花(黃酒煮汁炒)各二兩 黑豆四斤(三斤)(水浸取皮約五兩豆煮汁) 將蘇木、紅花酒、黑豆汁,加入大黃汁內,共熬成膏。(如黑豆不易購,可用魯豆衣四斤代替)。

救 產 丸

沈 陽

【功能與主治】活血化癰,止痛鎮瘕。主產后血暈,失血過多,精神恍惚,惡露不淨,腰腿疼痛,小腹塊痛,后發發熱,瘕病抽搐。

【處方】香附四兩七錢 蒼朮四兩 益母草八兩 澤蘭叶四兩 川芎 桃仁各二兩 牛膝 當歸 延胡索 粉甘草各二兩 大黃一斤 紅花 蘇木各八兩 黑豆一斤

【制法】前十味碾面,后四味熬膏,合作為丸,二錢重,金衣,蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸,黃酒或白開水送下。

【禁忌】生冷刺激物。

琥珀茯苓丸

沈 陽

【功能與主治】除血液循環之障礙,消癰止痛。主婦人產后子宮瘀血,腹脹疼痛,惡露不盡或寒閉尿症。

【處方】琥珀五錢 茯苓二兩 豬苓 木瓜各五錢 牛夕二錢 丹皮三錢 澤瀉八錢 香附一兩 車前 勾杜各五錢 附子一兩 莪朮四錢 三稜三錢 山楂八錢 蟾蜍十個 神曲 羌活 獨活 麦芽 广木香各五錢

【制法】共碾極細面,煉蜜為丸,二分五厘重。

產 后 類

【劑量及用法】每服一丸,白開水送下。

產后救生丸

沈 陽

【功能與主治】化滯生新,行瘀止痛。主產后惡露不盡,敗血上冲,神昏譫語,不省人事,暴脫下血,臍腹疼痛。

【處方】百草霜四兩 川芎五錢 丹參一兩 炮姜二兩 明天麻一兩 飛羅面 伏神各二兩 柴胡五錢 熟地一兩 當歸二兩 阿膠珠 麥冬 广木香 鳳眼草各一兩 京墨五錢 遠志二兩 紅花餅五錢

【制法】共碾極細面,煉蜜為丸,二錢重,蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸,空心,姜湯送下。

【禁忌】孕婦忌服。

婦科散瘀丸

沈 陽

【功能與主治】通經化癰,行血止痛。主產后惡露不盡,瘀血凝滯,癰瘕脹滿,起前錯后,經閉不通,干血勞症。

【處方】炙黃芪八兩 附子 桃仁各四兩 川芎二兩 五靈脂四兩 小茴 炮姜各二兩四錢 郁金 兩四錢 沒藥 當歸各四兩 沉香二兩四錢 白芍二兩 藏紅花四兩 吳萸 姜黃各二兩四錢 炙甘草二兩六錢

【制法】共碾極細面,煉蜜為丸,二錢重。

【劑量及用法】每服一丸,黃酒送下。

【禁忌】孕婦忌服,血虛無瘀者禁用。

烏 金 丸

一、北 京

【功能與主治】散郁化癰。主婦女郁結,胸肋刺痛,產后血瘀,面黃肌瘦。

【處方】香附(制) 大黃各四兩 木香 乳香 沒藥 官桂各五錢 五靈脂 桃仁 玄胡索 烏藥 莪朮各一兩 當歸二兩 益母草 蜚蜍

各二兩(煨)(或蜜絲)

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重二錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天 津

【功能與主治】調經化瘀。主婦女郁結、胸脇刺痛、產後血瘀、小腹疼痛、作冷作燒、面黃肌瘦。

【處方】香附(醋制)六兩 生白芍二兩 益母草一斤 艾炭 故紙(鹽炒) 熟地 莪朮(醋制)各一兩 川芎 元胡(醋制)各二兩 當歸 生蒲黃 小茴香(鹽炒) 廣木香 三稜(醋制)各一兩 百草霜七錢 吳茱萸(甘草水制)一兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、廣 州

【功能與主治】婦女產後腹痛腰痛。

【處方】香附 大黃各四兩 木香 乳香 沒藥各五錢 五靈脂一兩 益母草二兩 桃仁 元胡索 蓬莪朮各一兩 當歸二兩 蜜二兩

【制法】將上列各藥洗淨，切碎隔水蒸透，研成細末，用黑豆、紅花、蘇木各二兩煎水，和蜜糖為小丸。

【劑量及用法】每服三錢，開水送服。

四、福 州

【功能與主治】治月水不調，崩漏淋帶，孕育不成，血凝氣滯，癥瘕疼痛，經枯血閉，一切胎前產後等症。

【處方】大黃 香附各四兩 當歸二兩 元胡 蓬朮 烏藥 桃仁 天虫(煨存性) 靈脂各一兩 官桂 乳香 沒藥 木香各五錢 益母草一兩(以上共研為細末) 蘇木四兩 紅花二兩 黑豆一升

【制法】后三味煎膏，和蜜為丸，每粒重一錢五分。

【劑量及用法】每服一丸，隨病輕重加減，開水送下。

五、杭州(婦科烏金丸)

【功能與主治】治婦人情志悒郁，氣滯食減，口苦咽干，面黃肌瘦，胸脇刺痛，產後惡露上攻，敗血不止等症，皆可服之。

【處方】制香附四兩 單桃仁一兩 肉桂 廣木香 淨沒藥各五錢 蓬莪朮 玄胡索各一兩 淨乳香五錢 全歸二兩 台烏藥 五靈脂各一兩

【制法】共研細末，用黑大豆一升煎汁去渣。再加紅花二兩，陳酒五碗，煎至二碗，去渣用汁。再用蘇木二兩，水煎去渣用汁。將三汁熬膏，和蜜為丸，每重二錢五分，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸。重症加倍，溫酒或開水送下化服。

六、大同(產後烏金丸)

【功能與主治】行血化瘀，營養新血。主產後惡露不尽，瘀血作疼。難產，胎衣不下。經閉，血積癥瘕，經期不行。

【處方】醋香附二斤四兩 川芎 白芍 元胡各一斤二兩 益母草十二斤 蒲黃 祁艾 當歸 故紙各六兩 小茴二兩 熟地 木香各六兩 吳茱萸二兩 三稜 莪朮各六兩 百草霜 香墨 阿膠各四兩二錢

【制法】共軋細面，煉蜜為丸，每丸二錢重，蜡皮。

【劑量及用法】每服一粒，日服二次，或遵醫指服。

七、禹 縣

【功能與主治】主七情悒郁，崩漏帶下，胸脇刺痛，經血不調。產後惡露上攻，敗血不止。

【處方】香附六斤 白芍 川芎 玄胡索各三斤 益母草二斤 蒲黃 祁艾 破故紙 小茴香 大黃 廣木香 吳茱萸 三稜 莪朮各一斤 百草霜十一兩 京墨三兩

【制法】共為細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服三錢，黃酒送下。

【禁忌】孕婦及小兒忌用。

【備考】有效期二年。

八、濟南(婦科烏金丸)

【功能與主治】產後惡露不淨，

腹痛煩躁。

【處方】制香附(醋浸)四兩 木香五錢 五靈脂(炒)一兩 全當歸二兩 桃仁一兩 炙乳香 沒藥各五錢 元胡 烏藥各一兩 益母草 蜜(煨存性)各二兩 蓬莪朮一兩 大黃四兩 官桂五錢

【制法】上藥共軋細末，用黑豆洗淨一斤半去渣，加紅花二兩，黃酒一斤煎四五沸，去渣用汁。蘇木三兩，水煎去渣用汁。將三汁煎濃和藥面，蜜為丸，重二錢。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下，或溫酒送下。

【禁忌】忌食辛辣油膩及生冷食物，孕婦忌服。

九、沈 陽

【功能與主治】和血化瘀。主產後瘀血未盡腹痛，惡露過多，七情悒郁，胸脇引痛，食減煩悶等症。

【處方】香附四兩 木香 乳香 沒藥 官桂各五錢 五靈脂 延胡索 台烏 莪朮各一兩 當歸三兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，溫酒或白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

十、撫 順 (產後烏金丸)

【處方】全歸八兩 阿膠三兩 赤木二兩 祁艾四兩 元胡 川芎 麥芽 三稜 莪朮各二兩 桃仁一兩 丹皮 生地各四兩 谷芽二兩 紅花 白朮各一兩 白芍 白苓各四兩 赤石脂 白芷 益沉 肉桂 人參各二兩 香附一兩 沒藥五錢

【制法】共為細面，蜜丸，三錢大，蜡皮封。

十一、吉林、哈爾濱 (神效烏金丸)

【功能與主治】平肝順氣。舒通經血。逐瘀生新。消化結聚。肝瘀氣滯。瘀血閉經。惡露不下。積聚。癥瘕等症。

【處方】天麻一兩二錢 沒藥 歸尾 赤芍各一兩半 木香一兩 草霜三兩 京墨 益母膏各二兩 川芎一兩半

【制法】除將上列方劑中益母膏

后入外，余者均研为细面，炼蜜为丸。每丸二钱一分重。外用大赤金为衣。丸用棉纸包裹，外用蜡皮封固，貯于瓷罐中。

【剂量及用法】每服一丸，黄酒或白开水送下。

【禁忌】忌食腥辣；孕妇忌服。

十二、承德

【功能与主治】主气滞不思饮食，胸心烦热，面黄肌瘦，胸胁刺痛。产后腹痛，恶露不净。

【处方】香附二斤四两(醋炙) 破故纸 吴茱萸 甘草水炙 三棱 木香 莪朮 熟地 当归身酒洗 蒲黄炒 艾叶炭各六两 川芎 白芍 元胡(醋炙)各一斤二两 大茴香 小茴香各二两 益母草十二斤 古墨 百草霜 没药炙 阿膠(蛤粉炒)各四两二钱

【制法】共轧细末，水泛小丸，或炼蜜为丸，重二钱五分，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，黄酒送下，白水亦可。

十三、呼和浩特 (产后烏金丸)

【处方】熟地 香附 坤草 砂仁 当归各一两 川芎一两八钱 杭芍 桃仁 元胡 条芩 京墨 血余 百草霜 肉桂 艾炭各五钱 生地七钱五分 木香二钱五分

【制法】炼老蜜，大丸重二钱，半金衣，蜡皮封固。

催乳丸 天津

【功能与主治】助气、活血、下乳。主产后气血亏损，乳少，乳汁不通。

【处方】当归 生地各八两 川芎四两 生白芍八两 通草二两 生麦芽一斤 制山甲四两 漏芦 生黄芪 鹿角霜各八两 广木香 炒王不留各四两

【制法】共为细粉，炼蜜为丸，三钱重，蜡皮或蜡纸筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，白开水送下。

失笑散

一、上海

【功能与主治】产后恶露不清，经行小腹脹痛。

【处方】五灵脂(炒)六两 生蒲黄四两

【制法】共研细粉。

【剂量及用法】每服二钱至三钱，包煎服汤。

【禁忌】孕妇忌服。

二、南京

【功能与主治】主心腹絞痛，产后血暈等症。

【处方】五灵脂二钱(酒研澄去砂石炒) 蒲黄二钱(生炒各半)

【制法】共研细末。

【剂量及用法】每服二钱至三钱，煎服，或用砂糖吞服。

三、福州

(經驗失笑散)

【功能与主治】治妇人心痛气刺不可忍，及产后兒枕蓄血，惡血上攻疼痛，並治小腸气痛。

【处方】五灵脂(淨者) 蒲黄等分俱炒

【制法】上为末。

【剂量及用法】每服二、三钱，用酒煎热服。

四、杭州

【功能与主治】治月經不調，瘀結腹痛。产后恶露不行，胸腹急痛，敗血上冲，不省人事，及一切血气瘀痛等症。

【处方】蒲黄(半生，半炒) 五灵脂(酒淘淨砂土)各四两

【制法】共研细末为度。

【剂量及用法】每服二至三钱。醋調或膏，用酒水一盞煎至七成，食前热服或酒煎，加赤砂糖少許和滓服。若元氣虛者，加党参二至三钱煎湯調服。若不瘥，再服，甚者三服。

五、沈陽

【功能与主治】行血止痛，主产后瘀血腹痛欲絕，小腹硬塊堅硬攻痛。

【处方】五灵脂 生蒲黄 砂仁

各等分

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】每服二钱，白开水送下。

黑神散

沈陽

【功能与主治】散寒逐瘀，活血止痛。主产后恶露不尽，胞衣不下，攻冲痞满，脐腹脹痛及血暈，神昏眼黑，口噤，腹中瘀血諸疾。

【处方】黑豆半斤 白芍药 炙甘草 桂心 当归 熟地黄 蒲黄 炮姜各四两

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】每服二钱，黄酒半盞調服。

【禁忌】孕妇忌服。

附参考古方

【来源】1. 重刻太平惠民和剂局方。

【功能与主治】治妇人产后恶露不尽，胞衣不下，攻冲心胸痞满，或脐腹坚脹，撮疼及血暈、神昏，眼黑口噤，产后瘀血諸疾。

【处方】黑豆(炒，半升) 甘草(炙) 地黄(熟，干者) 干姜(炮) 肉桂(去粗皮) 芍药 当归(去蘆，酒制) 蒲黄(炒)各四两

【制法】上为细末。

【剂量及用法】每服二钱，酒半盞，童子小便半盞，同煎調下，急患不拘时候，連服二服。

2. 女科証治准繩。

【功能与主治】疗产后血塊痛，經脉行后腹痛，並經脉不調。

【处方】熟地黄一斤 陈生姜半斤

【制法】上二味同和炒干，为末。

【剂量及用法】每服二钱，用烏梅調下，常服酒調；經脉不通，烏梅、荆芥酒調下。

【备考】一方用山查濃煎汁，入沙糖少許，再煎热服。

妇科花蕊石散

福州

【功能与主治】治产后敗血不尽，血迷血暈，胎衣不下，不省人事。

【处方】花蕊石一斤 土色硫黃

四兩

【制法】為末和勻，用瓦罐一個，入二藥以紙泥封口曬干，用炭燬二柱香，次日取出研細。

【劑量及用法】每服一錢，童便和熱酒調下，甚者用二、三錢。

清經散（清魂散）

沈 陽

【功能與主治】補虛理血。主產後血暈，不省人事，四肢厥冷，手足痙攣，血虛神昏等症。

【處方】澤蘭葉 人參各三錢 荆芥穗一兩 川芎半兩 炙甘草三錢

【制法】共研極細面。

【劑量及用法】每服一錢，熱湯或溫酒一小盞，調勻灌下。

附參考古方

【來源】方易簡新編。

【功能與主治】治產後血攻，並治血氣虛弱又感風邪，忽然昏暈不知人事者。

【處方】當歸二三錢 川芎五七分 人參（另燉沖）一錢 荆芥（炒黑）八分 清炙甘草五分

【制法】共研極細末。

【劑量及用法】加紹酒一杯，溫服煎湯。灌服亦可。

豬 肝 散

蘭 州

【功能與主治】緩肚止瀉。主婦人產後久瀉不止。

【處方】潞參 白朮 上元桂 肉蔻 砂仁 良姜 丁香 炮姜 丁香各二錢

【制法】共研細面，用牙豬肝一個，竹刀切破將藥裝內。

【劑量及用法】每日早晚酌量用之。

下乳湧泉散

一、北 京

【功能與主治】促進乳腺分泌。主婦人乳汁不通。

【處方】當歸 穿山甲 王不留行各六十四兩 川芎三十八兩

【制法】共為細粉。

【劑量及用法】每服二錢，日服三次，溫黃酒送下，服後食豬蹄湯更效。

二、濟 南

【功能與主治】產後少乳。

【處方】當歸 川芎 白芍 生地 枳殼 白芷各二兩 花粉 柴胡 甘草各一兩 王不留行六兩 通草 漏蘆各五兩 制山甲二兩 生麥芽五兩

【制法】共為粗末，裝入細紗布袋，每袋一兩。

【劑量及用法】水煎服，日服二次，每服一兩。

【禁忌】忌食辛辣等物。

三、沈 陽

（通乳湧泉散）

【功能與主治】通經下乳。主乳汁不足，血氣諸虛，經絡失營，以致缺乳。

【處方】王不留行二兩 穿山甲五兩 人花粉 炙甘草各三兩 全當歸五兩 漏蘆二兩

【制法】碾細面。

【劑量及用法】每服二錢，豬蹄煎湯送服，或熱黃酒沖服。

【禁忌】孕婦忌服。

四、撫順（湧泉散）

【功能與主治】補血通乳。主婦人乳汁不足，產後乏乳貧血，乳汁不足，病後衰弱無乳等症。

【處方】當歸 川芎 絲瓜 萊菔 通草 生芪各一兩 白芷 甘草 浙貝 公英 青皮 漏蘆 赤芍各三錢 山甲 花粉 不留各二兩 桔梗五錢

【制法】共為細面。

【劑量及用法】每服二錢重，豬蹄煎湯送服之，早晚兩次。

五、承 德

【功能與主治】產後乳少。

【處方】當歸 白芍 茯苓 穿山甲 花粉 麥冬 漏蘆 王不留通草各二兩 沙參一兩 熟地四兩 甘草八錢

【制法】共為細粉。

【劑量及用法】每服二、三錢，豬蹄湯調服。

【禁忌】忌食辛辣等物。

六、呼和浩特

（附：下乳湧泉膏）

【處方】當歸 川芎 白芍 生地 通草 山甲 白頭翁 香附 陈皮 不留各二兩

【制法】共為細面。

【備考】湧泉膏照前方每料加生芪 生榮子各二兩 共為細面，熬膏。

附參考古方

【來源】

1. 衛生寶鑑（湧泉散）。

【功能與主治】治婦人因氣，乳汁絕少。

【處方】瞿麥穗 麥門冬（去心） 王不留行 紫龍骨 穿山甲（炮黃）各等分

【制法】上五味為末。

【劑量及用法】每服一錢，熱酒調下，食後豬蹄羹少許，投藥，用木梳左右乳上梳三十來梳，一日三次，食前服三次羹湯投一次，梳乳。

2. 刀病回春（1）（湧泉散）。

【功能與主治】治乳汁不通。

【處方】穿山甲（炒） 白殭蚕（炒） 肉豆蔻（面包煨熟）各四錢 皂角五錢 胡桃仁（去皮）四兩 芝麻（炒）半斤

【制法】以上為細末。

【劑量及用法】每服不拘多少，溫酒調下，任意食之。

【備考】不問虛盛，先用木梳頻刮乳房，後服藥效。

3. 刀病回春（2）（湧泉散）。

【功能與主治】治乳汁不通。

【處方】王不留行 天花粉 甘草各三錢 當歸 穿山甲（醋炙）各五錢

【制法】以上為細末。

【劑量及用法】每服三錢，豬蹄湯，或熱酒調下，其乳即通。

生 化 膏

大 同

【功能與主治】產後血虛，逐瘀生新。

【處方】當歸二兩 川芎一兩 桃仁泥五錢 益母草二兩 香附一兩半 紅花 澤蘭 炙草各一兩 姜炭五錢

【制法】清水熬汁加蜂蜜、紅糖收膏。

回 生 丹

一、北 京

【功能与主治】活血止痛。主妇人产后败血不净，腰痠腹痛。

【处方】黑豆四百兩 紅花五十兩 苏木二十四兩 老醋一千二百兩 以上四味熬湯去渣，將下列藥料共軋粗末拌勻晒干。

熟地 黃四百兩 當歸 川芎 熟地 茯苓 蒼朮 香附 烏藥 玄胡索 懷牛膝 蒲黃(炒)各二十五兩 白芍 甘草 橘皮 木香 三稜 五靈脂 羌活 山茱萸 地榆 人參(去蘆)各十二兩五錢 白朮 青皮 木瓜各七兩五錢 良姜 沒藥 乳香各二兩五錢 桃仁二十五兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重二錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天 津

(婦科回生丹)

【功能与主治】通經活血，化瘀止痛。主經閉不通，肚腹疼痛，及产后惡露不淨，腹脹又痛。

【处方】大黃一斤 紅花 苏木各三兩 黑豆 黃酒各一斤 醋三斤(先將大黃軋成小碎塊，紅花、黑豆、苏木三味用清水熬汁，熬透去渣濾淨，用汁煮大黃，待汁浸入，次將醋倒入，用微火徐徐煮之，須用鏟不停地攪動，至稠膏形，再將黃酒倒入。微煮后起入盆內) 當歸 川芎 熟地 茯苓(去皮) 炒蒼朮 香附(醋制) 烏藥 元胡(醋制) 桃仁(去皮) 炒蒲黃 川牛膝各二兩 生白芍 廣皮 廣木香 三稜(醋制) 五靈脂(醋炒) 地榆炭 羌活 山萸肉(酒制)各五錢 人參(去蘆) 青皮(醋炒)各三錢 白朮(炒) 木瓜各一錢 良姜四錢 制沒藥 制乳香各一錢 甘草五錢(以上軋成粗末，和煮制之大黃共和一起拌勻，晒干)

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，三錢五分重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白

開水送下。

【禁忌】孕婦及产后下血過多者忌服。

三、上 海

(人參回生至寶丹)

【功能与主治】治月經不來，行經腹痛，以及产后瘀血不淨。

【处方】大黃一斤 苏木三兩 大黑豆七十二兩 懷牛膝(酒洗)五錢 紅花三兩 米醋九斤 川芎(酒洗) 香附(醋制)各一兩 黨參二兩 當歸(酒洗)一兩 馬鞭草五錢 熟地(酒浸蒸晒)一兩 良姜四錢 木瓜一錢 延胡索(酒洗) 蒲黃(炒焦) 蒼朮(炒) 茯苓 桃仁(去皮尖)各一兩 全地榆(酒洗) 橘紅各五錢 青皮(炒)一錢 乳香沒藥(制)各一錢 益母草三兩 木香五錢 白朮(炒)一錢 烏藥二兩五錢 秋葵子一錢 羌活 三稜(醋浸) 甘草(炙) 五靈脂(醋煮焙干) 山茱萸肉(酒浸蒸搗) 白芍藥(炒)各五錢

【制法】先將大黃研成細粉，將苏木打碎，用水五飯碗煎汁三飯碗，將大黑豆水浸取壳，用絹袋盛壳同豆煮熟，去豆子不用，將壳晒干，其汁留用。將紅花炒黃，入好酒四飯碗，煎三、五沸，去渣取汁。再將人黃成細粉入淨鍋下米醋三斤，文火熬之，以長木棒不住手攪之成膏，再入醋三斤熬之，又加醋三斤，次第加畢，然后下黑豆汁，再熬，次下苏木汁，次下紅花，熬成大黃膏，瓷盆盛之。大黃鍋把亦鏟下，然后下黨參等三十味，並煎黑豆壳共晒干研細粉，同大黃膏拌勻，再下煉蜜為丸，每丸潮重二錢八分，低溫干燥，蜡壳固封。

【劑量及用法】每次一丸，溫開水化服。

【禁忌】孕婦忌服。

四、杭 州

(婦科回生丹)

【功能与主治】治婦人氣滯血瘀，月經不調，癥瘕積聚，行經腹痛，室女經閉，产后惡露不行，瘀血上冲，變幻諸病，並治产時胞衣不下，或胎死腹中，一切難產等症。

【处方】同上海。

【制法】每丸潮重三錢，淨室陰干，勿用火烘，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，溫酒

或白開水化服。

五、青 島(1)

【处方】全當歸一兩 川芎二兩 熟地一兩 茯苓一兩五 香附一兩(炙) 桃仁二兩 蒲黃一兩(炒) 炙草五錢 陳皮二兩 五靈脂五錢(炙) 紅花一錢 炮姜五錢 坤草一兩五 白朮一兩 黨參五錢

【制法】共軋面，蜜丸，重三錢。

六、青 島(2)

【处方】大黃 紅花 苏木 當歸各二兩 川芎 熟地 茯苓 蒼朮 香附 烏藥 元胡 桃仁 牛膝 蒲黃各一兩 白芍 甘草 陳皮 木香 三稜 靈脂 羌活 山萸 地榆各五錢 人參 白朮 青皮 木瓜 良姜 乳香 沒藥各三錢

【制法】共軋面，蜜丸，重二錢五，蜡皮。

七、沈 陽

【功能与主治】催生下胎，逐瘀生新。主難產死胎，惡露不下，产后血暈，臍腹攻痛，頭眩肢冷，心跳氣短，瘀血凝滯，少腹疼痛。

【处方及制法】錦紋大黃一斤(研末)，黑大豆二升，煎滾取汁，去油，豆壳晒干，陳米醋九斤，紅花二兩，好酒四碗，煎數沸，去渣取汁，用苏木三兩，河水五碗，煎汁一碗，去渣用，將大黃米入鍋內，下醋二斤，煎熬不住手攪，再下醋一斤，漸漸下畢，再用豆汁，苏木汁，紅花汁漸熬成膏，制為二錢重大丸。

【劑量及用法】臨產虛弱，人參湯下，橫生倒產，胎衣不下，淡鹽湯下，子死腹中，車前子湯，凡产后敗血脹痛，一切異症。每服一丸。

【禁忌】孕婦忌服。

八、撫 順

【处方】川軍一斤 赤木二兩 河水五碗 黑豆三升 陳醋五碗 煎汁三碗 紅花三兩 陳醋五碗 煎汁三碗 炒黃色諸藥听用 全歸 熟地 香附 元胡各一兩一錢 三稜 炙草各六錢 川芎 烏藥 白芍 蒲黃各一兩一錢 羌活 白朮 山萸 靈脂 陳皮各六錢 人參三錢 木瓜三錢六分 乳香 沒藥各

二錢四分 白朮三錢 青皮二錢
地榆 桃仁各六錢 蒼朮一兩二錢
山萸六錢

【制法】共為細面，蜜丸，三錢大，蜡皮封。

九、吉 林

【功能與主治】調經，活血。主經血閉塞，瘀血作痛，血寒閉經，少腹結塊，攻串疼痛，脘脹氣逆，石瘕癆疾等症。

【處方】當歸 白朮 熟地 川芎各一兩 人參二兩 茯苓 炙草 香附 元胡 桃仁各一兩 白朮 青皮各三錢 赤木二兩 木瓜二錢 川軍一斤 良姜四錢 烏藥二兩半 乳香二錢 生蒲黃二兩 川膝五錢 沒香二錢 羌活 獨活各五錢 木香四錢 地榆 連肉 三棱各五錢 紅花二兩 黑豆皮二升

【制法】共碾為細面，煉蜜為丸，為二錢一分重，大赤金為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，以黃酒，或紅糖水送下。

【禁忌】忌食魚腥；孕婦忌服。

十、哈 爾 濱

【功能與主治】逐瘀活血。主血寒凝結，經血閉塞，少腹結塊，攻串疼痛，脘脹氣逆，皮膚甲錯，石瘕癆疾。

【處方】當歸 白朮 熟地 川芎 人參各一兩 白朮三錢 茯苓 炙草各一兩 青皮三錢 木瓜一錢 川軍一斤 赤木二兩 良姜四錢 沒朮五錢 香附一兩 烏藥二兩半 元胡一兩 乳香二錢 桃仁一兩 生蒲黃二兩 川膝五錢 沒藥二錢 羌活 獨活各五錢 木香四錢 地榆 連肉 三棱 靈脂各五錢 紅花二兩 黑豆皮二升

【制法】共為細面，煉蜜為二錢一分重丸，大赤金衣。綿紙包，蜡皮封。

【劑量及用法】每服一丸，黃酒或紅糖水為引。

【禁忌】忌食魚腥；孕婦忌服。

十一、呼 和 浩 特 (婦科回生丹)

【處方與制法】大黃面一斤 蘇木絲二兩(熬水) 陳米醋九斤 紅花二兩(炒黃，用黃酒一斤煎好，去

渣用汁) 雄黃豆三升(用水浸取皮，用汁，皮仍歸后)

將大黃面入于淨鍋內，下米醋一斤用火熬之，使長竹板攪之，成膏，再加米醋三斤，一次后下豆汁，晒干，四次再用蘇木汁拌之，再用紅花汁拌之成膏，用盆盛貯，再加后藥：人參 當歸 川芎 香附 蒼朮 黃芩 茯苓 桃仁各一兩 牛膝 炙草 地榆 羌活 橘紅 白芍各五錢 木瓜 青皮各三錢 元胡一兩 乳香四錢 坤草二兩 木香四錢 良姜四錢 白朮 葵花各二錢 昆布一兩五錢 車前草二錢 靈脂 山萸各五錢 九地一兩以上共為粗末，將前藥所炙之藥及黑豆皮同拌在一處，晒干軋細面，煉老蜜為丸，重二錢，蜡皮封固。

附參考古方

【來源】醫宗金鑑：婦科心法要訣。

【功能與主治】墮胎，暴下血不止，面黃唇白，狐參湯。惡血不出，凝脹痛，回生、益母酌相當。

【處方】錦紋大黃一觔(為末) 蘇木二兩(打碎用河水五碗，煎汁三碗用) 人黑豆二升(水浸取壳，用絹袋盛壳同豆煮熟，去豆不用，將壳晒干，其汁留用) 紅花二兩(炒黃色入好酒四碗煎三五滾，去渣取汁用) 米醋九觔(陳者佳)

【制法】將大黃末一觔入淨鍋，下米醋三觔，文火熬之，以長木筋不住手攪之成膏，再加醋三觔熬之，又加醋三觔，次第加畢，然后下黑豆汁二碗再熬，次下蘇木汁，次下紅花汁，熬成大黃膏，取入瓦盆盛之，大黃鍋把亦鑊下，入后藥同磨。人參(酒洗) 川芎(酒洗) 香附(醋炒) 延胡索(酒炒) 蒼朮(米泔浸炒) 黃芩(隔紙炒) 茯苓 桃仁各一兩(去皮尖、油) 川牛膝五錢(酒洗) 甘草(炙) 地榆(酒洗) 羌活 橘紅 白芍各五錢(酒炒) 木瓜 青皮各三錢(去穢炒) 乳香 沒藥各二錢 益母草二兩 木香四錢 白朮一錢(米泔浸炒) 烏藥一兩五錢(去皮) 良姜四錢 馬鞭草五錢 秋葵子三錢 熟地一兩(酒浸九次蒸晒如法制就) 三棱(醋浸透紙裏煨) 五靈脂(醋煮化焙研細) 山萸肉各五錢(酒浸蒸

搗) 右三十味，並煎黑豆壳共晒為末，入石臼內，下大黃膏攪勻，再下煉熟蜜一觔，共搗千杵，取起為丸，每丸重二錢七八分，靜室陰干，須二十余日，不可日晒，不可火烘，干后只重二錢有零，鑲蜡護之，即蜡丸也。

【劑量及用法】用時去蜡壳調服。

產後理血丹

沈 陽

【功能與主治】逐瘀血，生新血，消積止痛。主婦女產后惡露不行，胞衣不下，少腹脹痛，面紅上冲，暈迷不醒等症。

【處方】附子半兩 丹皮 干漆各一兩

【制法】共碾極細面，好醋五兩，大黃末一兩，同熬成膏，和藥為小丸。

【劑量及用法】每服五分至一錢，溫酒沖服。

【禁忌】孕婦忌服，血虛無瘀者禁用。

神效產靈丹

一、西 安

【功能與主治】主治婦人產后，代謝機能衰弱，血循環發生障礙，惡露不下，或下之不尽，因而引起胸腹脹悶，兩肋刺痛，大目眩暈及產后虛怯，感冒風寒、惡寒發熱，全身疼痛等症。

【處方】當歸 首烏 兩頭尖 白朮 木香 細辛 血竭各五錢 人參 川烏 草烏 大茴 川芎各二錢 肉桂一兩半 沉香六錢 琥珀一兩 防風 白芷 芥穗 桔梗 麻黃 炙草各二兩 蒼朮半斤

【制法】共研細末，煉蜜為丸，二錢重，硃砂為衣。

【劑量及用法】每次一丸，陳黃酒送下，服后復臥。

【禁忌】無瘀血而內燥熱者不宜服。

二、呼 和 浩 特

【處方】當歸 首烏 兩頭尖 白朮 木香 細辛 血竭各五錢 川烏 草烏 大茴 川芎各二兩 肉桂 沉香 琥珀 防風 白芷

芥穗 枯梗 麻黄各二兩 蒼朮八兩 炙草二兩

【制法】蜜大丸重二錢硃衣，蜡皮封固。

还元丹

沈 陽

【功能与主治】补血行瘀。产后亡血过多，头目眩暈，自汗心跳，或恶露不净，腹痛發熱，四肢倦怠。

【处方】益母草八兩 澤蘭二兩 茯苓四兩 香附六兩 当归 熟地各四兩 白芍 川芎各二兩

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸，二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，黄酒或姜湯送下。

观音普济丹

一、青 島

【处方】当归一兩 木香八錢 紅花一兩二分 沒藥六錢 白面二兩 占墨六錢 百草霜二兩 天麻八錢

【制法】共軋面，白面为糊成丸，重二分。

二、呼和浩特

(观音救苦普济丹)

【处方】当归二兩五錢 天麻四兩五錢 京墨二十兩 木香 紅花 沒藥 飞罗面各四兩五錢 百草霜二兩五錢

【制法】水泛小丸。

产 后 药

一、天 津

【功能与主治】活血化痰。生血瘀不尽，血崩昏迷，遍身拘攣，关节痠痛，脊强項直，牙关紧閉，惊恐气逆，寒热往来，胸滿脹悶，腰腹疼痛。

【处方】紅花二兩 赤芍 肉桂(去粗皮) 莪朮(醋制) 熟地 当归 生蒲黄 干姜 雄黑豆各一兩

【制法】共为細粉，二錢重，裝袋。

【剂量及用法】每次服一袋，症重酌加，溫黃酒送下，白开水亦可。

其 他 类

滋陰百补丸

沈 陽

【功能与主治】补气养血。主女人劳伤，气血不足，乍寒乍热，心腹疼痛，胎前产后，諸虛百損，衰弱等症。

【处方】当归六錢 熟地黄一兩 香附六兩 白芍藥 川芎各一兩 益母草八兩 制甘草一兩 白茯苓二兩 元胡索 人參各一兩 木香 白朮各四兩

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸，二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，空心米湯送下。

【禁忌】孕妇忌服。

附参考古方

【来源】沈氏尊生書：妇科玉尺。

【功能与主治】治妇人劳伤气血，諸虛百損，五劳七伤，陰阳不和，乍寒乍热，心腹疼痛，不思飲食，怔忡無力。

【处方】香附一斤(用酒、醋、盐、童便，各浸一分，焙) 益母草半斤(酒洗) 当归六兩 熟地(姜汁炒) 川芎 白朮各四兩 白芍三兩 延胡索 人參 茯苓各二兩 炙草一兩

【制法】蜜丸。

【剂量及用法】空心下五六十九。

妇科五淋丸

天 津

【功能与主治】清热利水。主膀胱湿熱，淋漓不断，混濁帶血，小便不利，尿道刺痛。

【处方】当归 生地各四兩 川芎 滑石各三兩 木通 甘草 牛蒡子 生白芍各二兩 石草(去毛) 黃連各一兩 海金砂五錢

【制法】共为細粉，凉开水泛小丸，二錢重裝袋。

【剂量及用法】每次服一袋，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

茄 症 丸

哈 尔 濱

【功能与主治】陰挺，房事違理，意淫不遂，陰戶之中，有物挺出，形如茄狀，障碍交合。陰菌，陰中挺出，形如菌狀，四圍腫痛，痛痒無定，其色紅紫，流下黃水，小便重墜，漫數哺熱。主陰挺(陰茄)陰菌。

【处方】枯矾六兩 桃仁一兩 銅綠 雄黃 五味各五錢 梅片一錢

【制法】共碾为極細面，煉蜜为一錢四分重之橄欖形丸，雄黃为衣。瓷罇存貯。

【剂量及用法】將橄欖形丸，輕輕納入陰道深处，約二日間，藥丸漸次烊化，用淨水洗淨，再納入一丸，以愈为度。

瘰 症 丸

撫 順

【处方】枯矾六錢 全青四錢 桃仁一錢 雄黃五錢 五味五分 冰片一分

【制法】共为細面，蜜丸一錢重。

破血紫金丹

撫 順

【处方】山甲二錢 紅娘 斑蝥各一錢 赤木一兩 三棱二兩 莪朮一兩 血竭 紅花各五錢 桃仁二兩 牙皂八錢 金砂五錢 川軍 归尾各一兩 紅麴五錢 川芎一兩 天葵五錢 煅干漆五錢 龟板一兩 白硃砂五錢

【制法】共为極細面。

妇女香身丹

沈 陽

【功能与主治】增强新陳代謝之機能。主腋臭狐臊，口臭氣穢，白帶白濁，惡氣熏人。

【处方】沉香 人黃 麝香 紅花 檀香 青木香 甘松各二錢 細辛一錢 檳榔一錢 香附五錢 甘草 白芷 当归各一兩 麝香五分 芎藭八錢 豆蔻五錢 藁本八錢 防風五錢 龍腦三分 公丁香

四錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸一錢重。

【劑量及用法】每服一丸，每日服三次，飯後兩小時，白開水送下。

【禁忌】孕婦勿服。

化 瘡 錠

天 津

【功能與主治】除濕殺菌，消腫止癢。主濕毒、陰癢、陰腫、陰疹、白帶不止，淋漓不盡。

【處方】雄黃 枯礬各三兩 川

椒 桃仁(去皮) 蛇床子各二兩
五倍子 烏梅各一兩五錢

【制法】共為細粉，煉老蜜加豬胆汁一兩為錠，一錢重，用綿紙裹，絲繩拴，蜡紙包嚴裝盒。

【劑量及用法】每次一錠，放入陰道內。

下 瘡 錠

一、大 同

【功能與主治】陰戶內生茄，病形如鷄冠，或常流粘沫。疼痛難忍，坐臥不安。

【處方】紫梢花五錢 硃砂一錢
枯礬四兩 澤蘭五錢 銅綠三錢
五味子 雄黃 桃仁各五錢

【制法】共軋細面，老蜜為丸，每丸一錢，用絲綿裹實留綫頭。

【劑量及用法】將藥一粒，以溫水溫之，然後放入陰戶。

二、呼和浩特

【處方】枯礬二兩 銅綠 五倍子各五錢 蛇床子二兩 桃仁 雄黃各五錢

【制法】共為細面，老蜜為錠，重四錢，綿紙包好。

兒 科

伤寒瘟疫类

羌活丸

一、大同

【功能与主治】小兒外感。

【处方】羌活 独活 前胡 川芎 枳壳 天麻 柴胡 桔梗 薄荷 葛根各二兩 甘草一兩

【制法】共为細末，煉蜜为一錢大丸。

【剂量及用法】早晚各服一丸，淡姜湯送下。

二、沈陽(小兒羌活丸)

【功能与主治】疏散風寒，解表退熱。主傷風傷寒，頭痛發熱，惡寒咳嗽，鼻塞聲重，驚風抽搐，痘疹欲出，感冒初起。

【处方】羌活 前胡 独活 桔梗 党參各五錢 薄荷三錢 川芎五錢 甘草二錢 天麻 連翹各五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸三分五厘重。

【剂量及用法】每服一丸至二丸，小姜湯送下。

【禁忌】生冷。

三、沈陽

【功能与主治】疏風解表。主傷寒人痛，身痛發熱，惡寒咳嗽，鼻塞聲重，痘疹欲出，發抽驚風，喘嗽，手足抽搐等症。

【处方】党參 羌活 独活 前胡 川芎 桔梗 天麻各五錢 薄荷 地骨皮各三錢 甘草一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸七分重。

【剂量及用法】每服一丸，淡鹽湯送下。

【禁忌】忌生冷，風寒。

四、撫順(小兒羌活丸)

【功能与主治】發汗解熱。主小兒感冒，發熱惡寒，頭痛身痛，咳嗽

抽搐。

【处方】羌活三兩 独活 前胡各一兩五錢 川芎二兩 枳實 党參 明天麻 柴胡各一兩 甘草二兩 蘇叶三兩 桔梗一兩 白芷三兩 生地三兩 防風一兩 細辛一兩 蒼朮一兩 黃芩二兩

【制法】共为細面，蜜丸七分重。

【剂量及用法】七岁至十岁每服一丸。三岁至六岁服二分之一。用鮮姜、薄荷、霜桑叶、菊花煎湯送服。

【禁忌】忌食腥冷油膩。

五、哈爾濱(小兒羌活丸)

【功能与主治】解表清里，感冒寒涼，發熱畏冷，頭痛体痛，咳嗽抽搐。主治感冒。

【处方】羌活 独活 前胡 川芎各七錢 天麻 桔梗各五錢 党參 骨皮各三錢 炙草二錢

【制法】共碾为細面，煉蜜为七分或三分五厘重丸，硃砂为衣。瓷罐貯存。

【剂量及用法】七岁至十岁小兒每服一大丸(七分重者)。三岁至六岁每服一小丸(三分五厘重者)。三岁以下小兒每服小丸之二分之一。週岁以内小兒每服小丸之三分之一。均用鮮姜、薄荷、桑叶、菊花为引。

【禁忌】忌食腥冷油膩。

六、呼蘭浩特

【处方】羌活一兩 川芎 茯苓 桔梗 半夏 陈皮 前胡各一兩五錢 浙貝 蘇叶 元參 天冬 葛根各一兩 僵蚕 鉤藤 薄荷 甘草各五錢

【制法】蜜丸，重一錢，硃衣。

小兒四症丸

一、天津

【功能与主治】健胃消食，利尿止瀉。主小兒消化不良，嘔吐瀉肚，小便不利，肚腹脹痛，中暑中寒，頭痛身熱，口渴舌干，煩躁不寧。

【处方】广木香二錢 蘇叶一兩五錢 陈皮 厚朴(姜制) 藿香 白朮(數炒) 茯苓(去皮) 炒麦芽 炒蒼朮各一兩 花粉 澤瀉 山楂 豬苓 制半夏各七錢五分 白芷 桔梗 滑石 砂仁各五錢 神曲(數炒)七錢五分 以上十九味，共为細粉，每細粉十五兩二錢兌，琥珀面五錢

【制法】以上研細和勻，煉蜜为丸，一錢重，每斤丸药用硃砂面三錢为衣，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，週岁以内酌減。白開水化服。

【禁忌】忌冷油膩。

二、濟南

【功能与主治】小兒時感，嘔吐便瀉，大重畏寒，小便不利，肚腹脹痛。

【处方】木香二錢 赤茯苓一兩 山楂七錢五分 紫蘇叶一兩五錢 麦芽一兩 豬苓七錢五分 陈皮 蒼朮各一兩 法半夏七錢五分 厚朴一兩 天花粉七錢五分 白朮 藿香各一兩 六神曲 澤瀉各七錢五分 白芷 桔梗 滑石 琥珀各五錢(以上共为細粉另用) 木香四兩 紫蘇叶三兩 陈皮 厚朴 藿香 白朮 赤茯苓各二兩 天花粉 豬苓 法半夏各一兩五錢 砂仁 桔梗各一兩 共熬清膏

【制法】用以上藥粉和清膏，加蜜为丸，重五分。硃砂为衣。

【剂量及用法】每服一丸，白開水送下。週岁以下者酌減。

紫草丸

一、沈陽

【功能与主治】解毒表疹，兴奋神經。主痘疹將出未出，頭痛嘔吐，身熱神昏，咳嗽喘促，食慾不振，疹毒內攻，昏睡似極，小便赤澀。

【处方】紫草五錢 珍珠四分 硃砂五錢 牛黃二分 犀角 羚羊 青黛 川貝 羌活 琥珀 乳香

沒藥各三錢 玄參 雄黃各五錢
冰片二分

【制法】共碾極細面，再加入下藥：金銀花 地丁 胡桃仁各二兩 菊花 生甘草各一兩 用后五味熬成膏后，和前藥面攪均一處，加蜜少許為丸三分五厘重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

二、撫順

【功能與主治】宣透痘疹，清熱解毒。主天花欲出皮里含蓄，身熱面赤，煩躁驚啼；天花結痂，余毒不盡；鼻瘡，水痘，牙疳出血；痘痂不落，底盤紫黑；麻疹隱伏，欲出不出，毒火內攻，壯熱神昏，氣喘抬肩；麻疹之后，毒熱不退，哺熱身燒；胎毒，先天遺毒，皮膚潰爛，紅腫痛癢及一切瘡癤。

【處方】犀角六錢 紫草五錢 蘇珠二分 青黛二錢 牛黃二分 川貝三錢 冰片二分 硃砂五錢 琥珀 乳香 雄黃 沒藥 羌活各二錢 元參 竺黃各五錢

【制法】共為細面。雙花 地丁 核桃仁各一兩 甘草 菊花各一兩 此五味用水五碗，以沙鍋慢火煎至成膏，合蜜並前藥面為丸，三分五厘重，蠟皮封。

【劑量及用法】三歲以上每次一丸，七歲以上每服二丸，病重者日夜服二、四次。

【禁忌】辛辣等物。

三、吉林(暹羅紫草丸)

【功能與主治】宣透痘疹，解毒消熱。主天花痘疹胎毒。

天花 天花欲出，皮里含蓄，身熱面赤，兩目含淚。耳尻寒涼，煩躁驚啼。天花結痂，余毒不盡。鼻瘡口臭。耳膿目爛。牙疳舌腐。痘痂不落。底盤紫黑。一切火毒。

麻疹：麻疹隱伏，欲出不出，毒火反攻，壯熱神昏，咽喉腫痛，氣喘抬肩。麻疹之后，毒熱不退，哺熱蒸燒。

胎毒：先天遺毒，皮膚潰爛，紅腫癢痛，一切諸瘡。

【處方】珍珠二分 硃砂五分 牛黃 梅片 青黛 乳香 沒藥各三分 玄參五錢 雄黃五分 紫草五錢 羚羊 羌活 琥珀 甘草

暹羅角 桃仁 菊花各三錢 雙花 地丁各一兩

【制法】將珍珠、硃砂、梅片、牛黃均另研外，余均一處碾細，陸續調勻，煉蜜為丸，三分五厘重，大赤金為衣。用棉紙包，蠟皮封固。貯于瓷罇中。

【劑量及用法】三歲以上小兒每服一丸。七歲以上小兒每服二丸。病重者日夜服二、四次。

【禁忌】辛辣油膩。

小兒導赤散

沈陽

【功能與主治】鎮驚安神止抽。主小兒急驚抽搐，傷寒熱病，四時瘟疫，痘疹癰毒，及一切毒熱之症。

【處方】生地黄一錢 烏角 川黃連 木通各一錢 硃砂一錢半 粉甘草一錢 牛黃一分

【制法】除硃砂牛黃另研外，余共碾極細面。

【劑量及用法】每服一分至二分，開白水送下。

小兒清涼散

沈陽

【功能與主治】鎮驚退熱，解毒透表。主身熱面赤，咽痛或癰疹不透等症。

【處方】蟬退八分 殭蚕 金銀花 澤蘭 當歸各二錢 生地黄五錢 生石膏四錢 黃芩 黃連 紫草 焦山梔 丹皮各一錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服五分，病重者加倍。白開水送下。

牛黃十全散

沈陽

【功能與主治】清熱解毒，化痰鎮驚。主小兒癰疹，咽喉腫痛，急驚風症，痰涎壅盛，牙疳口臭，唇舌腐爛，神昏譫語，胎毒瘡瘍。

【處方】牛黃二分 黃柏二錢 馬勃一錢 青黛三錢 人中白二錢 珍珠一分 薄荷叶四錢 兒茶三錢 冰片一分 琥珀四分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】不滿週歲者半

分，一歲至二歲者一分，三歲至五歲者二分。開白水送下。

【禁忌】辛辣動火食物。

清疹散

沈陽

【功能與主治】清熱解表，解毒透疹。主疹毒不透，喉腫音啞，胸高氣喘，呼吸急促，腹痛便溏，神昏譫語，四肢熱厥，搐搦痙攣。

【處方】生石膏 烏犀角 京知母各五錢 全蟬退 白殭蚕 青連翹各四錢 金重樓三錢 薄荷叶四錢 蘆根一兩 金銀花一兩

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】小兒一歲以上，每服一分。三歲以上，每服二分。五歲以上每服三分，余类推。白開水送下。

【禁忌】魚腥辣物。

透毒散

沈陽

【功能與主治】清熱解毒透疹。主小兒痧疹初起，寒熱往來，咳嗽嘔嘔，鼻塞流涕，目澀多淚，咽喉腫痛，呼吸氣促，壯熱口渴，神昏妄言，頭痛肢搐，見點即回，或疹含不透，朝出夕退，退后復發，出沒無定，痛痒難堪等症。

【處方】烏犀角 淨蘆根 金銀花各一兩 滑石粉二錢 甘草粉五錢 赤芍藥 前胡 牛蒡子各五錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】小兒一歲以上每服一分。一歲以上每服二分。三歲以上隨症酌加。開白水送下。

【禁忌】腥辣及燥性食物。

育嬰金丹

一、天津(金液仙丹)

【功能與主治】清肺，疏風，化痰。主小兒感冒發燒，头疼头晕，痰喘氣促，風火頓嗽，嘔吐痰涎，口燥舌干，咽喉腫痛，小便赤黃，隱疹不透。

【處方】葛根二兩 黃芩 前胡 桔梗各四兩 防風 柴胡各二兩 木通 甘草 花粉 制半夏各四兩 枳殼(麸炒)二兩 芥穗四兩 人參

(去蘆)一两 神麴(麸炒)四两 苏叶二两

以上十五味,共为細粉,每細粉二斤十五两兌;

硃砂面一两 羚羊粉三錢

【制法】以上研細和勻,煉蜜为丸,一錢重。每斤丸药用硃砂面三錢上衣。蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸,周岁以内酌減。白开水化服。

二、兰 州

【功能与主治】止咳化痰,鎮惊安神,去风发汗。主小兒傷風頭痛,咳嗽氣喘,咽喉腫痛,牙疼口干,鼻流清涕,或鼻塞不通,急惊風抽搐。

【处方】胆星 羌活 防风 麻黄各一两 牙皂五錢 天麻一两五錢 薄荷二錢 全蠍十八条 茯苓竺黄 广皮各八錢 礞石(制)一两 殭蚕三十条 鈎藤四两 琥珀三錢 冰片五錢 牛黃一錢 麝香五分

【制法】共研細面,竹瀝膏和密为丸,一錢重。硃砂衣。

【剂量及用法】周岁以内服四分之一;一岁至二岁服半丸;二岁以上服一丸。开水調服。

【禁忌】刺激性食物。

三、沈阳(育嬰丹)

【功能与主治】清瘟疹,解毒熱。主瘟毒斑疹,欲出不透,咳嗽喘息,喉痛發熱,嘔吐不食。

【处方】連翹 金銀花各四錢 荆芥穗三錢 犀角 薄荷 桔梗各二錢 前胡一錢 藍根三錢 牛蒡(炒) 殭蚕 甘草 生地 竹叶 赤芍各二錢 蘆根 木通 羚羊各三錢

【制法】共碾極細面,煉蜜为丸。三分五厘重。蜡皮封固。

【剂量及用法】周岁以内小兒每服半丸;一至三岁者服一丸。白开水送下。

【禁忌】辛辣物。

小儿痧疹金丹

天 津 市

【功能与主治】清熱解毒表疹。主痧疹內蘊,痧疹潛伏,身熱面赤,咽喉腫痛,口干舌燥,咯痰黃稠。

【处方】大青叶 炒殭蚕 花粉

板兰根 地龙 川貝 桔梗 銀花 橘紅 山川柳 連翹(去心) 独脚蓮 炒牛蒡子各三錢 甘草二錢

【制法】共为細粉,煉蜜为丸,五分重。每斤丸药用硃砂面三錢上衣。蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸,日服二次,周岁以内酌減,鮮芦根熬水化服。白开水亦可。

香苏正胃丹

一、北京(香苏正胃丸)

【功能与主治】解熱健胃化滯。主小兒感冒中暑,停乳停食,頭痛身熱,嘔吐泄瀉。

【处方】橘皮二十两 厚朴 藿香各四两 紫苏叶八十两 茯苓 山楂 六神麴 麦芽 枳壳 砂仁各十两 扁豆三十二两 香薷六十四两 滑石三十二两 甘草五两

【制法】共为細粉,煉蜜为丸,重一錢。

【剂量及用法】每服一丸,日服一次,溫开水送下。小兒三岁以下者酌情減。

二、天 津

【功能与主治】清熱解表,健胃消食。主小兒感冒中暑,停乳停食,頭痛身熱,嘔吐泄瀉,腹痛腹脹,小便不利。

【处方】陈皮二两 厚朴(姜制)四两 苏叶八两 藿香四两 枳壳(麸炒) 砂仁 茯苓(去皮) 南楂 神麴(麸炒) 炒麦芽各一两 益元散 香薷各四两 炒扁豆二两

【制法】共为細粉,煉蜜为丸,一錢重,蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸;周岁以内酌減。白开水化服。

三、济 南

【功能与主治】小兒暑冷,傷風感冒,頭疼身熱,傷食傷乳,嘔吐泄瀉。

【处方】紫苏二两 香附 枳壳 桔梗 半夏 厚朴 陈皮 蒼朮 赤芍各一两 砂仁六錢 藿香六錢 甘草三錢

【制法】共研細末,煉蜜为丸,每丸重一錢。

【剂量及用法】每服一丸,白开

水送下。

【禁忌】辛辣生冷油膩等物。

四、呼和浩特(1)

【处方】藿香 陈皮 苏叶 山楂 桔梗 神麴各四錢 川朴(加料用紫朴) 扁豆 蒼朮 木通 赤芍各四錢 黃連 甘草 半夏各二两 枳实三两 薄荷 甘葛各二两

【制法】蜜大丸,重一錢。

五、呼和浩特(2)

(加料正胃丹)

【处方】照香苏正胃丹,每料再加丁香五分、檀香五分、冰片二錢。

【制法】蜜大丸,重一錢,硃衣、蜡皮。

惊 风 类

小儿調中丸

沈 阳

【功能与主治】健胃消食。主飲食不調,过食厚味甘甜生冷之物,难以消化,以致泄瀉痢疾,腹部脹痛,嘔吐惡心。

【处方】黃連(一半吳茱萸炒,一半姜汁炒)一两 白朮 白芍 蒼朮 山楂 广木香各一两二錢 陈皮 神麴 黃芩 延胡 茯苓 桔梗 厚朴 炒枳实 当归各二两

【制法】共碾極細面,水泛小丸。

【剂量及用法】每服二分至七分,开水送下。

【禁忌】忌食生冷、硬物。

保嬰育生丸

北 京

【功能与主治】解熱化痰,消滯安神。主小兒外感,風寒咳嗽,痰盛發熱,神呆惊風抽搐。

【处方】金銀花 連翹 橘紅各五錢 貝母 殭蚕 天竺黄 天麻 半夏 防风 胆南星各三錢 三仙一两(焦) 鈎藤三錢 黃芩四錢 甘草五錢 荆芥穗 薄荷各二錢 活蠍子十二个 桑叶五錢 共为細粉,每六两七錢細粉兌;雄黃五錢 琥珀四錢 冰片二錢 麝香一錢

【制法】上藥和勻,煉蜜为丸,重五分,硃砂为衣,蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下，小兒三歲以下者，酌時遞減。

疎風保童丸

昆明

【功能與主治】小兒發熱咳嗽，將起驚風。

【處方】麝香二分 胆南星一兩 薄荷 法夏 天麻 炙小白附子 花粉 橘紅各五錢 琥珀末六錢 殭蠶 虫蛻 白芷 荊芥(炒)各五錢 甘草二錢 鉤藤五錢 全虫二錢 防風 炒白芍各五錢

【制法】煉蜜為丸，硃砂為衣，每丸一錢。

【劑量及用法】嬰兒在半歲以下服三分之一，兩歲以下服半丸，開水調服。

【禁忌】慢驚風忌服；並忌食魚。

保兒安丸

禹縣

【功能與主治】主胃腸積熱，驚風抽搐，夜睡不安，大便閉結。

【處方】硃砂 明雄 全蠍 薄荷 明天麻 天竺黃 黃連 大黃 梔子 半夏 胆南各一錢

【制法】共為細面，水丸，硃砂衣，小米大。

【劑量及用法】小兒一日服十二丸，三歲服六十丸。

【禁忌】慢驚忌服。

【備考】有效期二年。

如意丸

南

【功能與主治】治小兒夜啼，發熱驚恐，痰喘氣促，及急驚風，手足抽搐，角弓反張。

【處方】天麻 鉤藤 殭蠶各二兩 蟬衣一兩 麻黃五錢 細辛三錢 桂枝一兩 琥珀一兩五錢 沙參一兩 薄荷六錢 檳榔一兩 胡黃連 雄黃(飛)各五錢 川貝母 枳殼 胆南星各一兩五錢 廣木香 沉香各一兩 全蠍三錢 法夏 杏仁各一兩五錢 白附子八錢 防風 天竺黃各一兩五錢 使君子一兩

蟾酥五錢 牽牛子一兩 熟大黃二兩 冰片一錢六分 西牛黃 芥子各五錢 廣陳皮一兩五錢 麝香一錢六分 云黃連五錢 硃砂(水飛)十兩五錢

【制法】共研細面，水泛為丸，如芥子大，方內硃砂為衣。

【劑量及用法】四個月內小兒，每服一粒至五粒，五個月至一歲，每服五粒至七粒，一歲至二歲服十粒，二歲至五歲，每服十五粒，五歲至十歲，每服二十粒，根據病情輕重，每日服一次或三次，溫開水化服。幼兒服此藥時，宜先檢視口腔，如牙齦上，發現粟粒形水泡，即以軟綢開水洗淨，去其惡血，然後服此丸藥。

【禁忌】體弱兒童忌服。

太極升降丸

濟南

【功能與主治】時感發熱，腮項腫疼，乳食停滯，痰盛抽搐。

【處方】殭蠶一錢 蟬蛻一錢 姜黃一分 大黃四錢 天竺黃 胆南星各一錢 梅片一分

【制法】共為細末，煉蜜為丸，每丸重三分。

【劑量及用法】週歲小兒，每次一丸，週歲以上，每次二丸。

太極丸

一、北京、濟南、承德

【功能與主治】清熱鎮靜豁痰。主痰熱氣促，手足抽搐，煩躁便秘。

【處方】大黃 殭蠶各九兩 胆南星 天竺黃各十五兩 共為細粉兌入：麝香 冰片各三錢

【制法】上藥和勻，煉蜜為丸，重五分，硃砂為衣。(濟南硃砂一兩八錢為衣)

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

二、天津

【功能與主治】清熱解鬱，消痰通便。主急熱驚風，痰涎壅盛，手足抽動，肢體強直，神識昏迷，大便秘結。

【處方】同北京。

【制法】研細和勻，每一兩藥面，用江米面三錢，蒸糊為丸，干重二分。每斤丸藥(硃砂面以藥面糊面

計算)用硃砂面四錢為衣。蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】一至二歲，每次服一丸；週歲以內酌減，白開水化服。

【禁忌】慢驚風忌服。

三、大同

【功能與主治】肺胃熱盛，痰實咳嗽，驚風夜眠不安。

【處方】同北京(加硃砂二兩)。

【制法】共為細面，煉蜜為丸，每丸八分，金衣蜡皮。

【劑量及用法】未滿週歲小兒，每丸分三次服，週歲以上者，服一粒。

四、沈陽(小兒太極丸)

【功能與主治】清熱解表，鎮驚消食。主小兒痰壅氣促，手足抽搐，角弓反張；發熱惡寒，頭疼身痛，煩躁嘔噦；便結溲澀，腹痛拒按；咳嗽面赤，四肢痙攣。

【處方】天竺黃 胆南星各五錢 殭蠶 大黃各二錢 麝香 梅片各二分

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，三分五厘重，硃砂為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，姜湯或白開水化服。

【禁忌】泄瀉者忌服。

五、撫順(小兒太極丸)

【功能與主治】鎮驚，解熱，緩瀉。主小兒急驚，手足抽搐，角弓反張；小兒感冒，發熱畏冷，火疼身痛，干嘔咳嗽；食積化熱，晡熱發熱，便結溲澀，腹痛拒按等症。

【處方】胆星一兩 硃砂三錢 麝香四分 天竺黃五錢 冰片四分 殭蠶 大黃各四錢

【制法】共為細面，蜜丸二分五厘重，蜡皮封。

【劑量及用法】驚風感冒，用桑葉、菊花、薄荷、姜為引，食積胃熱者白開水送下。

【禁忌】瀉泄便溏者忌服。

六、吉林、哈爾濱

(小兒太極丸、除瘟丸)

【功能與主治】鎮驚風，清肺熱，解瘟毒，表風邪，降滯食積，驅除胃熱。主小兒急驚，痰盛氣寒，二目天

吊，体肢發熱，不省人事；感冒發熱惡寒，頭痛身疼，嘔吐咳嗽，煩躁不寧；食積不化，手心發熱，日哺潮熱，便不消化，身倦腹痛。

【處方】胆星二兩 竺黃一兩 殭蚕 野軍各六錢 梅片 台麝各六分

【制法】除台麝、梅片另研外，其餘共研細末，然后再和一处，調勻，煉蜜為丸，一為二分一厘重，一為七分重。硃砂為衣，綿紙包，蜡皮封固。

【劑量及用法】如驚風感冒者，用桑葉、菊花、鉤藤、薄荷、鮮姜為引，食積胃熱，白水送下。

【禁忌】孕婦及泄瀉者忌服。

七、呼和浩特(1)

【處方】大黃 天竺黃 胆星各五錢 殭蚕三錢 麝香八厘 冰片二分

【制法】共為細面，江米糊小丸，重三分，硃砂衣。

八、呼和浩特(2)

(加料太極丸)

【處方】大黃 胆星 竺黃各一兩 硃砂一錢 麝香一分五厘 冰片六分

【制法】蜜大丸重五分，滿金衣蜡皮。

七 珍 丸

吉 林

【功能與主治】主急驚風，天吊風，撮口風，停痰停乳，面青氣脹，痰火交結，四肢抽搐，項背反張，夜啼不寧，痰久結滯，便燥痰促等症。

【處方】硃砂 雄黃 竺黃 全蠍 胆星 豆霜各三錢

【制法】共研細面，用米湯水泛為小丸，如穀粒大，硃砂為衣。

【劑量及用法】一歲以上者服七粒(即服足一付)，三歲以上重症，每次可服二付，用乳汁，或白水、糖水送下。

小兒驚風丸

一、福 州

【功能與主治】治小兒急驚風，痰涎壅滯，咳嗽氣促，心神不定等

症。

【處方】明天麻 全蠍 殭蚕 伏苓 葶藶 川連 川升麻各三錢 花粉五錢 天竺黃二錢 葛根五錢 琥珀二錢 防風三錢 麝香六分 老片 牛黃各五分 麻黃二錢

【制法】共研末，和生薑汁，竹瀝汁泛為丸，硃砂衣。

二、重慶(驚風丸)

【功能與主治】治小兒急驚，四時感冒，傷風吹乳發寒發熱等症。

【處方】天竺黃 全蠍 殭蚕 蟬蛻 鉤藤各二兩 沉香五錢 甘草 天麻各二兩 胆南星一兩 牛黃五分 珍珠七分 梅片一錢 麝香七分 硃砂三兩 雄黃二兩

【制法】除牛黃、麝香、珍珠、梅片另研細末外，硃砂穿衣，雄黃另稱，余藥共研細末，水泛為丸，如芥子大。

【劑量及用法】六月以內四粒，十歲十粒。

三、禹 县

【功能與主治】急驚風症，痰涎壅塞，食積不消，化痰瀉積。

【處方】天竺黃二兩 胆星 蟬退各一兩 鉤藤二兩 蒼朮六兩 芫花二兩 川芎六兩 巴豆霜三兩 硃砂三兩 麝香五分 殭蚕三兩

【制法】共為細面，水丸，如小米大，金箔為衣。

【劑量及用法】每服四十粒，溫開水送下，一歲服五粒。

【禁忌】孕婦忌服，慢驚、虛熱忌用。

【備考】有效期二年。

救 驚 丸

一、沈 陽

【功能與主治】定驚止癇，防止癇發。主驚風內熱，癇發抽搐，五癇熱厥。

【處方】薄荷三錢 殭蚕二錢 胆星四錢 白附子二錢 防風二錢 明人參二錢 法夏四錢 全蠍(去勾)三錢 青黛四錢 甘草二錢 天竺黃三錢 鉤藤三錢 麝香八分 片砂三錢 个牛黃五分 珍珠五分 琥珀二錢

【制法】共研細面，煉蜜為丸，三分五厘重，蜡皮封固。

驚 風 類

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

二、沈陽(吳氏救驚丸)

【功能與主治】定驚止癇，防癇攣抽搐。主驚風癇風，癇攣抽搐，發熱急驚，驚悸不安，五癇熱厥，時抽時止，臍風撮口，天吊抽風，心火熱急，狂叫譫語，一切熱症，各種抽風。

【處方】殭蚕 鉤藤 薄荷葉 防風 全蠍 天麻 天竺黃 粉甘草各三錢 白附子 硃砂 琥珀各二錢 青黛 胆南星 法半夏各四錢 麝香八分 牛黃 珍珠各五分

【制法】除麝香、珍珠、牛黃、琥珀另研外，余則共碾極細面，煉蜜為丸，三分五厘重，金箔為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白水送下。

【禁忌】辣腥葱蒜。

三、撫順(吳氏救驚丸)

【功能與主治】祛風鎮驚鎮癇。主小兒急熱驚風，五癇頑痰，驚悸不安，夜啼心煩，抽搐反張，目斜天吊。

【處方】殭蚕 全蠍 薄荷 硃砂 防風 甘草 竺黃 白附子 琥珀 鉤藤 天麻各二錢 胆星 法夏 青黛各四錢 蘇珠三分 麝香五分 牛黃八分

【制法】共為細面，蜜丸，三分五厘重，蜡皮封。

鎮 驚 丸

濟 南

【功能與主治】主急熱驚風，痰熱抽搐，舌強口噤，神昏不醒，小兒初生，臍風撮口，夜啼不安等症。

【處方】龍胆草二錢 黃連五錢 青黛 防風各三錢 鉤藤二錢 牛黃一錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，五分重。金箔為衣。

【劑量及用法】每次服一丸，薄荷湯送下。

牛黃鎮驚丸

一、北 京

【功能與主治】鎮靜，散風，豁

痰。主小兒急熱驚風，發熱抽搐，牙關緊閉，痰涎壅盛，煩躁不安。

【處方】大蘇 殭蚕 防風 鈎藤 川芎 桔梗 半夏 白朮 細辛 全蠍 茯苓 羌活 遠志 菖蒲 人參(去蘆) 荆芥穗 胆南星 各十兩 甘草 沉香各六兩 天竺黃三十兩 共為細粉，每二百一十二兩細粉兌：雄黃二兩 硃砂四兩八錢 冰片 牛黃 麝香各二兩四錢 琥珀一兩

【制法】上藥和勻，煉蜜為丸，重五分，硃砂為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下，小兒三歲以下者，酌情遞減。

【禁忌】忌一切辛辣食物。

二、天津

【功能與主治】鎮驚，散風，化痰。主急熱驚風，發熱氣促，痰涎壅盛，驚癇痙攣，牙關緊閉，神識昏迷。

【處方】川芎 茯苓(去皮) 川貝 羌活 胆星各一兩 鈎藤四兩 薄荷一兩 沉香 制川烏各二錢五分 菖蒲三錢五分 天麻一兩 黑郁金二錢 淡全蠍一兩 天竺黃六錢 地龍一錢 大黃 制白附子各五錢 共為細粉，每細粉十四兩八錢五分兌：琥珀面二錢五分 硃砂面一兩 冰片三錢 牛黃 麝香 珍珠各一錢 明雄黃面二錢

【制法】以上研細和勻，煉蜜為丸，五分重，每斤丸藥用硃砂面二錢上衣，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】一至二歲，每次服一丸，週歲以內酌減，病情嚴重者酌加，白開水化服。

三、杭州(牛黃鎮驚錠)

【功能與主治】化痰定喘，熄風安神。治虛弱小兒、急熱驚風、膽風撮口、牙關緊閉、四肢抽搐、角弓反張、痰涎壅盛、咳嗽氣喘、諸癇痙攣、危急諸症。

【處方】西牛黃八分 天竺黃五錢 珍珠粉一錢 明雄黃三錢 麝香一錢 飛辰砂一錢 杜胆星八錢 西琥珀二錢 明天麻三錢 炒棗仁六錢 遠志肉三錢 白殭蚕五錢 伏神六錢 全蠍三錢 半夏(竹瀝制)六錢

【制法】以上各取淨粉，用甘草五錢，煎湯代水和煉蜜為丸，每兩重五分，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，嬰兒酌減，用金銀器湯化服，或灯心湯或開水化服亦可。

四、蘭州

【功能與主治】清熱解毒，鎮驚安神。主急熱驚風，發燒，牙關緊閉，咳嗽氣喘，痰涎不出，抽搐驚癇，昏迷不醒。

【處方】川芎 茯苓 川貝 羌活 胆星各一兩 鈎藤四兩 薄荷一兩 白附子五錢 沉香 川烏各二錢半 菖蒲三錢半 天麻一兩 琥珀三錢半 王金三錢 全蠍兩 天竺黃六錢 硃砂一兩 明雄 冰片各二錢 牛黃 地龍 麝香 珍珠各一錢 大黃五錢

【制法】共研細面，蜜丸五分重，硃砂衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】週歲小兒服半丸，週歲以上服一丸，糖水送下。

【禁忌】生冷油膩。

五、大同

【功能與主治】小兒急熱驚風，手脚抽搐，呼吸緊張，痰涎壅塞，內熱咳嗽危在至急。

【處方】大蘇 殭蚕 防風 白附子 川芎 桔梗 半夏 白朮 棗仁 細辛 全蠍 茯苓 羌活 伏神 遠志 菖蒲 人參 荆芥穗 胆星 烏蛇(炙)各十兩 蜈蚣五條 甘草 沉香各六兩 川烏三兩 天竺黃一斤十四兩 雄黃二兩 硃砂四兩八錢 冰片 牛黃 麝香各一兩二錢 琥珀八兩

【制法】共為細末，煉蜜為丸，每丸五分，硃砂、金箔為衣，蜡皮。

【劑量及用法】未滿週歲小兒，每丸分三次化服，週歲以上服一粒，用開水化服。

六、禹縣(1)

【功能與主治】急驚風症，牙緊發熱，膽風撮口，心神不寧，驚癇發狂。

【處方】牛黃二錢 天竺黃 硃砂 明雄各二錢 麝香 冰片各五分 天麻 防風各二錢 伏神三錢 殭蚕五錢 胆南星 遠志各二錢

鈎藤一兩 陈皮 甘草各三兩 全蠍三錢

【制法】共合細面，蜜丸，重五分，赤令衣。

【劑量及用法】每服二丸，用鈎藤薄荷湯送下，一歲每服一丸，按歲大小加減。

【禁忌】慢驚風忌用，孕婦忌用。

【備考】有效期二年。

七、禹縣(2)(牛黃丸)

【功能與主治】小兒急驚，眼吊發搐，風熱癇疾，痰迷心竅，受風咳嗽。

【處方】牛黃五分 天竺黃一兩 伏神 明天麻 川羌活 胆南星 川貝母 鈎藤 全蠍 蟬蛻 白附子各九錢 明雄 硃砂各六錢 防風一兩 桔梗一兩二錢 粉甘草五錢

【制法】共為細面，煉蜜為丸，每丸重一錢。

【劑量及用法】三歲服一粒，二歲服半粒，再小酌減，溫開水送下。

【禁忌】慢驚風忌用。

【備考】有效期二年。

八、濟南、承德

【功能與主治】主小兒急熱驚風，發燒抽搐，昏迷痰盛，牙關緊閉。

【處方】天麻 殭蚕 防風 鈎藤 川芎 桔梗 法半夏 白朮 酸棗仁 細辛 全蠍 茯苓 羌活 遠志 菖蒲 人參 荆芥穗 胆南星 烏蛇(酒制去皮骨)以上各十兩 甘草 沉香各六兩 天竺黃一斤十四兩 雄黃二兩 硃砂四兩八錢 冰片 牛黃 麝香各二兩四錢 琥珀十二兩 川烏三兩

【制法】除牛黃、麝香、硃砂、冰片、琥珀另研兌，其他羣藥共為細粉，煉蜜為丸，重五分，硃砂為衣。蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】一切辛熱食物。

九、沈陽(1)(鎮驚丸)

【功能與主治】鎮驚熄風，安神，清熱化痰。主急驚風，膽風撮口，牙關緊閉，抽搐掣顫，反引睪視，不省人事，風痰迷竅，咳嗽喘急，身發高熱，哭笑無常，神智不清等症。

【处方】天麻 防風 雄黃各一錢 殭蚕 薄荷叶 鉤藤 天竺黃 清夏各二錢 硃砂五分 牛黃四分 琥珀二分 制草二錢 蠟尾一錢 麝香 冰片各二分 金箔二十張

【制法】除硃砂、牛黃、琥珀、冰片、麝香另研外，余者共碾極細面，煉蜜為丸，二分五厘重，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，兼感冒風寒者姜水化服，熱者薄荷湯化服，一歲以內小兒服半丸。

【禁忌】慢驚虛寒者禁服。

十、沈陽(2)(鎮驚丸)

【功能與主治】鎮驚安神。主心肝火盛，精神失常，或偶見異物，啼哭不止，抽搐神昏，痰壅氣促。

【处方】胆南星五錢 琥珀三錢 天竺黃五錢 明雄三錢 牛黃一錢五分 珍珠一錢 麝香五分

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，五分重。

【劑量及用法】每服一丸，三歲以下者半丸，白開水送下。

十一、吉林、哈爾濱(鎮驚丸、琥珀鎮驚丸)

【功能與主治】鎮驚，豁痰。主小兒急驚，目觸異物，耳聞異聲，神散氣亂，發為急驚，壯熱煩渴，痰壅氣塞，牙關緊閉，四肢抽搐；並主痰風，痰火壅塞，氣道不暢，痰鳴氣促，抽搐厥逆。

【处方】胆星 竹黃 赤苓各五錢 南星 琥珀 羌活 防風 焦朮 橘紅各三錢 殭蚕四錢 硃砂 雄黃 全蠍 犀角 天麻 鉤藤 姜夏 白芷 川貝 薄荷各二錢 甘草一錢 牛黃二分 珍珠 梅片各二分 麝香一分

【制法】將琥珀、雄黃、珍珠、牛黃、麝香、梅片等均各另細研，余均碾為細面，再陸續調勻，煉蜜為二分五厘重丸，人赤金為衣，用棉紙包，蜡皮封包裝，或貯于瓷罐中。

【劑量及用法】小兒一歲以內每服半丸，二歲至四歲每服一丸，五歲至六歲每服二丸，用鮮姜薄荷湯為引。

【禁忌】大便泄瀉及元氣衰弱者忌服。

十二、呼和浩特(鎮驚丸)

【处方】天竺黃 防風各一兩二

錢 天麻 茯苓 川羌 川貝 白附子 蟬蛻 全蠍 殭蚕 鉤藤各九錢 胆星 桔梗各一兩五錢 明雄六錢 甘草五錢 硃砂六錢 琥珀一兩 人參一兩五錢 冰片 牛黃各三錢 珍珠 麝香各一錢

【制法】煉老蜜為大丸，重五分，滿金衣，蜡皮封固。

附參考古方

【來源】幼科証治准繩。

【功能與主治】主急慢二驚，風痰上壅，手足抽掣，口眼喎斜，煩躁生嘔，精神昏悶，常服寧心鎮驚，疏風順氣。

【处方】人參(去蘆)三錢 粉草(半生，半炙) 茯神(去皮、木、根) 殭蚕(去絲) 枳殼(同前制)各五錢 白附子 南星(制) 白茯苓(去皮) 礪砂 牙硝 硃砂(水飛)各二錢半 全蠍拾尾(去尖毒) 麝香一字。

【制法】以上除牙硝、礪砂、麝香、硃砂四味，用乳鉢細研，余丸味焙為末，入乳鉢內和勻；前四味用糯米粉水煮清糊為丸，梧桐子大，就帶潤以銀硃為衣。

【劑量及用法】每服三丸至五丸或七丸，急驚用溫茶清磨化服，慢驚以生薑、熟附子煎湯研化溫服，薄荷湯化下，或麥門冬湯。

琥珀鎮驚丸

一、西安

【功能與主治】專治小兒驚風，天吊牙關緊閉，昏迷不醒，痰涎壅塞等症。

【处方】胆星八錢 竹黃五錢 雄黃 辰砂各四錢 麝香一錢 琥珀 全虫各二錢 殭蚕三錢 天麻二錢 梅片一錢

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】小兒服半丸，四、五歲服一丸，大人服二丸。

二、撫順

【功能與主治】清涼、鎮寧、化痰。主小兒急癇，小兒目觸異物、耳聞異聲、發為驚悸抽搐，或熱度太高，壯熱神昏，牙關緊閉，二目天吊，角弓反張，痰鳴氣喘，抽搐厥逆等症。

【处方】琥珀三錢 胆星五錢

竹黃 茯神 鉤藤各五錢 地龍 犀角各二錢 制軍三錢 硃砂 麝香各一錢 冰片五分 雄黃三錢 蘇珠二分 薄荷一錢

【制法】共為細面，蜜丸三分五厘，蜡皮封。

【劑量及用法】小兒一歲以下每服半丸，二歲至四歲每服一丸，薄荷姜湯送下。

【禁忌】大便瀉泄，元氣衰弱者禁用。

安神鎮驚丸

一、杭州(百益鎮驚丸)

【功能與主治】此丸扶元安神，益氣養血，開膈祛痰，效驗甚著。治小兒稟賦本虛，感風停食，早進涼藥，傷其脾胃以及病後元虛，將成慢驚，抽搐時作，痰鳴氣促，神倦露睛，危險之症。

【处方】吉林人參五錢 炒棗仁三錢 薄荷二錢 青黛一錢 天竺黃五錢 全當歸三錢 川黃連 煨龍骨 西牛黃各二錢 炒赤芍三錢 飛辰砂三錢 白茯神五錢 木通 炒山梔各二錢 制南星五錢 大生地 笏麥冬各三錢

【制法】共研細粉，煉白蜜為丸，每潮重五分，將方內辰砂為衣，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，用淡姜湯或開水化服。

二、沈陽

【功能與主治】清熱解毒，鎮驚安神。主急驚發熱抽搐，角弓反張，項背強直，口角流涎，神昏譫語，手足厥逆。

【处方】天竺黃 茯神 天南星各五錢 棗仁 麥冬 當歸 生地 赤芍各三錢 薄荷叶 木通 黃連 山梔 硃砂 牛黃 龍骨各二錢 青黛一錢五分 琥珀二錢

【制法】除硃砂、牛黃、青黛、琥珀另研外，余則共碾極細面、煉蜜為丸，二分重，赤金為衣。

【劑量及用法】兩歲以下每服半丸，三歲以上每服一丸，白開水送下。

附參考古方

【來源】幼科証治准繩。

【功能与主治】惊退后調理安心神，养气血和平預防之剂也。

【处方】天竹黄(另研) 人参 茯神 南星(姜制)各五錢 酸棗仁(炒) 麦門冬 当归(酒洗) 生地 黄(酒洗) 赤芍药(炒)各二錢 薄荷 木通 黄连(姜汁炒) 山梔(炒) 辰砂(另研) 川黄(另研) 龙骨(煅)各一錢 青黛(另研)一錢

【制法】上为末，蜜丸，菴豆大。

【剂量及用法】每服三、五丸，量兒大小加減，淡姜湯送下。

保嬰鎮惊丸

天 津

【功能与主治】清热、鎮惊、導滯。主小兒急热惊風，实热目赤，口瘡，便燥，小便赤黄。

【处方】人黄一兩五錢 甘草一兩 硃砂面三錢

【制法】研細和勻，煉蜜为丸，五分重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，週岁小兒酌減，白开水化服。

保安鎮惊丸

濟 南

【功能与主治】主小兒急惊風，五积六聚，面黄肌瘦，膨悶脹飽，水瀉不止。

【处方】薄荷二錢 焦山楂五錢 白豆蔻二錢 車前子二錢 广陈皮一錢五分 檳榔四錢 鈎藤四錢 牛黄二分 澤瀉三錢 草豆蔻二錢 砂仁二錢 甘草一錢 神麴二錢 灯心一錢 胆草一錢 蟬蛻二錢 黄连一錢 天竹黄一錢 殭蚕一錢

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，重一錢，硃砂一錢四分为衣。

【剂量及用法】每服一丸，白开水送下。

抱 龙 丸

廣 州

【功能与主治】小兒惊風。

【处方】胆星四兩 天竹黄一兩 雄黄 辰砂各五錢 麝香一錢

【制法】將上列各药洗淨，切碎，隔水蒸透，晒干研为药末，拌甘草膏

制成小丸。

【剂量及用法】每服三丸，用开水送服。

附参考古方

【来源】重刻太平惠民和剂局方。(小抱龙丸)

【功能与主治】伤風瘟疫，身热昏睡，气粗喘滿，痰实壅嗽，及惊風潮搐，癰毒中暑，並可服之，壯实小兒，宜与服之。

【处方】天竹黄一兩 雄黄(水研)二分 辰砂 麝香各半兩(別研) 天南星(腊月醃黄牛胆中，陰干百日。如無則以牛的去皮、膽，剉炒令熟用)四兩

【制法】上为細末，煮甘草水和丸，如皂角子大。

【剂量及用法】每服一丸，溫水化下，日晡內者，作三服。或用腊雪水煮甘草，和約尤佳。

牛黄抱龙丸

一、北 京

【功能与主治】清热，鎮靜，化痰。主小兒急热惊風，手足拘攣，痰涎壅盛。

【处方】胆南星一兩 伏苓五錢 全蠍一錢五分 殭蚕三錢 天竹黄二錢五分 共为細粉兌入：牛黄四分 琥珀 雄黄各二錢五分 硃砂一錢五分 麝香一分

【制法】上药和勻，煉蜜为丸，重五分，硃砂为衣，蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，日服二次，溫开水送下，小兒三岁以下者，酌情遞減。

【禁忌】忌食辛辣(乳母忌)。

二、天 津

【功能与主治】清热鎮惊，化痰安神。主小兒急热惊風，手足抽動，痰涎壅盛，头疼作燒，嘔吐咳嗽。

【处方】胆星四兩 鈎藤 淡全蠍 天竹黄各二兩 炒殭蚕 羌活 防風各一兩二錢 川貝 甘草 七爪橘紅各八錢 制白附子一兩二錢 以上共为細粉，每細粉一斤一兩二錢兌：硃砂面一兩八錢 琥珀面九錢 雄黄面七錢 牛黄一錢 麝香六分 冰片五錢

【制法】以上研細和勻，煉蜜为

丸，五分重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】一至二岁每次服一丸，週岁以内酌減，日服一次，白开水化服。

三、上 海

【功能与主治】小兒急热惊風，痰壅。

【处方】牛黄五分 赤茯苓五錢 天竹黄三錢五分 麝香二分 胆星一兩 全蠍(漂淡) 硃砂各一錢五分 腰黄一錢五分 殭蚕(炒)三錢 琥珀二錢五分

【制法】各取細粉，胆星化糊为丸，每粒滿重五分，蜡壳固封。

【剂量及用法】遵原方。

四、杭 州

【功能与主治】清热化痰，鎮惊熄風。治小兒急热惊風，身热昏睡，牙关緊閉，痰涎壅盛，咳喘气粗，四肢抽搐，目窜上視，一切危症。

【处方】西牛黄二錢五分 天竹黄 陈胆星各一兩五錢 白殭蚕(約一百二十六只) 青防風各一兩 广木香八錢五分 珍珠粉三錢 枳壳一兩五錢 西琥珀一兩 飞(硃砂七錢 淡全蠍(去头足約八十只)五錢 明腰黄一兩 明天麻一兩五錢 石菖蒲七錢五分 麝香三錢五分 川貝母一兩五錢 广皮一兩 貢沉香一兩二錢

【制法】以上各取淨粉，用鈎藤四兩，煎濃汁，將胆星烱化，量加煉白蜜为丸，每重三分。先用辰砂拌衣，再用金箔为衣。

【剂量及用法】每服一丸，重則二丸，薄荷湯或灯心湯化服。

【禁忌】慢惊風忌服。

五、南 昌

【功能与主治】主中風痰壅，神昏謔語，手足拘攣，瘋癲狂乱，小兒急惊風。

【处方】犀黄二錢 麝香五分 殭蚕五錢 胆南星二兩 琥珀五錢 竹黄七錢 明雄八錢 全蠍五錢 石菖蒲七錢五分 朱砂二錢

【制法】共研細面，老蜜为丸，朱砂、赤金为衣，每丸重八分，蜡壳封固。

【剂量及用法】每日服二次，每服一丸，鈎藤三錢泡湯化服或溫开

水化服。小兒視年齡及病情酌減服(丸內硃砂必須服下)。

【禁忌】孕婦忌服,乳母忌服,忌食肥甘。

【備考】非經醫師處方不可使用。

六、蘭州(1)

【功能與主治】促進消化,鎮驚解熱,化痰解毒,定驚安神。主治頭疼嘔吐,作冷,作燒,咳嗽痰多,遍身生瘡。

【處方】胆星二兩 鉤藤 全蠍 竺黃各一兩 殭蚕 羌活 白附子 防風各六錢 川貝 化桔紅 甘草各四錢 以上共研細面,每斤兌細料如下:

硃砂一兩八錢 琥珀九錢 雄黃七錢 人參五錢 牛黃一錢 麝香六分 冰片五錢

【制法】共為細面,煉蜜為丸,五分重,蜡皮封固。

【劑量及用法】五歲內服一丸,三歲內服半丸,白開水送下。

【禁忌】生冷油膩。

七、蘭州(2)

(牛黃琥珀抱龍丸)

【功能與主治】鎮驚、解熱、化痰、解毒。主治頭痛急躁,高热抽風。

【處方】胆星 大竺黃各五兩五錢 全蠍四兩四錢 雄黃二兩 血琥珀一兩二錢 牛黃一兩六錢 冰片 麝香各一錢

【制法】共為細面,煉蜜為丸,五分重,硃砂衣,赤金貼,蜡皮封固。

【劑量及用法】五歲內服一丸,三歲內服半丸,開水送下。

【禁忌】辛辣。

八、大同(抱龍丸)

【功能與主治】熱痰驚風之症。

【處方】明天麻 天竺黃 胆南星各五錢 硃砂二錢 鉤藤五錢 殭蚕 全蠍各三錢 雄黃二錢 珍珠 牛黃各二分 冰片 麝香 琥珀各三分

【制法】共為細面,煉蜜為三分大丸,赤金為衣。

【劑量及用法】二歲以下,每服半丸。

九、禹縣(金黃抱龍丸)

【功能與主治】驚風搐搦,口噤

咳嗽,膽風驚癇,胎毒痰熱。

【處方】牛黃三錢 天竺黃二兩 明天麻 川芎 胆星 川貝 白附子 全蠍 蟬蛻 殭蚕 鉤藤各一兩八錢 明雄 硃砂各一兩二錢 防風二兩 甘草一兩 桔梗二兩四錢 以上各一兩八錢

【制法】共為細面,煉蜜為丸,每丸重五分。

【劑量及用法】三歲服一丸,薄荷湯送下。

【禁忌】慢驚風忌服。

【備考】有效期二年。

十、濟南

(附:牛黃抱龍散)

【功能與主治】急熱驚風,痰壅抽搐。

【處方】牛黃 琥珀各一錢五分 胆星一兩 大竺黃三錢五分 全蠍一錢五分 赤苓五錢 雄黃五分 麝香二分 硃砂一錢五分 白殭蚕三錢

【制法】各為細末,加蜜為丸,四分重。散劑裝瓶,每瓶淨藥二分。

【劑量及用法】小兒每服半瓶,每日可服二次至三次,成人每服一瓶,每日二次,白開水送下。

【禁忌】忌食葷腥油膩、辛辣等物。

十一、沈陽(1)

【功能與主治】鎮驚清風,化痰疏風。主治嬰兒熱驚煩燥,痰嗽喘息,痘疹發熱,心神不寧,急熱驚風。

【處方】天竺黃 川貝 胆南星各三兩 雄黃九錢 羌活 琥珀 殭蚕 白附子 明天麻 防風 全虫各九錢 梅片 麝香 牛黃各一錢五分

【制法】除雄黃、琥珀、麝香、牛黃、梅片另研外,則共碾極細面,煉蜜為丸,三分五厘重,蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸,按症調引服之,一歲內小兒服半丸。

【備考】另方抱龍丸牛黃為三錢。

十二、沈陽(2)

(驚風抱龍丸)

【功能與主治】鎮驚,疏風,滌痰。主治急驚風,壯熱煩渴,痰壅氣

促,牙关緊閉,四肢抽搐,癇風壯熱無汗,角弓反張,身熱足寒,頸項強直,面赤目赤,頭搖直視,口噤神昏,風痰肺熱,咳嗽痰喘,顏面跳動,口眼歪斜。

【處方】胆南星 伏苓 防風 天南星各一兩 天竺黃 檀香 雄黃各五錢 硃砂 琥珀各四錢五分 鉤藤 橘仁 天麻 殭蚕 清夏 川貝 蘇薄荷叶各一兩 牛黃三錢 台麝二分

【制法】除雄黃、硃砂、琥珀、牛黃、麝香另研外,余則共碾極細面,煉蜜為丸,三分五厘重,金箔為衣,蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸,白開水送下。

十三、撫順

(驚風抱龍丸)

【功能與主治】鎮驚、疏風、化痰。主治急驚風,壯熱神昏,四肢抽搐,角弓反張,二目上吊,小兒熱病初起,熱度太高,發為急癇抽搐,痘疹欲出,熱度驟增多易抽搐,此藥有止抽透表之功。

【處方】胆星 云苓 防風各一兩 天竺黃五錢 硃砂四錢半 清夏 殭蚕 橘紅各一兩 牛黃六分 琥珀四錢半 川貝 薄荷 天麻各一兩 檀香五錢 鉤藤 南星各一兩 雄黃四錢半

【制法】共為細面,蜜丸三分五厘重,蜡皮封。

【劑量及用法】每服一丸,姜湯薄荷為引送下。

【禁忌】生冷油膩。

十四、哈爾濱

(驚風抱龍丸、抱龍丸)

【功能與主治】鎮驚,疏風,滌痰。主治急驚風,癇風,風痰,痰火,感冒,痘疹欲出發熱。

【處方】竺黃二錢 桔紅五錢 前胡四錢 天麻五錢 白附二錢 雄黃一錢 桔梗五錢 胆星 殭蚕各三錢 半夏五錢 硃砂一錢 川芎三錢 全蠍五錢 牛黃一錢 防風 薄荷各五錢 甘草三錢 鉤藤五錢

【制法】除硃砂、牛黃另研外,余均一處碾細,調合一處,煉蜜為丸,每丸重三分五厘,大赤金衣。

【劑量及用法】每服一丸，姜湯薄荷為引。

【禁忌】忌食生冷、油膩。

琥珀抱龍丸

一、南京

【功能與主治】解熱、強心、鎮靜。主小兒發熱煩躁，抽搐神昏，或驚悸不安等症。

【處方】飛琥珀七錢 陳胆星五錢 飛硃砂一兩 沉香五錢 白茯苓 西月石各一兩 天竺黃五錢 日晷 懷山藥各一兩 明雄黃五錢 炒枳殼一兩 麝香五分

【制法】共研細末(細料另研)，和勻，加煉白蜜為丸，每粒潮重八分，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，開水化服。

二、武漢

【功能與主治】小兒急熱發燒，驚風抽搐，昏迷痰盛，牙關緊閉。

【處方】琥珀五錢 天竺黃 檀香 抱木茯神 生甘草 枳實各一兩 硃砂五錢 山藥 胆南星 黨參各一兩 僵蚕五錢 全蠍二錢 薄荷五錢 鉤藤一兩 山楂一兩 麝香 牛黃 冰片各一錢 天麻五錢

【制法】上藥除麝香、冰片外，進行干燥，混合碾細，按淨粉量加煉蜜145—155%成丸，每錢二粒，蜡壳封。

【劑量及用法】三歲內每服半丸至一丸，三歲以上服一丸至二丸，重症酌量加服。

三、福州

【功能與主治】治小兒邪熱，風痰壅盛，煩躁驚悸，關旁不利，驚風厥閉等症。

【處方】琥珀七錢 麝香一錢 腰黃四錢 天虫 貝貝 沉香各五錢 茯苓 枳殼 竺黃 胆星 甘草 辰砂各一兩

【制法】共研細末，蜜丸囊式辰砂為衣。

【劑量及用法】每服一丸，薄荷湯化下，每粒重一錢五分。

四、杭州

【功能與主治】有熄風化痰之功，解熱醒神之效。治小兒急熱驚風，身熱面赤，躁煩不寧，四肢抽搐，目赤口乾，咳嗽氣喘，痰涎壅盛，昏睡不省等症。

【處方】西琥珀一兩 淡全蠍五錢 天竺黃一兩 白附子(制) 青防風 明大蘇 白僵蚕 胆星各五錢 麝香五分 生甘草二錢 川貝母一兩 梅冰片二分

【制法】以上各取淨粉，用鉤藤二兩，煎為濃汁，化胆星和煉白蜜為丸，辰砂為衣，每丸潮重一錢，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸，嬰孩酌量，以薄荷湯或灯心湯化服。

五、南昌

【功能與主治】小兒急驚，四時感冒，溫疫邪熱，致煩躁不寧，痰嗽氣急，及瘡疹欲出發搖等症。

【處方】牛黃二錢 梅片四錢 檀香、洗到) 琥珀各一兩 硃砂(以磁石去鐵，水飛晒干)五兩 枳殼(麵炒微黃) 枳實(麵炒微黃)各一兩 金箔(司硃砂入乳鉢內研極細)一兩片 吉林人參(去蘆)一兩五錢 胆南星一兩 天竺黃 云茯苓各一兩五錢 生甘草(去節)二兩

【制法】除金箔、硃砂不入碾內，檀香不過火外，其餘晒或焙同研細末，再入諸藥和勻煉蜜為丸，每丸一錢，蜡壳封固。

【劑量及用法】每服一丸至二丸，薄荷水或白開水化服。百日內嬰兒每丸分四次服。

【禁忌】忌食鷄、蝦、魚、油膩及辛辣熱食物。

六、沙市

【功能與主治】治小兒發熱，抽搐驚風，驚悸等症。

【處方】琥珀二錢五分 胆南星 僵蚕各五錢 雄黃 硃砂(上包用) 茯神 黨參各三錢 天竺黃五錢 鉤藤一兩 牛黃 麝香各一錢 粉甘草二錢

【制法】研極細末，煉蜜為丸，每丸淨重五分，硃砂為衣，外加金箔為衣，蜡壳封固。

【劑量及用法】量小兒之大小，

強弱，酌服一丸或半丸。

【禁忌】但熱無痰者，忌服。

七、重慶

【功能與主治】祛風化痰，鎮心解熱，和脾胃，益精神。治小兒諸症，四時感冒，風寒瘟疫，邪熱煩躁不寧，咳嗽氣急，痘疹欲出發搖。

【處方】牛黃 冰片各五分 沉香二錢五分 天麻三錢 全蠍一錢五分 川貝母三錢 胆南星一兩 琥珀二錢五分 防風 化橘紅各三錢 石菖蒲 枳殼各二錢 茯苓三錢 硃砂二錢 雄黃二錢五分 麝香二分 天竺黃二錢

【制法】除牛黃、麝香、冰片、硃砂、雄黃另研外，余藥共碾細末，煉蜜和丸，每重一錢安瓿封固。

【劑量及用法】每服一丸至二丸。

八、濟南

【功能與主治】急熱驚風，痰喘氣粗，四肢抽搐，昏迷不醒。

【處方】牛黃 琥珀各二錢五分 雄黃五分 胆星一兩 芥蒂五錢 全蠍 硃砂各一錢五分 白僵蚕三錢 天竺黃三錢五分 麝香二分

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，五分重。

【劑量及用法】每服一丸，白水送下。

【禁忌】辛辣、油膩等食物。

九、沈陽

【功能與主治】清熱、鎮驚、解毒。主小兒急驚風，癰癤抽搐，身熱昏睡，痰涎壅盛，喘咳不寧，四時瘟疫，痘疹未出，先發驚抽及中毒吐瀉等症。

【處方】天竺黃 胆南星 人參 硃砂 明雄 珍珠 琥珀 沉香 檀香 廣木香 麝香各三錢

【制法】除硃砂、明雄、琥珀、珍珠、麝香另研外，余則共碾極細面，煉蜜為丸，三分五厘重，金衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，薄荷湯送下。

【禁忌】慢驚風忌用。

十、承德(抱龍丸)

【功能與主治】急熱驚風，痰壅

抽搐。

【处方】天竺黄 胆星各二斤 琥珀十二兩 牛黄一兩六錢 麝香 冰片各一兩 雄黄二十兩 全蠍 薄荷 鈎藤 殭蚕各四兩

【制法】共軋細面，煉蜜為丸，重五分，金衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，開水送下，小兒三歲以下者，酌情遞減。

十一、呼和浩特

【处方】天竺黄 防風各一兩二錢 天麻 茯苓 川羌 川貝 白附子 蟬蛻 全蠍 殭蚕 鈎藤各九錢 胆星 桔梗各一兩五錢 明雄六錢 甘草五錢 硃砂三錢 琥珀五錢 人參七錢五分 冰片 牛黄各一錢五分 珍珠 麝香各五分

【制法】煉老蜜為大丸，重五分，滿金衣，蜡皮封固。

附參考古方

【來源】萬氏家藏育嬰家秘。

【功能與主治】理小兒諸驚，四時感冒風寒，溫痰邪熱，至煩燥不安，痰嗽氣急及瘡疹欲出發搐，並宜可服。

【处方】真琥珀 天竺黄 檀香（細剉） 人參（去蘆） 白茯苓各一兩半 粉草（去節）二兩 枳殼一兩 枳實（麩炒）一兩 硃砂（飛）五錢 胆星一兩 山藥一斤（黑皮） 金箔百片

【制法】取見成藥末一兩，同在乳鉢內研極細，杵仍和前末，用上為末和勻，取新汲井水為丸，如芡實大，陰干。

【劑量及用法】每服用薄荷湯化下。

珠黃琥珀抱龍丸

濟南

【功能與主治】鎮驚安神。主急熱驚風，痰涎抽搐。

【处方】牛黄 珍珠 甘草各五錢 琥珀一兩 天竺黄 防風各一兩二錢 天麻 茯苓 川羌 川貝 白附子 蟬退 胆星 桔梗各一兩半

【制法】共為細粉，蜜丸重三分，硃砂為衣。

【劑量及用法】週歲小兒每服一丸，日服二次，白開水送下。

金衣抱龍丸

一、北京

【功能與主治】鎮靜化痰。主嬰兒痰盛驚悸，睡眠不安。

【处方】胆南星四兩 天竺黄 甘草各一兩 共為細粉兌入：硃砂 雄黄各五錢 麝香一錢

【制法】上藥和勻，煉蜜為丸，重五分，金箔為半衣。

【劑量及用法】每服半丸，日服二次，鈎藤、薄荷煎湯，或溫開水化服。

二、呼和浩特

【处方】活蠍子十二兩 薄荷八兩 大虫一斤 天麻十二兩 桔梗八兩 白附子一斤 茯苓十二兩 云連八兩 防風 川羌各四兩 法夏 胆星各一斤 白朮十二兩 枳實 鈎藤 天竺黄各八兩 牛黄 麝香 冰片 硃砂 琥珀 沉香

【制法】煉老蜜為丸，重三分，寸果金，白紙包。

急慢驚風丸

一、福州

【功能與主治】治小兒驚風，氣促咳嗽不宣，或牙關緊閉等症。

【处方】茯苓二兩 黑胡連一兩 酒大黃 川黃連各八錢 原麝香三分 牛黄二錢 天麻五錢 全蟬蛻一錢 羚羊角四錢 梅片一錢五分 硃砂五錢 川貝一兩 天竺黄 法夏 葶藶 殭蚕各五錢 灯心灰二錢 金礞石四錢

【制法】上方十八味，共研細末，以竹瀝汁泛丸，赤金為衣。

二、呼和浩特

【处方】竺黄 天虫 天麻各一兩 胆星八錢 鈎藤一兩 伏神二兩 薄荷 防風各一兩 硃砂 麝香 犀角 羚羊 牛黄 冰片各四錢（慢驚風丸加老山人參一兩）

【制法】蜜大丸，重五分，滿金衣，蜡皮封固。

慢驚丸

一、天津

【功能與主治】扶陽逐寒，健脾止泄。主吐泄日久，慢脾驚風，面蒼耳冷，唇舌干燥，天吊鼻撮，額汗肢厥。

【处方】人參（去蘆） 陳皮 炮姜 白朮（麩炒） 防風各二錢 甘草一錢 茯苓（去皮）二錢 山萸肉（酒制） 肉豆蔻（滑石煨）各二錢 肉桂（去粗皮） 生白芍各一錢 制南星 天麻 當歸各二錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，一錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】一至二歲每次服一丸，週歲以內酌減，白開水化服。

【禁忌】生冷，急驚風勿服。

二、蘭州

【功能與主治】除濕散寒，健胃止瀉，主小兒慢驚風，外感風寒，內傷飲食，患病日久，身冷抽搐，鼻翼煽動，面色青黃淡白，唇舌干燥，吐瀉出虛汗，手足厥冷。

【处方】黨參 陳皮 炮姜 白朮 防風各二錢 炙甘草一錢 茯苓三錢 肉桂一錢 山藥二錢 肉蔻一錢 白芍一錢 南星 天麻 當歸各二錢

【制法】共研細末，蜜丸，一錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】生冷。

醒脾丸

沈陽

【功能與主治】小兒吐瀉日久，精神衰弱，脾虛脹滿，慢驚風，慢脾風等症。

【处方】厚朴 白朮 天麻 硫磺各二錢（入豆腐中煮三五沸） 全蠍 防風 官桂 人參各一兩

【制法】共碾極細面，面糊為小丸。

【劑量及用法】每服三分五厘，米湯送下。

【禁忌】忌食油膩厚味及雞、魚等。

附參考古方

【來源】類症普濟本事方。

【功能与主治】治小兒慢驚風，因吐利后虛，因昏睡欲生風癇。

【处方】白朮 厚朴 舶上硫磺 天麻各半兩 全蠍 防風 人參 官桂各一分

【制法】上為末，酒浸蒸餅和丸，如雞豆大。

【劑量及用法】每一丸米飲下。

小兒四六風丸

呼和浩特

【处方】川芎 硃砂各一錢 胆星七分 法夏 豆霜各一錢 明雄二錢 倒扒虫六十个(活) 竹黃一兩

【制法】共為細面，糊為小丸，如桐子大，每瓶裝二十九。

小兒回春散

沈陽

【功能与主治】鎮驚，清熱，解毒。主小兒一切火症。頭痛身熱，自汗口渴，咳嗽驚風，手足抽搐等症。

【处方】犀角 麥冬 生地黃各五錢 玄參 丹參 黃連各三錢 金銀花 連翹各二錢半 鉤藤 丹皮各三錢 竹葉一錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服一分，白開水送下。

小兒百效散

一、沈陽(嬰驚散)

【功能与主治】鎮驚安神，退熱消積。主驚風熱極，昏迷不醒，初生小兒，臍風撮口，實火內熱。

【处方】大黃 神曲各四兩 使君肉 硃砂各二兩 內金 當歸各四兩 二丑二兩 大赤金一百張

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服三厘，白開水送下。

二、承德

【功能与主治】急驚風，痰涎壅盛，嘔吐乳食，積滯停乳。

【处方】大黃八兩 豬牙皂 殭蠶各二兩 當歸 神曲 硃砂各四兩 黃土五錢 全蠍一兩 天麻四兩

【制法】共軋細面，每包三分。

【劑量及用法】初生小兒每付分三次服，一週分二次服，十二歲作一次服。

珍珠定風散

沈陽

【功能与主治】驅風解熱。治小兒高熱，抽搐咳嗽，四時感冒，急驚內熱，呼吸促迫，胸高氣急，神昏不語，驚悸不眠等症。

【处方】珍珠一分 胆南星五分 全蠍一分 龍腦二分 天竺黃 天麻各五分 殭蠶三分 薄荷五分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】小兒每服五厘。

保嬰散

沈陽

【功能与主治】清肺鎮驚，解熱化痰。主小兒驚癇，抽搐痰鳴，發熱喘促，口唇焦裂，喉痛，舌腫，熱毒發斑，疹后熱盛，肺火咳嗽。

【处方】蟬蛻五錢 鉤藤二錢 菖蒲 生梔 天麻 黃連 川貝各五錢 薄荷二錢 橘紅五錢 殭蠶粉草各二錢 胆星四錢 牛黃一分 梅片二分 硃砂五分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】週歲以下，每服一分，週歲以上酌加，最多三分，白開水送下。

【禁忌】五辛發物。

保赤萬應散(保赤散)

一、北京、天津、承德

【功能与主治】化痰，定搐，消積。主小兒停食停乳，日久成積，肚腹脹滿，痰盛抽搐。

【处方】天南星一兩(制) 硃砂六神麴各五錢 巴豆霜一錢(含油量不得超過百分之十)

【制法】共為極細粉，研勻，每包重三厘。

【劑量及用法】滿十二個月至二十四個月者每服一包，白糖滾水調和，空腹溫服。

【禁忌】服藥后勿食生冷油膩及不易消化之食品。感冒，發疹，泄瀉者忌服。

二、上海

【功能与主治】治食積痰多，腹脹。

【处方】硃砂一兩 胆星各一兩 巴豆霜三錢 六神麴一兩五錢

【制法】各取淨粉，共研極細粉。

【劑量及用法】每次一厘至五厘，溫開水送服。

【備考】憑醫師處方購用。

三、南京

【功能与主治】鎮驚，通便。主小兒乳滯，嘔吐，腹脹，發熱起驚，肚腹脹痛，大便酸臭，痰厥便秘。

【处方】同上海。

【制法】巴豆剝去殼，微火炒，榨去油脂，俟油脂完全去淨，取淨量三錢，與余藥共研成極細末為度，分為四厘重一包，用紙袋包裝。

【劑量及用法】每服一包，酌加白糖或蜜，以開水和服。

【禁忌】如小兒痧疹、天花、水瀉等症狀忌服。

四、武漢

【功能与主治】小兒四肢抽搐，喉中痰多，氣急便結。

【处方】同上海。

【制法】取上藥混合碾細，成淨粉80—85%即得。

【劑量及用法】每服三厘半至七厘，用熱湯送下，或略加白糖。

五、杭州(萬應保赤散)

【功能与主治】下痰化積，開胃安神。治小兒癰症疳疾，虫積腹痛，胃呆腹脹，大便酸臭，氣急痰壅，狀類驚風。

【处方】同上海。

【制法】共研細粉。

【劑量及用法】每服二厘，重則加倍，開水送下，或用白糖湯送服。

六、濟南

【功能与主治】主急熱驚風，痰涎壅盛。

【处方】雄黃六錢 犀角一錢 琥珀四錢 牛黃一錢 茯神五錢 金箔五十張 廣木香五錢 遠志二錢 黨參一兩 天竺黃五錢 全蠍四錢 沉香二錢 殭蠶四錢 甘草二錢 礞石五錢 蟬蛻四錢 菖蒲

二錢 硃砂 天麻各五錢 防風四錢 麝香 冰片各三分 胆星二錢

【制法】共為細粉，每包一分。

【劑量及用法】每服一包，重者二包，白開水或鉤藤煎湯送下。

七、蘭州

【功能與主治】化痰鎮靜，清熱消食。主小兒食物不化，吐乳疳積，抽風發燒，多生瘡癤。

【處方】胆星五錢 巴豆霜四錢 生神袖一兩 生大黃八錢 全蠍四錢 硃砂四兩八錢 牛黃一錢

【制法】共為細面，每包一錢重。

【劑量及用法】每服一包，白開水送服。

【禁忌】生冷泄瀉。

八、沈陽

【功能與主治】清熱消積，化痰鎮驚，主飲食不消，嘔吐膨脹，痰涎壅盛，急熱驚風。

【處方】大黃 牙皂各四兩 姜蚕 天麻各二兩 全虫二兩 豆霜二錢 神袖 硃砂各四兩 牛黃一錢 伏龍肝五錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二厘，白開水送下。

九、呼和浩特

【處方】大黃二錢 廣皮二錢 竹黃二錢 蠟尾二錢 寒水石四錢 雄黃(對包) 硃砂(對包) 窩牛乳各二錢

【制法】共為細面，每兩兌豆霜三錢七分五厘，每服五厘。

千金散

一、北京、濟南、承德

【功能與主治】鎮靜、定搐、安神。主小兒驚風抽搐，痰涎壅盛。

【處方】全蠍 殭蚕各二錢 天麻 黃連各四錢 胆南星 甘草各二錢共為細粉兌入，硃砂四錢 牛黃六分 冰片四錢

【制法】上藥和勻。

【劑量及用法】每服二分，日服二次，溫開水送下，小兒三歲以下者，酌情減。

【禁忌】忌辛辣食物。

二、西安

【功能與主治】主治小兒風熱痰喘，喉口天吊，抽搐急驚諸症。

【處方】牛黃 冰片 琥珀各五厘 甘草一分 全蠍(去刺) 殭蚕(直打) 黃連各半分 硃砂 天麻 胆星各二分

【制法】分別搗碎篩過，和勻再研，貯玻璃瓶內，黃蜡封口。

【劑量及用法】每次用五至七厘，薄荷煎湯調服，一日二次或三次，中病即止服。

【禁忌】慢驚者忌服。

三、大同(牛黃千金散)

【功能與主治】解熱祛風。主痰實咳嗽。

【處方】全虫七十個 廣橘紅 木通 犀角 大黃 生草 天虫各一兩 小枳實一兩六錢 赤芍 黃連各一兩 竺黃八錢 牛黃二錢 硃砂二錢六 薄荷二兩 灯心灰如黃豆大十團，金箔四十張。

【制法】共研細面，每包一分。

【劑量及用法】週歲以上者，每次服一包。

四、沈陽(1)

【功能與主治】清熱解毒。主急驚風症，驚癇抽搐，角弓反張，手足拘攣，週身壯熱，煩躁不安，咳嗽喘急，氣促痰壅。

【處方】全蠍(去鉤) 殭蚕各三分 片砂二分 冰片一分 天麻 川黃連各四分 胆南星 甘草各一分 个牛黃六厘

【制法】共研細末。

【劑量及用法】每服五、七厘至一分。

五、沈陽(2)

(牛黃千金散)

【功能與主治】定驚防抽，疎風化痰，主驚風抽搐，熱極癲癇，咳嗽痰壅，風火喘急，驚悸不安，睡臥不寧。

【處方】全蠍 殭蚕各二錢 硃砂四錢 梅片 明天麻各一錢 牛黃六分 川連一錢 粉草 胆星各二錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】週歲小兒每服半

分，週歲以上每服一分至三分，白開水送下。

六、沈陽(3)

(牛黃鎮安散)

【功能與主治】鎮靜退熱。主小兒急驚咳嗽，乳食停滯，身熱抽搐，飲食傷脾，脹滿腹痛，目開口噤，手足癱瘓等症。

【處方】牛黃六厘 黃連 天麻 硃砂各四分 全蠍 殭蚕各三分 胆星 甘草各二分 梅片六厘

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服半分至一分，薄荷湯送下。

七、撫順(牛黃千金散)

【功能與主治】清熱鎮驚，清肺寧嗽。主小兒急驚，動悸不安，四肢抽搐，神迷昏睡，背項強急，牙關緊閉，肺熱喘嗽，咳嗽頻頻，發熱心煩，驚啼不穩等症。

【處方】全蠍 殭蚕各三錢 硃砂六錢 牛黃六分 冰片五分 甘草二錢 胆星四錢 黃連 天麻各四錢

【制法】共為細面。

【劑量及用法】白晝內小兒服半分，週歲小兒服一分，肺熱喘嗽，可與桃花散合服，驚風用鉤藤、薄荷、姜送服。

【禁忌】大使瀉泄，胃腸虛者勿服。

八、吉林(牛黃千金散)

【功能與主治】鎮驚解鬱，清痰止嗽，寧肺解熱，定喘去塞。主小兒急驚，痰火盛蘊，驚癇失神，急驚抽搐，五心煩熱，面赤青赤，痰壅氣塞；小兒黃疸，胎火遺毒，發為黃疸；肺熱喘嗽，痰黃痰盛，阻滯氣逆，咳嗽氣促，痰鳴漉漉。

【處方】牛黃四分八厘 黃連 鉤藤 薄荷 全蠍 殭蚕各二錢五分 硃砂五錢 麝香二分 冰片四分 竹黃 胆星各二錢 天麻四錢 甘草二錢

【制法】共為細面，用絹羅篩至極細，再將牛黃、冰片、麝香、硃砂研細，兌入調勻。

【劑量及用法】初生小兒服二厘，一至一個月服五厘，滿週歲者服一分，二至三歲服二分。如肺熱咳

嗽，可与桃花散合服。小兒黃疸加用茵蔯、灯心、竹叶为引。急惊風加用鈎藤、薄荷、鮮姜为引。份量視小兒大小酌量用之。

九、哈尔滨 (牛黃千金散)

【功能与主治】清熱定驚，寧嗽定喘。主小兒急驚風，癰火內蘊，驚恐傷神，發為急驚，五心煩熱，面目青赤，痰壅氣塞，四肢抽搐，項背反張，目定口呆，人事不省，牙關緊閉；肺熱喘嗽，肺熱痰盛，阻塞氣道，咳嗽氣喘，痰鳴漉漉；初生小兒胎火遺毒，發為黃疸，皮膚橙黃。

【處方】同吉林。

【制法】共碾為極細面，絹羅篩過。瓷瓶嚴封。

【劑量及用法】百日內小兒服半分，週歲內小兒每服一分，週歲至三歲每服二分。肺熱喘嗽可与桃花散合服。小兒黃疸用茵蔯、薄荷、灯心、竹叶为引。急驚風症用鈎藤、薄荷、鮮姜为引。

【禁忌】大便瀉泄，脾虛勿服。

附參考古方

【來源】方世保元。

【功能与主治】小兒痰喘，急慢驚風至死，但能開口灌下，無不活者用。

【處方】全蠍(炙熟) 直殭蚕各三分 朱砂四分 牛黃六厘 水片天麻 黃連各四分 胆星 甘草各二分

【制法】上為末。

【劑量及用法】每服五、七厘，薄荷、金銀、灯心煎湯，不拘時調下。

回生救急散

北京、承德

【功能与主治】疏風化痰，鎮驚定搐。小兒發熱咳嗽，痰涎壅盛，驚悸抽搐。

【處方】天南星 黃芩各四兩 天竺黃 木香 柴胡 白附子 蓮子心 荆芥穗各一兩 天麻 一兩六錢 川烏 一兩 橘皮 三兩 薄荷四兩 葛根 二春柳 滑石各二兩 大黃 玄參各二兩 牛蒡子 一兩 殭蚕一兩 二錢 桔梗三錢 黃連一錢共為細粉兌入；雄黃二兩 麝香

二錢 牛黃一錢 硃砂六兩 冰片六兩五錢

【制法】上藥和勻。

【劑量及用法】每服二分，日服二次，溫開水送下，小兒三歲以下者，酌情遞減。

【禁忌】忌食油膩。

珠黃散

北京

【功能与主治】清熱安神化滯。主小兒熱盛，停食停乳，大便干燥，驚風抽搐。

【處方】大黃二兩 白牽牛二兩共為細粉兌入；牛黃一錢六分 硃砂二兩 麝香四分 珍珠五分

【制法】上藥和勻，玻璃瓶收貯，每瓶重二分。

【劑量及用法】每服一分，溫開水送下；三歲以下者酌情遞減。

全蠍散

吉林

【功能与主治】鎮驚解抽，通便瀉下之作用。主小兒急熱驚風，中風等症。

【處方】硃砂 半夏各七分 天麻 巴豆霜各二錢七分 南星 全蠍 川軍各七分 黃連二錢七分

【制法】共為細面，用絹羅篩至極細。

【劑量及用法】每服一分，用白水送下。

【禁忌】本品為峻劑行下藥，服後大便暢通，用于急驚風特效，如小兒久病，虛弱已極者，切不可用，否則恐有耗元氣，兼傷胃腸之弊。

附參考古方

【來源】小兒藥証直訣。

【功能与主治】治驚風中風，口眼喎斜，語不正，手足偏廢不舉。

【處方】全蠍(炒去毒) 殭蚕(炒) 甘草 赤芍藥 桂枝(不見火) 麻黃(去節) 川芎 黃芩(去心)各二錢 天麻六錢 大天南星(湯浸七次，去皮臍，切焙)三錢

【制法】上為細末。

【劑量及用法】每服二錢，水一盞半，姜七片，煎七分，溫服無時，量大小与之，日三四。

【禁忌】忌羊肉。

桃花散

一、濟南

【功能与主治】主小兒咳嗽，痰喘嘔吐，肺胃火盛等症。

【處方】生石膏一兩 川貝母五錢 硃砂五分

【制法】共研極細粉。

【劑量及用法】週歲以下兒童，每次服五分；週歲以上，每次服一錢。日服二次，蜜水調服。

【禁忌】辛辣，腥膩食物。

二、沈陽

【功能与主治】清肺鎮驚，化痰止嗽。主氣喘痰鳴，煩渴喜飲，驚恐不寧，肺熱咳嗽，痰壅氣促，內熱喘息。

【處方】石膏 川貝母各五錢 硃砂一錢

【制法】共碾細面。

【劑量及用法】週歲小兒每服一分，二、三歲小兒每服二、三分与牛黃千金散合服九妙。開水送下。

【禁忌】辛辣，大便瀉瀉者忌服。

三、撫順

【功能与主治】清肺寧嗽。主肺熱咳嗽，氣喘痰鳴，煩渴思飲，驚恐不寧。

【處方】川貝兩半 法夏一兩 月石一錢半 生石膏一兩 硃砂二錢半

【制法】共為細面。

【劑量及用法】每服錢半。小兒酌量用。

【備考】一方多片砂二錢半。

四、吉林、哈尔滨

【功能与主治】清肺寧嗽。主肺熱咳嗽，氣喘痰鳴，煩渴思飲，驚恐不寧。

【處方】同沈陽。

【制法】先研硃砂，研至極細為度。余均碾為細面，于一處調勻即成。貯于玻璃瓶中。

【劑量及用法】週歲小兒每服一分。二、三歲小兒每服二、三分。与牛黃千金散合用九妙。開水送下。

【禁忌】忌食辛辣；大便瀉泄者

忌服。

【备考】另方加法半夏五錢。

平惊消积散

禹 县

【功能与主治】急惊痰喘，不思飲食，积結發燒，肚腹实痛，大便綠色，伤食吐瀉，积滯痰火。

【处方】川貝母五錢 郁金一兩 明雄 硃砂 胆星 广木香各一錢二分 胡黃連七錢五分 鷄內金五錢 人黃 天竺黃各七錢五分 明天麻 苧參各一錢二分

【制法】共为細面。

【剂量及用法】小兒一岁服一分，白开水送下。

【禁忌】孕妇忌用。

【备考】有效期二年。

惊风七厘散

福 州

【功能与主治】治小兒胎毒，痰熱，气粗喘急，夜啼不宁。

【处方】川連一兩 薄荷四錢 竹黃二錢 川貝二兩 防風四錢 牛黃一錢 人麻五錢 羌活四錢 射香一分 殭蚕一兩 藿香五錢 冰片五分 蟬蛻 雄黃各五錢 胆星 硃砂各八錢 梔子五錢 全蠍二錢

【制法】共为末，蜜丸，棗式金衣，每粒重一錢，蜡封。

脐 风 散

(小兒脐風散)

一、天 津

【功能与主治】預防惊風，消积化食。小兒初生未食乳前，可作开口药，並能預防脐風(脐帶風、四六風、撮口風)，嬰兒服之可治宿食停水，嘔吐泄瀉，腹脹腹痛。

【处方】牙皂 淡全蠍各二兩 大黃四兩 当归六錢 共为細粉兌入：牛黃一錢 硃砂面十一兩 淨巴豆霜一錢

【制法】研細和勻，每包二厘重，裝袋。

【剂量及用法】每次服一包，乳汁化服。

二、大 同

【功能与主治】脐風，惊風等症。

【处方】全蠍 姜蚕 胆星 明天麻 姜半夏 川芎 雄黃各五錢 硃砂 甘草 天竺黃各三錢

【制法】共为細面。

三、济 南

【功能与主治】初生兒未乳之前，服之預防風症，並治脐風及一般風癇，积聚痞塊，痰嗽等症。

【处方】枯礬 硼砂各二錢 硃砂一錢 冰片 麝香各五厘 殭蚕一錢 鈎藤一錢五分

【制法】共为細粉。

【剂量及用法】日服一次至二次，每服五厘至一分，溫开水或乳汁送下，外敷臍帶亦可。

四、哈 尔 濱

【功能与主治】驚熱疳風。主脐風，腹脹臍腫，日夜多啼，四肢拘急，項强反張，口噤噴嚏，吮乳口松。

【处方】全蠍一錢五分 南星 硃砂各一錢 珍珠五厘 巴豆霜二錢五分 半夏一錢 牙皂五分 川軍一錢 台麝一分 雄黃五分 牛黃 梅片各五厘

【制法】共碾为細面，絹罗篩过。玻璃瓶存貯。

【剂量及用法】每服二厘至三厘，姜湯送下。

【禁忌】大便泄瀉者忌服。

五、承 德

【功能与主治】脐風，惊癇，抽搐。

【处方】猪牙皂 大黃各四兩 巴豆霜 硃砂各二錢 当归六錢 全蠍二兩 硃砂十一兩 金箔八十張 牛黃一錢

【制法】共碾細面。

【剂量及用法】小兒初生每包分三次服，一週岁分二次服，白开水送下。

六、呼 和 浩 特

【处方】蛇衣 殭蚕 大黃 辰砂各二兩 麝香一兩

【制法】共为細面，每服二分。

牛黃八宝散

撫 順

【功能与主治】化毒消炎，鎮靜解熱。主小兒急惊，疹后余毒，壯熱煩渴，四肢抽搐，二便閉滯，疹后毒熱，潛伏血中，皮膚生瘡，搔痒流水，疹毒蘊肺，肺炎喘促，甚則帶血，唇焦口糜，疹毒攻咽頭腫痛，扁桃腺腫，嚥下困難。

【处方】黃連 硃砂各一錢 雄黃三分 乳香五分 牛黃一分 川貝五分 江珠一分 大黃 甘草各五分

【制法】共为極細面。

【剂量及用法】周歲小兒每服一分，余者酌兒大小，服用之，白开水送下。

【禁忌】忌食辛辣等物。

至 宝 散

撫 順

【功能与主治】主痘疹斑痧，瘟疫熱毒及小兒惊風抽搐，風熱咳嗽以及流行感冒，熱邪傳里，汗出不解等症。

【处方】大黃五錢 金銀花六錢 連翹五錢 防風 薄荷 知母各四錢 玄參三錢 荆芥穗(炒) 桑黃芩各四錢 桔梗五錢 鈎藤 殭蚕(炒) 蟬蛻 紫草 牛勞子 牙皂 前胡 杏仁 生地各三錢

【制法】共为細粉。

小兒惊風散

一、南 昌

【功能与主治】小兒急惊風，手足搐搦，發熱咬牙，神識不清，痰嗽气喘，受惊恐心神恍惚。

【处方】蟬蛻二錢五分 人竺黃三錢五分 全蠍 胆星 法夏 茯苓各三錢 双鈎藤二錢五分 天麻三錢 飛硃砂二錢 梅片五錢 薄荷二錢五分 牛黃一錢五分 殭蚕二錢五分 金箔二十張 牛甘草二錢 熊胆一錢 麝香 珍珠末各一錢五分 琥珀一錢 白附子一兩 飛雄黃一錢 防風三錢

【制法】共研細末，在乳鉢內研極細面，至無聲為度，盛玻璃瓶內蜡

封固，並標明重量。

【劑量及用法】初生兒每服一厘至二厘，一歲至二歲者服二厘，三歲至五歲者服三至五厘，六歲至十歲者服六厘。用薄荷少許煎湯調服，開水調服亦可，視病情輕重及兒體強弱酌增減，每日服一次至三次。

二、蘭州

【功能與主治】清熱鎮驚。主輕症抽風驚悸。

【處方】全蠍五個 白僵蚕七個 明雄二分 硃砂 粉草各二分

【制法】共為細末。

【劑量及用法】每服五分，乳汁或白糖水化服。

【禁忌】忌食生冷、辛辣。

三、沈陽(牛黃驚風散)

【功能與主治】清熱却風，鎮驚止嗽。主發熱咳嗽，急驚抽搐，角弓反張，喘促氣急，妊娠驚癇，撮口臍風，牙關緊閉，不省人事，一切感冒。

【處方】天麻一錢 胆星 白附子各五分 防風一錢 珍珠 殭蚕 鈎藤 雄黃 薄荷 天竹黃 半夏 硃砂各五分 牛黃四分 甘草二錢 麝香二分 金箔二十張 琥珀二分 全蠍錢半 冰片二分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】小兒一歲內每服五厘，二歲服一分，感冒寒則姜湯服，高熱時，薄荷湯服。

【禁忌】慢驚、虛寒者禁用。

救 驚 散

一、沈陽(1)

【功能與主治】鎮驚清熱，安神定志。主急驚痰火，風感食傷，發熱頭痛，四肢抽搐，手足厥逆，兩目直視，咳嗽腹脹，氣促痰壅，驚悸神昏，嘔吐泄瀉。

【處方】洋參二錢 鈎藤四錢 殭蚕五錢 全蠍三錢 硃砂三錢 天麻錢半 胆星三錢 黃連五錢 粉草二錢 人黃六錢 榔片三分 牛黃四分 冰片三分 牽牛六錢 琥珀三錢

【制法】共碾極細面，磁瓶收貯，勿令洩氣。

【劑量及用法】週歲兒童每服一分，大者隨症加減，白開水送下。

【禁忌】辣腥生冷。

二、沈陽(2)(牛黃救驚散)

【功能與主治】鎮驚退熱，主嬰兒咳嗽乳，喘急痰壅，神昏天吊，身熱使閉，口噴流涎，目睛直視，驚悸不眠。

【處方】薄荷叶一錢 防風 甘草各三錢 蠍尾二錢 鈎藤四錢 琥珀三錢 硃砂 雄黃 明天麻各二錢 法夏四錢 青黛二錢 牛黃五分 胆星四錢 連珠六分 金箔十張 殭蚕 寸冬各三錢 麝香三分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服一分，白開水送下，體質較弱嬰兒減半，月內嬰兒均作四次，隨症酌引，收效尤捷。

【禁忌】辣腥食物。

三、撫順

【功能與主治】鎮驚，緩瀉。主小兒急驚風，食熱內蘊，發為急驚，肚熱神昏，睡眠驚啼，吐乳嘔吐，不思食物，大便秘結，小便不利。

【處方】一金散一兩 千金散一錢半 硃砂五分

【制法】共兌研細面。

【劑量及用法】小兒一週歲者服一分，余者酌兒大小用之，白開水送下。

【禁忌】胃腸虛弱，大便泄者忌服之。

鎮 驚 散

一、沈陽(1)

【功能與主治】退熱安神，除痰鎮驚。主驚厥抽搐，角弓反張，流行感冒，咳嗽喘急，痰涎壅盛，驚恐夜啼，癲癇昏迷，手足痙攣。

【處方】天麻 殭蚕各一兩 冰片一錢 桔梗一兩 麝香一錢 半夏一兩 牛黃三錢 橘紅 茯苓 白朮 鈎藤 全蠍各一兩 天竹黃 甘草 硃砂 琥珀各五錢 山藥二兩 胆星五錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】初生小兒每服二厘，二、三歲服一分，五、六歲服一分，薄荷、鈎藤湯水送下。

二、沈陽(2)

【功能與主治】輕宣解表，清熱化痰，鎮驚安神，理肺清熱。主小兒驚風，痰火壅閉，手足痙攣，四肢抽搐，風火外感，咳嗽喘促，身熱惡寒，心煩躁擾，角弓反張，天吊直視，口吐涎沫，神昏不明，時止時搐，夜睡不穩，常發驚恐。

【處方】霜桑叶 甘草 橘紅 桔梗 貝母 杏仁各三錢 硃砂一錢五分 琥珀二錢

【制法】共為極細面，加上硃砂，琥珀細面，研極細，貯磁瓶內。

【劑量及用法】周歲以內者，服一分至二分，周歲以上者，每服三分至五分，白開水送下。

三、沈陽(3)

【功能與主治】清熱止嗽，宣肺化痰。主肺熱咳嗽，呼吸短促，胸高氣急，痰涎壅閉，手足抽搐，角弓反張，急驚內熱，發熱惡風，煩躁身痛，嘔逆咳涎，肺熱蒸燒，使結澀赤。

【處方】甘草 犀角(研面) 滑石各三錢 雄黃二錢 珍珠五分 麝香三分 貝母三錢 冰片八分 大黃三錢 牛黃一錢 黃連 松花粉各三錢 猴棗三分 郁金一錢

【制法】共碾極細面，研后兌冰片，麝香，牛黃，珍珠等藥。

【劑量及用法】三歲以下每服五厘至五分，三歲以上至八歲，每服五分至一錢，白開水送下。

硃珀鎮驚散

濟 南

【功能與主治】小兒急驚痰厥，口眼歪斜，痰喘咳嗽，口舌生瘡，五心潮熱等症。

【處方】殭蚕三錢 大麻 全蠍 木通 犀角 薄荷 人黃 蟬蛻 柴胡 粉草 枳實 檳榔 赤芍 川連 天竹黃 菖蒲 川貝 羌活 鈎藤 橘紅 前胡各一錢 胆星 生地各一錢五分 丸心 梅片各五分 辰砂五錢 麝香 牛黃各一分 琥珀二錢

【制法】共為細面，瓶裝，重量三分。

【劑量及用法】每服一瓶，未滿，周歲者減半。

保嬰鎮驚散

濟 南

【功能与主治】急熱驚風，痰涎壅盛。

【处方】殭蠶五錢 硃砂四錢 胆星二錢 天竺黃三錢 川貝母二錢 雄黃一錢五分 金箔十張 法夏 琥珀各二錢 甘草一錢五分

【制法】共為細粉。

【劑量及用法】白開水送下，週歲以下，每服一分，週歲以上酌增。

【禁忌】脾虛洩肚忌服。

鎮 驚 膏

天 津

【功能与主治】散風、解熱、鎮驚。主小兒急熱驚風，咳嗽、嘔吐痰涎，昏迷不醒，面紅身熱，驚癇抽動，煩躁口渴，大小便秘。

【处方】大黃一兩 鈎藤 薄荷各二兩 淡全蠍三兩 天竺黃 甘草各五兩 胆星 七爪橘紅各二兩

【制法】以上藥熬汁去渣過濾，將汁煉至滴毛頭紙上，背面不陰為標準，每消膏一斤兌蜜二斤收膏，每膏一斤兌硃砂面一兩三錢攪勻，一錢重裝瓶。

【劑量及用法】一歲以內每次服半瓶，二歲以上者每次服一瓶，白開水沖服。

保 赤 丹

沈 陽

【功能与主治】清瘟解熱，健胃消食。主四時感冒，頭痛發熱，傷食傷水，泄瀉痢疾，食積痞塊，各種疳疾，嘔吐腹滿，食滯咳嗽，腹痛脹悶，肌肉消瘦。

【处方】柴胡一兩 粉葛一兩 板榔二兩 紫朴一兩 姜夏三錢 廣皮五錢 姜連三錢 杭芍一兩 木香三錢 車前一兩 薏米三兩 桔梗五錢 黃芩一錢 蒼朮五錢 赤苓二錢 神曲 麦芽 焦楂各五錢 益元散兩半

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸。二錢重。

【劑量及用法】每服一丸。姜水送下。

保嬰奪命丹

大 同

【功能与主治】主感受時疫，痰涎壅盛，咳嗽嘔吐，手足抽搐，胸膈膨脹，憎寒壯熱，天吊急驚風。

【处方】姜半夏 天南星各一錢半 全蠍一錢 明雄黃 天竺黃各五分 硃砂一錢 牛黃二分 川黃連一錢 殭蠶一錢半 煨礞石一錢 明天麻一錢半 琥珀 毛橘紅 鈎藤 錦紋大黃各一錢 麝香五厘 冰片二分 紫赤金十張 川貝母一錢半

【制法】每丸重一分，綿紙包，蜡固封。

【劑量及用法】一歲以內嬰兒分二次服，一歲以外一次服。

保幼培元丹

濟 南

【功能与主治】中寒中暑，腹痛，嘔吐，泄瀉，頭痛身燒。

【处方】蜜香一兩六錢 赤苓六錢 清夏四錢 柴朴八錢 蘇叶八錢 木瓜六錢 白芷四錢 廣皮八錢 檀香六錢 扁豆六錢 二仙二兩 木通四錢 澤瀉六錢 竹茹六錢 山藥九錢 砂仁四錢 白朮八錢(土炒) 甘草四錢 木香四錢 川連四錢

【制法】共為細末，蜜丸重一錢，硃衣。每丸一斤用硃砂三錢為衣。蜡皮。

【劑量及用法】每次服一丸，姜湯送下，白開水亦可。

小 兒 金 丹

一、天 津

【功能与主治】疏風化痰，清熱鎮驚，止嗽。主傷風感冒，發燒頭痛，鼻流清涕，咳嗽氣促，咽膈腫痛，驚悸心煩，疹出遲緩。

【处方】川貝 橘紅各四錢 羌活 生地 木通 大青叶 芥穗 桔梗 前胡 山川柳 赤芍 制南星 元參(去蘆)各三錢 薄荷二錢 鈎藤 制半夏 枳殼(麸炒)各三錢 葛根 大麻 防風 甘草 炒牛蒡子各二錢 共為細粉，每細粉六兩

二錢兌：羚羊粉 犀角粉各五分 硃砂面八錢 冰片一錢

【制法】以上研細和勻，煉蜜為丸，五分重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】週歲以上每次服一丸，週歲以下酌減，白開水化服。

二、蘭 州

【功能与主治】散風，發汗，化痰，消炎，止嗽，鎮驚安神。主傷風咳嗽，氣喘大痛，咽喉紅腫，感冒發燒，嘔吐，鼻流清涕，淋巴腺炎，急驚風等症。

【处方】川貝 桔紅各四錢 羌活 生地 木通 青叶 芥穗 桔梗 前胡 川柳 赤芍 南星 元參各三錢 薄荷二錢 鈎藤 半夏 枳殼各三錢 牛蒡子 葛根 天麻 防風 甘草各二錢 羚羊角 犀角各五分 硃砂八錢 冰片一錢

【制法】共研細面，蜜丸，五分重，蜡皮封固。

【劑量及用法】週歲以內服半丸，週歲以上服一丸，白開水送下。

【禁忌】忌食辛辣、油膩。

保幼再生丹

北 京

【功能与主治】解熱化痰，鎮驚安神。主小兒感冒，咳嗽痰盛，憎寒壯熱，驚風抽搐。

【处方】防風 天麻 天竺黃 貝母 桑叶各一兩一錢 胆南星 薄荷 茯苓 鈎藤各一兩 橘紅 甘草 桔梗各八錢 殭蠶 遠志各四錢 羌活六錢 活蠍二十個 共為細粉兌入：琥珀八錢 犀角 羚羊角 牛黃 麝香各一錢 冰片四錢 珍珠五分

【制法】上藥和勻，煉蜜為丸，重五分，硃砂為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下，小兒二歲以下者酌情遞減。

保幼化風丹

一、天 津

【功能与主治】清熱散風，止嗽化痰。主散風止痛，解癰祛痰，感冒發熱，頭痛身痛，四肢抽動，痰涎壅盛。

【处方】胆星二兩 羌活 独活 天麻 芥穗 防風 川芎 淡全蠍 甘草各一兩 薄荷二兩 人參(去蘆)一兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，一錢重，每斤丸藥用硃砂面二錢上，衣，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】一至二歲每次服一丸，週歲以內酌減，白開水化服。

二、蘭州

【功能與主治】解熱，散風，止嗽，化痰。主小兒受風咳嗽，嘔吐，消化不良，小便赤黃，急熱驚風等症。

【处方】胆星二錢 羌活 独活 天麻各一錢 鉤藤五錢 桔絡 半夏各二錢 全蠍 黨參各一錢 黃芩 甘草各二錢

【制法】共為細面，煉蜜為丸，一錢重，硃砂衣。

【劑量及用法】小兒五歲內服一丸，三歲內服半丸，白開水送下。

【禁忌】忌食生冷。

三、禹縣

【功能與主治】小兒驚風，痰涎壅盛，吐乳吐痰，咳嗽痰喘。

【处方】胆星 黨參 明天麻 独活 全蠍 川芎 細辛 羌活 防風 荆芥 黃芩 生甘草各五錢

【制法】共為細末，煉蜜為丸，硃砂為衣，每丸重五分。

【劑量及用法】三歲服一丸，按歲大小加減，薄荷灯心湯送下。

【禁忌】慢驚風忌用。

【備考】有效期二年。

四、呼和浩特

【处方】胆星 天麻 独活 川芎 羌活 黃芩 半夏 芥穗 全蠍 細辛 川芎 甘草各一兩 人參

【制法】蜜大丸，重一錢，硃衣。

散風丹

沈陽

【功能與主治】疏風解熱。主小兒驚癇抽搐，身熱喘急，四時感冒，煩躁咳嗽。

【处方】胆星二錢 独活 川芎 細辛 芥穗 人參 羌活 防風各一錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，一分重。

【劑量及用法】每服一丸，薄荷紫蘇湯送下。

【禁忌】忌食魚蟹驢肉。

附參考古方

【來源】幼科證治准繩。

【功能與主治】治小兒風癇。

【处方】牛胆南星二錢 羌活 独活 防風 天麻 人參 川芎 荆芥穗 細辛各一錢

【制法】上為末，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二丸，用薄荷紫蘇湯，不拘時送下。

小兒回春丹

一、北京、承德

(五粒回春丹)

【功能與主治】清熱透表，化毒豁痰。主小兒毒熱過盛，隱疹不出，發熱咳嗽，煩躁口渴。

【处方】橘紅 胆南星 防風 竹葉 桑葉 金銀花 連翹 羌活 各二兩五錢 茯苓 殭蠶 甘草各二兩 麻黃 薄荷 蟬蛻 赤芍 川貝 牛蒡子各二兩五錢 三春柳 杏仁各一兩五錢 共為細粉兌入；牛黃 冰片各四錢 麝香七錢二分

【制法】上藥和勻，用糯米六兩熬水泛小丸，硃砂為衣，每粒重約二分，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服五粒，日服二次，鮮蘆根煎水送下，溫開水亦可，小兒二歲以下者酌情遞減。

【禁忌】忌風寒，及一切葷食麵食。

二、天津

【功能與主治】清解透表，化痰祛熱。主感冒發燒鼻流清涕，時疫瘟疫，隱疹不出，發熱咳嗽，目赤流淚，煩躁口渴。

【处方】黃連 赤芍 浙貝 生地 葛根 黃芩 豆豉 大青葉 芥穗 木通各二兩 前胡 桔梗 元參(去蘆) 花粉各二兩 山川柳 柴胡各一兩五錢 炒大力子三兩 共為細粉兌入；犀角粉 羚羊粉各一兩

【制法】以上研細和勻，煉蜜為

丸，每粒一分重，每付五粒。每斤丸藥用硃砂面四錢上，衣，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】一歲服一粒，二歲服二粒至三粒，三歲以上服五粒，蘆根水化服，溫開水亦可，每日服二次。

【禁忌】避風，發疹有便瀉者忌用。

三、上海

【功能與主治】小兒急熱，驚風痰壅。

【处方】牛黃一錢 天麻二錢 麝香一錢五分 蛇含石八錢 冰片一錢五分 防風 腰黃各三錢 胆星二兩 硃砂三錢 天竺黃一兩 全蠍(酒洗漂淡) 殭蠶(炒) 羌活各二錢 川貝母一兩 白附子(制)三錢

【制法】共研細粉和勻，用甘草一兩，鉤藤二兩，煎湯泛丸，每粒潮重一分，每盒五粒，蜡壳固封。

【劑量及用法】每服二粒至三粒，溫開水化服。憑醫門處方購用。

四、南京

【功能與主治】清熱鎮驚。主小兒急驚，抽搐昏迷，閉竅等症。

【处方】同上海。

【制法】上藥生晒，各研細末，后加細料，乳細和勻，另用甘草一兩，雙勾藤二兩煎濃湯加煉蜜為丸，每粒五厘，每五丸裝一蜡壳封固。

【劑量及用法】一、二歲小兒，每服二粒，三、四歲每服三粒，五歲以上者，每服五粒，開水化服。

五、武漢

(小兒回春丸)

【功能與主治】驚風發搐，感冒發熱，鼻流涕涕斑疹煩躁，痰喘氣急，大便不通，小便溺血。

【处方】川貝母一兩 白附子(制) 雄黃各一錢 天竺黃一兩 防風二錢 冰片一錢半 胆南星二兩 制殭蠶一錢 西牛黃一錢 羌活二錢 全蠍(酒洗漂淡)二錢 麝香一錢半 天麻三錢 蛇含石(煨)八錢 硃砂三錢

【制法】取上藥除麝香、冰片外，進行干燥，混合碾細，以甘草一兩、鉤藤二兩煎取濃汁，迭成小丸(一法照淨粉量加淀粉50%，造成小丸)。

每錢二十粒，蜡壳封固。

【劑量及用法】一至二歲，每服一分，三至四歲，每服一分半，十歲以上者，每服二分。

六、福州 (万病回春丹、小兒 万病回春丹)

【功能与主治】治小兒急驚慢驚，發搐瘰癧，內外天吊，傷寒邪熱，斑疹，煩躁，痰喘氣急，五癰痰厥，大便不通，小便溺血等症。

【處方】川貝一兩 制白附 雄黃各三錢 天竹黃一兩 防風三錢 冰片一錢半 胆星二兩 殭蠶三錢(制) 牛黃一錢 羌活 全蠍各三錢(酒洗) 射香一錢半 天麻三錢 蛇含石八錢(煨) 硃砂三錢

【制法】共研細末，另用甘草一兩 鈎藤二兩 煎湯泛丸，金衣，如花椒大，外蜡壳封，每蜡壳內封五粒。

七、杭州

【功能与主治】治小兒急熱驚風，抽搐口噤，傷寒熱盛，斑疹煩躁，風熱痰壅，咳嗽氣喘，諸癰痰厥，吐乳夜啼，大便不通，小便赤澀等症。凡家有小兒者，宜常備此藥，以備不時之需也。

【處方】珍珠粉二錢五分 青防風一兩 梅冰片二錢 川羌活八錢 西牛黃二錢五分 制白附子八錢 當門子二錢五分 蛇含石(煨)八錢 飛腰黃六錢 飛辰砂三錢 杜胆星 天竹黃各一兩五錢 川貝母二兩 白殭蠶一兩五錢 酒全蠍八錢

【制法】上藥各研細末，用鈎藤一斤煎湯，酌加煉白蜜為丸，每粒潮重一分，每顆內裝三粒，蜡壳封固。

【劑量及用法】凡一、二歲小兒，每服一至二粒，三、四歲每服三粒，兒大者酌加。用鈎藤薄荷湯，或開水化服，或乳汁化服，兒小者將此丹化开，搽乳头上，令兒吮之亦可。

八、南昌 (小兒万病回春丹)

【功能与主治】風痰抽搐，感寒發熱，咳嗽氣促，斑疹煩躁。

【處方】全蠍(酒洗) 飛硃砂各三錢 蛇含石(煨)八錢 川貝 天竹黃各一兩 胆南星二兩 牛黃一

錢 白附子 天麻 殭蠶(制) 雄黃 防風 羌活各三錢 麝香一錢五分

【制法】共研細面，另用甘草一兩，雙鈎藤二兩，煎湯泛丸，每粒二厘重。每五粒用蜡壳封固。

【劑量及用法】每日服一至三次，一至二歲服二粒，三至四歲服三粒，十歲以上每服五粒，根據病情可酌情增減。

用鈎藤、薄荷煎湯化服，或白开水乳化服均可。

嬰兒可將丸溶化搽乳头上令吮之。

【禁忌】忌食滯腥及辛熱食物。

九、沙市

【功能与主治】治小兒外感風熱，痰涎壅盛，瘰癧抽搐，便秘溺赤等症。

【處方】川貝母一兩 制白附子 明雄各三錢 天竺黃一兩 防風三錢 山梅片一錢五分 胆南星二兩 殭蠶三錢 牛黃一錢 羌活 全蠍(酒洗)各三錢 麝香一錢五分 明大蠍三錢 蛇含石(煨)八錢 硃砂三錢

【制法】上藥十五味，研細末，用甘草一兩、鈎藤二兩煎湯去渣打糊為丸，如梧桐子大，金箔為衣，外用蜡壳封固，每蜡壳內裝五粒。

【劑量及用法】一歲以內小兒每次服一粒，二歲每服二粒，三或四歲每服三粒，十歲以上每服五粒，溫開水化服。

【禁忌】體虛無痰熱，外感者忌服。

十、重慶 (小兒万病回春丹)

【功能与主治】治小兒一切病症。

【處方】川貝母一兩 制白附 雄黃各三錢 天竹黃一兩 防風 羌活各三錢 冰片一錢五分 胆南星二兩 殭蠶三錢 西牛黃一錢 全蠍三錢 麝香一錢五分 天麻三錢 蛇含石八錢 硃砂三錢

【制法】除冰片、麝香、牛黃另研外，硃砂穿衣，余藥共碾細末，用甘草一兩、鈎藤一兩煎濃汁，煉蜜為丸，如梧桐子大，每三五粒重三分，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一粒至三五粒。

【備考】蛇含石真偽難解未放入。

十一、西安(回春丹)

【功能与主治】退熱解毒，鎮靜鎮驚。主驚風，瘰癧抽搐，角弓反張，發熱咳嗽，氣喘痰鳴，斜視，嘔吐不安等症狀。

【處方】犀角 天麻 羌活 葛根各四錢 琥珀五錢 羚羊四錢 殭蠶四錢 云苓六錢 全虫一錢 元參六錢 薄荷 牛黃各五錢 元胡四錢 冰片五分 防風 甘草各四錢 半夏 硃砂各六錢 竺黃四錢 珍珠四分 花粉六錢 麝香四分 川連三錢

【制法】個別共為細末，煉蜜為丸，如梧桐子大，赤金為衣，裝蜡皮內(五丸裝一個)

【劑量及用法】按醫師處方服用。

【禁忌】體溫低者勿用。

十二、蘭州

【功能与主治】解熱止咳，化痰發汗，散風定驚止癇。主凡屬小兒感冒，頭疼面紅發燒，咽喉腫疼，咳嗽氣喘，如小兒急驚風，抽搐睡眠不安等症，皆可服用。

【處方】鈎藤 胆星各八兩 蛇含石(即干饅饀)三兩 硃砂 防風 羌活 殭蠶 全蠍 天麻 白附子 雄黃各一兩二錢 冰片 麝香 牛黃各三錢 川貝 天竹黃 甘草各四兩

【制法】共研細面，蜜丸，如芡實大，硃砂衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】一歲服一粒，兩歲服兩粒至三粒，三歲以上服五粒，用白开水化服，每日三次。

【禁忌】忌食生冷油膩之物。

十三、大同(五粒回春丹)

【功能与主治】小兒驚風，鎮驚除痰，表疹清熱止咳。

【處方】毛橘紅 胆星 防風 竹叶 蘆根各二兩五 茯苓 殭蠶 廣皮 甘草各二兩 麻黃 薄荷 青礞石 鈎藤 牙皂各二兩五 全蠍十兩 琥珀 天麻各三兩 硃砂一兩六錢 珍珠一錢六 竺黃一錢

牛黃四分 冰片四錢 麝香七分二厘 蜈蚣九條 羌活二兩五分

【制法】共軋細末，江米糊丸(濕者20粒，重一錢)，每蜡皮內裝五粒。

【劑量及用法】每丸內裝五粒，未滿一個月者二粒，未滿五個月者一粒，週歲以上者五粒，日服二次，將藥搗升化水服之。

十四、禹 县

【功能与主治】急惊發搐，傷寒邪熱，斑疹煩躁，五癰痰厥。

【處方】川貝母一兩 白附子 雄黃各一錢 天竹黃一兩 冰片一錢五分 青防風三錢 胆星二兩 殭蠶二錢 牛黃一錢 羌活 全蠍各一錢 麝香一錢五分 天麻三錢 黃芩八錢 硃砂三錢

【制法】共為細面，加甘草一兩，鈎藤二兩煎湯，和蜜丸，如花椒子大，外蜡壳封固。

【劑量及用法】一歲至二歲服二丸，三歲至四歲三丸，至十歲者服五丸。

【禁忌】體弱，慢驚忌用。

【備考】有效期二年。

十五、濟 南

(小兒萬病回春丹)

【功能与主治】感冒發熱，鼻流清涕，咳嗽作嘔，隱疹未出。

【處方】川貝母一兩 白附子(制) 雄黃各一錢 天竹黃一兩 青防風三錢 胆星二兩 制殭蠶 羌活 全蠍(酒洗) 天麻各一錢 蛇含石八錢(煅) 冰片一錢五分 牛黃一錢 麝香一錢五分 硃砂三錢

【制法】上藥十五味，共為細面，另用甘草一兩 鈎藤二兩煎濃湯，和煉蜜為丸，如花椒大，外用蜡壳封固，每壳內盛五粒。

【劑量及用法】一二歲每服二粒，三四歲每服三粒，十歲者每服五粒，白水送下，或以此丹化開擦乳頭上，令兒吮之亦可。

【禁忌】酸辣厚膩食品。慢脾風者忌服。

十六、撫 順(1)

【功能与主治】清涼、解熱、鎮靜。主小兒感冒，發熱咳嗽，熱度增高，急驚抽搐，麻疹初期，發熱流涕，

隱疹潛伏，驚恐不穩，煩熱不寧，咳吐喘急等症。

【處方】牛黃六分 麝香一錢 犀角一錢 薄荷錢半 殭蠶 白附子各錢半 柴胡一錢 硃砂 天麻 牛蒡子各一錢 甘草 黃芩各二錢 鈎藤三錢 胆星五錢 法夏四錢 蘇珠五分 川貝三錢 雄黃四錢 双花一錢 全蠍五錢 琥珀 云苓各一錢 橘紅一錢

【制法】共為細面，蜜丸，三分五厘重，蜡皮封。

【劑量及用法】週歲以上小兒每服一丸，余者酌兒大小用之，白水送下。

【禁忌】辛辣等物。

十七、撫順(2)(回春丹)

【功能与主治】清涼解熱，消炎。主感冒傷寒初期，頭疼身痛，口渴煩熱，咳嗽痰稠，斑疹傷寒，猩紅熱，麻疹初期皮內潛伏或紫或紅，或收沒太速，火毒內陷合併肺炎，氣息喘急等症。小兒急癇，卒然抽搐，昏迷痰癢，角弓反張，口角流涎，牙關緊閉，痰鳴氣促，一切熱病大痛，齒痛，口糜齒腐，吐血，衄血，凡屬火病皆治之。

【處方】牛蒡子三錢 全蠍一錢 鈎藤三錢 山藥五錢 白附子 云苓各錢半 大黃一錢 天麻 法夏各二錢 黃芩 青葉各一錢 胆星二錢 石菖蒲錢半 殭蠶二錢 川貝 天竹黃各二錢 赤芍錢半 黃連一錢 白朮錢半 紅人參二錢 元參四錢 桔梗錢半 犀角三錢 薄荷 琥珀各二錢 麝香二分 蘇珠一分 雄黃二錢 冰片一錢 橘紅 花粉各二錢 牛黃二分

【制法】共為細面，蜜丸，大丸一錢四分，小丸七分。

【劑量及用法】大人每服一丸，小兒每服一小丸，感冒初發水送下。

【禁忌】孕婦勿服；形寒肢冷，久瀉者忌服。

十八、呼 和 浩 特

(五粒萬病回春丹)

【處方】芥穗 葛根 黃連 羌活各四錢 豆豉六錢 前胡 元參各四錢 桔梗 牛蒡各六錢 山柳柴胡各四錢 升麻二錢 天麻 殭蠶各四錢 全蠍 川貝 胆星 薄

荷各一錢 廣橘紅六錢 紫草 人中黃 硃砂各四錢 犀角二錢 羚羊角 人參各四錢 琥珀二錢 牛黃八分 珍珠五分 麝香二分 冰片二錢

【制法】共為細面，江米汁為丸，重六厘，硃衣滿金衣。

導 赤 丹

一、北京、承德

【功能与主治】清熱利尿。主小兒口舌生瘡，煩躁尿赤。

【處方】黃連 生地 大黃 木通各十五兩 黃芩 甘草 滑石 連翹 梔子 玄參各二十兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸重一錢。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。小兒二歲以下者酌情遞減。

二、天 津

【功能与主治】清熱，利二便。主腸胃積熱，口舌生瘡，咽喉腫痛，牙根出血，腮頰腫痛，暴發火眼，大便不利，小便赤黃。

【處方】大黃三兩 生梔子二兩 四錢 生地一兩六錢 木通 茯苓(去皮) 滑石 甘草各八錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸一錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，週歲以內酌減，白開水化服。

三、蘭 州

【功能与主治】瀉內熱，清腸胃，利大小便。主腸胃積熱，口舌生瘡，咽喉腫痛，牙根出血，腮頰腫痛，暴發火眼，大便不通，小便赤黃。

【處方】大黃二兩 梔子二兩 四錢 生地一兩六錢 木通 赤芍 滑石各八錢

【制法】共研細末，蜜丸一錢重。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

【禁忌】忌食辛辣。

四、大 同

【功能与主治】小兒胃熱，口舌生瘡，大便秘結，清熱解毒。

【處方】黃連 赤芍 大黃 木通各十五兩 黃芩 花粉 滑石 連翹 梔子 元參各三兩

【制法】共為細末，煉蜜為丸一錢重。

【劑量及用法】未滿週歲小兒每丸分三次化服，週歲以上者分二次，二歲以上者每次一粒，日服二次，開水化服。

五、濟南

【功能與主治】清熱利尿。

【處方】生地 滑石各二兩 木通 枳殼 梔子 黃柏各二兩 赤苓 一兩五錢 甘草 一兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸，重一錢。

【劑量及用法】白開水送下。

【禁忌】忌食辛辣、油膩、腥羶等物。

清熱保幼丹

濟南

【功能與主治】五臟實火，三焦急熱，面赤發熱，口舌生瘡。

【處方】炙軍五錢 薄荷二錢 生梔子八錢 生石膏 元明粉 赤苓 白菊花 雙花 枳殼 廣豆根 知母 牛子 川連 射干 川貝各三錢 粉草六錢 冰片二錢

【制法】共為細粉，蜜丸一錢重，蜡皮。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】忌食發物。

沈瀝丹

沈陽

【功能與主治】清熱，解毒，緩下劑。主胎毒，胎熱，胎黃，面赤目閉，口舌瘡瘍，喉閉喉蛾，渾身壯熱，便秘溺赤，麻疹斑痧，游風，癰疥，痰食風熱，疳腮面腫，十種火丹，諸般抽搐。

【處方】川芎 大黃(酒蒸) 茯苓 黃柏各九錢 赤芍 黑牽牛 滑石 連翹各六錢 枳殼 薄荷葉各四錢五分 板榔七錢五分

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二分五厘重。

【劑量及用法】月內小兒服一丸，稍大服二丸，茶湯化服。

附參考古方

【來源】衛生鴻寶。

【功能與主治】胎毒、胎熱、胎黃，面赤目閉，鵝口口瘡，重舌木舌，喉閉喉蛾，渾身壯熱，大便秘結，小便黃赤，麻疹斑痧遊風，癰疥，痰食風熱，疳腮面腫，十種火丹，諸般風搖。

【處方】川芎(酒洗) 大黃(酒蒸) 茯苓(酒炒) 黃柏(酒炒)各九錢 赤芍(炒) 黑丑煨(取大末) 滑石(飛水) 連翹(去心)各六錢 枳殼(麸炒) 薄荷葉各四錢半 尖板榔二錢半

【制法】為末，蜜丸芡實大。

【劑量及用法】月內兒一丸，稍大二丸，茶湯化服。

七珍丹

一、北京

【功能與主治】清熱安神，祛痰化滯。主小兒驚風抽搐，痰涎壅盛，停食停乳。

【處方】鉤藤 半夏(制) 僵蚕各二兩 胆南星 天竺黃各五錢 共為細粉兌入，雄黃一兩 硃砂麝香各二錢 巴豆霜四錢(去淨油含量不得超過百分之十)

【制法】上藥和勻，甘草煎水泛小丸。

【劑量及用法】每服三厘，白開水化服。

【禁忌】忌生冷油膩等物。

二、天津

【功能與主治】清熱、利便、化痰。主傷乳傷食，積聚痞塊，消化不良，肚脹腹痛，咳嗽痰涎，驚風拘攣，大便不通。

【處方】胆星 天竺黃各五錢 淡全蠍 煨僵蚕 寒食糰各一兩 共為細粉兌入，硃砂面五錢 淨豆霜二錢 麝香一錢 明雄黃面五錢

【制法】以上研細和勻，涼開水泛小丸，如小米粒大，每斤丸藥用硃砂面一兩上，五分重裝瓶。

【劑量及用法】小兒三、四個月，每次服三粒，五、六個月服四、五粒，週歲服六、七粒，白開水化服。

【禁忌】體弱者勿服。

三、南昌

【功能與主治】小兒急驚發熱，

手足搐搦，痰涎壅盛，肚腹膨脹。

【處方】巴豆霜四兩 飛硃砂 淨全蠍 明雄黃 煨僵蚕 胆星 天竺黃 法夏 明天麻各一兩

【制法】共研細末，水泛為丸，如芥子大，用方內硃砂為衣。

【劑量及用法】小兒二個月至六個月者，每服三丸至四丸。六個月至一歲者，每服六丸至八丸。一歲至二歲者，每服八丸至十丸。三歲至四歲者，每服十二丸。五歲至六歲者，每服十六丸。白開水化服(丸內硃砂必須服下)。

【備考】非經醫師處方，不可使用。

四、蘭州(小兒七珍丹)

【功能與主治】退熱化痰，清腸利便。主咳嗽，痰喘，消化不良，肚腹脹痛，停食停乳。

【處方】同天津。

【制法】共研細面，水打為小丸，硃砂為衣。

【劑量及用法】小兒三、四月，每次服一粒，五、六月服四、五粒，週歲服六、七粒，白開水送下。

【禁忌】脾虛者忌服。

五、大同

【功能與主治】消化不良，內傷食積之症。

【處方】巴豆霜 硃砂 雄黃 南星 僵蚕 全虫各一兩 麝香二錢

【制法】共為細末，寒食面打糊為丸，如小米大，硃砂為衣。

【劑量及用法】每次服一丸。

六、禹縣(小兒七珍丹)

【功能與主治】小兒急驚，乳積痰積，大便閉結，嘔吐瀉痢，食積腹脹。

【處方】硃砂 天竺黃 僵蚕 全蠍 巴豆霜 胆南星 明雄黃各四兩

【制法】共為細面，水丸，硃砂為衣，小米大。

【劑量及用法】嬰兒一月每服一丸，按此加減，十歲服二十丸，白開水送下，乳汁送亦可。

【禁忌】孕婦忌用，慢驚，體虛忌用。

七、济南、承德 (小兒七珍丹)

【功能与主治】清热鎮惊，化痰消食。主小兒停食停乳，腹脹痰盛。

【处方】胆南星 大竺黃 硃砂 (留一半为衣) 明雄黃 巴豆霜各五錢 全蠍(去勾) 白殭蚕 饅饊面各一兩 麝香一錢

【制法】共研細末，水打为丸，如芥子大，硃砂为衣。

【剂量及用法】小兒三、四个月每服二、三粒，五、六个月者服四、五粒，乳汁送下。週岁服五、六粒，四五岁服七、八粒，用白开水送下。

【禁忌】忌辛辣油膩等物(乳母亦忌食)；体弱兒童忌服。

八、沈陽

【功能与主治】散風解熱，消痰安神。主撮口臍風，牙关緊閉，喘促高热，兩目天吊，痰壅搐搦，大便燥結。

【处方】全蠍 雄黃各二錢 麝香二分 巴豆霜二錢 硃砂 大竺黃 胆南星各三錢 明天麻三錢

【制法】共碾極細面，水泛为丸，硃砂衣。

【剂量及用法】每服七粒。白水送下。

九、撫順

【处方】雄黃 竺黃 殭蚕 全虫 胆星 硃砂各一兩 豆霜五錢 麝香二分

【制法】共为細面，水泛小丸，硃砂衣。

十、哈尔滨(小兒七珍丹)

【功能与主治】定風降痰。主小兒惊風，痰火交煎，惊恐受風，痰鳴漉漉，面青氣脹，喘促咳嗽，四肢拘攣，項背反張，目斜直視。

【处方】硃砂 雄黃 竺黃 全蠍 胆星 巴豆霜各三錢

【制法】共碾为細面，面糊湯泛为小丸，如谷粒大。

【剂量及用法】一岁以下小兒每服三粒至四粒，二岁以上小兒每服七粒，乳汁或白水調服。

【禁忌】忌食肥冷油膩；脾虛泄泄者禁服。

十一、呼和浩特

【处方】胆星 殭蚕 大黃 天麻各三錢 广皮四錢 竺黃 蝸牛 蠍尾各二錢 寒水石四錢(煨)

豆霜三錢 硃砂 明雄黃 麝香

【制法】共为細面，用甘草水泛为小丸；如粟米大，硃砂衣。

寿嬰丹 吉林

【功能与主治】解抽鎮惊，消毒利便。惊風，胎毒，大便燥結。

【处方】豆霜二錢四分 全蠍 天麻 殭蚕 胆星 匣片砂 血琥珀 白附 血竭 皂角 明雄 青黛各一錢四分

【制法】上藥品共为細面，用醋糊为丸，每丸如黄豆大，硃砂为衣，裝入玻璃瓶或瓷罐內。

【剂量及用法】每服一丸，白水送下。

牛黃八宝丹

一、天津

【功能与主治】清熱解毒，消腫止痛。主咽喉腫痛，溫毒發斑，神昏躁狂，胎毒胎嫩，鵝口馬牙，重舌口瘡。

【处方】青黛二錢 儿參(去蘆)五錢 羌活 錢 黃連 浙貝 制乳香 制沒藥各三錢共为細粉 兌入牛黃 冰片各二錢 雄黃面五錢 羚羊粉 犀角粉各三錢 珍珠四分 硃砂面五錢

【制法】以上研細和勻，另用銀花、地丁、菊花各二兩，甘草五錢，熬汁去渣濾淨，煉淨水份为度，收膏加蜜五錢和丸，每丸三分重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】一至二岁每次服一丸，週岁以內酌減，白开水化服。

二、济南(八宝丹)

【功能与主治】小兒內熱惊風，抽搐痰壅氣促，疹后余毒，二便閉澀。

【处方】牛黃五分 羌活二錢 菊花 犀角粉 川貝母 木通各三錢 冰片二分 硃砂五錢 紫花地丁 川黃連各三錢 雄黃五錢 核桃仁三錢 羚羊粉各三錢 珍珠四分 乳香三錢 黃芩五錢 沒藥 青

黛各三錢 琥珀二錢 金銀花三錢

【制法】除牛黃、琥珀、硃砂、雄黃、珍珠、冰片、羚羊、犀角另研兌外，余藥共为細粉和勻，煉蜜为丸，重二分，金箔为衣。

【剂量及用法】未滿週岁者，每服半丸，兩岁者每服一丸，三至七岁者服二丸，病輕者服一丸，白开水送下。

三、沈陽

【功能与主治】解毒表疹，清熱鎮痛。主斑疹不出，出沒太急，熱毒內陷，煩躁不安，咳嗽喘息，渾身發赤，兩頰紅腫，咽喉作痛，諸瘡腫瘍。

【处方】牛黃 冰片 青黛各二錢 雄黃三錢 玄參五錢 羌活三錢 黃連五錢 羚羊角一錢 犀角五錢 乳香五錢 沒藥三錢 珍珠四分 硃砂五錢

【制法】共碾極細面，另用双花，紫地丁，甘菊各二兩，甘草五錢。以水五碗，熬數沸去藥渣，用濃汁再熬成膏。更入煉蜜为丸。每粒重三分。

【剂量及用法】一岁至二岁，每服一粒。三至四岁，每服二粒，六岁每服三粒。白开水送下。

【禁忌】忌食辛辣之物。

四、吉林、哈尔滨 (八宝丹)

【功能与主治】化毒消炎，解熱鎮惊。主小兒急惊，壯熱煩渴，痰壅氣促，牙关緊閉，四肢搐搦；疹毒未透，潛伏血中，皮膚生瘡，咽喉糜爛，或疹毒繼肺，咳嗽痰壅，甚或帶血，肺經內熱，干咳音啞，及喉痺乳蛾等症。

【处方】东牛黃五分 犀角三錢 梅片二分 川連 羚羊 乳香 沒藥各三錢 琥珀二錢 羌活 川貝各三錢 硃砂 雄黃各五錢 珍珠四分 黃芩五錢 青黛 銀花 菊花 地丁 核桃肉各三錢(吉林有木通三錢)

【制法】將牛黃、琥珀、硃砂、雄黃、珍珠、梅片均各另細研，其余碾为細面，一处調勻，煉蜜为丸，入丸七分重，小丸二分重，大赤金衣。綿紙包裹，蜡皮封。

【剂量及用法】小兒服用小丸，未滿週岁者服半丸，兩岁者服一丸，

三至七岁者服二丸，輕症可服一丸。成人服用大丸，每次二至三丸，白水調服。

【禁忌】白喉忌服；忌食辛辣油膩。

附参考古方

【来源】沈氏尊生書。

【功能与主治】此方治痧症發斑，發狂，渾身赤紫痧，后惡毒瘡瘍皆能消化。

【处方】雄黃 元參(瓦上焙)各五錢 炒羌活 土炒川連 羚羊角 犀角 炒貝母 乳香 沒藥各二錢 青黛二錢 珍珠四分 硃砂五錢 牛黃 冰片各二錢

【制法】共研細末，再將金銀花、紫花地丁、甘菊各二兩，甘草五錢，用長流水五碗，砂鍋內慢火煎至半，取汁渣絞干，桑柴火熬膏，入煉蜜盡許，再熬粘筋和丸，每丸重三分。

【劑量及用法】幼者一丸，大人二丸，蜜湯下。

至聖保元丹

一、北 京

【功能与主治】解熱鎮驚化痰。主小兒感冒發燒，急熱驚風，手足抽搐，項背強直。

【处方】胆南星 防風 羌活各三兩五錢 茯苓 殭蚕 甘草 天竺黃 橘皮各二兩 麻黃 鉤藤 薄荷 豬牙皂各二兩五錢 全蠍四兩 天麻三兩共為細粉兌入；琥珀二兩 牛黃四錢 冰片二錢 硃砂一兩六錢 麝香四錢

【制法】上藥和勻，煉蜜為丸，重五分，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。小兒三岁以下者，酌情遞減。

【禁忌】忌食生冷油膩。

二、天 津

【功能与主治】解熱鎮驚化痰。主小兒感冒發燒，痰涎壅盛，急熱驚風，背強項直，手足抽動，神昏不醒，嘔吐咳嗽。

【处方】胆星七錢 茯苓(去皮)四錢 炒殭蚕二錢 麻黃五錢 防風七錢 鉤藤 薄荷各五錢 羌活七錢 淡全蠍八錢 天竺黃 廣皮

各四錢 天麻六錢 牙皂五錢 甘草四錢 煅青礞石五錢 蜈蚣二條(五分重)共為細粉，每細粉七兩八錢五分兌；冰片五分 麝香 牛黃各一錢 琥珀面 珍珠 硃砂面各四錢

【制法】以上研細和勻，煉蜜為丸三分重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，週歲以內酌減，白開水化服。

三、蘭 州

【功能与主治】去熱散風，鎮驚安神，解毒化痰。主小兒四肢抽搐，昏迷，週身發燒，咳嗽嘔吐，感冒頭疼等症。

【处方】竺黃五錢 硃砂一兩 琥珀七錢 枳實 茯神 胆星 鉤藤 全蠍 雄黃 甘草各一兩 羚羊五錢 殭蚕一兩 沉香 犀角各五錢 木通一兩二錢 礞砂一兩 山藥二兩

【制法】共為細面，蜜丸三分重，硃砂衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下，未滿週歲小兒減半。

【禁忌】辛辣油膩。

四、大 同

【功能与主治】小兒驚風，嗽喘，夜燒，傷感熱化痰，鎮驚，定抽。

【处方】獨活四錢 云苓八錢 全蠍十八個 天虫二十八條 天麻一兩 羌活六錢 廣皮八錢 青礞石 防風各一兩 胆星一兩四錢 竺黃一兩 硃砂八錢 琥珀三錢 蜈蚣五條 珍珠五分 牛黃一錢 冰片二錢 射香一錢

【制法】共為細面，另以鉤藤、麻黃、牙皂、薄荷、生草各一兩熬膏，兌竹瀝膏一兩，生姜汁一兩，加煉蜜為丸，每丸重五分，金衣，蜡皮。

【劑量及用法】未滿週歲小兒，每丸分三次化服，週歲以上者，每次一丸，日服二次水化服。

五、濟 南

【功能与主治】感冒發燒，痰盛煩躁，手足抽搐，急熱驚風。

【处方】胆南星三兩五錢 琥珀二兩 天麻三兩 防風三兩五錢 廣陳皮二兩 牛黃四錢 羌活三兩五錢 麻黃二兩五錢 冰片二錢

茯苓二兩 鉤藤二兩五錢 硃砂一兩六錢 殭蚕二兩 薄荷二兩五錢 珍珠一兩六錢 甘草二兩 牙皂二兩五錢 麝香四錢 天竺黃二兩 全蠍四兩

【制法】除牛黃、麝香、珍珠、琥珀、硃砂、冰片另研兌外，其他群藥共為細粉，煉蜜為丸，重五分，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下，小兒三岁以下者，酌情遞減。

【禁忌】忌食生冷油膩。

六、沈 陽

【功能与主治】鎮驚安神，除痰解熱。主小兒風熱抽搐，角弓反張，兩目上吊，喘促厥逆，麻疹咳嗽，痰鳴氣促。

【处方】防風一錢三分 天竺黃一錢 胆星一錢八分 天麻二錢 羌活一錢三分 殭蚕四個 茯苓一錢 蜈蚣(炙)半條 橘皮一錢 麝香二分 全蠍三個 琥珀八分 牛黃二分 冰片一分半 珍珠五分 硃砂一錢 青礞石五分

【制法】共碾極細面，外用鉤藤一錢，甘草二錢，麻黃二錢，牙皂一錢，四味熬膏加姜汁，竹瀝一盅，為三分五厘重，硃砂衣蜡皮封固。

【劑量及用法】一歲未滿者服半丸至一丸，一歲以上酌加，白開水送下。

【禁忌】忌食醋。

七、撫 順

【功能与主治】鎮驚、疎風、化痰。主小兒急驚，壯熱無汗，角弓反張，頸項強急，頭搖直視，口噤神昏，小兒感冒，發熱畏冷，頭疼身痛，咳嗽喘促，身熱足寒，驚悸夜啼。

【处方】防風 羌活 冰片各五分 胆星七錢 云苓四錢 天麻六錢 陳皮四錢 琥珀三錢 天竺黃四錢 殭蚕三錢 蜈蚣二條 硃砂四錢 牛黃五分 薄荷 鉤藤 青礞石 麻黃 甘草 牙皂各五錢 蘇珠三分 射香八分 全蠍錢半

【制法】共為細面，蜜丸三分五厘重，蜡皮封。

【劑量及用法】每服一丸，灯心、薄荷、鮮姜送下或鮮姜、薄荷、菊花、桑葉為引。

【禁忌】忌食生冷油膩。

八、哈尔滨(保元丹)

【功能与主治】鎮惊，疎風，滌痰。主小兒急惊風，壯熱煩渴，痰壅氣促，牙关緊閉，四肢搐搦，或汗出當風，發為瘧風，壯熱無汗，角弓反張，身熱足寒，頸項強急，面赤目赤，大搖直視，口噤神昏。並治風痰，咳嗽痰喘，痰鳴氣促，感冒寒涼，發熱畏冷，頭痛體痛等症。

【处方】胆星 竺黃各三錢五分 全蠍十四個(去毒) 殭蚕二十四個 蜈蚣二條(去毒) 防風 天麻 礞石 羌活 前胡各三錢五分 牛黃七分 琥珀三錢五分 硃砂二錢八分 珍珠一錢四分 麝香 梅片各七分 薄荷 皂角 麻黃 鈎藤 甘草 竹瀝各三錢五分

【制法】除麝香、梅片、硃砂、珍珠、琥珀、牛黃等另研外，余均碾為細粉，陸續調合一處，將竹瀝兌入煉蜜為丸，二分一厘重。(或三分五厘重)大赤金衣。綿紙包裹，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，病重二丸，灯心薄荷鮮姜与令制品同煎湯為引，或鮮姜薄荷桑叶菊花為引。

【禁忌】忌食生冷油膩。

九、承德

【功能与主治】解熱，鎮惊，化痰。主小兒感冒發燒，急熱惊風，手足抽搐，項背強直。

【处方】胆星 防風 羌活各三兩五錢 茯苓 殭蚕 甘草 天竹黃 琥珀 廣皮各二兩 麻黃 礞石 鈎藤 薄荷 猪牙皂各二兩五錢 全蠍四兩 天麻二兩 蜈蚣十條 冰片二錢 硃砂 珍珠各一兩六錢 麝香 牛黃各四錢

【制法】共軋細麵，煉蜜為丸，重五分，金衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下，小兒三歲以下者，酌情遞減。

【禁忌】忌食生冷油膩。

十、呼和浩特

【处方】防風一兩二錢 廣橘紅八錢 川羌六錢 薄荷一兩 天麻 竹黃 礞石各一兩二錢 胆星一兩

四錢 天虫四錢 鈎藤 茯苓各一兩 甘草八錢 遠志四錢 活蠍子二十一個 硃砂八錢 琥珀 牛黃 珍珠 麝香 冰片

【制法】煉老蜜大丸，重五分，滿金衣，蜡皮封固。

至聖保嬰丹

濟南

【功能与主治】主五臟痰涎壅盛，惊風抽搐，半寒半熱，煩躁不寧，痘前痘后，余熱不清。

【处方】明雄黃五錢 川羌 川連 山貝各二錢 犀角四錢 乳香二錢 沒藥 琥珀 青黛各二錢 元參 硃砂各五錢 珍珠子四分 牛黃 梅片各二分 赤金八十張

【制法】共為細面，煉蜜為丸，每丸重一分，方內赤金為衣。

【劑量及用法】一歲左右服一丸，三歲左右服二丸，隨症調引。

牛黃紫金丹

一、撫順

【功能与主治】鎮惊解熱。主小兒急惊，神散氣亂，壯熱煩渴，牙关緊閉，四肢抽搐，肺熱喘風，咳嗽痰喘，口渴心熱，痰鳴氣促，小兒感冒，發熱惡寒，頭痛身痛，惊啼不穩等症。

【处方】天麻 天竹黃各二錢半 胆星五錢 麝香二分 硃砂五分 白附子二錢 地骨皮三錢半 胡黃連一錢 牛黃四分 全蠍二錢 殭蚕錢半

【制法】共為細面，蜜丸二分重，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，用鮮姜、桑叶、薄荷、菊花為引。

【禁忌】忌食生冷油膩。

二、吉林、哈尔滨

(紫金丹)

【功能与主治】鎮惊，疎風，滌痰，解表。主小兒急惊，壯熱煩渴，痰壅氣促，牙关緊閉，四肢搐搦，汗出當風，發為瘧風，壯熱無汗，角弓反張，身熱足寒，頸項強急，面赤目赤，大搖直視，口噤神昏；並主風痰，咳嗽痰喘，痰鳴氣促；感冒寒涼，發熱畏冷，頭痛體痛等症。

【处方】天麻一錢五分 胆星五

錢 殭蚕 丹皮各一錢五分 竺黃 白附各二錢 全蠍三錢 胡連一錢 骨皮一錢五分 硃砂五分 牛黃四分 麝香二分

【制法】除牛黃、麝香、硃砂等另研外，余均碾為細粉，陸續調合一處，煉蜜為丸二分一厘重(吉林作四分一厘)，或三分五厘重，大赤金為衣。綿紙包裹，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，病重二丸，鮮姜薄荷桑叶、菊花為引。

【禁忌】忌食生冷油膩。

珠黃寶生丹

北京

【功能与主治】清熱熄風。主小兒發熱咳嗽，惊風抽搐。

【处方】殭蚕 防風 入花粉 鈎藤 天麻 天竹黃 玄參 黃芩 梔子 桔梗各四兩 全蠍五錢 胆星 南星 石膏(生) 羌活各一兩五錢 猪牙皂一兩 薄荷一兩五錢 甘草四兩 共為細粉兌入：硃砂一兩 犀角 牛黃各五錢 珍珠 麝香各三錢 冰片 羚羊角各一兩

【制法】上藥和勻，煉蜜為丸，重五分，金箔為半衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，溫開水送下，金銀花、薄荷煎湯送服亦可，週步內可服半丸。

救惊丹

沈陽

【功能与主治】定惊止抽，清痰開窍，安神鎮怯。主小兒惊風，癇風，胎風一切抽風。凡屬于熱性抽搐，癲癇及痰火性抽風症狀，卒然昏倒，身熱強直，口角流沫，角弓反張，兩目上吊，肘抽肘上，身發高熱。

【处方】清半夏 化橘紅 明天麻 薄荷叶 白殭蚕 双鈎藤 陈胆星各三錢 青黛一錢 天竹黃 全蠍 粉甘草各三錢 大連珠五分 防風二錢 麝香 牛黃各二分 琥珀一錢 硃砂二錢

【制法】碾成極細面，過重羅后，將硃砂、琥珀、大連珠各研細面兌一處，最后入麝香，煉蜜為丸，一錢重，磁瓶貯藏。

【劑量及用法】每服一丸，每日兩次至三次，白開水送下。

琥珀保嬰丹

一、哈尔滨(保嬰丹)

【功能与主治】清火定風。主小兒急驚風症，痰火內蘊，外感風邪，卒然暴驚，壯熱抖戰，角弓反張，痰壅氣塞，四肢搐搦，口眼喎斜，面青口噤。

【处方】东牛黃五分 天竺黃二錢五分 山參一錢 礞石二錢 东珍珠 明雄黃 油桂各一錢 半夏二錢 台麝五分 犀牛角 粉草各二錢 南星一錢 梅片五分 川貝母一錢五分(去心) 前胡二錢 川芎一錢五分 血琥珀二錢 殭蠶一錢 防風二錢 蜈蚣二條 辰砂三錢 全蠍四個 天麻二錢五分 紋軍三錢

【制法】牛黃、珍珠、麝香、辰砂、琥珀，均各另研，余藥碾為細面，一處調勻。

【劑量及用法】週歲小兒，每服一分，二歲至五歲每服二分，六歲至八歲每服一分，燈心、竹葉、薄荷、鮮姜為引。

【禁忌】忌食辛辣生冷油膩等物(乳母亦忌)。

二、呼和浩特

【处方】防風六錢 廣橘紅四錢 川芎 錢 薄荷五錢 天麻 竹黃 礞石各六錢 胆星七錢 天虫二錢 鉤藤 伏苓各五錢 甘草四錢 遠志一錢 活蠟(干)五錢十一个 硃砂七錢五分 琥珀五錢 牛黃 珍珠 麝香各一錢五分 冰片一錢 川貝五錢

【制法】共為極細面，每丸重一分，用白綿紙內墊烏金紙包裹外，再用白綿紙包之，蜡皮封固。

小兒百壽丹

一、北京、承德(百壽丹)

【功能与主治】清熱健胃，化滯安神。主停乳停食，消化不良，痰盛咳嗽，氣促抽搐。

【处方】山楂 滑石各五兩 蒼朮 胆南星 天竺黃 木香各二兩五錢 砂仁 六神麴 麦芽 鉤藤 薄荷 殭蠶各一兩五錢 茯苓 桔

梗 甘草各一兩 橘皮二兩五錢 共為細粉兌入：硃砂一兩 牛黃二錢 (承德桔皮改香附)

【制法】上藥和勻，煉蜜為丸，重八分，金箔為半衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸(承德週歲內服半丸)，白開水送下。

二、天津

【功能与主治】清熱散風，健胃消食。主感冒傷風，發燒頭疼，咽喉紅腫，嘔吐咳嗽，急熱驚風，停食停乳，消化不良。

【处方】川貝 桔梗 橘紅 陳皮 薄荷各九錢 炒殭蠶 銀花各一兩二錢 芥穗 天竺黃 甘草各九錢 焦神曲 焦麦芽 焦山楂各八錢 花粉 元參 大黃各一兩二錢 炙冬 鉤藤各一兩五錢 天麻 柴胡各六錢 炒大力子九錢 連翹(去心)一兩二錢共為細粉，每細粉一斤五兩九錢兌：麝香九分 硃砂面 冰片各二錢 羚羊粉九分 犀角粉一錢五分 牛黃一分 明雄黃面二錢

【制法】以上研細和勻，煉蜜為丸，五分重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】一至二歲每次服一丸，週歲以內酌減，白開水化服。

【禁忌】發熱便瀉者忌用。

三、濟南

【功能与主治】驚悸，食滯嘔吐。

【处方】山查肉 滑石各五兩 香附 茅朮 木香各二兩五錢 益智 砂仁 甘松 神曲 麦芽各一兩五錢 遠志 山萸肉 云苓 桔梗 甘草 硃砂各一兩

【制法】共研細面，蜜大丸，重一錢。

【劑量及用法】每服一丸，白水送下。

【禁忌】忌食生冷。

乾元丹

一、北京

【功能与主治】清熱消導，熄風化痰。主小兒乳食停滯，咳嗽身熱，驚悸抽搐。

【处方】大黃 天竺黃 白朮 連翹 卡勞子各八錢 赤芍 橘紅

驚風類

各一兩 天花粉 全蠍各一兩五錢 桔梗 羌活 天麻各二錢 薄荷 胆南星各一錢共為細粉，每九兩八錢細粉兌：牛黃 琥珀 冰片各三錢 麝香二錢

【制法】上藥和勻，煉蜜為丸，重五分，金箔為半衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，溫開水送下，不及週歲者減半。

【禁忌】忌食油膩粉食。

二、濟南

【功能与主治】主急熱驚風，咳嗽痰多。

【处方】牛黃 天竺黃各二錢 麝香二錢 冰片 琥珀各一錢 胆星一兩 天花粉一兩五錢 赤芍 橘紅各一兩 全蠍 桔梗各一兩五錢 連翹八錢

【制法】除牛黃、麝香、冰片、琥珀另兌外，其他群藥為極細粉，煉蜜為丸，一錢重，蜡皮封固。

【劑量及用法】週歲以下者，小兒服半丸。

化風丹

一、北京

【功能与主治】化風豁痰。主小兒急熱驚風，痰涎壅盛。

【处方】黃連 橘紅各二十兩 殭蠶十兩 胆南星 枳實各四十兩 大黃一百六十兩 黃芩八十兩 沉香 鉤藤各十兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重五分，硃砂為衣。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。小兒三歲以下者，酌情遞減。

二、濟南

【功能与主治】主小兒急熱驚風，痰涎壅盛。

【处方】黃連 橘紅各二十兩 殭蠶十兩 胆星 枳實各四十兩 大黃一百六十兩 黃芩八十兩 沉香十兩 鉤藤十兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，五分重，硃砂十五兩為衣。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，開水送下，小兒三歲以下者酌減。

已風丹

沈陽

【功能与主治】鎮惊定癇，止癇。主小兒惊癇，二目天吊，神識不清，項背強直，角弓反張，癇攣抽搐。

【处方】天竺黃 防風 鉤藤各一兩 白殭蚕 全蠍 白附子各五錢 麝香五分

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，五分重。

【劑量及用法】每服一至二丸。以煎芥湯化服。

法制金液丹

福州

【功能与主治】治陰極發躁，厥冷脉伏，肢厥神昏，自汗吐利，口鼻氣冷將成慢惊。

【处方】舶上硫黃五兩

【制法】研細末，水飛，入砂罐內鉄蓋蓋定，鉄絲繩口，鉄釘旋緊，水調赤石脂封口，鹽泥固濟候干，埋地坑以三足釘釘于地，將罐置釘上，另用一蓋盛水置罐上，再用鹽泥封，慢火燒養七日夜（一作二日夜），再加頂火用炭十斤為度，候冷取出，用柳木槌于乳鉢內研細，每木一兩用蒸餅一兩，打糊為丸，桐子大。

小兒咽喉靈丹

天津

【功能与主治】清熱消腫止痛。主肺胃火熱，咽喉腫痛，喉痹喉癰，腮頰紅腫，單雙乳蛾，煩躁不寧。

【处方】銀花 淨金燈 生石膏各二錢 人黃二錢 連翹（去心） 黃芩 黃連 桔梗 甘草 川貝各三錢共為細粉兌入：犀角粉 冰片 硃砂面各一錢

【制法】以上研細和勻，煉蜜為丸，五分重。蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，週歲以內酌減。白開水化服。

【禁忌】風邪身熱咽痛者慎用。

謝氏育嬰丹

呼和浩特

【处方】大黃六錢 麻黃 蟬蛻

防風 鉤藤各五錢 法夏四錢 南星 天虫 桂枝 全虫各三錢 甘草二錢 焦三仙一兩 天麻四錢 川貝 廣紅各五錢 硃砂一兩 麝香四分 牛黃五分 冰片五分

【制法】蜜大丸，重五分，半金衣蜡皮。

秘制混元丹

呼和浩特

【处方】混元衣（紫河車） 白梅花 伏神各四兩 甘草 木香 竺黃各二兩 益智仁一兩 遠志一錢 山藥五錢 甘松三錢 黃耆二兩 桔梗二錢 茯苓五錢 砂仁六錢 香附三兩 滑石十二兩 莪朮六錢 人參 牛黃 麝香 硃砂

【制法】蜜大丸，重八分，硃衣寸果金衣。

【備考】加料者，人參、麝香、牛黃加一倍。

金衣至寶錠

一、大同

【功能与主治】主急惊風，邪熱痰實，氣短咳嗽，宿食不化。

【处方】陳皮 山楂 麥芽 白附子 全虫 蟬蛻 天麻 羌活 鉤藤 板榔 殭蚕 蘇叶 薄荷 藿香 川貝 胆星 硃砂各五錢 芥子 滑石 琥珀各二錢 神曲八兩 茯苓二兩 牛黃一錢二分 冰片各六分

【制法】共軋細末，煉蜜為丸，每個五分重，金箔衣。

【劑量及用法】一錠薄荷湯下。

二、蘭州

【功能与主治】鎮定神經，開胃消食。主小兒食物不化，發熱惡寒，感冒咳嗽，溫邪抽風。

【处方】廣陳皮 東山楂 麥芽 附子 全蠍 蟬蛻 天麻 羌活 鉤藤 板榔 天虫 蘇叶 薄荷 藿香各五錢 白芥子 滑石各二錢 川貝 胆星 硃砂各五錢 琥珀三錢 牛黃二分 寸香五分 冰片三錢

【制法】共研細末，煉蜜為丸，五分重，金衣。

【劑量及用法】每服一丸。

【禁忌】葱姜辛辣，生冷油膩。

三、沈陽

【功能与主治】健脾強胃，除積退熱。主小兒傷食，傷乳，停食停水，嘔吐，大小便不通，消化不良。

【处方】焦白朮 陳皮各五兩 莪朮三兩 甘草二兩 茯苓三兩 木香五兩 南山楂四兩 三稜三兩 胆星 青皮各二兩 板榔 山藥各四兩 琥珀二兩 雄黃二兩 硃砂六兩 牛黃 冰片各三錢 麝香二錢

【制法】為極細面，煉蜜為錠，重一分五厘，金衣。

【劑量及用法】早晚空心白開水送下，每服二錠。

【禁忌】面黃食物。

四、承德

【功能与主治】傷乳停食，嘔吐瀉痢，急熱驚風，發熱咳嗽。

【处方】陳皮 山楂 麥芽 白附子 全蠍 蟬蛻 天麻 羌活 鉤藤 板榔 殭蚕 蘇叶 薄荷 藿香 川貝母 胆星 硃砂各五錢 白芥子 滑石 琥珀各二錢 神曲八兩 茯苓二兩 牛黃一錢二分 麝香 冰片各六分

【制法】共研細面，煉蜜為錠，重二分，金衣。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下，小兒三歲以下者酌情遞減。

【禁忌】忌食生冷油膩之物。

五、呼和浩特

【处方】茯苓二兩 白朮三錢 陳皮 益智仁 桔梗各五錢 青皮二兩 木香六錢 三稜五錢 莪朮一兩 甘松三錢 山藥 遠志各一兩 黃耆五兩 滑石三兩 甘草 藿香各五錢 麝香二分 人參五錢 硃砂八錢 冰片七分

【制法】蜜大丸，重五分，寸金裹。

定搐化風錠

一、北京

【功能与主治】鎮靜化痰。主小兒抽搐，惊悸不安，痰盛氣促。

【处方】全蠍十個 桔梗三錢

黃連二錢 蟬蛻三錢 甘草 防風 大黃各二錢 羌活一錢 殭蠶 半夏各二錢 麻黃五分 共為細粉 兌入：硃砂五錢 牛黃 麝香各一分 冰片一分

【制法】上藥和勻，煉蜜為丸，重五分，硃砂為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌食油膩。

二、大同

【功能與主治】小兒驚風，手足抽搐，痰涎壅盛。鎮驚解風定搐，除痰降熱。

【處方】全蠍子二百個 天麻 竺黃各十二兩 胆星 半夏 鉤藤 伏苓 殭蠶 蟬蛻 枳實 化橘紅 白朮 川貝 琥珀各九錢 薄荷 羌活 防風 白附子 甘草各六錢 牛黃二分 麝香八分 冰片三錢 硃砂二兩二錢 雄黃一兩二錢

【制法】共為細面，煉蜜為丸，硃砂金箔為衣，蜡皮。

【劑量及用法】未滿週歲小兒，每丸分三次化用，週歲以上者服一粒，日服二次，開水化服。

三、承德

（小兒定搐化風錠）

【功能與主治】小兒急熱驚風，手足抽搐。

【處方】全蠍二百個 蟬蛻九錢 防風六錢 天麻十二兩 枳實九錢 白附子六錢 天竺黃十二兩 橘紅九錢 甘草 薄荷 羌活各六錢 胆南星 白朮 半夏 鉤藤 伏苓 川貝母 琥珀 殭蠶各九錢 牛黃二分 冰片三錢 硃砂二兩二錢 雄黃一兩二錢 麝香八分

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，硃砂金箔為衣，蜡皮封固，每丸三分重。

【劑量及用法】未滿週歲小兒，每粒分三次化服，週歲以上，每粒作一次服，日服二次，開水化服。

小兒定風珠

承 德

【功能與主治】定風止抽，鎮驚清熱。主驚熱風痰，定志安神，痰涎壅盛，十指拘曲，口渴身熱，昏迷不

醒。

【處方】防風五錢 全蠍 半夏 天麻 殭蠶 鉤藤 甘草 南星 蟬蛻 薄荷 桔梗各一兩 硃砂三兩 牛黃五分 麝香二分

【制法】共軋細面，煉蜜為丸，重五分，金衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】小兒一歲以下每服半丸，一歲以上每服一丸，早晚各服一次，薄荷灯心湯送下。

【禁忌】忌食辛辣之物。

小兒肥皂餅

蘭 州

【功能與主治】解熱，鎮靜。主小兒四肢逆冷。頭燒口斜，昏迷抽風。

【處方】殭蠶五錢 全蠍二錢 粉草五錢 白芷七錢 白附片 薄荷各五錢 天麻 肥皂角各一兩

【制法】以上共為細面，蜜作為餅，每餅重一錢，金衣。

【劑量及用法】每服一餅，五個月以下酌減。

【禁忌】忌食生冷。

小兒急驚粉

北京、承德

【功能與主治】清熱鎮驚化痰。主小兒急熱驚風，痰涎壅盛。

【處方】殭蠶 天花粉 鉤藤各四錢 連翹 羌活 天麻 防風 天竺黃 半夏 甘草各三錢 大青葉五錢 全蠍一錢 薄荷 豬牙皂各一錢 共為細粉兌入：雄黃二錢 冰片 牛黃 琥珀各二錢 麝香八分 珍珠五分 硃砂六錢 羚羊角一錢

【制法】上藥和勻。

【劑量及用法】每服一分，日服二次，溫開水送下，三歲以下者酌情遞減。

鎮驚新葯

沈 陽

【功能與主治】鎮靜止抽。主嬰兒急驚，突然抽風，胃脘攣症，目睛上視，手足抽搐，咬牙不語，口吐白沫，額骨赤紅，食火便秘，腹痛泄瀉。

【處方】郁金前三錢 川軍前三

痰 嗽 類

分 雄黃六錢 青黛三分 巴豆霜一錢半 牛黃二分

【制法】共軋極細面，磁瓶存貯。

【劑量及用法】一歲嬰兒每服半分，按年齡增減。

【禁忌】辣物。

兒 女 福

濟 南

【功能與主治】主胎毒內熱，肚腹滿硬，停食咳嗽，驚悸抽搐。

【處方】豆霜七兩 神柚 南星 硃砂各十兩 殭蠶五兩 全虫四兩 天麻五兩 大竺黃 川貝各六兩

【制法】共為細粉。

【劑量及用法】每服五厘，可視年齡大小酌予增減。

痰 嗽 類

小兒止咳丸

（華蓋止咳丸）

濟 南

【功能與主治】小兒感冒，咳嗽痰喘，氣急鼻塞，聲重。

【處方】前胡 杏仁 蘇梗 麻黃 黃芩 胆星 橘紅 海浮石 川貝 枳殼各一錢

【制法】共為細末，煉蜜為丸，每丸重五分。

【劑量及用法】每服二丸，開水送下。週歲以下兒減半。

小兒久嗽丸

天 津

【功能與主治】疏風，解熱，止咳，化痰。主感冒咳嗽，痰多而稠，或久嗽不止及百日咳。

【處方】法半夏一兩 生石膏四兩 炒蘇子一兩 冬花 牛桑皮 杏仁（去皮炒）各一兩 菖蒲 沉香各二錢 炒殭蠶一兩 生杷叶 桑叶各二兩 金銀簪五錢 竹茹粉二兩 葶藶子一兩 麻黃六分 藿香五錢 煨海浮石一兩

【制法】共為細粉，梨膏為丸，一錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，週歲以內酌減，白開水化服。

【禁忌】吐血、吐血忌用。

止嗽太和丸

天津

【功能与主治】清热化痰止咳。主小兒感冒咳嗽，內熱發熱，痰涎壅盛，喘嗽氣促，嘔吐惡心。煩躁不寧。

【处方】胆星 茯苓(去皮) 厚朴(姜制)各一兩 前胡 生桑皮 生紫苑 桔梗 橘紅 制半夏 黃芩各六錢 薄荷叶 川貝 炒蘇子 麻黃 生石膏 香櫞 甘草 熟軍各四錢 陈皮一兩 杏仁(去皮炒)四錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，一錢重。每斤丸藥用硃砂面一錢上衣，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，週歲以內酌減。白開水化服。

小兒寧嗽丸

沈陽

【功能与主治】小兒感冒發熱咳嗽，鼻塞嚏噴，聲重喘急，頭疼身痛，乍冷乍熱，咽喉作痛，目赤鼻干，痧疹未透，毒火內攻。

【处方】紫蘇 黃芩 川貝母各二兩 杏仁 前胡 桔梗 知母 桑皮 茯苓 陈皮 地骨皮各五錢 花粉 半夏 胆星 甘草 玄參 枳殼各二錢 瓜蒌八錢 薄荷五錢

【制法】共碾細面，煉蜜為丸七分重。

【劑量及用法】每服一丸，姜湯送下。

【禁忌】發物、油膩、辛、酸食品。

解肌寧嗽丸

一、北京

【功能与主治】發汗止咳。主小兒感冒風寒，憎寒發熱，咳嗽氣促。

【处方】麻黃五兩 前胡 菊花 黃芩 枳殼各二兩 桑叶 桔梗 橘皮 紫蘇叶 貝母各十兩 生石膏十六兩 杏仁八兩 甘草五兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重一錢。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。三歲以下者酌情遞減。

【禁忌】忌食油膩。

二、天津、承德

【功能与主治】散風解肌，止咳化痰。主小兒傷風咳嗽，頭痛身熱，口渴咽干，鼻流清涕，嘔吐痰涎。

【处方】制半夏 桔梗 天麻 陈皮 前胡 杏仁(去皮炒) 枳殼(麸炒) 葛根 浙貝 花粉 元參(去蘆)各五兩 蘇叶三兩 廣木香一兩五錢 茯苓(去皮) 甘草各四兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，一錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】一至二歲，每次服一丸，週歲以內酌減。白開水化服。

三、大同

【功能与主治】小兒傷風咳嗽，頓咳。

【处方】花粉 前胡 胆星 黃芩 枳殼各二十兩 桔梗 陈皮 桑叶 蘇叶 浙貝各十兩 山楂十五兩 青黛七兩 甘草五兩

【制法】共為極細末，煉蜜為丸，每丸一錢。

【劑量及用法】未滿週歲小兒每丸分兩次服；週歲以上每次服一粒。日服二、三次。

四、呼和浩特

【处方】川芎 茯苓 桔梗 半夏 黃芩 陈皮 前胡各二兩 甘草五錢 蘇叶 葛根 枳殼 桑皮各一兩五錢 浙貝一兩

【制法】蜜大丸，重一錢。

清金理嗽丸

濟南

【功能与主治】小兒咳嗽，胸悶痰多。

【处方】廣陈皮 黃芩 胆星各八兩 枳殼 桔梗 桑皮 杏仁各四兩 知母 百部 麥冬 甘草各二兩

【制法】共為細粉，蜜大丸重一錢。硃砂為衣。

【劑量及用法】每服一丸。不足一歲者服半丸。

瀉白丸

天津

【功能与主治】散風，鎮咳，止渴。主傷風咳嗽，痰涎很多，口渴舌干，鼻塞不通。

【处方】蘇叶 前胡 杏仁(去皮炒) 紫苑 生石膏各三錢 麻黃 桑皮 薄荷 川貝 冬花 蘇仁 甘草各二錢 葶藶子一錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，一錢重。蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】二、三歲服一丸；週歲服半丸；週歲以內酌減。用白開水化服。

白玉丸

一、沙市

【功能与主治】治小兒風熱，咳嗽痰多，喘促等症。

【处方】法半夏 浮海石 川貝母各四兩 制南星一兩

【制法】上藥四味研細末，用生薑八錢，煎湯去渣，以湯汁泛為丸。

【劑量及用法】三月內小兒服一分，三月至六月服二分，六月至一歲服三分，一歲以上服四分，每日服二次，用淡米湯送下。

【禁忌】體弱無痰者忌服。

二、大同

【功能与主治】咳嗽痰喘之症。

【处方】南星 白附子 茯苓 天麻 僵蚕 白芷 竺黃各一兩 半夏 石膏各四兩

【制法】水泛小丸米粒大。

【劑量与用法】每次服五丸，開水化服。

三、禹县

【功能与主治】小兒痰壅，咳嗽吐乳，肚脹疼痛，風痰急驚。

【处方】胆南星 白附子各四兩 半夏 石膏各八兩 明天麻 僵蚕 白茯苓 白芷 天竺黃各二兩

【制法】共為細面，水丸，石膏為衣，小米大。

【劑量及用法】一歲至三歲每服二十丸；四歲至十歲每服四十丸。

【禁忌】孕婦忌用，慢驚忌用。

【備考】有效期二年。

小兒化痰丸

一、上海

【功能与主治】小兒風寒咳嗽，痰涎壅盛。

【处方】天麻(根) 僵蚕(炙) 天花粉 川貝母 橘紅 桔梗 姜半夏 南星(制) 天竺黃各一兩 石菖蒲 薄荷 硃砂各五錢

【制法】共研細粉，用鈎藤二兩煮汁，加煉蜜為丸，每粒潮重五分。

【劑量及用法】兒童用藥，遵醫師指示服用。

二、福州

【功能与主治】治嬰孩傷風，傷寒，驚風，氣喘，潮熱，痰壅，大便熱結等症。

【处方】同上海。

【制法】共研細末，水泛為丸。硃砂衣。

三、杭州

【功能与主治】治小兒感冒風寒，咳嗽氣喘，潮熱痰壅，大便熱閉等症。此丸散風退熱，順氣化痰，價廉效宏。

【处方】天竺黃一兩 薄荷三錢 石菖蒲二錢 廣橘紅六錢 白僵蚕八錢 制南星四錢 川貝母八錢 姜半夏六錢 明天麻三錢 白桔梗 天花粉各六錢

【制法】共研細末，煉蜜為丸，每潮重五分，辰砂為衣。

【劑量及用法】每服一丸，重則加倍。薄荷湯或開水化服。

驚驚咳丸

北京、濟南

【功能与主治】清肺鎮咳。主小兒咳嗽不已，連作數十聲，甚則咯血，音啞，面目浮腫。

【处方】杏仁二兩 牛蒡子一兩 梔子(炒) 大花粉 紫蘇子 生石膏各二兩 甘草四錢 瓜蒌皮二兩 麻黃四錢 青黛一兩 蛤壳二兩 射干一兩 白芥子四錢 細辛二錢 共為細粉兌入：龍涎香五分 麝香二分(濟南缺龍涎香)

【制法】上藥和勻，煉蜜為丸，重四分，金箔為衣。

【劑量及用法】每服一丸，白開水或梨湯送下。

鸛鷀涎丸

一、上海

【功能与主治】小兒頓咳。

【处方】細辛五錢 射干一兩 石膏 蛤壳(煅) 杏仁(去皮尖)各二兩 牛蒡子(炒)三兩 麻黃(去節)八錢 青黛一兩 山梔子(炒焦) 天花粉各二兩 甘草四錢 鸛鷀涎一兩

【制法】共研細粉，加煉蜜為丸，每丸潮重八分。

【劑量及用法】每服一丸，溫開水化服。遵醫師指示服用。

二、杭州

【功能与主治】治小兒感冒風寒，或冷熱時氣致成鸛鷀欬，連聲咳嗽，似哮喘，喘血音啞，面目浮腫等症。

【处方】同上海，分量加倍。

【制法】生晒研粉，將鸛鷀涎和煉蜜打丸，每顆潮重五分。

【劑量及用法】每服一丸。燈心、竹叶湯化服。甚者日再服。

小兒鎮咳散

沈陽

【功能与主治】止咳化痰，鎮咳清熱，定喘止嘔。主風寒咳嗽，內熱咳嗽，熱甚作喘，口燥鼻干，咳甚作嘔，呼吸促迫，煩躁不安等症。

【处方】黃芩 枳殼各一錢半 前胡一錢 桔梗八分 化橘紅二錢 半夏一錢 竹茹 紫菀各一錢半 生石膏三錢 制龍砂八分 杏仁二錢 川貝一錢半 杷叶二錢 百部 瓜蒌皮 薄荷各一錢 蘆根三錢 金銀花一錢半 桑叶 犀角 白前 茅根各二錢

【制法】共研極細面。

【劑量及用法】滿週歲之小兒，每服一分，滿二歲者每服二分，余者按年齡增減服之。開白水送下。

【禁忌】腥辣及熱性食物。

小兒清肺散

一、沈陽

【功能与主治】解毒清火，理肺

化痰。主內熱咳嗽，喘促氣急，傷風鼻塞，發熱惡寒，痰疹不出，神昏驚風等。

【处方】犀角二錢 薄荷 元參 麥冬 羌活各三錢 黃芩五錢 花粉三錢 黃連二錢 川貝五錢 杏仁 前胡 桔梗 京母 桑皮 橘紅 浙夏 麻黃 胆南星 甘草各二錢 茯苓四錢 水片八分

【制法】共研極細面。

【劑量】一、二歲每服一分，四、五歲加倍。姜湯送下。

【禁忌】咸辣食物。

二、撫順

【功能与主治】清肺止咳。主感冒咳嗽，疹後咳嗽，百日咳嗽，支氣管炎等症。

【处方】清半夏 白果仁 川貝母 杏仁 花粉各四錢 清茶葉 大青叶各二錢 青黛 冰片各二分 葶藶子 黃芩各三錢

【制法】共為細面，每付一分重。

【劑量及用量】小兒一週歲，每服一分。開白水送下。

三、撫順(清肺散)

【功能与主治】清肺，消炎，鎮咳。主小兒感冒咳嗽，支氣管炎咳嗽，肺炎咳嗽，百日咳等症，以及小兒發熱咳嗽氣喘，肺熱痰盛。

【处方】制白部 黃芩各一錢半 生石膏一錢 茯苓二錢 制白前錢半 胆星 沉香各一錢 川貝錢半 犀角一錢 法夏錢半 水片 牛黃各二分

【制法】共為細面。

【劑量及用法】小兒一週歲，每服一分，余者酌兒大小服用之。白開水送下。

【禁忌】辛辣。

牛黃清肺散

沈陽

【功能与主治】清肺化痰，消炎止咳。主痰涎壅盛，胸滿肋痛，氣滯喘促，肺熱咳嗽。

【处方】牛黃二分 半夏 川貝母各一錢五分 梅片三分 蓋沉香一錢 茯苓二錢 胆星一錢 白前 百部 黃芩各一錢五分 生石膏一

錢 一角二錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】小兒五歲以下者二分，週歲以下者一分。白開水送下。

【禁忌】辛辣油膩。

清金散

撫順

【功能與主治】清肺，解熱，止咳。主感冒咳嗽，肺炎咳嗽，麻疹咳嗽，傷風流涕，百日咳，扁桃腺炎等症。

【處方】蘆根二兩 川貝母一兩 山梔子一兩 板蘭根 硃砂 琥珀 犀角各四錢 冰片一錢

【制法】共為細面。

【劑量及用法】週歲小兒，每服一分，開水送下。

牛黃清金散

沈陽

【功能與主治】清肺，清心，止咳，鎮驚。主小兒肺熱，咳嗽音啞，喘促痰壅，舌干咽痛，吐乳面赤，四肢抽搐，頭痛身熱，一切咳嗽。

【處方】川貝 黃芩各一錢 生石膏五分 牛黃二分 大花粉 京母各一錢 薄荷五分 冰片二分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服一分，每日三次，白開水送下。

猴棗驚涎散

沈陽

【功能與主治】祛痰利氣鎮咳。主百日咳（又名頻咳，其咳連續不斷，必候腹底乙氣提出，方得氣舒而暫止。又作咳時面色盡赤，胃中泛嘔，涕淚交流，額汗淋漓，劇者兩肋牽痛面目浮腫，聲啞失音或咳血衄血，肌肉消瘦，纏綿難愈，遲延失治，危險特甚，小兒患此症最多，連服一星期可癒）。

【處方】猴棗五分 驚驚涎一錢 冬瓜仁 前胡 海浮石 瓜蒌仁 白前 牛蒡子 麻黃 桔梗 葶藶子各二錢 蘇子二錢 黃芩四錢 炒杏仁 生石膏 川貝各三錢

【制法】共研細面，磁瓶貯藏。

【劑量及用法】三歲以下小兒每服一分，五歲以下小兒每服二分，七歲以下小兒每服三分。白開水送下。

【禁忌】服藥十小時內，忌食辣、腥、冷、粘等物。背部不可感觸風寒，尤須注意。

寧嗽膏

沈陽

【功能與主治】鎮痛解熱，止咳寧嗽。主小兒感冒，頭痛惡寒，嘔吐咳嗽，喘促身熱，驚風抽搐，口燥舌干，面紅目赤，小便短澀。

【處方】麻黃 杏仁 桔梗 甘草 知母 川貝母 冬花 黃芩 紫苑各五錢 黃連一錢 香附二錢 牛胆兩星一兩

【制法】諸藥水浸濃汁，加煉蜜熬膏。

【劑量及用法】每服一茶匙，量兒大小增減之，白開水送下。

【禁忌】大戟、芫花、甘遂、海藻、發物、辣物。

止嗽清宣丹

沈陽

【功能與主治】止咳，定喘，退熱。主小兒感冒，乍寒乍熱，痰壅喘促，咳嗽不安，吐乳身熱，咽喉音啞。

【處方】款冬花七錢 甜杏仁五十粒 蜜桑皮 紫蘇子 橘皮各七錢 五味子三錢 麻黃五錢 甘草一錢 真羚羊角二錢 白果仁七錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸。七分重。

【劑量及用法】每服一丸。三、四歲酌服半丸。白開水送下。

【禁忌】生冷油膩。

九寶丹

濟南

【功能與主治】主小兒肺經不調，痰喘咳嗽，感冒風寒，身熱頭痛，鼻流清涕，畏怕風寒。

【處方】薄荷一兩 陳皮 蘇子各二兩五錢 麻黃（炙） 桂枝尖 甘草各八錢 杏仁 桑皮各一兩五錢 腹反二兩

【制法】大腹皮燉熟，兌蜜為丸，每丸重一錢。

【劑量及用法】週歲以上每服一丸，週歲以下半丸，白開水化服。

小兒止嗽金丹

一、天津

【功能與主治】解熱潤肺，化痰止咳。主傷風發燒，咳嗽黃痰，口干舌燥，腹滿便秘，久嗽痰盛。

【處方】元參（去蘆） 麥冬 杏仁（去皮炒）各四兩 炒蘇子二兩 焦板榔一兩 胆星四兩 知母 蘇子各二兩 桔梗 竹茹粉 生桑皮 川貝 花粉 生薑仁 甘草各三兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，一錢重。蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】週歲以上每次服一丸；週歲以內酌減。白開水化服。

二、蘭州、濟南

【功能與主治】解熱，止咳，化痰。主傷風咳嗽，嘔吐痰液，口干舌燥，咽喉疼，發燒口渴，胸中滿悶等症。

【處方】元參（濟南作四錢） 麥冬 杏仁各四兩 焦板榔三兩 胆星四兩 知母 蘇子 蘇子各二兩 桔梗 竹茹粉 桑皮 川貝 花粉 薑仁 甘草各三兩

【制法】共研細面，蜜丸一錢重。蜡皮封固。

【劑量及用法】週歲以下每服半丸；週歲以上每服一丸。白開水送下。

【禁忌】辛辣。

兒科嗽靈丹

濟南

【功能與主治】咳嗽痰多，胸滿聲啞。

【處方】廣陳皮 枳殼 桑皮 制杏仁 桔梗 黃芩 知母各四兩 百部一兩 麥門冬 胆星 化橘紅各四兩 天竺黃二兩 半夏四兩 粉甘草二兩 川貝母四兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，每丸重一錢，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

妙 灵 丹

一、北京、承德

【功能与主治】解热化痰安神。主小兒發熱，痰涎壅盛，惊悸不安，咳嗽氣促。

【处方】天竺黄 胆南星 牛石 芎 殭蚕各七兩 桔梗二兩 連翹 合銀花各四兩 薄荷 貝母 桑叶 黄芩 杏仁各二兩 生地四兩 甘草 蟬蛻 釣藤各一兩 共为細粉，每五、五兩細粉兌：麝香 冰片 各六錢 硃砂二兩

【制法】上藥和勻，煉蜜为丸，重五分。蜡皮封固。

【剂量及用法】每服一丸，日服二次，溫开水送下。三岁以下者酌情遞減。

【禁忌】忌食油膩。

二、天津、蘭州、济南

【功能与主治】清热化痰，散風鎮惊。主感冒發燒，頭痛眩暈，內熱咳嗽，嘔吐痰沫，鼻干口燥，咽喉腫痛，小便不利。

【处方】川貝 橘紅 生地 元參(去蘆)各八錢 制半夏 桔梗 薄荷 赤芍 天麻 釣藤 制南星 羌活 前胡 葛根 木通各六錢 共为細粉，每細粉九兩八錢兌：硃砂面五錢 冰片一錢 羚羊粉五分 犀角粉五分

【制法】以上研細和勻，煉蜜为丸，五分之，每斤丸藥用硃砂面三錢上衣，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量与用法】週岁以上每次服一丸，週岁以下酌減。白开水化服。

三、呼和浩特

【处方】赤芍 竹黄各二兩 牛蒡子一兩五 大黃八錢 南星二兩 川芎八錢 全蠍一兩五 花粉 連翹各八錢 麻黄二錢 防皮八錢 桔梗二兩 云苓一兩五 天虫二兩 白朮 毛橘紅各八錢

【制法】每料兌：琥珀 硃砂 冰片 牛黃 人參 蜜大丸，重五分。滿个丸，蜡皮。

百日咳新葯

一、沈 陽

【功能与主治】清肺化痰，杀菌

止嗽。主初起鼻腔癢痒，灼热噴嚏，臉腫充血，喉痒咳嗽，甚則連咳不休，早醒攀性反复不已之短嗽，無吸氣之暇，持續二、三十秒，作笛样之吸氣，夜間最甚，吐出玻璃样之粘液，甚則噴血数旬不愈。

【处方】象牙末二分 牛黃五厘 黃連一錢 熊胆一分 梅片五分 人參五分 珍珠一分 硃砂一錢 象皮一錢 麝香五厘

【制法】共碾極細末，收貯磁瓶。

【剂量及用法】每服一厘至一分，最輕重酌用。白水送下。一日三次。

【禁忌】發物、五辛。

二、撫 順

【功能与主治】利氣化痰，降氣行痰，瀉肺火，散肺風，消痰解痞。主唾如膠漆，噎氣不除，每咳作嘔，甚則咳血，面浮腫。

【处方】制麻黄七錢 生山梔二錢 北細辛一錢五分 五爪紅四錢 葶藶子二錢 炒杏仁四錢 北五味二錢 制桑皮二錢 清夏四錢 生石黃七錢 制紫苑二錢 生黃芩一錢 生甘草三錢 制復花四錢

【制法】共为細面。

【剂量及用法】本藥局小兒每次服半分，滿週岁服一分，兩岁至三歲服一分五厘，四岁至六岁服二分，七至八岁服三分，九至十岁服四分，十至十五岁服五分。日服二回，白水送下。

【禁忌】忌口。

胃 腸 病 类

小兒健脾丸

一、西 安

【功能与主治】主治消化機能不潔，食積不化，胃呆不思飲食，腸內寄生虫(蛔虫、蟯虫等)。並有止瀉、強壯作用，宜于經常服用。

【处方】黃朮三兩 云苓三兩 蓮肉 芡實 山藥 广皮各二兩 东棗三兩 六神麵一兩六錢 使君子 內金各二兩 杭芍一兩四錢 炙草八錢 澤瀉八錢

【制法】共制为細面，煉蜜为丸，每丸重一錢。

【剂量及用法】每天二、三次。

胃 腸 病 类

岁至三歲每次四分之一丸；三歲至五歲每次三分之一丸；五歲至九歲每次二分之一丸。溫开水化服，在飯后或吃奶以后服用。

【禁忌】热性病消化不良勿服。

二、蘭 州

【功能与主治】開胃，止瀉。主治小兒消化不良，腹瀉不止，虛弱腹痛，飲食不進。

【处方】潞党参一兩 白朮一兩 云苓 砂仁 蓮子 薏米 建糖 东棗 麦芽各五錢 肉蔻二錢 訶子三錢 炙草 陈皮 山藥 扁豆各五錢 內金四錢

【制法】共为細面，蜜大丸一錢重。

【剂量及用法】每服一錢，白开水服。

【禁忌】生冷。

健脾肥兒丸

大 同

【功能与主治】消化不良，脾胃虛弱。

【处方】人參二兩 於朮一兩五錢 云苓一兩 炙草五錢 广皮一兩 薏仁一兩 建蓮五錢 扁豆一兩 山藥一兩五錢 山楂十兩 神曲 麦芽各二兩 澤瀉三錢 芡實一兩 藿香三錢 桔梗三錢 炮姜二錢 糯米四兩 白糖十兩。

【制法】共研細面，煉蜜为二錢大丸。

【剂量及用法】早晚每服一丸，开水送下。

消 补 丸

禹 县

【功能与主治】消化不良，乳食不進，食积奶积，腹疼膨脹，积滯吐瀉。

【处方】南山楂 枳实 砂仁 麦芽 檳榔 穿山甲各四兩 炒神曲 白朮 山藥 厚朴 广木香 白茯苓 澤瀉 防皮 黃連各二兩 甘草一兩

【制法】共为細面，水丸如入米大。每包三分。

【剂量及用法】每服二包。一岁至二岁服半包；三歲至四岁服一包。

白开水送下。日服二次。

【禁忌】胃弱忌用。

【备考】有效期一年。

燒針丸

一、西 安

【功能与主治】主治小兒脾胃机能紊乱，嘔吐、瀉泄，时輕时重。

【处方】黄丹 硃砂 枯矾各等分

【制法】共为極細面，用大棗肉和为丸，如桐子大。

【剂量及用法】一岁小兒每次服二、三丸，一天二次。量兒童大小酌情加減服用。用鉄針扎藥丸，放灯上燒存性，研爛，飯湯或用开水調服。不可在煤油上燒。

【禁忌】热性病勿服。

二、蘭州、洛陽

【功能与主治】安定神經，止腹瀉。主小兒水瀉。

【处方】同西安。

【制法】共为細面，聚泥为丸，如大梧桐子大，扎眼。

【剂量及用法】每服五分，一日三次，开水送服。

【禁忌】生冷油腻。

三、大 同

【功能与主治】下瀉症。

【处方】硃砂一兩 枯矾三錢 黄丹二錢

【制法】紅棗肉为丸如豆大，刺針上，于灯上燒存性米湯調服。

【剂量及用法】一岁以上服三丸。

四、吉林、哈尔滨

【功能与主治】止瀉。主小兒脾虛泄瀉，經久不愈，瀉泄青白，面蒼体瘦，泛嘔不食，青筋暴露。

【处方】同西安。

【制法】共为細面，大棗肉搗爛为丸，如黃豆大。丸上各戳一針眼。

【剂量及用法】每服三、四丸。戳針尖上，油灯火上燒存性，研爛，米湯調服。瀉者食前服，吐者不拘時間服。外用綠豆粉調鷄蛋清，吐者敷兩足心，瀉者敷兩門，有神效。

【禁忌】忌食一切不易消化生冷、油腻物品。

五、呼和浩特

【处方】同西安。

【制法】共为細面，聚泥丸，重二分。用針穿一針孔。

附参考古方

【来源】驗方新編

【功能与主治】治吐瀉如神。

【处方】黄丹(水飞) 硃砂(水飞) 枯矾各等分

【制法】为末，紅棗为丸，黃豆大。

【剂量及用法】每服三、四丸，戳針尖上灯火上燒存性，研爛，淘米水調服，瀉者食前服，吐者不拘時服。外用黃豆磨成粉，調鷄蛋白，吐者敷兩足心，瀉者敷兩門神效。

福幼理中丸

天 津

【功能与主治】扶气健脾，溫中驅寒。主脾虛气弱，嘔吐久泄，面色萎黃，身体消瘦，精神不振，食慾缺乏。

【处方】人參(去蘆)二兩 炒棗仁 枸杞子各一兩 熟地二兩 干姜 白朮(麸炒) 生黃芪各一兩 當歸 山萸肉(酒制)各五錢 故紙(盐炒)一兩 核桃仁五錢 生白朮一兩 肉桂(去粗皮)五錢

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，一錢重。每斤丸約用硃砂面二錢上。衣。蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，週岁以内酌減。白开水化服。

【禁忌】忌食寒涼、生冷、油腻。积滯吐瀉忌用。

啓脾丸

一、北 京

【功能与主治】健胃止瀉。主腸胃虛弱，腹脹久瀉。

【处方】人參(去蘆) 白朮 茯苓 山藥 蓮子各一兩 澤瀉 橘皮 甘草 山楂各五錢

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，重一錢。

【剂量及用法】每服一丸，日服二次，溫开水送下。小兒三岁以下者酌情遞減。

【禁忌】忌食生冷。

二、天津、蘭州

【功能与主治】健胃消食，止瀉利尿。主腸胃衰弱，消化不良，嘔吐便瀉，腹脹腹痛，小便不利，面色萎黃。

【处方】党參(去蘆)八兩 厚朴(姜制)二兩 青皮(醋炒) 陈皮各一兩 白朮(麸炒)八兩 砂仁一兩 神曲(麸炒) 炒麦芽 甘草各四兩 豬苓 茯苓(去皮)各八兩

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，一錢重。蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】一至二岁每次服一丸，週岁以内酌減。白开水化服。

【禁忌】忌食生冷、硬食；痢疾初起忌用。

三、大同(小兒啓脾散)

【功能与主治】小兒脾胃衰弱，久瀉，神疲，面黃肌瘦，食物不化，消化不良。

【处方】党參 蓮子 茯苓 山楂 山藥各一兩 陈皮 神曲 白朮 澤瀉 麦芽各五錢

【制法】共为細末，煉蜜为丸，每丸一錢。

【剂量及用法】未滿週岁小兒每次服半丸，週岁以上者每次服一丸。日服二次。

四、济 南

【功能与主治】小兒胃腸衰弱，腹脹便泄。

【处方】党參 蓮肉 山藥各一兩 陈皮八錢 神曲八錢 茯苓一兩 麦芽五錢 山楂一兩 白朮一兩 澤瀉八錢 炙甘草五錢

【制法】以上十一味，共为細面，蜜丸一錢重。

【剂量及用法】一岁以下服半丸；一岁以上服一丸。白水送下。

【禁忌】忌生冷及过硬不易消化等食物。

五、沈 陽

【功能与主治】理脾健胃，滋補強壯。主消化不良，食慾不振，胸腹滿痛，嘔吐糟粕，体倦神疲，面黃肌瘦，便頻下痢，脾虛气短，小兒病后脾胃虛弱，泄瀉腹脹。

【处方】同北京。

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸，二錢重。

【剂量及用法】每服一丸，米湯送下。小儿減半。

【禁忌】忌食生冷硬物。

六、呼 和 浩 特

(人參啟脾丸，附：
加料啟脾丸)

【处方】人參 炙草各五兩 山藥(土炒) 山楂(土炒) 蓮肉 廣陳皮 白朮(土炒) 茯苓 澤瀉各一斤四兩 神曲一斤 扁豆四兩

【制法】蜜大丸，重一錢。紙包，蜡皮封固。

【備考】加料啟脾丸照前方每料再加於朮四兩 砂仁三兩

附參考古方

【來源】醫學入門。

【功能與主治】治大人、小兒脾積、五更瀉，消疳黃脹，定腹痛。常服生肌，健脾益胃。

【处方】人參 白朮 茯苓 山藥 蓮肉各一兩 陳皮 澤瀉 山楂 甘草各五錢

【制法】為末，蜜丸彈子大。

【劑量及用法】每一丸，空心米飲化下，或為散服亦好。

天 一 丸

一、天 津

【功能與主治】健脾，利水，止瀉。主脾胃不和，小水不利，肚腹脹滿，心煩口渴，嘔吐瀉痢，小便色如米泔。

【处方】灯心草二兩五錢 滑石 茯苓(去皮)各五兩 猪苓二兩 澤瀉三兩 人參(去芦)一斤

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，一錢重。每斤丸藥用朱砂面三錢上灰。蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，周歲以內酌減。白開水化服。

二、濟 南

【功能與主治】利水，治小兒虛熱丹毒，骨蒸發熱，大便泄瀉，乳食不化。

【处方】灯心一斤九兩 猪苓 茯苓 滑石各三斤二兩 澤瀉一斤十四兩 黨參五斤(去芦頭)

【制法】共軋細面，煉蜜為大丸，

重一錢，朱砂為衣。

【劑量及用法】每次一丸，開水化服。

五味異功散

沈 陽

【功能與主治】健胃和脾。主小兒氣虛，脾胃虛熱，或口舌流涎，驚搖痰嗽，睡時露睛，飲食少思，吐瀉不止。

【处方】人參 白朮 茯苓 甘草 橘皮各一兩

【制法】共軋極細面。

【劑量及用法】量兒大、小酌定。三至五歲每服一錢；成人脾虛亦可服一至四錢。白開水送下。

【禁忌】生冷油膩。

附參考古方

【來源】小兒藥証直訣(異功散)。

【功能與主治】溫中和氣，治吐瀉不思乳食，凡小兒虛冷病，先與數服，以助其氣。

【处方】人參(切去頂) 茯苓(去皮) 白朮 陳皮(剉) 甘草各等分

【制法】上為細末，每服一錢，水一盞、生姜五片、棗兩個，同煎至七分。

【劑量及用法】食前，溫量多少與之。

嬰兒健脾散

大 同

【功能與主治】脾胃虛弱，飲食不進，肌體瘦弱等。

【处方】蓮肉五兩 人參五兩 茯苓五兩 薏米五兩 炙草五兩 白朮三兩七錢 扁豆二兩七錢 砂仁一兩五錢 山藥三兩七錢 陳皮五兩

【制法】共為細面。每袋二錢裝。

【劑量及用法】每服半袋，米湯或姜水送下。

消疳扶脾散

福 州

【功能與主治】專治小兒脾胃虛弱，飲食減少，面黃肌瘦，泄瀉便溏

等症。

【处方】茯苓 淮山藥各二十兩 芡實十兩 炒麥芽五兩 炒蓮子十兩 炒谷芽五兩 炒扁豆 炒薏米各十兩 炒內金 炒福參各五兩

【制法】共研細末，和粳米粉為散。

育 嬰 散

沈 陽

【功能與主治】消食化積，止痛除脹。主小兒吐乳，氣喘咳嗽，腹痛脹滿，消化不良，不思飲食，熱結小便不利，熱極驚風，胸高氣急，風痰內閉，口爛口渴，痰涎壅塞等症。

【处方】台黨參 檳榔炭 黑白二丑炭 野軍各一兩 朱砂三錢

【制法】上藥共軋極細面，後入朱砂細研。

【劑量及用法】初生兒每服一厘至一分；彌月後一分至二分。白開水送下。

健 胃 散

沈 陽

【功能與主治】健胃整腸，止瀉利濕。主腹痛泄瀉，嘔吐反胃，消化不良，食欲減退，久瀉使瘡，慢性痢疾。

【处方】人參 油朴各三錢 茯苓 砂仁各四錢 蒼朮六錢 麥芽四錢 清夏三錢 草果二錢 藿香 石榴皮 紫菀各三錢 血琥珀 川芎各二錢 朱砂 白朮 甘草各三錢

【制法】共軋極細面。

【劑量及用法】小兒六個月內服半分，周歲內一分；二歲二分；三歲三分。大一年加量一分。

【禁忌】肉類、油膩、冷食。

小兒千金散

蘭 州

【功能與主治】暖腹開胃，殺蟲，止瀉。主小兒消化不良，腹瀉不止，腹痛虛弱，殺腸寄生蟲。

【处方】白朮一兩 云苓七錢 砂仁三錢 檳榔五錢 枳殼一錢 山藥八錢 君子仁五錢 山楂 麥芽 陳皮 建櫚各三錢 榧子四錢 內金五錢 川朴三錢 官桂四錢

薏米 藟參各五錢 柿蒂 小茴香
炙草各一錢

【制法】共研細末，每服一錢。

【禁忌】生冷油膩。

小兒消熱散

沈 陽

【功能与主治】消食化積，健脾退熱，鎮驚，和胃，止嘔。主乳食停滯，不思飲食，肚腹脹滿，潮熱晡熱，目赤口干，鼻中出血，口唇潰爛，煩躁不寧。凡因實火內熱，引起的一切疾病。

【處方】山楂炭五錢 枳殼二錢 內金 廣皮各二錢 川軍二錢 厚朴一錢半 板榔一錢半 黃芩一錢半 夏一錢 白芍二錢 胆草 薄荷各一錢半 梔子 木通 廣角各一錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】滿一歲小兒每服一分，滿三歲小兒每服二分，余者酌量增減之。

【禁忌】辛熱、硬物。

小兒化滯散

沈 陽

【功能与主治】清熱導滯，整腸除痢。主飲食不節，積滯成痢，大便窘迫，里急後重，腹中絞痛，或便膿血，下如魚腦。

【處方】生白芍六錢 當歸 板榔 枳殼 萊菔子 車前子 黃芩各三錢 黃連 粉甘草 焦楂各二錢 伽南香一錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】五歲以下者三分至五分；五歲以上者五分或一錢，酌量用之。紅者白糖水送下；白者紅糖水送下。

【禁忌】生冷食物。

一金散

一、沈 陽

【功能与主治】清火消食，化積導滯。主胎火內熱，積滯吐乳，腹痛多啼，驚風咳嗽，身體煩躁，大便燥結，尿如米泔，口瘡流涎，鼻赤腫痛，一切實火。

【處方】炒黑丑 藟參 炒白

丑各一兩 生甘草八錢 川大黃一兩 硃砂三錢 金箔二十個 琥珀三錢 雞內金五錢 龍胆草一錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服一分，開白水送下。

【禁忌】忌生冷硬物。

二、撫 順

【處方】人參 板榔 大黃 白丑 黑丑各一兩 硃砂少許

【制法】共為細面。

丁香散

沈 陽

【功能与主治】補胃健脾。主小兒久痢赤白，羸瘦不食，脫肛等症。

【處方】丁香 厚朴 黃連 訶子肉 白朮 伏龍肝各五錢 木香一錢 赤石脂一兩

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服五分，米湯調下，每日三、四次。量兒大小，隨意加減。

溫脾固腸散

大 同

【功能与主治】脾胃虛弱，久泄可用。

【處方】白朮 扁豆 車前子各三錢 肉蔻 訶子肉 蓮肉 薏米炒山藥各二錢 炙草錢半 高麗參二錢 廣木香一錢 粟壳三錢

【制法】共研極細末，每包七分。

【劑量及用法】早晚每服一次，黑糖、淡姜湯送下。

止瀉分清散

沈 陽

【功能与主治】利濕止瀉，健胃整腸。主小兒傷食，胃弱作瀉，胸腹脹滿，小便短少，長夏濕熱內郁，久瀉不止。

【處方】蒼朮二錢 厚朴一錢 廣砂仁五分 干姜一錢 黃連五分 茯苓 赤苓 澤瀉各二錢 琥珀五分 竹叶一錢 清夏一錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】週歲每服一分，三至五歲每服二分。白開水送下。

【禁忌】生冷硬物。

止瀉散

西 安

【功能与主治】主治小兒腸胃機能衰弱，瀉泄稀水，帶有未消化食物以及各種慢性腸炎。

【處方】黨參 白朮 扁豆 山藥 云苓 澤瀉 薏米 蓮肉 陳皮 甘草各一兩

【制法】共研為極細面。

【劑量及用法】一歲小兒每次二至三分，一日二、三次，用飯湯或溫開水化服。

小兒痢疾散

天 津

【功能与主治】消滯整便。主飲食不調，過食生冷，紅白痢疾，腹疼下墜，不思飲食。

【處方】黃連 赤芍各三錢 山楂四錢 廣木香 茯苓(去皮)各三錢 熟軍二錢 石蓮肉 白朮(數炒) 板榔 生山藥 生白芍 枳殼(數炒)各一錢 甘草一錢五分

【制法】共研細粉，五分重裝袋。

【劑量及用法】每次服一袋，日服二次。週歲以內酌減。白開水化服。

【禁忌】腥冷油膩。

白朮膏

沈 陽

【功能与主治】利水消積，健脾助胃。主治小兒傷乳停食，胃弱脾虛中氣不足，小便不利，寒濕腹痛，泄瀉不止。

【處方】人參 白茯苓 白朮各二錢 白豆蔻七分 砂仁十個 肉豆蔻二枚 山藥五錢 廣木香一錢 甘草二錢

【制法】共熬成膏，加煉蜜收成膏。

【劑量及用法】小兒每週歲服一茶匙，次遞增之。

【禁忌】生冷硬物。

保赤丹

沈 陽

【功能与主治】健胃消食。主四

時感冒，頭痛發熱，傷食傷乳，泄瀉，食積痞塊，各種疳疾，嘔吐酸水，腹痛脹悶，肌肉消瘦。

【處方】柴胡一兩 粉葛一兩 枳殼二兩 厚朴一兩 姜夏三錢 廣皮五錢 黃連三錢 杭芍一兩 木香三錢 車前一兩 薏米三兩 桔梗五錢 黃芩三錢 蒼朮五錢 赤苓三錢 神曲五錢 麥芽五錢 焦楂五錢 益元散一兩五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，七分重。

混元丹

天津

【功能與主治】滋補健胃強脾。主小兒身體衰弱，心悸氣短，食慾不振，消化無力，腹脹脾弱脾瀉。

【處方】紫河車二錢 白梅花 香附(醋制) 桔梗各一兩 滑石二兩 人參(去蘆) 生黃芪各二錢 生山藥三錢五分 茯苓(去皮)三錢 神曲(麩炒)三錢 遠志肉(甘草水制)三錢五分 共為細粉，兌入，硃砂面一兩 麝香一分

【制法】以上研細和勻，煉蜜為丸，一錢重。蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】一至二歲每次服一丸；週歲以內酌減。白開水化服。

保元丹

沈陽

【功能與主治】滋養益氣，扶弱補虛。主氣血不足，嬰兒怯弱，痘毒內陷，面色蒼白，氣陷久瀉，肢體無力，肺脾虛弱，惡寒自汗。

【處方】炙黃耆三錢 人參三錢 炙甘草一錢 黃桂五分

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸。二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，小兒酌減。白開水送下，米湯亦可。

【禁忌】生冷。

育嬰壯脾丹

西安

【功能與主治】主治嬰兒及兒童消化機能衰弱，腹脹停食不化。

【處方】內金三兩 烏虫一兩

芡實二兩 白朮二兩 枳殼二兩 枳榔一兩半 六神三兩 麥芽三兩 梔子二十個 君子肉一兩半 薏米二兩 鍋巴八兩

【制法】共研為極細末。

【劑量及用法】一歲小兒每次三分至五分，其他按年齡增減之。每次服量最多不要過一錢。每天服用二次，食後開水化服，或加紅糖，蜂蜜少許混合服用。

【禁忌】熱性病忌服。

小兒化食丹

濟南

【功能與主治】主傷風傷乳，腹脹便秘，肚大青筋，紅白痢疾等症。

【處方】焦神曲 焦山楂 焦麥芽 焦枳殼各一兩 莢朮三錢 各五錢 炒白朮 焦黑朮 大黃各一兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重五分，蜡皮封固。

【劑量及用法】週歲每服一丸；週歲以上者每服二丸。白開水送下。

【禁忌】辛辣油膩等物。

小兒至寶丹

一、天津

【功能與主治】解熱健胃，止嘔止瀉。主身體發熱，腹瀉便泄，嘔吐脹滿，赤白痢疾。

【處方】厚朴(姜制)四錢 炒蒼朮三錢 制半夏四錢 桔梗 黃連 藿香各三錢 山楂五錢 陳皮 芥穗各四錢 廣木香二錢 砂仁四錢 炒麥芽 花粉 枳殼(麩炒) 甘草 人黃 木通各二錢 共為細粉，兌入，硃砂面 冰片各二錢

【制法】以上研細和勻，煉蜜為丸，五分重。蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】一至二歲每次服一丸；週歲以內酌減。白開水化服。

二、沈陽(育嬰至寶丹)

【功能與主治】健胃消食，整腸化滯。主小兒傷食停乳，嘔吐泄瀉，腹中疼痛，脾虛下利，食積吐酸，消化不良，身熱煩躁，一切食火。

【處方】六神八錢 麥芽 山楂 桔梗各六錢 前胡 枳殼 陳皮 砂仁各五錢 紫豆蔻 厚朴各三錢

甘草二錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，七分重。硃砂為衣。

【劑量及用法】週歲以上，每服一丸。白開水送下。

【禁忌】魚肉、生冷、硬物。

三、撫順

【功能與主治】健胃整腸。主胃腸虛弱，消化不良，嘔吐瀉泄，腹痛嘈雜。可以常服，增進飲食。

【處方】山楂六錢 神曲五錢 桔梗六錢 陳皮五錢 甘草二錢 前胡 川朴 砂仁 枳殼 萊菔各五錢 麥芽六錢 三稜 莢朮 蒼朮 香附 草薢各五錢

【制法】共為極細面，蜜丸七分重。

【劑量及用法】四歲以上小兒每服一丸；週歲至三歲小兒每服三分之一或半丸。

【禁忌】油膩、辛辣、硬物。

四、吉林、哈爾濱

(嬰兒至寶丹)

【功能與主治】健脾消食。主脾胃虛弱，消化不良，嘔吐泄瀉，腹痛嘈雜。

【處方】神曲 麥芽 山楂 桔梗各六錢 前胡 枳殼 厚朴 廣皮 砂仁各五錢 白朮三錢 甘草二錢

【制法】共為細面，煉蜜為七分重丸，硃砂為衣，用瓷罇貯存。

【劑量及用法】四歲以上每服一丸；週歲至三歲每服半丸；週歲以內每服四分之一丸。

【禁忌】忌食辛辣、油膩。

理脾止瀉丹

濟南

【功能與主治】小兒脾胃不和，瀉痢腹脹。

【處方】白朮九兩 廣陳皮五兩 赤茯苓五兩 川厚朴五兩 豬苓九兩 茅蒼朮五兩 澤瀉九兩 甘草五兩 肉桂九錢 砂仁一兩五錢 車前子二兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重一錢。硃砂一兩八錢為衣，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，白開

水送下。

白朮助胃丹

沈陽

【功能与主治】健胃，除濕，止瀉固腸。主小兒胃弱，嘔吐泄瀉，腹痛脹滿，消化不良久痢脫肛，肌肉瘦弱。

【处方】白朮一兩半 東黨參六錢 白茯苓一兩 炙甘草五錢 白豆蔻十五枚 砂仁四十粒 肉豆蔻四枚 廣木香二錢 生山藥一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為小丸，五分重。

【劑量及用法】周歲以內，每服半丸；一週歲以上一丸；二歲二丸；隨歲遞加。米湯送服。

【禁忌】肉類脂肪。

香橘丹

一、北京、濟南

【功能与主治】健胃化滯止瀉。主小兒傷乳傷食，腹脹腹痛，嘔吐泄瀉。

【处方】茯苓 蒼朮 白朮 橘皮 香附(制)各十八兩 山藥 半夏 扁豆 薏苡仁 蓮子 枳實 厚朴 山楂(炒) 六神麴(炒) 麥芽(炒)各十二兩 砂仁 澤瀉 甘草各六兩 木香二兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重一錢。

【劑量及用法】每服一丸，白開水或姜湯送下。

【禁忌】忌食生冷、油膩。

二、天津(小兒香橘丹)

【功能与主治】健胃，化滯，止瀉。主傷乳傷食，腹脹腹痛，嘔吐瀉肚，紅白痢疾。

【处方】橘紅 廣木香 青皮(醋炒)各五錢 神麴(麩炒) 炒麥芽各一兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，一錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，週歲以內酌減。白開水化服。

【禁忌】寒涼硬食。

三、西安(小兒香橘丹)

【功能与主治】主治腸胃虛弱，

消化不良，胃口不開，慢性腸胃炎。

【处方】云苓 蒼朮 陳皮 白朮各九錢 法夏 山藥 扁豆 薏米各六錢 蓮肉六錢 香附九錢 砂仁三錢 枳實六錢 川朴六錢 木香錢半 澤瀉三錢 東棗 神麴 麥芽各六錢 生草二錢

【制法】煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】一歲小兒每次服五丸，一天二次。其他按年齡增減之。

【禁忌】便秘者勿服。

四、大同

【功能与主治】小兒脾胃衰弱，吐瀉，久瀉，久痢，大小便不分。

【处方】【制法】同北京

【劑量及用法】未滿週歲兒，每丸分二次，週歲以上者服一丸，日服二次。

【禁忌】忌食生冷之物。

五、呼和浩特

(小兒香橘丹)

【处方】砂仁 藿香 神麴 蒼朮 麥芽 扁豆 川朴各四兩 枳實 澤瀉 陳皮 白芍 青皮 赤苓各二兩 木香 甘草 訶子肉各一兩

【制法】共為細面，蜜大丸，重一錢。

至寶錠

一、北京、濟南

【功能与主治】解熱，消導，化痰。主小兒停乳傷食，外感風寒，發熱咳嗽，嘔吐泄瀉。

【处方】橘皮 山楂 麥芽 白附子 全蠍 蟬蛻 天麻 羌活 鉤藤 枳殼 殭蠶 紫蘇葉 薄荷 藿香 貝母 胆南星各五十兩 白芥子二十兩 滑石五十兩 六神麴 茯苓各一百兩共為細粉，兌：黃六錢 麝香 冰片各四錢 硃砂十二兩 雄黃五兩 琥珀二兩

【制法】上藥和勻，煉蜜為錠，重五分。

【劑量及用法】每服一錠，日服三次，溫開水或焦三仙熬水送下。小兒三歲以下者酌情遞減。

【禁忌】忌食生冷油膩之物。

二、天津(小兒至寶錠)

【功能与主治】解熱健胃消導。主小兒宿食停乳，感冒發燒，咳嗽嘔吐，腹脹腹痛，消化不良，瀉肚痢疾。

【处方】廣陳皮 淡全蠍 鉤藤 薄荷葉 滑石 山楂 蟬蛻 枳殼 藿香 炒麥芽 天麻 炒殭蠶 貝母 羌活各五兩 神麴(麩炒)一斤四兩 胆星 蘇葉各五兩 伏苓(去皮)一斤四兩 制白附子五兩 炒白芥子二兩 共為細粉兌入：牛黃六錢 麝香 冰片各四錢 雄黃面五兩 琥珀面二兩 硃砂面十二兩

【制法】以上研細和勻，煉蜜為丸，五分重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，週歲以內酌減。白開水化服。

一、北京、承德

【功能与主治】消積化滯祛痰。主停食，停水，停乳，痰盛，腹滿，便秘。

【处方】人參 大黃 黑牽牛 白牽牛 枳殼各一兩共為細粉兌入：硃砂二兩

【制法】上藥和勻。

【劑量及用法】每服二分，日服二次，溫開水送下。小兒三歲以下者酌情遞減。

二、天津

【功能与主治】通便清熱，制嘔整腸。主腹肋脹滿，嘔吐痰涎，大便秘結，飲食不振，食積作瀉，胸悶氣滯。

【处方】人參(去蘆) 大黃 枳殼 炒二丑各一兩共為細粉兌入：硃砂面一兩

【制法】以上研細和勻，二分重裝袋。

【劑量及用法】初生小兒，每包四次服，週歲每次服一包，糖水化服。

三、南京(小兒一捻金)

【功能与主治】導滯清熱。主小兒大便秘結，肚腹膨脹，痰壅氣急，面紅唇干。

【处方】生大黃一兩 炒黑丑一兩 枳殼一兩 紅抄參五錢

【制法】共研細末。

【劑量及用法】一歲以內服半分，用蜜水調服。一歲以外，視病情輕重、年齡大小、體質強弱，或加或減，最多不能超過二分。

【禁忌】忌食辛辣、油膩，脾虛體弱者忌服。

四、蘭 州

【功能與主治】鎮靜神經，清理胃腸。主小兒胸膈脹滿，咳嗽氣喘，嘔吐痰沫，肚腹膨脹，不思飲食，大便不通等症。小兒初生未食乳以前，用此藥開口，可解胎毒，預防疾病。

【處方】黨參 大黃 枳榔 二丑 硃砂各一兩

【制法】以上共研細面。

【劑量及用法】初生一個月，每服一分；週歲每服二分。糖水化服。

【禁忌】生冷、油膩。

五、大 同

【功能與主治】食積不化，冷熱不和。

【處方】大黃二兩 枳榔一兩 二丑一兩 胡參二錢

【制法】共為細面，每包五分。

【劑量及用法】每包分二次服，清水調服。

六、禹 縣

【功能與主治】小兒痰壅，氣喘咳嗽，肚腹膨脹，不思飲食。

【處方】黑白丑五錢 黨參五錢 枳榔五錢 大黃五錢

【制法】共合細面。

【劑量及用法】一歲每服二分，三歲每服四分。溫開水送下。

【禁忌】體弱者忌用。

七、濟南(小兒一捻金)

【功能與主治】停乳嘔吐，痰涎壅盛。

【處方】生大黃 枳榔 黑丑 白丑各一兩 硃砂五錢 台參五錢 赤金十張

【制法】共研細粉，合勻裝瓶，淨裝一分，蜡封。

【劑量及用法】一歲以下每服五厘(半瓶)；一歲以上每服一分(一瓶)。空腹時蜜水調服。白水送下亦可。

【禁忌】辛辣、油膩、腥羶等物。

小兒脾虛胃弱及患慢脾風症忌服。

八、沈 陽

【功能與主治】消食化滯，消脹止痛。主腹脹便秘，開口吐沫，不能吮乳，或乳食過飽，停乳溢乳，腹滿，大便稠粘，脾虛泄瀉，痢疾，咳嗽喘息，熱極抽搐等。

【處方】人參一兩 黑白丑各一兩 枳榔一兩 野大黃一兩 硃砂二錢

【制法】共碾極細面，后兌硃砂細研。

【劑量及用法】初生兒，每服半分；嬰兒一分至五分。開白水送下。

九、撫 順

【功能與主治】瀉下消食。主停乳食積，消化不良，腹痛腹滿，胃痛嘔吐，不思食物，睡臥不安，大便秘結，小便不利。

【處方】白人參 枳榔 大黃 白丑 黑丑各一兩 硃砂一錢

【制法】共為細面。

【劑量及用法】乳兒時將此散半分，用乳汁調稠抹于乳頭上，令兒吮之；週歲以上者水調服一分；三歲以上者服一分半至二分。以便行一至二次為度，大便不行再服。

【禁忌】忌食生冷、油膩。

十、吉林(人參一捻金、一捻金散、八仙牛膠散)

【功能與主治】能促進大腸蠕動，能消能降，故為優良之瀉劑。主胃腸積滯，消化不良，大便燥結，小便不利等症。

【處方】野軍二兩 黑丑二兩 白丑二兩 人參二兩 枳榔二兩

【制法】將上藥干燥后碾為細面，用細絹篩二次，碾極細為度。

【劑量及用法】大人每服二錢，三歲以上者服六、七分；週歲以上者服三、四分；未滿週歲者每服一、二分。用乳汁調服或抹于乳頭上令兒吮之皆可。如兒稍大一點以水調服。或用糖水調服更妙。

十一、哈爾濱(一捻金散又人參一捻金)

【功能與主治】消食化積，乳食積聚，消化不良，肚腹膨脹，胸膈氣急，嘔乳嘔逆，不思飲食，睡熱自汗，

睡臥驚醒，大便秘結，小便不利。

【處方】野軍二錢 黑丑二錢 白丑二錢 人參二錢 枳榔二錢

【制法】共碾為細面，絹羅篩過，玻璃瓶存貯。

【劑量及用法】如系乳兒，宜將此散一、二分以乳汁調稠，抹于乳頭上，令兒吮之。如系已斷乳小兒，週歲以上者水調服三、四分；三歲以上者服七分，以大便行一、二次為度。大便不行者，再服。

【禁忌】忌食生冷、油膩。

十二、承 德

【功能與主治】消積化滯祛痰。主停食停水停乳，痰盛，腹滿，便秘。

【處方】人參 大黃 黑牽牛 白牽牛 枳榔各十兩 共為細粉，兌硃砂二兩

【制法】上藥和勻。

【劑量及用法】每服二分，日服二次，溫開水送下。小兒三歲以下者酌減。

附參考古方

【來源】醫宗金鑑

【功能與主治】不乳。

【處方】大黃(生) 黑丑 白丑 人參 枳榔各等分

【制法】上為細末。

【劑量及用法】每少許，蜜水調服。

一 字 金

禹 縣

【功能與主治】食積乳積，停食發熱，肚腹硬疼，大便閉結。

【處方】黨參五兩 金礞石一兩 大黃四兩 巴豆霜四兩 青皮一兩 枳枝二兩 紅袖四兩

【制法】共為細面，每包重三分。

【劑量及用法】三歲至五歲服半包；八歲至十歲服一包。涼開水和紅糖送下。

【禁忌】孕婦及虛弱者忌用。

【備考】有效期二年。

八 珍 糕

一、上 海

【功能與主治】兒童腸胃薄弱，消化不良便溏。

【处方】党参二兩 白朮(炒)二兩 陈皮一兩五錢 茯苓 蓮肉 薏苡仁 扁豆(炒) 芡实各六兩 粳米(炒熟)七斤半 糯米(炒熟)七斤半 白糖十斤

【制法】共研細粉，加白糖十斤和勻，入模成糕。

【剂量及用法】每次服三塊至五塊，嚼服。

【禁忌】忌食生冷及不易消化之物。

二、杭州

【功能与主治】补元益气，开胃健脾。小兒体弱，消食止瀉，香甜可口，而無葯气，飢时常食，肥兒良剂。

【处方】陈米(炒)七斤八兩 怀山药(炒)八兩 春砂仁一兩 蓮子肉(炒)八兩 芡实(炒)八兩 薏苡仁(炒)八兩 白茯苓八兩 白扁豆(炒)八兩

【制法】共研細末，每粉十斤，加白糖七斤八兩，和印成糕。

【剂量及用法】飢时常服之。

肥兒糕

沈陽

【功能与主治】养元气，健胃腸，进飲食。主腹脹泄瀉，虛勞瘦怯。

【处方】白茯苓(去皮) 怀山药 芡实仁 蓮肉(去心皮)各四兩 共为細面 陈倉米半升 糯米半升 白砂糖一斤半

【制法】先將葯面盛麻布袋放入鍋內蒸極熟，取出，再入白糖，同攪極勻，摻作一塊用小木印，印作餅子，晒干收用。

【剂量及用法】随意服用。

疳积类

小兒化积丸

禹县

【功能与主治】食积乳积，膨滿肚痛，气滯痞塊，消化不良。

【处方】丁香一兩五錢 木香 玄胡 檳榔 青皮各一兩五錢 香附六兩 巴豆霜四兩五錢 三稜 蓬朮 大黃 东查各二兩

【制法】共为細面，水丸，紅袖为衣

【剂量及用法】每服三分，冷开水送下，一、二岁服五丸。

【禁忌】孕妇及虛弱者忌用。

【备考】有效期二年。

小兒紫霜丸

濟南

【功能与主治】小兒惊癇积聚。

【处方】代赭石(煨) 赤石脂各一兩 杏仁 去油巴豆霜各五錢

【制法】共为細面，煉蜜为丸，重二分。

【剂量及用法】周岁小兒，每服一粒，十岁六粒。不宜多服。

肥兒丸

一、北京、天津

【功能与主治】消积杀虫。主小兒食积虫积，消化不良，面黃肌瘦。

【处方】炒麦芽 胡連 肉豆蔻(滑石煨) 神曲 檳榔各五錢 广木香二錢 白朮五錢 山楂 枳实各二錢 使君子仁五錢

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，一錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，週岁以內酌減，白开水化服。

【禁忌】生冷油膩。

二、上海(疳积丸)

【功能与主治】疳积

【处方】同北京(但枳实作枳壳)。

【制法】共研細粉，煉蜜为丸，每粒潮重一錢五分。

【剂量及用法】遵医师指示服用。

【禁忌】生冷、油膩物。

三、福州(五疳肥兒丸)

【功能与主治】治小兒脾虛，疳积，面黃体瘦，大腹膨脹，一切积滯。此丸杀虫退热。

【处方】白朮 茯苓 山药 連翹 神曲 枳实 檀肉 蓮子 扁豆 麦芽 谷芽 谷虫各一兩 香附 丹皮 地骨各八錢 青皮 米仁各六錢 党参 銀柴胡 川朴 澤瀉 砂仁各五錢 木香二錢

【制法】共为細末，冬蜜为丸。

【剂量及用法】每服三錢米飲

下。

四、杭州(消痞肥兒丸)

【功能与主治】治小兒脾胃虛弱，杂食生冷油麵，致成痞积，面黃肌瘦，潮热食少，青筋綻露，腹大坚痛，大便泄瀉等症。此丸健脾益胃，消痞杀虫，久服令兒肥健。

【处方】炒冬朮一兩 使君子肉(炒)三錢 炒山楂 怀山药 芡实各五錢 广陈皮三錢 川黃連二錢 焦麦芽 白茯苓各五錢 炒米仁一兩 澤瀉三錢 建神曲 白扁豆各七錢 广藿香二錢

【制法】共研細末，煉蜜为丸，每潮重二錢。

【剂量及用法】每服一丸。米飲湯或开水化服。每日早晚各服一次。

五、昆明(健脾肥兒丸)

【功能与主治】清肝，化虫，健脾，开胃。

【处方】炒芍药二兩 蕪荑一兩五錢 焦楂 青皮 甜苜蓿 炒白芍各二兩 漂白朮四兩 胡連一兩五錢 广木香八錢 炒麦芽二兩 檳榔 石斛 生草各二兩 洋糖肉三兩

【制法】研末煉蜜为丸。

【剂量及用法】每服一丸(三岁以下減半，开水調服)。

【禁忌】忌生冷、香燥。

六、禹县

【功能与主治】脾胃虛弱，面黃發热，嘔吐瀉痢，积滯肚脹，乳食不消，伤食瘦弱，消痞杀虫。

【处方】潞党参一兩五錢 土炒白朮五兩 胡黃連五兩 茯苓二兩 使君子四兩 山楂肉二兩五錢 黃連二兩 神曲 麦芽各三兩五錢 甘草 蘆薈各一兩五錢

【制法】共研細面，水丸。

【剂量及用法】一岁每服三分。白开水送下。

【禁忌】寒症忌用。

【备考】有效期二年。

七、濟南

【功能与主治】消瘦腹脹，疳积虫积。

【处方】潞党参二兩五錢 蘆薈一兩五錢 甘草二兩五錢 麦芽三

兩五錢 神曲二兩五錢 黃連二兩
山查肉二兩五錢 使君子四兩 茯苓
二兩 胡連五錢 白朮五兩

【制法】共為細粉，水泛為丸。

【劑量及用法】小兒一歲，每服一分，白開水送下。

【禁忌】寒症忌用。

八、沈陽(雞肫肥兒丸)

【功能與主治】健脾整腸助消化。主小兒乳食傷脾，腹脹氣悶，嘔吐泄瀉，面黃肌瘦，食物不消，枯干羸瘦等症。

【處方】白朮一兩 茯苓八錢 厚朴 麥冬各四錢 扁豆五錢 芡實八錢 枳實四錢 麥芽 神曲各六錢 蓮肉八錢 胡連二錢 山楂八錢 雞內金四錢 黃連一錢 橘皮八錢 黃芪五錢 麥實一兩 炙甘草 丹皮各三錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸七分重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】生冷硬物。

九、沈陽(消疳肥兒丸)

【功能與主治】健胃殺蟲消疳。主飲食傷脾，泄瀉腹痛，肌肉羸瘦，肚大腹脹，飲食不化，毛髮枯干，津液枯竭等症。

【處方】人參 香附 白朮 雞內金 橘皮 厚朴 使君子 五穀蟲 蒼朮各一錢五分 茯苓二錢 薏仁五錢 神曲一錢五分 麥芽 山楂各二錢 胡連 炙甘草各一錢五分 黃連一錢 當歸五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸七分重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】生冷硬物。

十、撫順(消疳肥兒丸)

【功能與主治】健胃整腸，驅蛔蟲。主胃腸不調，營養缺乏，腹脹青筋，面黃削瘦，嗜食無厭，口臭唇裂，肌瘦發燒，蛔蟲盤裏，腹疼嘔吐等症。

【處方】白人參二兩 白朮一兩 青皮六錢 云苓 香附 蘆薈 神曲各八錢 胡連 川朴各一兩 薏米二兩 陳皮六錢 蒼朮一兩 黃

連二錢 君子仁一兩 當歸二兩 山楂八錢 內金一兩 麥芽八錢 炙草五錢 谷芽一兩

【制法】共為細面，蜜丸一錢重。

【劑量及用法】五歲以上者，每服一丸；五歲以下者服二分之一。白開水送下。

【禁忌】生冷、硬物、魚腥等品。

十一、哈爾濱(消疳肥兒丸)

【功能與主治】消痞殺蟲。主疳疾，由于脾虛食火，積久成疳，症見腹大頸細，青筋暴露，面黃骨立，寐不安寧，骨蒸發燒，嗜食無厭，宿脹，由于食積腸胃，以致脫腹脹大，口臭唇裂，肌瘦發燒；蟲積，由于蛔蟲盤聚，腹內結塊，起伏無定，症見攻串疼痛，寐而驚醒，形消骨立。

【處方】雞內金四兩炒 焦山楂 六神曲 炒麥芽 炒白朮各一兩半 炒君子一兩二錢 黃連 胡黃連 炒谷蟲 揀人參各一兩 茯苓 炙甘草各九錢 炒薏仁八錢

【制法】共碾為細面，煉蜜為七分重丸。

【劑量及用法】一歲以上者每服一丸，三歲以下至一歲者減半，一歲以內者服四分之一，每日可服一、二次。

【禁忌】脾胃寒濕者忌服。

十二、承德(加味肥兒丸)

【功能與主治】消積殺蟲。主小兒食積，蟲積，消化不良，面黃肌瘦。

【處方】銀柴胡 厚朴 使君子 麥芽 青皮 三稜 燕窩 蒼朮 枳殼 萊菔子 神曲 上各一斤 白朮六斤 黃連 胡黃連 檳榔 全蠍各八兩 蘆薈二兩 干蟾 黃芩 茯苓 雞內金 芩皮 山查各二斤 阿膠四兩

【制法】以上二十五味，共軋細面，水泛小丸。

【劑量及用法】每服二十粒，日服三次，溫開水送下。三歲以下酌量遞減。

【禁忌】忌食油膩生冷。

十三、呼和浩特(加味肥兒丸)

【處方】胡連 黃連 神曲 山

疳 積 類

查 麥芽 酒芩各二十兩 人參三斤十二兩 白朮二斤四兩 茯苓 甘草各二十兩 蘆薈三斤十二兩 內金二斤半 燕窩 五穀蟲各三十兩 使君子二斤十二兩

【制法】共為細面，水小丸。

附參考古方

【來源】1. 太平惠民和劑局方。

【功能與主治】治小兒疳病者，多因乳食喫太早所致，或因久患藏腑胃虛蟲動，日漸羸瘦，腹大髮堅，不能行步，面黃口臭，發熱，面無精神，此藥殺蟲進食。

【處方】肉豆蔻(兩裏煨) 使君子(去皮) 麥蘖(炒)各五兩 黃連(去鬚) 神曲(炒)各十兩 檳榔二十個(不見火) 木香各二兩

【制法】上為細末，猪胆為丸，如粟米大。

【劑量及用法】每服三十丸，量多少加減，熟水下，空心服。

【備考】一方：黃連、神曲、使君子各一兩，檳榔、肉豆蔻各半兩，木香二錢，面糊圓，如蘿蔔子大，熟水下。

2. 增補方保元。

【功能與主治】消疳化積，磨癰清熱，伐肝補脾，進食殺蟲，潤肌膚，養元氣。

【處方】人參三錢半 白朮 白茯苓(去皮)各三錢 黃連(姜炒)三錢半 胡黃連五錢 使君子(去壳)四錢 神曲(炒) 麥芽(炒) 山楂肉各三錢半 甘草(炙)三錢 蘆薈二錢半(碗盛，泥封固置坑中，四面谷糠火煨透用)。

【制法】上為末黃米糊為餅(白湯化下)，或做丸黍米大。

【劑量及用法】每服二、三十丸，看兒大小米湯下。

3. 匹爾金鑑。

【功能與主治】脾疳。

【處方】人參二錢半 白朮五錢(土炒) 茯苓三錢 黃連二錢 胡黃連五錢 使君子肉四錢 神曲(炒) 麥芽(炒) 山查肉各三錢半 甘草錢半(炙) 蘆薈二錢半(煨)

【制法】上為末，黃米糊丸，如黍米大。

【劑量及用法】每服二、三十丸，米湯化下。

消积皂矾丸

西 安

【功能与主治】主治小兒消化不良，胃呆胃弱，慢性貧血，面黃肌瘦，腸寄生虫病，吃土，吃炭，瀉泄，腸炎等病。

【处方】內金二兩 雷丸五錢 山楂 神麴各四兩 麦芽二兩 陈皮二兩 白朮 皂矾各四兩 蒼朮 茯苓各二兩 川朴二兩 扁豆 山藥各二兩 炙草 炙芪各二兩

【制法】煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】二岁小兒每次五至十丸，其他按年齡酌情增减，溫开水化服，飯后服用。

【禁忌】热性病勿服。

真色五花丸

呼 和 浩 特

【处方】蘆薈 川朴 山楂 君子 胡連 三稜各二兩 莪朮 香附各二兩 木香 阿魏 枳榔 炙草各一兩 紅花子 麦芽 神麴各四兩 茯苓 白朮各二兩 人參

【制法】水泛小丸，黃柏、青黛、滑石、硃砂加本色共五色为衣。

五 疳 丸

一、沈 陽(1)

【功能与主治】食积，虫积，痢疾腹脹，唇爛舌干，疳积痞塊。

【处方】使君子 麦芽 黃連 燕黃 橘紅各一兩

【制法】共研極細面，面糊为小丸。

【剂量及用法】每服一錢，量兒年齡酌減，空心米湯送下，不拘時候。

【禁忌】生冷硬物。

二、沈陽(2)(五疳消积丸)

【功能与主治】杀虫消食。主小兒疳积，面黃肌瘦，牙疳口臭，腹大筋青，食少脹滿，虫积腹痛。

【处方】川黃連 燕黃 龍胆草各三錢 炒麦芽 焦山楂 廣陈皮 炒神麴各一兩

【制法】共碾極細面，水泛为小丸。

【剂量及用法】每服二錢白水送

下。

【禁忌】生冷硬物。

三、沈陽(3)(消痞五疳丸)

【功能与主治】消痞除积。主面黃肌瘦，懶食喜睡，腹脹泄瀉，日晡潮热，目赤眵多，白翳遮睛，眼臉爛痒，口舌生瘡，惊悸咬牙，齦肉腫痛，齒齦出血，喜食生冷，口唇皸裂，咳嗽气喘，上大青筋。

【处方】胡連五錢 木香一錢 麝香六分 蘆薈一錢 赤茯苓四錢 蟬退八錢 使君子肉五錢 浮瀉四錢 蛤粉 胆草 粉甘草各三錢 金灯十五个 小獼肝一兩 羊肝一兩 防風一錢

【制法】除麝香另研，獼肝羊肝焙干外，余者共碾細面，水泛小丸，二厘重。

【剂量及用法】二岁以下每服一丸，二岁以上每服五丸。

【禁忌】生冷硬物。

四、撫順(小兒五疳丸)

【处方】蘆薈 燕黃 白朮 人參 胡連 內金 使君子各二錢半 明砂一兩 芡实一兩 干蟬一个 公雞胆一个。

【制法】生白布一方包煮，研为粉，煉蜜为丸一錢大。

五、呼和浩特

【处方】茯苓，山楂 木通 殭蚕 黃芩 白朮 陈皮 胡連 蓮肉 生地 三稜 莪朮各四兩 神麴 麦芽各一斤四兩 全蠍八兩 內金一兩 蘆薈四兩 枳实一斤 甘草 白皮各四兩

【制法】水泛小丸

附参考古方

【来源】太平惠民和剂局方(五疳消食丸)。

【功能与主治】治小兒五疳八病，杀腹藏虫，疔疳劳及走馬，牙齒唇爛，肚大青筋，此药大能进食，悅顏色，長肌肉。

【处方】使君子(炒，去皮) 麥蘖 黃連(去鬚，微炒) 草龍胆 燕黃 橘紅(焙)各等分

【制法】上为細末，粟米糊为丸如粟米大。

【剂量及用法】每服二、三十丸，

空心米飯吞下，不拘時候，量兒岁數加減。

百 效 丸

天 津

【功能与主治】消积理滯，鎮惊化痰。主小兒寒熱凝結，停食宿水，腹疼腹脹，痰喘气促，慢惊風症，紅白痢疾。

【处方】川貝 厚朴(姜制)各二錢 肉豆蔻(滑石煨)一錢五分 柴胡 元參(去蘆)各一錢 肉桂(去粗皮)一錢五分 知母二錢 血竭一錢五分 共为細粉兌入：硃砂面二錢 麝香 冰片各一分 淨巴豆霜二錢

【制法】以上研細和勻，煉蜜为丸，每丸一分重，每付二丸，每斤丸药，用硃砂面四錢为衣，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，週岁以内酌減，白开水化服。

蘆 薈 丸

一、武 汉

【功能与主治】小兒疳积虫积，肚腹脹滿發熱，口鼻生瘡，牙齦腫爛等症。

【处方】胡連 鶴虱 蘆薈 广木香 雷丸 黃連 青皮 燕黃各一兩 麝香一錢

【制法】取上药进行干燥，混合碾細，用淨水送成小丸，每錢不得少于五十粒。

【剂量及用法】小兒每服五分至一錢，白开水送下。

二、杭 州

【功能与主治】治小兒疳积热盛，口渴食減，肌肉消瘦，口鼻生瘡，牙齦腐爛，口臭齒齦，牙縫出血等症。

【处方】蘆薈 胡黃連 川黃連 广木香 白燕黃 小青皮各五錢 全当归 白茯苓 广陈皮各一兩五錢 炙甘草七錢

【制法】共研細末，米糊为丸，每潮重一錢。

【剂量及用法】每服二丸。米飲湯或开水化服。凡疳热上攻，牙縫

出血者，服之甚效。

三、大同

(加味蘆薈丸)

【功能与主治】五疳瘦弱面黄肚大筋青之症。

【处方】蘆薈 胡黄连 陈皮 青皮 枳壳 枳实 苍朮 焦黄 枳实 枳实 厚朴 神曲 山楂 麦芽 砂仁各二钱 板榔 使君子 各二钱 黄连钱半。

【制法】共为极细末，水泛为小丸，青黛为衣。

【剂量及用法】小兒每服五分。

四、禹县

【功能与主治】五疳諸積，面黄肌瘦，肚大青筋，寒热往来，口鼻生疮，好食泥土。

【处方】蘆薈 砂仁 神曲 胡黄连 大黃 山楂 板榔 麦芽各二两 陈皮 炙甘草各五钱 使君子二两

【制法】共为细面，水为丸，如绿豆大。

【剂量及用法】每服一钱，白开水送下，小兒每服五分。

【备考】有效期二年。

珍珠丸

上海

【功能与主治】疳积。

【处方】牛黄五钱 胡黄连二钱 琥珀二钱 木香二钱 银柴胡二钱 南星(制)五钱 硃砂二钱 珍珠一钱 雷丸二钱 天竺黄五钱 板榔五钱 雞内金一兩

【制法】共研细粉，用米汤泛丸，如芥子大，以硃砂为衣。

【剂量及用法】七岁以下每岁一丸，逐岁增加，温开水化服，每日三次。遵医师指示服用。

【禁忌】忌食生冷、腥臭、油腻。

金蟾丸

杭州

【功能与主治】治小兒疳积虫痛，面黄口渴，腹大如鼓，青筋绽露，饮食不化，食积泄瀉等症。此丸消疳杀虫，極有效驗。

【处方】使君子肉二兩 西砂仁二兩 山楂肉(炒)五兩 炒干蟾三兩 炒麦芽 五灵脂各二兩 五谷虫五兩 蓬莪朮 广陈皮 小青皮各二兩

【制法】共研细末，炼蜜为丸，每湖五二钱，每服一丸，米飲湯化服。

保童丸

沈陽

【功能与主治】杀虫化积，健胃消疳。主小兒虫积，停食腹脹，面黄肌瘦，各和疳症。

【处方】胡黄连 龙胆草各五兩 使君子肉 广木香 蘆薈各一兩 苦楝皮一钱 大麦五钱

【制法】共碾极细面，醋煮米糊为丸，五厘重。

【剂量及用法】每服一丸至五丸，不拘时间，米湯送下。

五色兌金丸

南京

【功能与主治】主小兒疳积虫痛。

【处方】白丑二兩 十蟾皮二钱 飞滑石一兩 胡黄连 六神曲 陈胆星各五钱 川黄連二钱 黑丑 飞青黛 大黃(上三味另研为衣) 雄黄各二兩 生石膏一兩(上二味另研乳细为衣)

【制法】各研细末，沸水泛为小丸，每钱约三百粒，以黑丑、青黛、大黃、雄黄、石膏五种药末，分别为衣，分为五色。

【剂量及用法】每服五厘，最多不超过三分，量兒之大小，体之强弱，斟酌用之，不宜多服。

吉林(五色兌金丹)

【功能与主治】除热，消疳。主小兒五疳内热，邪火發燒等症。

【处方】干蟾一个 紋軍 黑丑 白丑 雄黄 青黛各一兩二钱四分 胆星 胡連 神曲 川連各二钱四分 石膏 滑石各六钱七分

【制法】共研细面，用水泛为小丸，如葡萄子大。用石膏、雄黄、大黃、青黛为衣。

【剂量及用法】小兒每一岁服一粒(按岁增加)。白开水送下。

疳 积 类

【禁忌】忌食生冷油腻等物，小兒脾弱瀉泄忌服。

使君子丸

南昌、禹县(蛔虫丸)

【功能与主治】治虫脹腹痛及食劳發黃，喜食茶米、炭土等物。

【处方】使君子(去壳)二兩 南星(姜制) 板榔各一兩

【制法】前药用麦芽、茶叶、木炭、灶心土各四兩，合炒至药黃色，除去同炒之品，将药研成细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每日一次，每服二钱，早晨空腹时，砂糖水吞下。服药后四小时，再进飲食，勿令飽。

【禁忌】勿食了热及不易消化食物。

附参考古方

【来源】幼科証治准繩。

【功能与主治】治腹內諸虫作痛，口吐清水。

【处方】使君子肉(薄切，屋瓦焙干) 板榔 酸石榴根皮(东向者佳，淨洗剉焙) 大黃(半生半炮)各七钱半

【制法】以上除板榔剉晒不过火，余三味再焙，同板榔为末，沙糖水煮麵糊，丸麻仁大。

【剂量及用法】每服三十丸至五十丸，淡猪肉汁空心下，或雞肉汁亦好。

食积万应散

沈陽

【功能与主治】清热，消食，除疳。主食积乳积，腹痛發热，吐乳便白，煩热惊癇，咳嗽气促，心神不安，睡露白睛，手足顫动。

【处方】黑丑炭 粉甘草 白丑炭各一兩 真硃砂二钱 川黄連二钱 血琥珀 大黃炭各二钱 板榔片一兩 梅片五分 黃芩一兩

【制法】共碾极细面。

【剂量及用法】五岁以下每服三分，三岁以下，每服二分，一岁以下每服一分，五个月以下每服五厘。白开水送下。

【禁忌】生冷硬物。

娃娃安宁散

禹 县

【功能与主治】急惊发热，食积乳积，大便秘结，肚腹实疼。

【处方】川黄连四两 广木香二两 胡黄连四两 蓬莪朮二两 朱砂一两四钱 西大英四两 天竺黄二两 明雄二两 明天麻四两 青皮二两 胆星五钱 潞党参四两 三棱二两 巴豆霜

【制法】共为细面，每包一分。

【剂量及用法】一岁用五厘，逐乳用或用温开水送下。

【禁忌】虚弱症及孕妇忌用。

【备考】有效期二年。

清虫散

禹 县

【功能与主治】驱虫积。

【处方】使君子五钱 榧子 槟榔 雄黄各一钱五分

【制法】共为细面。

【剂量及用法】小儿二岁服三分，白开水送下。

【备考】有效期二年。

化积散

承 德

【功能与主治】开胃健脾，消滞宽中，磨积，消胀，消痞。

【处方】生地 鸡内金各四钱 胡黄连一钱 砂仁 甘草各一钱五分 君子 神曲(建) 陈皮各二钱 穿山甲三钱 茯苓 扁豆各六钱 芫荽 南山楂各八钱 焦山楂 焦麦芽 焦神曲各二钱七分

【制法】以上十六味，共轧细面为散。

【剂量及用法】一、二岁每包服三次，三、四岁每包服二次，五、六岁每包服一次。白开水送下。

【禁忌】粘、硬之物。

五消散

吉林、哈尔滨

【功能与主治】消痰积，杀蛔虫，止腹痛。主小儿食积不消，膨闷胀

满，腹大体瘦，贪食不厌，积聚腹痛，一切虫积。

【处方】鸡内金(炒)一两 水红子(炒) 南山楂(炒) 花槟榔(炒) 君子肉(炒) 大麦芽(炒) 六神曲各二两

【制法】将以上七种药品，共为细末，用绢罗筛二、三次，以极细为度。

【剂量及用法】大人每服一钱五分，七岁至十二岁服一钱，二岁至七岁服五分，满周岁每服三分。以白开水送下。

五疳散

沈 阳

【功能与主治】健胃固肠，杀虫化积，主小儿五疳潮热，面黄肌瘦，烦渴吐泻，肚大青筋，精神疲倦。

【处方】白朮两半 白茯苓 使君子肉各七钱半 甘草钱半 山楂肉五钱 炒麦芽 炒金樱子肉 连子心 橘红各五钱 麦冬一两 芡实一钱半 青皮二钱

【制法】共碾极细面。

【剂量及用法】每服七分，白开水送下。

【禁忌】生冷粘腻硬物。

消疳散

一、沈 阳

【功能与主治】促进新陈代谢机能使之旺盛。主小儿头发稀少，面黄肌瘦，肚大青筋饮食减少，或多食反瘦，精神萎靡，形体日渐衰弱。

【处方】人言一钱 蟾酥一钱四分 朱砂 斑蝥各一钱 麝香 冰片各一分 巴豆霜一钱

【制法】共研细面，磁瓶收贮。

【剂量及用法】每用三厘放在烤好的小膏药当中，贴在前额中心，过三小时揭下，出一小水泡，用新针挑破，涂香油少许即愈。

【禁忌】发物辣物。

二、抚顺(1)

【功能与主治】镇静，消疳，解毒。主五疳内热，邪火发烧，瘟毒痘疹，余毒不尽，脓溃流血，口痛舌烂，腥臭难闻。

【处方】苏珍珠 射香各二分

冰片五分 朱砂二钱 银朱五钱 黄连五钱 枯矾四两 炮鳖甲三钱

【制法】共为极细面。

【剂量及用法】一周岁者服一分，随年龄酌用之。并可做上口腔药。

【禁忌】忌食发物。

三、抚顺(2)

【功能与主治】主大人、小儿久积，或痛或胀，腹大青筋，面黄肌瘦，发热口渴，肋痛寝寐，五积六聚，小儿疳痞等症。

【处方】鸡内金一两 大黄七钱 香附 枳实各五钱 牛黄五分 黑白牵牛五钱 雄黄二钱 鳖甲四钱 赤芍 红花 三棱 莪朮 桃仁 山查 焦神曲 广木香 槟榔 当归 广陈皮 青皮 砂仁 五灵脂 延胡索 甘草 莱菔子 生地 朱砂各三钱

【制法】共为细粉。

四、抚顺(3)

【处方】白朮 石决各一两 象皮五钱 梅片一钱半 台麝二分 枯矾一两 江珠二分

【制法】共为细面。

吴氏消疳散

沈 阳

【功能与主治】燥湿利水，温中解热，理气健脾，安胃杀虫。主小儿泻泄，日夜无度，渐渐瘦羸，虫积食痞。

【处方】黄柏 芫荽 黄连各二钱 厚朴 木香各一钱 没食子一钱五分 槟榔 丁香各一钱 椿根白皮一钱二分五厘

【制法】共碾极细面。

【剂量及用法】一、二岁者每服二、三分，五六岁者每服五、六分。一日服三次，食前用米汤送下，或用紫苏、木瓜为引。

【禁忌】鱼肉。

附参考古方

【来源】苏沈良方(吴婆散)。

【功能与主治】治小儿疳泻不止，日夜通数不记，渐渐羸瘦，众药不效者。

【处方】黄柏(蜜炙) 黄连(微

炒) 桃根白皮 芩莢(去皮)各一分 木香 厚朴(姜汁炙) 丁香 槟榔各一錢 沒石子一錢半 棟根白皮七分。

【制法】上为末。

【剂量及用法】每服一字，三岁以上半錢，五、六岁一錢。用紫苏、木瓜米饮调下，乳食前。一日二服。

清 疳 散 沈 阳

【功能与主治】清肝解热，化积理脾。主停食宿乳，体倦腹胀，午后发烧，面色萎黄，肌肉消瘦，目赤口臭，大便稠粘，尿色赤黄，积久变疳等症。

【处方】枳壳二錢 青皮 广皮 查炭各二錢 槟榔 白朮 半夏各錢半 白芍 厚朴 茯苓 大黄 朱砂各一錢 象牙二分 半黄一分 胆星八分 珍珠三分 麝香二分 冰片三分

【制法】先将枳壳等研为极细面，再将朱砂等七味研极细面兑匀。

【剂量及用法】满一岁之小儿每服一分，二岁至三岁者每服二分。

【禁忌】腥辣及硬性食物。

鸡 肝 散

一、上 海

【功能与主治】疳积

【处方】鲜鸡肝一具 雷丸 使君子肉各三錢

【制法】将鲜鸡肝和药捣烂，煮熟焙干后，研细粉，瓶装固封。

【剂量及用法】每付分四次服用，早晨空腹时温开水送服。遵医嘱指示服用。

二、杭 州

【功能与主治】治小儿饮食不节，脾胃受伤，致成疳积，腹大泄泻，面黄肌瘦，肝热上攻，目珠生翳，久则成盲，宜早治之。此散清肝健脾，进食止泻，明目去障，效验颇著。

【处方】胡黄连二錢 芙蓉叶五錢 煨肉果一錢 白雷丸二錢 夜明砂一錢五分 煨石决明二錢 使君子肉二錢 鸡肝一具

【制法】共研细末，用酒酿一杯，将鸡肝打烂，拌和晒干，再研细末为

度。

【剂量及用法】每服二至三錢。开水送下，日服二次。使目珠障翳退净为度。

三、南 昌

【功能与主治】小儿疳积，腹大泄泻，面黄肌瘦，肝火上攻，目珠生翳。

【处方】飞朱砂四錢 飞滑石五錢 煨石决明一兩 青黛三錢 胡连 赤石脂各五錢 芦甘石(制)六錢

【制法】共研细末。

【剂量及用法】每服六分，视年龄及病情酌量增减之。用鸡肝一具(不落水者，竹刀破开，将药末放入，用线扎紧煮熟，去线食之。

【禁忌】忌食有刺激性及不易消化食物。

四、重 庆

【功能与主治】快脾开胃，消食化积。能杀三虫，疗疳气。

【处方】槟榔 使君子各四兩 鸡内金 炙甘草 雷丸 云苓各五兩 芡实十兩 牵牛子四兩

【制法】共碾细末。纸袋包装，每包五錢。

【剂量及用法】每服五分至一錢。

疳 积 散

一、天 津

【功能与主治】杀虫消积。主食积疳积，蛔虫蛲虫，寸白虫，一切肠胃寄生虫，腹胀腹痛，面黄肌瘦，消化不良。

【处方】茯苓(去皮)二兩 海螵蛸一兩 槟榔 鹤虱 雷丸 三稜(醋制) 枳朮(醋制)各五錢 红花三錢 炒鸡内金 使君子肉各五錢

【制法】共为细粉，二錢重装袋。

【剂量及用法】五岁以上服一袋，周岁每袋分五次；二、三岁分三次；四、五岁分二次，白开水送下。

【禁忌】荤腥食物。

二、南 京(痞药)

【功能与主治】治疳积。主小儿面黄肌瘦，腹部膨胀，便多整谷甚至毛发脱落，目翳雀盲。

【处方】煨石燕子 煨石决明 白茯苓 使君子肉各二兩 威灵仙 炙鸡内金 谷精草各一兩

【制法】上药七味，加冰糖或白糖一两，共研为细末，每二錢用纱布袋包装。

【剂量及用法】每服一袋，以米汤一碗，于饭锅上蒸透，只吃米汤，不吃药末。

三、兰 州

(小儿疳积散)

【功能与主治】杀虫消积。主小儿疳积、蛔虫。患寄生虫的人，往往消化不良，肚子疼，呕吐，面黄肌瘦，宜服此散。

【处方】茯苓二兩 海螵蛸一兩 雷丸 鹤虱 君子肉 内金 三稜 莪朮各五錢 红花三錢

【制法】共研细面，装瓶二錢重。

【剂量及用法】每次半瓶，一錢重，白开水送下。

【禁忌】忌生冷硬物。

四、沈 阳

【功能与主治】健脾消积，杀虫利气。主小儿缺乳，饮食过度，或病后失调，面黄腹大，便溏酸臭，溺如米泔，头皮干枯，毛发焦落，目涩羞明，生翳形瘦，夜热早凉。

【处方】厚朴一兩 广陈皮 片 苓各七錢 百草霜 青黛各二錢 旋复花錢半 芩莢五錢

【制法】共碾极细面。

【剂量及用法】按小几年龄，每岁用药五厘，空腹时灯心汤送下。病愈以肥儿丸调理。

附参考古方

【来源】幼科证治准绳。

【功能与主治】治魅乳、病乳、夹乳、夹食。大病之后，饮食失调，平居饮食过饱伤脾，致成疳积。面黄腹大，小便色如米泔，大便泻黄酸臭，头皮干枯，毛发焦穗，甚至目涩羞明，睛生云翳，形体骨立，夜热昼凉，丁奚哺露等证并用主之。

【处方】厚朴(厚而紫色有油者佳，去粗皮切片，生姜自然汁炒熟为末)一兩 广陈皮(去白为末)八錢 粉甘草(去皮净为末) 真芦荟(净末)各七錢 芩莢(真孔林大而多白衣者佳，去白衣壳净末)五錢 青黛

(取顏料鉢中浮碎如佛頭青色者,研淨末)三錢 百草霜(乃山中人家鍋底墨也,淨末)二錢 旋復花(淨末)一錢半

【制法】以上勻和成劑用。

【劑量及用法】每一歲用藥一分,用灯心湯早上空腹時調服,服後病即愈。再用肥兒丸調理,如脾氣未安用健脾丸或大健脾丸,如疳氣未盡用白皮一兩、白木香一錢、白茯苓五錢加好平胃散三錢,陳米粥湯調服。

清疳化虫散

昆 明

【功能與主治】杀虫健胃。主小兒疳積。

【處方】青皮 橘紅各一兩 白朮 茯苓各二兩 麥冬 使君子各一兩 藜蘆子 芡實各八錢 桑參一兩 建蓮子 焦山楂各八錢 麥芽一兩 胡連三錢 洋燕黃五錢 柴胡八錢 白芍 神麴 枳榔 繡風 甘草各一兩

【制法】研末。

【劑量及用法】三歲以下服半包。開水調服。

【禁忌】體弱小兒忌服。

寸白虫散

沈 陽

【功能與主治】杀寸白虫,以及凡因寸白虫所引起的腹脹,腹痛,心胸嘈雜等症。

【處方】貫眾 白燕黃 酸石榴皮各一兩

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二錢,開白糖水空心服之。

消疳蘆薈散

沈 陽

【功能與主治】消疳杀虫,清熱鎮驚。主積熱成疳,腹內諸虫,驚悸不安,癰厥身熱,吐瀉腹痛,肌膚生瘡,癰癰結核,癰疥濕毒,皮痒濕疹,小便如泔,日晡潮熱,大便不調。

【處方】蘆薈三錢 雷丸四錢 黃連 青皮 鶴虱 胡連 木香 燕黃各三錢 麝香二分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】三歲以上每服五分,三歲以下每服二分,一歲以下每服一分,余者类推,隨症酌用。

【禁忌】生冷、五辛、發物。

妙效丹

沈 陽

【功能與主治】鎮驚止癇,調胃通便。主慢驚風症,咳嗽喘急,五疳停食,夜啼腹脹,嘔吐瀉痢,咽喉不利,口流涎。

【處方】明雄 蠅尾 煅硝石 杏仁 硃砂各一錢 豆霜五分

【制法】先將砂石之品,研細一丹兌蠅尾、杏仁、豆霜均以棗肉為小丸。

【劑量及用法】每服一分,量孩之大小酌減服之。

【禁忌】脾胃虛弱者忌服。

消积万灵丹

濟 南

【功能與主治】小兒五積六聚,嘔吐腹滿,痢疾等症。

【處方】硃砂 神麴 麥芽 枳榔 山楂各二兩 豆霜四兩 雄黃二兩 麝香五錢 胆星一兩五錢 全蠍 殭蚕各五錢

【制法】共為細面,將方內豆霜調勻,水泛小丸,如米粒大。方內硃砂為衣,每包四厘。

【劑量及用法】每服一包,溫開水送下,未滿週歲者減半。

【禁忌】不可多服。

育兒丹

禹 縣

【功能與主治】食積虫積,面黃肌瘦,腹脹疼痛,一切積聚。

【處方】郁金三錢 梔子三兩 巴豆霜三錢 使君子三兩 杏仁 枳榔 桃仁各二錢 硃砂一錢 明雄一錢

【制法】共碾細面,水為丸,每包重一分。

【劑量及用法】一歲至二歲每次服一包,三歲至四歲服一包半,五歲至六歲服二包。白開水送下。

【禁忌】虛弱症忌用。

【備考】有效期二年。

一厘丹

杭 州

【功能與主治】治小兒疳積虫痛,腹大如鼓,面黃肌瘦,各種積滯,急驚痰多,咳嗽抽搐。

【處方】麝香一兩 明腰黃 飛辰砂 白殭蚕 全蠍尾各三兩 巴豆霜二兩 杜胆星一兩

【制法】上藥各研極細粉,用神柚糊為丸,如麥子大。

【劑量及用法】每服一至二分,重症加倍,開水送下。

白玉餅

一、沈 陽

【功能與主治】消癥消積,化痰化食。主治小兒腹有癥積停乳,痰嗽流涎,腹痛脹肚,癥塊堅硬,面黃肌瘦,肚大筋青,大便燥結,精神不振。

【處方】寒食面一兩 滑石 半夏 茯苓各五錢 巴豆霜一錢

【制法】共碾極細面,和勻,糯米飯為小片,滑石衣。

【劑量及用法】小兒三歲以上者及六歲以下者三餅,三歲以下者二餅。蔥白湯送下。

二、撫 順

【功能與主治】攻下食積。主小兒脾弱,消化不良,食積成痞,脘腹脹大,疼痛拒按,青筋暴露,睡不閉目,驚悸不安。

【處方】寒食面 滑石 姜夏各二兩 川軍 豆霜各一兩 南星 白附子各二兩

【制法】共為細面,面糊丸如榆錢大。

【劑量及用法】用香油灯火,將餅烤焦,小兒三歲以上每服四餅至五餅,三歲以下者一餅至二餅。臨睡白水送下。

【禁忌】腥冷污膩。

三、吉林、哈爾濱 (白 餅)

【功能與主治】消食健脾,攻瀉食積。主小兒食積,痞積,乳積,傷食,吐酸等病。

【处方】滑石一錢 輕粉一錢 半夏(湯洗焙燥)一錢 南星一錢 巴豆(去皮膜水一升煮水盡為度)二十四枚

【制法】將以上五味藥品，均研為細面和勻，糯米飯為丸，如綠豆大，捏做餅形，滑石為衣。

【劑量及用法】用香油燈火，將餅烤微焦，小兒三歲以上，每服四片至五片，三歲以下者一片至二片，臨睡時葱白湯或乳汁送下。

【禁忌】服后忌食腥冷油膩。

肥兒片

禹 县

【功能与主治】食積奶積，消化不良，宿食停滯，吞酸反胃。

【处方】郁金三錢 巴豆霜六錢 杏仁三錢 桃仁三錢 硃砂一厘 明雄三錢 黃蜡一兩 麝香二厘

【制法】共研細面，先將蜡化開入藥，和為片每片六厘。

【劑量及用法】每服十二片，小兒一歲每服一片。溫開水送下或乳汁送下。

【禁忌】虛弱症忌用。

【備考】有效期二年。

鐵門栓

沈 陽

【功能与主治】固腸止瀉。主小兒疳疾，面黃肌瘦，泄瀉痢疾，日久不愈，腸滑脫肛，神疲氣促。

【处方】炒文蛤一兩 白矾(枯半生)一錢半 黃丹(水飛淨)二錢

【制法】共碾極細面，用黃蜡一兩化為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服一分五厘，用茶一錢，姜二錢煎湯送下。

【禁忌】忌食生冷粘硬之物。

健兒素

蘭 州

【功能与主治】開胃，止瀉，殺蟲，強心。主小兒食物不化，瀉痢不止，打蟲各蟲，增加健康。

【处方】黨參一兩五錢 山藥 神曲 內金各二兩 蘆薈五錢 白朮三兩 薏米仁二兩 東查二兩 芡實二兩 炙草一兩 茯苓 檳榔各二兩 梔子仁一兩五錢 君子仁

一兩五錢 扁豆三兩 砂仁一兩五錢 蓮肉二兩 酒軍一兩

【制法】共研細末，每包一錢重。

【劑量及用法】未滿週歲，每次半包。一至二歲，每次一包。三至五歲每次二包。日服三次，四小時服一次。白開水化服。

其 他 类

犀角解毒丸

一、上 海

【功能与主治】小兒瘡毒。

【处方】犀角 黃連各一兩 甘草五錢 連翹七錢 赤芍藥七錢 桔梗七錢 防風一兩 薄荷五錢 牛蒡子七錢 當歸一兩 生地一兩 黃芩七錢 荆芥一兩

【制法】共研細粉，煉蜜為丸，每丸潮重一錢五分。

【劑量及用法】遵醫師指示服用。

二、杭 州

【功能与主治】治小兒胞胎積熱，痘疹余毒，煩熱面赤，口渴咽干，皮膚紅腫，瘡癤丹毒，牙縫出血，便閉溺赤等症。

【处方】同上海。

【制法】共研細末，煉蜜為丸，每潮重一錢。蜡壳封固。

【劑量及用法】月內嬰兒每服半丸；一月至四、五歲者，每服一丸。燈心湯化服。

【禁忌】忌油膩、煎炒之物。

三、吉 林(犀角化毒丸)

【功能与主治】清熱解毒止癢。小兒瘡毒，痘、疹、斑、痧余毒，喉齒疼痛。

(一)小兒瘡毒：胎毒食熱，發為瘡毒，爛流黃水，痛癢不寧。

(二)痘疹之后：毒熱內蘊，或發頤腫，或發喘嗽，或腫咽喉。

(三)喉內疼痛：痰火上炎，喉疼齒痛，便結口臭，口糜舌腐。

【处方】犀角一錢 桔梗一兩 赤芍藥(一方做赤茯苓)五錢 牛蒡五錢 生地五錢 玄參六錢 連翹六錢 朴硝二錢 甘草二錢 青黛二錢

【制法】將上列七味藥品共碾細

面，煉蜜為七分重丸，青黛為衣或硃砂為衣。除用包裝保存外，用瓷罐或玻璃瓶存貯。

【劑量及用法】每服一丸至三丸；小兒六歲至十歲每服一丸；三歲至五歲每服半丸；三歲以下者每服四分之一。均用薄荷湯為引。

【禁忌】忌食辛辣。孕婦忌用。

四、哈爾濱

(犀角化毒丸)

【功能与主治】清熱解毒。主小兒瘡毒，痘、疹、斑、痧余毒，喉齒疼痛。

【处方】犀角 桔梗各一錢 赤芍藥五錢(一方作赤茯苓) 牛蒡生地各五錢 玄參 連翹各六錢 朴硝 甘草 青黛各二錢

【制法】共碾為細面，煉蜜為七分重丸，青黛為衣(或硃砂為衣)。瓷罐存貯，或蜡皮包封。

【劑量及用法】成人每服一丸至三丸；六歲至十歲小兒每服一丸；三歲至五歲小兒每服半丸；三歲以下小兒每服四分之一。均用薄荷湯為引。

【禁忌】忌食辛辣。孕婦忌用。

附參考古方

【來源】瘍醫大全。

【功能与主治】此通治小兒諸瘡毒，及痘疹后余毒喉齒等証。

【处方】犀角(鎔)一錢 桔梗一兩 赤茯苓 牛蒡子 生地各五錢 玄參 連翹各六錢 朴硝 甘草 青黛各二錢

【制法】共研極細末，煉蜜為丸，如龙眼大。

【劑量及用法】薄荷湯化下，挾掠者硃砂為衣。

犀角化毒丸

一、濟 南

【功能与主治】一切瘡癤，疹后余毒。

【处方】犀角二錢 連翹六錢 天花粉五錢 桔梗一兩 玄參三錢 甘草三錢 生地五錢 青黛二錢 酒大黃三錢 赤茯苓六錢 芒硝三錢 川貝母五錢 牛蒡子五錢 黃芩五錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重七分。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

二、沈陽

【功能與主治】清熱解毒涼血。主胎毒口瘡，斑疹痘疹，咽喉腫痛；咳嗽喘促，頭痛身熱，嘔吐驚風。一切熱症。

【處方】桔梗一錢五分 牛地黃二錢 茯苓一錢二分 牛蒡子一錢二分 犀角 羚羊各一錢 元參一錢五分 連翹 花粉各一錢五分 川貝母一錢 元明粉八分 甘草六分

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸七分重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

三、撫順

【功能與主治】清涼化毒。主小兒瘡毒、胎毒，黃水瘡毒，痛癢不寧；痘疹、斑痧等毒火內蘊，為齧腫痛，咽腫咳嗽，口臭出血，牙疳齒痛，二便秘結。

【處方】犀角四錢 浙貝五錢 花粉一兩 連翹五錢 桔梗一兩 牛地五錢 赤芍一兩 牛蒡子一兩 元參一兩 甘草四錢 雙花一兩 朴硝八錢 酒芩一兩 薄荷一兩 黃連四錢 青黛五錢

【制法】共為細面，蜜丸七分重，青黛為衣。

【劑量及用法】小兒六歲至十歲，每服一丸；五歲以下服半丸。用薄荷湯送下，白水亦可。

【禁忌】辛辣等物。

四、吉林（化毒丸）

【功能與主治】清熱，解毒，止血，消炎。主小兒瘡毒，胎毒，痘疹，斑痧余毒，喉腫，齒痛等症。一、小兒瘡毒症狀——因胎毒食熱所致，發而為瘡毒，皮膚腐潰，黃水蔓延。二、痘疹斑痧余毒症狀——因毒內蘊，有發頰腫，或爛肉齧，或發咳嗽，或腫咽喉，或生皮膚之疾，或患頭面瘡症。三、咽齒痛症狀——因毒火上越，便秘燥結，口干舌燥，咽痛喉腫，鵝口馬牙，疳疔作熱。

【處方】廣犀角三錢四分 薄荷二兩 連翹四兩 甘草二兩 朴硝二兩 銀花二兩四錢 生地二兩四

錢 黑參四兩 桔梗四兩 赤芍三兩 青黛二兩 牛蒡子二兩四錢 花粉二兩四錢

【制法】共為細面，用最細絹羅篩之，煉蜜為丸，每丸七分重，青黛為衣。除包裝保存外，即裝入磁罐內，以免風干。

【劑量及用法】十三歲至成年每服一、二丸；七歲至十一歲每服一丸；一歲至六歲，每兩丸均三次服之；一歲至二歲每兩丸兩次服之。每日早晚二次服之，以白開水或白糖水送服。

【禁忌】孕婦忌用。忌食生冷。

犀角解毒散

沈陽

【功能與主治】解毒清火透表。主流行性痘，傷風感冒，皮膚瘡毒，咽喉腫痛，斑疹不消，心煩不寧，疹后余毒，咳嗽發熱，諸瘡腫痛。

【處方】牛蒡子二錢 桑葉一錢 白芍一錢 防風一錢 黃芩二錢 連翹一錢 黃連二錢 牛黃二分 薄荷五分 牛地一錢 荊芥二錢 西紅花一錢 銀花一錢 冰片六分 麥冬一錢 赤芍二錢 當歸二錢 元參一錢 犀角一錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】大人每服一錢，小兒酌減。白開水送下。

小兒牛黃散

一、天津

【功能與主治】清熱化毒，鎮驚解毒。主肺熱痰黃，咽喉腫痛，口瘡牙疳，頭面生瘡，皮膚潰爛，週身發熱。

【處方】大黃一兩 浙貝 黃連 花粉 赤芍 甘草 銀花 連翹（去心）各五錢 炒（丑）四錢 制沒藥 制乳香各一錢五分 共為細粉 兌入：雄黃面二錢五分 牛黃四分 五厘 冰片二錢五分 麝香 珍珠各一分五厘

【制法】以上研細和勻，三分重裝瓶。

【劑量及用法】週歲每次服半瓶；二、三歲服一瓶。乳汁或糖水調服。

二、蘭州

【功能與主治】清熱化毒，散風鎮驚，解毒。主小兒痰喘，咽喉腫痛，口瘡牙疳，週身發熱，頭面生瘡，皮膚潰爛。

【處方】大黃一兩 大貝 川貝 花粉 赤芍 甘草 銀花 連翹各五錢 沒藥 乳香各錢半 牛黃四分五 冰片二錢五 麝香 珍珠各一分五厘

【制法】共研細末，每瓶重二分。

【劑量及用法】每服一分重，糖水或乳，調服。

【禁忌】辛辣食物。

賽金化毒散

一、北京

【功能與主治】清熱化毒。主小兒疹后余毒不淨，口渴便秘煩躁。

【處方】乳香 沒藥 貝母 黃連各二兩 赤芍 天花粉 大黃各四兩 甘草一兩五錢 共為細粉 兌入：牛黃四錢 冰片五錢 雄黃二兩

【制法】上藥和勻。

【劑量及用法】每服二分，日服二次，溫開水送下。小兒二歲以下者酌情遞減。

二、天津

【功能與主治】清熱，解毒，通便。主皮膚濕毒，頭面生瘡，大便干燥，小便短赤，疹后余毒不淨，疹前大便秘結。

【處方】制乳香 制沒藥 川貝 黃連各二兩 赤芍 花粉 大黃各四兩 甘草一兩五錢 共為細粉 兌入：牛黃四錢 冰片五錢 珍珠八錢 雄黃面二兩

【制法】以上研細和勻，二分重裝瓶。

【劑量及用法】小兒週歲，每瓶分三次服；二、三歲分二次服；四歲以上每次服一瓶。白開水送下。

【禁忌】小兒體質衰弱，脾虛不固者，皮膚虽有濕毒不可服本藥。

三、蘭州

【功能與主治】退熱解毒。主痘疹后余毒不清，頭面生瘡，週身潰爛，發熱便秘。

【处方】乳香二兩 雄黃二兩
沒藥二兩 浙貝二兩 黃連一兩
赤芍四兩 花粉四兩 大黃四兩
甘草一兩五 牛黃四錢 冰片五錢
珍珠八錢

【制法】共研細末。

【劑量及用法】週歲小兒服一分重；二、三歲服一分五厘重；四、五歲服二分重。外敷紫草膏調敷。

【禁忌】生冷及滯滯等物。

四、濟 南

【功能與主治】疹後余毒，瘡癤便秘。

【處方】同天津

【制法】共為細粉。

【劑量及用法】週歲小兒服一分；二、三歲服一分五厘；四、五歲服二分。外用以紫草膏調敷患處，或用胭脂膏亦可。

【禁忌】辛辣、油膩等物。

五、沈 陽

【功能與主治】清熱解毒潤燥。主疹後余毒，瘡瘍腫毒，瘡癤流膿流水，火毒入里，咳嗽喘促，項腫咽痛。

【處方】乳香一錢 沒藥一錢
川貝一錢 明雄五分 黃連一錢
花粉一錢 野軍一錢五分 甘草七分 赤芍二錢 冰片二分 牛黃二分 珍珠四分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】小兒週歲者每服一分；週歲以內服五厘。白開水送下。

【禁忌】腥膻、油膩。

六、撫 順

【功能與主治】消炎解熱。熱毒潛伏，發斑發疹，大熱神昏，咳嗽唇裂，便秘腹瀉，疳積痘毒，扁桃腺腫脹及一切毒瘡均能治之。

【處方】乳香一錢 江珠四分
花粉 川貝各一錢 甘草八分 黃連一錢 赤芍二錢 冰片二分五 牛黃二分 雄黃一錢 沒藥 川軍各一錢

【制法】共為細面。

【劑量及用法】小兒每服一分至二分，白開水送下。

【禁忌】辛辣。

七、吉 林

【功能與主治】清瘟解毒。主瘟

毒潛伏，煩渴思飲，狂妄譫語，咳嗽唇裂，使結秘澀，耳聾，衄血，頤腫瘡毒。

【處方】珍珠 牛黃各一錢 梅片 川連 雄黃 川貝各一兩 赤芍五錢 花粉二兩 大黃四錢（半生半炒） 乳香（去油）一兩 沒藥（去油）一兩 甘草七錢

【制法】共碾細面，珍珠、梅片、牛黃、雄黃另研後入。用玻璃瓶或瓷罐存貯。

【劑量及用法】大人每服七分至一錢。白開水沖服。小兒每服一分至二分。

【禁忌】忌食辛辣。孕婦忌服。

八、哈爾濱

【功能與主治】清瘟解毒。主瘟毒。

【處方】珍珠 牛黃各四錢 梅片一錢 川連 雄黃 乳香（去油） 沒藥（去油）各一兩 赤芍五錢 川貝一兩 花粉二兩 大黃四錢（半生半炒） 甘草七錢

【制法】共碾為細面，珍珠、牛黃、梅片、雄黃另研後入。

【劑量及用法】小兒每服一分至二分；成人每服七分至一錢。白開水沖服。

【禁忌】忌食辛辣。孕婦忌服。

絳 雪 丹

沈 陽

【功能與主治】解熱通便。治小兒煩熱，睡臥不寧。

【處方】芒硝 硃砂各一兩

【制法】共碾極細面，米糊為丸。二分重。

【劑量及用法】二歲小兒每服一丸，砂糖水化下。

附參考古方

【來源】幼科証治准繩。

【功能與主治】治小兒煩熱。

【處方】芒硝一兩 硃砂一兩

【制法】上為末，飯丸芡實大。

【劑量及用法】二歲一丸，砂糖水化下。

五福化毒丹

一、北 京

【功能與主治】清熱解毒。主小

兒瘡疹余毒不淨，熱盛煩渴，口舌生瘡。

【處方】枯梗 生地 赤芍 牛蒡子各五兩 玄參 連翹 甘草各六兩 芒硝五兩 青黛二兩 黃連五兩 共為細粉兌入：犀角二兩

【制法】上藥和勻，煉蜜為丸，重一錢。

【劑量及用法】每服一丸，日服二次，溫開水送下。小兒二歲以下者酌情遞減。

二、天 津

【功能與主治】清實熱解毒。主小兒熱毒實火，口舌生瘡，牙根出血，頸項赤腫，遍身常生瘡癤，疹後余毒不淨。

【處方】生地 連翹（去心） 枯梗 元參（去蘆）各二兩 赤芍 甘草 黃連各五錢 胆草三錢 青黛五錢 芒硝三錢 銀花一兩 炒牛蒡子二兩 共為細粉兌入：犀角粉一錢五分

【制法】以上研細和勻，煉蜜為丸，一錢重。蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】一至二歲每次服一丸，週歲以內酌減。白開水沖服。

【禁忌】疹後瀉痢忌服。

三、上 海

【功能與主治】皮膚瘡毒，口舌燥裂。

【處方】黃連一兩 銀花二兩 甘草一兩五錢 大黃二兩 枯梗一兩五錢 犀角二錢 硃砂一兩

【制法】共研細粉，煉蜜為丸，每丸重五分。

【劑量及用法】每次半丸至一丸，燈心一分煎湯化服。

四、杭州（五福化毒丸）

【功能與主治】小兒熱毒蘊積，譫語躁煩，面赤咽干，口舌生瘡，頭面瘡癤，熱毒腫痛等症。乃涼血清熱之劑。

【處方】熟地 天冬 生地 麥冬 玄參各二兩 生甘草 元明粉各二兩 青黛一兩五錢

【制法】共研細末，煉蜜為丸，每潮重一錢五分。

【劑量及用法】每服一丸。開水化服。

五、沙 市

【功能与主治】此丹治热毒肺胃，能清肺凉血。主瘡疹余毒，口齿出血，牙疳口臭，唇舌生瘡等症为初生小兒要药。

【处方】桔梗 芒硝 玄参 牛蒡子 青黛 粉甘草 赤芍各六錢 犀角一錢 連翹五錢 生地五錢 黃連一錢

【制法】余芒硝外共研細末，次和青黛等药煉蜜为丸，每粒重五分。

【剂量及用法】每次服一丸或兩丸，温开水下。

【禁忌】体虛無热者忌服。

六、西 安

【功能与主治】主治成人、小兒風热，腦神經不清，惊癇，疹后余毒，时發昏迷，午后潮热，腸胃燥热，大便不暢，小便短赤等症。

【处方】犀角五錢 生地八錢 連翹八錢 玄参二兩 牛蒡子四錢 青黛五錢 桔梗六錢 芒硝八錢 粉草八錢

【制法】上十味选上等藥品，分別搗杵罗末和勻，煉蜜为丸，每丸重一錢。硃砂为衣，用蜡皮包封。

【剂量及用法】成人每次服二丸；小兒一岁以下每次服半丸；二岁至五岁每次服一丸。一日兩次，薄荷湯送下。

【禁忌】小兒慢惊風久瀉者不宜服用。

七、蘭 州

【功能与主治】清实热解毒。主小兒蘊积热毒实火，口舌生瘡，牙根出血，頰項赤腫、头面身体常生瘡癤，实热丹毒等症。

【处方】生地二兩 牛蒡子二兩 連翹二兩 元参二兩 桔梗二兩 犀角一錢半 赤芍五錢 粉草五錢 川連五錢 胆草三錢 青黛五錢 芒硝三錢

【制法】共研細面，蜜丸一錢重。

【剂量及用法】每次服一丸，不滿岁小兒減半或三分之一。白开水化服。

【禁忌】辛辣。

八、大 同

【功能与主治】热毒瘡症。

【处方】生石膏三錢 犀角三錢 桔梗一兩 大生地五錢 連翹六錢 元参六錢 青黛二錢 牛蒡子五錢 生草三錢 赤茯苓五錢

【制法】共为細末，煉蜜为一錢大丸。

【剂量及用法】三岁以下每服一丸。

九、濟 南

【功能与主治】主小兒一切瘡癤，疹后余毒。

【处方】【制法】同蘭州。

【剂量及用法】每服一丸，不滿週岁小兒減半，或服三分之一。白开水化服。

十、沈 陽

【功能与主治】解毒，消腫。主小兒胎毒，瘡毒腫痛，刺痒难堪，皮膚瘡疥破流毒水。

【处方】白人参錢五分 白茯苓一錢 桔梗一錢 胆草錢半 玄参二分 川黃連二錢 青黛錢半 粉草二錢 薄荷叶八分 木通八分 硃砂八分 冰片一分五厘

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸。七分重。

【剂量及用法】每服一丸。空心白开水送下。

十一、承 德

【功能与主治】小兒一切瘡癤，疹后余毒。

【处方】【制法】同蘭州。

【剂量及用法】每服一丸，不滿週岁小兒減半或服三分之一。白开水化服。

十二、呼 和 浩 特

【处方】犀角五分 黃連 生地 甘草 薄荷 花粉各一兩 元参 黃芩 桔梗 連翹各二兩 皮硝一兩 冰片三分

【制法】蜜大丸，重一錢，青黛衣。

附参考古方

【来源】重刻太平惠民和剂局方。

【功能与主治】治小兒蘊积毒热，惊惕狂躁，頰赤咽干，口舌生瘡，夜臥不宁，譫語煩渴，头面身体多生

瘡癤。

【处方】玄参(洗焙) 桔梗各六兩 茯苓(去皮)五兩 人参(去蘆)牙硝(枯过) 青黛(研)各二兩 甘草(剉炒)一兩半 麝香(研)半錢 金箔 銀箔各八片为衣

【制法】上为細末，入研药勻，煉蜜为丸，每兩作十二丸。

【剂量及用法】一岁兒一丸分四服，薄荷湯化下。及瘡疹后余毒上攻，口齿涎血臭气，生地黄自然汁化一丸，用鷄翎打在口內。热瘡肌肉黃瘦，雀目夜不見物，陈粟米泔化下，食后臨臥服。

小兒化毒丹

南 京

【功能与主治】主小兒胎火，口舌生瘡，及疹痘后余热未清等症。

【处方】桔梗二兩五錢 川黃連二錢五分 生地一兩五錢 甘草三兩 赤芍二兩五錢 牛蒡子二兩五錢 元参三兩 芒硝一錢五分 連翹二兩 薄荷五錢 青黛一兩

【制法】上药共研細末，煉蜜为丸，每粒五分。

【剂量及用法】每服一至二丸，开水化服。

犀角化毒丹

大 同

【功能与主治】小兒火毒，一般瘡癤，眼目赤腫，宿食积热，疹后余热。

【处方】犀角一兩 薄荷 甘草 砂仁各一兩五錢 苦桔梗 川芎 黃芩 連翹 梔子各二兩 淡豆豉 澤瀉 花粉 銀花 藿香 菊花各三兩 焦楂 焦麦芽 焦神曲各一兩四錢 滑石四兩

【制法】共为細末，煉蜜为丸，每丸重五分。蜡皮。

【剂量及用法】未滿週岁小兒，每丸分三次服之；一岁以上服半丸；三岁以上服一丸。

小兒化毒錠

天 津

【功能与主治】清解化毒。主諸般瘡癤，濕熱胎毒，皮膚風疹，余毒

不淨，口渴煩躁，大便不通。

【处方】胡連 薄荷 大黃 赤芍 花粉 銀花 生梔子各三錢 甘草二錢共為細粉兌入，雄黃面一

錢 硃砂面五分 麝香二分 冰片五分

【制法】以上研細和勻，煉蜜為

丸，五分重，蜡皮或紅紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，週歲以內酌減，白開水化服。

五官科

眼目类

明目蒺藜丸

一、北京、承德

【功能与主治】清热散风，退翳明目。主暴發火眼，羞明怕日，云翳障翳，胬肉攀睛。

【处方】黄連十二兩 薄荷 連翹 川芎 白芷 密蒙花 石决明（生） 黄柏 防風 梔子 蟬蛻 荆芥 赤芍 木賊草 旋复花 草决明各四十八兩 蔓荊子 当归 生地 黄芩各九十六兩 蒺藜一百四十四兩（炒去刺） 菊花一百四十四兩 甘草二十四兩

【制法】共为細粉，煉蜜为小丸。

【剂量及用法】每服三錢，白开水送下。

二、天津

【功能与主治】清热散风，明目退翳。主云翳障翳，胬肉攀睛，迎風流淚，怕日羞明，眼边紅爛。

【处方】川芎 蒺藜（鹽炒） 木賊草 蟬退各八兩 菊花十二兩 薄荷叶三兩 防風 桔梗 胆草各五兩 当归尾 赤芍 生地 羌活各四兩 白芷 黄芩 甘草各一兩 五錢 复花八兩 草决明五兩

【制法】共为細粉，凉开水泛小丸，三錢重。裝袋。

【剂量及用法】每次服一袋，白开水送下。

【禁忌】禁房事；忌辛辣食物。

三、福州

【功能与主治】治肝肾不足，目生障翳，視物昏花，迎風流淚，羞明怕日，雀目，青盲，暴發赤腫，天行时眼，一切眼症。

【处方】白蒺藜十六兩 雞子白十个

【制法】將雞子白拌蒺藜一宿，晒干为末，水泛为丸。

四、杭州

【功能与主治】治目生障翳，視物昏花，迎風流淚，畏日羞明，雀目青盲，目赤暴腫，各种目疾。有平肝祛風，明目退翳之功。

【处方】同福州。

【制法】將雞子白拌蒺藜一夜，晒干研末，水泛为丸。

【剂量及用法】每服三錢。开水送下。

五、蘭州

【功能与主治】散風明目，清热退翳。主暴發紅腫，障翳云朦，視物昏花，流淚怕光，眼边紅爛。

【处方】同天津。

【制法】共为細面，水打小丸。

【剂量及用法】每次三錢，白开水送下。

【禁忌】忌食刺激性食物。

六、禹县

【功能与主治】内外翳障，迎風流淚，暴發赤腫，气眼酸痛。

【处方】白蒺藜 生地 当归 赤芍 川芎 菊花 連翹 木賊 黄芩 防風 荆芥 羌活各六兩 甘草 蟬蛻 白芷各三兩

【制法】共碾細面，水为丸。

【剂量及用法】每服二錢，白开水送下。

【禁忌】血虛忌用。

【备考】有效期二年。

七、济南

【功能与主治】暴發火眼，紅腫羞明。

【处方】同天津

【制法】共为細末，水泛小丸，綠豆大。

【剂量及用法】每服三錢，白开水送下。

【禁忌】忌食辛辣、腥羶等食物。

八、青島

【处方】黄連四兩 連翹一斤

白芷一兩 菊花一斤 黄芩一斤
薄荷一斤 归尾一斤 决明四兩
黄柏八兩 蔓荊子四兩 甘草四兩
蒺藜二斤 复花四兩 草决明四兩
梔子四兩 川芎四兩 木賊八兩
防風八兩 芥穗八兩 蟬退八兩
生地一斤 赤芍八兩

【制法】共軋面，水泛小丸。

九、沈陽

【功能与主治】清热散风，退翳明目。主眼疾暴發，赤腫外障，翳膜遮睛，風火眼，天行赤眼，視物昏花，迎風流淚，羞明怕日，夜盲症，一切外障目疾。

【处方】当归 丹皮 赤芍 川芎各二兩 龙胆草 防風 荆芥穗各一兩 黄芩 山梔 連翹 甘菊花 蔓荊子 生地黃各四兩 蒺藜八兩 决明子六兩 黄連一兩

【制法】共碾極細面，水泛为小丸。

【剂量及用法】每服一錢至二錢。

【禁忌】忌辛辣、烟酒及有刺激性之食物。

十、撫順

【处方】蒺藜四兩 木賊八兩
防風八兩 川芎四兩 羌活四兩
全退四兩 生地四兩 赤芍八兩
归尾四兩 甘草四兩 荆芥八兩
白菊八兩 黄芩八兩 連翹八兩
山梔四兩 蔓荊子四兩 白芷四兩

【制法】共为細面，水泛小丸。

十一、吉林、哈尔滨

（蒺藜丸、蒺藜明目丸）

【功能与主治】平肝明目，退翳清热。主肝旺腎虛，目生障翳，視物昏花，迎風流淚，羞明畏光，雀目青盲，痰火上灼，目赤赤腫，胬肉脹痛，熱淚不止，白膜遮睛，血絲貫瞳，眼泡浮腫，瞳人散大。

【处方】桔梗 蒺藜 木賊 羌活 蟬蛻 薄荷 防風 草决 复盆 当归 川芎 白芍 生地 白

芷各七兩

【制法】共為細面，用水泛為小丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，白水送下，日二、三次。

【禁忌】忌食辛辣；孕婦忌服。

十二、呼和浩特

【處方】川芎 木賊 蒺藜 蟬退各二斤 薄荷 防風各一斤四兩 菊花 復花各三斤半 桔梗一斤四兩 當歸 白芍 羌活 生地各一斤 白芷 黃芩各十兩 甘草六兩 胆草 草決各一斤四兩

【制法】水泛小丸。

明日上清丸

一、北京、濟南、承德

【功能與主治】清熱散風，明目止痛。主暴發火眼，紅腫作痛，頭暈目眩，云翳遮睛。

【處方】黃連 菊花 玄參 熟大黃 枳殼 橘皮 桔梗 黃芩 薄荷 甘草 當歸 赤芍 荊芥 連翹 蒺藜(炒) 梔子 蟬蛻 天花粉 生石膏 車前子 麥冬各五兩

【制法】共為細粉，水泛小丸，滑石為衣闔亮。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水送下。(承德每服二十粒，即一錢，日服三次)

【禁忌】忌辛辣食物；孕婦勿服。

二、天津

(清心明日上清丸)

【功能與主治】清熱散風，明目止痛。主暴發火眼，紅腫作痛，頭暈目眩，眼邊刺痒，大便燥結，小便赤黃。

【處方】黃連 桔梗 元參(去蘆) 熟軍 枳殼(麸炒) 廣皮 菊花 黃芩各八兩 薄荷 甘草 當歸尾 赤芍 荊芥 連翹(去心) 蒺藜(鹽炒) 生梔子 蟬退 花粉 生石膏 麥冬 車前子各五兩

【制法】共為細粉。水丸——涼開水泛小丸。三錢重，裝袋；蜜丸——煉蜜為丸，三錢重，蠟皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】水丸——每次服一袋；蜜丸——每次服一丸。白開

水送下。

【禁忌】孕婦及患內障眼，體虛者勿服；禁房事；忌辛辣食物。

三、杭州

【功能與主治】涼血清肝，散風降熱。治陰虛肝旺，風熱上攻，翳膜外障，目視昏糊，多淚疼痛，倒睫，各種風熱目疾。

【處方】大生地四兩 決明子 青防風 大黃 全當歸 桑白皮 蔓荊子 木賊草 白菊花 荊芥各二兩 川黃連 粉甘草 冬朮 獨活 白桔梗 黃芩 連翹 川羌活 龍胆草 川芎 軟柴胡各二兩

【制法】生晒研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服二至三錢。開水送下。

【禁忌】忌酒色及辛熱之物。

四、蘭州

(清心明日上清丸)

【功能與主治】散風，解熱，明目。主暴發火眼，白睛紅赤，痛痒怕光，流淚，眼皮紅腫。

【處方】黃連半斤 桔梗半斤 元參半斤 熟軍半斤 枳殼半斤 廣皮半斤 菊花半斤 黃芩半斤 薄荷五錢 甘草五錢 歸尾五錢 赤芍五錢 荊芥五錢 連翹五錢 蒺藜五錢 梔子五錢 蟬蛻五錢 花粉五錢 生石膏五錢 寸冬五錢 車前子五錢

【制法】共為細面，水打小丸。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

【禁忌】忌刺激性食物。

五、大同

(清心明日上清丸)

【功能與主治】清心火，明目。

【處方】川連 菊花各四兩 元參 熟軍 枳殼 廣皮 桔梗 黃芩各八兩 薄荷 甘草 歸尾 赤芍 荊芥 連翹 蒺藜 梔子 蟬退 花粉 石膏(火燉) 車前子 寸冬各五兩

【制法】水泛為丸。

【劑量及用法】每服三錢。

六、青島(1)

【處方】歸尾 生地 黃芩 薄

眼目炎

荷 枳殼 草決各十二兩 川芎 菊花 連翹 桔梗 防風 白芷 荊芥 木賊 生軍各半斤 羌活六兩 甘草四兩

【制法】共軋面，水泛小丸。

七、青島(2)

【處方】連翹四斤 大黃十二斤 川芎二斤 黃連半斤 菊花八斤 白芷四斤 芥穗四斤 甘草二斤 薄荷二斤 蔓荊子四斤 防風二斤 旋復花一斤 桔梗四斤 黃芩四斤 黃柏二斤 梔子四斤 石膏一斤

【制法】共軋面，水泛小丸。

八、呼和浩特

(附：明日上清膏)

【處方】歸尾十斤 川芎五斤 生地 黃芩各七斤半 菊花 連翹各三斤十二兩 薄荷七斤半 枳殼七斤半 桔梗 防風 黃柏 荊芥 川芎各三斤十二兩 澤瀉 白芷 大黃各五斤 粉草二斤半 草決明七斤半

【制法】水泛小丸。

【備考】明日上清膏：上方熬膏，每斤兌大黃二兩，薄荷面三兩。

菊花明目丸

(菊花通聖丸)

沈陽

【功能與主治】清熱明目。主暴發火眼，胞腫痒痛，白睛發赤，時流熱淚，眼臉赤爛，黑睛翳障。

【處方】羚羊五錢 防風 川芎 大黃 赤芍 連翹 麻黃 芒硝 薄荷 當歸 滑石 甘草 梔子仁 白朮 桔梗 生石膏 荊芥穗 黃芩各一兩 菊花 黃連各一兩五錢 川芎五錢 蒺藜一兩

【制法】共軋極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，小兒酌減。食後白開水送下。

【禁忌】忌食五辛、魚腥。

羚羊明目丸

沈陽

【功能與主治】清熱明目，活血止痛。主外障眼病，胬肉佈睛，目赤腫痛，暴發火眼，云翳障目。

【处方】羚羊角一两 白菊花二兩 川芎一两 車前一两 防風六錢 羌活五錢 薄荷五錢 赤芍一两 大黃五錢 朴硝五錢 血竭二錢 沒藥二錢 丹皮三錢 紅花五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸七分重。

【劑量及用法】每服一丸，食前白開水送下。

【禁忌】忌辛辣等食物。

清火明目丸

呼和浩特

【处方】歸尾四兩 川芎二兩 生地 黃芩各二兩 菊花二兩 連翹一兩五錢 薄荷 枳殼各二兩 桔梗 防風 黃柏 荆芥 川芎各一兩五錢 白芷二兩 澤瀉二兩 川軍三兩 草決二兩 石決二兩 黃連一兩 甘草一兩五錢 薄荷冰八錢 冰片六錢

【制法】蜜大丸，重一錢，蜡皮。

疏肝明目丸

沈陽

【功能與主治】清肝涼血，散風退翳。主目赤紅腫，餐肉攀睛，迎風流淚，血灌瞳仁，一切外障。

【处方】酒大黃五兩五錢 山藥 山萸肉 龜絲子 枳殼 白菊花 木賊 決明子 當歸 生地黃 紅花各五兩 淨蟬蛻 羌蔚子 赤芍 龍胆草 金石斛 青皮 地骨皮 石決明 玄參 桃仁各五錢 檳榔 獨活 防風 羌活各五錢 火麻仁 郁李仁各二兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水下。

【禁忌】忌五辛、烟酒。

單料羚羊珀明目丸

哈爾濱

【处方】黃連羊肝丸面一斤 再加黃連 生梔子 生石膏 黃芩各五錢 羚羊二錢 琥珀五錢 冰片 薄荷冰各一錢

【制法】共為細面，蜜小丸。

加料羚羊珀明目丸

呼和浩特

【处方】黃連 川芎 木賊 枳殼 五味各六錢 杏仁 人參 甘草 青葙 青鹽 黃柏 蒙花 寸冬 菊花 蒺藜 山藥 當歸 杜仲各一兩八錢 生地 天冬各二兩七錢 全蠍 防風 荆芥各四錢五分 蔓荊子 茯苓 枸杞 石斛 草決 龜絲子 沙苑 蟬蛻各一兩四錢 知母一兩八錢 羚羊二兩 琥珀二兩 冰片四錢 薄荷冰二錢

【制法】共為細面，蜜大丸重二錢，半金衣，蜡皮封固。

小兒明目丸

天津

【功能與主治】明目退熱。主上焦熱盛，兩眼紅腫，疼癢不安，二便不利。

【处方】薄荷二錢 赤芍 黃芩 生梔子 花粉 人黃 銀花各二錢 甘草二錢 白菊花 黃連 車前子各一錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸五分重。每斤丸藥用硃砂面三錢上。蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，週歲以內酌減。白開水化服。

清風養血丸

南昌

【功能與主治】目赤腫痛。

【处方】荆芥 蔓荊子 菊花 白芷 麻黃 防風 桃仁(去皮尖) 紅花(酒炒) 川芎各五錢 當歸(酒洗) 白芍(酒炒) 草決明 石決明 甘草各一兩

【制法】共研細末，水泛為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】日服二次，每服二錢，開水送下。

【禁忌】忌食酸、辣及炙燂之物，孕婦忌服。

肝明丸

沈陽

【功能與主治】清熱明目，磨云

退障。主云翳障目，視物昏花，青盲夜盲，迎風流淚，眼臉作痒。

【处方】熟地黃 龜絲子 車前子 麥冬 薏仁 決明子 地膚子 羌蔚子 枸杞子 五味子 黃芩 防風 澤瀉 杏仁 細辛 青葙子 葶藶 官桂 羊肝(焙干)各一兩五錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】忌食辛辣、油膩發物。

開光復明丸

大同

【功能與主治】清心肺，退云，明目散風。

【处方】梔子二兩 川連四兩 黃芩 黃柏 大黃各二兩 澤瀉 元參 紅花 胆草各一兩 赤芍 歸尾各一兩二錢 菊花二兩 防風一兩 生地一兩二錢 石決明 蒺藜各二兩 羚羊一錢 冰片五錢

【制法】共為細面，煉蜜為一錢五分丸。金箔上，蜡皮封固。

【劑量及用法】每服二丸，白開水送下。

再造還明丸

杭州

【功能與主治】治血虛肝熱，目腫疼痛，漸生障翳，多淚羞明，隱隱畏光，視物不清等症。

【处方】懷山藥四兩 木賊草二兩 枸杞子一兩 龍衣一兩 望月砂二兩 丹參 茯苓 蟬衣 谷精草各三兩

【制法】共研細末，水泛為丸。

【劑量及用法】每服二錢，早晚各一次。開水送下。

黃連羊肝丸

一、北京

【功能與主治】補血，清熱，消炎。主血分熱盛，眼目昏暗，羞明怕光，餐肉攀睛。

【处方】黃連二十兩 草決明 黃芩 石決明(生) 柴胡 夜明沙 密蒙花 木賊草 羌蔚子 青皮

胡黄连各四十兩 龙胆草 黄柏各二十兩 鮮羊肝一百六十兩煮熟連湯炮制。

【制法】晒干共为細粉，煉蜜为小丸。

【剂量及用法】每服三錢，日服二次，溫开水送下。

【禁忌】忌辛辣食物。

二、天 津

【功能与主治】消炎，明目，止痛。主凡屬火旺，眼目昏暗，羞明怕光，齆肉攀睛，眼珠疼痛，迎風流淚。

【处方】胆草 羌藟子 木賊 蒙花 黄連各一斤四兩 夜明砂 柴胡 胡連 生石决明各二斤八兩 蒺藜(鹽炒)二斤 黄芩 炒草决明各二斤八兩 鮮羊肝十斤 黄柏 青皮(醋炒)各一斤四兩

【制法】將鮮羊肝煮熟和前药串一处晒干，共为細粉，煉蜜为丸，三錢重。蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一九，白开水送下。

【禁忌】忌辛辣食物。

三、蘭 州

【功能与主治】散風明目，消炎止痛。主暴發火眼，兩目紅腫，怕光流淚，視物昏花，眼珠疼痛。

【处方】同天津。

【制法】將白羊肝煮熟，和前药共研細面，蜜小丸。

【剂量及用法】每次一錢，每日服二次。白开水送下。

【禁忌】刺激性食物。

四、大 同

【功能与主治】肝胆火熾，目赤紅腫，羞明，目多淚或生云翳。能清心火，明目，退翳。

【处方】石决 草决 木賊 夜明砂 胆草各一斤四兩 柴胡 青皮 川黄連 胡連 黄柏各一斤四兩 黄芩 蒙花 羌藟子各二斤半 羊肝二对

【制法】共軋細末，煉蜜为小丸。

【剂量及服法】每次服三錢，日服二次。开水送下。

五、濟 南

【功能与主治】雀盲。

【处方】黄連一兩 羊肝一斤

【制法】先以黄連研为細末，用竹刀將羊肝剖开去筋膜，在乳鉢中研細如糊，入黄連末搗合为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服一錢，白开水送下。

【禁忌】忌辛辣等有刺激食物。

六、青 島

【处方】当归 白芍 茯苓 梔子 枸杞 川芎 黄連 粉草 犀角各二兩 蒺藜六兩 生地 熟地 山萸各八兩 桔梗五兩 青箱 麦冬 石决明 蒙花 元参 草决明各二兩 木賊 蟬退 五味子各一兩 羊肝二具

【制法】共軋極細面，蜜为小丸。

七、呼和浩特

【处方】黄連 川芎 木賊 枳壳 五味各六兩三錢 杏仁 前参 甘草 菴子 入青鹽 黄柏 知母 蒙花 麦冬 菊花 蒺藜 山药 羚羊 犀角 当归 杜仲各一斤二兩 生地 天冬各一斤十一兩 金銀 防風 荆芥各四兩五錢 蔓荊子 茯苓 枸杞 石斛 草决 菴絲子 沙苑各十二兩五錢 羊肝十具

【制法】共为細面，蜜小丸。

明目羊肝丸

一、上海(羊肝丸)

【功能与主治】主視物模糊，眼瞢不舒。

【处方】当归身(酒洗)二兩 夜明砂(淘淨)二兩 羊肝八兩 蟬衣二兩 木賊草(去节)二兩

【制法】除羊肝外，余药共研細粉，再將羊肝去筋膜煮爛搗和，加糊为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服一錢五分至三錢，溫开水送服。

【禁忌】忌食辛辣等有刺激性食物。

二、南 京

【功能与主治】主下眼，夜盲。

【处方】羊肝四兩 夜明砂二兩 蟬衣二兩 木賊草二兩 西当归二兩

【制法】除羊肝外，共研細末，將羊肝洗淨煮爛，杵融和末为小丸，每

錢約計做成三十粒。

【剂量及用法】每服三錢，一日一至二次，开水吞服。

三、福 州

【功能与主治】治肝虛，風熱，冷淚，赤瘤，內外障眼。

【处方】黄連二兩 家菊花 龙胆草 石决明(煨) 人參 当归 熟地 枸杞 麦冬 牛膝 青鹽 黄柏 柴胡 防風 羌活各八錢 肉桂四錢 羯羊肝一具(焙干为末)

【制法】上为末，煉蜜丸，桐子大。

【剂量及用法】每服三、四十丸，溫湯下。

四、杭州(羊肝丸)

【功能与主治】平肝养血，散熱退翳。治新久目疾，障翳遮睛，視無所見，迎風流淚，眼弦赤爛，病后目疾。

【处方】同上海(少一半)。

【制法】共研細末，將羊肝水煮，搗爛为丸。

【剂量及用法】每服三錢，开水送下。早晚各一次。

五、南昌(羊肝丸)

【功能与主治】目疾內障。

【处方】同杭州。

【制法】共研細末，方內羊肝去筋膜，水煮熟爛和蜜为丸。

【剂量及用法】日服二次，每服三錢，白开水送下。

【禁忌】忌辛辣食物。

六、沈陽(1)

【功能与主治】主內障云翳，視物昏花，迎風流淚，雀目青盲，暴發火眼，目赤睛疼，瞳人昏散，視力不足，病后云膜，赤腫皆爛，种种目疾，經久不愈者均有特效。

【处方】羊肝二兩 白蒺藜一兩 菊花一兩 川芎三錢 石决明一兩 生地黃一兩 楮實子五錢 槐角五錢 黄連五錢 五味子五錢 荆芥穗二錢五分 当归五錢 甘草五錢 薏仁七錢 防風二錢

【制法】羊肝以水煮熟，再將諸药碾極細面，煉蜜为丸，二錢重。

【剂量及用法】一日服二次，食后清水送下。

七、沈陽(2)

【功能与主治】补肝益肾，明目退翳。主云朦、火朦、雀朦，视物昏花，迎風流淚，暴發赤腫，痘后眼症，以及眼边赤爛。

【处方】夜明砂 蟬蛻 当归 川黃連 木賊各二兩 羊肝六兩 枸杞一兩 生地黃二兩 菊花一兩 羚羊角五錢 草決明二兩 沙苑二兩 蒺藜二兩 防風一兩 荆芥穗三兩 川芎二兩 羌活二兩

【制法】共碾極細面，將羊肝水煮，銅器中搗爛，和藥面為小丸。

【劑量及用法】每服一錢至二錢，食后清茶送下。

【禁忌】五辛發物。

八、沈陽(3)

【功能与主治】清火明目，退翳障。主內障云翳，視物昏花，迎風流淚，雀目青盲，瞳人昏散，視力不足，病后云膜、赤腫皆爛。

【处方】羊肝六兩 夜明砂二兩 蟬退二兩 木賊二兩 当归一兩 黃連二兩 枸杞二兩 生地二兩 菊花二兩 草決明二兩 沙苑子二兩 防風一兩 川芎二錢 羌活三錢 蒺藜二兩 芥穗三錢

【制法】先將羊肝切薄片晾干，合諸藥共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】一日服二次，食后白開水送下。

九、撫順

【功能与主治】滋養明目。主肝腎虛，營養不足，以致二目昏花，視物不明，瞳人散大，二目干澀，雀朦夜盲，畏日羞明，以及火眼之后，二目昏暗日久不愈者。

【处方】菊花一兩 犀角三錢 熟地四兩 防風二兩 寸云一兩 当归一兩 枸杞一兩 川羌活二兩 草決四兩 生地二兩 楮實一兩 沙苑二兩 丹皮兩半 澤瀉兩半 茯苓兩半 山藥二兩 黃連五錢 萸肉五錢 羊肝二兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下，每日二次。

【禁忌】忌食辛辣。

十、吉林(羊肝丸)

【功能与主治】养肝助肾，清头明目。主瞳人散大，羞明视物不清，雀目青盲，眼边赤痒，流淚等症。

【处方】羯羊肝一具(薄切，新瓦上焙干) 菟絲子一兩 車前子一兩 麥門冬(去心)一兩 決明子一兩 白茯苓 五味子 枸杞子 羌蔚子 苦葶藶 萎蕤仁(去壳皮) 地膚子(去壳) 建澤瀉 軟防風 子条芩 苦杏仁(炒) 北細辛 貢桂心 青箱子各一兩 熟地黃一兩五錢

【制法】共碾為細面，煉蜜為小丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，空腹白開水送下。每日三次。

【禁忌】忌食辛辣。

十一、承德

【功能与主治】视物流淚，雀盲昏花。

【处方】羊肝六兩 夜明砂 蟬蛻 木賊草 当归 黃連 生地 菊花 草決明 沙苑子 蒺藜各二兩 防風 枸杞子各一兩 川芎三錢 羌活三錢 荆芥穗三錢

【制法】先將羊肝切片晾干，合諸藥，共碾細粉，煉蜜為丸，重二錢。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，食后白開水送下。

附參考古方

【來源】類証普濟本事方。

【功能与主治】治內障。

【处方】白羯羊肝(只用于肝一片，薄切瓦上焙干) 熟地一兩半 菟絲子 車前子 麥冬 蕤仁 決明子 澤瀉 防風 地膚子(去壳) 黃芩 白茯苓 五味子 枸杞 羌蔚子 杏仁(大者炒) 苦葶藶 華陰細辛 桂心 青箱子各一兩

【制法】上為末，蜜丸，如梧子大。

【劑量及用法】每服三、四十丸，溫水下，日三服，不拘時。

明目雁肝丸

沈陽

【功能与主治】滋补清热，养血明目。主肝虛目澀，視物昏花，云翳遮睛，倦怠眩暈，口苦咽干，血虧視弱，眼珠刺痛，手足燥熱。

【处方】羚羊八錢 菊花 熟地

黃肉蓯蓉 枸杞 防風各二兩 生地黃 決明子 川羌活各二兩 当归 楮實各一兩 沙苑子二兩 雁肝一具焙干

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，一日二次，白開水或茶水或菊花煎湯送下。

【禁忌】忌食五辛、烟酒。

明目地黃丸

一、上海

【功能与主治】視物模糊，目澀羞明。

【处方】熟地八兩 茯苓 牡丹皮(酒炒)各三兩 澤瀉(鹽酒炒)三兩 懷山藥(炒)四兩 山茱萸肉(酒炒)四兩 白芍藥(炒) 白菊花 当归 枸杞子 白蒺藜(炒)各二兩 石決明四兩

【制法】共研細粉，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢，淡鹽湯送服。

二、南京

【功能与主治】主目澀多淚，視物不清。

【处方】同上海。

【制法】上藥共研細末，煉白蜜為丸，每錢約做十五粒。

【劑量及用法】每服三錢，一日二次，開水吞服。

三、武漢

【功能与主治】目赤翳膜，青盲內障，腫疼發痒。及治因虛損而發生的各種目疾。

【处方】同上海

【制法】小丸——取上藥進行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜55—60%，迭成小丸，每錢不得少于二十五粒。

大丸——如法得淨粉后，加煉蜜110—120%，和成大丸，每丸重為二錢。

【劑量及用法】每服三錢至五錢。

四、福州

【功能与主治】治肝腎俱虛，風

邪所乘，热气上攻，目翳遮睛，目澀多淚，瞳人散大，視物不清等症。

【处方】大熟地八兩 茯苓 白芍 丹皮 澤瀉 甘菊 當歸 枸杞 菴藜各二兩 淮山藥 石決明 石棗各四兩

【制法】共研細末，和蜜煉為丸。

五、杭州

【功能与主治】治肝腎兩虛，風熱上攻，目睛內障，翳膜遮睛，隱澀羞明，迎風流淚，瞳人散大，視物不清等症。凡血虛目疾，宜常服。

【处方】大熟地 大生地各十六兩 怀山藥二兩 金石斛 江枳壳 苦杏仁 青防風各四兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二至四錢，淡鹽湯送下。

六、蘭州

【功能与主治】去上焦虛熱。補心血不足。主頭暈眼花，老年因血液不足，以致視物昏花，營養不足，視力不明，以及缺乏維他命，夜盲等症。

【处方】六味丸面一料 知母 黃柏 菊花 杭芍 沙苑 菴絲各三兩 川芎 琥珀各一兩

【制法】以上共為細面，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

【禁忌】忌刺激性食物。

七、大同

【功能与主治】滋陰明目。

【处方】大熟地八兩 山萸 山藥各四兩 云苓 澤瀉 丹皮各三兩 白芍 沙苑子 當歸各二兩 柴胡 菊花 枸杞 決明 蟬退各一兩五錢 石決明一兩

【制法】蜜成二錢大丸。

【劑量及用法】每服一丸。

八、禹县

【功能与主治】肝腎血虧，眼目昏暗，內外翳障，胬肉攀睛，久患眼疾。

【处方】熟地八兩 山萸 山萸肉各四兩 牡丹皮 澤瀉 黃柏各三兩 白菊花 當歸 枸杞子各四兩 白芍 知母各二兩 柴胡二兩

延五味四兩 白茯苓二兩

【制法】共碾細面，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢。早晚空心服，開水送下。

【禁忌】寒火忌用。

【備考】有效期間一年。

九、濟南

【功能与主治】眼目昏花，流淚羞明。

【处方】熟地八兩 山萸 山萸肉各四兩 丹皮 茯苓 澤瀉各二兩 當歸 枸杞子各四兩 菊花 白芍 菴藜各三兩 石決明四兩

【制法】煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服三錢。

【禁忌】忌食辛辣、油膩等物。

十、青島(1)

【处方】當歸四兩 川芎二兩 白芍三兩 菊花四兩 菴藜六兩 菴絲子二兩 黃柏二兩 知母三兩

【制法】共軋細面，蜜丸，如梧桐子大。

十一、青島(2)

【处方】生地十八斤 熟地十八斤 枳殼四斤半 防風四斤半 牛膝二斤零四錢 杏仁一斤零四錢 石斛半斤 黃柏三斤 知母三斤 菊花四斤半 丹皮二斤零四錢

【制法】共軋面，蜜丸如桐子大。

十二、沈陽

【功能与主治】腎虛目暗，羞明疼痛，視力減弱，瞳子混濁，兩目干澀，或久服涼藥不愈者當服此藥。

【处方】熟地黃四兩 生地黃 生山藥 澤瀉 山萸 牡丹皮 柴胡 茯苓 當歸 五味子 菊花各二兩 枸杞三兩 菴藜二兩 車前子二兩 白芍一兩五錢 知母一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，淡鹽湯送下。

【禁忌】忌食鹽。

十三、撫順

【功能与主治】補水清火明目。主肝腎俱虛，風火上攻，目翳遮睛，

瞳人散大，視物昏花等症。

【处方】熟地八兩 山萸 山萸肉各四兩 澤瀉 丹皮 云苓各三兩 杞子 菊花各四兩 車前三兩 當歸 菴絲子各四兩 鹽知母 鹽黃柏 白芍 川芎各二兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服二錢，白水送下。

【禁忌】忌食辛辣等物。

十四、哈爾濱

【功能与主治】補水清火明目。舉凡肝腎俱虛，風熱上攻之一切目翳遮睛，目澀多淚，瞳人散大，內障昏花，視物不明等症，並皆治之。主目翳遮睛，目澀多淚，內障昏花，瞳人散大。

【处方】同上海。

【制法】共碾為細面，煉蜜為丸，如梧桐子大。瓷罇存貯。

【劑量及用法】每服二錢，白水送下。

【禁忌】忌食辛辣。

十五、呼和浩特

【处方】熟地 生地各四斤 枳實 枸杞 石斛 牛膝 杏仁 絲子 防風 獨活 知母 黃柏 沙苑各二斤

【制法】共為細面，蜜小丸。

杞菊地黃丸

一、北京

【功能与主治】滋補明目。主身體衰弱，視物昏暗，迎風流淚，頭眩耳鳴。

【处方】枸杞子 菊花各一兩 熟地四兩 山萸 山藥各二兩 茯苓 丹皮 澤瀉各一兩五錢

【制法】共為細粉，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服三錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦勿服。

二、天津

【功能与主治】滋腎明目。主身體衰弱，視物昏暗，迎風流淚，頭昏耳鳴，內障散光，視神經衰弱。

【处方】同北京(大一倍)。

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，三錢重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，淡鹽水送下。

【禁忌】禁房事；忌食辛辣之物。

三、上海

【功能与主治】目赤腫痛，畏光羞明，久視昏暗，頭暈足軟。

【处方】同天津。

【制法】共研細粉，煉蜜為丸，如梧子大。

【剂量及用法】每服三錢，溫開水送服。

【禁忌】忌刺激性食物。

四、南京

【功能与主治】主頭暈，目昏，目赤，羞明，迎風流淚。

【处方】同北京。

【制法】共研細末，加煉白蜜為丸，每錢約做十五粒。

【剂量及用法】每服三錢，一日二次，淡鹽水或開水吞服。

五、武漢

【功能与主治】目赤腫痛，久視昏暗，迎風流淚，怕日羞明及盜汗潮熱。

【处方】熟地黃四兩 建澤瀉一兩半 淮山藥二兩 酸棗皮二兩 茯苓一兩半 粉丹皮一兩半 枸杞子一兩 白菊花一兩

【制法】小丸——取上藥進行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜50—52%送成小丸，每錢不得少于二十五粒。大丸——如法得淨粉后，加煉蜜120—130%，和成大丸，每丸重為三錢。

【剂量及用法】每服一錢，早晚用開水各吞一次。

六、杭州

【功能与主治】滋陰養血，清肝明目。治肝腎兩虧，虛熱上炎，目赤腫痛，視物昏暗，迎風流淚，畏光羞明，瞳人散大，漸成內障等症。

【处方】同天津。

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

【剂量及用法】每服二至四錢，淡鹽湯或開水送下。

七、南昌

【功能与主治】肝腎陰虧，虛火目赤，頭暈眼瞢，迎風流淚，腰腳酸軟。

軟。

【处方】同北京（枸杞多五錢）。

【制法】共研細末，煉蜜為丸，如梧子大。

【剂量及用法】每服三錢，淡鹽湯或溫開水送下，每日早晚各服一次。

八、沙市

【功能与主治】治肝腎不足，虛性充血，目赤羞明，迎風流淚，久視昏暗，頭暈足軟等症。

【处方】同南昌（大一倍）。

【制法】上藥研細末蜜丸。

【剂量及用法】成人量，每次服三錢，日服一次，空腹用淡鹽湯或溫開水下。

【禁忌】體寒及大便滑泄者忌服；孕婦忌服。

九、重慶

【功能与主治】治肝腎不足，虛火上炎，目赤腫痛，久視昏暗，迎風流淚，怕日羞明，盜汗潮熱足軟等症。

【处方】同北京。

【制法】共研細末，煉蜜為丸，紙盒包裝。

【剂量及用法】一錢至四錢。

十、昆明

【功能与主治】水分不足，眼目干澀。

【处方】熟地八兩 淮山藥 棗皮各四兩 茯苓 粉丹 澤瀉 杭菊 枸杞各二兩

【制法】研末煉蜜為丸。

【剂量及用法】每服一丸，水吞，每服二錢至三錢。幼童減半。用開水早晚各服一次。

【禁忌】感冒體弱身倦不宜服。

十一、西安

【功能与主治】具有消炎強壯作用。慢性眼病及體虛眼病不能復原者可作輔助治療。

【处方】熟地八兩 山藥 山萸各四兩 丹皮 澤瀉 茯苓 枸杞 菊花各二兩

【制法】共為細末，煉蜜為小丸。

【剂量及用法】每次二、三錢，開水沖服，早晚各一次。

【禁忌】熱性病及便秘者忌服。

十二、蘭州

【功能与主治】散風明目，滋養強壯。主身體衰弱而引起之眼疾，凡屬眼目昏花，視物不明，常見黑花，怕光流淚等症均宜常服。

【处方】六味地黃面一斤半 枸杞子 白菊花各二兩

【制法】共研細面，蜜小丸。

【剂量及用法】每次服三錢，淡鹽湯送下。

【禁忌】忌刺激性食物。

十三、大同

【功能与主治】滋陰明目。

【处方】熟地半斤 山萸 山藥各四兩 云苓 丹皮 澤瀉各三兩 枸杞 菊花 蒺藜各二兩

【制法】共為細面，蜂蜜為丸三錢重。

【剂量及用法】每服一丸，開水送下。

十四、禹縣

【功能与主治】虛火上升，眼目昏花，目赤腫痛，迎風流淚，內外翳障。

【处方】同天津。

【制法】共為細面，煉蜜為丸。

【剂量及用法】每服二錢。空心開水送下。

【禁忌】火眼忌用。

【備考】有效期間一年。

十五、濟南

【功能与主治】體弱目昏，視物不明。

【处方】同北京。

【制法】共為細末，煉蜜為丸，梧子大。

【剂量及用法】每服三錢，淡鹽水或白開水送下。

【禁忌】辛辣等物。

十六、青島

【处方】熟地八兩 生山藥 山萸各四兩 牡丹皮 建澤瀉 白茯苓各三兩 枸杞子 杭白菊各四兩 菟絲子一兩 沙苑蒺藜二兩

【制法】共為細末，煉蜜為小丸。

十七、沈陽

【功能与主治】益血補肝，養腎

明目。主肝腎血虧，眼目昏朦，視物不真，迎風流淚，內障黑花經久不愈。

【處方】熟地一兩 生山藥 山茱萸各四兩 丹皮 澤瀉 茯苓各二兩 枸杞子 白菊花各四兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，空心淡鹽湯送下。

【禁忌】怒氣、勞碌、房事、煙酒、五辛等物。

十八、撫順

【功能與主治】滋養明目。主腎水虛乏，迎風流淚，內障昏花，目赤羞光，久視無力等症。

【處方】熟地八兩 山藥 山茱萸各四兩 澤瀉 丹皮 茯苓 枸杞子 菊花各二兩

【制法】共為細面，蜜丸二錢重。

【劑量及用法】每服二錢，早晚二次，白水送下。

【禁忌】孕婦忌服；忌食辛辣等物。

十九、吉林、哈爾濱 (杞菊丸)

【功能與主治】滋陰助腎，清頭明目。主眼疾迎風流淚，內障昏花，瞳人散大，兩目失明等症。

【處方】同撫順。

【制法】共碾細面，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每日早晚服，每服二錢，用開水或淡鹽湯送下。

【禁忌】孕婦忌服；禁食辛辣物。

二十、承德

【功能與主治】體弱目昏，迎風流淚。

【處方】同北京。

【制法】共為細粉，水泛小丸，滑石為衣，闔亮。每兩分作二百粒。

【劑量及用法】每服二十粒，日服二次，溫開水送下。

二十一、呼和浩特

【處方】熟地 山茱萸 枸杞 黃柏 知母各一斤八兩 菊花 丹皮 澤瀉 茯苓 白芍 絲子 菴子 草決各一斤二兩 白芍 川芎 茯

苓各十二兩 山藥一斤八兩

【制法】蜜小丸。

保瞳丸

杭州

【功能與主治】補腎清肝，明目退翳。治肝腎虛弱，目光昏暗，云障糊視，內外障翳，瞳人散大，羞明多淚等症。

【處方】大熟地四兩 肥知母一兩五錢 決明子二兩 菴絲子二兩 密蒙花一兩五錢 漳莢葵二兩 玄精石 青箱子各一兩五錢 枸杞二兩 白茯苓二兩 甘菊花二兩 女貞子二兩 麥冬二兩 車前子一兩五錢 谷精草二兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸。每兩重二錢五分。

【劑量及用法】每服一丸。開水化服。

石斛夜光丸

一、北京、承德

【功能與主治】滋補明目。主內障昏花，瞳人散大。

【處方】石斛五錢 天冬二兩 菴絲子七錢五分 人參二兩(去蘆) 茯苓二兩 菊花 山藥各七錢五分 麥冬 熟地各一兩 菴葵 青箱子各五錢 生地一兩 枸杞子七錢五分 草決明 杏仁 五味子 茯苓(炒) 川芎 甘草 黃連 防風 枳殼各五錢 懷牛膝七錢五分 共為細粉，兌入，羚羊角 犀角各五錢

【制法】上藥和勻，煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水或淡鹽湯送下。

【禁忌】忌急怒及食有刺激性之食品；孕婦忌服。

二、天津

【功能與主治】滋陰降火，散結明目。主因身體衰弱。或營養不良而引起的眼疾。凡屬內障，視物昏花，瞳人變淡綠色或淡白色，及迎風流淚。

【處方】人參(去蘆) 天冬 茯苓(去皮)各二兩 生地 熟地各一兩 麥冬 菊花 菴絲子各五錢 杏仁(去皮炒) 石斛各二兩 懷牛膝 五味子(酒蒸) 茯苓(鹽炒)

生山藥 菴葵(酒蒸) 川芎 枳殼(數炒) 防風 黃連 青箱子 甘草各五錢 枸杞子七錢五分 炒草決明二兩 共為細粉，兌入，羚羊粉 犀角粉各五錢

【制法】以上研細和勻，煉蜜為丸，二錢重。蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，淡鹽水送下。

【禁忌】禁忌房事及辛辣食物。

三、上海

【功能與主治】目光不斂，眼見黑花。

【處方】犀角五錢 羚羊角五錢 枳殼(數炒)五錢 淡菴葵五錢 川石斛五錢 青箱子五錢 五味子五錢 茯苓二兩 黃連五錢 熟地一兩 白菊花七錢五分 白蒺藜五錢 杏仁(去皮尖)七錢五分 天冬(炒)二兩 決明子七錢五分 麥冬一兩 川芎五錢 枸杞子七錢五分 甘草(炙)五錢 黨參二兩 防風五錢 生地一兩 懷山藥七錢五分 菴絲子(酒浸)七錢五分 懷牛膝(酒浸)七錢五分

【制法】共研細粉，煉蜜為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服一錢至二錢，溫開水送服。

四、南京

【功能與主治】主瞳人散大，視物昏花，內障等症。

【處方】金銀石斛七錢 羚羊角五錢(磨汁) 黨參二兩 烏犀角五錢(磨汁) 天門冬二兩 懷山藥七錢五分 白茯苓二兩 白菊花七錢五分 熟地黃一兩 草決明七錢五分 生地黃一兩 菴絲子七錢五分 淡菴葵五錢 懷牛膝七錢五分 川芎五錢 杏仁七錢五分 防風五錢 白蒺藜五錢(去刺) 五味子五錢 枸杞子七錢五分 青箱子五錢 麥門冬一兩 炙甘草五錢 川黃連五錢 枳殼五錢

【制法】將羚羊、犀角另行磨汁，余藥共研細末，和勻，加煉白蜜為小丸，每錢約做五十粒。

【劑量及用法】每服一錢至二錢，淡鹽水吞服。

【禁忌】忌食辛辣。

五、武 汉

【功能与主治】目赤腫痛，蒙障羞明，發痒眵淚，瞳人散大。

【处方】川石斛七錢 天冬二兩 菟絲子七錢 人參 茯苓各二兩 甘菊花七錢 山藥七錢 麥冬 熟地各一兩 從蓉 青箱子各五錢 生地一兩 杞子七錢 羚羊角五錢(水磨成漿，和入藥末) 草決明八錢 杏仁七錢 五味子五錢 犀角五錢(水磨成漿，和入藥末) 沙苑子五錢 川芎五錢 川牛膝七錢半 枳殼 防風 黃連各五錢 炙甘草八錢

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細。照淨粉量加煉蜜50—52%，迭成小丸，每錢不得少于二十五粒。

【劑量及用法】每服二錢至五錢，日服二次，開水送下。

六、福 州

【功能与主治】治神水散大，昏如霧露，眼前黑花，觀物成二，久則光不收斂及內障瞳人淡白綠色。

【处方】石斛(酒洗)五錢 人參 牛地 熟地(酒洗) 麥冬 天冬 茯苓 防風 草決 黃連(酒炒)各一兩 羚羊角 犀角 川芎 炙甘草 枳殼(炒) 青箱子(微炒) 五味子(炒) 肉從蓉各五錢(酒洗，去鱗炙) 牛膝(酒洗) 蒺藜(炒去刺) 菟絲(制) 家菊花 山藥 杏仁 枸杞各七錢

【制法】共為末，煉蜜丸，桐子大。

【劑量及用法】每服三、五十丸，溫酒、鹽湯送下。

七、杭 州

【功能与主治】治肝腎虛弱，目光不斂，瞳色青白，昏如雲霧或見黑花，視一為二，瞳人內障，諸種目疾。乃滋陰柔肝，治內障之良方也。

【处方】同福州。

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢。淡鹽湯送下。

【禁忌】忌食辛辣、烟酒等物。

八、南 昌

【功能与主治】目光不斂，瞳孔漸散，色淡綠或淡白，昏如霧露。或

見黑花，視一為二及瞳人內障諸症。

【处方】黨參二兩 黃連 川芎各五錢 杏仁七錢 枸杞七錢五分 麥冬 天冬(焙) 生地各一兩 甘菊 菟絲子(酒洗)各七錢五分 熟地一兩 山藥七錢五分 刺蒺藜 石斛 五味子 枳殼(數炒) 肉從蓉各五錢 草決明八錢 防風 羚羊角 青箱子各五錢 云苓二兩 鑄犀角 炙甘草各五錢 牛膝(酒洗)七錢

【制法】共研細末，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】日服二次，每服二至三錢。淡鹽湯送下。

【禁忌】忌食辛辣、烟酒等物。

九、沙 市

【功能与主治】治目光不斂，瞳孔散大，色淡綠或淡白，或如霧露或見黑花，或視一為二，及瞳人內障諸症。

【处方】鮮石斛七錢 天門冬二兩 菟絲子七錢五分 黨參 白茯苓各一兩 甘白菊 淮山藥各七錢五分 麥冬 熟地黃各一兩 肉從蓉 青箱子各五錢 生地一兩 北枸杞七錢五分 羚羊角五錢 草決明八錢 杏仁(去皮)七錢五分 北五味 潼天蒺藜 炙甘草 川芎 黃連 烏犀角 防風各五錢 川牛膝七錢五分 炒枳殼五錢

【制法】研為細末，煉蜜為丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每次服二錢，淡鹽湯送下。

【禁忌】眼病不因于水亏火弱並外感者忌服。

十、西 安

【功能与主治】具有消炎、鎮靜、強壯作用。主內障，視物不明，雲翳攀睛，瞳人返背，慢性目疾。

【处方】薄荷七錢 當歸二兩 石斛一兩半 杭芍二兩 菊花四兩 川芎六錢 生地 山藥 羌活各二兩 胆草五錢 丹皮一兩 梔子五錢 柴胡 北五味各七錢 羌活五錢 赭石二兩 磁石二兩 生草八錢

【制法】煉蜜為小丸。

【劑量及用法】每服二、三錢，淡鹽水送下。

【禁忌】忌刺激性食物。

十一、蘭 州

【功能与主治】散風清熱，滋陰明目。主因身體衰弱或營養不足而引起的眼疾。凡屬內障外翳，瞳孔張大或縮小，瞳人無光，昏暗不明，視物不清，迎風流淚。

【处方】黨參 天冬 茯苓 生地各二兩 熟地一兩 麥冬 菊花 菟絲子各五錢 草決明 杏仁 石斛各二兩 川牛膝 五味子 蒺藜 山藥 從蓉 川芎 枳殼 防風 羚羊 犀角 黃連 青箱子 粉草 枸杞各五錢

【制法】共為細面，蜜小丸。

【劑量及用法】每次服二錢重，淡鹽湯送下。

【禁忌】忌刺激性食物。

十二、大 同

【功能与主治】滋陰補腎，清心，明目。主治內障。

【处方】麗參 歸 山藥 黃柏 菟絲子 菊花 枳殼 五味子 犀角 甘草各一兩 熟地 生地 天冬 寸冬各二兩 茯苓 杞子 牛膝 杜仲 石斛 杏仁 青箱子 草決 蒺藜各一兩五 羚羊七錢五 知母二兩 川芎八錢 川連七錢 防風八錢 從蓉一兩。

【制法】蜜為小丸。

十三、禹 縣

【功能与主治】陽衰陰弱，不能升精于目，以致神水寬大漸散，昏如霧露，空中有黑花及觀物成二，神水淡綠、淡白者。

【处方】天門冬 潞黨參 白茯苓各二兩 石斛 山藥 枸杞子 菟絲子 白菊花各七錢 麥門冬 熟地各一兩 杏仁 川牛膝各七錢五分 生地黃一兩 蒺藜 肉從蓉 川芎 炙甘草 枳殼 青箱子 防風 犀牛角 延五味 羚羊角 草決明 黃連各八錢

【制法】共為細面，煉蜜為丸如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下。

【禁忌】火熱眼忌用，小兒不用。

【備考】有效期三年。

十四、濟 南

【功能与主治】目光不斂，視物昏花。

【处方】同北京。

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，重二錢。

【剂量及用法】每服一丸，日服三次。溫开水送下。

【禁忌】忌急怒、气惱，並忌食辛辣之物。

十五、青島(1)

【处方】石斛 菊花 枸杞 生地 熟地 当归 云苓 山藥 天冬 麦冬 苘苳子 菴蓉 防風 枳壳 沙苑 草决明各二兩 川芎二兩 黄芩三兩 菟絲子二兩 牛膝 杏仁各一兩五錢 人參 犀角 羚羊各一兩

【制法】共軋面，蜜小丸。

十六、青島(2)

【处方】天冬六斤零四錢 牛膝一斤零九錢 熟地二斤二兩 川芎一斤九兩 山藥 石斛 麦冬 苘苳子 草决明 防風 五味子 菴蓉 甘草 梔子 犀角 菟絲子 羚羊 枳壳 白蒺藜 白菊 杏仁各一斤零九錢 人參 茯苓各六斤零四錢 生地二斤零三錢

【制法】共軋面，蜜丸，如桐子大。

十七、沈 陽

【功能与主治】补血除湿，祛毒解热，明目益睛。主內障初起，瞳人散大，視力減弱，昏如云霧，空中黑花，黑睛变淡綠色，視物成二体，或黑睛变淡白色及純白色，兼生眵淚，干澀。

【处方】同上海。

【制法】共碾極細面，蜜丸一錢重。蜡皮封固。

【剂量及用法】每晨服一丸或二丸，淡鹽湯送下。

【禁忌】忌食辛辣、烟酒。

【备考】如能每晚加服磁砂丸或互用更效。

十八、撫順(夜光丸)

【处方】石斛 菊花 枸杞 熟地各四兩 党参 羚羊 犀角各一

兩 天冬 苘苳子各二兩 菟絲餅三兩 白朮四兩 杏仁一兩半 牛膝一兩半 沙苑 寸云各二兩 防風二兩 寸冬二兩 当归四兩 草决明 川芎 黄芩各三兩 山藥四兩。

【制法】共为細面，蜜丸二錢大。

十九、呼和浩特

【处方】人參 当归 山藥 黄柏 菟絲子 菊花 枳壳 犀角 五味 甘草各八兩 九制熟地 生地 天冬各一斤八兩 麦冬 茯苓 枸杞 杜仲 牛膝 石斛 杏仁 苳子 草决 菴蓉 羚羊各十兩二錢 知母一斤 川芎 黄連 防風各六兩 羚羊 犀角各五分 人參三錢

【制法】蜜小丸。

附参考古方

【来源】市視瑤函。

【功能与主治】治內障初起，視覺微昏，空中有黑花，神水变淡綠色；次則觀物成二，神水变淡白色；久則不觀，神水变純白色，及有眵淚，干澀等症。

【处方】大門冬(去心) 麦門冬(去心) 人參 茯苓 熟地黃 生地黃各一兩 牛膝(酒浸) 杏仁(去皮尖) 枸杞子各七錢半 草决明八錢 川芎 犀角(剉細末) 白蒺藜 羚羊角(剉細末) 枳壳(麸炒) 石斛各五錢 五味子(炒) 苳子 甘草 防風 肉菴蓉 川黄連各五錢 菊花 山藥 菟絲子(酒煮)各七錢

【制法】以为細末，煉蜜为丸如桐子大。

【剂量及用法】每服三、五十丸，溫酒鹽湯送下。

磁 砂 丸

一、北 京

【功能与主治】重鎮明目。主头眩目昏，翳膜內障，視一成二，或耳鳴重听。

【处方】磁石二兩(煅) 硃砂一兩 六神麴二兩

【制法】共为細粉，水泛小丸。

【剂量及用法】每服一錢，日服二次。溫开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

二、天 津

【功能与主治】鎮靜神經，明目安神。主因神經衰弱而致瞳人散大，內障外翳，視物昏花，耳鳴耳聾。

【处方】煅磁石二兩 硃砂一兩 神麴三兩

【制法】共为細粉，用神麴打糊为小丸，一錢重裝袋。

【剂量及用法】每服一袋，白开水送下。

三、南 京

【功能与主治】主視物昏花及耳鳴重听。

【处方】煅磁石(置瓦火煅，醋淬七次，研細水飞，澄定晒干，取淨末)二兩 飞硃砂(水飞取淨末，酌留为衣)一兩 生六神麴二兩

【制法】共研和匀，另用神麴一兩研碎以水和作餅，置鍋中加水煮沸，撈起浮起神麴糊，和入前药末內，酌加煉白蜜为丸，硃砂为衣。每錢約做十五粒。

【剂量及用法】每服二至三錢，一日一次，空腹时开水吞服。

四、武 汉

【功能与主治】主耳鳴耳聾，心悸目眩，以及癰癤等症。

【处方】煅磁石二兩 硃砂 陈麴各一兩

【制法】取上药进行干燥，混合碾細，照淨粉量加淀粉40%，用适量之淨水送成小丸，每錢不得少于二十五粒。

【剂量及用法】每服一钱二錢，空腹时开水送下。

【禁忌】孕妇忌服。

五、福州(磁砂丸)

【功能与主治】治神水寬大漸散，昏如霧露中行，漸觀空中有黑花，觀物成二体及內障，神水淡綠色澹白色；又治耳鳴耳聾。

【处方】同天津。

【制法】共研末，更以神麴一兩，水和作餅，煮浮入前药，煉蜜为丸。

六、杭 州

【功能与主治】治瞳人散大，昏

如云霧，或見黑花，視物成二，內外翳障，以及耳鳴耳聾，癲狂癩症。

【处方】同北京。

【制法】用神曲研細調糊打丸。

【劑量及用法】每服二十至三十丸，空腹時用米飲湯送下。

七、南昌

【功能与主治】瞳孔散大，昏如霧露中行，視空中有黑花或視物成二體，翳膜內障、外障，神水淡綠色、淡白色及耳鳴、耳聾癩癩諸症。

【处方】同北京(大一倍)。

【制法】將磁石、硃砂研為細末，神曲打糊為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二錢，空腹時米湯送下。

八、沙市

【功能与主治】治眼目昏花，如在霧露中行。及耳聾耳鳴，癩癩等症。

【处方】同北京。

【制法】上藥和勻以神曲打糊為丸。

【劑量及用法】每服一錢五分至二錢，每日服二次，溫開水下。

【禁忌】氣虛下陷者及孕婦忌服。

九、重慶

【功能与主治】治目中神水寬大漸散，昏如霧露中行，目現黑花，視物如二，翳膜內外障及耳聾，耳鳴，癩癩諸症。

【处方】同北京。

【制法】先將磁石置火上燒紅，醋碎七次，研細水飛，澄定晒干，取淨二兩。再加神曲為末，合硃砂拌勻，水泛糊為丸，紙盒包裝。

【劑量及用法】二至三錢。

十、昆明

【功能与主治】目內障，病后耳聾。

【处方】磁石(醋煨)一斤 硃砂一斤 神曲一斤半

【制法】研末，水疊小粒。

【劑量及用法】每服二錢半，幼童減半，用開水早晚各服一次。

【禁忌】急性眼痛忌服。

十一、西安

【功能与主治】強壯補血。主治眼科各種慢性疾病，綠白內障，云翳遮睛，迎風流淚，視物茫然。

【处方】同天津。

【制法】共為細末，神曲打糊為丸，硃砂為衣如桐子大。

【劑量及用法】每次二、三錢，早晚各一次，開水沖下。

【禁忌】身體虛弱者開始用量宜少

十二、蘭州

【功能与主治】鎮靜神經，明目安神。主神經衰弱而致瞳人散大，內障外障，視物昏花，耳鳴耳聾。

【处方】同北京。

【制法】用神曲打糊為小丸。

【劑量及用法】每次二十丸，白開水送下。

【禁忌】忌刺激性食物。

十三、大同

【功能与主治】瞳仁散大，神光不收，睹物昏花。

【处方】同武漢(大一倍)。

【制法】神曲糊丸，硃砂為衣。

【劑量及用法】成人每服二錢。

十四、禹縣

【功能与主治】肝腎雙虧，瞳人散大，內障外障，淡綠白色，視物昏花，耳鳴耳聾。

【处方】同武漢。

【制法】用神曲糊為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每服二十丸，空心白開水送下。

【禁忌】孕婦忌用。小兒不用。

【備考】有效期二年。

十五、濟南

【功能与主治】耳聾耳鳴，眼目昏暗或見黑花。

【处方】磁石(醋煨七次)四兩 硃砂二兩 神曲八兩

【制法】共為細末，用方內神曲二兩糊為丸，如梧桐子大。

【劑量及用法】每次一錢，白開水送下。

【禁忌】忌食辛辣油膩等物，孕婦忌服。

十六、沈陽

【功能与主治】消除眼障，祛暗復明。主兩目昏花，瞳仁昏暗，視物不明，頭暈目眩等症。

【处方】同天津。

【制法】共碾極細面，面糊為小丸。

【劑量及用法】每服一錢四分，空腹飯湯送下。

【禁忌】忌食五辛、煙、酒。

十七、呼和浩特

(明目磁硃丸)

【处方】磁石八兩 上硃砂二兩

【制法】神曲糊小丸，硃衣。

決明子丸

沈陽

【功能与主治】補腎養肝，清頭明目。主風熱上沖，眼胞紅腫，外受風邪，口昏赤痛，視物不清，瞳仁昏暗，翳障遮睛。

【处方】決明子 青箱子 細辛 蒺藜 羌活 川芎 獨活 羚羊 升麻 防風各五錢 玄參 枸杞 黃連各二兩 菊花一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，淡竹葉湯送下。

【禁忌】忌食辛辣、發物。

益氣聰明丸

南京

【功能与主治】主內障初起，視物昏花，兼治耳聾，耳鳴等症。

【处方】黃芪二錢五分 蔓荊子三錢 黨參二錢五分 杭白芍二錢 升麻一兩五錢 炒黃柏二錢 葛根六錢 炙甘草一錢

【制法】共研細末，加煉白蜜為丸。每錢約做二十粒。

【劑量及用法】每服三錢，一日一次，空腹時開水吞服。

撥云退翳丸

一、北京(退翳丸)、承德

【功能与主治】消障退翳，散風

明目。主火眼外障，血翳貫睛，視物不清，羞明避痛。

【处方】当归 香附 防风 草决明各三十二兩 蟬蛻八兩 玄參六十四兩 青皮十六兩 連翹三十二兩 菊花六十四兩 蛇蛻八兩 白芷三十二兩 川芎二十兩 枳壳六十四兩 密蒙花十六兩 柴胡三十二兩 薄荷十六兩 黃芩三十二兩 郁金十六兩 蒺藜六十四兩(炒) 木賊草六十四兩 赤芍三十二兩 橘皮三十二兩 穀精草八兩

【制法】共为細粉，水泛小丸，滑石为衣，闔亮。

【剂量及用法】每服二錢，日服二次，溫开水送下。

二、天津

【功能与主治】消障退翳，散風明目。主火眼外障，血翳貫睛，視物不清，羞明隱痛，老眼昏花，迎風流淚。

【处方】甘草三錢 木賊草二兩 蜜蒙花二兩 川芎一兩五錢 蛇退(麸炒)三錢 当归一兩五錢 菊花五錢 芥穗 地骨皮各一兩 川椒七錢 花粉六錢 薄荷叶五錢 楮实子 黃連 蟬退各五錢 生蔓荊子二兩 蒺藜(鹽炒)一兩五錢

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，三錢重。蜡皮或蜡紙筒封固。

【剂量及用法】每次服一丸，白开水送下。

【禁忌】禁房事；忌辛辣食物。

三、上海(撥云丸)

【功能与主治】迎風流淚，畏光羞明。

【处方】木賊草(去节)二兩 川芎一兩五錢 密蒙花二兩 白菊花五錢 羌活 荆芥各一兩 当归一兩五錢 花椒 黃連 薄荷各五錢 蔓荊子(炒)一兩 蟬衣五錢 蛇蛻(酥炙)三錢 地骨皮一兩 白蒺藜(炒)一兩五錢 甘草(炙)三錢 天花粉六錢 桃仁(去皮尖)五錢

【制法】共研細粉，煉蜜为丸，每丸朝重一錢二分五厘。

【剂量及用法】每服一丸，食后臥臥細嚼，溫开水送下。

四、武汉

【功能与主治】風热障翳，目赤腫痛。

【处方】当归一兩半 白蒺藜一兩 黃連 蛇蛻各三錢 炙甘草五錢 花椒七錢半 密蒙花 甘菊各一兩 枳实 花粉 薄荷 蔓荊子各五錢 荆芥 川芎 羌活 地骨皮 木賊草各一兩 蟬蛻三錢

【制法】取上药进行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜55~60%，迭成小丸，每錢不得少于二十五粒。

【剂量及用法】每服一錢，日服三次。

五、福州

【功能与主治】治風热，障翳。

【处方】同武汉。

【制法】共为細木，冬蜜煉丸，每兩作十丸。

【剂量及用法】每服一丸，日三次。翳者米泔下；睛暗当归湯下；內障木香湯下。

六、南昌

【功能与主治】風热障翳。

【处方】同武汉。

【制法】共为細末，煉蜜为丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】日服三次，每服二錢。翳者米泔吞服；睛暗者当归一錢煎湯下；內障者木香一錢煎湯下。

【禁忌】酒蝦及辛热食物。

七、重庆

【功能与主治】治努肉攀睛。

【处方】蔓荊子 木賊 蜜蒙花各二兩 川芎 東蒺藜 当归各一兩五錢 菊花五錢 荆芥穗 地骨皮各一兩 川花椒七錢 天花粉六錢 薄荷 桃仁 楮实 黃連 蟬蛻各五錢 蛇蛻 炙甘草各三錢

【制法】共研細末，煉蜜为丸，紙盒包裝。

【剂量及用法】一錢至三錢。

八、杭州

【功能与主治】散風，清熱，明目。主眼睛紅腫疼痛，流淚怕光，云翳遮睛，老眼昏花等症。

【处方】羌活 薄荷 連翹 防风 木賊 甘草 望月砂 蟬蛻 当归 梔子 蔓荊子 石决明 蒙花各一兩 川連五錢 生地二兩

殭蚕五錢 蒺藜二兩 菊花 銀花 荆芥 夜明砂 牛膝各一兩

【制法】共研細末，蜜小丸。

【剂量及用法】每次服三錢，白开水送下。

【禁忌】忌刺激性食物。

九、大同

【功能与主治】散風清熱，撥障退翳，目赤紅腫升陽降熱，養血和肝。

【处方】蒺藜 菊花各三斤 生地 蔓荊子 黃芩 归尾各二斤 黃柏 生梔子 連翹 薄荷 川芎 白芷 草决 旋复花 蒙花 木賊 石决明 防风 荆芥 蟬衣各一斤 生草半斤 黃連四兩。

【制法】共研細末，水为小丸。

【剂量及用法】每次服三錢，日服二次。

十、禹县

【功能与主治】云翳攀睛，朦遮瞳人，昏暗不明，迎風流淚。

【处方】川花椒七錢 白菊花一兩 薄荷叶五錢 川芎一兩五錢 地骨皮一兩 木賊草二兩 楮实五錢 当归一兩五錢 荆芥穗一兩 密蒙花二兩 蟬蛻五錢 甘草三錢 蔓荊子二兩 川黃連五錢 白蒺藜一兩五錢 蛇蛻三錢 天花粉六錢

【制法】共为細面，煉蜜为丸，每兩作八丸。

【剂量及用法】每服一丸，清茶送下。

【禁忌】血亏忌用。小兒不用。

【备考】有效期二年。

十一、济南

【功能与主治】目赤生翳，努肉攀睛。

【处方】同禹县。

【制法】共为細粉，煉蜜为丸，每丸重一錢五分。

【剂量及用法】每服一丸，清茶送下。

【禁忌】忌食辛辣腥膻等物。

十二、青岛

【处方】蒙花 木賊 芥穗 枸杞 白芍 菊花 当归 芥子各六兩 蒺藜 薄荷 知母 猪苓各四兩 青鹽 川芎各三兩 白芷 甘

草各二兩 巨胜子半斤

【制法】共軋面，蜜為小丸。

十三、沈陽(撥云退翳丹)

【功能与主治】清肝明目，退翳止痛。主外障云翳，赤腫流淚，齆肉攀睛，血灌瞳仁，目痛難忍，一般眼疾。

【处方】蔓荊子 木賊 密蒙花 各二兩 白蒺藜 川芎 當歸各一兩五錢 荆芥穗 地骨皮各一兩 天花粉六錢 薄荷叶 黃連 蟬蛻 菊花各五錢 蛇退 甘草(炙)各二錢

【制法】共軋極細面，煉蜜為丸。二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，食后或臨臥，茶清送下。

【禁忌】忌食辛辣腥物；孕婦忌服。

十四、撫順

【处方】歸尾四兩 赤芍 木賊 龍衣各二兩 決明五兩 全退一兩 乳沒四兩 桃仁三兩 香附十兩 枯草五兩 義仁三兩 紫葢二兩 血竭二兩 沙苑一兩半 甘草五兩 石蟹二兩 羚羊五錢 紅花二兩。

【制法】共為細面，水泛小丸。

十五、呼和浩特

【处方】蒙花 蒺藜 木賊 全蠍各四斤八兩 川芎 菊花 青鹽 枸杞 知母 黃連 薄荷 防風 荆芥各二斤四兩 蔓荊子一斤十一兩 白芷二斤四兩 當歸一斤十一兩 巨胜二十二斤半 楮實二十二斤半

【制法】共為細面，蜜小丸。

還睛丸

一、沈陽

【功能与主治】養血安神，搜風明目。主內外翳障，齆肉攀睛，爛弦風眼，年老虛弱目昏多眵，迎風流淚，視物昏花，一切眼疾。

【处方】人參 杏仁 肉蓯蓉 杜仲 牛膝 石斛 枸杞子各一兩 犀角 防風各八錢 菊花 菟絲子 當歸 熟地 黃柏 青葙子 枳殼 茯苓 蒺藜 羚羊角 草決 山藥各一兩 天冬 麥冬 生地 川芎

黃連 五味子 炙甘草各七錢 知母二兩

【制法】共軋極細面，煉蜜為丸，二錢重。蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，淡鹽湯送下。

二、撫順

【处方】琥珀五錢 山梔 青葙 各一兩 故紙一兩半 荆芥一兩 白菊二兩 蛇退五錢 蒺藜 白芩 各一兩 知母一兩 黃柏一兩半 黃連五錢 黃芩一兩 木賊 生地 石決各一兩 明砂 蒙花 沙苑各一兩半 枸杞 蟬退 白芍各二兩 全歸四兩 薄荷二兩。

【制法】共為細面，蜜丸二錢大。

三、吉林

【功能与主治】清風火，去云翳。眼赤目腫，翳痒赤痛，暴發火眼等症。

【处方】當歸一兩六錢七分 薄荷 枸杞 生地 決明 蒺藜 木賊 菊花各一兩三錢四分 夜明沙一兩 故紙 黃柏 蒙花各一兩 蟬蛻 黃芩 蘇梗 知母 荆芥 茯苓 青葙 沙參各六錢七分 蛇蛻 黃連 琥珀各二錢四分

【制法】共為細面，煉蜜為小丸。用瓷罐存貯。

【劑量及用法】每服二錢，用清茶水送下。

【禁忌】忌食發物。

明目還睛丸

杭州

【功能与主治】治風熱上沖，眼目紅腫，畏日羞明，隱翳難開，多淚多眵，齆肉攀睛，內外翳障，偏正頭風等症。

【处方】生冬朮 防風 羌活 菟絲子(酒浸) 炙甘草 白蒺藜(去刺炒) 青葙子 密蒙花 木賊 各一兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

【劑量及用法】每服二錢，開水送下，日服三次。

附參考古方

【來源】太平惠民和劑局方。(還睛丸)

【功能与主治】治風毒上攻，眼目赤腫，怕日羞明，多淚眵淚，隱翳難開，眶痒赤痛，臉眥紅爛，齆肉侵睛，或患暴赤眼，睛疼不可忍者。又治偏正頭疼，頭風，頭目眩暈。

【处方】白朮(生用) 菟絲子(酒浸，別研) 白蒺藜(炒，去刺) 木賊(去節) 羌活(去苗) 青葙子(去土) 密蒙花 防風(去蘆) 甘草(炙)各等分

【制法】上為末，煉蜜丸如彈子大。

【劑量及用法】每服一丸，細嚼白湯下，空心食前，日服。

一花五子丸

沈陽

【功能与主治】清解風熱，退散翳膜。主外障翳膜，視物昏花，赤腫疼痛，眵淚模糊。

【处方】甘菊花 旋復花 密蒙花各一兩 地膚子 青葙子 復盆子 牛蒡子 蔓荊子 草決明各一兩 白蒺藜 川芎 木賊 黃芩 防風各一兩五錢

【制法】共軋極細面，面糊為小丸。

【劑量及用法】每服一錢，一日二次，麥門冬煎湯送下。有翳加桑白皮煎湯送下。

八子丸

沈陽

【功能与主治】祛風熱，補肝腎，疏氣血。主風火赤眼，翳膜遮睛，內外兩障，暴發赤痛，干澀昏花。

【处方】青葙子 決明子 葶藶子 五味子 枸杞子 地膚子 車前子 菟藟子 麥冬 細辛 官桂 生地 赤芍 澤瀉 防風 黃芩各一兩

【制法】共軋極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，清茶或溫米湯送下。

【禁忌】忌食葱、蒜、辣物。

退翳還睛丸

大同

【功能与主治】風熱目痛，散風

退翳。

【处方】当归 川芎 生地 黄芩 黄連各八錢 梔子六錢 連翹 防風 荆芥 薄荷 羌活 蔓荊子 菊花 蒺藜 石决明 桔梗 柴胡 甘草 胆草各五錢 木賊一兩。

【制法】用蜜成丸，每丸二錢重，開水送下。

保目全附丸

沈 陽

【功能与主治】明目退翳，清熱養血。主目昏花，視物不清，云翳遮睛，迎風流淚，視力衰弱，目眩暈，夜盲等症。

【处方】白蒺藜 黃柏 九參 青葙子 黃芩 赤芍 防風 知母 犀角各五錢 木賊 蟬蛻 石决明 草决明 归尾各一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

洗眼碧玉丸

一、青 島

【处方】归尾 防風 梔子 菊花 杏仁各二兩 郁李仁一兩 白朮 胆朮 甘草 紅花各五錢 川連 薤仁各一兩

【制法】共為細面，人乳為丸，銅綠面五分為衣。

二、呼和浩特

【处方】归尾 防風 梔子 菊花 杏仁 郁李仁 白朮 胆朮 薤仁 黃連 甘草各等分

【制法】用人乳疊丸，重一分，銅綠衣。

明目沒竭散

沈 陽

【功能与主治】清熱散風，化痰止痛。主外障眼疾，暴發火眼，紅腫赤爛，外傷眼疾，眼目作痛，云翳遮睛，偏正頭痛，流淚羞明。

【处方】沒藥二錢 血竭一兩二錢 大黃一兩 石决 木賊各五錢 朴硝一兩 归尾 蟬蛻各五錢 防

風三錢 犀角三錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服二錢，茶水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

清 涼 散

蘭 州

【功能与来源】清熱消炎，解熱明目。主風火眼痛，眼皮紅腫，眼目昏花等症。

【处方】蝦目石一兩 梅片五錢

【制法】共為細面。

【劑量及用法】涼開水洗患處，用玻璃針點眼角。

【禁忌】忌吃刺激性食物。

碧 云 散

一、青 島

【处方】川芎 白芷 細辛 薄荷 不食草 菊花 冰片 青黛各一兩。

【制法】共研細面。

二、沈 陽

【功能与主治】清毒消腫，止痒除痛。主頭痛腦脹，外翳攀睛，眵黏腫脹，紅赤昏暗，羞明隱澀，火痛風痒，耳聾耳鳴，楊梅結毒，入于顱頂，火目暴痛。

【处方】搗不食草二錢 青黛 川芎各一錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】先嚥滿口涼水，每用少許入鼻內，以嚏淚為效，后吐涼水。

三、呼和浩特

【处方】薄荷三兩 青黛一兩 細辛五錢 川芎一兩 不食草一兩五錢 冰片二分

【制法】共為細面。

光 明 散

武 漢

【功能与主治】內障盲，目赤腫痛等症。

【处方】珍珠四分半 地梨粉一兩 硃砂五分 煅硼砂三錢 麝香四分半 冰片一錢 海螵蛸三錢

熊胆四分半 煅甘石一兩半

【制法】取上藥混合碾細，成淨粉85—90%即得。

【劑量及用法】每服用此粉少許，點眼角內，目閉片時，即覺舒適。

八宝光明散

沙 市

【功能与主治】治風熱上壅，結膜發炎，目紅腫痛，熱淚羞明等症。

【处方】硼砂(煅)八錢 煅甘石八兩 正梅片四錢八分 葶藶粉三兩 珊瑚一錢二分 瑪瑙一錢二分 硃砂一錢二分 麝香一錢二分 云黃連(水炮)二錢

【制法】上藥研極細末，裝小玻璃瓶內，嚴密封固，勿使藥氣揮發。

【劑量及用法】先將牙籤消毒，用牙籤尖端蘸涼開水一滴，再蘸藥末少許，點入人、小眼角。每日約點二或三次，點藥后閉目休養。

【禁忌】結膜無炎症者忌用。

風火眼痛散

昆 明

【功能与主治】驅風清熱。主急性眼痛。

【处方】生地十兩 紅花 粉丹皮各四兩 归尾八兩 蟬退四兩 車前八兩 杭菊 川芎 黃芩各六兩 梔子 柴胡 薄荷 木通各四兩 赤芍六兩 防風八兩 青葙子四兩

【制法】研末。

【劑量及用法】每服二錢，用開水早晚各服一次。

【禁忌】老目疾無效。

沒 藥 散

沈 陽

【功能与主治】破血積，止疼痛，消瘀退翳。主眼胞生瘡，目赤生翳，疼痛難忍，消腫退翳，或被物傷，血灌瞳人，漏睛膿血，白睛赤紅，瘀血贅肉遮睛等症。

【处方】真血竭一兩 沒藥二兩 朴消 大黃各一兩半

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服一錢至二錢，食后茶清送服。如被物撞破或血灌瞳人，有瘀血者，以酒引送下。

附參考古方

【來源】銀海精微。

【功能與主治】治心、脾、胃得熱，致胞肉生翳。

【處方】大黃（多用） 真血竭（破瘀血、止痛、去赤） 沒藥（少） 朴硝（多）

【制法】上照多少加減為末。

【劑量及用法】每服二、三錢，食後用茶酒調下。

夜明散

武 漢

【功能與主治】目赤胞腫，夜盲羞明。

【處方】木賊草 石決明 谷精草 密蒙花 夜明砂各二兩 蟬蛻二兩

【制法】混合碾細，成淨粉85~90%即得。

【劑量及用法】每服一至二錢，早晚開水送下。

明目蟬花散

大 同

【功能與主治】明目退云，平肝活血。

【處方】菊花二兩 石決明 木賊 蟬退 谷精草 川芎 赤芍各一兩 當歸 生地各一兩五錢 防風一兩 蒺藜二兩 香附 青皮各五錢 蛇退三錢。

【制法】共為細面。

【劑量及用法】早晚每服二錢，開水送下。

明目清肝散

沈 陽

【功能與主治】清肝明目，消腫止痛。主目赤腫痛，流淚羞明，眼泡紅腫，便燥尿赤，目珠夜痛，胬肉攀睛。

【處方】野軍一兩五錢 姜黃 殭蠶各五錢 蟬蛻一兩 元明粉二兩 川連 犀角各五錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服七分，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

羊肝明目散

青 島

【處方】當歸 生地 白芍 防風 赤芍 菊花 刺子 草決 石決 蒺藜 川芎 柴胡 連翹 青箱子 甘草各一兩

【制法】共軋細面。

保光清涼散

禹 縣

【功能與主治】風火爛眼，暴發赤腫，眼疼眼痒，畏光羞明。

【處方】爐甘石二兩五錢 珍珠一分 硼砂四兩五錢 青鹽一錢五分 玄明粉一錢 硃砂五分 麝香一分 冰片二兩五錢 黃丹一錢

【制法】共為細面。

【劑量及用法】輕者每日二次，重者三次，點眼。

【禁忌】血虧症及孕婦忌用。

【備考】有效期一年。

明 日 散

一、禹 縣

【功能與主治】去云退翳。主治迎風流淚，風火爛眼，羞明畏光。

【處方】冰片一錢 麝香二厘 硼砂八錢 薏仁霜三錢 玄明粉一兩六錢 胆矾二厘

【制法】共為細面。

【劑量及用法】每天點一次，用骨簪點眼角內。

【禁忌】孕婦忌點。小兒不點。

【備考】有效期一年。

二、呼和浩特

【處方】白粉四兩 紫硃砂 海螵蛸各三錢 熊胆二錢 葶藶粉 滑石各五錢 上云珀 煅石膏各一錢 煅硼砂一兩 冰片三錢 麝香一分 人造香一錢 薄荷冰五分

【制法】共為極細面，每瓶裝五分。

爛 弦 散

禹 縣

【功能與主治】爛弦風，紅眼眶。

【處方】爐甘石一兩 黃連一錢 黃柏一錢 蔓荊子一錢 菊花一

錢

【制法】將上藥熬水沖甘石，澄清干后，以艾葉七十個薰之，裝瓶內。

【劑量及用法】香油調搽，抹眼患處。

【禁忌】翳障眼忌用。

【備考】有效期一年。

退 云 散

一、蘭 州

【功能與主治】明目去翳，暴發火眼，氣脹昏花，紅腫痛痒，流淚怕光，外障云翳，眼邊紅爛。

【處方】煅日石十兩 冰片一兩 麝香二分 熊胆二錢

【制法】共為極細面，裝大小瓶。用葶藶汁和冰糖汁與撥云散作成瓜子式即成瓜子眼藥。

【劑量及用法】用簪蘸涼開水和藥，點眼角。

【禁忌】忌食刺激性食物。

二、西 安

【功能與主治】結膜炎，結合膜翳，眼睛紅腫赤痛，炎症初起。

【處方】制日石四兩 地來粉四兩 上冰片八錢

【制法】共研為極細面，密貯。

【劑量及用法】用涼開水調勻，塗于眼瞼上，一天二、三次。

【禁忌】應遵醫生指示，並需與內服藥併用較好。

撥云退翳散

一、禹 縣

【功能與主治】去云退翳，胬肉攀睛，藍白霧氣，各種云翳。

【處方】硼砂二兩 硃砂五分 海螵蛸三錢 爐甘石一兩 麝香一分 云胆矾一分 青鹽四分 冰片八錢 珍珠一分 玄明粉六分 煅礞砂一兩五錢

【制法】共為極細面。

【劑量及用法】輕者每日二次，重者三次，點入眼內。

【禁忌】孕婦忌用。

【備考】有效期一年。

二、濟南（撥云散）

【功能與主治】目赤生翳，胬肉。

攀睛。

【处方】同禹县。

【制法】共为極細粉，裝瓶，每瓶二分。

【剂量及用法】点入眼角內，輕者每日二次，重者三次。

撥云散

一、北京、承德

【功能与主治】明目退翳。主暴發火眼，云翳遮睛。

【处方】爐甘石四兩(煨) 黃連一兩 用黃連熬汁，浸煨爐甘石，去渣陰干，成細粉后每四兩細粉兌：冰片 琥珀各一錢五分 珍珠一錢

【制法】上藥和勻，共为極細粉。

【剂量及用法】蘸涼開水点入眼角。

二、天津

【功能与主治】明目退翳。主暴發火眼，气腫昏花，紅腫痛痒，流淚怕光，外障云翳，眼边紅爛。

【处方】甘石一斤 用黃連一兩熬水過濾浸煨甘石，飛淨去渣晒干。每甘石粉一兩兌：冰片一兩 麝香二分 熊胆(化水)一錢

【制法】以上和勻研成極細粉，三分重裝瓶。

【剂量及用法】用玻璃棍蘸藥点眼角內。

三、大同

【功能与主治】專点一切杂患眼疾，消腫退翳。

【处方】爐甘石六斤 川連一斤(熬水) 冰片四兩八

【制法】將甘石火煨五次，浸入黃連水內，取浮飛者盛瓦盆內晒干，共研細面。

【剂量及用法】用簪挺沾水沾藥点眼角。

四、青島(八宝撥云散)

【处方】爐甘石三兩 黃連水浸煨七次

【制法】共軋極細面，磁瓶裝貯。

五、吉林

【功能与主治】調弱清朦，收腫明目，解痒止痛。主云朦翳子，暴發火眼，爛眼边，瞳人散大，迎風流淚。

【处方】當歸尾 防風 胆草 黃連 連翹 黃芩 黃柏 礞砂 石決 蒙花 車前 赤芍 花粉 谷精 柴胡 玄參 川軍 菊花 山梔 木通 蟬退 荆芥 木賊 蒺藜 生地 羌活 川芎 甘草 薄荷 卓決各一錢四分 甘石三斤二兩

【制法】將前藥熬水煨甘石，研面用水飞过，再研極細面，按每一兩兌梅片四分即成。裝瓶藥瓶內密封。

【剂量及用法】用銀簪蘸冷水点藥，上了眼內或眼角。

六、呼和浩特

【处方及制法】上浮水甘石，火煨，用黃連水浸，七次，飛面晒干，每兩兌大梅片五分。

撥云散

沈陽

【功能与主治】清熱散風，撥云退翳。主口生翳障，目赤爛弦，視物昏花，淚淚羞明。

【处方】川芎 胆草 楮實 薄荷 羌活 荆芥穗 草決明 蒼朮 大黃 甘草 木賊 蒙花 連翹 川椒 菊花 桔梗 石膏 地骨皮 白芷 白蒺藜 檳榔各一兩 石燕一對

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】每服五分至一錢，食后桑白皮湯送下。

八宝撥云散

(八宝礞砂眼藥粉)

南京

【功能与主治】主目赤腫痛，翳障攀睛。

【处方】珍珠粉二分(水飞) 瑪瑙五分(水飞) 珊瑚五分(水飞) 琥珀五分(水飞) 礞砂七分 煨熊胆五分 麝香二分 冰片五分 制甘石三錢(水飞) 煨西月石一錢五分 飛硃砂五分 杜齋粉二錢(以鮮荸薺搗碎，濾取細汁，澄淀成粉晒干，用淨粉二錢)

【制法】各取淨粉，先分別乳細，再共合乳至極細無声为度，愈細愈佳。分裝二分重一瓶，用玻璃瓶裝，

以白蜡封口密藏。

【剂量及用法】以点眼棒蘸涼開水点眼角。

珍珠撥云散

沙市

【功能与主治】治風熱上壅，結膜發炎，目紅腫痛，熱淚羞明，翳障遮睛，臉痒赤爛等症。

【处方】飛甘石二兩 礞砂二錢(煨) 珍珠 麝香各二分 番礞砂五分 荸薺粉八錢 琥珀 熊胆各五分 正梅片一錢二分 云黃連(泡水)五分 硃砂三分

【制法】上藥研極細末，裝小玻璃瓶內，嚴密封固，勿使藥性揮發。

【剂量及用法】先將牙籤消毒，用牙籤尖端蘸涼開水一滴，再蘸藥末少許，点入大小眼角。每日約点二或三次，点藥后閉目休养。

【禁忌】結膜無炎症忌用。

八宝磨云散

大同

【功能与主治】清涼退翳。

【处方】甘石粉二錢五分 元明粉 礞砂 海螵蛸各三錢 麝香 牛黃 珍珠各五厘 冰片四錢 硃砂二錢 熊胆 胆矾各一錢五分

【制法】共为細末。

【剂量及用法】用涼開水調点用。

八宝退云散

一、大同(附：八宝退云錠)

【功能与主治】主暴發火眼，熱淚難睜，膜糊云翳赤腫作痒。

【处方】白甘石十二兩 黃甘石六兩 梅片四兩 礞砂五錢 熊胆二錢 青黛八分 麝香五分 黃連面六錢 石蟹五錢

【制法】共为細末。

【剂量及用法】將藥蘸水点入大眼角。

【禁忌】忌刺激性食物。

【備考】八宝退云錠，即上藥面用鷄子清調蜜合起。

二、蘭州

【功能与主治】消炎殺菌退翳。

主暴發火眼，兩目腫痛，白翳遮蓋，羞明畏光，見風流淚，眼邊紅爛。

【處方】蘇珍珠五粒 西牛黃 麝香 礞砂 真熊胆各一分 硃砂一分 广辛紅八分 梅花片四錢 爐甘石一兩

【制法】以上共為極細面。

【劑量及用法】用骨簪輕蘸清水，沾藥少許，點入大眼角內。一日三次。

【禁忌】忌刺激性食物。

三、沈陽

【功能與主治】消云翳，止痛除腫。主眼目新久風火症，畏日怕風，翳遮睛，及各種外障。

【處方】爐甘石二兩 當歸一兩 艾葉五錢 槐皮一兩（用水一碗半，煎至一碗。以甘石入水浸三日畢，則用布裹埋于地下，更宿取出）血竭 沒藥 乳香 麝香 輕粉 礞砂 珍珠 瑪瑙 水晶各三分 熊胆 胆矾各二分 銅綠一分 牛黃 雄黃各三分 冰片五分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】清晨以溫水洗淨眼，以銀簪蘸水將藥點兩眼角。如暴發赤眼，一夜點三次，其效甚捷。

附參考古方

【來源】扶壽精方（八寶推云散）。

【處方】爐甘石二兩 當歸一兩 艾五錢 槐皮一兩 用水一碗半，煎至一碗，以火煅石，將前水酒之三次畢，則用青布裹之，埋于小便地下，更宿取出，入下藥：血竭 沒藥 乳香 麝香 硃砂 輕粉 礞砂 珍珠 瑪瑙 水晶各三分 熊胆 胆矾各二分 銅綠一分 牛黃 雄黃各三分 冰片五分

【制法】上研為極細末。

【劑量及用法】清晨以溫水洗淨眼，以銀簪點兩眼角，如赤暴眼一夜點三次，其效甚捷。

眼科八寶散

撫順

【處方】瑪瑙一錢半 珊瑚一錢半 血珀一錢半 連珠一錢半（四味用豆腐煮透，為極細面）熊胆五

分 礞砂五分 冰片四分 台礞二分五 血竭七分半 片砂七分半 乳香五分 沒藥五分 甘石一兩半

【制法】共為細面。

賽空青眼散

沈陽

【功能與主治】消腫除翳，清障止痛。主內障，黑花昏愒，視物不清，甚則瞳人散大、縮小或干痛，澀痒無淚；患外障者，赤紅暴發，腫痛難忍，甚則云翳遮滿，蟹肉攀睛，以致兩瞳障礙等症。

【處方】煅礞砂五厘 熊胆五分 大連珍珠八個 片砂五分 冰片六分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每用少許，以骨簪蘸藥點之。

明目退云散

大同

【功能與主治】清頭明目，退翳祛風。

【處方】蔓荊子一兩 綠升麻三錢五 黃柏四錢 生地黄三錢 苦參 牛蒡子 防風 薄荷葉 赤芍 當歸 花粉 青連翹各二錢 荆芥穗 川芎各一錢 蟬衣二錢 菊花一兩 白蒺藜二錢 川黃連五錢

【制法】共研極細面。

【劑量及用法】飯後白水送服。

還睛退云散

大同

【功能與主治】眼內障、外障，赤腫。

【處方】人參 杏仁 肉蓯蓉 杜仲 牛膝 石斛 枸杞 菊花 菟絲子 當歸 熟地 黃柏 青葙子 枳殼 白茯苓 蒺藜（炒） 草決明 山藥各五錢 犀角 防風 羚羊角各四錢 大門冬 麥門冬各一兩五 川芎 黃連 五味子 炙甘草各三錢五 知母一兩

【制法】共研細末。

【劑量及用法】每服二錢，白水送下。

復明散

沈陽

【功能與主治】散郁活血，磨云退翳。主暴發火眼，蟹肉攀睛，紅絲結網，云翳遮睛，以及風火相蒸，眼皮腫爛等症。

【處方】牛黃 麝香各一分 熊胆 水晶 石蟹各一錢 連珠三分 血珀二分 甘石粉一兩五錢 梅片一錢五分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】用銀簪清水蘸藥面，點大眼角內。

日月光明散

一、沈陽

【功能與主治】磨云，退翳，開障，除膜，明目。主暴發火眼，內外障翳，云障遮睛，赤腫羞明。

【處方】甘石粉一斤五兩 綠豆粉一斤五兩 西瓜霜五兩 元明粉一斤 冰片二兩

【制法】共碾極細面，裝入小玻璃瓶中。

【劑量及用法】每日早晚，隨時用銀簪点上。

二、承德

【功能與主治】暴發火眼，外障翳膜，云障遮睛，白睛紅赤，黑睛昏暗，眼邊赤爛，視物不明。

【處方】熊胆 琥珀 瑪瑙 麝香 青鹽各五分 礞砂九分 珍珠 硃砂 礞砂各三錢 冰片二兩 牛黃二錢五分 輕粉一錢五分 沒藥二分五厘 枯礬五兩 葶藶粉十兩 綠豆粉十五兩 爐甘石二十五兩

【制法】共研極細面。

【劑量及用法】用溫開水少許，合藥成稀液調勻，以潔淨銀簪蘸藥點入大眥內，閉目仰臥，使藥性流于全目，通于輪廓，俟半刻時後方開目，每日照點四、五次。

【禁忌】忌食蒜、葱、酒、腥、秦椒等物。

開障去翳散

沈陽

【功能與主治】磨云退翳。主目

珠云障，赤腫作痛，畏日羞明，迎風流淚，各種翳膜，視物不清，暴發火眼，沙眼等症。

【處方】黃連 黃芩 川軍 連翹 生地 胆草 菊花 銀花 薄荷 木賊 川羌 蟬退 赤芍 防風 荆芥 甘草 黃柏各一錢

【制法】水煎湯去渣澄清，放碗中揀上好煨甘石一兩煨研入湯內，再將碗用紙封好，過數日后再加銅綠二分、胆矾二分、硃砂三分、雄黃三分、硼砂一分、冰片八分、麝香三分共為細面，磁瓶內封固。

【劑量及用法】用涼水以棉簪點少許于目內。

退翳回光散

沈陽

【功能與主治】明目退翳，消風散腫。主目生翳障，或痘疹后余毒不散。

【處方】蛤粉一兩 谷精草一兩

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服一錢，用豬肝一片，劈開摻藥在上卷定。再用麻線扎緊。濃米泔一碗，煮至肝熟為度。取出放冷，睡時細嚼，再用原煮米泔送下。

【禁忌】忌腥辣動火食物。

黃連膏

一、北京

【功能與主治】消炎止痛。主暴發火眼，紅腫作痛，怕日羞明。

【處方】黃連二十五兩

【制法】將黃連熬汁收膏，以不陰紙為度，每兩汁兌煉蜜一兩。

【劑量及用法】用熱開水將眼洗淨，以藥膏少許點入眼角。

二、天津

【功能與主治】明目止痛。主暴發火眼，紅腫痛癢，流淚畏光，眼邊紅爛。

【處方】黃連八兩 黃柏 防風各四兩 菊花二兩 當歸四兩 甘草八兩

【制法】以上藥熬汁，去渣過濾，煉至濃汁，每濃汁六兩加蜜五兩收膏兌：冰片五分。二分重裝盒。

【劑量及用法】用玻璃棍，蘸藥

膏少許，點眼角。

三、沈陽

【功能與主治】明目止痛。主目中赤絡，火眼疼痛，流淚等症。

【處方】黃連八兩 冰片一錢

【制法】黃連去蘆，刮去皮，炮碎。以水三碗煎大半碗，濾去渣，復煎濾淨。入磁器盛放，重湯熬成膏去火毒，再加龍腦。

【劑量及用法】以簪蘸涼水，蘸藥膏點眼。

四、承德

【功能與主治】暴發火眼。

【處方】黃連 甘草各二兩 黃柏四兩 防風 當歸各一兩 菊花五錢

【制法】以上六味熬膏，再兌冰片五分、蜜三兩攪勻。

【劑量及用法】用熱開水將眼洗淨，以藥膏少許點入眼角。

明日黃連膏

一、蘭州

【功能與主治】明目止痛。主暴發火眼，紅腫痛癢，流淚怕光，眼邊紅爛。

【處方】黃連八兩 黃柏一斤 防風四兩 菊花二兩 當歸八兩 甘草八兩 生地一斤 姜黃四兩

【制法】上藥共煎去渣濃縮，每二兩濃汁加蜜五兩、冰片五分。

【劑量及用法】用簪蘸取少許，點眼角。

【禁忌】刺激性食物。

二、大同

【功能與主治】肺胃火盛，眼邊潰爛，迎風流淚。

【處方】歸尾 川連 生地各五錢 薤仁 防風 薄荷各四錢

【制法】共熬膏，兌好白蜜，共成四兩，再兌頂上梅片二錢。

【劑量及用法】以点眼棍点入眼角內。

三、濟南

【功能與主治】暴發火眼。

【處方】黃連二錢五分

【制法】將黃連熬汁收膏，以不陰紙為度，每兩汁兌白蜂蜜一兩。

眼目類

【劑量及用法】取少許滴眼角內。

【禁忌】忌辛辣油膩等物。

四、青島

【處方】生軍 川連各一兩 黃芩 黃柏 白朮 菊花各五兩

【制法】共熬膏，加入乳、白蜜及冰片五分。

五、沈陽

【功能與主治】清熱去癢止痛，消腫明目。主暴發火眼，結膜、角膜炎，一切眼疾。

【處方】黃連四兩 黃柏 當歸各二兩 甘草一兩 菊花五錢

【制法】共熬成膏，兌白蜜六兩、冰片一錢。裝入錫盒。

【劑量及用法】每日早晚兩次，用淨簪調藥點之。

龍腦黃連膏

(光明眼藥)

杭州

【功能與主治】治肝熱上升，目紅難開，畏光羞明，熱痛多淚，睛沿赤爛，障翳遮睛之症。無不應。

【處方】梅水片二錢五分 淡硃砂一錢

【制法】共研細粉，用黃連膏四兩調勻。

【劑量及用法】每日早、晚點入眼角。

【禁忌】忌葱、酒、大蒜發物。

清涼明目膏

禹縣

【功能與主治】暴發赤腫，眼癢眼疼，目中赤脈，眼睛澀磨，畏光羞明，風火爛眼。

【處方】黃連一斤 生地三斤 玄參一斤 麝香二分 冰片 薤仁 梔子仁各四兩 蜂蜜三斤

【制法】共合一處，熬汁加蜜三斤，收膏。

【劑量及用法】輕者每日二次，重者三次。點入眼內。

【禁忌】虛症眼忌用，孕婦忌用。

【備考】有效期二年。

明明化眼藥膏

大同

【功能与主治】暴發火眼，結膜痒，迎風流淚，眼皮難睜。

【处方】爐甘石八兩 硼砂六錢 石決明五錢 海螵蛸四錢 珍珠八分 梅片六兩 牛黃一錢 麝香一錢 熊胆四錢 白凡士林一磅

【制法】共合一處為膏。

【劑量及用法】塗眼內。

洗眼紫金膏

北京

【功能与主治】清熱消炎退翳。主暴發火眼，外障云翳，胬肉攀睛，眼臉赤爛。

【处方】硃砂 硼砂 乳香 赤芍 當歸各一分 雄黃二錢 麝香五分 黃連五錢

【制法】赤芍、當歸、黃連共為細粉，與諸藥研和勻，煉蜜為餅，每兩分作五十個。

【劑量及用法】每用二個，溫開水溶化洗之。

三光眼藥膏

西安

【功能与主治】主治流行性結膜炎，慢性結膜炎，砂眼，麥粒腫，眼癢等。

【处方】金熊胆五錢 真梅片二兩 小浮殼甘石五兩 薄荷冰三錢 西瓜霜二兩 硼砂一兩 白凡士林六十二兩 香油六兩

【制法】將爐甘石煨過，用黃連煎湯浸之，取上浮者，再以人工方法研為細末，和其它原料混合，再研為細面。用白凡士林溶化成為膏，攪勻即成。

【劑量及用法】適量，每日一、二次，用玻璃棒蘸取少許，搽入眼內。

熊胆爛眼膏

禹 县

【功能与主治】風火爛眼，暴發赤腫，迎風流淚，干澀磨痛。

【处方】黃連 黃柏 大黃 黃

芩各二斤 薏仁八兩 熊胆 麝香各二分 冰片八兩 蜂蜜二斤

【制法】將麝香、冰片、熊胆三味外研，其餘鍋內熬濃膏四斤，再將三味研面加入即成。

【劑量及用法】點眼角內。

【禁忌】翳障眼忌用。

【備考】有效期一年。

明目熊胆膏

蘭 州

【功能与主治】明目去翳。主新久眼疾，云障障翳，迎風流淚，紅腫痛痒，眼臉腫痛，眼邊潰爛。

【处方】黃連四兩 苦參一兩 菊花二兩 歸尾五錢 紅花一兩 荷葉一兩 熊胆一錢半 冰片一兩 白蜂蜜一兩五錢

【制法】熬膏，熊胆、冰片另兌。

【劑量及用法】竹葉或骨簪蘸涼水和藥少許，點眼角。

【禁忌】忌刺激性食物。

薏仁春雪膏

沈 陽

【功能与主治】止痛明目。主目赤羞明，痛痒沙澀。

【处方】薏仁(去油)四錢 梅片五分

【制法】先將薏仁研細，入梅片和勻，用蜂蜜一錢二分再研即成。

【劑量及用法】每用少許，以筋人眼用。

退翳回光膏

一、青 島

【处方】黃丹 沒藥 血竭 黃柏 銅綠 乳香各五錢 硼砂 輕粉 川連 青鹽各一分五厘 薏仁四錢

【制法】共熬膏，加牛乳一碗、白蜜、冰片一錢、麝香五分收膏。

二、撫 順

【处方】黃連二兩 甘石五錢 白梨二個 白蜜一兩半

【制法】水熬成膏，入冰片五分、熊胆五分。

化 針 丹

大 同

【功能与主治】治暴發火眼。能退云翳，明目清火。

【处方】云胆矾 枯矾各三兩 銅青四兩 川椒 烏梅 杏仁各三錢 新針一個 菊花五錢 馬銅錢一斤(火煨七次) 青鹽二兩

【制法】上藥為二十次的劑量，以布包，煎湯用。

【劑量及用法】煎湯洗眼。

碧 霞 丹

沈 陽

【功能与主治】清熱，磨云，退障。主視物不清，干澀難睜，內障眼疾均可洗之。

【处方】當歸 沒藥各二錢 血竭 白丁香 硼砂 冰片 台麝香各一錢

【制法】共碾極細面，熬黃連膏，和為小丸。

【劑量及用法】每用一丸。新汲水半盞，瓷器浸洗之。

磨障靈光丹

一、沈 陽

【功能与主治】清火退翳。主兩目赤腫，胬肉攀睛，暴發火眼，羞明流淚，外障云翳，眼臉疼痛。

【处方】黃連一兩(剉豆大童便浸一宿晒為末) 黃丹(水飛)三兩 甘石六兩(另以黃連一兩剉置水中，燒甘石通紅碎七次) 當歸(取細面)二錢 輕粉(另研) 硃砂(另研) 白丁香(取末) 海螵蛸(取末)各一錢 麝香(另研) 鍾乳(另研) 冰片各五分

【制法】先用好白沙蜜一兩，銀器或沙鍋熬沸五、七次，以淨紅紙搭去蠟面。除黃丹外，下余藥門柳木攪勻，次下黃丹再攪，慢火徐徐攪至紫色，將乳香、麝香、輕粉、硃砂和勻，入上藥內以不粘手為度，急丸如皂子大。以紙裹之。

【劑量及用法】每用一丸，新汲水化開，時時點翳上數滴。

二、撫 順

【处方】黃連一兩 黃丹三兩

当归二錢 麝香五分 輕粉 硃砂 冰片 海螵蛸 白丁香各一錢 甘石六兩 乳香五分

【制法】用白蜜十兩，砂鍋熬七沸，除黃丹外，將黃連、當歸、甘石、海螵蛸為細面，用柳條攪勻，次下黃丹。徐徐攪至紫色。再將麝香、乳香、輕粉、硃砂、白丁香、冰片研面，和入前藥急急丸如芡實大。

三、吉林(磨障丹)、哈尔滨

【功能与主治】磨障去翳，清火解毒。主目疾。

【处方】黃連一兩(剉如豆大，童便浸一宿晒干，碾細) 黃丹二兩(水飛) 爐甘石六兩(另以黃連一兩剉置水中，燒石通赤，入水淬七次，研細) 当归二錢(碾細) 輕粉(另研) 硃砂(另研) 白丁香(研細) 海螵蛸(研細)各七錢 麝香(另研) 乳香(另研) 龍腦(另研)各五分

【制法】先用好白砂蜂蜜十兩，銀器或砂鍋內熬五、七沸，以淨紙搭去蜡面，下入黃連面、爐甘石面、当归面、海螵蛸面、白丁香面等五味。用柳木攪勻，次下黃丹，再攪，慢火，徐徐攪至紫色。再將乳香、麝香、輕粉、硃砂四味下入，攪勻，旋入冰片，以不粘手為度。丸如皂角子大。以油紙裹，瓷瓶封藏。

【劑量及用法】每次用一丸，新汲水化開，洗眼或點眼。

【禁忌】忌食辛辣。

四、呼和浩特(靈光丹眼藥)

【处方】黃連五錢 当归二兩 甘石三錢(水飛) 黃丹一兩五錢 乳香 硃砂 白丁香 輕粉 海螵蛸各五分 冰片二錢 麝香

【制法】共為細面，煉老蜜為丸，重三分，外用白棉紙封固。

洗眼靈光丹

大同

【功能与主治】散風明目，消炎退腫，退云散障。

【处方】黃連 川椒各二十兩 菊花五十兩 防風 青鹽 郁李仁 歸尾 杏仁 薤仁 白矾 芒硝各十兩 銅綠十五兩 熊胆五錢 冰片一兩五

【制法】以上共為粗面，棉紙封固，每包一錢五分。

【劑量及用法】放于盤內泡之，用藥棉花洗之。

琥珀還睛丹

一、大同、呼和浩特

【功能与主治】滋陰補腎，清心明目。主治內障。

【处方】当归 生地 川芎 白芍 菊花 枳子 蒺藜各四兩 故紙 川連 黃芩 茯苓 寸冬 琥珀 復盆子 蒙花 木賊各二兩 青葙子 蔓刺子 楮實子 梔子 黃柏 知母 青鹽 甘草各一兩 胆草一兩四

【制法】共為細末，蜜小丸。

【劑量及用法】每服一錢。

二、青島

【处方】琥珀粉二錢 当归八錢 白芍八錢 川芎四錢 菊花八錢 生地八錢 蒺藜一兩二錢 熟地一兩二錢 天冬六錢 麥冬六錢 夜明砂八錢 丹皮八錢 蛇退二錢 澤瀉六錢 知母四錢 草決明八錢 梔子一錢

【制法】共研細面，蜜小丸。

寶光返瞳丹

沈陽

【功能与主治】補血明目。主視物昏花，瞳仁干缺，瞳孔散大，欲成內障。

【处方】磁石(煅醋碎七次水飛)二兩 肉蓯蓉(酒浸制十)一兩 菟絲子(酒浸晒干)二兩 補骨脂(炒)巴戟(去心) 熟地黃各一兩 木香 五味子 甘草(炙) 桂心各五錢 石斛二兩 遠志(去心)一兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸。二錢重。

【劑量及用法】每服一丸。食前白開水送下。

【禁忌】忌辛辣食物。

八寶明目錠

大同

【功能与主治】暴發火眼，流淚難睜，遮睛怕日，眼角作痒。

【处方】白甘石十二兩 黃甘石四兩 硼砂五錢 石決明五錢 琥珀六錢 梅片四兩 熊胆五分 麝香五分

【劑量及用法】將藥錠點水，點入大眼角，每天點二、三次，點後閉目休息十五分鐘。

紫金錠

禹縣

【功能与主治】風火爛眼，暴發赤腫。

【处方】爐甘石十四兩 青鹽一兩 煅石膏二十兩 硼砂一兩 冰片八兩 煉蜂蜜十五兩

【制法】共為細面，煉蜜和均為錠。

【劑量及用法】每次少許，點入眼角內。冷開水調和。

【備考】有效期一年。

八寶眼藥

一、天津

【功能与主治】消炎去翳，明目止痛。主暴發火眼，兩目腫痛，云翳遮蓋，胬肉攀睛，羞明畏光，眼邊赤爛。

【处方】爐甘石一斤用黃連一兩熬水過濾浸煅甘石飛淨去渣晒干。每甘石粉二兩兌，冰片六錢 琥珀面 煅珊瑚各一錢五分 珍珠子四分 硃砂面一錢 麝香四分 煅硼砂面一錢 熊胆一錢五分(化水)

【制法】以上研極細粉和勻，三分重裝瓶。

【劑量及用法】用玻璃棍蘸涼水，和藥點眼角內。

【備考】每瓶帶玻璃棍一根。

二、上海

【功能与主治】迎風流淚，目赤腫痛。

【处方】牛黃二分 熊胆六分 珍珠一錢 冰片一錢五分 甘石(制)五錢 海螵蛸七分 學齋粉二錢五分 青魚胆二只 珊瑚五分 黃連二錢 瑪瑙五分 薤仁霜一錢 麝香二分

【制法】共研極細粉，並裝固封。

【劑量及用法】將藥少許，點在眼角內。

三、杭 州

【功能与主治】退翳消障。主新久翳障，翳肉遮睛，風熱睛痛，畏光羞明，迎風流淚，一切目疾。

【处方】西牛黃五分 飛辰砂一錢 制甘石一兩五錢 琥珀二錢 梅冰片四錢 當門子五分 珍珠粉一錢 地栗粉八錢 熊胆五分 蕤仁霜一錢 飛硼砂一錢

【制法】共研極細末，至無聲為度，愈經愈好。

【劑量及用法】每用少許，點入眼角，合眼靜坐半時，頗驗。

【禁忌】忌食辛辣、葱蒜、酒等物。

四、昆 明

【功能与主治】急性眼痛，畏光羞明，外障翳膜，迎風流淚。

【处方】上甘石四兩 硼砂二兩 葶藶粉五錢 熊胆二錢 冰片五錢 麝香一錢

【制法】甘石、硼砂火煅透，退火，水飛為細末。再入其他藥劑成粉。

【劑量及用法】用灯蕊草蘸水以沾藥粉少許入眼。

五、蘭 州

【功能与主治】消炎去翳，明目止痛。主暴發火眼，兩眼腫痛，羞明畏光，見風流淚，眼邊赤爛。

【处方】制甘石二兩 冰片六錢 琥珀一錢五 硼砂二錢 珊瑚一錢五 珍珠子四分 硃砂一錢 熊胆二錢半 麝香四分

【制法】研細面，再過細羅。

【劑量及用法】用骨簪蘸清水沾藥少許，點入大眼角內，一日三次。

【禁忌】忌刺激性食物。

六、濟 南

【功能与主治】暴發火眼，翳障遮睛。

【处方】同上海。

【制法】共為細粉，裝瓶封固。

【劑量及用法】將藥粉少許入眼角內。

【禁忌】忌辛辣、刺激性食物。

七、沈陽(八宝明目散)

【功能与主治】清熱止痛，磨云

退翳，除却外障，消瘀明目。主眼疾，翳障遮睛，暴發火眼，胞臉赤爛，迎風流淚，羞明赤痛，一切外障。

【处方】牛黃三分 珊瑚五分 黃連一錢 冰片錢半 瑪瑙五分 蕤仁霜一錢 爐甘石五錢 熊胆六分 海螵蛸七分 珍珠二錢 麝香三分 青魚胆二個 葶藶粉二錢半

【制法】共研極細面，瓷瓶收貯。

【劑量及用法】每用少許，清水蘸藥，點眼內，一日四次。

光 明 眼 藥

南 昌

【功能与主治】暴發火眼，紅腫疼痛，羞明畏日，云翳遮睛。

【处方】牛黃三分 珊瑚五分 冰片一錢五分 瑪瑙五分 蕤仁霜一錢 飛爐甘石五錢 熊胆六分 珍珠(人乳制)一錢 青魚胆二個 麝香三分 葶藶粉二錢五分 海螵蛸七分 黃連二分

【制法】共研細末，瓷瓶固封。

【劑量及用法】用玻璃棒蘸藥點眼內仰臥片時。

【禁忌】忌食辛燥、烟酒。

光 明 水 眼 藥

杭 州

【功能与主治】治風熱目疾，紅腫作痛，痒而多淚，畏光羞明，翳障翳肉，風沿爛眼，一切新久風熱目疾。

【处方】甘石一兩 琥珀一錢 地栗粉二錢五分 當門子二分 熊胆八分 元明粉八分 冰片八分 飛硼砂一分 辰砂六分 海螵蛸(漂淨)一兩(用大黃、黃芩、黃連各二錢煎汁制)

【制法】各研細末，用黃連膏二兩調勻。

【劑量及用法】每用少許，點于眼角，合眼靜坐半小時甚效。

【備考】黃連膏方：

川黃連三斤 煎濃汁去渣，加白蜜十二兩收膏。

克 明 亮 眼 藥

濟 南

【功能与主治】眼目赤腫，紅絲

纏結。

【处方】牛黃一錢五分 珊瑚 瑪瑙各二錢五分 蕤仁霜五錢 熊胆二錢 冰片五兩 珍珠五錢 海螵蛸三錢五分 麝香一錢五分 黃連一兩五錢 甘石粉五兩

【制法】共研極細面。

【劑量及用法】用點眼器，沾冷開水，沾藥少許點眼內，閉目休息。每日點二、三次。

撥 云 眼 藥

重 慶

【功能与主治】主治眼目昏花，迎風流淚，畏日羞明，云翳遮睛，眼胞紅腫，白雲貫珠。

【处方】爐甘石六兩 煅硼砂一兩 烏龍骨一兩 硃砂二錢 熊胆二錢 麝香八分

【制法】先將爐甘石火煅水飛淨，再下各藥，共乳細末至無聲為止。玻璃包裝，每瓶三分。

【劑量及用法】將灯心以清水浸濕，沾藥末入大、小眼角，稍閉片時，使藥力通行。一日三至四次。

光 明 燥 眼 藥

杭 州

【功能与主治】治風熱上炎，目紅腫痛，畏光羞明，翳膜遮睛，迎風流淚，視物昏花，一切新久目疾。

【处方】制甘石一兩 地栗粉五錢 梅冰片一錢

【制法】共研細粉。

【劑量及用法】每用少許，早晚點于眼角，合眼靜坐半小時甚效。

【禁忌】忌酒、葱、大蒜等物。

干 眼 藥

上 海

【功能与主治】眼赤怕光，迎風流淚。

【处方】甘石(制) 葶藶粉各四兩 冰片八錢

【制法】各取淨粉，共研極細粉。

【劑量及用法】將藥點少許在眼角內，日點二次至三次。

【禁忌】不可入口。

瓜子眼药

一、天 津

【功能与主治】消炎明目，退翳。主暴发火眼。气蒙昏花，红肿痛痒，流泪怕光，外障云翳，眼边红烂。

【处方】甘石一斤用黄连一两，熬水过滤，浸煨甘石飞净去渣晒干。每甘石粉十两兑：冰片一两 麝香二分 熊胆二钱（化水）

【制法】以上研极细和匀，用荸薹六两榨汁，和冰糖二两化水作成瓜子式，每个干重一分。

【剂量及用法】以药蘸凉水点眼角。

二、西 安

【功能与主治】主治结膜炎，结膜翳。

【处方】煨甘石十两 梅片一两半 薄荷霜一钱 金熊胆钱半 云矾钱半 硼砂八钱 元明粉八钱 血珀钱半

【制法】共为极细末，每两用香油三两调匀成膏。云矾必须包枣肉内煨白。

【剂量及用法】一天二、三次，将药涂于眼睑上。

【禁忌】内障无效。

三、兰 州

【功能与主治】消炎止痛，消肿退翳。主暴发火眼，迎风落泪，眼边红烂，各种砂眼等症。

【处方】梅花片三钱 米珍珠五粒 牛黄五厘 熊胆二厘 藏硃砂

一厘 甘石粉一两

【制法】以上共研极细面，香油调和。生甘石用火煨好，三黄汤浸透，研细为度。

【剂量及用法】温开水洗患处，用玻璃针将药点患处。

【禁忌】忌刺激性食物。

四、大 同

【功能与主治】风热目疾，障翳云蒙，暴发火眼，胥肉遮睛。

【处方】炉甘石六斤 川连一斤 冰片四两

【制法】将川连熬水，甘石火煨三、四次，浸入川连内浮飞者，取出盛瓦盆内晒干，研细兑冰片，用冰糖水合，作瓜子大。

【剂量及用法】沾冷水点眼。

五、济 南

【功能与主治】暴发火眼，红肿胀痛。

【处方】煨甘石（水飞极净）三两 荸薹粉八钱 冰片一钱五分

【制法】用冰糖水搅对和匀拈如瓜子大。

【禁忌】辛辣油腻等物。

六、承 德

【功能与主治】暴发火眼，红肿胀痛。

【处方】炉甘石十两 冰片一两半 硼砂八钱 薄荷冰一钱 熊胆一钱半 胆矾一钱五分 玄明粉八钱 硃砂一钱半

【制法】共为极细粉，作成瓜子式。

赛空青眼药

（光明点眼药粉）

南京（附：鹅毛管眼药、水眼药）

【功能与主治】消炎。主风火赤眼，羞明，痛痒流泪。

【处方】水飞甘石八钱 飞朱砂二分 冰片五分 煨西月石二钱 西牛黄一分 麝香二分 荸薹粉三钱（以鲜荸薹捣碎，滤取细汁，澄淀晒干，用净粉三钱）

【制法】各取净粉，先分别乳细，再共合乳至极细，无声为度，愈细愈佳。分装，二分重一瓶，用玻璃瓶装，以白蜡封口密藏。

【剂量及用法】以点眼棒，蘸凉水点眼角。

【备考】附方：

（一）鹅毛管眼药：用光明眼药粉一两，加水飞制甘石一两、冰片三分，共同乳至极细无声时，以眼药膏擦匀，分做成条，每条一分重，晾干后，以鹅翎（煮沸消毒）装之。用蜡封口。

（二）水眼药：用光明眼药粉一两，加水飞制甘石一两、冰片三分，共同乳至极细无声时，用顶白蜜二两加川黄连片五分，置锅中隔水蒸熟，滤取净蜜调至适当浓度。以锡盒装之。

（三）制甘石法：净水甘石三斤，用三黄汤煨浸。大黄、黄柏、黄芩各三两，煮透去渣取汁行用。将甘石用瓦罐或铁罐装好，外以铅丝缚扎，便于提取，置烈炭火中煨之，计三次。每煨至甘石极红时，取出，倒于

二黃湯內浸透，再以末酥之甘石，仍如前法煨至三次，最后去石渣不用。以煨過分化之甘石，下乳鉢加水乳至極細，越細越佳，晒干听用。

（四）眼約膏方：小黃連一錢 薄荷二錢 白芷二錢 元明粉一錢 黃柏二錢 生地二錢 桑白皮二錢 桑葉二錢 防風二錢 焦山梔二錢 荆芥二錢 蟬衣二錢 白蒺藜二錢 木賊草二錢 谷精草二錢 密蒙花二錢 赤芍二錢 白菊花二錢 龍胆草二錢 決明子四錢（打） 上藥共熬汁去渣濾清，收成清膏（宜老）。

杏核眼藥

西安

【功能与主治】具有止痛，消炎，消毒作用，主治結膜炎，紅腫痛痒。

【处方】甘石 黃丹各一兩 硼砂 海螵蛸各二錢 青鹽八分 沒藥二錢 麝香一分 乳香二分 梅片三分

【制法】共為極細末，生蜂蜜作成膏。

【劑量及用法】塗于眼內，一天二、三次。

眼癬藥

上海

【功能与主治】眼眶紅赤，作痒多淚。

【处方】雞蛋（用黃）二十只 干眼藥四錢

【制法】將雞蛋黃熬油，加干眼藥調和。

【劑量及用法】搽眼眶上。

【禁忌】不可入口。

宋氏洗眼藥

大同

【功能与主治】暴發火眼。

【处方】白菊花一兩 桑白皮一兩 苦杏仁一兩 烏梅一兩 銅青一兩 飛硃一兩 大青鹽一兩

【制法】共為細面。

【劑量及用法】開水泡洗。

清涼眼藥面

西安

【功能与主治】主治輕症眼病，

結膜炎。

【处方】爐甘石一兩 上梅片一錢

【制法】共研為極細末。

【劑量及用法】每次少許，一天二、三次，用涼開水調滴于眼內或干撒于眼內。

【禁忌】忌刺激性食物。

光明油

禹 县

【功能与主治】眼中一切疾病。

【处方】蝸牛一百个 蚕皮三个 冰片一分 香油五兩

【制法】蝸牛洗淨，裝瓶內，入香油，每日晒之。冰片水飛同蚕皮入油內。

【劑量及用法】點于眼內。

【備考】有效期二年。

洗眼蛋蘭

天 津

【功能与主治】散風清熱明目。

主暴發火眼，眼邊紅爛，眼瞼腫痛，迎風流淚，羞明畏光，視物昏朦，眼疾癢痛。

【处方】黃連 菊花 銀花 當歸尾 防風各二錢 紅花 芥穗 胆矾 麝仁 蟬退各二錢 川椒五分 共為粗末，兌入：冰片二分

【制法】以上藥和勻，三錢重，用綿子包成鷄心形式。

【劑量及用法】以開水一杯浸藥先煮，后用藥球蘸藥水洗之。洗眼器皿要保持清潔。

玉 壺 冰

北京、濟南

【功能与主治】退翳明目。主云蒙翳障，蟹肉攀睛，迎風流淚，視物昏花。

【处方】葶藶粉二兩 珍珠 硼砂各三錢 牛黃 麝香 硃砂（炙） 冰片 大青鹽 沒藥各五分 琥珀 熊胆 胆矾 海螵蛸各一錢 玄明粉 枯礬各三分 硃砂二錢 爐甘石四兩（煨）

【制法】共為極細粉。

【劑量及用法】用涼開水和勻，點入眼角。

【禁忌】忌食辛辣物。

耳 鼻 類

五 礬 丸

沈 陽

【功能与主治】助腎益精，補虛通竅。主勞聾，氣聾，毒聾及各種耳聾，不聞語言或耳內作聲，耳鳴耳炎。

【处方】山茱萸 干姜 巴戟天 白芍 澤瀉 桂心 菟絲子 黃芪 干地黃 遠志 蛇床子 茯苓 石斛 當歸 細辛 菰蓉 牡丹皮 人參 炙甘草 附子各二兩 防風一兩五錢 菖蒲一兩 羊腎二枚

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸二錢重。

【劑量及用法】大人每服一丸，小兒減半。白水或鹽湯送下。

耳 聾 丸

一、天 津

【功能与主治】清肝熱盛，通竅利濕。主耳聾耳鳴，耳內生膿，耳竅不通，上焦濕熱，頭暈頭疼。

【处方】胆草 黃芩 生地 澤瀉 木通 生梔子 當歸 菖蒲 甘草各一兩 共為細粉兌入：羚羊粉五分

【制法】以上研細和勻，煉蜜為丸，二錢重。蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次服一丸，白開水送下。

二、濟 南

【功能与主治】肝火耳聾。

【处方】龍胆草一斤半（酒炒） 酒芩 梔子 澤瀉各十二兩 木通 車前子 當歸 生地各十四兩 柴胡一斤半 甘草一斤

【制法】共為細末，水泛為丸，青黛五兩為衣。

【劑量及用法】每服二錢，白開水送下，小兒酌減。

【禁忌】孕婦忌服；忌食辛辣食物。

三、呼 和 浩 特

【处方】歸尾 胆草 生梔子各一兩二錢 黃芩 黃柏各八錢 黃連

上大黃 蘆薈各六錢 木香四錢
每料兌：麝香五分 冰片二錢 羚羊二錢 青黛一錢 薄荷冰一錢
【制法】細面，重一錢，蜜丸，蜡皮封。

耳聾左磁丸

一、上海

【功能与主治】耳鳴，目眩。

【处方】熟地八兩 山茱萸肉（酒炒） 怀山藥（炒）各四兩 牡丹皮（酒炒） 茯苓 澤瀉（盐酒炒）各三兩 五味子 磁石（煅）各一兩

【制法】共研細粉，煉蜜為丸，如梧桐子大。

【剂量及用法】每服三錢，溫開水送服。

二、南京（耳鳴丸）

【功能与主治】腎虛有熱，耳鳴重听。

【处方】大熟地八兩 萸肉（酒潤） 怀山藥各四兩 丹皮 澤瀉 茯苓各二兩 煅磁石（乳細） 軟柴胡各一兩

【制法】將熟地煮爛，和余藥共杵成末。再晒干，研為細末，加煉白蜜為丸。每錢約二十粒。

【剂量及用法】每服二錢，一日一次，淡鹽水吞服。

三、武汉（柴磁地黃丸）

【功能与主治】耳鳴耳聾，亦治目眩。

【处方】同南京。

【制法】小丸——取上藥進行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜50~52%，迭成小丸，每錢不得少于二十五粒。

大丸——如法得淨粉后，加煉蜜110~120%和成大丸，每丸重為三錢。

【剂量及用法】每次服三錢，早晚各服一次，淡鹽湯送下。

四、杭州

【功能与主治】治肝腎陰虧，虛火上炎，頭眩目赤，視物昏花，耳鳴耳聾，口干舌燥等症。

【处方】大熟地（砂仁酒拌九蒸九晒）八兩 白茯苓三兩 煅磁石（醋燻）二兩 山茱萸（酒潤）四兩

粉丹皮二兩 五味子二兩 怀山藥四兩 澤瀉三兩

【制法】共研細末，煉蜜為丸。

【剂量及用法】每服二至四錢，淡鹽湯送下。

藿胆丸（清肝保腦丸）

上海

【功能与主治】治鼻淵。

【处方】藿香叶八十兩 猪胆三十只

【制法】將藿香叶研細粉，猪胆取汁，和水泛丸，如綠豆大。

【剂量及用法】每服一錢至一錢半，食后溫開水送服。

片連散

沈陽

【功能与主治】清熱祛濕，消毒止痛。主耳中流膿，經年不愈，耳底耳瘡等症。

【处方】白矾七分五厘 黃連五分 冰片一分

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】用棉紙裹藥面，納耳中。

耳疳散

上海

【功能与主治】耳流膿水。

【处方】麝香五厘 枯明矾二錢

【制法】共研極細粉。

【剂量及用法】將藥棉卷淨耳孔，將藥粉摻入少許。

【禁忌】外用藥，不可入口。

疳耳散

沙市

【功能与主治】治耳內流膿流水等症。

【处方】熟甘石五錢 胭脂（燒灰）十張 正梅片二分 枯矾一錢 海螵蛸一錢 麝香一分 橄欖核（燒存性）五粒

【制法】共研極細末，以無聲為度。

【剂量及用法】先將耳內膿水，用棉花紙捻攪干，用草管將藥少許吹入耳內。

耳 鼻 炎

【禁忌】孕婦忌用。

紅棉散

一、天津

【功能与主治】活血，消炎，止痛。主耳內生瘡，紅腫疼痛，流膿流水。

【处方】枯矾 煅礬石各七錢五分 共為細粉兌入：麝香二分 冰片一錢

【制法】將枯矾、煅礬石研細，用蘇木、紅花各五錢熬水泡色晒干。再加麝香、冰片研細和勻。五分重裝瓶。

【剂量及用法】先用棉花擦淨膿水后，以紙卷筒或竹管，將藥吹送耳內。

二、南京（吹耳散、耳痛散）

【功能与主治】主內耳生膿，腫痛流水。

【处方】陳皮灰二兩 胭脂灰二錢 冰片五分

【制法】上藥以陳皮、胭脂煅灰存性，各取淨末，再加冰片共乳至極細為度。

【剂量及用法】先用棉花將耳內膿水攪淨后，用少量干搽。或用油調為稀薄液體，滴入耳內。

三、武汉

【功能与主治】耳內腫痛，流水流膿。

【处方】胭脂（用色取汁）一錢 白矾（煅枯）二錢 麝香五厘 冰片一錢 礬石七兩半

【制法】取上藥混合碾極細，成淨粉85~90%即得。又法取花椒五錢，麻油十四兩，入鍋煎汁后，出花椒得淨油十二兩，加以上藥粉與油拌勻。

【剂量及用法】先用棉枝攪去膿水，以藥粉與油拌勻，滴入耳內。

四、杭州（吹耳紅棉散）

【功能与主治】治肝經郁熱，耳瘡流膿，熱耳痛，腫痛不已，旋愈旋發之症。

【处方】枯白矾二錢 麝香一分五厘 胭脂二錢（煅存性，干油胭脂更佳）

【制法】共研極細末為度。

【劑量及用法】先用新棉花球拭淨耳內膿水，後用新棉花蘸藥粉塞耳中，每日早晚各換一次，有收濕，生肌之功。

五、蘭州(通耳紅棉散)

【功能與主治】止痒，止疼。主耳聾，流膿，疼痛，紅腫，流黃水。

【處方】枯礬七錢五分 甘石七錢五分 麝香二分 冰片一錢 胭脂一兩(包水，用色)

【制法】將枯礬、甘石共研細末，用胭脂水泡後晒干，再加二味細料共研勻。

【劑量及用法】外用之法：用花椒炸香油拌均，滴入耳內。

六、濟南

【功能與主治】耳內腫痛，流水流膿。

【處方】同蘭州。

【制法】將枯礬，煨甘石共為極細粉，用胭脂水泡，晒干，再將麝香、冰片研勻。

【劑量及用法】用花椒炸香油拌勻，滴入耳內。

七、沈陽

【功能與主治】化毒排膿，止痒消腫。主肝經郁火，耳內生瘡，流膿痛痒，小兒胎熱，各類耳瘡，流水流膿等症。

【處方】大紅胭脂(二帖煨存性) 枯礬五分 煨甘石五分 梅片一分 台麝香五厘

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】吹入耳內。

八、撫順

【功能與主治】解毒，止痛，燥濕。主因毒火或瘟後疹後毒火未清，以至耳底流膿，浸淫外溢，疼痛難寐。

【處方】紅棉炭五錢 枯礬三錢 麝香 冰片各一分

【制法】共為細面。

【劑量及用法】先將耳內洗淨，然後將藥面用葦管或紙筒吹入耳底。無膿者可用香油調稀，仰耳滴入。

九、吉林、哈爾濱

【功能與主治】解毒，止痛，燥

濕。主耳底流膿，浸淫外溢，疼痛難寐。

【處方】大紅胭脂(燒黑)一兩 紅胭脂(燒黑)一兩 枯礬三錢 麝香一分

【制法】共研細面，遮光瓶保存。

【劑量及用法】先將耳內洗淨。再將藥末用葦管、竹管或紙筒吹入耳底，又有耳內常結膿痂，耳聾耳痛，即以此藥香油調稀，仰耳滴入，外裹絲綿，候浸透脫出自愈。

【禁忌】忌食辛辣。

礪砂散

沈陽

【功能與主治】消毒，化堅，散腫。主耳痔，耳聾，耳挺，流膿流水等。

【處方】礪砂一錢 輕粉三分 雄黃三分 冰片五厘

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】蘸點患處。

吹耳散

重慶

【功能與主治】治耳腫出膿及耳心挖傷，耳蝕等症。

【處方】甘石一兩 礪砂五錢 滑石一兩 輕粉五錢 虫白蜡一錢 麝香一分 冰片一錢

【制法】共碾極細末，玻璃瓶裝。

【劑量及用法】用稻管吹入少許，再用細柔紙搓捻，徐徐攪之使耳干結痂。

割耳散

一、西安

【功能與主治】主小兒耳后破口流水。

【處方】葛條灰五錢 甘石五錢 梅片五分

【制法】共研極細末。

【劑量及用法】搽患處。

二、蘭州

【功能與主治】殺菌消炎。主割耳。

【處方】輕粉 山甲 銀粉 黃丹各三錢 冰片一錢

【制法】共研細末。

【劑量及用法】用香油調敷患處。以消毒紗布蓋之。

耳底散

一、南昌

【功能與主治】耳內腫痛流膿水。

【處方】枯礬三錢四分 黃丹三錢四分 青花龍骨三錢四分 麝香七厘

【制法】共研細末。

【劑量及用法】先用溫開水蘸藥棉，將耳中膿水洗淨，再將藥末用鴨毛或棉條蘸入耳內或吹入耳內。

二、吉林(耳底白龍散)

【功能與主治】解毒止痒，殺菌消炎。主耳底出膿，耳膜炎，疼痛難禁。

【處方】同南昌。

【制法】將以上四味藥，共為細面。

【劑量及用法】將此藥數于患處，或吹入耳內。

【備考】貯遮光瓶內，勿使走味，以免失效。

三、呼和浩特

【處方】棉花籽炭 枇杷炭各二兩 黃柏三錢 青黛二錢

【制法】共細面，每兩面兌甘石粉五錢，冰片三分，麝香三厘。

黃連膏

哈爾濱

【功能與主治】潤燥清火止痛。主鼻旁生瘡。

【處方】黃連 黃柏 姜黃各三錢 當歸尾五錢 生地一兩 香油十二兩 黃蜡四兩

【制法】將藥入油內熬燥枯干，濾去渣滓，加黃蜡俟熔化盡，用夏布將油濾淨，傾入瓷碗內，以柳枝攪之，候凝為度。瓷瓶存貯。

【劑量及用法】每用少許，搽敷患處。

【禁忌】忌食辛辣。

耳 底 油

一、北 京

【功能与主治】消炎止痛。主耳內生瘡，流膿流水，腫痛作痒。

【处方】核桃仁油一錢（煉） 冰片二分 麝香一分

【制法】將冰片、麝香研極細，與核桃仁油和勻。

【劑量及用法】先將耳內膿水洗淨擦干，再行滴入二、三滴。

二、天 津

【功能与主治】除濕、解毒。主耳腫、耳痛，潰膿流水，日久不愈。

【处方】胡桃油四兩 麝香（研細，一分） 冰片（研細）一錢

【制法】共和一處攪勻，一錢重裝瓶。

【劑量及用法】先將耳內用棉花沾淨，再以油滴入耳內。

三、濟南（滴耳油）

【功能与主治】耳疳症，耳中流膿水等症。

【处方】核桃油一錢 上梅片一分

【制法】將梅片研細末，加入核桃油內，裝入瓶中。

【劑量及用法】將耳內膿用藥棉沾淨，滴入耳內。

四、沈陽（治耳油）

【功能与主治】解毒通竅。主耳腫，流膿流水，聾耳，耳內潰破，腐爛等症。

【处方】胡桃油一兩 冰片二錢 麝香五分

【制法】將冰片、麝香研勻，和入胡桃油內，磁瓶貯。

【劑量及用法】每用少許，滴入耳內。

【禁忌】忌辛、腥食物。

五、呼 和 浩 特

【处方】熟鷄子黃十個 香油二兩

【制法】以上兩味同炒，鷄子黃出淨油去渣，每兩兌麝香五分，薄荷冰一分，冰片二分，瓶裝。

口 齒 咽 喉 類

六 神 丸

一、北 京

【功能与主治】解毒、消炎、止痛。主咽喉緊痛，單雙乳蛾。

【处方】麝香 珍珠各一兩 蟾酥一兩二錢 牛黃 朱砂各一兩

【制法】共為細粉，水泛極小丸，百草霜一兩為衣。每分約作一百粒。

【劑量及用法】每服十粒，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天 津

【功能与主治】解毒、消炎、止痛。主時疫白喉，咽喉腫痛，單雙乳蛾，喉風喉痛，咽下困難。

【处方】牛黃一錢五分 明雄黃一錢 珍珠一錢五分 麝香一錢 冰片一錢

【制法】共研極細粉，涼開水泛小丸，燒酒化蟾酥一錢為衣。候干再用百草霜一錢四分為衣（干重一分，約一百粒）。每大瓶裝一百粒，每小瓶裝十粒。

【劑量及用法】成年人每次口含十粒，徐徐咽下；小兒酌減。

【禁忌】忌烟、酒及辛辣食物；孕婦忌服。

三、

处方同

四、南 京

【功能与主治】主喉痛喉蛾，爛喉丹痧，乳痈，疔瘡癰疽，以及小兒急喉。

【处方】西牛黃一錢五分 珍珠一錢五分 麝香一錢五分 飛朱砂一錢五分 明雄黃二錢 杜蟾酥二錢（另研細末，酒化）

【制法】上藥各取淨粉，共研至極細末。將蟾酥用酒化開，乳至極融後，擦為小丸，如菜籽大。每分計做一百粒。百草霜為衣。

【劑量及用法】成人每次服十粒，小兒酌減。外症初起，用一、二十丸，以酒化開敷患處，可以消散。

【禁忌】孕婦忌服。

五、武 漢

【功能与主治】咽喉腫痛，單雙乳蛾，丹痧疔瘡，癰疽毒腫。

【处方】西牛黃一錢半 雄黃一錢 珍珠粉一錢半 麝香一錢 冰片一錢 蟾酥（用燒酒化）一錢 百草霜一錢半（為衣）

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，以蟾酥用燒酒化液，用液迭成小丸，再用百草霜為薄衣，闔光。每分不得少于一百粒。

【劑量及用法】每服五至十丸，熱湯化開，慢慢咽下。重者再服。或遵醫囑。

【禁忌】孕婦慎服。

六、杭 州（外科六神丸）

【功能与主治】治時邪癘毒，爛喉丹痧，喉風喉痛，單雙乳蛾諸症；并治疔毒惡瘡，癰疽發背，腸痈乳痈，一切無名腫毒等症。

【处方】同上海，治法亦同。

【劑量及用法】每服十丸，開水化開，徐徐咽下，重則再服。外症用酒化開，敷于患處。

七、南 昌

【功能与主治】主爛喉丹痧，喉風喉痛，喉蛾，疔瘡對口，癰疽發背，腹疽乳痈。

【处方】同上海。

【制法】研細末，酒化蟾酥搗和為丸，如芥子大，百草霜為衣；每百粒重約一分。

【劑量及用法】口服一次。每服十粒，溫開水送下。重者可再服一次。

【禁忌】孕婦忌服。

八、沙 市

【功能与主治】治咽喉發炎，扁桃體紅腫，喉痛喉蛾及疔瘡對口，癰疽發背，乳痈初起等症。

【处方】牛黃一兩五錢 雄黃 麝香 正梅片 蟾酥（燒酒化）各一兩 珍珠一兩五錢

【制法】上藥共研極細末，酒化蟾酥為衣，如芥菜子大。再用百草霜為衣。嚴密貯藏，勿使藥性揮發。

【剂量及用法】成人量每服十丸，用温开水化开，缓缓咽下，病重者再服；小儿老人酌减。

【禁忌】体虚及孕妇忌服。

九、兰 州

【功能与主治】消炎止痛，主咽喉肿痛，单双乳蛾等症。

【处方】珍珠二钱 牛黄二钱 麝香二钱 梅片一两 蟾酥一钱（用烧酒泡） 雄黄一两

【制法】共研极细面，鸡子清为丸，如小米粒大。灯草灰衣。

【剂量及用法】每服十小粒，噙化。

【禁忌】孕妇忌服。

十、大 同

【功能与主治】咽喉肿痛。

【处方】珍珠一钱 牛黄二钱 冰片二钱 明雄黄四钱 蟾酥一钱 麝香一钱 金果榄一两 青黛四钱

【制法】共研细面，用蟾酥水和之，百草霜为衣。小丸。

【剂量及用法】大人七粒，小孩酌量减之。白水送下。

十一、禹 县

【功能与主治】喉风喉痹，双单乳蛾，疔瘡对口，无名肿毒，咽喉肿痛。

【处方】同上海。

【制法】共碾细面，水为丸，如芥子大。

【剂量及用法】每服十粒，白开水化开，徐徐咽下。小儿每服五粒。

【禁忌】孕妇忌用。

【备考】有效期一年。

十二、

处方删

十三、吉林、哈尔滨

【功能与主治】通窍防腐，消肿解毒。主治一切外科肿毒，红肿疼痛，烦躁呕吐，神昏谵语，寒热往来等症；并治烂喉痧疹，喉风喉痹，乳蛾等一切喉症；瘰癧瘟疫，传染急病，壮热肢冷，四肢抽搐，欲吐不吐，欲泻不泻，搅闹烦躁。

【处方】东牛黄一两五钱 珍珠

粉一两五钱 雄黄一两 台麝香一两 冰片一两 蟾酥一两（烧酒化）

【制法】以上药各另研，除蟾酥外先将五味和匀，再用烧酒将蟾酥融化，泛为小丸，如芥子大，百草霜为衣。玻璃瓶或小牛角瓶封装。

【剂量及用法】瘰癧疫癘每服十丸或二十丸，白水送下。或化开涂搽患处，喉症每用十丸，白水化开，含服徐徐咽下，重者再服。

【禁忌】忌食辛辣，孕妇禁服。

十四、承 德

【功能与主治】咽喉肿痛，痈疔瘡毒。

【处方】牛黄 珍珠各一钱五分 麝香 蟾酥 冰片 雄黄各一钱

【制法】各为细粉，用烧酒化蟾酥捣和为丸，如芥子大，百草霜为薄衣。每一百粒约重一分。

【剂量及用法】每服十粒，温开水送服。

十五、呼和浩特

【处方】当门子 蟾酥 珍珠各一钱 雄精一钱 牛黄二钱 青黛六钱 人指甲二钱 僵蚕二钱半 黄连一钱 梅片二钱 熊胆一钱 古墨二钱 紫金錠五钱 壁钱一钱 元明粉二钱 硼砂二钱 好川军三钱

【制法】共为细面，紫金錠、熊胆打糊为小丸，如菜子大。青黛为衣。

【剂量及用法】每付十粒。每大瓶装一百粒。

冰 梅 丸

一、杭 州

【功能与主治】治风热上攻，咽喉肿痛，痰涎壅盛，喉风喉痹，喉痹乳蛾，咽喉百病。

【处方】大青梅一百枚（用食盐、朴硝各四两，以水焯化浸梅子一昼夜） 猪牙皂四两 青防风四两 生甘草四两 生明矾四两 桔梗二两 生南星五钱 生半夏四两（二味水漂七天为度）

【制法】上药共煎浓汁，浸梅晒干，再浸再晒，以汁尽梅上起白霜为度。

【剂量及用法】每用一枚，丝棉包，含口内，有津先咽五、六口，后有痰涎吐尽，以口内无痰，只有口津为度。

二、福 州

【处方】山豆根 甘草 半夏各二两 苦梗 连翘 元参 射干各三两 牛蒡 川贝 薄荷各一两五钱 鲜白梅十斤 食盐二十两 白糖三两

【制法】共研末，水泛为丸。

冰梅上清丸

杭 州

【功能与主治】治胸膈积热，口舌生疮，咽喉肿痛，声音不清等症。

【处方】梅冰片一钱 百药煎八两 玄明粉 西砂仁 生甘草 白桔梗各一两 薄荷 诃子肉 飞翹砂 柿霜各二两

【制法】共研细末，炼蜜为丸。每重五分，阴干勿用火烘。

【剂量及用法】每服一丸。临睡噙化，口津咽下。

冰麝上清丸

沙 市

【功能与主治】治口舌热毒，目赤肿痛，火牙疼痛，心胃烦热等症。

【处方与制法】儿茶四两 正梅片五分 麝香五厘此一味研细末 山豆根五钱 桔梗二钱 诃子二钱 黄连五钱 薄荷三钱 玄参三钱 粉甘草一钱 风化硝五钱。此八味煮去渣，熬成膏，和前五味药末为丸，如芡实大。

【剂量及用法】每次用一丸或二丸含化。

【禁忌】体虚非实火者忌服。

祛毒牛黄丸

沈 阳

【功能与主治】解毒化痰清热。主咽喉肿痛，满口生疮，痰涎壅盛，喘急气促，饮食难进。

【处方】牛黄三钱五分 人参 琥珀 犀角 桔梗 生地黄 硼砂各五钱 雄黄一两 元参 升麻各五钱 蛤粉四两 寒水石二两 朱

砂七錢 鉛白 龍腦各一錢

【制法】除牛黃、琥珀、硃砂、龍腦另研外，余則共碾極細面，煉蜜為丸，一分五厘重。

【劑量及用法】每服一丸，食后白開水送下。

【禁忌】發物、五辛、油膩。

雄黃解毒丸

一、大同

【功能與主治】主瘡症。

【處方】雄黃一兩 郁金三錢 巴霜一錢

【制法】共為細末，醋糊為丸。

【劑量及用法】每服二丸，開水化服。

二、沈陽

【功能與主治】消腫解毒，化痰祛熱。主一切咽喉腫痛危急之症，以及小兒驚熱，痰涎壅塞。

【處方】明雄黃一錢 郁金二錢 巴豆仁一錢

【制法】共碾極細面，醋糊為小丸，一分五厘重。

【劑量及用法】每服七丸，清茶送下。

【禁忌】孕婦忌服。

三、撫順

【處方】雄黃五錢 郁金五錢 大黃四兩 巴豆四兩 乳香一兩 沒藥一兩

【制法】共為細面，醋糊為小丸，雄黃衣。

四、吉林、哈爾濱

(雄黃丸)

【功能與主治】瀉毒宣竅。主治急性喉痹，內火外感，喉腫閉塞，熱冷頭痛，牙關緊閉，小兒痰風，外感風邪，痰阻清竅，發為驚抽，痰鳴氣促，口噤強直，目定面青。

【處方】明雄黃一兩 川郁金一兩 巴豆十四粒去油（又方加川軍一錢四分）

【制法】共研細面，醋煮面糊為丸，如棗豆大。除包裝外，用玻璃瓶貯存。

【劑量及用法】成人喉痹，每服七丸，清茶送下。如小兒痰風可服二丸或三丸，量年齡大、小加減。

【禁忌】忌食辛辣。

五、呼和浩特

【處方】川郁金一斤 雄黃半斤 豆霜二錢五分 大黃半斤

【制法】水泛小丸。

附參考古方

【來源】重樓土論。

【功能與主治】治一切急喉痹極危症。

【處方】明雄黃一兩 川郁金一兩 巴豆（十四粒去油去盡油）

【制法】共研細，醋煮麵糊為丸，如綠豆大。

【劑量及用法】每服七丸，清茶送下，吐去痰涎立效。如至死者，心頭猶熱，灌藥不下，以鐵匙挖開口灌之，若得下嚥無有不活。如小兒驚熱痰涎壅塞，或二丸三丸，量大小加減服之，亦神效。

清咽利膈丸

一、北京

【功能與主治】清熱利咽消腫。主咽喉疼痛，腮腫舌干。

【處方】玄參 升麻 桔梗 甘草 茯苓 黃連 黃芩 牛蒡子 防風 白芍（各等分）

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重二錢。

【劑量及用法】每服二丸。日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌食辛辣、厚味。

二、濟南

【功能與主治】發熱腮腫，咽喉腫痛。

【處方】同北京。

【制法】共為細粉，水泛小丸，綠豆大。

【劑量及用法】每服二錢，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】忌食辛辣、油膩等食物。

三、青島(1)

【處方】桔梗 元參 花粉 大黃 大力子 連翹 薄荷 黃柏 雙花 甘草 川連 石膏 豆根 防風 殭蠶 麥冬 生地 葛根 生訶子各二兩

【制法】共軋細末，加麝香一分，

水泛小丸。

四、青島(2)

【處方】連翹二斤 黃芩一斤 梔子二斤 薄荷二斤 防風二斤 桔梗四斤 元參二斤 牛蒡二斤 花粉二斤 射干二斤 荆穗二斤 熟軍半斤

【制法】共軋細面，水泛小丸。

五、沈陽

【功能與主治】清熱解毒，止痛消腫。主急慢喉風，雙單乳蛾，咽喉腫痛，項腫發頤，咽喉糜爛，唇口焦裂，疹后余毒未盡，音啞喉痹。

【處方】犀角 牛子 連翹 荆芥 防風 梔子 桔梗 元參 黃連 金銀花 黃芩 薄荷各三錢 甘草 大黃 朴硝各二錢

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。金衣、蜡皮封固。

【劑量及用法】每服一丸，小兒減半。食后竹葉湯送下。

【禁忌】辛辣食物。

六、承德

【功能與主治】咽喉腫痛。

【處方】連翹 射干 玄參 梔子 防風 花粉 芥穗 牛蒡子 薄荷各二斤 甘草三斤 黃芩二斤 桔梗四斤 大黃八兩（炙）

【制法】共為細粉，水泛小丸。

【劑量及用法】每服三錢，白開水送下。

【禁忌】孕婦忌服。

七、呼和浩特

【處方】元參 桔梗 花粉 大黃 連翹 牛子 黃芩 射干 豆根 白芷 銀花各四斤 甘草 黃連 薄荷 石膏 防風 殭蠶 寸冬 生地 葛根 訶子各二斤

【制法】共為細面，水泛小丸。

清咽太平丸

一、上海

【功能與主治】頰赤，煩熱，咽痛。

【處方】犀角二兩 桔梗三兩 柿霜二兩 薄荷一兩 甘草 川芎 防風各二兩

【制法】共研細粉，加煉蜜為丸，

每丸潮重一錢。

【劑量及用法】每服一丸，噙化或溫開水化服。

二、武漢

【功能與主治】膈上有火，頰赤口渴，咽喉不清等症。

【處方】同上海。

【制法】取上藥進行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜110—120%和成大丸，每丸重一錢。

【劑量及用法】每服一至二錢，噙化或溫開水化服。

三、濟南

【功能與主治】胸膈煩熱，頰赤口渴，咽喉不清等症。

【處方】同上海。

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重一錢。

【劑量及用法】每服一丸，噙化或溫開水化服，日服三次。

清音丸

一、天津

【功能與主治】清涼解熱，生津止渴。咽喉腫痛，音啞聲嘶，口干舌燥，嚥下不利。

【處方】元參（去蘆） 桔梗 山豆根 胖大海 薄荷葉 牛礬砂 金果櫻 射干 黃連各一兩 訶子肉二兩 銀花一兩五錢 麥冬一兩五錢 黃芩 生梔子 淨金燈 川貝 甘草各五錢

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，一錢重。蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次一丸，含在口中，緩緩嚥下。每天含二、三丸。

【禁忌】辛辣食物。

二、西安

【功能與主治】咽喉腫痛，咳嗽失音。

【處方】桔梗一兩 訶子肉一兩 甘草五分 礬砂三錢 青黛三錢 冰片二分

【制法】共研細末，煉蜜為丸，重一錢，蜡皮封。

【劑量及用法】成人每次服一丸，放入口內噙化，以口津徐徐嚥下。

【禁忌】勿食生冷。

三、蘭州

【功能與主治】清涼解熱，生津止渴。主肺熱，胃熱，而致口干舌燥，喉嚨不清，聲啞失音。

【處方】桔梗一兩 寒水石一兩 蘇薄荷一兩 訶子一兩 粉甘草一兩 青黛二錢 礬砂二錢 冰片三分 烏梅一兩

【制法】共研細面，蜜大丸，一錢重。

【劑量及用法】隨時將藥噙在口中溶化，緩緩下嚥。每天可服三、五丸。

【禁忌】服藥期間，不要吸煙飲酒或刺激性食物。

四、濟南

【功能與主治】肺熱胃熱，口干舌燥，聲啞失音等症。

【處方】同蘭州。

【制法】共為細末，煉蜜為丸，一錢重。

【劑量及用法】每服二丸，日服二次，溫開水送下。

【禁忌】煙酒及辛辣等食物。

五、沈陽

【功能與主治】清咽治咽喉，口腔疾患。主肺熱火盛咽頭發炎，口燥咽干，支氣管炎，聲音嘶啞，咳嗽音啞。

【處方】鮮地黃五錢 烏梅肉十五枚 大門冬六錢 黃芩四錢 訶子勾二錢 麥門冬六錢 鮮荷葉 京知母各五錢 杭霜五錢 粉甘草六錢 紅梨汁一兩 羊乳二兩 甘蔗汁一兩

【制法】共碾極細面，羊乳梨汁熬成膏，少加煉蜜為丸五分重。

【劑量及用法】每服一丸，放口內噙化。

【禁忌】忌五辛、油膩、酸、鹽刺激食物。

六、呼和浩特

【處方】人參 烏梅 礬砂 元明粉 兒茶 桔梗 青黛各四兩 寒水石 石膏各半斤 甘草四兩

【制法】共為細面，蜜大丸，重一錢。

鐵笛丸

一、北京

【功能與主治】潤肺利咽。主失音聲啞。

【處方】訶子 麥冬 茯苓 瓜蒌皮各十兩 貝母 甘草 桔梗各二十兩 鳳凰衣一兩 玄參十兩 青桑四兩

【制法】共為細粉，煉蜜為丸，重一錢。

【劑量及用法】每服二丸，日服三次，溫開水送下。

【禁忌】忌食辛辣及油膩、煙、酒。

二、上海

【功能與主治】咽干音啞。

【處方】大黃 訶子肉（煨）各一兩 川芎 連翹各二兩五錢 甘草二兩 薄荷四兩 砂仁一兩 白芍煎 桔梗各二兩

【制法】共研細末，用雞蛋白三十個和蜜為丸，每丸潮重一錢。

【劑量及用法】每服一丸，含化徐徐嚥下。

【禁忌】生冷食物。

三、武漢

【功能與主治】風熱咳嗽，喉痛聲啞，口燥咽干。

【處方】薄荷四兩 甘草二兩 桔梗二兩 川芎二兩半 連翹二兩半 訶子肉一兩（煨） 砂仁一兩 大黃一兩

【制法】先將羣藥進行干燥，混合碾細，照淨粉量加煉蜜100—110%。再將雞蛋白（24個雞蛋的）兌入，和成大丸。每丸重為一錢。

【劑量及用法】每服一錢，噙化或熱湯送下。

四、杭州（喉痛鐵笛丸）

【功能與主治】治肺熱上炎，喉痛聲啞，口燥咽干。兼治陰虛內熱，津液不能上輸及言語過多，呼叫耗散，失音聲啞等症。

【處方】同上海。

【制法】共研細末，雞子清和煉蜜打丸，每粒潮重一錢。

【劑量及用法】每服一丸，口內噙化，開水送下。

五、沈陽

【功能与主治】清音利喉，消炎止痛。主治喉痛音啞，口燥咽干或狂歌高喊，或受風寒，以致咽頭發炎而聲音嘶啞。

【处方】苏薄荷四兩 甘草 桔梗 連翹 川芎各二兩五錢 訶子肉 砂仁 大黃各一兩

【制法】共碾極細面，雞蛋清和蜜為丸，七分重。

【劑量及用法】每服一丸，含化或熱湯送下。

【禁忌】五辛、油膩。

六、撫順

【处方】訶子肉 寸冬 天冬 薄荷 貝母 兒茶 生草各一兩 小石一兩半 元參一兩半 桔梗一兩半 梅肉二兩 黨參一兩半 粉葛一兩半

【制法】共為細面，蜜丸一錢八。

七、吉林

【功能与主治】清肺潤喉，退熱清音。主治喉腫、喉痛、喉啞、咳嗽等症。

【处方】當歸(酒洗)七錢 熟地 生地各六錢七分 天冬(鹽炒) 麥冬(鹽炒) 寸冬(鹽炒) 知母 訶子 阿膠(炒)各三錢四分 黃柏(蜜炒)六錢七分 元參二錢 白茯苓六錢七分 人乳一碗 牛乳一碗 甜梨汁一碗 烏梅肉十五個

【制法】將以上共為細面，煉蜜丸，每丸元肉大。保存于瓷罐或玻璃瓶中。

【劑量及用法】每服十丸，用訶子湯、蘿蔔湯送下。

【禁忌】忌辛辣。

八、呼和浩特

【处方】烏梅肉 硼砂 明粉 薄荷 寸冬 枇杷 射干 桔梗 甘草 訶子 兒茶 百藥煎 元參各一兩

【制法】共為細面，蜜大丸，重一錢。

附參考古方

【來源】增補壽世保元。

【功能与主治】聲嘶失音。

【处方】當歸(酒洗)一錢 懷生

地黃一兩 懷熟地黃一兩 天門冬(去心，鹽炒)五錢 麥門冬(去心，鹽炒)五錢 黃柏(蜜炒)一兩 知母五錢 玄參一錢 白茯苓(去皮)一兩 訶子五錢 阿膠(炒)五錢 人乳一碗 牛乳一碗 烏梅肉十五個 甜梨汁一碗。

【制法】上為細末，煉蜜為丸，如黃豆大。

【劑量及用法】每服八、九十九丸，訶子湯下，羅卜湯亦可。

噙化丸

禹 縣

【功能与主治】上焦火盛，頭目不清，口燥舌干，時常作渴。

【处方】薄荷一斤 白糖四斤 蜂蜜十六斤

【制法】薄荷為面，加白糖、蜂蜜和為丸。每丸重三分。

【劑量及用法】每服三粒至五粒，小兒服一粒。噙口內化下。

【禁忌】寒症忌用。

【備考】有效期半年。

牛黃噙化丸

一、天津

【功能与主治】清熱，解毒，止痛。主治喉腫痛，口燥咽干，痰涎不出，咳嗽聲啞。

【处方】黃連五錢 金果櫻二錢 牛硼砂三錢 柿霜 綠豆粉各一兩五錢 共為細粉兌入：牛黃一錢 麝香三分 硃砂面四錢 雄黃面八錢 冰片二錢

【制法】以上研細和勻，煉蜜為丸，五分重，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次一丸，含口中噙化，緩緩嚥下。

【禁忌】忌辛辣食物；孕婦忌服。

二、濟南

【功能与主治】咽喉腫痛，口燥舌干，痰涎不出，咳嗽聲啞。

【处方】金果櫻一兩 金橘一兩 黃連 桔梗 生石膏各一兩 硼砂(煨)五錢 雄黃 硃砂 柿霜各五錢 綠豆皮一兩

【制法】共為細粉，另兌麝香五錢、冰片一錢五分、牛黃二分和勻，用方柿霜和煉蜜為丸，重一錢。

【劑量及用法】噙化緩緩嚥下。

冰硼散

一、北京

【功能与主治】消炎止痛。主治咽喉腫痛，口舌生瘡。

【处方】冰片 硼砂(生) 玄明粉各五錢 硃砂六分

【制法】共為細粉。

【劑量及用法】用二分上患處。如咽喉痛，日吹三、四次。

【禁忌】忌食辛辣、葷、麪等物。

二、天津

【功能与主治】消炎止痛。主治牙齦腫痛，牙縫出血，口舌生瘡，咽喉腫痛。

【处方】生硼砂 元明粉各一兩 共為細粉兌 冰片一錢五分

【制法】以上研細和勻。一錢重裝瓶。

【劑量及用法】將散少許，擦在痛處；咽喉腫吹于患處，待口涎徐徐流出。日敷數次。

【禁忌】烟、酒、辛辣食物。

三、上海

【功能与主治】咽痛，牙齦腫脹，口舌碎痛。

【处方】冰片一兩 硼砂(煨)十兩 芒硝十兩 硃砂一兩二錢

【制法】各取淨粉，共研極細粉。

【劑量及用法】用藥吹于患處。

四、南京

【功能与主治】咽喉、口齒腫痛、破爛等症。

【处方】煨硼砂五錢 元明粉五錢 硃砂六分 冰片五分

【制法】共研細末，乳至極細。

【劑量及用法】每用少許擦患處。

五、武漢

【功能与主治】咽喉、口齒腫爛作痛。

【处方】冰片五分 硼砂五錢 玄明粉五錢 硃砂六分

【制法】取上藥混合碾細，或淨粉85—90%即得。

【劑量及用法】每日三至五次，吹擦患處。日吹擦三至四次。

【禁忌】用藥期內，禁食辛辣物。

六、南昌

【功能与主治】咽喉腫痛，口舌生瘡。

【处方】薄荷三錢 黃芩五錢 連翹五錢 甘草五錢 元明粉五分 青黛三錢 洋兒茶三錢 西芫根二錢 黃柏五錢 硼砂五錢 冰片一錢

【制法】共研細末。

【劑量及用法】將藥粉少許吹敷患處，日三四次。

【禁忌】忌食辛辣食物；白喉忌用。

七、沙市

【功能与主治】治咽喉發炎，口舌腫爛等症。

【处方】硼砂(煨)一兩 硃砂五分 玄明粉六錢 正梅片五分

【制法】上藥四味，共研極細末。密貯勿洩氣。

【劑量及用法】取少許，擦口舌腫爛處。咽喉腫痛，用細管吹入。甚者一日五、六次。

【禁忌】無熱者忌用。

八、重慶

【功能与主治】治咽喉、口舌腫毒瘰癧及痰火久嗽，音啞咽痛等症。

【处方】冰片五錢 硼砂五兩 玄明粉五兩 硃砂六錢

【制法】共乳細末，玻璃包裝。

【劑量及用法】適宜為度。

九、昆明

【功能与主治】口唇破潰。

【处方】硼砂二兩 冰片五錢 殭蠶五錢

【制法】研末。

【劑量及用法】每包五分，分三次搽用。敷搽患處，或泡水嗽口。

十、西安

【功能与主治】主治口角炎，口瘡，舌緣炎。

【处方】硼砂五錢 火硝五錢 硃砂三分 梅片三分

【制法】共為極細末。

【劑量及用法】每次少許，撒佈于患部。

【備考】如化膿性病症，可由

醫生指示內服藥。

十一、蘭州

【功能与主治】消炎止痛，主牙齒疼痛，牙縫出血，牙根腫痛，口舌生瘡，咽喉腫痛。

【处方】煨硼砂 元明粉各一兩 冰片一錢五分

【制法】共研極細面。

【劑量及用法】將此散少許擦在痛處；咽喉腫，吹于患處，待口涎徐徐流出。日敷數次。

十二、大同

【功能与主治】口舌生瘡。

【处方】石膏二兩 硼砂五錢 元明粉三錢 冰片一錢

【制法】共研細面。

【劑量及用法】搽于口內。

十三、濟南

【功能与主治】咽喉腫痛，口舌生瘡等症。

【处方】冰片七錢五分 硼砂七錢五分 生石膏二兩 元明粉二兩

【制法】共研極細粉。

【劑量及用法】每次三、五分，吹患處。

【禁忌】辛辣之物。

十四、沈陽(1)

【功能与主治】清熱消腫。主口舌糜爛，牙齦腫痛，或咽喉腫爛諸症。

【处方】同北京。

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】內服五分，溫水送下。亦可用少許擦于患處。如咽喉腫痛以筆管吹之。

十五、沈陽(2)

【功能与主治】清毒化腐。主口瘡舌腫，咽喉糜爛，牙痛齒齦，舌干唇裂。

【处方】生石膏一兩 硼砂七錢 白殭蠶一錢 梅片三分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每用少許，吹擦皆效。先用冷茶漱口，嗽淨擦藥。日服五、六次。

十六、撫順

【功能与主治】清熱，鎮痛，消

炎。主喉痹、喉風、乳蛾爛喉、腫潰疼痛，喉干音啞，口瘡糜爛，牙齦腐蝕。

【处方】硼砂五錢 元明粉一兩 生石膏五錢 硃砂四分 冰片五分

【制法】共為細面。

【劑量及用法】用草管吹之或洗淨手蘸藥搽抹患處。

【禁忌】辛辣酒類。

十七、吉林、哈爾濱

【功能与主治】清熱，止痛，生肌。主喉痹、喉風、乳蛾、爛喉、一切喉症，音啞，口糜，舌爛等症。

【处方】同武漢。

【制法】共研細面，用絹羅篩極細。遮光瓶存貯，置清涼處。

【劑量及用法】可將此藥少許吹于患處。如咽喉病，以蘆管吹之；重者日吹六、七次，必見功效。

【禁忌】忌食辛辣。

十八、承德

【功能与主治】咽喉腫痛，口舌生瘡，消炎止痛。

【处方】冰片五分 硼砂五錢 玄明粉三錢 硃砂六分

【制法】共為細粉。

【劑量及用法】將藥粉少許吹敷患處，每日三、四次。

【禁忌】忌食辛辣。

十九、呼和浩特

【处方】寒水石二兩 硼砂二兩 石膏五兩 元明粉二兩

【制法】共為細面，每兩兌冰片三分。

附參考古方

【來源】外科正宗。

【功能与主治】治咽喉、口齒新久腫痛，及久嗽痰火，咽啞作痛。

【处方】冰片三分 硃砂六分 玄明粉 硼砂各五錢

【制法】共研極細末。

【劑量及用法】吹搽患上，甚者日搽五、六次最效。

青黛冰硼散

福州

【功能与主治】治小兒胎火過

盛,口中生瘡及大人喉痛等症。

【處方】老片 青黛 礬砂(煨) 川連各五分 中白一錢 甘草一錢 煨石膏三錢

【制法】共研末為散。

冰 片 散

呼 和 浩 特

【處方】石膏二兩 冰片二分

【制法】共為細面。

錫 類 散

一、北 京

【功能與主治】消炎止痛。主咽喉腫痛,乳蛾癰爛。

【處方】西瓜霜 礬砂(生) 冰片 青黛 寒水石(煨)各三錢 珍珠 牛黃各五分

【制法】共為極細粉。

【劑量及用法】每用少許吹入患處。

二、天 津

【功能與主治】清熱解毒止痛。主扁桃腺炎,咽喉紅腫,飲食困難。

【處方】象牙屑三錢 青黛六錢 壁錢炭一錢 人指甲(滑石煨)五分 共為細粉兌入;珍珠三錢 冰片二分 牛黃五分

【制法】以上研細和勻,一分重裝瓶。

【劑量及用法】將此散少許,吹喉嚨患處。一日數次。

【禁忌】辛辣食物。

三、上 海

【功能與主治】喉痛乳蛾,口舌碎瘡。

【處方】冰片三分 牛黃五分 象牙屑(煨)三錢 壁蟾窠(要用泥壁上者,木板上勿用)二百只 人指甲(炙)五分 珍珠三錢 青黛六錢

【制法】將人指甲、壁蟾窠文火炒透,研粉。再和其它藥,共研極細粉。瓶裝固封。

【劑量及用法】先漱淨口腔,用藥鼓,吹敷患處。

四、南 京

【功能與主治】咽喉腫痛,口舌糜爛。

【處方】飛青黛六分 珍珠粉三分 煨象牙屑二分 西牛黃五厘 人指甲五厘(煨) 冰片三厘 壁錢二十個(煨灰存性)

【制法】上藥七味,各取淨末,共乳至極細為度。

【劑量及用法】每用少許,吹患處。

【備考】密藏。

五、武 漢

【功能與主治】疫喉、乳蛾、牙疳、口舌糜爛。

【處方】象牙屑(煨)三分 珍珠(制)二分 青黛(飛)六分 冰片三厘 西牛黃一分半 壁錢三分

【制法】取上藥混合碾細,成淨粉85~90%即得。

【劑量及用法】每用二厘,吹入患處,日吹數次。

六、杭 州

【功能與主治】治疫毒爛喉,乳蛾牙疳,口舌糜爛,一切危症。凡屬外感為病諸藥不效者,吹入患處,靈驗非常,為治喉症之清血解毒,祛腐生肌之良藥。

【處方】同上海。

【制法】各取淨粉和勻研細為度。

【劑量及用法】每用少許,吹入患處,數次極效。

七、南 昌

【功能與主治】咽喉腫痛糜爛,雙單喉蛾,牙疳,口舌瘡癰。

【處方】同上海。

【制法】共研細末,再入乳鉢內研至極細為度,瓷瓶收貯勿使洩氣。

【劑量及用法】每用少許吹入患處,每日數次,含片刻流去痰涎。

八、沙 市

【功能與主治】治咽喉發炎,紅腫白腐,口舌糜爛及痘疹后一切喉炎等症。

【處方】同上海。

【制法】上藥研細末磁瓶密貯,勿洩氣。

【劑量及用法】口舌糜爛,用少許外擦患處。喉症則用細管吹入咽喉。

【禁忌】非因咽喉發炎糜爛而為

喉痹等症者忌用。

九、重 慶

【功能與主治】治疫喉,乳蛾,牙疳,口舌腐爛。

【處方】同上海。

【制法】先將壁錢煨存性,人指甲炒,煨象牙、珍珠乳細末。再下青黛、梅片、牛黃,乳至無聲為度。玻璃瓶封固,紙盒包裝。

【劑量及用法】適宜為度。

十、蘭 州

【功能與主治】清熱消炎,解毒止痛。主咽喉紅腫,扁桃腺發炎,口舌糜爛,飲食不能下嚥。

【處方】珍珠一錢(豆腐蒸) 象牙屑二錢(炒黃) 人指甲五分(新瓦烤黃) 京牛黃一錢 青黛六錢 梅片一錢

【制法】共研極細末,每瓶一分重。

【劑量及用法】此散少許吹咽喉患處。每日數次。

十一、大 同

【功能與主治】喉頭炎。

【處方】青黛三錢 人指甲(煨)一錢 石膏二錢 薄荷一錢 黃連二錢 蘆薈二錢 麝香五分 冰片五分

【制法】共為細面。

【劑量及用法】少許吹在咽喉。

附參考古方

【來源】金匱翼。

【處方】西牛黃五厘 冰片三厘 珍珠三分 人指甲五厘(男病用女,女病用男) 象牙屑二分(煨) 青黛六分(去灰脚淨) 壁錢二十個(煨。土壁磚上者可用,木板上者不可用)。

【制法】共為極細末。

【劑量及用法】吹患處。

綠 袍 散

一、南 京

【功能與主治】去腐消炎。主咽喉紅腫,口舌糜爛。

【處方】飛青黛一錢五分 川黃柏一錢五分 山豆根八分 薄荷八

分 川黃連三分 煅人中白五分
(漂淨) 煅兒茶五分 煅硼砂五分
冰片五分 西牛黃一分

【制法】共研細末。西黃、冰片
后加，乳至極細為度。密藏。

【劑量及用法】每以少許，吹搽
患處。

二、武 漢

【功能與主治】口疳、疔瘡。

【處方】黃柏二兩 青魚胆一兩
冰片三錢 硼砂(煅)三錢 青黛三
錢 胆矾三錢 人中白三錢

【制法】取上藥混合碾細，成淨
粉85~90%即得。

【劑量及用法】每用五厘至一
分，吹搽患處。

三、南 昌

【功能與主治】口瘡喉蛾。

【處方】飛青黛一兩 黃柏四兩
甘草四兩 正冰片一兩五錢

【制法】先將黃柏、甘草研面，再
入青黛、冰片研勻極細。忌火烘炒。

【劑量及用法】每用少許，干搽
患處，或吹入喉內。

四、沙 市

【功能與主治】治口疳，口瘡，口
舌發炎等症。

【處方】黃柏二兩 青魚胆(如
難見可不用)一兩 硼砂(煅)三錢
青黛三錢 正梅片三錢 蘆薈一兩

【制法】七藥共研細末。

【劑量及用法】每次用少許，干
搽患處。

【禁忌】體寒者忌用。

五、昆 明

【功能與主治】口瘡發炎。

【處方】黃柏二兩 薄荷二兩
洗片六錢 青黛一兩

【制法】研末。

【劑量及用法】每包五分，分三
次搽用，敷搽患處。

【禁忌】忌食刺激性食物。

六、蘭 州

【功能與主治】消炎去腐。主口
瘡牙疳。

【處方】硼砂二錢 人中白一錢
兒茶一錢 青黛三錢 黃柏二錢
薄荷三錢 冰片一錢 粉草一錢

連黃一錢 花粉一錢

【制法】共研極細末吹之。

【劑量及用法】用少許擦牙根潰
爛處。治口瘡用稍許撒瘡上，使病
者低人張口，令毒水外流。

七、大 同(1)

【功能與主治】口舌生瘡。

【處方】黃柏一兩 薄荷四兩

青黛三錢 冰片五分

【制法】共研細面。

【劑量及用法】擦患處。

八、大 同(2)

【功能與主治】黃水瘡症，胃火
口瘡。

【處方】黃柏一兩，青黛三錢。

【制法】共為細末。

【劑量及用法】搽患處。

九、沈 陽

【功能與主治】清熱消腫，化腐
解毒。主口瘡舌腫，咽喉赤痛，咽膈
不利，舌唇腐爛。

【處方】黃柏七錢 青黛 兒茶
各三錢 薄荷 甘草各一錢 冰片
三分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】生薑、薄荷汁調
塗患處。

十、吉 林

【功能與主治】清熱，止痛，生
肌。主口瘡，心胃火盛，口舌糜腐，
氣息腥臭，疼痛流涎。

【處方】黃柏七錢 青黛三錢
薄荷叶一錢 梅片三分

【制法】共為細面，梅片另研后
入。用蠟紙封裝或貯于磨口瓶中。

【劑量及用法】淨指蘸搽患處。

【禁忌】忌食辛辣、酒類。

十一、呼 和 浩 特

【處方】薄荷一兩五錢 硼砂
黃柏各五錢 青黛一兩五錢

【制法】共為細面，每兩加梅片
二分。

烏 龍 散

沈 陽

【功能與主治】清熱鎮痛消腫。
主惡寒發熱，咽喉腫痛，單雙乳蛾，

小兒糖疹癰痧，毒熱不解，老人痰火
郁結等症。

【處方】4黃五分 台麝四分
冰片錢半 千金霜 文蛤 毛慈姑
灯草炭各八錢 大戟五錢 朱砂錢
半 安息香半具

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】滿一年小兒服一
分，二歲者每服二分，成人每服六
分。

【禁忌】忌腥辣食物。

珠 黃 散

一、天 津

【功能與主治】清熱解毒止痛。
主咽喉紅腫，單雙乳蛾，潰爛疼
痛。

【處方】珍珠 牛黃各一兩

【制法】共研極細粉。

【劑量及用法】將此散少許，吹
入咽喉患處，內服亦可。

【禁忌】忌烟、酒及辛辣食物。

二、上 海

【功能與主治】咽喉、口舌發炎。

【處方】牛黃一錢 珍珠三錢

【制法】共研極細粉，瓶裝固
封。

【劑量及用法】將藥少許，用管
鼓，吹敷患處。

三、南 京

【功能與主治】清熱解毒，去腐
生肌。主咽喉腐爛，外瘍久不收斂。

【處方】珍珠三錢(豆腐煮制，去
豆腐不用) 西牛黃一錢

【制法】珍珠以豆腐煮制后，杵
碎乳細水飛，晒干加西牛黃共乳至
極細，無聲為度。

【劑量及用法】每用少許，將患
處洗淨后擦之。

四、蘭 州

【功能與主治】清熱解毒止痛。
主咽喉紅腫，潰爛疼痛，單雙乳蛾。

【處方】同天津。

【制法】共為細面。

【劑量及用法】以此散少許，吹
入咽喉患處。內服成人每次二厘，
日服二至三次，小兒酌減。溫開水
沖服。

五、濟 南

【功能与主治】臟腑積熱，咽喉腫痛，痰涎壅盛。

【处方】珍珠一分 川黃四分 冰片三分 川貝母一錢 大黃八分 黃連一錢 雄黃三分

【制法】共為細粉，每包重一分。

【劑量及用法】少許吹入咽喉患處。內服亦可。週歲以上者，每服一包。

六、沈 陽

【功能与主治】解毒去火，生肌防腐。主乳蛾腫閉，喉痧潰爛，牙疳出血，口舌糜爛，諸瘡潰腐，梅毒未清，病後余毒，喉腫咽痛。

【处方】同上海。

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服一分或二分。

珠黃消疳散

天 津

【功能与主治】清熱解毒。主咽喉腫痛，口臭牙疳，齒齦潰爛，牙縫出血。

【处方】花粉 青黛 黃連 生礬砂 青叶 薄荷叶 甘草各一兩 兒茶二兩 以上八味共為細粉 兌入：牛黃二錢 珍珠一錢 冰片五錢

【制法】以上研細和勻，二分重裝瓶。

【劑量及用法】將此散塗擦患處，一日數次。

【禁忌】忌烟、酒、辛辣食物。

八宝珍珠散

西 安

【功能与主治】治喉中腐爛，聲音嘶啞。

【处方】孩兒茶 黃連末 貝母（去心另研） 青黛各一錢五分 紅褐（燒灰存性） 官粉 黃柏末 魚腦石（微煨） 琥珀末各一錢 人中白（煨）二錢 礬砂八分 冰片六分 西牛黃 珍珠（豆腐內煮半柱香時取出研末）各五分 麝香三分

【制法】為極細末，和勻再研。

【劑量及用法】以細管吹入喉內爛肉處。

附參考古方

【来源】医宗金鑑：外科心法要訣。

【处方】兒茶 川連末 川貝母（去心、研） 青黛各一錢五分 紅褐（燒灰存性） 官粉 黃柏末 魚腦石（微煨） 琥珀末各一錢 人中白二錢（煨） 礬砂八分 冰片六分 京牛黃 珍珠各五分（豆腐內煮半柱香時取出研末） 麝香三分

【制法】各研極細末，共兌一處，再研勻。

【劑量及用法】以細管吹入喉內爛肉處。

異 功 散

一、武汉(喉症異功散)

【功能与主治】雙單喉蛾，及爛喉風，喉痹等症。

【处方】斑蝥四錢 血竭六分 乳香六分 沒藥六分 全蠍六分 麝香三分

【制法】取上藥混合碾細，成淨粉85—90%即得。

【劑量及用法】不論爛喉，喉風，喉痹，雙單喉蛾，用尋常膏藥一張，取此散如黃豆大，貼項間，患左貼左，患右貼右。過三至四小時起泡，用銀針挑破。

二、西 安

【功能与主治】主治緊急喉症如喉疳、喉閉、喉痧諸要症及牙痛不堪等症。

【处方】斑蝥四錢 血竭 沒藥 全蠍 元參各五分 麝香 梅片各三分

【制法】先將斑蝥去足翅，糯米炒黃去米不用，再將各味分別搗研細末，磁瓶固封。

【劑量及用法】用普通膏藥一張，將上藥取用如黃豆大，摻放膏藥上貼在痛處外皮，左貼左，右貼右，約二、三小時即起毒泡，銀針挑破即愈。凡險症起泡更速。

【禁忌】孕婦忌用。切勿入口。

三、大 同

【功能与主治】咽喉腫痛。

【处方】明沒藥一錢 硃血竭一錢 斑蝥（去頭翅）十一个 麝香一分 元參一錢

【制法】共研極細面。

【劑量及用法】將藥面撒在膏藥上貼之。

四、濟南(貼喉異功散)

【功能与主治】咽喉腫痛甚急之症。

【处方】斑蝥四錢（去足翅） 血竭花 乳香 沒藥 麝香 全蠍 元參 上梅片各六分

【制法】先將斑蝥用糯米拌炒，以米色微黃為度去糯米。其餘除血竭、梅片外合諸藥共研極細粉，再加血竭、梅片合勻，用磁瓶收存。

【劑量及用法】每用少許用拔毒膏貼脖子，用手抹之內起泡時，即揭下用針串破泡放出毒水即癒。

【禁忌】忌有火毒之食物。

五、沈 陽

【功能与主治】消腫止痛，單雙乳蛾，喉痹喉痧，腫閉潰爛，氣息難通，咽喉作痛，飲食難下，一經貼用，疼止腫消。

【处方】斑蝥四錢（去頭足，糯米炒黃） 血竭 沒藥 乳香 全蠍各六分 台麝三分 玄參六分 冰片二分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】取其散如豆粒大，用普通膏藥一貼，左痛貼右項間，右痛貼左項間，以起泡為度。用針挑破即癒。

【禁忌】孕婦禁用。

六、吉林、哈爾濱

(冰麝異功散、喉科異功散)

【功能与主治】提毒外出，止痛消腫。主乳蛾爛喉，喉痧，喉風，喉痹，一切喉症；瘋狗咬傷，毒虫、蛇、蠍螫傷等症。

【处方】同濟南。

【制法】共研為極細面，用絹羅篩二、三次。

【劑量及用法】每用此散時，以二分置于拔毒膏上如黃豆粒大，對腫處貼于項下。右患貼右，左患貼左。俟三、四小時後取下，見有小泡，用銀針挑出水，則喉痛立止。陰症喉腫無效，瘋狗毒虫咬傷，均如

前法貼之，拔出毒水，以免毒氣入內。

【禁忌】忌食辛辣，勿入口。

舒 喉 散

天 津

【功能與主治】解熱活血止痛。主咽喉腫痛，乳蛾喉痹，口舌生瘡，潰爛不已。

【處方】琥珀二錢 牛黃二厘 硃砂 兒茶各一分 麝香 熊胆 生硼砂各二厘 冰片五錢

【制法】以上研細和勻，一分五厘重裝瓶。

【劑量及用法】每次一瓶，重者加倍，吹患處。重者每天三次，輕者二次。

【禁忌】烟、酒、辛辣食物。

纏 喉 散

大 同

【功能與主治】纏喉風。

【處方】巴豆霜三錢 上辰砂一錢 明雄二錢 倒退虫七個

【制法】共為細末，每包一分。

【劑量及用法】每服一分，開水化服。見兒酌減。

清 蛾 散

呼 和 浩 特

【處方】殭蚕五錢 薄荷一兩 硼砂五錢 青黛一兩 雄黃三錢 豆根八錢

【制法】共為細面，每兩兌麝香二厘、牛黃二厘、冰片二分。

西 瓜 散

蘭 州

【功能與主治】消炎，解毒，止痛。主咽喉紅腫，乳蛾疼痛，不能下嚥。

【處方】西瓜霜二錢 青黛一錢 枯礬五分 冰片五分 川連一錢 牛黃一錢 珍珠三分

【制法】共研細面，裝瓶。

【劑量及用法】用此藥少許，吹于咽喉患處。

龍腦破毒散

哈 爾 濱

【功能與主治】止痛消腫去腐。主喉症。

【處方】殭蚕八分(微炒去嘴) 青黛八分 甘草八分 牛蒲黃五分 馬勃一分 冰片二分 麝香一分 西瓜霜四錢

【制法】共碾為極細面，絹羅篩過。玻璃瓶封藏。

【劑量及用法】紙筒或草管吹喉。

【禁忌】忌食腥、辣，白喉忌用。

雄黃解毒散

沈 陽

【功能與主治】解毒清熱，清咽滌痰。主咽喉腫痛及小兒驚熱，痰涎壅塞等症。

【處方】明雄黃 川郁金各一兩 巴豆(去壳去油)十四粒

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每服一、二分，清茶送下。

【禁忌】孕婦忌服。

琥珀救喉散

沈 陽

【功能與主治】化痰消腫，消炎鎮痛。專治乳蛾，喉風喉痹，咽喉腫痛，瘟毒結喉。

【處方】血琥珀二錢 牛黃 熊胆各二分 梅片二分 珍珠二分 兒茶分半

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】內服每用一分，白開水送下。外用草管吹一分。

【禁忌】忌食魚肉、辛辣之物。

萬應喉症散

杭 州

【功能與主治】清熱化痰，消腫止痛。治積熱上沖，咽喉腫痛，喉痹喉風，雙單乳蛾初起之症。

【處方】西瓜霜一兩 飛辰砂二錢 犀角尖二錢 西牛黃一兩 明腰黃二錢 人中白二錢 珍珠粉二錢 梅冰片五分 麝香五分

【制法】共研細末。

【劑量及用法】先用涼茶漱口，每用少許，吹于患處。屢用即見效驗。

吹 喉 散

一、南 昌

【功能與主治】咽喉紅腫疼痛。

【處方】上梅片五分 兒茶一錢 五分 薄荷一兩 西豆根五錢 殭蚕三錢 硼砂一錢五分 青黛三錢 元參三錢

【制法】共研細末。

【劑量及用法】每用少許吹患處。含住片刻，流去痰涎。

【禁忌】白喉忌用。

二、昆 明

【功能與主治】咽喉腫痛，飲食難下。

【處方】熊胆一錢 麝香五分 沈片一錢 青黛三錢 牙皂三錢 細辛二錢 牛黃一錢 枯礬一錢 硼砂三錢 人手指甲二錢

【制法】研末。每三分作一包。

【劑量及用法】每服一分，每包按三次用。以細竹管將藥少許，吹入喉內。

【禁忌】忌刺激性食物。

三、沈 陽

【功能與主治】咽喉腫痛，氣閉不通，喉風喉痹，痰壅舌啞，呼吸困難等症。

【處方】硼砂二錢 兒茶一錢 蒲黃六分 煅硝六分 白滑石一錢 冰片五分 黃柏五分(面) 黃連面五分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】用小竹管吹喉。

八寶吹喉散

濟 南

【功能與主治】溫毒結于咽喉，乳蛾，喉痹，喉風，喉癰等症。

【處方】硼砂 石膏各一錢五分 青黛二錢 珍珠一分 人中白一錢五分 東牛黃三分 薄荷霜二分 大梅片六分

【制法】共為細末裝瓶。

【劑量及用法】如牙關緊閉，用

溫開水調和，徐徐灌下。

七 宝 散

沈 陽

【功能与主治】清热消腫，通關利竅。主雙單乳蛾，咽喉腫痛，纏喉白喉，痧喉爛喉，一切喉痹，內火上炎。

【处方】牛黃一分 梅片一錢 琥珀二錢 大連珠四粒 台麝香五厘 生石膏二錢 熊胆仁二分

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】外用每用一分吹喉內；內服開白水送下，每服二分。

青 芝 散

南 昌

【功能与主治】咽喉腫痛癰爛，雙單乳蛾。

【处方】川黃連五錢 飛青黛二兩二錢 上冰片二錢 硼砂一兩二錢 西瓜霜二兩 橄欖核（用生橄欖取核。熟者勿用）三兩 絲瓜叶二兩

【制法】共研細末，再于乳鉢內研極細，以無聲為度。

【劑量及用法】每用少許吹患處。日數次。

神效回生散

呼 和 浩 特

【功能与主治】專治卡脖。

【处方】川郁金五錢 明雄黃五錢 豆霜一錢 枯礬一錢

【制法】共細面。

【劑量及用法】每付小兒三分，大人五分。如病重不能嚥者加冰片少許，吹入咽喉立見功效。內服白水送下。

喉 症 散

一、南 京

【功能与主治】主風火喉症，口舌咽喉發炎。

【处方】煅硼砂三錢 西牛黃五分 西瓜霜二錢 梅片五分 煅方兒茶二錢 金果欖五分 煅象牙屑二錢 白殭蚕二錢 煅人中白二錢（須先漂淨后煅）

【制法】上藥九味，如法炮制，各取淨末，西黃、冰片后加，乳至極細為度。

【劑量及用法】每用少許，吹搽患處。

【備考】密藏。

二、濟 南

【功能与主治】咽喉腫痛，腐爛色白，呼吸窒塞。

【处方】西瓜霜二兩 硼砂一兩 殭蚕三錢 硃砂五錢 姜半夏一兩 雄黃一兩 枯礬二兩 牛黃三錢 元明粉一兩 珍珠三錢 冰片二錢

【制法】將硼砂、殭蚕、半夏、雄黃，共為細粉，再將其他藥兌入研極細裝瓶。

【劑量及用法】吹患處。

【禁忌】烟、酒及辛辣食物。

文 蛤 散

天 津

【功能与主治】清熱解毒。主咽喉紅腫，牙齦潰爛，口臭生瘡，疼痛不止。

【处方】五倍子（炒黑存性）一兩 冰片一錢

【制法】研細和勻。

【劑量及用法】將此散擦抹患處。

【禁忌】忌烟、酒及辛辣食物。

碧 玉 散

武 漢

【功能与主治】咽喉腫痛閉塞，水漿不下，喉痺重舌，木舌腫脹。

【处方】青黛一錢 盆硝一錢 蒲黃一錢 甘草一錢

【制法】混合碾細，成淨粉85~90%即得。

【劑量及用法】每用少許吹入咽喉內，細細嚥下。

中 白 散

一、上海（青黛散）

【功能与主治】口腔發炎。

【处方】冰片五分 薄荷二錢 人中白（煅）二兩 黃柏三錢 方兒茶一兩 青黛三錢

【制法】各取淨粉，共研極細粉。

【劑量及用法】用藥吹患處。

二、沈 陽

【功能与主治】防腐爛，消腫痛。主口舌生瘡，牙齦赤腫潰爛。

【处方】人中白一兩 梅片五分 孩兒茶五錢 青黛三錢 黃柏三錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】洗淨患處，上之即可。

三、吉 林

【功能与主治】清熱解毒，止痛消腫，止痒防腐，生肌合口。主小兒牙疳牙宣，口內潰爛，等症。

【处方】人中白六錢七分 蘇薄荷三錢四分 孩兒茶三錢四分 川黃柏二錢 會青黛二錢 梅花片三分五厘

【制法】將以上六味藥品共為細末，用絹羅篩之，以極細為度。

【劑量及用法】每日擦患處，二、三次，即見功效。

【禁忌】擦后忌服辛辣、酒類等品。

四、哈 爾 濱

【功能与主治】清熱止痛生肌。胃火上灼，口糜舌腐，破爛腥臭，疼痛流涎。主口糜瘡。

【处方】中白一兩 薄荷五錢 兒茶五錢 黃柏 青黛各三錢 冰片五分

【制法】共研為極細面，絹羅篩過。玻璃瓶存貯。

【劑量及用法】洗淨手指，蘸搽腐破處。

【禁忌】忌食辛辣、酒類。

附參考古方

【来源】外科正宗。

【功能与主治】治小兒口疳、走馬疳，及牙齦腐爛黑臭者。

【处方】人中白（湯壺者佳，煅紅）二兩 兒茶一兩 黃柏 薄荷 青黛各末六錢 冰片五分

【制法】共再研極細。

【劑量及用法】先用溫湯漱淨，吹藥疳上，日用六、七次。

牙 疳 散

一、南京(人中白散)

【功能与主治】主小兒走馬牙疳、口疳、牙齦腐爛臭黑。

【处方】煅人中白二兩(漂淨后煅) 方兒茶一兩(微炒) 黃柏六錢 煅硼砂六錢 薄荷六錢 飛青黛八錢 川黃連五錢 冰片五分

【制法】共研極細末。

【劑量及用法】每用少許，擦患處。擦前先將患處洗淨。

二、西 安

【功能与主治】主治牙疳。

【处方】紅棗一枚 白砒一塊(黃豆大) 冰片一分

【制法】先將白砒入大棗內用絲綫紮好瓦上煨烟為度，石灰泡爛研細加冰片再研為細面。

【劑量及用法】每次用少許敷佈患處。未用以前用水漱口，用藥后半小时漱口，勿將藥物嚥下。

三、蘭 州

【功能与主治】消炎去腐。主牙齦潰爛。

【处方】人中白一錢 兒茶二錢 青黛二錢 胡黃連二錢 梅片五錢 硼砂二錢 黃柏一錢

【制法】共研細末。

【劑量】用少許擦牙齦上潰爛處，使病者低頭張口，令毒水外流。

四、大 同

【功能与主治】肺胃火熾，牙齦潰爛，牙疳蔓延，經久不愈。

【处方】川連三錢 梅肉一錢 人中白二錢 青黛二錢 硼砂一錢 生石膏二錢 冰片五分

【制法】共研細面。

【劑量及用法】擦患處，每日三至四次。

五、濟 南

【功能与主治】齒齦潰爛，口臭出血。

【处方】兒茶一兩 人中白(煅)四錢 青黛四錢 黃柏 硼砂 蘆薈 胡黃連各二錢 冰片一錢

【制法】共為極細粉，用絹羅篩

二、三次。

【劑量及用法】用藥粉少許敷患處。

【禁忌】忌食辛辣。

六、沈 陽

【功能与主治】清熱消腫化疳。主牙齦腫爛，口腔氣臭。

【处方】人中白五錢 綠矾五錢 五倍子五錢 梅片五分

【制法】共研極細面。

【劑量及用法】先用淨水拭淨患處，再敷藥面。

七、撫順(1)(中白散)

【功能与主治】清熱止痛，生肌消炎。主胃火上灼，口糜舌爛，腐敗牛鼻，疼痛流涎。

【处方】人中白 兒茶 黃柏 青黛各一錢 冰片一分 黃連三分 硼砂一錢

【制法】共為細面。

【劑量及用法】洗淨手指蘸藥擦腐爛處。

【禁忌】辛辣、酒類。

八、撫順(2)

【处方】黃柏二錢 兒茶二錢 冰片三分 胡連一錢 硼砂一錢 青黛二錢 薄荷二錢

【制法】共為細面。

九、撫順(3)

【处方】牛黃一分 兒茶二錢 黃連一錢 炒蒲黃五分 珍珠二分 冰片一分 中白五分 血余五分 紅娘子五分

【制法】共為細面。

十、吉林、哈爾濱

【功能与主治】消疳化毒，清熱鎮痛，止痒生肌。主牙疳紅腫，齦肉赤爛，口臭出血，牙枯脫落，穿腮蝕唇，以及胃熱上攻等。

【处方】同濟南。

【制法】共為細末，用絹羅篩二、三次。

【劑量及用法】淨指蘸藥面搽抹患處。

【禁忌】忌食辛辣。

十一、呼 和 浩 特

【处方】黃連一兩二錢 烏梅肉

四兩 人中白八錢 硼砂四錢 青黛八錢

【制法】共為細面，每兩兌冰片二分。

玉 泉 散

一、上 海

【功能与主治】口腔發炎。

【处方】生石膏六兩 甘草一兩

【制法】各取細粉，充分和勻。

【劑量及用法】每服三錢至五錢，包煎服湯。

二、福 州

【功能与主治】治陽明內熱，煩渴頭痛，二便閉結，瘟疫癰黃，及熱痰喘嗽等症。

【处方】石膏(生用)六兩 甘草二兩

【制法】共為末。

【劑量及用法】每服二、三錢，新汲水或熱湯或人參湯調下。

白 清 胃 散

一、北 京

【功能与主治】清熱消炎止痛。主牙齒疼痛，口舌生瘡。

【处方】生石膏十兩 硼砂一兩(生) 冰片二錢

【制法】共為細粉。

【劑量及用法】用涼開水蘸藥少許抹患處。

二、天 津

【功能与主治】解熱止痛。主牙齒疼痛，牙根腫爛，牙縫出血，口舌生瘡。

【处方】生石膏四兩 生硼砂 元明粉各一兩 共為細粉兌入：冰片二錢

【制法】以上研細和勻，二錢重裝瓶。

【劑量及用法】將此散少許擦患處，引涎液出口，日擦數次。

【禁忌】忌烟、酒、辛辣食物。

三、濟 南

【功能与主治】口舌生瘡，齒齦腫痛。

【处方】生石膏四兩 硼砂(煅)一兩 元明粉一兩 冰片二錢

【制法】共为細末。

【剂量及用法】敷痛处引涎流出。日敷数次。

四、呼和浩特

【处方】寒水石一兩 硼砂二兩 石膏五錢 明粉二兩 枯矾五錢

【制法】共为細面，每兩兌冰片三分

樟 冰 散

沈 陽

【功能与主治】清热解穢。主牙痛齦腫，口唇赤痛，潰爛腫疼。

【处方】祁艾二錢，胡椒(开口者)七粒 樟腦三錢

【制法】前藥盛碗內，上用一碗对合紧，用紙封固下以炭火一小塊如鷄子大燒之，冷定开取上碗內具有白霜。火不可过猛，猛則霜紅，以白者为妙。

【剂量及用法】納牙內少許。

牙痛失笑散

一、沈 陽

【功能与主治】清凉定痛。主風火牙痛，虫牙疼痛，牙齦腫爛等症。

【处方】草撥八分 細辛叶一錢 冰片二分半

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】擦牙痛处，流涎片时見效。

二、吉林(牙痛散)

【功能与主治】凡牙齒齦腐，疼痛腫脹，敷用此藥，功能杀菌，消毒，使口腔清潔，立止牙痛。主虫牙痛，火牙痛。

【处方】草撥八分 北細辛叶一錢 梅花冰片二分五厘 薄荷冰一分

【制法】共为細末，用絹羅篩过。

【剂量及用法】將此藥搽于患处，伏于棹边，流涎片刻見效。

【禁忌】忌食發物。

立止牙痛散

一、南京(牙痛散)

【功能与主治】主風火牙痛。

【处方】沒食子四錢 生石膏四

錢 煅硼砂一錢 元明粉一錢五分 冰片五分 飛硃砂七分

【制法】共研为細末，乳至極細。

【剂量及用法】每用少許，擦患处。

二、西 安

【功能与主治】止痛杀菌鎮靜。主治蛀虫牙痛，神經性牙痛。

【处方】生烏藥 牙皂 草烏 雄黃 洋冰各一錢 北細辛二錢 冰片八分

【制法】共为極細末。

【剂量及用法】每次用少許。撒佈于患部，令徐徐流出藥涎，不可嚥下。

三、沈陽(牙痛散)

【功能与主治】散風祛火，杀虫止痛。主風火牙痛虫痛齦腐。

【处方】雄黃精四錢 生石膏二兩 硃砂二錢 火硝二錢 大梅片五分

【制法】共碾極細面。

【剂量及用法】先用鹽水漱口，再用此藥少許，擦牙数次即愈。

擦 牙 散

一、撫 順

【处方】石膏二兩 炙軍 煅石膏各一錢 枯矾 白矾 白芷 青盐各一兩。

【制法】共为細面。

二、呼和浩特

【处方】生石膏四兩 食盐 申姜各二兩 細辛 白芷各五錢

【制法】共为細面。

青 果 膏

一、北 京

【功能与主治】清咽止渴。主咽喉腫痛，音啞口燥舌干。

【处方】鮮青果一百六十兩 山豆根一兩 麦冬 胖大海 天花粉 訶子各四兩 錦灯笼二兩

【制法】共熬汁收膏，以不陰紙为度。每兩汁兌煉蜜一兩。

【剂量及用法】每服五錢，白开水調化送下。

二、天 津

【功能与主治】清咽喉，化痰涎。主咽喉紅腫，咳嗽吐痰，口燥舌干，心煩胸滿。

【处方】鮮青果十斤

【制法】熬汁去渣過濾，將汁煉至滴毛頭紙上，背面不陰为标准。收清膏，每清膏一斤兌蜜三斤收膏。裝瓶。

【剂量及用法】每次服一兩，白开水冲服。

三、上海(橄欖膏)

【功能与主治】咽喉痛。

【处方】鮮橄欖一千六百兩

【制法】將鮮橄欖煎汁一次，去核，再煎一次榨淨。將二次所煎藥汁澄清過濾，蒸發成濃汁。加冰糖廿五斤收膏，成膏四斤八十兩。

【剂量及用法】每次半羹匙，开水化服。

四、南 京

【功能与主治】生津止渴，解魚蟹毒，清痰熱，利咽喉，醒酒。

【处方】鮮青果十斤

【制法】將青果晒干后，清水煎熬濃汁，去渣過濾。用明矾八錢化水，入內攪勻，加入冰糖四斤收膏。

【剂量及用法】每服二錢，开水和服。

碧 雪 丹

杭 州

【功能与主治】治一切積熱，咽喉腫痛，口舌生瘡，悶熱煩躁，喉痹壅塞，二便不通，大行熱疫，發狂昏憤等症。此丹清熱解毒，功效卓著。

【处方】石膏(水飛)十六兩 朴硝十六兩 烏牙硝十六兩 寒水石(水飛)十六兩 生甘草十六兩 芒硝十六兩 硝石十六兩

【制法】先將甘草煎湯去渣，入諸藥再煎。用柳木不斷攪勻，再加青黛十六兩和勻为度。

【剂量及用法】每服一至二錢。含化嚥津，或凉开水調下。口舌瘡，敷患处。

棗信丹

一、沙市

【功能与主治】治小兒痘疹后因疳蝕而鼻唇癰爛，頭部疳癰走竅。

【处方】紅棗(去核)一斤 砒石一兩 正梅片三錢

【制法】先將大棗破开去核，再將砒石末包入棗內，燒存性。候冷又加梅片共研極細末。严密貯藏于瓶內，勿使藥性揮發。

【劑量及用法】因細菌侵蝕而成疳者用此藥末外擦。成人用之亦宜。

【禁忌】非因疳蝕者忌用。藥末忌吞入咽喉。

二、南京

(金銀丹、赤霜散)

【功能及主治】主走馬牙疳，潰爛雲腐，甚至腮穿牙脫。

【处方】大紅棗一枚 紅砒一分 冰片一分

【制法】將紅棗去核，以砒納入棗內，用線紮好，置瓦上用炭火炙至棗枯烟尽为度，以碗盖熄。候冷退去火气，研为細末，再入冰片乳至極細。

【劑量与用法】每用少許擦患處，吐出口中粘涎。憑医生处方購用。

【禁忌】不可嚥下。

三、武汉

(加味信棗丹，信棗丹)

【功能与主治】牙疳腐爛，色紫牙搖，腮硬腮穿等症。

【处方】信石(煨)五分 黃柏末五錢 蘆薈一錢 紅棗肉五錢

【制法】混合碾細，成淨粉80—85%即得。

【劑量及用法】先用米泔水漱淨疳毒，后塗此藥于堅硬或腐爛處，用藥多少，視患處大小而決定。

【禁忌】切勿咽下。

九龍活命丹

濟南

【功能与主治】咽喉腫痛，小兒口瘡。

【处方】牛黃 麝香各二分 火

硝八分 西瓜霜二兩 硼砂二錢五分 梅片五分 馬勃 血竭各一錢五分 蒲黃一分

【制法】共研極細粉，用瓶收貯，蜡封瓶口。

【劑量及用法】先用清水漱口，將藥先服，后吹咽喉。大人每次一分至二分，小兒減半。若治口瘡，敷患處即可。

【禁忌】忌食辛辣、油膩、甜物。

咽喉丹

沈陽

【功能与主治】清咽解熱，消腫除痰。主咽喉腫痛，雙單乳蛾，咽干音啞，胃熱口瘡。

【处方】生地 茵陳 黃芩各一兩 生石膏 石斛 麥冬各五錢 枳殼 烏犀角 馬勃 人中黃 枇杷叶各三錢

【制法】共碾極細面，煉蜜为丸，一錢五分重。

【劑量及用法】每服一丸，小兒減半，早晚食后白開水送下。

【禁忌】忌食五辛、發物。

小兒丹

一、沈陽

【功能与主治】清熱解毒，止痛生肌。主疹后余毒不消，壅結咽喉，紅腫疼痛，嚥物不下以及牙齦破爛，舌唇焦裂，口瘡等症。

【处方】硼砂二錢 朴硝三錢 硃砂一錢五分 乳香 沒藥各一分

【制法】共碾極細面

【劑量及用法】每用少許，吹咽喉，外敷亦可。

二、撫順

【处方】沉香一兩 木香一兩 片姜黃二兩 豆霜五錢 硃砂一兩

【制法】共为細面，醋和面为小丸，硃砂衣。

附參考古方

【来源】沈氏尊生書。

【功能与主治】治疹后余毒，壅遏在咽喉，腫痛，嚥物不下，或結一切余毒，牙齒破爛。

【处方】白官礬二錢 朴硝三錢

辰砂錢半 乳香(去油) 沒藥(去油)各二分。

【劑量及用法】吹、敷俱可。

牙痛一粒丹

西安

【功能与主治】牙痛(神經性痛)。

【处方】蟾酥一錢 五靈脂一錢 薄荷冰五分 麝香一分

【制法】先將蟾酥用陳酒化透，共为末，金箔为衣。

【劑量及用法】含于痛牙處，每次一粒，痛止停用。

烏龍錠

一、沈陽(1)

【功能与主治】清涼退熱，消腫解毒。主時行瘟疫，咽喉腫痛，單雙乳蛾，小兒疹病，疔毒惡瘡，痰火壅盛，昏眩不語。

【处方】牛黃二錢 麝香六錢 千金霜 文蛤 毛慈姑 紅芽大戟各四兩 灯心炭 朱砂各六錢 水安息二具 冰片六錢

【制法】共碾極細面，糯米糊为錠，每錠七分，小錠三分五厘重。

【劑量及用法】每服一錠，外敷亦可。

【禁忌】五辛食物。孕婦忌服。反甘草。

二、沈陽(2)

【功能与主治】清涼退熱，消腫解毒。主時行瘟疫，寒熱，咽喉腫痛，單雙乳蛾，小兒疹痧，疔毒惡瘡，老人痰火，昏眩不語。

【处方】牛黃二錢 麝香六錢 千金霜 文蛤 毛慈姑 灯心炭 紅大戟各四兩 朱砂六錢 水安息一个

【制法】共碾極細面，糯米糊为錠，大人用八分重，小兒用四分重，赤金为衣。

【劑量及用法】每服一錠，外敷亦可。

【禁忌】忌食辣物，孕婦忌服。反甘草。

三、撫順(1)

【功能与主治】清涼解毒。主瘟

毒發斑，毒熱潛伏，壯熱神昏，目閉語謬，泛惡嘔吐，遍體發斑，形如云片或紅或紫；疹疹內陷，疳痧麻疹，毒熱內陷，皮色青紫，舌起芒刺，咽干口渴，唇裂目赤，懊憹不安；喉痹由于君相火盛，風寒外襲，發為喉痹，咽喉紅腫，疼痛異常，滴水難嚥，大便燥結，小便赤短；癰疽初起，寒熱往來，炎腫疼痛，嘔吐攪鬧，口涎不尽。

【處方】燈心炭三錢 大戟 毛慈姑 千金霜各二兩 牛黃五分 麝香錢半 冰片 朱砂各三錢 文蛤二兩

【制法】共為細面，江米面為錠，七分重。

四、撫順(2)

【處方】烏龍炭三錢 大戟 慈姑 千金霜各二兩 牛黃一錢 台麝 冰片 片砂各三錢 水安息一具 文蛤二兩。

【制法】共為細面，江米面為錠，一錢重。

五、吉林、哈爾濱

【功能與主治】清瘟解毒。瘟毒發斑，疹疹內陷，喉痹癰疽。

【處方】東牛黃一錢 台麝香 片匣砂 梅花片各三錢 水安息一具 千金霜 毛慈姑 五倍子各二兩 燈心炭六錢 紅芽大戟二兩

【制法】牛黃、麝香、片匣砂及梅花片均另研，余藥碾為細面，一處調勻。用糯米糊為錠，每重七分，大赤金為衣。

【劑量及用法】每服一錠，白水調服。早晚二次。

【禁忌】忌食辛辣；孕婦忌服；反甘草。

玉鎖匙

一、沈陽

【功能與主治】清熱消腫，解毒利咽喉。乳蛾喉痹，纏喉風疔，痰壅口禁，痧疹毒盛，咽喉腫痛，甚則糜爛。

【處方】馬牙硝三錢 硼砂三錢（用新煉銀罐，先硼後硝，層層間煉，如升枯矾之狀，松脆為妙）冰片六分 殭蚕（炒研）五分 雄黃五分

【制法】共碾極細面，收貯磁瓶

內。

【劑量及用法】用少許吹患處，痰涎即出。

二、吉林

（玉鎖匙、金不換）

【功能與主治】止痛消腫，防腐。主咽喉腫爛疼痛，舌強口糜等症。

【處方】芒硝五錢 硼砂五錢 飛硃砂五錢 冰片五分 制殭蚕五分

【制法】用銀鍋先煉硼砂，後煉芒硝。煉如枯矾狀，松脆為度，研為極細面。置冷處，出火氣。然後加入冰片、硃砂、殭蚕等細面，共成極細之散劑。

【劑量及用法】頻吹入喉中。

【禁忌】白喉忌用；忌食辛辣。

附參考古方

【來源】《因緣·病証方論》。（玉鎖匙）

【功能與主治】治風熱喉痹及纏喉風。

【處方】焰硝一兩半 硼砂半兩 腦子一字 白殭蚕一分

【制法】各末，研勻。

【劑量及用法】以竹管吹入錢許入喉中，立愈。

金鎖匙

一、沈陽

【功能與主治】清火消腫，開喉癰清痰。主咽喉腫痛，水漿難入，及各種咽喉疾患，痰壅氣閉，呼吸困難，牙齦喉風，疫喉腫閉，口噤不開，牙關緊閉。

【處方】火硝一兩五錢 硼砂五錢 殭蚕一錢 雄黃二錢 冰片二分五厘

【制法】共碾極細面，合一處。

【劑量及用法】以竹管吹之。

二、青島

【處方】焰硝一兩五錢 硼砂五錢 雄黃二錢 殭蚕一錢 冰片三分

【制法】共研極細面。

附參考古方

【來源】《醫宗金鑑》。

【功能與主治】弄舌喉風。

【處方】冰片二分五厘 白殭蚕一錢 雄黃二錢 焰硝一兩五錢 硼砂五錢

【制法】各研末，共和勻。

【劑量及用法】以細筆管吹入喉內腫痛處。

西瓜霜

一、北京

【功能與主治】消腫止痛。主咽喉腫痛，乳蛾喉痹。

【處方】西瓜霜二十兩 冰片六錢

【制法】用黃泥鉢一個，將西瓜一個裝入，將瓜切蓋，以火硝裝滿仍以瓜蓋蓋之，竹筴插定。再以鉢一個合之，外用皮紙條和泥將縫封固，放陰處。連數日鉢外即吐白霜以鵝毛掃下，仍將鉢放陰處再吐再掃，以鉢外無霜為度。以霜加冰片共研細粉。

【劑量及用法】每服一分，吹入喉內。

【禁忌】忌酒、肉、油、麪。

二、西安

【功能與主治】殺菌消毒。主治喉頭炎，口腔炎，扁桃腺炎，舌腺炎等。

【處方】大西瓜一個 火硝 皮硝各二斤半

【制法】用大西瓜一個割開，去皮裝罐中。再加火硝、皮硝拌勻溶化，掛于過風處吹之。日久出霜很多。每兩霜兌入大梅片一錢。

【劑量及用法】一日三、四次。每次少許吹入患處，將藥涎徐徐流出再吹藥粉。

三、大同

【功能與主治】咽喉紅腫，起白成蛾，口舌生瘡，牙齦糜爛。

【處方】西瓜霜二兩 芒硝五錢 冰片二錢

【制法】將西瓜切成薄片，裝入瓦罐內。一层西瓜，一层芒硝。後封好放在過風陰涼處。候罐外有白霜撥下。每兩兌冰片三分，研細為度。

【劑量及用法】擦患處。

四、濟 南

【功能与主治】咽喉腫疼。

【处方】西瓜一个 提淨火硝二斤半 梅片三分(每兩西瓜霜用量)

【制法】1. 准备工作:(一)瓦罐一个高尺許,罐口約八寸許。先將罐洗淨,用日光晒極干备用。(二)稻草圈一个,洗淨,晒極干备用。(三)竹劈兩個,洗淨,用細繩紮成十字架备用。(四)紅棉紙二張备用。(五)木架一个。(六)紗布一塊。

2. 時間:在夏天初伏开始作。

3. 地点:潔淨透風房子一間,嚴禁蚊蠅入內。

4. 制法:(一)先將西瓜洗淨擦干,將西瓜頂用刀切下,瓜口約三寸許。用勺將瓜瓤取出,用紗布擰汁放入碗內备用(取瓜瓤時不要挖得太薄)。(二)將瓦罐放在架上,瓦罐內放稻草圈,穩好。將瓜放入罐內要端正。(三)將火硝填入瓜內(火硝必須多提煉幾次,不然,瓜霜能變為水)。再放入瓜汁(瓜汁要看內容量),裝入約八分滿即可。(四)將十字竹劈架放入瓜口上,再將瓜頂蓋上。(五)罐口用紅棉紙兩張封上,用細繩紮上。(六)在做西瓜霜的初期,必須每日打開三、四次,看瓜內的水多少。多則取出,少則添上。(七)出藥日期,約一、二星期,罐肚先出白點。慢慢罐子發白,繼而發出白棉花形藥,附于罐上,即可用竹刀刮下,放入瓶內收用。(八)此罐可放至二、三個月,至罐上不大出藥,即可作廢。此藥效力最好的是棉花形的藥(粗的軋細效力也不錯)。西瓜霜研入梅片后,裝入小瓶。每瓶一錢用蜡封。

【劑量及用法】將藥吹至患處,日三次。此藥可以下嚥。

【禁忌】忌食酸、辣、甜、牛肉、雞蛋、魚腥等物,並忌房事。

五、吉 林

【功能与主治】止痛,防腐,消

腫。上喉蛾、喉痹疹腫腐爛,滴水難嚥。勢欲閉塞。

【处方】皮硝若干 西瓜皮一个

【制法】將西瓜切蓋去穢,如鉢狀,滿裝皮硝,仍以瓜蓋蓋之,竹簽插定。懸置陰涼通風地方。過幾日瓜外吐白霜,用鵝毛扫下。再吐再扫,以無霜為度。又法:將裝皮硝之西瓜置黃泥鉢內,用紙條黃泥封之,放陰涼處。俟鉢外吐霜扫之,如前法。

【劑量及用法】用約少許吹喉腔內。

【禁忌】忌食辛辣之物。

【備考】白喉忌用。

牙 疼 藥

一、濟 南

【功能与主治】牙疼。

【处方】蕁撥四錢 白芷四錢 冰片一分 高良姜 明雄 細辛各四錢 山椒四兩

【制法】共為細末。

【劑量及用法】敷痛處,引涎流出。

二、承德(牙痛藥)

【功能与主治】牙疼。

【处方】蕁撥 明雄 細辛 高良姜 白胡椒各四錢 麝香五分

【制法】共為細粉。

【劑量及用法】敷痛處,引涎流出。

三、呼和浩特

(立止牙疼藥)

【处方】蟾酥 細辛 蕁撥 食鹽各等分

【制法】用蟾酥糊粘小丸。

牙 疼 藥 水

天 津

【功能与主治】止痛,殺菌,防

蛀。主風火牙痛,牙齦紅腫,虫蛀牙作疼,及一切神經性牙疼。

【处方】蕁撥 細辛 良姜各一兩

【制法】以上共軋粗末,加入五十度白干酒一斤八兩,浸泡一星期,每日攪拌兩次,攪后蓋嚴,然後壓榨過濾去渣,再加白干酒,調整至1000毫升(即二斤)裝瓶。每瓶6毫升(即一錢九分二厘)。

【劑量及用法】以精制棉(即藥棉花)蘸藥水,塗于患處。

牙 痛 一 粒 笑

杭 州

【功能与主治】治風熱虫患,各種牙痛,疼甚叫号,齒齦浮腫之症。塞于患處,消腫止痛。

【处方】麝香一錢 乳香(去油)一錢 沒藥(去油)一錢 杜蟾酥一錢

【制法】研為細粉,將蟾酥烊化為丸。

【劑量及用法】將藥塞于患處待化。如虛熱牙痛止后,少壯接服知柏地黃丸;老人服還少丹。

耳 鳴 丸

北 京

【功能与主治】瀉積熱兼滋補。主耳鳴重听。

【处方】人黃八兩 山茱萸八兩 茯苓八兩 澤瀉八兩 黃連一兩 龍胆草十兩 黃柏十兩 梔子十兩 黃芩十兩 當歸十兩 龜板十兩(炙) 熟地十兩 山藥十兩 木香三兩 青黛五兩 五味子二兩 蘆薈二兩 礞石二兩(煨) 共為細粉兌入:麝香五錢

【制法】上藥和勻,水泛小丸,硃砂、赭石各半為衣,闔亮。

【劑量及用法】每服二錢,日服二次,溫開水送下。

【禁忌】忌辛辣、動火食物;孕婦忌服。

証 雜

利生丸

沈 陽

【功能与主治】調氣止痛，利濕祛痰。主心腹脹痛，風痰喘嗽，膈食吐酸，紅白痢疾，崩漏帶下，身面發黃，濕熱流注，無名腫毒。

【处方】茅蒼朮 烏藥 香附 藿香 蘇叶 厚朴 陳皮 青皮 赤芍 小茴 木香 川芎 當歸 黃芩 枳殼 白茯苓 木通 檳榔 各一兩 草果二兩 粉甘草五錢

【制法】上藥不可烘，須晒干碾成極細面，米糊為丸，重一錢五分。

【劑量及用法】每服一丸。心痛，灯心、姜湯送下，胸膈脹，二消湯送下。

【禁忌】生冷硬物。

附參考古方

【來源】惠直堂經驗方（珍本醫書集成）。

【处方】茅蒼朮 烏藥（二味俱米泔浸一宿晒干） 香附（一半童便浸炒，一半米醋浸炒） 藿香 純蘇叶 厚朴（姜汁炒） 陳皮 青皮（醋炒） 赤芍（酒炒） 砂仁（去壳） 小茴（微炒） 木香 草果（麩裏煨去壳）各二兩 川芎（微炒） 歸身（微炒） 黃芩（微炒） 枳殼（數炒） 白茯苓 木通 鷄心 檳榔各一兩 粉甘草五錢

【制法】上藥不可烘，須日晒干為末，陳棗、米糊為丸，每重一錢五分，亦須晒干，不可見火，晒干，約每丸九分。

【劑量及用法】每服一丸，心痛，灯心二分，姜一升煎湯送下；肚痛，姜一片，搗碎入炒鹽三分，開水沖服；胸腹膨脹，姜皮五分，大腹皮一錢，煎湯下；瘧疾，發日用東向桃腦七个、姜一片煎湯下；風痰喘嗽，蘇叶薄荷湯下；赤痢，白蜜二錢，米湯調下；白痢，紅糖一錢，姜汁一匙，同米湯調下；疝氣，小茴香、川陳湯下；

隔食嘔酸，小兒痞積，姜湯下；血崩、惡露不淨，當歸一錢煎湯下；身面黃胖，濕熱流注，無名腫毒，俱陳酒下。

鵝 榔 丸

吉 林

【功能与主治】活血助氣。主治胸醉各毒，遍身倦怠，四肢痠痛，咳嗽痰喘，大小便結，赤白痢疾，酒積酒寒。

【处方】冬虫草 金牛草各六錢 七分 當歸一錢四分 川芎四錢 法半夏 黃芪 熟地 丹皮 山藥 明黨參 鶴虱各二錢 洋參五錢四分 炙肉二錢 夏花一錢四分 米壳二錢

【制法】先將米壳熬成膏，再將其他藥研為末，以米壳膏為丸，如黃豆大，紅色為衣。貯瓷壇中保存。

【劑量及用法】如毒重每服七丸，輕者四丸，均用白水送下。

升降敗毒丸

沈 陽

【功能与主治】清溫祛邪熱。主瘟疫斑疹，時毒發頤，毒火上升，口瘡牙痛，咽腫，眼胞赤爛，翳障，花柳毒，腹瀉腹痛，男淋濁，女帶下，小兒胎毒，二便不通等症。

【处方】野大黃八兩 姜黃 蟬退 僵蚕各四兩

【制法】共碾極細面，煉蜜為丸，二錢重。

【劑量及用法】每服一丸，元酒二盅，調蜜一匙冷服，病重者三小時後如法續服。

【禁忌】發火物。孕婦忌服。

紫 金 散

沈 陽

【功能与主治】解毒防疫。主山嵐瘴氣，無名腫毒，瘟疫傷寒，絞腸腹痛，赤白痢疾，嘔吐泄瀉，急驚抽搐，五疳毒蠱，痘痧麻疹，瘡瘍丹毒，

喉風乳蛾，皮爛紅腫，中毒中惡，四時瘟疫，濕瘟黃疸，神昏氣促。

【处方】台麝香二錢 重樓三錢 金霜一兩 明雄黃 硃砂各二錢 紅芽大戟一兩五錢 文蛤二兩 山慈姑各二兩 黃連一錢

【制法】共碾極細面。

【劑量及用法】每次服七厘至一分，白開水送下。

【禁忌】生冷硬物。孕婦勿用。

【備考】吹入鼻孔少許，可防疫癘傳染。

一 氣 膏

吉 林

（乾坤一氣膏）

【功能与主治】活血殺菌，驅風散寒，滲濕除痰，暖宮調經。主新久痞疾，諸風癱瘓，流注，各種惡瘡，男子夢遺滑精，腎寒精冷，女人赤白帶下，久不生育。

【处方】當歸 白附子 赤芍 白芍 白芷 生地 熟地 山甲 木鱉 巴豆（去壳） 蓖麻（去壳） 三棱 莪朮 五靈脂 川斷 肉桂 元參 滴乳香 明沒藥各一兩二錢 台麝三錢 貝阿魏二兩（切片）

【制法】除乳、沒、麝、魏外，余藥皆入香油五斤內浸，春三日、夏五日、秋七日、冬十日，期畢，用桑柴火熬至藥枯，用細絹濾清。每淨油一斤，配頂上飛丹十二兩，將熬成之油入鍋內，下章丹，槐枝攪之令成膏，端下鍋來，用木盆坐穩，漸下阿魏片，令其泛化，魏盡，再下乳、沒、麝香攪均，乘熱傾入磁罐內，分二處盛之，以備用時溶化便利。

【劑量及用法】用時以熱湯化開。痞病，用紅緞攤一兩重油膏貼之；外科隨瘡面大小用藥可也；男子滑精，如女帶下等患，貼丹田穴；諸風癱瘓，貼野俞穴。

附參考古方

【來源】外科正宗。

【功能与主治】此膏專治痞疾，

毋論新久立效。又治諸風癱瘓，淫後流汗，各種惡瘡，百般怪症，男子夜夢遺精，婦人赤白帶下，又男女精寒血冷，久無嗣息者。

【处方】当归 白附子 赤芍 白芍 白芷 生地 熟地 穿山甲 木鼈肉 巴豆仁 蓖麻仁 三稜 蓬朮 五靈脂 續斷 肉桂 元參 各一兩 乳香 沒藥各一兩二錢 麝香三錢 真阿魏(切薄片听用)二兩。

【制法】上用香油五斤，除乳、沒、麝、魏外，余皆入油浸，春三、夏五、秋七、冬十，期畢，桑柴火熬至藥枯，細絹濾清，每淨油一斤配飛丹十二兩，將油入鍋內，下丹，槐枝攪攪其膏，候成，端下鍋來，用木盆坐穩，漸下阿魏片泛化已足，方下乳、沒、麝香，再攪勻，乘熱傾入瓷罐內，分三處盛之。

【劑量及用法】臨用湯中頓化，痞病紅腫癰貼，余病絞痛俱可攤之。有腫者對患貼之，男子遺精，婦人白帶，俱貼丹田，諸風癱瘓，貼腎俞穴並效。

百效膏

北 京

【功能与主治】活血化痞。主風濕疼痛，跌打損傷，積聚痞塊及婦女月經不調。

【处方】白芷四兩 官桂二兩 当归十一兩 玄參 大黃 赤芍 木鼈子各四兩 血余三兩 生地十一兩

【制法】上藥用香油二百四十兩炸枯去渣，煉至滴水成珠，入黃丹一百兩攪勻成膏，另用：

阿魏二兩 乳香二兩 沒藥二兩 共為細粉，每十六兩膏油兌藥粉五錢，攪勻攤貼。

【劑量及用法】微火化開貼患處。

【禁忌】忌勞累並忌食發物。

附桂紫金膏

沙 市

【功能与主治】治風濕風寒，勞傷癱瘓，積聚痞塊，流注癰癤，寒濕脚氣，鶴膝，痠痛，疝氣遺精等症。

【处方】生地 当归 干姜 桂枝 麻黃 白芷 甘草 蒼朮各一兩 枳殼 五加皮 莪朮 桃仁 山索 川烏 陳皮 台烏 三稜 細辛 首烏 草烏 柴胡 防風 寄奴 牙皂 川芎 威靈仙 羌活 赤芍 藁本 續斷 獨活 連翹各三錢 血余一團 天雄八兩 小茴香附 刺芥 海風藤各三錢

【制法】上藥用麻油四斤，入藥煎枯去渣，再下黃丹三十兩熬成膏，候半冷，再下后列細料藥：中安桂一兩 麝香三分 广木香二錢 冰片四錢 樟腦二錢 乳香 沒藥各二錢 共研細末攪入膏內令勻，退火攤用。

【劑量及用法】用時將膏藥在火上烘融攤開，貼患處。

【禁忌】非因寒濕致病及有發炎症狀者忌貼。孕婦忌用。

甲 魚 膏

一、撫 順

【处方】活甲魚二个 寸云 母丁各六錢 海馬二付 蛤蚧二对 狗腎二具 石燕一兩 鹿茸二对 香油五斤。

【制法】熬枯去渣，次入。

当归 木瓜 牛膝 川椒 白茯苓各六錢 鎖陽 熟地 肉桂 附子各一兩 炙起石六錢 以上熬枯去渣，再熬滴油成珠，每斤入丹半斤，后入下列面藥：

血竭 甘草 甘遂 干姜 乳香 沒藥 台烏各六錢 人參二兩 攪勻為度。

二、吉 林

【功能与主治】追風去寒，調經活血。主男子小腸疝氣，腎寒腹痛；女子赤白帶下，經血不調，子宮寒冷，腰痠腿痛。

【处方】甲魚一个 紫河車一具 白花蛇 烏蛇 阿魏 三稜 莪朮 紅花 桃仁 肉桂各六錢七分 章丹二一四兩 香油六斤四兩

【制法】用香油將上藥熬成膏，攤時兌少許麝香、冰片為佳。

【劑量及用法】將膏藥烤貼臍上。

壬 水 金 丹

一、天 津

【功能与主治】退熱清音，化痰止咳。主咽喉腫痛，肺熱咳嗽，胃熱口干煩渴，大便不通。

【处方】大黃十二斤 黃酒八斤 鮮柳枝 綠豆 蜂蜜 青果汁各一兩六錢 綠茶二斤 先將大黃砸成小塊，鮮柳枝、綠豆、綠茶三味用清水熬透，去渣濾淨取汁，再和黃酒、蜂蜜、青果汁，將大黃浸透，共裝入罐內(或不生鏽的桶)，將罐口封固，隔水蒸煮，至汁盡為度，倒出晒干。

人參(去蘆)四兩 生礬砂二兩 元明粉六兩 沉香八兩 五倍子四斤 七爪橘紅一斤 生寒水石一兩二錢共為細粉，兌入：

硃砂面一兩二錢 琥珀面 牛黃各一兩六錢 犀角粉 羚羊粉各八錢七分 制鐘乳石粉一兩二錢

【制法】以上研細和勻，用江米面四斤蒸糊為丸，每丸干重二分，蜡皮或蜡紙筒封固。

【劑量及用法】每次一丸嚥化，日含二、五丸。

【禁忌】烟、酒、辛辣食物。

二、青 島

【处方】大黃 嫩柳芽 槐芽 榆樹芽 酸棗芽 桑芽各一斤 黃酒三斤

【制法】大黃九蒸九晒，共軋面，江米糊為丸重二分，赤金衣。

三、沈 陽

【功能与主治】開郁化痰，強心健腦。主風痰火痰，食積水積，氣膨水膨，吐逆嘔喘，咳嗽痰盛，二便秘結，喉痹乳蛾，癲狂等症。

【处方及制法】野大黃片一斤，用黃酒、蜜各一斤拌浸一宿，次日再用綠豆一斤熬水浸一宿，又次日用黑鉛一斤听用，再用柳芽鋪甑底一寸五分管，將黑鉛煎成條與綠豆拌勻，鋪柳芽上一大半，蒙以夏布，將大黃鋪布上，此層布上再用柳芽多多蓋滿，蒸之一小時為止，放冷，去柳芽、鉛、豆，將大黃晒干，再露一夜，如此蒸制共九次，再將下列羣藥熬汁浸晒。五加皮五兩 陳皮三兩

生石膏四兩 枳殼二兩 牙皂二兩
焦山梔五錢 牛白朮 川貝母 香
附各二兩 銀梅肉二兩 薄荷 木
香 半夏 胆南星各二兩 酒黃芩
一兩 松香三兩 用水二十斤熬汁
至一斤半，去渣浸前制大黃，晒干再
浸，以汁盡為度，晒干研面，加元明
粉兩半 礞石一兩 礞砂五錢 琥珀
四錢 羚羊角 鍾乳石各一錢
東牛黃四錢半 朱砂一錢 共碾極
細面，煉蜜為丸。二錢重。

【劑量及用法】噙一丸至二丸，
白開水調服亦可。

【禁忌】生冷油膩。

四、撫順

【處方與制法】錦紋軍十斤 黃
酒 蜂蜜各一斤 以黃酒、蜂蜜拌
均錦紋軍放一夜次早所用。次用綠
豆一升，熬水浸一夜。再用黑鉛一
斤，打成片條所用。將制就之錦紋
軍共蒸九次。用蜜九斤，綠豆九升，
黑鉛九斤，蒸法用新柳木甑，以柳芽
鋪甑底厚寸半，次將鉛一斤、豆一升
拌均，以大半放柳芽上蓋布一塊，將
川軍放布上，又將布一塊蓋川軍上，
將余一半鉛蓋布上，將柳芽多多蓋
滿，蒸三柱香時，待冷定，起甑去柳
芽、鉛、豆不用，再將川軍晒干，露一
夜。如此九次，另用。

倍子五兩 梅肉 牙皂 枳殼各
二兩 陳皮 川貝 胆星 檀香各
三兩 山梔五錢 半夏三兩 黃芩
一兩 香附三兩 石膏四兩 薄荷
二兩 木香五錢 白朮三兩 上藥
用水二十斤，熬四斤去渣，取淨汁，
約存三斤，浸錦紋軍九次。汁尽晒
干，為極細面。

再將下列藥：

沉香二兩 犀角 羚羊 乳石各
三錢 牛黃四錢 朱砂三錢 明粉
一兩半 礞砂五錢 血珀四錢 共
研多次，以錦紋軍面拌均，以文蛤膏
合之，共搗干下所用。乳石粉用薑
香、甘松、零陵香、沉香水煮三日，不
住手攪之，以味不澀，滿口生津為
度。再用白朮、當歸、黃芪、枸杞、甘
草各五錢熬汁，入倍子汁內合上藥
制成之錦紋軍粉及乳石粉為丸，芡
實大，金衣。

五、呼和浩特

【處方與制法】川錦紋(軋粗面)

鉛(化成餅)各六斤 一层鋪藥，一
层鋪嫩柳芽三斤。藥一层，柳芽一
层，蒸晒七次；再用普洱茶三斤蒸
晒各七次；再用綠豆一升蒸晒各七
次，去豆不用。務用旺火蒸三個時
辰為度，晒干，軋細面，江米糊為丸，
每丸晒各二分，滿金衣。如配合時，
務于清明節前為好，若清明節后配
合者則不佳。成做時每斤面兌犀
角、羚羊各一錢。

紫金錠(玉樞丹)

一、北 京

【功能與主治】解諸毒，消癰腫。
諸瘡腫毒，腮腫牙疼，水瀉腹痛，
及蠍蟻咬。

【處方】山慈姑二兩 五倍子
千金子霜各一兩 紅芽大戟一兩五
錢 共為細粉兌入：朱砂 麝香
雄黃各一錢

【制法】七藥和勻，用糯米麵六
兩四錢，打糊為錠，干重一錢。

【劑量及用法】每服五分，日服
二次，溫開水送下，外用醋研敷患
處。

【禁忌】孕婦忌服。

二、天 津

【功能與主治】解諸毒，消癰腫。
上諸瘡重毒，兩腮赤腫，霍亂吐瀉，
肚腹疼痛。

【處方】山慈姑二兩 五倍子一
兩 紅大戟(醋制)一兩五錢 共為
細粉兌入：朱砂面 雄黃面 麝香
各二錢 千金子霜一兩

【制法】以上研細和勻，每藥面
一兩，用江米麵二錢蒸糊為錠，每錠
干重一錢。

【劑量及用法】每次服五分，白
開水送下。外用：醋研塗抹患處。

【禁忌】孕婦忌服。

三、上 海

【功能與主治】內服治中暑，胸
悶嘔吐，腹痛泄瀉。外用散瘡癰。

【處方】山慈姑二兩 續隨子霜
一兩 大戟一兩五錢 麝香一錢
腰黃 朱砂各七錢五分 五倍子
(去內垢)二兩

【制法】共研細粉，用糯米粉打
糊作錠，每錠干重一分。

【劑量及用法】外用，用冷開水

磨化，塗于患處，日夜數次。遵醫師
指示服用。

【禁忌】孕婦忌服。

四、南 京

【功能與主治】內服開胃，外用
消散。主瘡癰腫痛，關竅閉塞。

【處方】麝香三錢 飛朱砂五錢
飛明雄黃五錢 千金子霜一兩 山
慈姑二兩(姜汁洗去毛皮) 五倍子
一兩(揀去虫土，搗碎洗淨) 紅芽
大戟一兩五錢(酒煮去蘆根骨焙)

【制法】上藥七味，如法炮制，各
取淨粉，研末和勻乳細，加糯米糊杵
融做錠。

【劑量及用法】內服：每次用量
一分至二分，開水和服。外敷：用醋
磨塗患處。

【禁忌】孕婦忌服。

【備考】玉樞丹為不加米糊之淨
木。

五、武漢、廣州

(太乙紫金錠、太乙
玉樞丹)

【功能與主治】瘡癰腫痛，關竅
閉塞。

【處方】同北京。

【制法】進行干燥，混合碾細，按
淨粉量加糯米粉50%，用適量水，煮
成糊狀，和成為錠，大者重為一錢，
小者重為五分。

【劑量及用法】每服三分至一
錢，清冷開水磨服，外治用醋磨搽。

六、福 州

(太乙玉樞丹、神仙解毒
萬病丹、太乙紫金錠)

【功能與主治】通治百病。內服，
外敷無不神效。

【處方】紅芽大戟(杭產紫色者
佳，米泔浸去蘆根皮骨，淨，焙)一兩
五錢 山慈姑(有毛者真，去皮姜汁
洗淨焙) 文蛤(即五倍子去虫屎
洗淨焙)各二兩 千金子(即續隨
子，揀白肉紙裹研去油淨霜)一兩
硃砂(鏡面有神氣者水飛) 雄黃
(鮮紅透明者水飛)各五錢 麝香
白門子(研去毛渣)三錢

【制法】共研細末，用糯米白粥
白口中搗數千下，以極光潤為度。
印成錠子，每錠干重一錢。

【禁忌】孕婦禁忌。

七、杭 州(1)

(太乙紫金錠、万病解毒丹)

【功能与主治】治时行瘟疫，霍乱痧脹，山嵐瘴气，中暑昏厥，水土不服，喉風赤腫，中風口噤，四肢厥冷，以及癰疽疔毒，蛇蠍蜂毒，一切飲食中毒，內服外敷均可。

【处方】茅慈姑 五倍子(槌破揀去虫，土刮淨毛)各二兩 千金子霜一兩 紅毛大戟一兩五錢 飛灰砂 飛腰黃各七錢五分 麝香 錢

【制法】各取淨粉，加糯米粉打糊制錠。每重一分。

【劑量及用法】每服二至五錠，小兒酌減，用涼開水化服，外症用水磨敷患處。

【禁忌】孕婦忌服。

八、杭 州(2)

(太乙紫金片)

【功能与主治】芳香通竅，避穢解毒。治霍乱痧脹，山嵐瘴气，中暑昏厥，水土不服，喉風中毒，中風諸痛，小兒急惊風，以及暑濕瘟疫，穢濁熏蒸，神識昏亂危急諸症。

【处方】茅慈姑 五倍子(槌破揀去虫土刮淨毛)各二兩 千金子霜一兩 紅毛大戟一兩五錢 麝香三錢 梅水片二錢 苏合油一兩

【制法】各取淨粉，加糯米糊搗成薄片，洒金(或用京墨)，切而用之。

【劑量及用法】每服二至八分，小兒酌減，涼開水化服。

【禁忌】孕婦忌服。

九、南 昌

【功能与主治】中暑吐瀉，腹痛脹滿，痰厥卒倒，咽腫牙痛，癰疽腫毒。

【处方】紅大戟(酒煮去骨焙)一兩五錢 麝香二錢 飛雄黃七錢 飛朱砂二錢 千金子霜 五倍子(去虫土)各一兩 毛慈姑二兩

【制法】共研末糯米糊為錠，每錠潮重一錢。

【劑量及用法】每服一錠或半錠，重者服二錠，溫開水化服。外用醋磨敷患處。

【禁忌】孕婦及氣虛者忌服。不可与甘草同服。

十、沙 市

(太乙紫金錠)

【功能与主治】解諸毒，疔癰腫，通關竅。

【处方】山慈姑一兩 硃砂三錢 五倍子 紅大戟 千金子各一兩 明雄 錢 麝香 梅片各一錢五分

【制法】共研細末，用糯米漿為丸。

【劑量及用法】每服五分至一錢，開水下，小兒減半，外症用醋磨敷。

【禁忌】体虛及孕婦忌服。

十一、重 庆

【功能与主治】解諸毒，疔瘡腫，利便通，並治危急痼症。

【处方】同北京。

【制法】麝香、硃砂、雄黃另研，余藥共研細末，面糊作餅，每重一錢。

【劑量及用法】內服半錠至一錠，外搽不拘。

【禁忌】不可与甘草同服。氣虛及妊娠切不可服。

十二、西 安

(太乙紫金錠)

【功能与主治】主治諸瘡癰疔，喉中飲食諸毒，藥毒內陷，病發寒熱欲嘔、煩亂，心腹疼痛，癰腫，語言蹇澀及諸痧症。研末吹鼻可防傳染。

【处方】麝香 明雄 硃砂各三錢 山慈姑(去皮洗淨焙) 五倍子(洗去灰)各二兩 千金子霜一兩 紅牙大戟(去蘆洗焙)一兩半

【制法】分別搗研細末，絹羅過，料准分量研勻，以糯米濃汁搗杵，和勻為錠，每重一錢，玻璃紙包封。

【劑量及用法】成人每服五分，中病即止，不知再服。溫水磨化灌之，瘡毒用黃酒化服，牙痛等用薄荷湯，痢痧症用姜湯，小兒按年齡遞減。

【禁忌】孕婦忌服。

十三、蘭 州

【功能与主治】消腫止痛，活血

解毒。主各種瘡癰腫疼，牙痛，腮腫，食物中毒，跌打損傷，蠍螫蛇咬。

【处方】文蛤一斤 雄黃一兩 血竭三兩 山慈姑八兩 麝香三錢 大戟一兩二錢 千金子霜 朱砂各五兩 冰片三錢

【制法】共研細末，米面糊拌均做成錠一錢重。

【劑量及用法】內服每次一錠，白開水送下；外用醋磨敷。

【禁忌】孕婦忌服。

十四、濟 南

【功能与主治】主中暑吐瀉，腹痛脹滿，痰厥卒倒，咽腫牙痛，癰疽腫毒。

【处方】大戟(去蘆根，酒洗去骨焙)一兩五錢 山慈姑(姜汁洗去毛皮焙)二兩 五倍子(去虫土碎洗淨) 千金霜(去淨油)各一兩 雄黃(水飛) 麝香 朱砂(飛淨)各三錢

【制法】除朱砂、雄黃、麝香另研，兌其他群藥共為細粉和勻，用黃米麵糊為錠。

【劑量及用法】每服五分，口服二次，溫開水送下。外用醋磨敷患處。

【禁忌】辛辣、葷腥、油膩等物。孕婦及氣虛者忌服。

十五、沈 陽(1)

【功能与主治】解毒消腫。主癰疽瘡瘍，無名腫毒，疔毒惡瘡，跌打損傷，虫咬蛇傷，咽喉腫痛，吐瀉痢疾，時行瘟疫，傷寒熱病，驚風急痢，痘疹痘疾。

【处方】麝香三錢 文蛤一兩 千金子(去油)一兩 毛慈姑(去皮)二兩 紅大戟一兩半 重樓一兩

【制法】共碾極細面，糯米粉調糊為錠，大者重一錢，小者重五分。

【劑量及用法】一切腫毒，以濃醋磨汁，塗患處；內服用白開水送下。每服一大錠，小兒酌用。

【禁忌】孕婦忌服。

十六、沈 陽(2)

【功能与主治】通竅解毒。主食物中毒，虫毒，霧露瘴癘，癰疽發背，对口疔瘡，天蛇毒，無名腫毒，蛇牛紅絲等疔瘡，赤白痢疾，吐瀉，絞腸痧，痰喘，急熱驚風，五疳，脾病黃

腫，癰疹，牙痛，偏正入風。

【处方】麝香三錢 山文蛤二兩 千金霜 重樓 明雄各一兩 朱砂三錢 毛慈姑一兩 紅牙大戟一兩五錢

【制法】共碾極細末，糯米粉煮糊，做成錠。每錠七分，小錠三分五厘重。

【劑量及用法】每服一錠，重病連服二錠，白開水送下。外敷用酒或醋抹塗之。

【禁忌】孕婦忌服。反甘草。

十七、沈陽(3)

(太乙紫金錠)

【功能与主治】一切飲食藥毒，虫毒，霧露瘡癤，癰疽發背，对口疔瘡，天蛇毒，無名腫毒，蛇舌紅絲等疔瘡，陰陽二毒，傷寒瘟疫，發狂喉風，赤白痢疾，吐瀉絞腸及諸痰喘，男婦急中顛邪，暈厥狂亂，各種癰癩等風，縊溺驚壓，但心头溫者，蛇蠍瘋犬咬傷，新久瘡疾，急熱驚風，五疳五病，脾病黃腫，癰疹瘡瘤，牙痛，小兒父母遺毒，皮爛肚爛，跌打損傷，偏正頭風，如入經閉，入行疫氣，傳尸癘瘡。

【处方】同沈陽(2)。

【制法】共碾極細面，糯米粉煮糊入臼同搗千余下而成錠，每錠七分重。

【劑量及用法】每服一錠，重病連服二錠，取通利后以溫粥補之。外用可用開白水或酒磨塗瘡毒。

十八、撫順

【功能与主治】清涼解毒。主斑疹傷寒麻疹，壯熱煩渴，神昏譫語，疹毒潛伏，毒瀉毒痢，吐瀉交作，小兒急癰，項強抽搐，疔毒惡瘡，毒火內攻，乍寒乍熱，攪亂神昏以及咽喉腫痛，嚥下困難。腫毒外敷甚效。

【处方】千金霜 文蛤 大戟 毛慈姑各五兩六 重樓四兩 朱砂一兩二錢半 麝香一錢半 雄黃一兩一錢半

【制法】共為細面，江米為錠七分重。

【劑量及用法】每服一錠，姜汁、薄荷湯送下。外用醋調敷患處。

【禁忌】孕婦忌服。忌辛辣等物。

【備考】一方麝香用一錢，每錠八分重。

十九、吉林(太乙紫金錠)

【功能与主治】內服可以解毒。外敷可消腫瘍。並能清瘟熱，利關節，治白痢。

(一) 一切飲食藥毒、虫毒、瘡氣、齒毒、河豚毒及白死六畜肉毒，以致昏亂不醒或生異形病症者，用清水磨服。服后或吐或瀉，毒去必愈。南方山嵐瘴氣、烟霧瘴疫，最能傷人。偶有感冒，精神不快，惡寒壯熱，欲嘔不嘔者，即用水磨一錠服之，得吐瀉便瘳。傳尸癘瘡，諸藥不能取效者，每早清水磨服一錠，至三次后，逐下惡物尸虫，異形怪類，其病自愈。女了久患癘瘡，為尸虫所噬者，用清水磨服一錠，片時吐下小虫十余條再服蘇合丸，其病頓失，調理月余而安。小兒父母遺毒，生下百口內，皮爛爛斑，谷道、眼瞼爛爛者，俱用清水磨塗。

(二) 新久瘡疾發時，東流水煎桃柳枝湯磨服。

(三) 中風中氣，口眼歪斜，牙关緊閉，言語蹇澀，筋脉攣縮，骨節風腫，遍身疼痛，行步艱辛，諸風諸痢，並用酒磨熱服之。牙痛，酒磨塗痛處，並含少許，良久嚥下。癰疽、發背、对口、疔瘡、天蛇、無名腫毒、蛇舌疔、紅絲疔、楊梅瘡、諸風癰疹、新久痔瘡、並用無灰酒磨服。外用水磨，塗瘡上。日夜塗數次，覺痒而消。瘋犬蛇毒，虫傷發腫，攻注偏身，甚者毒氣入里，昏悶呼叫，命在須臾，俱用酒磨灌下，再吃葱湯一碗，蓋被出汗立愈。打扑損傷，用松節、無灰酒研服。

(四) 赤白痢疾，肚腹泄瀉，急痛霍亂，絞腸痧及諸痰喘，並用姜湯磨服。

(五) 自縊、溺死、驚死、壓死等一時昏絕者。但心头微溫未冷者，俱用生薑、續斷煎酒磨服。

(六) 陰陽二毒，傷寒心悶，狂言亂語，胸膈滯塞，邪毒未出，瘟疫煩亂發狂，桃花疔，喉閉喉風喉蛾喉疔，俱用薄荷湯待冷磨服。小兒急慢驚風(此藥寒熱得宜)、五疳、五痢、脾病、黃腫、癰疹瘡瘤、牙关緊急，並用薄荷浸水研濃，加蜜服之。

(七) 年久頭脹、頭痛、太陽痛、偏

頭風痛、及諸瘡愈后，毒氣攻注，腦門作脹者，俱用葱、酒磨研服一錠，再磨塗兩太陽穴上。

(八) 急中顛邪，喝叫奔走，失心狂亂，羊癰猪顛等風，俱用白芷蒲煎湯磨服。

(九) 流行時疫，病菌傳染，用桃根湯磨濃，滴入鼻孔，再服少許，任入病家，絕不傳染。

(十) 婦人經水不通，紅花湯下。

【处方】山慈姑(姜汁先洗去毛皮焙干) 五倍子(去土虫洗淨) 千金子(用白仁者去壳去油) 各二兩 朱砂(水飛) 五錢 雄黃(鮮紅大塊者水飛) 一兩 麝香一錢 紅牙大戟(去蘆根，酒煮去骨，焙。) 一兩五錢

【制法】各研為細粉，秤入于大乳鉢內再研數百轉，加入細石口中，漸加糯米濃粥調和，杵千余下至極光潤為度，每錠潮重七分。用油紙包裹，外用玻璃紙封固，用瓷坛貯，以免洩氣。

【劑量及用法】每服一錠或半錠，重症二錠。姜汁薄荷湯或開水磨服。(參閱主治各條)外敷法，除醋或茶湯磨敷腫痛處。后再抹醋、茶。(參閱主治條)

【禁忌】忌食發物。孕婦禁服。

二十、哈爾濱(太乙紫金錠)

【功能与主治】解諸毒，疔瘡腫，清瘟熱，利關節，治白痢。內服可解諸毒，外敷可消腫瘍。

【处方】同保定，制法、劑量及用法、禁忌亦同。

二十一、承德

【功能与主治】中暑吐瀉，腹痛脹滿，痰厥不醒，咽腫牙痛，癰疽腫毒。

【处方】山慈姑(姜汁洗去毛皮焙) 二兩 五倍子(去虫土，碎，洗淨) 千金子(去壳油) 各一兩 朱砂(飛淨) 麝香各三錢 紅牙大戟(去蘆根，酒煮，去骨焙) 一兩五錢 雄黃(水飛) 三錢

【制法】除朱砂、雄黃、麝香另研外，余藥共為細粉和勻，用米麵糊為錠。

【劑量及用法】每服五分，日服二次，溫開水送下。外用醋研敷患處。

【禁忌】孕婦及虛弱者忌服。

二十二、呼和浩特 (太乙紫金錠)

【处方】大戟一兩五錢 茅慈姑二兩 硃砂一錢 文蛤一兩 千金子霜二兩 雄黃三錢 草河車二兩 麝香 冰片(血竭對色用)

【制法】共為細面，江米八兩，煮餅為錠，務搗千捶為要。

鹽 水 錠

一、沈 陽

【功能与主治】解毒止痛消腫。主治一切腫毒疥癬，蛇蠍毒虫咬傷腫痛，暴發火眼，贅肉攀睛，眼臉赤爛，口舌生瘡，乳蛾喉痹，咽痛牙痛。

【处方】馬牙硝一斤 皂硃木 黃丹各一兩 朱砂七錢 雄黃一錢

【制法】先將馬牙硝入鉄鍋內，烈火燒化成水。依次下皂硃木、黃丹等藥，共攪極勻，傾倒光滑平石上面，待凝硬收用。

【劑量及用法】用治瘡腫虫咬時，醋磨或水磨令化，敷抹患處。用治口瘡咽痛牙痛時，置口內或放痛處溶化。用治眼疾時，研面以骨簪

上藥。

二、撫 順

【处方】皂硃一兩 火硝八兩 黃丹一兩 雄黃五分 朱砂五分。

【制法】先將火硝、皂硃溶化，入黃丹、雄黃、朱砂，傾鑄為錠。

八宝金藥墨

福 州

【功能与主治】一治時氣熱眼，用水磨搽。

一治腸風下血，用薄荷湯磨服。

一治湯火傷，用水磨搽。

一治小兒口舌生瘡，用薄荷磨服。

一治腫毒初起，用天南星磨搽。

一治腫毒潰后不能收口，先煎甘草水洗過，用水磨搽。

一治牙痛，剪少許啣在患處。

一治双單蛾，用荊芥湯磨服。

一治刀斧傷，用水磨搽。如傷口闊大，將墨搗細敷。

一治咽喉腫痛，用水磨服。

一治熱傷風，鼻塞氣緊者，剪少許啣在口內。

一治口渴心熱，用灯心湯磨服。

一治吐紅不止，用水磨並童便和

服。

【处方】胡連 川連各二錢 梅片三錢 麝香 珍珠各二分 牛黃五分 殭蠶一錢 青黛七分 草霜一錢 礞石二錢 大黃一錢 熊胆五分 灯心灰五分 五倍子 山慈姑 甘草各三錢 元明粉一錢 硼砂二錢 琥珀一錢半 薄荷叶二錢 荊芥一錢

【制法】共研細末，每料加茶油烟二兩，合藥粉配膠其煉成墨錠，金衣。

局方百藥煎

福 州

【功能与主治】清肺化痰定嗽，解熱生津，止渴收濕，消酒，烏鬚髮。治齒宣風熱牙痛(泡湯噙漱)，久痢脫肛，大腸氣痔(為末稀粥調服)，小兒面鼻疳蝕，口糜瘡，乳結(研末酒煎服)，風濕諸瘡。

【处方与制法】用五倍子研為細末，每一斤用真茶葉一兩煎濃汁，入醇糟四兩，搗爛拌和，器盛置糠缸中窖之，待發起如發麵狀，即捏作餅丸，晒干用。

索引

[本索引是先按笔画,后按起笔(丶一丨ㄣノㄥ)的次序排列的,並采用了已正式公布使用的四批简化字。为了便于查閱,無論繁簡体字,“及”、“卩”統作三画,“卅”、“乚”、“木”統作四画,“朮”作五画。]

檢 字 表

一 画

一

二 画

二 十 丁 七 刀 八 人 九 儿

三 画

三 千 万 下 寸 大 己 巳 子 丑 飞 小 上 山
千 久 川 女

四 画

六 文 心 火 王 专 天 开 无 五 木 牙 太 不
双 巴 孔 止 日 中 内 水 分 午 牛 王 长
升 丹 月 风 风 仁 化

五 画

头 宁 立 玄 半 归 必 平 天 玉 打 正 巨 甘
古 左 石 右 龙 东 圣 加 目 甲 叶 叭 史
四 牛 失 戌 外 代 们 片 白 卯 瓜 台

六 画

江 安 广 决 伏 冲 冰 羊 夹 地 老 艾 再 西
耳 托 朴 夺 百 存 至 欢 导 边 光 当 吊
吃 虫 回 肉 杀 全 合 先 竹 孕 伐 伏 仲
伤 华 自 血 舟 行 妇 如

七 画

沉 沉 沈 沒 宋 快 辛 疔 疔 冻 状 冷 良 启
补 兌 来 寿 迂 麦 赤 芋 芎 芎 均 坎 护
扶 抑 豆 更 兩 劳 克 杜 杞 杏 医 达 辰
灵 局 防 阳 忽 吹 吳 呂 时 助 貝 男 坐
谷 牡 利 秃 肝 肚 肘 龟 佛 廷 皂 妙

八 画

泻 法 河 泄 治 宝 定 疳 疳 夜 育 羌 並 单
奉 攻 青 武 芦 芙 苏 花 坤 拔 抱 臥 枣
直 枕 林 批 松 奇 还 硇 陀 陆 阿 附 虎
齿 明 易 固 采 乳 金 制 知 和 备 肥 周
无 使 狗 所 参

九 画

济 洋 洗 活 宜 穿 疮 疥 軍 扁 秘 祛 神 美
烂 珍 玳 指 封 范 苦 茄 英 赵 故 胡 枯
枳 柏 伞 砂 硯 建 咬 咳 咽 胃 食 威 重
复 种 香 肺 胆 胜 胎 急 信 便 侯 保 禹
弘 衍 紅 蚌

十 画

流 消 海 家 宫 高 疳 离 养 益 泰 珠 蚕 盐
帝 热 卓 茵 茵 茶 菜 茯 荆 起 郝 眞 桂
桃 原 夏 破 桑 退 除 党 虔 柴 哮 蚊 豹
选 退 焉 脏 胭 臭 射 純

十一 画

凉 清 淋 混 淨 梁 密 惊 惜 痔 麻 鹿 羚 断
雪 理 救 培 堆 都 控 接 探 荷 连 速 乾
梅 梔 殊 硝 通 屠 陳 道 眼 敗 異 累 崩
崔 第 梨 脚 魚 健 既 猪 得

十二 画

湧 溫 湿 寒 割 痧 痞 痢 普 琼 斑 琥 越
苦 卒 萊 菊 单 提 換 搜 腎 黃 散 硫 雄
强 犀 疏 隱 紫 黑 喉 景 蛔 蛤 跌 貼 筋
舒 秘 透 脾 順 猴 結 絳

十三 画

溯 滋 新 誠 資 福 雷 瑞 塘 葛 蔞 葯 椿 楊
榆 碑 預 鷄 隔 齡 暖 鉄 愈 咸 腸 解 催
經

十四 画

滴 滾 滌 蜜 慢 瘋 精 駙 碧 葵 蒼 慈 嘉 截
聚 槐 輕 豨 蜡 銀 毓 熊 綠

十五 画

潤 寬 諸 調 熟 摩 糊 震 駐 增 撥 薏 蔞 棒
磁 黎 膝 綿 緩

十六 画

燙 磨 療 燒 霍 靜 蕩 蕤 醒 橄 橘 顚 嚙 暹
螃 錫 鷗

十七 画

賽 謝 癰 瘡 霜 霞 擦 薄 蕙 薯 薛 韓 避 嬰
簾 鮮 黛 縮

十八 画

槓 嶸 鎖 鎖 鵲 臍 鯽

十九 画

藤 霸 礪 蟾 踴 獺

二十 画

藿 藿

二十一 画

麝 驅 纏 續

二十二 画

麝 麝 麝

二十三 画

調 驗 疊

二十四 画

癩 鼈 驚

二十五 画

獾

二十七 画

鷓

索	引	分	类
		一	画
一二三层茴香丸	272	十味补膏	67
一气膏	562	十味香附丸	440
一字金	508	十珍香附丸	440
一扫光	400	十珍散	65
一扫光瘡药	401	十香丸	264
一扫光散	396	十香止痛丸	263—264
一塊气	282	十香丹	126
一塊气丸	282	十香返生丹	126
一把抓	283	十香返魂丹	126—127
一金散	505	十香煖膈膏	320—321
一苓散	178	丁香核桃丸	249
一厘丹	515	丁沉透隔丸	249
一笔消	393—394	丁香爛飯丸	249
一笔钩	394	丁香散	505
一粒金丹	386	丁香破气丸	267
一粒珠	393	丁香破气化积丸	267
一捻金	507—508	丁蔻理中丸	304
一捻金散	508	七宝丹	162
		七宝美髯丸	73
		七宝美髯丹	73—74
		七宝益寿丹	75
		七宝散	556
		七味地黄丸	52
		七味都气丸	56
		七制香附丸	439—440
		七珍丸	476
		七珍丹	492—493
		七香餅	282
		七厘散	406—408
		七液丹	187
		刀伤药	414
		八了丸	533
		八止丸	333
		八止散	333—334
		八仙牛郎散	508
		八仙庆寿酒	128
		八仙长寿丸	55—56
		八仙酒	128
		八宝止血药墨	329
		八宝丹	386 493
		八宝生肌散	357 358
		八宝光明散	534
		八宝吹喉散	555
		八宝治红丹	328—329
		八宝坤顺丹	446—447
		八宝撥云散	536
		八宝明目散	541
		八宝明目錠	540
		八宝金药墨	567
		八宝珍珠散	357 554
		八宝紅灵丹	191—192
		八宝退云散	536—537
		八宝退云錠	536
		八宝推云散	537
		八宝礞砂眼药粉	536
		八宝眼药	540—541
		八宝提毒散	392
		八宝瑞生丹	278
		八宝磨云散	536
		八味丸	19
		八味丹	76
		八味地黄丸	18—19
		八味肾气丸	19
		八珍丸	30
		八珍益母丸	426—428
		八珍膏	508—509
		八厘散	319—408
		人中白散	557
		人参一捻金	508
		人参女金丹	450—451
		人参牛黄至宝丹	157
		人参玉液金丹	456
		人参归脾丸	31 33
		人参回生丹	464
		人参回生至宝丹	468
		人参回生再造丸	98
		人参再造丸	97 101
		人参坤顺丹	446
		人参固本丸	38
		人参益母丸	427—428
		人参养荣丸	26 28
		人参养荣汤	28
		人参鹿茸丸	14 15 50
		人参啓脾丸	504
		人参理中丸	301—302
		人参敗毒散	149—150
		人参健脾丸	297—298
		人参琥珀丸	37
		人参龜甲煎丸	145
		人馬云安散	186
		人馬平安行軍散	186
		人馬平安散	185—186
		九一丹	383
		九分散	406
		九气心痛丸	266
		九气拈痛丸	266—267
		九龙丹	389—390
		九龙活命丹	559
		九聖散	396—397
		九宝丹	501
		九味羌活丸	136
		九制大黄丸	210
		九制香附丸	439
		九制清心丸	209
		九制稀莖丸	90
		九轉黃精丹	73
		二	画
二十四制清宁丸	208—209	二	画
二分丸	347	二	画
二龙膏	277	二	画
二冬膏	236—237	二	画
二母丸	226	二	画
二母宁嗽丸	225—226	二	画
二母安嗽丸	225	二	画
二至丸	58	二	画
二妙丸	165	二	画
二妙散	178	二	画
二味左金丸	260	二	画
二味拔毒散	396	二	画
二味枳朮丸	287	二	画
二味香連丸	309	二	画
二姜丸	292	二	画
二益丹	455	二	画
二陈丸	228—229	二	画
十二溫經丸	422	二	画
十五制清宁丸	208—209	二	画
十仙丹	390	二	画
十灰丸	235	二	画
十灰散	327—328	二	画
十全大补丸	21—23	二	画
十全大补湯	21 23	二	画
十全大补膏	67	二	画
十寶丸	330	二	画
十寶湯	330	二	画
十味补丸	21	二	画

九轉慈航丹	453	下疳散
九女福	498	下癰錠
九科嗽靈丹	501	寸白虫散
		寸金丹
三		大力丸
一腎氣丸	50	大山楂丸
三才丸	57	大風子油
三才封髓丸	79	大補丸
三才封髓丹	78—79	人補元煎丸
三才伐木丸	304	人補全鹿丸
三仙丹	386	大和陰丸
三光眼藥膏	539	大靈砂丹
三因控涎丹	335	大金丹
三妙丸	166	八金花丸
三妙散	396	大活絡丹
三妙膏	361—362	大香連丸
三花五子丸	533	大補肺散
三花神祐丸	330	大麻風丸
三物急急丸	293	人粒蜜香丸
三和散	273	大敗毒膏
三蛇胆陳皮散	110	大造丸
三腎丸	49—50	大健脾丸
三黃丸	201	人溫中丸
三黃寶脂丸	402—403	大慈絲子丸
三黃散	353	人黃丸
干疥刺痒擦抹方	398	大黃墜虫丸
干眼藥	541	大調經丸
萬氏牛黃丸	102	人顆益母丸
萬氏牛黃清心丸	101—102	已椒蘆黃丸
萬應山楂丸	258	已風丹
萬應丸	362—363	子午丸
萬應太乙膏	411	子龍丸
萬應內傷膏	411	衛生丹
萬應頭風膏	152	衛生散
萬應平安散	186	衛生寶
萬應靈膏	411	衛生寶丹
萬應時症丸	175	衛生潤腸丸
萬應寶珍膏	410	飛龍奪命丹
萬應神麴	163	小兒一捻金
萬應神麴糕	164	小兒七珍丹
萬應保赤散	483	小兒力病回春丹
萬應紅毛膏	411	小兒千金散
萬應消核膏	376	小兒久嗽丸
萬應喉症散	555	小兒五疳丸
萬應錠	198	小兒太極丸
萬壽香面	165	小兒止咳丸
萬靈丹	382	小兒止嗽金丹
萬靈油	398	小兒牛黃散
萬金散	318	小兒化毒丹
萬病回春丹	490	小兒化毒錠
萬病解毒丹	565	小兒化食丹
下乳涌泉散	467	小兒化積丸
下乳涌泉膏	467	小兒化滯散

画

360—361	小兒化痰丸	503
471	小兒寧嗽丸	499
515	小兒四六風丸	483
187 188	小兒四症丸	472
404	小兒百壽丹	496
258 259	小兒百效散	483
399	小兒至寶丹	506
23 41	小兒至寶錠	507
41	小兒導赤散	473
13	小兒回春丸	489
41	小兒回春丹	489—491
153	小兒回春散	483
126	小兒定風珠	498
205	小兒定搐化風錠	498
118—122	小兒羌活丸	472
309	小兒明目丸	523
234	小兒肥皂餅	498
343—344	小兒金丹	488
167	小兒咽喉靈丹	497
371	小兒香橘丹	507
46	小兒急驚粉	498
297	小兒消熱散	505
305	小兒疳積散	514
45	小兒清肺散	509
90	小兒清涼散	473
434—435	小兒驚風丸	476
430	小兒驚風散	486—487
425	小兒降脾散	503
233	小兒健脾丸	502
497	小兒痧疹金丹	474
33	小兒痢疾散	505
335	小兒紫霜丸	509
380	小兒調中丸	474
148	小兒臍風散	486
380	小兒鎮咳散	500
380—381	小安腎丸	44
314	小靈丹	559
379—380	小抱龍丸	479
507	小金丸	344
492—493	小金丹	387—389
490—491	小活絡丹	122—123
504	小粒金丹	389
498	小珠砂丸	105
511	小陷胸丸	233
475	小健脾丸	297
498	小溫中丸	305
501	上清丸	203
517	山楂丸	258—259
519	山楂內消丸	258
519—520	山楂化滯丸	307
506	千里追風丸	344
509	千金止帶丸	441
505	千金止帶散	443

索	引								
千金内消散	354	天一丸	504	五疳肥兒丸	509				
千金白朮散	317	天王补心丹	70—73	五疳消食丸	511				
千金吉祥丸	417	天中茶	164	五疳消积丸	511				
千金保孕丸	459—460	天水六一散	180	五疳散	513				
千金保孕丹	462	天水散	180	五积丸	139				
千金保胎膏	462	天麦二冬膏	237	五积散	146				
千金散	484—485	天眞丹	69	五倍子散	395				
千槌膏	364	天麻丸	86—87	五淋白濁丸	333				
千槌綠云膏	366	天麻琥珀丸	88	五淋白濁散	334				
千槌膏	376	天麻散	110	五粒万病回春丹	491				
久瀉丸	300	开关散	110	五粒回春丹	489—490				
久制香附丸	439	开元复明丸	523	五福化毒丸	518				
久痢丹	323	开明丸	523	五福化毒丹	518—519				
川芎茶調丸	135—136	开郁老菴丸	251—252	五腰丸	47				
川芎茶調散	147 148	开郁順气丸	252	五瘟丹	153				
女金丸	449	开胃健脾丸	299	五瘟丹	280				
女金丹	449	升膏散	461	五瘟至宝丹	457				
女科八珍丸	416	开胸利气丸	247	五瘟再生丸	107				
女科烏賊丸	424	开胸順气丸	245 246	五瘟丸	543				
女科烏雞白鳳丸	420	开降去翳散	537—538	木瓜麵	282				
女科金丹	450 452	无比山藥丸	17	木耳丸	92				
女經膏	444	无極丹	197	木耳散	109				
		五子丸	46—47	木香丸	244				
		五子补腎丸	47	木香分气丸	254 255				
		五子衍宗丸	46	木香金鈴丸	273				
		五仁丸	314	木香順气丸	243—245				
		五仁潤腸丸	314	木香調气散	273				
		五加皮药酒	128 129	木香檳榔丸	245 253—254				
		五色兌金丸	512	牙疳散	557				
		五色兌金丹	512	牙疼药	561				
		五色灵药	392	牙疼药水	561				
		五色淋濁丸	333	牙痛一粒丹	559				
		五行散	355	牙痛一粒笑	561				
		五麦八味丸	55	牙痛失笑散	558				
		五更太平丸	224	牙痛散	558				
		五宝丹	455	牙痛药	561				
		五毒膏	368	太乙万应膏	363				
		五花丸	270	太乙無名丸	248				
		五虎丹	412	太乙王樞丹	564				
		五虎搜毒丸	351	太乙来复丹	322				
		五味異功散	504	太乙紫金片	565				
		五味檳榔丸	247—248	太乙紫金錠	564—567				
		五苓丸	174	太乙膏	363 364				
		五苓散	174—178—179	太平丸	142 224—225				
		五香丸	257 258	太平养肺丸	224				
		五香万应丸	257—258	太平散	355				
		五香粉	282	太阳膏	152				
		五香散	274	太極丸	475 476				
		五香飯灰	282	太極升降丸	475				
		五消散	513	太倉丸	292				
		五海丸	346	不換金正气散	182				
		五海癭瘤丸	346	双了拐	134				
		五疳丸	511	双补丸	20				
六一散	180								
六分散	274								
六石風引散	109								
六合丸	171								
六合定中丸	170—171								
六合散	65								
六君子丸	285								
六君子湯	285								
六味丸	52								
六味地黃丸	50—52								
六味至宝丹	156								
六味通解散	147								
六和丸	171								
六和茶	200								
六神丸	546—547								
六神麴	324								
六郁丸	263								
六积丸	257								
六聚爛积丸	256—257								
文武膏	68								
文蛤散	395 356								
心胃止痛丸	295								
火燙药	414								
王氏三黃丸	351								
王氏痔漏丸	350—351								
王府舒肝丸	264—265								
专治瘡疾方	165								
专治痔漏	393								
专治瘰癧药麵	393								

双解丸	138	水蓬膏	277	风痛丸	92
双解香苏丸	138	分水丹	189	风损膏药	414
双解通圣丸	138	分清五淋丸	332—333	仁丹	197
孔子大圣知枕中方	70	分清止淋丸	332	化风丹	496
孔圣枕中丸	69	午时茶	164—165	化虫丸	269—270
孔圣枕中丹	69	牛黄十全散	473	化虫散	275
止血十灰散	327	牛黄八宝丹	493—494	化毒丸	517
止血丸	326	牛黄八宝散	486	化食三消丸	255
止血丹	329	牛黄卫生丹	155	化食丹	321
止血化瘀丹	329	牛黄上清丸	204	化核膏	375
止血四红丹	328	牛黄千金散	484	化针丹	539
止血秘红丹	329	牛黄丸	477	化积丸	268
止血痢疾丸	308	牛黄安宫丸	143—144	化积散	274 513
止血散	328	牛黄安宫散	151	化坚膏	375
止泻分清散	505	牛黄至宝丹	156—158	化痞丸	268
止泻四神丸	291	牛黄抱龙丸	479—481	化痞散	274—275
止泻胃苓丸	301	牛黄抱龙散	480	化痞膏	276
止泻温中散	318	牛黄清心丸	101 105	化滞丸	251
止泻散	505	牛黄清金散	501	化痰丸	230—231
止带丸	441	牛黄清胃丸	206	化痰金丹	241
止咳丸	227	牛黄清肺散	234 500—501	化腐生肌散	358
止咳化痰丸	227	牛黄清宫丸	144	化腐锭子	392
止咳定喘丸	227	牛黄清宫丹	154—155	化腐锭	471
止咳雪梨膏	239	牛黄清瘟丹	155	化腐膏	277
止红肠癖丸	327	牛黄惊风散	487	化腐回生丹	457
止淋散	334	牛黄救惊散	487	化腐回春丹	457
止痛二姜丸	292	牛黄琥珀抱龙丸	480		
止痛良附丸	263	牛黄紫金丹	495		
止痛膏	152	牛黄解毒丸	210 211		
止痢丸	308	牛黄解瘟丹	155	头风散	148
止痢香连丸	310	牛黄醒消丸	342	头风膏	152
止痢急救丹	323	牛黄噤化丸	550	头痛太阳膏	152
止痢散	319	牛黄镇安散	484	宁志丸	37
止嗽太和丸	499	牛黄镇惊丸	476—478	宁坤丸	425
止嗽化痰丸	226—227	牛黄镇惊锭	477	宁坤丹	447
止嗽百花丸	221	王子丸	47	宁坤至宝丹	447
止嗽定喘丸	227	王水金丹	563—564	宁坤锭	457
止嗽青果丸	220	长寿丹	69	宁神丸	37
止嗽金丹	241	长春丹	187 196	宁神丹	70
止嗽保金丹	241	长春百补丸	41	宁神定志丸	37
止嗽清宣丹	501	升降败毒丸	562	宁嗽丸	224
止嗽散	234—235	升降散	150—151	宁嗽化痰丸	225
日月光明散	537	丹梔逍遥丸	436	宁嗽太平丸	224
中白散	556—557	丹溪二妙散	178	宁嗽膏	501
中满分消丸	255	丹溪大补阴丸	41	立上头痛散	148
内伤膏	411	丹溪保和丸	306—307	立止牙疼药	561
内伤膏药	411	丹溪越鞠丸	262	立止牙痛散	558
内补养荣丸	417	月白珍珠散	357	立止咳嗽丸	227
内府跌打回生第一仙丹	413	月事丸	424	立安丸	59
内消丸	258	凤凰丸	332	立效丸	221
内消瘰癧丸	345—346	风火眼痛散	534	立马回疔丹	387
水陆二仙丹	78	风湿止痛丹	381	玄霜紫雪膏	238
水陆二味丸	78	风寒麻木膏	116	玄霜膏	238

索	引				
半貝丸	228	古菴心腎丸	45	史國公藥酒丸	93
半夏天麻丸	87—88	左歸丸	43—44	四正丸	175
半夏糊	242 324	左金丸	260—261	四聖散	396
半硫丸	315—316	左金丹	261	四生丸	326
歸芍六君丸	286	石灰大黃散	410	四白天癰散	397
歸芍六味丸	53	石斛夜光丸	528—530	四君子丸	284—285
歸芍地黃丸	53	右歸丸	19—20	四君子湯	284
歸芍理中丸	325	龍虎丸	30—31 106—107	四妙丸	166
歸參丸	333	龍虎化毒丹	387	四虎散	358
歸腎丸	44	龍虎散	65	四制香附丸	437—438
歸脾丸	31—33	龍胆瀉肝丸	212—213	四制益母丸	426
歸脾養心丸	32	龍骨續斷丸	40	四制陳實丸	266
必效散	234 397	龍腦破毒散	555	四物丸	416
平安丸	248 249	龍腦黃連丸	538	四物香附丸	438
平安散	186	東垣平胃散	317	四物益母丸	416
平肝舒絡丹	278	東垣疎少安神丸	35	四物益母膏	445
平肝順氣丸	265	聖靈解毒丸	351	四神丸	290—292
平胃散	283 317	聖濟大活絡丹	120	四苓丸	178
平燥消積散	486	聖濟活絡丹	119	四苓散	178
火疥膏	398	加皮露	129	四紅丹	328
玉竹膏	238	加味二陳丸	292	四消丸	259—260
玉屏風散	65	加味太乙膏	363	四症丸	175
玉泉散	180 557	加味玉露散	182	四逆散	150
玉紅膏	366—367 370	加味左金丸	261	四烏賊一蠶茹二妙丸	424
玉谷散	397	加味四九丸	88	四順丸	174
玉壺水	543	加味白朮丸	221	生化膏	467
玉真散	409—410	加味薑薤丸	512	生肌八寶丹	386
玉液金丹	455—456	加味肥兒丸	510	生肌玉紅丹	386
玉雪丹	156	加味枳朮丸	288	生肌玉紅膏	366—367
玉鑰匙	560	加味香連丸	309—310	生肌定痛散	358
玉容粉	397	加味信梨丸	559	生肌珍珠散	356
玉樞丹	564	加味保和丸	306—307	生肌散	357 358
玉鎖匙	560	加味麻仁丸	313	生肌膏	371
玉露養肺丸	217	加味犀角丸	211	生津丸	205
玉露散	318	加味逍遙丸	436—437	失笑丸	290
打老兒丸	39	加味提毒散	355	失笑散	466
打傷八味散	408	加味腎氣丸	59—60	戊己丸	307
正一丹	322	加料萬應膏	411	外用紅靈藥	392
正元丹	68 69	加料女金丹	451	外科六神丸	546
正氣丸	167—168	加料太極丸	476	外科西黃丸	342
正骨紫金丸	404	加料正胃丹	474	外科腦砂膏	365
正骨紫金丹	404	加料啓脾丸	504	外科黃連膏	398
百勝丸	48	加料祛暑丸	174	外科蟾酥丸	339
甘仁散	395—396	加料寧神丸	209	外科蟾酥錠	390
甘露消毒丸	171	加料琥珀明目丸	523	代天宣化丸	141
甘露消毒丹	186	加料荷葉丸	326	代抵當丸	142
甘露茶	323	加料健脾丸	298	代參膏	66
甘露散	182 318	加料舒肝丸	265	片連散	544
古方二陳丸	229	甲魚膏	563	白雲平安散	186
古方一腎丸	50	叶天士神丹	161	白鳳丸	419—421
古方手拈丸	171	叶靈神丹	326	白歸脾丸	32
古方清眩丸	136	叭達杏仁粉	243	白平安散	186
古方彌養丸	91	史國公藥酒	128	白玉丸	499

白王化痰丸	106	壮阳三肾丸	49
白王膏	367—368	壮阳丹	74
白王餅	515 516	冲和散	354
白王霜药酒	323	冲和膏	354
白王露	323	冰片散	552
白虎丸	297	冰梅上清丸	547
白虎助胃丹	506	冰梅丸	547
白虎散	316	冰蛇散	395
白虎膏	505	冰珊瑚散	550—551
白龙膏	398	冰霜梅苏丸	172
白花蛇药酒	133	冰霜弄了粉	399
白虎丹	279	冰霜上清丸	547
白虎骨酒	131	冰霜異功散	554
白金丸	106	冰霜痧药丸	176
白帶丸	442	羊胆丸	524—525
白帶散	443	羊胆明目散	535
白降丹	383 384	羊胆瘰癧丸	107—108
白膠	81	灭鼠膏	368 369
白清血散	557 558	地骨皮露	242
白林散	334	地榆丸	349
白魚兒膏	366	地榆散	328
白痧散	185	地榆槐角丸	348 349
白提毒散	355	老奴丸	38—39
白餅	515	老年延寿丹	69
白避瘟散	183	老慈丸	251—252
白鱗魚膏	369—370	老鸛草膏	116
瓜子眼药	542	艾附暖宫丸	432 433
瓜蒌膏	370	再造丸	96 101
瓜蒌胆麦丸	300	再造至宝丹	382—383
台草八香丸	263 264	再造还明丸	523
台麝七厘散	408	再造膏	65—66
		西瓜散	555
		西瓜膏	240
		西瓜霜	560—561
		西黄醒消丸	342
		耳底白龙散	545
		耳底油	546
		耳底散	545
		山疳散	544
		耳疳散	544
		耳聾丸	544 561
		耳聾丸	543—544
		耳聾左磁丸	544
		托毒丸	142
		朴儿化郁丸	252
		夺命丹	370 384
		白口咳新药	502
		百合固金丸	217
		白补丸	41
		百补全鹿丸	13
		百补增力丸	293
		百补增力丹	294
		百补济阴丸	419

六

画

汗斑粉	397	西瓜散	555
汗斑散	397	西瓜膏	240
安中散	317	西瓜霜	560—561
安全片	200	西黄醒消丸	342
安坤贊育丸	423	耳底白龙散	545
安神丸	36	耳底油	546
安神定志丸	37	耳底散	545
安神固精丸	59	山疳散	544
安神鎮惊丸	478—479	耳疳散	544
安胎丸	458—459	耳聾丸	544 561
安宫丸	143—144	耳聾丸	543—544
安宫牛黄丸	142 144	耳聾左磁丸	544
安宫牛黄散	142 151	托毒丸	142
产后丸	464	朴儿化郁丸	252
产后烏金丸	465—466	夺命丹	370 384
产后理血丹	469	白口咳新药	502
产后救生丸	464	百合固金丸	217
产后药	470	白补丸	41
决明子丸	531	百补全鹿丸	13
壮士固金丸	217	百补增力丸	293

百补鹿胎丸	418
百寿丹	496
百宝济坤丹	447—448
百花丸	221
百花定喘丸	221
百花膏	285
百果世膠	242
百消丸	256
百效丸	511
百效膏	563
百益鎮惊丸	478
百順丸	256
百解散	146
存安柚	163
至聖心原丸	141
至聖保元丹	494—495
至聖保嬰丹	495
至宝三肾丸	49—50
至宁丹	156—158
至宝散	486
至宝錠	507
导赤丹	491—492
边臣十八位	415
光明水眼药	541
光明油	543
光明点眼药粉	542
光明眼药	538 541
光明散	534
光明燥眼药	541
当归内补丸	416
当归龙香丸	213—214
当归补血膏	67
当归蘆香丸	214
当归拈痛丸	92
当归养血丸	416
吊筋药	414
吃片虎	394
回天丸	98
回天再造丸	99—101
回春丸	261
回生丹	463—469
回生再造丸	98—99 101
回生救急散	485
回生第一丹	412—413
回生黑錫丹	118
回生丹	387
回生散	387
回阳王龙膏	374
回阳膏	116
回阳救急丹	69
回阳救急酒	200
回阳散	359
回春丸	273

杞菊地黄丸 525 528
 杏苏二陈丸 220
 杏核眼药 543
 医痛丸 107
 医痛無双丸 107
 达原丸 141
 达痰丸 231
 辰砂六一散 181
 辰砂益元散 180
 灵光丹眼药 540
 灵应痧药 177
 灵应愈风丹 124
 灵宝丹 189—190
 灵宝如意丸 190
 灵宝如意丹 189 191
 局方一笔钩 394
 局方八珍丸 30
 局方牛黄清心丸 102—103
 局方半硫丸 315
 局方百药煎 567
 局方至宝丹 156—157
 局方至宝散 156
 局方香连丸 308
 局方伏菟丸 63
 局方紫雪丹 159
 局方黑锡丹 117
 防风通圣丸 136 138
 防风通圣散 148
 防风解热丸 138
 防疫丹 197—198
 阳和丸 343
 阳和解凝膏 362 371 374
 阳和膏 372—374
 忍冬花露 200
 吹耳红棉散 544
 吹耳散 544—545
 吹喉散 555
 吴氏消疳散 573
 吴氏救惊丸 476
 吴茱萸丸 300
 吴萸散 513
 吕祖治发背灵宝膏 370
 时令救急丹 195—196
 时疫丸 174
 时疫清瘟丸 139
 时疫普济丹 154
 时症丸 175
 貝母二冬膏 237
 坐板瘡药 392
 谷神散 274
 牡丹五等散 275
 利气丸 266
 利仁丸 562

利膈丸 528
 秃疮油药 220
 秃疮药 543
 肝胃气痛散 107
 肝胃至宝丹 107
 肚痛丸 141
 肘后癩肝散 231
 龟版胶 181
 龟版散 180
 龟鹿二仙丸 540
 龟鹿二仙胶 177
 龟鹿二胶 124
 龟鹿固本丸 189—190
 龟鹿参杞膏 190
 龟鹿胶 189 191
 龟龄集 394
 龟龄化痞丸 30
 佛手升骨散 102—103
 佛手酒 315
 佛手露 567
 佛手露酒 156—157
 延寿丹 156
 延龄广嗣丸 308
 皂荚丸 63
 妙应丸 159
 妙灵丹 117
 妙济丹 136 138
 妙香丸 148
 妙香琥珀丸 138
 妙香散 197—198
 妙效丹 343

八

画

247 治濁固本丸 333
 400 治帶固下丸 442
 400 治痔藏連丸 347
 317 治濕平胃丸 283
 279 治痢丸 307—308
 267 治痢神效丸 307 308
 65 治痢散 318—319
 80 宝光返瞳丹 540
 396 宝珍膏 411
 81 定心丸 37
 81 82 定中丸 170
 82 定中散 182
 30 定志丸 105—106
 81 定坤丹 448 449
 81 定金丸 223
 82 定痛丸 267
 268 定痛五香散 274
 461 定痛散 130 410
 281 定喘丸 222
 281 定喘止咳丸 222—223
 281 定喘固金丸 222
 76 207 定喘散 235
 17 定搐化風錠 497 498
 233 疳灵丹 162
 336 疳疾丸 144
 502 疳疾五品丸 144—145
 125 疳疾半貝丸 144
 33 疳疾膏 152
 332 疳气丸 271 273
 65 疳气灵丹 281
 515 疳气散 275
 夜光丸 530
 夜明散 535
 育兒丹 515
 育赤散 111
 育嬰丹 474
 育嬰壯脾丹 506
 育嬰至宝丹 506
 319 育嬰金丹 473 474
 300 301 育嬰散 504
 242 育麟保坤丹 448
 497 羌活丸 472
 242 並补兩天丸 30
 243 单料琥珀明目丸 523
 239 奉賢丸 326
 82—83 玫瑰花露 281 282
 45—46 玫瑰露 281
 329 青龙丹 386—387
 300 青州白丸子 83 84
 283 青州白露丸 84
 393 青芝散 556
 545 青果止嗽丸 220
 382 青果膏 558

索	引				
青娥丸	58—59	阿膠散	319	金衣八宝坤順丹	446
青蛤散	395	阿魏丸	268—269	金衣至宝錠	497
青黛冰硼散	551	阿魏化病丸	268	金衣抱龙丸	482
青黛散	556	阿魏化病膏	275—276	金衣祛暑丸	173
青囊斑龙丸	62	附子七味丸	21	金花丸	205
青麟丸	207—208	附子理中丸	302—303	金璫丹	559
武当救世丸	86	附桂八味丸	18	金砂五淋丸	332—333
武侯行軍散	185	附桂理中丸	303—304	金砂散	334
武紅灵丹	194	附桂紫金膏	444 563	金料散	108
芦荟丸	511—512	虎肚丸	295	金剛丸	40
芙蓉散	353	虎骨木瓜丸	88—89	金液仙丹	473
苏子降气丸	220	虎骨木瓜酒	131—132	金釵石斛膏	215—216
苏合丸	94	虎骨酒	129—131	金黃如意散	352
苏合香丸	94—96	虎骨追風酒	130	金黃抱龙丸	480
苏合感应丸	96	虎骨膠	133	金黃散	352—353
苏砂药	177	虎骨药酒	130—131	金鈎鈎积丸	268
苏解丸	147	虎骨膏	114—115	金絲万应膏	112
苏解散	147	虎骨熊油膏	114	金鼠矢	199
花柳九龙丹	390	虎膠丸	39	金精老奴丸	38
花柳敗毒丸	351	虎脛骨酒	130—131	金匱备急丸	293
花柳搜毒丸	351	虎潛丸	84	金匱腎气丸	42—43 64
花柳解毒丸	351	明目上清丸	522	金匱薯蕷丸	25
花蕊石散	328	明目上清膏	522	金匱龜甲煎丸	145—146
坤草膏	445	明目羊肝丸	524 525	金箔鎮心丹	127
坤順丸	424	明目地黄丸	525—526	金銀花露	200
坤順丹	446	明目沒竭散	534	金鎖王关丸	60
坤膏	445	明目还睛丸	533	金鎖正元丹	74—75
拔毒生肌散	358	明目退云散	537	金鎖固精丸	60
拔毒生肌膏	362 371	明目清肝散	535	金鎖匙	560
拔毒散	355	明目黃連膏	538	金蟾丸	512
拔毒膏	370 371	明目散	535	金櫻子煎膏	68
抱龙丸	479—481	明目雁肝丸	525	金櫻子膏	68
抱胆丸	106	明目蒺藜丸	521—522	金櫻膏	68
臥龙丹	193—194	明目熊胆膏	539	制金柑	282
枣信丹	559	明目磁硃丸	531	制香附丸	437
直指香連丸	308	明目蟬花散	535	知柏八味丸	54—55
枕中丸	69	明明化眼药膏	539	知柏地黄丸	53—55
枕中丹	69—70	易老天麻丸	87	和中理脾丸	286
枇杷叶膏	239	固下丸	442	和平丹	196
枇杷叶露	242	固本丸	38	和血通經丸	431
枇杷膏	239—240	固本膏	67—68	和解丸	135
松石猪肚丸	64	固金丸	217	备急丸	175 293
奇風散	109	固腸丸	300—301	肥兒丸	509—510
還元丹	470	固經丸	432	肥兒片	515
还少丸	77	固精丸	60	肥兒膏	509
还少丹	77—78	采芸麵	163	周公百岁酒	79
还睛丸	533	乳香定痛丸	404	周氏回生丹	195
还睛退云散	537	乳痛橘香散	359	周氏应效丹	195
矾郁丸	106	金不换	566	兔腦丸	460—461
陀僧膏	375	金不换神化膏	111	使君子丸	512
陆氏潤字丸	295	金不换膏	111—112	狗皮膏	115—116
阿加陀药	175	金水六君丸	216	所以載丸	460
阿膠	80	金水六君煎	216	参归丸	333

参麦六味丸 56
参苏丸 218
参苏理肺丸 218—219
参芪片 66
参苓平胃散 317
参苓白朮丸 299—300
参苓白朮散 299 316
参茸广嗣鱼鳔丸 16
参茸三肾粉 82
参茸卫生丸 28—30
参茸丸 28
参茸白鳳丸 420
参茸白补丸 28
参茸补血露 458
参茸补肾丸 38
参茸济生坤順丸 424
参茸济坤丹 447
参茸虎骨酒 132
参茸固本丸 37—38
参茸固本还少丹 77
参茸胜金丹 452
参茸理中丸 304
参茸药酒 79
参桂养荣丸 27
参桂鹿茸丸 15—16
参桂理中丸 304

九

画

济仁丹 197
济世丹 197
济生立效丹 196
济生归脾丸 32
济生烏梅丸 327
济生腎气丸 64
济生橘核丸 270
济陰丹 76
济坤丸 424
济坤育麟丸 418
洋参保肺丸 217
洗面玉容散 397
洗眼灵光丹 540
洗眼蚕茧 543
洗眼紫金膏 539
洗眼碧玉丸 534
活血壯筋丹 125
活血膏 411—412
活血潤腸丸 314
活胃散 313
活絡丹 118—123
活絡膏 412
宣化丸 141—142
疮毒化毒散 353
疮科保安丸 343

疮科蝦蟆丸 343
疥瘡药 399
疥瘡膏 398
疥药一扫光 401—402
疥药方 400
疥药膏 400
军中跌打丸 398
局鵠玉壺丸 404
秘制全鹿丸 418
秘制鳳凰丸 174
秘制清宁丸 332
秘制混元丹 209
秘傳千錠膏 364
祛風天麻丸 87
祛風木瓜酒 132
祛毒牛黃丸 547
秘暑丸 173—174
神朮散 317
神仙一塊气 282
神仙万亿丸 295
神仙双了拐 134
神仙冲和丸 136
神仙金不换膏 111
神仙巨胜子丸 48
神仙既济丸 48
神仙换骨丹 125
神仙药酒丸 94
神仙解毒万病丹 564
神立七宝丹 162
神应白消丸 269
神应普济丹 154
神妙奇效丹 322
神祐丸 330
神香苏合丸 95
神效七厘散 407—408
神效万应錠 199—200
神效卫生宝丹 380
神效止血丸 326
神效化痔丸 350
神效四神丸 291
神效冲和丹 153
神效百花膏 235
神效产灵丹 469—470
神效回生散 556
神效回春丹 126
神效补天丹 75
神效青娥丸 59
神效虎肚丸 295
神效金砂散 334
神效济生散 184 185
神效活絡丹 121
神效烂积丸 257
神效胜金丹 452

神效烏金丸 465
神效鹿胎丸 418
神效普济丹 154
神效散 109
神效截瘧散 151
神效瘰癧膏 376
神效橘核丸 271
神效蠟峒丸 405
神效礪头药 400
神授散 410
神犀丸 161
神犀丹 161—162
神麴 324
神麴茶 163
美髯丹 74
烂弦散 535
烂积丸 256—257
珍珠八宝散 357
珍珠丸 512
珍珠丹 356
珍珠定風散 483
珍珠散 356 358
珍珠撥云散 536
玳瑁散 443
指迷茯苓丸 83
封臍暖肚膏 321
范志麵 163
苦参丸 394
苦参扫疥丸 394
茄症丸 470
英明普救丸 248
英神普救丸 248
英雄大力丸 404
赵氏金丹 450
故紙四神丸 291
胡蘆巴丸 272 273
胡尚書壯阳丹 76
胡麻散 274 395
胡椒灵脂散 274
胡椒散 274
枯痔散 339
枳朮丸 287—288
枳实导滞丸 254
枳实消痞丸 290
柏子仁丸 48
柏子养心丸 34 35
柏子养心丹 34 35
柏叶散 353
牵正丸 93
牵正散 109
牵正膏 116
砂鍋丸 441
观音救苦丹 188

索	引								
观音救苦普济丹	470	保元丸	47	红花活血膏	114				
观音救苦膏	364	保元丹	495 506	红升丹	384—385				九
观音救急丹	196	保目全睛丸	534	红茅药酒	281				画
观音普济丹	470	保幼化风丹	488—489	红提毒散	355				
建神轴	163	保幼再生丹	488	红棉散	544—545				十
建轴	163	保幼培元丹	488	红痢疾丸	308				画
咬头膏	365	保安万灵丹	381—382	红鸡膏	411				
咳嗽散	234	保安丸	381	红膏药	377				
咽喉丹	559	保安镇惊丸	479	红避瘟散	182 183				
胃苓丸	174	保产无忧丸	459	娃娃安宁散	513				
胃苓散	178	保产无忧散	459—461						
胃病丹	321	保产安胎丸	459						
胃痛丹	322	保光清凉散	535						
胃溃瘍粉	325	保孕丸	459	流气丸	246				
食积万应散	512	保孕丹	462	流气导滞丸	246				
威喜丸	63	保孕安胎丸	459	消风丸	86				
重料木瓜酒	132	保赤万应散	483—484	消风百解发汗散	146				
复明散	539	保赤丹	488 505—506	消风养血丸	523				
复甦散	146	保赤散	483	消补丸	502				
种王丸	417	保身丸	31	消炎解毒丸	141				
种育丸	417	保育回生丸	432	消腫化毒丹	383				
香苏正胃丹	474	保坤丹	448	消食万应麴	324				
香附丸	437 440	保金丸	223	消食化积丹	280—281				
香砂六君子丸	285	保和丸	306—307	消食化痰丸	230				
香砂六君丸	285—286	保肺丸	220	消食苏风丸	138 139				
香砂平胃丸	284	保胎丸	459	消食保和丸	305				
香砂平胃散	317	保胎无忧丸	459	消食饭灰	282				
香砂正胃丹	323	保胎无忧散	461	消食顺气丸	246				
香砂助胃丸	290	保胎金丹	463	消痞扶脾散	504				
香砂胃苓丸	301	保胎膏	461—462	消痞蘆薈丸	515				
香砂养胃丸	289—290	保真广嗣丸	16	消痞肥兒丸	509				
香砂枳朮丸	288	保童丸	512	消痞散	513				
香砂理中丸	304	保嬰丹	496	消核丹	389				
香連丸	308—309	保嬰夺命丹	488	消核散	359				
香連化滞丸	310	保嬰育生丸	474	消核膏	375				
香連散	309	保嬰散	483	消积万灵丹	515				
香橘丹	507	保嬰鎮惊丸	479	消积丹	280				
香薷丸	169	保嬰鎮惊散	483	消积皂矾丸	511				
肺宁药片	243	保睡丸	528	消积保中丸	268				
肺癰再补散	235	禹余粮丸	330	消痔千金散	359				
胜利丹	196	独角膏	365	消痔丹	389				
胜金丹	452—453	独角莲膏	364—365	消滯止痛丸	266				
胜金散	410	独角莲膏药	364	消寒上痛丹	279				
胎产金丹	462—464	独活寄生丸	93—94	消痞五疳丸	511				
急救丸	174—175	独活寄生丹	94	消痞化积丸	255				
急救丹	188	衍庆丸	17	消痞阿魏丸	268				
急救回生丹	196	紅毛拔毒膏	362	消痞肥兒丸	510				
急慢惊風丸	482	紅毛紫金膏	376	消痞狗皮膏	276—277				
信囊丹	559	紅玉丹	367	消痞膏	276				
便产神方	461	紅白痢疾丸	308	消脹止痛丸	295				
便血紅痢膏	321	紅伤黑药	411	消脹寬膨散	274				
侯氏黑散	109—110	紅灵丹	191	消癰丸	344—345				
保兒安丸	475	紅花当归丸	431	消癰七海丸	346				
				消癰五海丸	346				

消癭丹	389	蚕豆花露	329	虔制犀黄丸	343
消癭顺气丸	347	盐水錠	567	柴芍六君丸	286
海龙丸	344	壺公丹	383	柴芍六味丸	56
海金沙散	334	热熨針	134	哮喘丸	233
海狗健腎丸	45	草还丹	75	哮喘金丹	241
海參丸	45	茵陈五苓丸	304	豹骨木瓜丸	92
海馬下腎丸	50	茵陈五疸丸	304	选料大灵砂丹	153
海馬追風膏	113—114	茴香丸	17	追風丸	92—93
海藻丸	345	茴香疝气丸	271	追風丹	124
家傳产胎金丹	463	茴香橘核丸	271—272	追風苏合丸	94
宫方草灵丹	76	杂調散	148	追風活血膏	113
宫粉膏	364	茱連左金丸	261	追風活絡丹	122 123
高氏女金丸	451	茯苓丸	83	追風散	109
高丽丸	206	茯苓丸	63	追風透骨丹	124
高丽清心丸	104 206	茯苓丹	63	追風膏	113
疳积丸	509	疳防敗毒散	149	追風露	133
疳积散	514—515	起痿丸	40	追風露药酒	133
离宮錠	392	郝氏养肺丸	224	追虫利积丸	269
养血归脾丸	32	真人还少丹	78	烏头赤石脂丸	290
养血安胎丸	458	真人养臟散	318	烏龙丸	296
养血当归膏	443	真色五花丸	511	烏龙散	553
养血当归精	443	真武丸	17	烏龙膏	369
养血固胎丸	458	真犀丹	162	烏龙錠	559—560
养血愈風酒	128	桂附八味丸	18	烏金丸	464—466
养血調經丸	428—430	桂附地黄丸	17	烏金散	431
养血調經膏	443—444	桂附理中丸	303	烏梅丸	311—312
养陰清肺丸	216	桂附膏	114	烏梅安胃丸	311
养陰清肺膏	216 236	桃花散	359-360 397 410 485	烏梅安眠丸	312
养荣丸	26—27	原方平胃散	283	烏鷄丸	422
养胃丸	289	原方封髓丹	79	烏鷄白鳳丸	419—421
养肺止嗽丸	218	夏枯草膏	374—375	烏鷄种子丸	422
养肺止嗽丹	241	破气丸	267	烏鷄調經丸	422
养臟散	318	破伤風止真散	409	烏賊骨丸	424
养脾进食丸	287	破血紫金丹	470	脏連丸	347—348
益心救苦金丹	449	桑枝膏	114	胭脂膏	369
益元散	180—181	桑麻丸	48—49	臭灵丹	197
益气丸	25	桑麻散	234	射干麻黄丸	228
益气六君丸	285	桑菊散	148—149	純阳正气丸	172—173
益气健中丸	31	桑菊銀翹散	149		
益气聪明丸	531	桑槿子膏	68		
益母丸	425—426 428	桑槿膏	68		
益母还魂丹	455	退云散	535		
益母草膏	444 446	退翳丸	531		
益欢散	274—334	退翳回光散	538		
益寿比天膏	66	退翳回光膏	539		
益坤救苦金丹	449	退翳还睛丸	533—534		
泰山盤石丸	460	除痔丸	350		
琥珀安神丸	36	除湿膏	397—398		
琥珀保嬰丹	496	除痛丸	267		
珠黄宝生丹	495	除痰二陈丸	228		
珠黄消疳散	554	除瘟丸	475		
珠黄琥珀抱龙丸	482	除瘟救苦丹	188		
珠黄散	485 553—554	党参膏	319		

十 一 画

凉水金丹	263	279—280
涼金丸		263
涼寒头痛酒		162—163
涼膈丸		206
涼膈丹		206
涼膈散		215
清心丸		105
清心牛黄丸		102—103
清心明目上清丸		522
清火丸		205
清火化痰丸		230
清火明目丸		523
清火涼膈丸		206

索	引				
清火凉膈散	215	清湿紫金膏	369	理疝丸	272
清火贵金膏	216	清暑益气丸	169	理疝胡芦巴丸	273
清元散	180	清痰止嗽丹	240	理肺丸	219
清气化痰丸	229—230	清蛾散	555	理脾止泻丹	506
清宁丸	207—210	清肠解痢散	319	救产丸	464
清虫散	513	清解散	150	救坤丹	447
清华潤肺丹	241	清經散	467	救苦丹	188
清血珠黄丸	338	清瘟丸	139—140	救苦玉雪丹	156
清血搜毒丸	351	清瘟丹	155	救苦金丹	449
清血解毒丸	338	清瘟至宝丹	155	救苦膏	112
清肝保脑丸	544	清瘟解毒丸	140 155	救急水	200—201
清毒药	392	清瘟解毒丹	140 155	救急丹	188
清金止咳化痰丸	223	清瘟解毒膏	151—152	救急痧气丸	176
清金止嗽化痰丸	223	清魂散	467	救急痧药水	201
清金止嗽膏	235—236	清燥救肺丹	241	救急散	184
清金理嗽丸	493	清麟丸	136	救急雷公散	184
清金散	234 501	淋症丸	332	救急膏	112
清音丸	549	混元丹	506	救急避瘟散	183
清神定志丸	105 106	净肺丸	330	救惊丸	476
清咽太平丸	548 549	梁会大津丹	126	救惊丹	495
清咽抑火丸	223	密陀僧散	397	救惊散	487
清咽利膈丸	548	惊风七厘散	486	培坤丸	424
清咽散	274	惊风丸	476	培坤丹	448
清胃丸	206—207	惊风抱龙丸	480	堆毒群芳白	394
清胃保安丸	287	惊风散	109	都气丸	56—57
清胃黄连丸	206 207	惊悸丸	106	控涎丸	335
清胃黄连膏	207	惜红丸	223	控涎丹	335 336
清胃散	215	痔瘡丸	349—350	接骨丹	413
清肺止嗽丸	221	痔漏丸	350	荷叶丸	325 326
清肺化痰丸	220—221	痔漏无双丸	351	速翹敗毒丸	337
清肺宁	243	麻子仁丸	313	速翹敗毒膏	362 371
清肺抑火丸	221—222	麻仁丸	312 313	速翹解毒丸	140—141
清肺抑火化痰丸	221	麻仁滋脾丸	312 313	速产鬼脑丸	460
清肺抑火膏	221 223 236	鹿角胶	81	乾元丹	496
清肺散	234 500	鹿胎丸	418	乾坤一气膏	562
清肺膏	236	鹿胎冷香丸	419	乾坤丹	76
清宫丹	154	鹿胎膏	443	乾坤种子丹	76
清疳化虫散	515	鹿胎胶	443	梅苏丸	172
清疳散	514	鹿茸大补丸	12	梅花丸子	379
清疹散	473	鹿茸丸	14	梅花点舌丹	377—379
清热三黄丸	201	鹿茸膏	67	梔子金花丸	205
清热保幼丹	492	鹿茸丸	12	梔子金花膏	205
清热凉血膏	462	鹿肾胶	82	朱衣宽中丸	266
清眩丸	136	鹿鞭胶	82	朱珀鎮神丹	127
清脑慧智丹	70	羚羊明目丸	522	朱珀鎮惊散	487
清凉明目膏	538	羚翹解毒丸	134—135	朱砂万亿丸	294—295
清凉眼药面	543	羚翹解毒膏	157	朱砂万应丸	294
清凉散	534	断红锡鬚丸	327	朱砂安神丸	35—36
清凉解毒丸	141	雪梨膏	238—239	朱砂膏	368
清凉膏	371	理中丸	301—303	礞砂散	545
清痔散	359	理气丸	246	礞砂膏	365
清湿二妙丸	166	理气健脾丸	299	通产散	461
清湿三妙丸	166	理气舒肝丸	246		

通关丸 64
 通关散 109—110
 通关滋肾丸 63 331
 通耳红棉散 544
 通乳湧泉散 467
 通宣理肺丸 219—220
 通宣理肺膏 235
 通幽半硫丸 315
 通聖丸 138
 通絡益氣丹 123
 通經丸 431
 通經甘露丸 431—432
 屠苏酒 323
 屠苏飲 323
 陳鞠 324
 逍遙丸 436
 逍遙散 436 442—443
 眼科八宝散 537
 眼癬藥 543
 敗毒散 149—150
 異功散 504 554
 異授二龍膏 277
 累濟散 184
 崩漏止血散 443
 崩露丸 440
 崔氏八味丸 19
 第一效丹 413
 梨膏 238—239
 脚氣粉 399
 脚氣散 399
 脚氣藥 399
 脚氣藥粉 399
 魚鱉丸 16
 魚鱉種子丸 16
 健兒素 516
 健民丹 197
 健民滋荷油 393
 健母固胎丸 458
 健阳老奴丸 38
 健步虎潛丸 84—86
 健体固本藥酒 241
 健胃丸 287
 健胃止嘔散 318
 健胃丹 321
 健胃散 504
 健脾丸 297—298
 健脾平胃丸 284
 健脾肥兒丸 502 509
 健脾增力丹 321
 健脾粉 325
 健脾養生丸 296
 健脾膏 324—325
 既濟丸 47

既濟固真丹 74
 猪肝散 467
 猪肚丸 64
 猪腰六合散 65
 得生丹 456—457

十二画

湧泉散 467
 温六散 182
 温元散 180
 温白丸 294
 温脾固腸散 505
 温經丸 422—423
 温氣藥 399
 寒涼咳嗽酒 242
 割耳散 545
 痧丸 176
 痧氣飞龙夺命丹 194—195
 痧氣丸 175
 痧氣丹 177
 痧氣靈丹 177—178
 痧氣臥龍丹 193
 痧氣蟾酥丸 176
 痧藥 175 177—178
 痧藥丸 175 178
 痧藥蟾酥丸 177
 痞藥 514
 痛經丸 432
 痢症散 319
 痢疾丸 307
 痢疾導滯散 319
 痢疾奇妙丹 323
 痢疾香連散 318
 痢疾散 319
 普濟丸 141
 普濟回春丹 152
 普濟靈砂丹 152
 普濟消毒丸 141 170
 普濟通宣丸 141
 普濟通眩丸 141
 普濟散 184
 普濟解疫丸 171
 普濟解疫丹 187
 普救丸 248
 琼玉膏 237—238
 斑龍二至丸 62
 斑龍二至百補丸 62
 斑龍丸 62
 斑龍百補丸 62
 琥珀丸 331
 琥珀五淋丸 331
 琥珀分清丸 331
 琥珀丹 73
 琥珀鳳凰丸 332

琥珀安神丸 36
 琥珀多寐丸 37
 琥珀利氣丸 266
 琥珀抱龍丸 481—482
 琥珀還睛丹 540
 琥珀參苓散 334
 琥珀勝金丹 452
 琥珀養心丹 73
 琥珀茯苓丸 215 464
 琥珀清金散 235
 琥珀救喉散 555
 琥珀通淋丸 331—332
 琥珀散 110
 琥珀膏 370
 琥珀蜡矾丸 338—339
 琥珀鎮驚丸 478
 越鞠丸 261—262
 越鞠保和丸 262—263
 菩提萬應丸 170
 菩提丸 169—170
 菩提救苦丸 169
 萃仙丸 62
 萃仙丹 62
 萊菔散 235
 菊花明目丸 522
 菊花茶調散 147—148
 菊花通聖丸 522
 單解分清丸 331
 單解分清散 331
 提毒散 355 383 392
 提膿八將散 355
 提膿丹 386
 換骨丹 125
 搜風丸 93
 搜風順氣丸 89—90
 腎氣丸 43
 黃水瘡散 399
 黃水瘡藥 399
 黃水散 397
 黃芪建中丸 25
 黃芪膏 66
 黃明膠 81
 黃金丹 188—189
 黃金散 396
 黃腫丸 31
 黃狗腎膠 82
 黃狗鞭膠 82
 黃病絳矾丸 305
 黃連上清丸 201—203
 黃連上清膏 203
 黃連安神丸 35
 黃連羊肝丸 523—524
 黃連利氣丸 247

鸡鸣遇仙丹 280
 隔紙膏 369
 齡龟丸 419
 暖宮丸 433
 暖臍丸 310 321
 暖臍膏 319—321
 鉄門栓 516
 鉄扇散 410
 鉄笛丸 549—550
 鉄簾散 354—355
 愈風丹 123—124
 愈風酒 128
 愈痔丸 350
 威应丸 96
 威应丹 183
 威应救急丹 196
 感冒苏風丸 135
 腸風槐角丸 348
 腸胃舒郁丸 265
 腸連丸 347
 腸紅丸 326—327
 解肌宁嗽丸 499
 解肌安嗽丸 224
 解表散 150
 解毒犀黃丸 342
 解毒斷蛇丸 109
 解郁四宝丹 279
 解热鎮靜錠 198 200
 解語丹 127
 催生丸 460
 催生丹 460—461
 催牛兔腦丸 460
 催乳丸 466
 經帶金丹 454—455
 經期腹痛丸 432
 經驗止痛丸 266
 經驗失笑散 466
 經驗療癰丸 344

十四画

滴耳油 546
 滾痰丸 232—233
 滌痰丸 233
 蜜制山楂丸 307
 蜜煎導 325
 慢惊丸 482
 精制万应錠 127
 精制灵砂丹 152
 精制猴棗散 109
 駝皮膠 80
 碧云散 534
 碧玉散 180 182 556
 碧雪丹 558

碧霞丹 539
 痰藜丸 521
 痰藜明目丸 521
 蒼朮丸 169
 慈航丹 453—454
 嘉禾散 274
 截瘡七宝丹 162
 截瘡散 151
 聚精丸 62—63
 槐角丸 348 349
 槐角地榆丸 349
 輕黃膏 398
 豨薟丸 90—91
 豨薟膏 116
 蜡矾丸 337—339
 銀粉散 360—361
 銀翹散 149
 銀翹解毒丸 135
 銀翹解毒散 149
 銀翹解毒膏 151
 銀翹解熱丸 135
 毓麟固本膏 67
 毓麟珠丸 417—418
 熊油虎骨膏 114
 熊胆爛眼膏 539
 熊胆軟膏 377
 綠云膏 366
 綠袍散 552 553
 綠苔葯 366

十五画

潤肺白花香 235
 潤肺鉄笛丸 218
 潤肺膏 236
 潤使丸 313
 潤腸丸 313—314
 寬中丸 296
 寬胸利膈丸 246
 諸瘡一掃光 401
 諸瘡解毒丹 382
 諸痔脫管丸 350
 諸葛行軍散 185
 調中消丸 259
 調中健脾丸 298—299
 調胃健中丸 296
 調經丸 417 428 430
 調經女金丹 450—451
 調經丹 455
 調經回春膏 444
 調經育子丸 429
 調經和血散 443
 調經種子丸 417
 調經養血丸 429

調經益母丸 428
 調經毓麟丸 418
 調經毓麟珠 418
 熟地膏 462
 摩風膏 398
 糊葯 325
 震灵丹 454
 駐車丸 310
 增力丸 293
 增精補腎丸 59
 撥云丸 532
 撥云退翳丸 531—533
 撥云退翳丹 532—533
 撥云退翳散 535
 撥云眼葯 541
 撥云散 535—536
 蓮沉百消丸 252
 蓮沉消導丸 252
 辟耳散 544
 樟冰散 558
 磁砂丸 530
 磁硃丸 530—531
 黎峒丸 404—406
 黎峒膏 410—411
 膝下膏 369
 綿上黃芪膏 66
 緩中丹 322

十六画

燙火軟膏 412
 燙火葯 414—415
 燙火葯膏 412
 磨積散 274
 磨障丹 540
 磨障灵光丹 539—540
 瘰癧干提膏 376
 瘰癧丸 345
 瘰癧內消丸 345
 瘰癧疏肝丸 344
 燒針丸 503
 霍乱急救丸 175
 霍乱救急丹 196
 靜神丹 70
 蕩疔丹 281
 養仁春雪膏 539
 醒消丸 341—342
 醒迷至宝丹 127
 醒脾丸 482—483
 橄欖膏 558
 橘半枳朮丸 289
 橘香散 359
 橘紅丸 229
 橘紅化痰丸 229

案	引				
橘核丸	270—271				
橘核疝气丸	271				
穎曲氏回春膏	376				
响化丸	550				
响化止咳丸	227—228				
退避清解散	150				
退避紫草丸	472				
螃蟹丸	110				
錫类散	552				
鷓鴣膏	376				
十 七 画					
赛空青眼散	537				
赛空青眼药	542—543				
赛金化毒散	517—518				
謝氏育嬰丹	497				
痢症鎮心丸	106				
痢症鎮心丹	127				
瘡症丸	470				
霜雪定喘丸	233				
零天曲	243				
擦牙散	558				
擦疥药	399				
擦癬药水	400				
薄荷油	393				
煮苡附子敗醬散	359				
煮苡敗醬散	359				
薯蓣丸	25—26				
薛氏金匱腎气丸	42				
韓氏驅毒散	354				
避火丹	390				
避疫散	183 183				
避秽回苏丹	192—193				
避瘟丹	182—183				
避瘟散	506				
嬰兒至宝丹	504				
嬰兒健脾散	483				
嬰兒驚散	393				
臙瘡神效方	369				
臙瘡膏	329				
鮮生地露	200				
鮮菴香露	234				
黛蛤散	65				
縮泉丸					
十 八 画					
檳榔丸	245				
檳榔四消丸	259				
檳榔消痞散	274				
檳榔順气丸	245				
鎮坎散	334				
鎮惊丸	476—478				
鎮惊定痙散	110—111				
鎮惊散	487				
鎮惊新药	498				
鎮惊膏	488				
鎮阳丸	61				
鎮阳固精丸	61 62				
鎮阳固精丹	61				
鵝黃散	360				
鵝瑯丸	562				
脐风散	486				
鯽魚白油膏	366				
鯽魚膏	366				
十 九 画					
藤黃膏	364				
霸王泥	400				
礞石丸	232				
礞石滾痰丸	231—233				
蟾香散	334				
蟾酥丸	176 339—340				
蟾酥条	391				
蟾酥痧气丸	176				
蟾酥痧药丸	176				
蟾酥解毒丸	340—341				
蟾酥餅	391				
蟾酥錠	390—391				
蹲鴟丸	344				
獼肝丸	57				
二 十 画					
藿香正氣丸	166—169				
藿香正氣散	179				
藿香丸	168				
藿香散	179				
藿胆丸	544				
藿嗽丸	227				
二 十 一 画					
麝香化積丹	280				
麝香化痞膏	277				
麝香回春膏	376				
麝香拔毒膏	371				
麝香狗皮膏	115—116				
麝香救疫散	184				
麝香透毒散	150				
麝香蜈蚣膏	365				
麝香膏	365				
驅風膏	113				
驅疫丹	153				
纏喉散	555				
續隨子丸	331				
二 十 二 画					
瘰癧五海丸	346				
癬治水	400				
癬瘡方	400				
癬瘡药	400				
癬药水	400				
臘仙琼玉膏	238				
二 十 三 画					
蠲痛活絡丹	122				
驗方千鍾膏	398				
蠱症散	275				
二 十 四 画					
癲狂丸	106				
癲狂丹	127				
癲狂老虎丸	107				
癲狂馬宝散	111				
癲癰白金丸	106				
鰲甲丸	146				
鰲甲胶	80 81				
鰲甲煎丸	145				
鰲驚咯丸	500				
二 十 五 画					
獾油	415				
二 十 七 画					
鷓鴣涎丸	500				

行名、药名对照表

本表按左起字首，一丨丿起笔排列

三四十一画

三画	六画	九画	十画
三春柳 子朮 干淮山 大枫 大风肉 大风子 寸朮汁 小豆 上桂 川甲	山川柳 於朮 干淮山 大枫子 大枫肉 大枫子 白朮汁 赤小豆 上肉桂 穿山甲	制黄芩 前仁 洋老 草决 茺蔚 荆子 春砂 胆草 盆子 香排 丝子 丝餅 独脚蓮	炙黄芩 車前子 樟脑 草决明 茺蔚子 蔓荆子 阳春砂 龙胆草 复盆子 排香 菟丝子 菟絲餅 独角蓮
四画	七画	十画	十一画
六麵 天花 五倍 天竹 王不留 王不留 不食 中白 中黄 水紅 公丁 公英 毛狗 牛子	六神麵 花 五倍 天竺 王不留 王不留 不食 中白 中黄 水紅 公丁 公英 毛狗 牛子	宮粉 凌香 酒归 酒母 浮海石 海沉 海蛸 海桐 海藤 粉丹 荳根 桑蛸 珠砂 桂子 連子 秦归 倍子	官粉 零陵香 酒当归 酒知母 海浮石 海沉香 海蛸 海桐皮 海枫藤 粉丹皮 山豆根 桑蛸 硃砂 肉桂 蓮子 秦归 五倍子
五画	八画	十一画	十一画
石决 石菖蒲 节蒲 甘葛 田七 北辛 冬瓜 瓜仁 白皮 白冰 白附 白菊 片姜 母丁 台烏	石决 石菖蒲 九节蒲 乾葛 田三七 北細辛 款冬 瓜蒌 桑白 白冰糖 白附子 白菊 片姜 母丁 台烏	鹿胶 羚羊 羚羊 羚羊 羚羊 淮膝 清盐 盆沉 排草 萊	鹿角胶 羚羊角 羚羊角 羚羊角 羚羊角 淮牛膝 大青盐 盆沉香 排草 萊

校勘表

頁	欄	行	誤	正	頁	欄	行	誤	正
2	左	12	炒炭系藥物炒至黑色	炒炭系將藥物炒至黑色	83	中	13	及婦產后發喘	及婦人產后發喘
7	左	18		“施紙上貼之”下落(見鬼遺方)四字	83	右	倒數10	去水瀝干	去水晒干
8	右	12	加熱使用	加熱使溶	84	中	1	碎研	研碎
13	中	29	和搗為丸	搗和為丸	89	中	1	三錢大	三錢重
19	右	18	遵醫師指示服用	或遵醫師指示服用	89	右	32	清溫或溫酒	清湯或溫酒
22	左	33	諸藥研細末	共研細末	91	右	10	癰瘻	麻痺
24	左	21	蜜煉為丸	煉蜜為丸	91	右	13	貫仲	貫仲
25	右	18	煮融玄皮	煮熟玄皮	95	中	倒數9	兌與以上細料	兌以上細料
25	右	21	熱湯送下	熱湯送下	95	右	36	白蜡固封	白蜡封固
26	中	36	藥共研細粉	“藥”字刪	96	左	20	霍	霍
27	左	5	蜜煉為丸	煉蜜為丸	96	右	2	不滿金衣	花金衣
29	左	22	蜡封固	蜡皮封固	100	左	30	霍香	養香
31	左	倒數1	糯米粉為小丸	糯米粉打糊為小丸	102	左	13	每粒按潮重一錢	每粒潮重一錢
32	中	10	蜜煉為丸	煉蜜為丸	102	中	3	蜡封固	蜡皮封固
32	右	33	三錢	每服二錢	102	右	10	萬氏牛黃清心丸	萬氏牛黃清心丸
36	左	22	硃砂加衣	硃砂為衣	103	左	33	一丸	每服一丸
37	左	34	臥寐不安	夜寐不安	103	中	18	煉蜜蜡壳為丸	煉蜜為丸，蜡壳封固
39	左	5	大	重	104	中	40	五分至一錢	可用至一錢
43	右	倒數9	遵醫師指示服用	或遵醫師指示服用	105	左	35	陸續研配	陸續配研
44	右	34	或滾水	“或”字刪	105	左	倒數3	瘕瘕	瘕瘕
48	右	28	氣腹時	空腹時	105	中	38	臨服	臨睡
52	右	4	精神靡味	精神頹靡	105	中	47	入添	添入
58	右	15	或煉蜜為丸	以煉蜜為丸	105	右	11	臨服時	臨睡服
58	右	43	均	勻	108	右	21	加然銅、毛狗二錢	加自然銅、狗脊各二錢
53	中	35	各服一丸	各服一次	109	右	倒數9	共研細末，雷細藥室	共研極細末
53	中	41	抗芎	杭芎	110	左	5	樟丹成膏時	馬寶
62	左	14	細入藥粗入熬膏用	細入藥，粗熬膏用	112	中	37	每張大小四錢五分至五錢	下丹成膏時
66	左	21	菟絲子	菟絲子一兩	112	中	44	每張大小四錢五分至五錢	每張四錢五分至五錢
66	左	27	而熬之滴水成珠	熬至滴水成珠	113	右	33	外入	兌入
67	中	18	當歸一錢	當歸一兩	116	左	30	銀衣	銀花
67	右	11	以燭封口	以蜡封口	118	左	16	遞加一錢正	遞加至一錢正
68	左	24	細末料	細料	119	左	5	竹节香附	竹节香附
68	左	25	細末方	細料方	119	左	倒數9	竹节香附	竹节香附
68	左	32	冬虫海龙各四	冬虫夏草海龙各四兩	121	右	26	与余共碾极細面	与余药共碾极細面
70	左	7	九节菖蒲	九节菖蒲	125	右	26	水为丸	水泛为丸
73	中	7	丸如黍米大	和丸如黍米大	126	中	4	远連	黃連
75	右	28	七分大	七分重	126	中	30	大赤金丹为衣	大赤金为衣
75	右	倒數3	餅知母	及知母	127	左	11	共为末	共为細末
76	中	8	莢	实	127	中	18	共为末	共为細末
77	右	倒數10	淫羊藿	淫羊藿	129	左	22	用生絹布盛	用生絹袋盛
82	右	21	凉干装瓶	晾干装瓶	129	右	39	漚	滲
					130	左	11	对入	兌入
					131	右	16	骨脛	脛骨
					131	右	35	共烧酒	用烧酒
					142	右	倒數6	固封	封固

頁	欄	行	誤	正
146	中	11	易	宜
149	左	5	一袋	每服一袋
149	左	倒数11	一袋	每服一袋
149	右	倒数1	為細末	共為細末
150	右	7	及溫	體溫
153	中	11	每一丸	每服一丸
154	中	5	二錢大	二錢重
154	右	14	雙叶	桑叶
157	左	26	尋衣	循衣
157	右	20	尋衣	循衣
158	右	倒数4	煩燥	煩躁
160	中	7	篋	棒
161	中	14	篋	棒
161	右	23	固封	封固
163	左	18	吳芷	白芷
163	左	23	海	梅
164	中	16	羔	糕
167	右	22	三錢至五錢	每服三至五錢
168	右	13	患者每服一丸	“患者”二字刪
171	中	30	離鄉行旅，水土不服	應刪去
172	中	18	鈕扣	鈕扣
173	中	32	九十六兩	應刪去
179	中	1	不欲	不欲飲
179	右	倒数2		加“藿香”
180	左	倒数8	細糲米	紅糲末
181	中	14	每服三錢	應刪去
182	中	6	共為兌研為細面	共研為細面
183	左	17	細辛	細辛三兩
183	中	倒数10	銀珠	銀硃
185	右	21	開白涼	涼白開
187	中	倒数1	三錢	每服三錢
190	右	15	銜	啣
191	中	8	共研細粉	混和研勻
192	左	32	丹石錢	月石錢
192	中	8	再和研勻	混和研勻
192	中	31	再和研勻	混和研勻
192	右	倒数2	鬼剪羽	鬼箭羽
194	左	7	灰	炭
194	左	28	灰	炭
194	中	17	灰	炭
194	中	21	每瓶二分封	每瓶二分，沾蜡密封
195	左	25	灯草灰	灯草炭
198	右	倒数6	酒醱磨服	酒醋磨敷
199	左	倒数9	沉香墨	陳香墨
199	中	倒数12	如醋研敷	加醋研敷
200	中	倒数6	玻璃裝包	玻璃裝貯
200	右	24	冬花	忍冬花
202	中	7	三錢	每服三錢
208	左	倒数7	拌蒸晒干	應刪去
208	左	倒数6	拌蒸晒干	應刪去

頁	欄	行	誤	正
208	中	倒数8	晒干	晒干研細
209	左	20	合豆	黑豆
209	右	18	主肝火，便秘，小 溲不利，淋症， 腸風便血	應刪去
211	中	5	二錢大	二錢重
213	左	倒数4	煉蜜為丸	煉蜜為丸
214	右	7	一丸	每服一丸
216	左	3	千金釵石斛	千金釵石斛
222	左	1	共軋面	共軋細面
225	中	倒数9	各五兩	應刪去
229	中	8	馬兜苓	馬兜鈴
232	右	16	元胡粉	元明粉
235	右	7	阴	滲
236	中	倒数9	治	主
237	左	倒数7	一匙	每服一匙
239	右	倒数10	去节	去芦
239	右	倒数8	阴	滲
240	中	8	一匙	每服一匙
245	中	29	胸肋	胸脇
246	左	11	為水丸	水泛為丸
246	左	19	閃亮	闐亮
251	左	14	咯	噎
251	右	9	隔	膈
252	左	3	咯	膈
252	中	倒数4	肋	脇
253	右	倒数10	二錢至四錢	每服二錢至四錢
254	左	11	水為小丸	水泛小丸
257	左	16	咯	噎
257	左	32	咯	噎
262	中	倒数6	分量用各四兩	分量各用四兩
262	右	4	分量用各一斤	分量各用一斤
264	右	倒数12	咯	噎
265	左	17	舒肺丸	舒肝丸
269	中	倒数1	大	重
273	左	6	外方	處方
274	左	35	噴門	賁門
276	左	17	牽丹	章丹
280	右	13	紅豆寇	紅豆蔻
284	左	27	香砂	木香 砂仁
284	左	29	香砂	木香 砂仁
286	左	倒数12	三錢	每服三錢
288	中	27	香砂	木香 砂仁
288	中	29	香砂	木香 砂仁
295	中	18	三消	三仙
298	右	13	蜡皮	蜡皮固封
299	中	20	甘姜	干姜
301	中	倒数8	香砂	木香 砂仁
301	中	倒数6	香砂	木香 砂仁
307	左	倒数6	砂蓮子	炒蓮子
309	左	16	浓血	膿血
310	右	7	热水帶	热水袋

頁	欄	行	誤	正
310	右	15	密丸	蜜丸
311	中	16	送用	送下
313	左	8	空服	空腹
316	左	35	砂惹仁	炒惹仁
321	左	倒數 7	沙	紗
323	中	38	霍香	藿香
324	中	2		“鮮蒼耳草”加 “適量”
324	中	35		“蓼實”后加“各 十斤”
325	右	10	三錢	每服三錢
326	左	36	七爪 橘紅	七爪橘紅
332	左	29	每包	每服
333	右	倒數 5	赤露	赤淋
338	左	10	沈氏遵生書	沈氏尊生書
338	左	33	干蟬	干蟾
339	中	32	修合時忌婦人雞 犬見之	應刪去
339	右	2	瓶收貯封固	玻璃收貯封固
339	右	17	天蝸牛	大蝸牛
339	右	倒數 11	研開極細粉	研成極細粉
340	中	2	搗亂	搗爛
340	中	19	搗亂	搗爛
340	中	倒數 5	冰片	冰片各一分
341	中	7	消痰	消炎
342	左	27	廣增	增廣
343	中	8	每服五分一錢	每服五分或一錢
344	左	34	固封	封固
344	中	13	核內	核桃內
346	右	倒數 6	肉包不便	肉色不變
347	中	倒數 5	陳蒼米	陳倉米
347	右	倒數 5	漫火	慢火
348	中	17	搗亂	搗爛
351	中	10	金蟬	金蟾
352	右	33	外用搽油	外用茶油
355	右	倒數 2	一、二十內	一二十分鐘內
362	左	18	漚	滲
362	右	8	枳	應刪去
366	右	14	巴豈	巴豆
366	中	28	一貼	每用一貼
367	左	19	熬成	熬至
367	左	20	搗勻	攪勻
367	右	倒數 11	銀珠	銀硃
368	中	倒數 1	藥研細末	共研細末
369	左	16	紅昇片	紅昇丹
371	左	6	干蟬	干蟾
371	中	29	干蟬	干蟾
374	右	13	漚	滲
375	左	倒數 2	下丹陀僧	下章丹及密陀僧
375	右	20	屯	藤
376	左	15	敷處	患處
379	中	倒數 5	珍珠	珍珠各一錢

頁	欄	行	誤	正
380	左	34	麝香	麝香五分
383	左	17	癰	痛
384	左	14	要	藥
381	中	29	三炷香去火冷	三炷香去火冷定
384	中	30	開看者	“者”字刪
385	中	12	火釘	大釘
385	中	17	用火	用水
385	中	19	均有	約有
387	左	倒數 10	化烱	烱化
388	左	倒數 11	黑炭	墨炭
388	左	倒數 14	地骨	地龍
388	中	10	枝元	桂元
388	中	26	險瘡	險瘡
388	中	27	險疽	險疽
390	左	16	每付九丸	每服九丸
391	左	倒數 9	麝香	麝香五分
391	左	倒數 9	冰片	冰片一錢
391	右	倒數 12	凉水抹液	凉水磨液
392	左	25	麝香	麝香一錢
392	左	25	冰片	冰片二錢
396	右	20	少許	每次少許
400	左	10	青粉	輕粉
401	左	倒數 6	勻有效	均有效
406	中	12	冰片	冰片各二錢
409	中	30	吳白芷	香白芷
409	中	倒數 6	每三錢分裝玻璃 瓶內	每三錢裝玻璃瓶 內
410	中	倒數 1	每末一錢	每服一錢
412	左	28	洗片	冰片
418	中	4	鹿茸	鹿茸各三錢
419	左	35	水滾小丸	水泛小丸
421	右	4	龜甲	鱉甲
421	右	15	三錢大	三錢重
426	中	5	每五十丸	每服五十丸
426	左	倒數 6	人參	人參一兩
430	左	22	云苓	茯苓
431	左	10	蜜丸三錢大	蜜丸三錢重
438	中	13	同炒去梔	同炒去山梔
440	右	9	蜡	醋
444	右	19	阴	滲
444	右	33	漚	滲
447	中	21	帶	滲
450	右	7	小兒不用	應刪
450	右	28	扎	軋
454	左	倒數 12	楓	風
454	中	33	白開水送下	煎水送下
455	左	倒數 8	等症	應刪
455	中	倒數 3	用細絹布包好	用細絹包好
457	中	33	病	痛
458	中	23	共軋而	共軋面蜜丸
458	中	倒數 1	均青	均青皮
459	右	15	沉香	沉香二錢

頁	欄	行	誤	正	頁	欄	行	誤	正
459	右	15	川貝母	川貝母各一錢	500	左	倒数14	咳	咯
462	左	21	澱	滲	502	左	倒数6	硃砂	硃砂各五錢
462	左	32	澀	滲	502	左	倒数5	牛黃	牛黃各一錢
463	中	44	二个	二斤	502	左	倒数5	人參	人參五錢
463	中	倒数3	紙棉包	棉紙包	502	中	倒数3	共制为細面	共研为細面
464	中	11	西綿文	西錦紋	508	左	倒数6	淨裝一分	淨重一分
464	中	23	后蓐发热	产蓐发热	511	左	23	人參	人參五錢
465	中	18	溫酒或开水送下	溫酒或开水化服	511	中	25	干蟬	干蟬
			化服		513	左	10	巴豆霜	巴豆霜四兩
465	中	34	或遵医指服	或遵医喝服	513	中	22	芡实一錢半	芡实七錢半
465	右	39	三錢大	三錢重	514	右	38	魃乳	魃乳
470	左	20	紅花一兩二分	紅花一兩	515	中	14	研細一丹兌	研細再对
470	右	33	白硃砂	“白”字刪	523	右	16	退云	退云翳
478	中	42	大人服二丸	应刪	530	左	倒数5	磁砂丸	磁硃丸
480	左	倒数6	煉蜜为三分大丸	煉蜜为三分重丸	532	中	32	努	搗
480	右	9	橘仁	橘核	534	右	4	“服”	应刪
481	右	倒数8	麝香另研外后	“后”字刪	536	中	倒数6	杜薺粉	薺薺粉
482	中	21	牛黃	牛黃一兩	538	左	25	肝熱	肝熱
482	中	22	冰片	冰片各五錢	538	左	35	阴	滲
482	中	22	沉香	沉香各二兩	538	中	倒数1	阴	滲
483	中	21	如小儿痧疹	如有痧疹	539	右	32	碎	滓
484	中	28	薄，姜	薄荷姜湯	540	左	倒数12	麝香	麝香三分
488	左	23	阴	滲	540	右	倒数3	并裝	瓶裝
488	中	14	蜡封固	蜡皮封固	544	左	6	左磁	左慈
488	中	23	柴朴	紫朴	551	右	倒数5	患上	患处
489	左	倒数10	人參	人參五錢	553	中	1	連黃	黃連
493	中	5	明雄黃	明雄黃各二錢	556	左	32	共細面	共研細面
493	中	5	麝香	麝香一錢	558	中	倒数4	阴	滲
494	右	29	为三分五厘重	为三分五厘重丸	558	右	7	阴	滲
495	中	3	琥珀	琥珀二錢	560	右	21	每服一分	每用一分
495	中	4	珍珠	珍珠各一錢	562	左	倒数11	药每丸九分	約每丸九分
495	中	4	冰片	冰片各五分	563	中	31	再熬滴油成珠	再熬至滴水成珠
496	右	22	周岁以下者，小	周岁以下者服半	563	右	12	乳蛾	乳蛾
			儿服半丸	丸	564	右	倒数2	白白	石白
497	中	16	人參	人參一兩	567	左	7	麝香	麝香三錢
497	中	16	麝香	麝香各五分	567	左	7	冰片	冰片一錢五分
497	中	16	硃砂	硃砂一兩	567	右	倒数3	糠缺	糠缸

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名= 全国中药成药处方集

作者= 中医研究院中药研究所 沈阳药学院药学系合编

页数= 5 9 1

S S 号= 1 0 3 4 1 0 7 1

出版日期= 1 9 6 2 年0 9 月第1 版